



ARMY MEDICAL LIBRARY
FOUNDED 1836



WASHINGTON, D.C.

Apud Vincent. p. 83 sq.

De Siloh, Gen. 49.

Gnate Dei effigies aeterni viva parentis,
 Aeterna Verbum mente satumque patris.
 Iudutus nostra qui carne in virginis alvo,
 Humanum accedis, maxime Christe, genus:
 Te pius Isacides compellat nomine Siloh,
 Quod tenerae es foetus virginis ipse tener.
 Ac velut involvens foetum membrana recentem,
 Dum rude sub matris pectore turget onus.
 Mollis et adinotus non est durabilis ullos,
 Pendet et a Cotylis squalida tota novis:
 Sic infirma fuit caro tunc tua maxime Christe,
 In cruce pro nobis cum lacerata fuit.
 Indueras etenim mirando foedere carnem,
 Huic nostrae similem, suppliciiue ream.
 Sed prorsus fragilis nos ipsi, et sordida pellis,
 Materna chorion labe reumque sumus.
 Attamen hoc vivet chorion, quando induis ipse,
 Voce tua sanans, atque cruore lavans.
 Sic autem nobis divina haec munera dantur,
 Cum discunt vocem pectora nostra Dei,
 Ac coetus ideo discentum Christe tueris,
 Ut chorion vere sit Schola casta tuum.
 At tua tuta precor servetur fascia Siloh,
 Ne queat hanc ullus dilacerare furor.

No. 256.

an. 1552.

Versus, quos Mel. scripsit in exemplar dialectices Antonii
 Geueri Noribergensis patricii d. 6. Mart. 1552., editi
 primum a Strobelio in: Nachricht von Mel. öfterm Aufenth.
 und Berichtigungen zu Nürnberg. p. 40 sq. in eiusd. vermisch-
 ten Beiträgen zur Lit. p. 120.

In tota vita numeros ut scire necesse est,
 Idque Deus lumen mentibus ipse dedit;
 Sic praecepta homines dialectica nosse necesse est.
 Haec enim a summo lux venit orta Deo,
 Ordine diversus res ut distinguere possis,
 Ne velut obscurum sit tibi sermo chaos,
 MELANTH. OPER. VOL. X.

No. 257.

an. 1552.

Scripta publ. Witteb. I, p. 435 b. et apud Vincent. p. 61 sq.

Philippus Melanthon de consideratione humani corporis.

Non casu volucres atomi, sine mente ruentes,
 Hanc mundi formam progenere novam.
 Formatrix sed mens sapiens ac optima mundi est,
 Consilio servans condita cuncta suo.
 Quae clara impressit passim vestigia rebus,
 Conditor agnosci possit ut inde Deus.
 Nosse vias numerorum ac ordinis, atque tenere
 Immotum recti iudicium atque mali.
 Non haec ex caecis atomis sapientia venit,
 Verum est naturae prospicientis opus.
 Sic etiam positus coeli terraeque perennes,
 Quodque trahunt certae sidera cuncta vices,
 Testantur vere numen sapiensque bonumque
 Esse, quod has leges condidit atque regit.
 Sic non humano concreta in corpore membra
 Sponte sua, et casu nata sine arte putes.
 Singula consulto certos distinxit ad usus,
 Cum templum vellet nos Deus esse sibi.
 Divina in cerebro radios sapientia spargit,
 Cum verbo mentes luce suaque regit.
 At cor iustitiae domus est, sentitque dolores,
 Cum punit fontes vindicis ira Dei.
 Adflatuque Dei purgatum, gaudia sentit
 Et vita fruitur non pereunte Dei.
 Formatum ad tantos corpus cum videris usus,
 Factorem agnoscas et venerere Deum.
 Ipsius et templum non labes ulla prophanet,
 Pollutum abiiciat ne gravis ira Dei.

Noribergae, Die conversionis Pauli
 anno 1552.

Manu Philippi inscripti sunt hi versus libro: Andr. Vesalii
 Bruxellensis Scholae medicorum Patavinae Professoris, de
 humani corporis fabrica. Basil. 1543. fol. qui iam est
 Dom. Trevirani, Profess. Vratislav.

gekauft 1828 aus dem Nachlass von M. Ant. Luth, von L. C. Exnermann
 Das latine. Gedicht Melanthon's, gedruckt von Johann Georgen Jauer,
 in Nürnberg nach dem Original. (Mit einem Vorwort)
 Die Holzstiche im Text sind nach dem Originalen des Hof-
 raten Luth, der Titelholzstich aber nach dem Originalen und Litho-
 grafie von H. W. Schlegel (Ambr. F. Didot Off. f. l.
 Grav. f. Bois. 92.).



Vesalii, Andr., de humani corporis fabrica libri septem. Cum figg. Fol.
 Basil., Oporinus, 1543. Ldrbd. Schönes Ex. Aufd. Vorsatzblatt das
 eigenhänd. geschriebene Gedicht Ph. Melanthon's:
 De consideratione humani corporis, in 34 Zeilen, dadirt
 Noribergae die conversionis Pauli a. 1552:
 (Melanthon weilte bekanntlich vom 22. Januar bis 9. März in Nürnberg.)
 Abgedruckt findet sich dasselbe in scripta publica Wittemberg I. pag. 435 b.,
 ferner in der v. P. Vincentius 1563 in Wittenberg veranstalteten Sammlung
 Epigrammatum Ph. Melanthonis libri VI. pag. 61 seq. und endlich in Bret-
 schneider's corpus Reformat. X. pag. 610. Bei dem letzten die Notiz, dass
 fragliches Exemplar des Vesalii im Besitze des Prof. Treviranus, damals
 zu Breslau, sei, aus dessen Bibliothek unser Exemplar stammt.

philippus Melancthon

de consideratione

humani corporis.

Non casu volueres Atomis, sine mente ruentes,

Hanc mundi formā progeniturā novā

Formatoris sed mens sapiens ac optima, mundi est,

Consilio servans condita cuncta suo.

Quorū clara impressit passim vestigia rebus,

Conditor agnosci possit ut inde Deus.

Nosse vias numerorum ac ordinis, atq; tenere

Immotū recti iudiciū atq; mali

Non hae ex caecis Atomis sapientia venit,

Verū est naturae prospicientis opus.

Sic etiā positis coeli terrarq; praerennes,

Quodq; vagantur cuncta sidera cuncta vices,

Testantur vere nūmen sapiensq; bonūq;

Esse quod has Leges condidit atq; regit.

Sic non humano cōcreta in corpore membra

Sponte sua, ut casū nata sine arte putes.

Singula cōsulto circos distinxit ad usus,

Cū templū veller nos Deus esse sibi.

Divina in cerebro radios sapientia spargit

Cum verba mentes Luce suaq; regit.

At cor Iusticiae domus est, sentitq; dolores,

Cum punit sentes vindicis ira Dei.

Adflatuq; dei purgatur gaudia sentit

Et vita fruatur non persequente Dei.

Formatū ad tantos corporis cū videris usus

Factorū agnoscat & venerere Deū.

Ipsius & templū non labes ulla profanet.

Pollutū, abiciat, ne gravis ira Dei.

Noriburger Dio

conversionis Pauli

ANDREAE VESALII
BRUXELLENSIS, SCHOLAE
medicorum Patavinæ professoris, de
Humani corporis fabrica
Libri septem.



CVM CAESAREAE
Maest. Galliarum Regis, ac Senatus Veneti gra-
tia & privilegio, ut in diplomatis eorumdem continetur.

B A S I L E A E.

Sam. Radechin
1543

Vesalius, Andreas

AD DIVVM CAROLVM

QVINTVM, MAXIMVM, INVICTISSIMVM

QVE IMPERATOREM, ANDREAE VESALII

in suos de Humani corporis fabrica libros, Præfatio.



VANTVMVIS uaria in artibus scientijsq; tractandis grauitè obſtent, quo minus accuratè perdiscantur, minusq; foeliciter in uſum ſuccedant, CAROLE clementiſſimè Cæſar, tamen haud mediocre diſpendium quoque adferre arbitror, nimium diductam diſciplinarum, quæ uni cuiſpiam arti abſoluendæ famulantur diuiſionem, & multo adhuc magis eius artis exercitiorum adeò moroſam ad diuerſos artiſices diſtributionem, ut qui artis ſcopum ſibi præfixerūt, unam eius partem ita complexentur, ut cæteris quæ ipſum maximopere ſpectant, & ab illo ſeiungi nequeunt, relictis, nihil unquam egregium præſtent, ac propoſitum ſinem nunquam attingentes, à uera artis conſtitutione perpetuò declinent. Nam, ut cæ-

teras quidem ſilentio præteream, & de ea quæ ſanitati hominū præfecta eſt, aliquantiſper ſermonem inſtituam, proſectò in hac tametſi reliquarum omnium quas hominis ingenium adinuenit longè cōmodiſſima & imprimis neceſſaria difficiliſq; ac operoſa ſit, nihil peſtilentius irrepere potuiſſet, quàm quòd aliquando, & præcipue poſt Gotthorum illuuiem, Manſoremq; Perſiæ regem (ſub quo Arabes nobis adhuc cum Græcis meritò familiares uigebant) medicina eoſq; lacerari cepit, quòd primarium eius inſtrumentum manus operam in curando adhibens, ſic neglectum eſt, ut ad plebeios ac diſciplinis medicæ arti ſubſeruientibus neuiquam inſtructos, id quaſi uideatur eſſe demandatum. Quamuis enim tres medicorum ſectæ olim extiterint, Logica uidelicet, Empirica & Methodica, nihilominus tamen illarum autores uniuerſæ artis ſcopum ad conſeruandam ſanitatem, morboſq; proſtigandos direxerunt. deinde huc omnia, quæ ſinguli in ſuis ſectis arti neceſſaria exiſtimabant, referentes, tripli-
ci auxiliorum inſtrumento utebantur, quorum primum uictus fuit ratio, ſecundum omnis medicaminum uſus, tertium manus opera, quæ uel præ cæteris medicinam eſſe deficientium additionem, & ſuperfluorū ablationem, eleganter oſtendit, ac nunquam non ſui uſum in affectuum curatione præbet, quoties in remedica obimus, quorum beneficio hanc generi humano ſaluberrimā eſſe, tempora uſusq; docuerūt. Triplex hæc medendi ratio, cuiuſcunq; ſectæ medicis æquè erat familiaris, ipſiq; proprias manus pro affectuum natura curationi accommo-
dantes, non minorem induſtriam in illis exercendis impenderunt, quàm inſtituendæ uictus rationi, aut medicamenti dignoſcendis, ac componendis. quemadmodum præter cæteros diuini Hippocratis libros, ij liquidò arguunt, quos de Medici munere, de Oſſium fracturis, Articulorum luxationibus, eiusq; generis malis omnium abſolutiſſimè conſcripſit. Quin & Galenus poſt Hippocratem medicinæ princeps, præterquam quòd Pergamenſium gladiatorum curationem ſibi ſoli commiſſam ſubinde gloriatur, neque ingraueſcente iam ætate, ſimias ab ipſo ſecandas famulorum opera excoſari uoluit, crebrò inculcat, quantum manus artificio oblectatus ſit, quamq; ſtudioſe id cum cæteris Aſiæ medicis exercuerit. Imò ueterum nullus non æquè attentè curationem quæ manu ſit, atque eam quæ uictu ac medicamentis perficitur, poſteris tradidiſſe uidetur. Verùm maximè poſt Gotthorum uaſtationem, quando omnes ſcientiæ antea pulcherrimè florentes, atque ut decebat exercitiæ, peſſum iuere, lautiores medici primùm in Italia ad ueterum Romanorum imitationem manus operam ſtudentes, quæ in ægris manu faciendæ ducerent, ſeruis præſcribere, ac illis tantum architectorum modo aſtare, cœperunt. Mox quum ſenſim cæteri quoque ueram medicinam exercitantium incommoda detrectarent, quæſtui honoriq; nihil interim ſubducentes, à priſcis medicis promptè degenerarunt, coquendi modum, omnemq; adeò uictus præparationem ægrorum cuſtodibus, medicaminū compositionem pharmacopolis, manuum uerò munus tonſoribus relinquentes. Atque ita temporis ſucceſſu, curandi ratio tam miſerè diuulſa eſt, ut medici quidem, ſe phyſicorum nomine uenditantes, medicamentorum & uictus ad reconditos affectus præſcriptionem ſibi duntaxat arrogauerint: reliquam autem medicinam, ijs quos Chirur-

gos nominant, uixq̃ famulorum loco habent, relegarint, turpiter à se quod præcipuum & anti-
 quissimum est medicinæ membrum, quodq̃ naturæ speculationi (si modò quod aliud) in
 primis innititur, depellentes: id quod tamen hodie apud Indos maximè reges exercent, Persæ
 hæreditario iure suis liberis perinde ac quondam tota Asclepiadum ars tradunt, Thraces cum
 plerisque nationibus summè colunt ac uenerantur. ea artis parte propemodum neglecta, quam
 olim Romani tanquam eludendis interimendisq̃ hominibus excogitatam, è re publica proscri-
 pserunt: ut quæ citra Naturæ opem nihil penitus accomodet, imò & illam alioquin in mor-
 bo à se explicando satagentem, iuuare studeat, frequenter totam pessundet, & ab officio pror-
 sus abstrahat. Vnde etiam illi potissimum debemus, quòd tot conuicijs in medicos iaci solitis
 hæc sacratissima ars eluditur, quum tamen ipsius pars, quam liberalibus disciplinis instituti
 à se turpiter diuelli sinunt, præcipua laude illam perpetuò illustret. Quando enim ingeniorum
 fons Homerus medicum uirum multis præstantiorem esse affirmat, & cum uniuersis Græciæ
 poetis Podalirium & Machaonem celebrat, hi diui Æsculapij filij non ideo prædicantur,
 quòd febriculam, & quæ sola Natura absque medici auxilio leuius, quàm illo adhibito, sanat,
 remouerent, hominum ue palato in reconditis deploratisq̃ affectibus subseruirent: sed quia
 luxationum, fracturarum, uulnerum, & reliquarum continuitatis solutionum, sanguinisq̃ flu-
 xus curationi potissimum præessent, ac spiculis, telis, atque alijs eiusmodi malis (quæ bella in
 primis inferunt, diligentemq̃ medici operam semper expetunt) generosissimos Agamemnonis
 milites liberarent. Verum augustissime Cæsar CAROLE, unum medicinæ instrumentum
 alijs præferre, haudquaquam proposui: quum triplex dicta auxiliorum ratio minimè disiungi
 possit, & tota ad unum artificem attineat: atque ad hanc ut debitè exequatur, omnes medicinæ
 partes ex æquo ita constitutæ paratæq̃ sint, ut singula eo felicius in uelum referantur, quo quis
 cumulatius omnia inuicem iungat. Quamuis etiam rarus omnino morbus occurrit, qui non
 statim triplex præsidiorum instrumentum requirat: itaq̃ opportuna uictus ratio instituenda, &
 medicamentis ac demum manu aliquid molienum sit. adeò ut huius artis tyrones modis omnibus
 hortandi ueniunt, ut illorum (si dijs placet) physicorum susurros uilipendentes, Græcorum more, ac
 quemadmodum artis natura penitus præcipit, manus quoq̃ curationi admoueant, ne deinceps
 laceram medendi rationem, in communis hominum uitæ perniciem conuertant. Atque hoc
 eo instigandi sunt diligentius, quo in medicina hodie integrius eruditos, à manus opera, tan-
 quam à peste, ideo præsertim abstinere cernimus, ne à medicorum Rabinis apud indoctam ple-
 bem pro tonsoribus traducantur, ipsisq̃ postmodum neque par cum istis uix dimidiato medi-
 cis quaestus, neque honor, neque apud imperitum uulgus aestimatio accedat. Hæc etenim
 detestabilis uulgi opinio præcipue remoratur, quo minus totum curandi artificium, uel hoc
 etiam seculo assumamus, & interiorum affectuum curationem duntaxat nobis asciscentes, ma-
 gna mortalium noxa (ut semel uereq̃ dicam) modica solum ex parte medici esse studeamus.
 Quippe quum primum ad pharmacopolas uniuersa medicamentorum compositio relegare-
 tur, mox etiam medici impense ipsis necessariam simplicium medicaminum cognitionem ami-
 serunt, atque ut tot barbaris uocibus, falsisq̃ etiam pharmacis officinæ scaterent, tot uerò ele-
 gantissimæ ueterum compositiones nobis pariter deessent, adhucq̃ complures etiam lateant,
 autores fuere: ac inexhaustum laborem pararunt cum ætatis nostræ, tum qui ante annos ali-
 quot hanc præcessere eruditissimis uiris, indefesso studio simplicium medicamentorum cogni-
 tioni sic incumbentibus, ut illam pristino nitori restituere conati, plurimum contulisse uidean-
 tur: cuius rei inter tot celebres alioquin uiros, argumentum præbet, huius ætatis rarum speci-
 men Gerhardus Vueldbik, Maiestati tuæ à secretis, uariaq̃ disciplinarum ac linguarum eru-
 ditione cum primis ornatus, atque in stirpium historia nostrorum hominum exercitissimus.
 Cæterum peruersissima hæc curationis instrumentorum ad uarios artifices diductio, adhuc
 multò execrabilius naufragium, ac longè atrociorem cladem præcipuæ naturalis philosophiæ
 parti intulit, cui quum hominis historiam complectatur, firmissimumq̃ totius medicæ artis
 fundamentum, ac constitutionis initium iure habenda sit, Hippocrates & Plato tantum tri-
 buerunt, ut illi inter medicinæ partes, primas esse adscribendas non dubitarint. Hæc nanque
 cum prius à medicis unice excoleretur, ipsiq̃ in hac adipiscenda omnes neruos intenderent,
 tum demum miserè collabi coepit, quum ipsi manuum munus ad alios reiicientes, Anatomem
 perdiderunt. Dum enim medici solam interiorum affectuum curationem ad se pertinere autuma-
 bant, etiam uiscerum cognitionem sibi abundè sufficere arbitrabantur, & ossium, musculorum,
 neruorum, uenarum, arteriarum quæ ossa musculosq̃ perreptant fabricam, ueluti ad ipsos
 non spectantem, neglexerunt. Ad hæc quum uniuersa administratio tonsoribus committe-
 batur, non solum uera uiscerum cognitio medicis periit, uerum etiam dissecandi industria
 interci-

intercidit prorsus, eo quòd scilicet hi confectionem non aggredierentur, illi uerò quibus manus artificium committeretur, indoctiores essent, quàm ut dissectionis professorum scripta intelligerent: tantùm abest, ut difficillimam abstrusissimamq̃ artem manu ipsis traditam, id hominum genus nobis asseruaret, utq̃ hæc pestilens curatiuæ partis dispersio detestabilem ritum in Gymnasijs non inueheret, quo alij humani corporis sectionem administrare, alij partium historiam enarrare consueuerunt, his quidem graculorum modo, quæ nunquam aggressi sunt, sed tantum ex aliorum libris memoriæ commendant, descripta uel ob oculos ponunt, altè in cathedra egregio fastu occinentibus: illis autem adeò linguarum imperitis, ut dissecta spectatoribus explicare nequeant, atque ex physici præscripto ostendenda lacerent, qui manu corporis sectioni nunquam adhibita, tantum ex commentario nautam non sine supercilio agit. Atque ut sic omnia perperam docentur in scholis, ac ridiculis quæstionibus dies aliquot abeunt, ita quoque spectatoribus in illo tumultu pauciora proponuntur, quàm lanius in macello medicum docere posset. ut aliquot Gymnasia præteream, ubi de humani corporis compage refecanda uix unquam cogitatur: usque adeò uetus medicina à pristino decore ante plures annos desciiuit. Porro quum illa iam pridem in tanta huius seculi (quod tuo numine prudenter moderari uolunt superi) fœlicitate cum omnibus studijs ita reuiuiscere, atque à profundissimis tenebris caput suum erigere cœpisset, ut ueterem candorem citra controuersiam in nonnullis Academijs propemodum recuperasse uideretur, nihilq̃ illa impensius adhuc desideraret, ac prorsus emortuam humani corporis partium scientiam, ipse tot præstantium uirorum exemplo prouocatus, huic pro mea uirili, ac ijs quibus possem rationibus opem ferendam duxi. Ac ne, omnibus aliquid communium studiorum gratia tanto successu attentantibus, solus torpescerem, aut etiam à meis progenitoribus degenerarem, hoc naturalis philosophiæ membrum ita ab inferis reuocandum putaui, ut si non absolutius apud nos, quàm alias unquam apud priscos dissectionum professores uersaretur, eò tamen pertingeret, ut aliquando haud puderet asserere, hanc dissectionis rationem cum antiqua illa conferri posse: nostraq̃ hac tempestate nihil simul ita collapsum, moxq̃ integritati restitutum, ac Anatomen fuisse. Verùm id studium neutiquam successisset, si quum Parisijs medicinæ operam darem, huic negotio manus non admouissem ipse, ac obiter mihi & cōsodalibus ab imperitissimis tonsoribus in una atque altera publica sectione uisceribus aliquot superficietenus ostensis acquieuissem, adeò enim perfunctoriè illic, ubi primùm medicinam prosperè renasci uidimus, Anatome tractabatur, ut ipse in brutorum aliquot sectionibus sub celebri ac nunquam satis laudato uiro Iacobo Syluio uersatus, tertiam cui unquam mihi adesse obtigit sectionem, solito absolutius, & sodalium & præceptorum hortatu adductus publicè administrarem. Quum autem secundo (tonsoribus ab opere iam relegatis) illam aggredierer, musculos manus cum accuratiori uiscerum dissectione conatus sum ostendere. præter octo enim abdominis musculos turpiter, peruersoq̃ ordine laceratos, nullum unquam musculum, ut neque etiam os aliquod, multoq̃ minus adhuc neruorum, uenarum, arteriarum exactam seriem, quisquam mihi primùm monstrauit. Mox Louanij, quò ob belli tumultus mihi redeundum fuerat, quòd illic decem & octo annis de Anatome ne somniauerāt quidem medici, utq̃ de eius Academiae studiosis bene mererer, ac ipse in re prorsus abdita, & mihi ad medicinam apprimè necessaria exercitatio redderet, accuratius paulo quàm Parisijs, humanā fabricam ita inter diuidendum enarraui, ut iuniores eius Academiae professores nunc magnā atque adeò seriam ac diligentē in hominis partibus dignoscēdis operam impendere uideantur, probè intelligentes, quàm egregiam philosophandi suppellectilem earum notitia ipsis suppeditet. Porro Patauij in clarissimo totius orbis gymnasio, quia ad medicinæ chirurgicę professionem (quam, ne à reliqua medicina me ipsum disiungerem, annis quinq̃ illustrissimis, & erga doctrinarum studia longè liberalissimis SENATVS VENETI stipendijs conductus, prælego) Anatomes quoq̃ tractatio pertinet, eam in hominis constructione inquirenda nauauī operam, ut modò sæpius hīc & Bononiæ hanc ita administrauerim, ridiculoq̃ scholarum more expulso sic ostenderim atque docuerim, ut in hac nihil quod à ueteribus proditum ad nos peruenit, desiderare possimus, ac nullius quæ occurreret partis constructionem adhuc expeteremus. At medicorum segnities nimium cauit, ne Eudemī, Herophili, Marini, Andreæ, Lyci, ac aliorum dissectionis procerum scripta nobis referuarentur, quum ne fragmentum quidem alicuius paginae supersit tot illustrium autorum, quos uel Galenus secundo commentario in Hippocratis librum de Natura humana, plures uiginti commemorat, imò & Galeni Anatomicorum librorum uix dimidia pars ab interitu est uindicata. Qui uerò ipsum sunt secuti, in quorum classē Oribasium, Theophilum, Arabes, & nostros quotquot legere hætenus mihi licuit, recensēo (illorum bona dixerim uenīa) omnes, si modò

quid lectu dignum tradiderunt, ex Galeno id sunt mutuati, & per Iouem studiose secanti, nihil unquam minus aggressi uidentur, quàm humani corporis sectionem: adeò mordicus horum primarij nescio cui dicendi generi, aliorumq; in resecando oscitantiae fidentes, Galenum in dispendiosa compendia turpiter redegerunt, nunquam ab illis dum ipsius sensa assequuntur, ne latum quidem unguem recedentes: imò librorum frontibus adijciunt, ipsorum scripta è Galeni placitis penitus confarcinata, suaq; Galeni esse omnia, ideo etiam subiungentes, si quis fortè ea duceret reprehendenda, ob id Galenum quoq; esse còtemnendum arbitraretur. Atque ita huic omnes fidem dedere, ut nullus repertus sit medicus, qui in Galeni anatomicis uoluminibus, ne leuissimum quidem lapsum unquam deprehensum esse, multoq; minus deprehendi posse, censuerit: quum interim (præterquam quòd Galenus se frequenter corrigit, suamq; negligentiam in quibusdam libris commissam, in alijs, postea exercitator redditus, non semel indicat, contrariaq; frequenter docet) nobis modò ex renata dissectionis arte, diligentiq; Galeni librorum prælectione, & in plerisque locis eorundem non poenitenda restitutione constet, nunquam ipsum reseculisse corpus humanum: at uerò suis deceptum simijs (licet duo ipsi arida hominum cadauera occurrerint) crebro ueteres medicos in hominum confectionibus se exercentes immeritò arguere. Quinetiam quamplurima apud Galenum inuenias, quæ in simijs quoque minus rectè affecutus est, ut taceam, mirandum esse maximè, in multiplici infinitaq; humani corporis organorum & simiæ differentia, nullam nisi in digitis ac poplitis flexu, Galenum animaduertisse: quam cum cæteris procul dubio omisisset, nisi citra hominis dissectionem ipsi fuisset obuia. Verum in præsentia, haudquaquam institui falsa Galeni dissectionis professorum facilè principijs dogmata perstringere: multoq; adhuc minus in ipsum bonorum omnium autorem, mox initio impius, suæq; autoritatis parum obseruans haberi uelim. Haud enim ignoro, quàm medici (longè secus quàm Aristotelis sectatores) turbari soleant, quum multo sapius quàm ducentes à uera partium humanæ harmoniæ, usus functionisq; descriptione, Galenum declinasse, in unius Anatomæ administratione nunc obseruât, toruè interim & summo defendendi studio dissectas particulas expendentes. Quamuis & hi ueritatis amore ducti, paulatim inde mitescant, suisq; oculis ac rationibus nò inefficacibus plus fidei, quàm Galeni scriptis adhibeant, hæc uerè paradoxa non ab alijs autoribus emendicata, neque autoritatum congerie tantum firmata, huc illuc ad amicos sedulo perscribentes, & ad illorum inspectionem, ac demum ad ueræ Anatomæ cognitionem, tam sollicitè & amicè hortantes: ut spes sit, hanc breui in omnibus Academijs ita excolendam, quemadmodum Herophili, Andreae, Marini, aliorumq; præstantissimorum dissectionis procerum seculo in Alexandria olim exerceri consueuit. Quod quo foeliciores Musarum auspicijs succedat, quantum in me fuit, præter illa quæ aliàs huius argumèti in lucem edidi, & quæ plagiarij quidam me procul à Germania absentem arbitrati, tanquam sua emisserunt, iam de integro humani corporis partium cognitionem eo ordine in septem libros redegi, quo in hac urbe & Bononiæ in illo eruditorum uirorum coetu ipsam pertractare soleo. Hac siquidem ratione, qui secanti adfuere, demonstratorum habebunt commèntarios, cæterisq; leuiori negotio Anatomem ostendent. Quanquam alioquin & his quibus inspectio denegatur, minimè futuri sint inutiles, quum cuiusque humani corporis particulæ numerum, situm, formam, magnitudinem, substantiam, ad alias partes connexum, usum, munus, ac eiusmodi permulta, quæ in partiū natura disseccantes rimari consueuimus, unà cum mortuorum uiuorumq; resectionis artificio, satis diffusè persequantur, & partium omnium imagines sermonis contextui insertas ita contineant, ut ueluti dissectum corpus operum Naturæ studiosis ob oculos collocent. Ac primo quidem libro omnium ossium cartilaginumq; naturam enarraui, quæ quòd illis reliquæ partes suffulciantur stabilianturq;, & secundum hæc describantur, ab Anatomes studiosis primùm cognoscenda ueniunt. Secundus liber ligamenta, quorū beneficio ossa cartilaginesq; inuicem cōnectuntur, & dein musculos, motus è nostro arbitratu pendentis opifices, cōmemorat. Tertius, uenarum quæ musculis & ossibus cæterisq; particulis familiarem quo enutrientur sanguinem deferunt, ac dein arteriarum insiti caloris spiritusq; uitalis temperiem moderantiū, frequentissimam seriem complectitur. Quartus non modò neruorum qui musculos adeunt distributionem, sed & reliquarum quoque omnium propagines edocet. Quintus organorum nutritioni, quæ potu & cibo perficitur, famulantium constructionem tradit: ac insuper ob sedis uiciniam, instrumenta etiam continet, ad speciei successionem à summo rerum Opifice fabricata. Sextus cordi uitalis facultatis fomiti, ipsiq; subministrantibus particulis dicatur. Septimus uerò cerebri & sensus organorum harmoniam ita persequitur, ut illic neruorum à cerebro originem ducentium series quarto libro expressa, nò repetatur. Quippe in horum librorū ordine digerendo, Galeni sen-

Librorum ordo
& tractatio.

sententiam sum sequutus, qui post musculorum historiã, uenarum, arteriarum, neruorum, & dein uiscerum Anatomen pertractandam duxit. Quantumuis nō inepte, ac potissimum apud huius scientiæ tyronem, aliquis cum uasorū distributione rudem uiscerum cognitionē ita persequendam contendet, quemadmodum in Epitome præstiti: quam ueluti horum librorū semitam, ac in illis demonstratorū indicem præparauī, Serenissimi Principis PHILIPPI Maiestatis tuæ filij, ceu uiui paternarum uirtutum exemplaris (à quo quæcunq; in optimo totius orbis moderatore desiderari possunt, quàm cumulatissimè expectantur) splendore decoratam, auctoritateq; munitam. Verum hīc quorundam iudicium mihi succurrit, qui non duntaxat herbarum, sed & humani corporis partiū quantumuis etiã exquisitissimas delineationes, rerum naturalium studiosis proponi, acriter damnant: quod has non picturis, uerum sedula refectione, rerumq; ipsarum intuitu disci oporteat. perinde sanè ac si hoc nomine uerissimas, ac utinam à typographis nunquam deprauandas partium icones sermonis contextui adhibuissē, ut studiosi illis freti, à cadauerum sectione temperarent; & nō ipsi potius, quibus possem modis medicinæ candidatos ad cōsectiones proprijs manibus obeundas, cum Galeno hortarer. Profecto si ueterum, qui pueros domi in cōsectionibus administrandis, perinde atque in pingendis elementis & lectione exercebant, consuetudo huc usq; deducta fuisset, non picturis modò, uerum & omnibus cōmentarijs perinde atque ueteres illos facile nos carere permetterem: qui tum primum de Administrandis dissectionibus scribere sunt aggressi, quum nō liberis solum, sed alienis etiam uiris quos uirtutis nomine suspiciebant, artem cōmunicare honestū esse censuerunt. Cum primum enim pueri non amplius in sectionibus exerceri cōsueuere, protinus necessariò accidit, ut Anatomen infelicius cōdiscerent, exercitatione, quam in pueritia auspicari solebāt, abolita. Adeò ut quā ars Asclepiadum familia excidisset, multisq; seculis in deterius uergeret, opus fuerit libris qui speculationē ipsius integrā conseruariēt. Quantum uerò picturæ illis intelligendis opitulentur, ipsoq; etiã uel explicatissimo sermone rem exactius ob oculos collocent, nemo est qui nō in geometriã, alijsq; mathematū disciplinis experiatur: præterquàm quod nostræ partium imagines illos impense oblectabūt, quibus nō semper humani corporis rescanditur copia: aut si datur, tam delicata & in medico parum probanda præditi sunt natura, ut etsi iucundissima hominis cognitione, immensi rerū Conditoris sapientiã (si quid aliud) attestate, insigniter capiantur, eò tamen animum inducere nequeunt, ut uel sectioni aliquādo intersint. Vt cunq; uerò sit, toto opere id unice studui, ut in negotio longè reconditissimo, neq; minus arduo, quamplurimis prodessem, humaniq; corporis fabricæ non decē, aut duodecim (uti obiter spectanti apparet) sed aliquot mille diuersis partibus extructæ historiã, quàm uerissimè & absolutissimè pertractarē, ac intelligendis Galeni libris posteritati adhuc asseruatis, & inter cætera diuini eius uiri monumēta præceptoris operã requirentibus, nō spernendā frugem medicinæ candidatis adferrē. Licet interim non me lateat, quàm conatus iste meæ ætatis, qua uigessimū octauum annum nondum excessi, nomine, parū auctoritatis habebit, ac quam minimè obcrebram non uerorum Galeni dogmatum indicationem, ab illorum morsibus erit tutus, qui mihi Anatomen docenti nō astitere, aut ipsi hanc sedulò non sunt aggressi, primaq; fronte uarias rationes in Galeni defensionem cōminiscentur, nisi magno alicuius numinis patrociniò ex more commendatus in lucem auspicatò prodeat. Verum quia maiori nullo quàm diui CAROLI, inuictissimi, maximiq; Imperatoris nunquā intermorituro nomine tutius muniri, splendidiusq; ornari potest, tuam Cæsaream Maiestatem omni reuerentia supplex iterum atq; iterū obsecro, ut iuuenile hoc meum studiū multis rationibus causisq; sibi obnoxium, sub ipsius ductu, splendore ac patrociniò in hominū manibus tantisper uersari sinat, donec per rerum usum, ac quod ætate accedit iudiciū, eruditionemq; hunc laborem summo optimoq; Principe digniorem reddam, aut aliud non reiiciendum aliū ex arte nostra deprompti argumenti munus offeram. Quamuis augurer, ex uniuerſa Apollinea disciplina, adeoq; tota naturali philosophia, nihil tuæ Maiestati gratius acceptius ue procudi posse, historia, qua corpus & animum, ac præterea diuinum quoddam numen ex utriusq; symphonia, & nosmetipsos denique (quod uerè hominis est) cognoscimus. Atque ut id pluribus colligo argumētis, ita inde in primis conijcio, quod in ea librorum frequētia, quæ scelicis memoriæ MAXIMILIANO Romanorū maximo Imperatori auo tuo cōsecrati fuere, nullus præsentis negocij libello unquam gratior extiterit. Neq; unquam obliuiscar, qua uoluptate tabulas meas Anatomicas inspexeris, quamq; curiose de singulis percunctatus sis, quas pater meus Andreas Maieſt. T. à pharmacis primarius iuxta ac si delissimus, aliquando intuendas obtulit. Vt nunc præterea incredibile illum, ut in omnes disciplinas, ita etiã multo maximè in mathematicas, & præsertim eius quæ mundi astrorumq; scientiam pertractat, amorem, & in tanto heroë admirabilem eius peritiã. Adeò, ut haud fieri queat,

auton. ap. reg. in.

*Conscripsit hoc
anno ætatis
xxviii.*

AD CAROLVM V. INVICTISS. IMP. PRAEFATIO.

quin ut mundi scientia unice teneris, ita etiam aliquando omniū creaturarum absolutissimæ fabricatione expēdenda delecteris, & immortalis animæ diuersorio ac instrumēto cōsiderando uoluptatem capias: quod domicilium, quia permultis nominibus mundo egregiē correspondet, ueteribus haud ab re microcosmus nuncupabatur. Cæterū, uti modò homini dignissimam sui corporis structuræ cognitionem, per se longē commendatissimam, & cui tantopere uel Romæ summos uiros, tum rebus, tum disciplinis philosophicis per omnia præcipuos, operam impendere iuuuit, minimē hīc prædicandam statui: ita quoque Magni illius Alexātri, quinon nisi ab Apelle pingi, à Lysippo in ære duci, & à Pyrgotele sculpi uoluit, probè memor multo minùs hic laudum tuarum aliquid recensendum duxi, ne ieiuna & parum exercitata oratione, illis pro luce tenebras offundam. præsertim quum prorsus improbandus sit, nimium receptus in Præfationibus ritus, quo absq̃ omni delectu, & ferè præter meritum, ueluti ex typo & formula quapiam, uilis alicuius præmioli gratia, omnibus ascribi solent, suspicienda doctrina, singularis prudentia, mira mansuetudo, acre iudicium, indefessa liberalitas, erga literatos & studia mirus amor, in rebus agendis summa celeritas, omnisq̃ adeò uirtutū chorus, quo tuam Maiestatem non minus quàm dignitate, ac fœlicitate, rerumq̃ gestarum triumphis uniuersos mortales anteire, nullus nō (quamuis hic à me non dicatur) perspectissimū habet, unde etiam summi numinis loco adhuc uiuus coleris: quod ut Dīj studijs & toti orbi non inuideant, sed diutissime mortalibus incolume, perpetuoq̃ fœlix seruent ac tueantur, precor.

Patauij. Calend. Augusti, anno post natum CHRISTVM

M. D. XLII.


TYPOGRAPHVS LECTORI.

Quoniam Epistola, quam unā cum Tabulis, ad hosce de Humani corporis fabrica libros & ipsorum Epitomen paratis, ab ANDREA VESALIO ex Italia missam accepimus, pleraque continere nobis uisa est, quorum alioquin Lectorem initio admonendum putassemus, quæq̃ Typographis, præcipuè ita parui Principum decreta pendentibus, & ad ea quæ in rei literariæ usum euulgantur deprauanda natis, significanda uidebantur, operæ precium duximus illam ita quoque uti ad nos missa est, candidis Lectoribus communicare.

IOANNI OPORINO GRÆCARVM LITE

RARVM APVD BASILIENSES PROFESSORI,


amico charissimo suo.

S. CCIPIES breui simul cum his literis per Mediolanenses mercatores Danonos, tabulas ad meos de Humani corporis fabrica libros, & eorundem Epitomen sculptas. Utinam tam integrè ac tutò Basileam perferantur, atque sedulò cum sculptore & NICOLAO STOPIO hic Bombergorum negotiorum fidelissimo curatore, in humanioribusq; Studijs apprime uersato iuvene, eas composui: ne aliqua ex parte atterantur, aliudue incommodum ipsis uectura inferat. Inter tabularum seriem exemplar frustatim reposuimus, simul cum impresso singularum figurarum typo, cui quo quæque loco repouenda ueniat asscripsi: ne fortè illarum ordo ac dispositio tibi tuisue operis negocium faceisset, figuræq; non ordinatim imprimerentur. In exemplari promptè discernes, ubi genus characterum sit immutandum, quandoquidem scripturæ partem, quæ organorum historiam completitur, continuoq; orationis contextu singulis capitibus absoluitur, lineis ab ea distinxî, quæ ad characterum qui in tabulis sculpti occurrunt explicationem iuuat: ob idq; figurarum & characterum Index appellatur. In continua orationis serie nusquam figuris indicandis interrupta, literulas expendes, quas in officinis superlineares nuncupatis: quæ illis respondent annotationibus, quas interiori margini non tanta industria, quanto labore & tædio, adhibui, ut lectori uelut scriptorum essent commentarius, exprimens in quânam figura pars, cuius mentio incidit, spectari possit: uti annotationes in exteriori margine obuiæ, eorum quæ enarrantur argumentum quodammodo proponunt. In interioribus, ne essem prolixior, eam rationem obseruauî, ut quotiescunque figura indicatur, quæ capiti, ubi annotatio spectatur, præfixa est, nullum capitis numerum indicem: quem alioquin appono, si figura alteri præponatur capiti. Rursus, si figura in libro ubi annotatio occurrit, inueniatur, libri numerum figuræ haud subijcio. Quamobrem uerò figuras hoc illoue loco collocandas duxerim, in librorum titulis, & characterum indicibus abunde explicatum reperiēs. Notarum enim, quibus partes in delineatione quapiam insigniendæ fuerūt, loco, characteres quorum in officinis perpetuò usus est, in tabulis sculpsimus: primum ferè à maiusculis, & dein alijs Latinorum orsi: insuper Græcorum minoribus: mox ab eorundem grandioribus, qui Latinis non sunt familiares: quum uerò hi omnes non sufficerent, numerorum typos assumpsimus, & si quæ alia notula in communibus typis occurrebat. In horum indicum descriptione obseruatum est, ut indicans unamq; priuatam explicationem habens character, in margine liber collocetur. Si uerò peculiarem non habeat indicem, ac ueluti cum alio characterē exprimatur, ipsi punctum in margine subieci, ut unâ cum cæteris lectori in serie obuius fieret. Verùm hanc rationem, ac potissimum cur characterum indicem cum partium historia confundendum non putauerim, aliàs ad te prolixius scripsi: nunc uerò ijs quibus possum modis hortor, & rogo pariter, ut omnia quàm nitidissimè & ocyus excudantur, utq; in meis conatibus expectationi, quam omnes de tua Officina, nunc primum magno studiosorum commodo, feliciq; Musarum omine instituta conceperunt, satisfacias. Præcipuum studium in tabularum impressione erit impendendum, quòd non uulgariter ac scholasticè, uelut quæ simplicibus duntaxat lineis sint expressæ: nusquam picturæ ratione (si interdum locum quo res delineatæ suffulcirentur, excipias) neglecta. & quanquã hic iudicio ualeas, nihilq; nõ de tua industria & sedulitate mihi pollicear, hoc unum percuperem, ut inter excudendum id exemplar quàm proximè imitareris, quod à sculptore speciminis sui loco impressum, unâ cum ligneis formis reclusum inuenies. ita enim nullus character, quantumuis etiam in umbra reconditus, oculatum sedulumq; lectorem latitabit. & quod in hac pictura longè est artificiosissimum, mihiq; spectatu perquàm iucundum, linearum in quibusdam partibus crassities simul cum eleganti umbrarum obfuscatione apparebit. Verùm non est quod hæc tibi perscribam, quum in papyri lenitate soliditateq; ac in primis in uestrarum operarum diligentia positum sit, ut singula, quale nunc mittimus exemplar, nosq; hic aliquot impressimus, ex tua Officina omnibus proponantur, multisq; fiant communia. Dabo operam, ut non ita multo post ad uos proficiscar, & si non toto impressionis tempore, saltem aliquandiu Basileæ cōmorer, mecum formulam decreti Senatus Veneti allaturus, quo cauetur, ne quis tabularum

tabularum aliquam absque meo consensu imprimat. Cæsaris, quantumvis tu generale in omnes libros quos primus imprimis habeas, mater mea ad te Bruxella mittet. dudum enim mihi imperatum fuit: sed ut recentius esset, ad pluresq; annos utile, hactenus non curauimus describendū. Regis Gallia, se mihi adepturum recepit ipsius apud Venetos Orator, Monspeffuli antistes. Licet hac ex parte parum sim anxius: imò diplomatum exemplaribus ne paginam quidem occupandam duxerim. Nam quid principum decreta apud bibliopolas, & in omnibus angulis nunc densissimè satos typographos ualeāt, abundè in meis Anatomicis tabulis ante annos tres Venetijs primū impressis, & postmodū misere passim deprauatis, maioribusq; interim titulis exornatis, est animaduvertere. Augustæ enim mea ad NARCISSVM VERTVNVM, Cæsaris & regni Neapolitani primum medicum, rarumq; profectò nostræ ætatis medicorum exemplar, subducta epistola, nescio quis rabula Germanicè est præfatus, & præter meritum in Auicennam reliquosq; Arabes blaterans, me inter quosdam succinctos Galenos connumerat, & (ut emptori fucum faceret) me coegisse in sex tabulas falsò asserit, quæ Galenus pluribus quàm triginta libris diffuse complexus est. Dein Latina se Germanico idiomate donasse subiungens, attestatur Græcas & Arabicas uoces ab ipso adhibitas: quum interim non solum tales omnino subduxerit, sed ea omiserit quæ conuertere nequiuit, quorumq; nomine tabulæ in primis debebant esse commendatiores. præterquam quòd Venetam sculpturam peruerse istic sunt imitati. Hoc Augustano sculptore longe rudior imperitiorq; extitit, qui Coloniae iisdem tabulis manum admouit: quantumvis illic nescio quis in typographi gratiam scribat, non tantum ex meis tabulis hominis constructionem melius quàm ex humanæ fabricæ resectione intueri posse, uerū etiam ipsos ex elegantissimis figuris fecisse multo elegantiores: quum tamen & picturam ualde corruperint, & neruorum delineationem parum feliciter imitadam adiecerint, quam ego characterum adiecto indice, uni atque alteri amico, qui id tantisper dum ipse eā ederem, à me expetebant, ruditer delineaueram. Parisijs tres priores eleganter expresserunt, alijs interim propter sculpturæ (uti conijcio) difficultatem omisis: quum potius à prioribus, si studiosorum habita esset ratio, abstinendū fuisset. Cæterum Argentinenfis ille, quē FVCHSIVS tantis conuicijs ob quædam denuò transcripta proscindit, quemq; ego longe alio iure quàm ipse plagiarium appellare possem, de studijs pessimè est meritis, quòd tabulas quæ nunquam satis magnæ studiosis proponi poterunt, tam foedè contraxerit, & turpissimè pictas, ac præter omnem rationem circumscriptas, cum Augustani uersione, tanquam suas emisit. Huius gloriæ is inuidere uisus est, qui undecunque citra delectum compilatis ex aliorum libris, imaginibus, Marpurgi & Francofordiæ eius generis libros adhuc emittere pergit. Adeo ut diuina illa & foelicissima Italarum ingenia leuiter feram, et ualde exosculer, quòd aliud in Germaniæ medicis iudiciū ob sordidorū quorundam typographorū mancipia requirant, quæ nullum nō scripti genus uilis alicuius præmioli à typographis emungēdi gratia cōgerere, emutare, transcribere, suoq; nomine ut nouum quid editum uideatur, decretaq; principum sileant, emittere audent. Hæc eò scribo, ut intelligas, quàm parum illa impressioni tuæ adhibenda putauerim. quin potius significandum duxerim, me multò lubentius tabulas alicui industrio typographo quocunque transmissurum: quantumq; in me esset, operam meam in rei literariæ usum communicaturum: quàm ut ineptus aliquis, cui pro mea uirili rationibus omnibus obesse conabor, tabulas tanto labore in communem studiorum usum confectas imitaretur, illæq; turrido quopiam præfixo titulo, perinde ac si à me ita negligenter exiissent, in hominum manus uenirent. Atque hæc potissima est causa, cur tabulas meo sumptu parauerim, ac nunc iterum atque iterum abs te contendam, ut quàm integerrimæ & mundissimæ à tuis operis seruentur. Vale. Venetijs, nono Calendas Septembres.

Tuus And. Vesalius.

ANDREÆ VESALII.



ANDREAE VESALII

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER PRIMVS, IIS QVAE

uniuersum corpus sustinent ac suffulciunt, quibusq; omnia
stabiliuntur & adnascuntur dedicatus.

QVID OS, QVISQVE IPSIVS VSVS

& differentia. Caput I.



S CAETERARVM hominis partium est durissi-
mum, & aridissimū, maximeq; terrestre & frigidum,
& sensus denique præter solos dentes expers. Huius
enim temperamenti summus rerum opifex Deus
substantiā meritò efformauit, corpori uniuerso fun-
damenti instar subiiciendam. Nam quod parietes &
trabes in domibus, & in tentorijs pali, & in nauibus
carinae simul cum costis præstant, id in hominis fa-
brica ossium præbet substantia. Ossium siquidem
alia roboris nomine tanquam corporis fulcra pro-
creantur, e quorum numero sunt tibiæ & femo-
rum ossa, & dorsi uertebrae, ac omnis ferè ossium con-
textus. Alia reliquis partibus ueluti propugnacula,
tutissimiq; ualli & muri à natura obijciuntur, quem-

Ossis natura.

Ossium usus.

*Ossium differen-
tia ab usu.*

admodum caluaria, uertebrae spinæ, & transuersi earundem processus, pectoris os, costæ.
Alia quorundam ossium articulis præficiuntur, ne illi plus satis laxè moueantur, aut in ni-
mium acutos inclinentur angulos. Huius nanque beneficij occasione, ossicula effinguntur,
sesami seminis magnitudini à dissectionis professoribus comparata, quorum quædam secun-
do pollicis manus internodio, & quatuor reliquorū digitorum primis internodijs, & primis
etiam internodijs quinque digitorum pedis coarticulantur. Dentes porro incidendis & con-
fringendis & atterendis moliendisq; cibis priuatim conducunt, perinde ac duo auditus instru-
menti ossicula peculiari usu audiendi officio famulantur. Verum cuiusq; ossis primarium mu-
nus, singulorum ossium Caput fusiùs ostendet, quandoquidem in præsentia abunde est, gene-
ratim ossium usum recensere: quo (ut semel dicam) hæc fulcrorum modo uniuersam corporis
molem sustentant, & ijs omnia adnascuntur & firmanentur, & ab iisdem suspenduntur, adeò
sanè ut ex ossium usu aut officio, non alia quàm modò ferè diximus, desumi possit differentia.
In magnitudine uerò ossa uariant, quòd nonnulla quidem sint grandia, ut femur, tibiæ os, hu-
merus, & ossa sacri ossis lateribus utrinque connexa: nonnulla autem parua existant, ut bra-
chialis ossa, dentes, & ossicula quæ sesamo assimilantur. Alia rursus ampla sunt, ut ossa sacri os-
sis lateribus coarctata, scapulæ, sacrum os, uerticis ossa, frontis & occipitij. Alia angusta & gra-
cilia & longa, ut fibula, radius, ulna, & cum alijs multis costæ. Porro satius erit omnes diffe-
rentias, quas à forma petere integrum esset (cum innumeræ occurrant) ad priuatas ossium
descriptiones reseruare. Arduum quippe esset, ossibus nondum enarratis assequi, quæ nam
horum sint aspera: ut ea quæ lapidea in caluariæ basi uocabimus, quòd præruptæ rupi simi-
lia uideantur. item quæ læuia sint, ut uerticis ossa, frontis os, pectoris os. deinde quæ triangu-
lum referant, ut scapulæ: & quadrangulum, ut uerticis ossa: & quæ cunei speciem obtineant,
ut capitis os, à cuneo *σφλωδης* dictum: & quæ iugis assimilentur, ut *ζυγώματα* Græcis, iuga-
lia autem nostris appellata: & quæ *ν* nostrum imitentur, ut clauiculæ: & quæ ensis effigiem
ostendant, ut pectoris os: insuper quæ *υ* figuram referant, ut *υοειδης* uocatum os: & quæ ra-
dij quo latiores cordulæ texuntur figuram expriment, ut cubiti os radij nomine donatum: &
quæ cubo tesseraeq; comparamus, ut pedis os à cubi imagine *κυβοδης* nuncupatum: & quæ
cymbæ imagini accedant, ut pedis os à cymba Græcis *σκαφοδης* appellatum: & quæ molæ,
scuto & patellæ similia dicantur, ut os genu articulo præpositum: ad hæc quæ totius Italiæ
circumscriptionem leuiter proponant, ut femur: & quæ fibulam repræsentent, ut tenuius in ti-
bia os fibula appellatum: & quæ coccygis seu cuculi auis rostro comparentur, ut sacro ossi sup-
positum os, quod coccyx nuncupatur: dein quæ incudis uel molaris dentis effigiem quodam-
modo repræsentet, ut minus organi auditus ossiculum: & quæ malleum, ut grandius eiusdem

*Differentia à
magnitudine.*

A forma.

A organi

*Differentia
ab appendicib.
processibus, ca-
pitibus, &c.
Ab ossium com-
missuris.*


*A cartila-
gine.*

*Ab ossium
substantia &
constitutione.*

organi ossiculum: præterea quæ à uerticuli forma nomen fortiantur, ut dorſi uertebrae: & quæ clauo à Græcis γόμερα appellato respondeant, ut dentes: & quæ mediam maiusculæ piſæ seu ciceris formam præferant, ut duo pedis ossicula, primo pollicis internodio supposita: eiusq; generis ossium quæ forma inuicem uariant permulta, non ita obiter ab illo cui ossa adhuc inco- gnita sint, intelligerentur. Atque hac etiam ratione processuum, appendicum, capitum, su- perciliorum, sinuum, & tuberculorum imagines, in præſenti neuiquam recensendæ ueniunt: quemadmodum neque aliqua quæ ex hisce sumi possit ossium differentia, quum quid proces- sum, appendicem, eiusq; ordinis reliqua nominem, hætenus non expreſſerim, ista secundo ab hoc capite necessariò pertractaturus. Ac proinde etiã differentiæ ab ossium cõmissurarum spe- ciebus petita, nisi cõmissuris accuratè explicatis, obuiæ esse nõ queunt. Quòd autè quamplu- rimæ sint, & cognitu non admodum faciles, quartum Caput attestabitur. Item differentias quæ à cartilagine dependere possunt, nondum natura cartilaginis exposita, haud promptè quiuis assequeretur. Incognita enim cartilagine, intellectu difficile est, quæ nam ossa cartila- gine prorsus destituantur, ut uerticis ossa: quæ illa undique, ut quædam brachialis ossa, aut ali- qua tantum ex parte, ut femur, incrustentur. quæ item in cartilaginem degeneret: ut nasi ossa, costæ, pectoris os. His igitur differentijs in suum locum asseruatis, eas quæ à substantia & ossium cõstitutione colliguntur, sermoni hîc adijciamus. Sunt enim quædam ossa pla- nè solida, neque quouis pacto effracta, inte- rius cauernulis sinibusue obsita uidentur: ut, præter cætera, duo nasi ossa, & quod in oculorum sede minimum, ac superioris ma- xillæ ossium secundum numerabitur: & ea quæ sesami seminis magnitudini comparan- tur: & duo ossicula auditus organo propria. quæ omnia nisi temporis successu impensè resiccata, nullam omnino cauitatem intus o- stendunt. Nonnulla uerò exterius, quasi con- tinua crusta, aut lamina obducerentur, solida apparent, sed effracta. quædam paruis tantū sinibus cauernulisq; cõpactissimæ spongiæ, uel læuissimi pumicis foramina quamproxi- mè referentibus, intus oppleta cernuntur, quandam fungi speciem exprimentes: ut in minorum ossium numero, brachialis ossa, & tarsi ossa: in maiorum autem, sacrum os, uertebrae corpora, pectoris os, calcis os, talus, deinde & uerticis ossa. quædam uerò præter cauernulas, nulla serie aut numero po- sitas, amplū aliquem & insigniter cauum exi- gunt sinum, qui solidissima ualidissimaq; os- sis substantia circumdatus in extremis angu- lis, osseis ueluti lineis interstinguitur. Hunc sinum singula ossa, quibus obtigit, unicum ferè adipiscuntur. Sunt autem huius classis inter minora ossa, pedi, postbrachialis, & di- gitorum ossa: atque ex his potissimū primæ & secundæ digitorum acies, quantumuis se- cus Galeno Anatomes professorum præci- puo uisum sit, ossa digitorum solida consti- tuenti. Grandiora uerò ossa eiusmodi sinu donata sunt, femur, tibiæ os, humerus, maxilla inferior, quartum superioris maxillæ os, fron- tis os, temporum ossa, & plerunq; ipsum cuneiforme os. Dentes autem, qui omnium ossium facile sunt durissimi, huius generis sinum quoque obtinent: sed interim dictis nuper cauernu- lis, & pumicis modo efformatis foraminulis prorsus destituuntur. Maiores isti sinus, & illa pumici ac exiccato fungo non ab similibus constructio, ossibus contigerunt, cum quò motus no- mine

Quoniam præſens differentia in figuris, singulis Capitibus quibus priuatim os aliquod describitur, præpositis, ita ut reliqua quæ hoc

Capite pertractantur, non est obuia, hîc appinxi- mus brachij ossis, seu ut cū Cel- so dicamus, humeri, secun- dum longitudinem dissecti al- teram partem, quæ ipsius capite quod scapula articu- latur, cauernulas pumicis modo efformatas, & A in- signitas cõmonstrat: quæ ad modū et squamā illis cauer- nulis obducta, et B notata. C autem inscribitur portio exterioris superficiei istius ossis, hîc cõspicua. Insuper D sinum cõmonstrat am- pliter cauum, qui solidissima crassaq; ossis parte E ac F indicata circumdatus, secū- dum humeri longitudinem exporrigitur. Ad sinus ue- rò summum ubi G reponi- tur, & inum ubi H uisi- tur, ossæ occurrunt lineæ, medullam hoc sinu conten- tam intexentes. Cæterum sub humero os cymbam refe- rens, ac undecima figura trigessimæ tertij Capitis ex- primendū, hîc uerò per me- dium dissectum, & I & K insignitum delineauimus, ut ossis apparet substantia pumicis instar constructa. Ac utrunq; quidem L, cauernosam fungosamue hu- ius ossis notat substantiam. M uerò, squamam, quæ os- sis constituit superficiem,



& undique illi fungosæ substantiæ circumducitur. Præterea huic ossi unum ossiculorum subiunximus, quæ primo pollicis pedis interno- dio coarctata, in secunda trigessimæ tertij Cap. figura & & ostenduntur. Atq; hoc ideo N notatum integrè per medium diuisum, ut aliquod os impensè solidum, & cauernulis penè destitutum, in con- spectum quouis pacto ueniret.

*In 1 de Vsu
partiu, et 2 lib.
Cõmentar. in
Hipp. lib. de
Fracturis.*

mine leuiora redderentur, tum ut medullam proprium ipsorum nutrimentum illis cōtinerent, aut priuatim aërem, aliquam ue peculiarem materiam, ut frontis os, temporum ossa, præter medullam, amplecterentur. Neque solum in maioribus his ossium sinibus, ut quispiam arbitra retur, medulla reponitur, uerum illæ spongiæ modo extructæ cauernulæ non minus quàm in signiores illi sinus medulla infarciuntur. Quòd autem singulis ossibus prout unumquodque maiori minoriue indiget leuitate, robore & duritia, aut prout huic aut illi sensus organo præ est, sinus hi & ossium densitas iustissimè attribuatur, in singulorum ossium enarratione sedulo prosequar. Præter cauernulas & sinus, quibus ossa intus scatent, quædam etiam amplis foraminibus sunt peruia, ut occipitis os, & uertebrae, quæ dorsalem transmittunt medullam. pubis quoque ossa, quò leuiora reddantur, cæteris omnibus grandius foramen obtinent. Alia autem paruis perforantur foraminibus, ut pleraque capitis & maxillarum ossa, uenis, neruis, arterijs uiam præbentia: & os quod inter capitis ossa octauum numerabitur, odorum gratia tenuibus foraminulis cribri modo perforatum creditur. Alia exterius ac in superficie nullum quod sensu dignoscitur foramen cōmonstrant, ut brachialis ossa, & dentes, & digitorum ossium permulta. Non paucis autem ossibus foraminula obtingunt, quæ exterius ac in superficie sunt conspicua: non tamen uniuersum os penetrant, sed tantum uenis & arterijs crassiora ossa subeuntibus præparantur. Eiusmodi foramina in calcis osse, & talo, & osse sacro, & in grandium uertebrearum corporibus passim occurrunt: quò uidelicet hæc crassiora sint, quàm ut à uasis ipsorum superficiem tantum perreptantibus, alimentum commodè queant assumere. Ab ossium sensu leuis admodum pendet differentia. Dentes enim sensu præditos, reliqua autem ossa illo destituta arbitramur: quamuis non nimium temerè ossibus omnem sentiendi uim adinere conuenit, quum in crebris quas manu obimus curationibus interdum ossa dolore affici, etiam præstantissimi medici affirmant: non ignorantes interim membranam quandam omnibus propemodum ossibus obduci, quam *περίσσω* ob id Græci uocarunt, cuius gratia alijs ossa (si quid modò sentiunt) sensu pollere uisum fuit. Præterea & soli dentes tota sede qua extra gingiuas prominent, nudi sunt, reliquis interim ossibus omni ex parte tectis, & ante sectionem latitantibus. Ad hæc dentes ubi prominent, membrana ossa inuolvente destituuntur, ut & caluariæ interior superficies, quæ cerebrum continetur, quam dura cerebrum induens membrana proximè succingit, quum alioquin cæteris ossibus dicta prius membrana undique circumducatur, si eas sedes exceperis, quibus ossa uel articulantur inuicem, uel alioquin mutuò construuntur.

Qua ossium parte medulla reponatur.

Ab ossium foraminibus.

A sensu.

Ab occultatione.

A membrana ossa succingente.

QVID CARTILAGO, ET QVIS CARTILAGINIS usus & differentia. Cap. II.



CARTILAGO osse mollior est. terrestris tamen ac durissima partium corporis secundum os particula, prorsus solida, & nullis foraminibus cauernulisque ossium modo intus oppleta, & sensus ac medullæ expers. Huius usus perquam uariis est. Primum namque idem præstat quod ossa, quum uelut fulcrum quoddam sit, cui proximæ partes adnascantur, & ad stabiliantur. Cartilagine enim quibus larynx constat, ossium munere eleganter funguntur. quippe ipsis quidam implantantur musculi, ac nonnulli ab illis enascuntur. Insuper cartilagine hæ laryngem perinde effingunt, atque rusticorum domus ex trabibus confectas cernimus, priusquam stramina, tegulæ, & lutum illis adhibentur. Neque sanè hominum ossa & cartilagine carne nudatas, ac postmodum unà contextas, propius cuiuspiam imagini asimilaueris, quàm tuguriorum fabricæ iam primum erectæ, & nondum ramis aut terra ornatae. Pari quoque ratione cartilagine ossium uicem obeunt, quæ inibi reponuntur, ubi nullo osse locato, musculi suam insertionem tentant: quod palpebris & naso euenit. In palpebrarum enim extremis oblongæ consistunt cartilagine, in quas musculi palpebras mouentes inseruntur. Ad hæc, nasi alæ cartilaginibus efformantur, quæ musculorum insertionem perinde ac ossa excipiunt. Quinetiam illæ alarum cartilagine, nasi apicem unà cum alijs cartilaginibus à nasi ossibus prognatis eleganter ossium ritu suffulciunt, eriguntque. Præterea costarum ossa in cartilagine finiunt, in omnibus quòd ad usum ferè spectat, illis ossibus respondentes: quamuis ex abundanti his cartilaginibus peculiaris usus accedit, quo thoracis amplitudinem (quam illæ cum costarum ossibus efformant) promptius dilatari constringique patiuntur, quàm si rigida & ossis modo dura essent. Insuper eiusdem ferè usus gratia asperæ arteriæ cartilagine nostri imaginem exprimentes, in hoc ab ossibus discrepant, quòd præter id quòd bellè sustinent, ossisque munus fulciendo gerunt, eam adipiscuntur temperiem, cuius be-

Cartilaginis natura.

Usus communis ossium usui respondens.

Cartilagine osse propius stringi ac dilatari.

*Cartilaginis
usus in arti-
culis.*

*Tertia in arti-
culis quibusdā
cartilago.*

*Li. 2 de Ad-
ministran. se-
ctionibus.*

*Cartilago
glutinis uicē
subiens.*

*Ligamentorū
substantiā in-
grediens carti-
lago.
Cartilagine
aliquid conti-
nuo erigētes.*

*Extātib. par-
ticulis adnatæ
cartilagine.*


*Cartilaginis
differentiæ.*

neficio distendi comprimique secus quam os possunt. Adde & alium cartilaginis usum neutiquam infimum, quo hæc ossibus occasionem præbet, ut in continuis frequentibusque motibus attritu minus uidentur. Ossium nanque commissuræ motus gratia extructæ, propter ossium siccitatem ex mutuo contactu, leui opera rumperentur, nisi utraque commissuræ ossa tota sede qua se inuicem contingunt, articulumque formant, cartilagine quadam ueluti crusta scorsim obducerentur, & hæc cartilago suo in duritiæ mollietisque temperamento ossium impetui resisteret, & unà incidentis uim cedendo leuiter exolueret. Neque solum cartilago in ossium affricu quo minus mutuo contactu atterantur commoda est, at ita læuis planaque uisitur, ut promptissime ossis caput in suo sinu uoluatur, nullaque asperitas motus promptitudinem impediat, accedente huc uiscido lubricoque humore, & ueluti smegmate quopiam, quo rotulas ad reflectendum funes oblinimus. Quinetiā sagax rerum Opifex adeo præstantem cartilaginis usum in articulis fore cognouit, ut non solum ad eum quem diximus modum ossa in mutuo contactu cartilagine læui & lubrica crustæ cuiusdam modo ornauerit, uerum in nonnullis articulis præter has cartilagine tertiam quandā adhibuerit, quæ neutrius ossis cartilagini, sed tantum membraneis articuli ligamenti orbiculatim connascitur, & ueluti cartilaginum ossibus obducentarum quoddam interstitium efficitur. Hæc utrinque, quæ inter alias cartilagine consistit, læuis, & ob uiscidum quo oblinitur humorem lubrica est, & multo illis cartilaginibus quæ ossibus obnascuntur mollior. Huiusmodi cartilagine inferioris maxillæ ad superiorem articulos intercedere, suo loco audies; deinde aliam pectoris ossis cum clauicula articulum, & nexum clauiculæ cum summo humero, & ulnæ cum brachiali, & tibie ossis cum femore, in quo articulo huius generis cartilagine, sinus, quibus femoris capita excipiuntur, magna Naturæ providentia peculiariter augent. Verum eiusmodi cartilagine Galeno non uidentur animaduersæ, si ex omnibus eas duntaxat exceperis, quas genu articulo proprias esse diximus; quarum Galenus ligamenti nomine semel, & obiter tantum meminit. Arabibus autem eas notiores fuisse, quodammodo hinc colligitur, quod illi ossium contextum docentes, ossa quidem omnia scripserint esse contigua: illis tantum seclusis, in quibus Laguahic, aut (ut correctius dicamus) Luhach intercedunt, quæ ossa inuicem nonnihil dirimunt, ea uoce huius generis cartilagine mollietate à ligamenti natura parum absimilem intelligentes. At quibus sedibus hæc contineantur, neminem Arabum hætenus docuisse reperi. Huiusmodi itaque usum cartilago in articulis suppeditat. ad quem rursus accedit, quod in plerisque ossium commissuris non ad motum institutis, cartilago quasi glutinis uicē interuenit: quemadmodum in pubis ossium commissura fieri animaduertimus, & in minoribus natu corporibus, in appendicis cum reliquo osse coalitu. Porro de cōglutinantis cartilaginis natura, ubi ossium commissurarum differentiam persequemur, denuo agendum erit, ubi hæc luxationum gratia neutiquam perfunctoriè perpendenda ueniet. Pariter & cartilaginis species, quam ligamenta cartilaginosa aliquando formare docebimus, in ligamentorum enarratione pertractabitur. Sunt autem eius generis in uertebrarum connexu, in coxendicis articulo, & in genu. In præsentia igitur suffecerit, ita cartilaginis naturā leuiter explicare: ad quam non inopportunè adhuc cartilagine retuleris, in hoc fabricatas, ut quippiam in ipsis quod continuo erectum esse oportuit, firmaretur. Cuius generis palpebrarum sunt cartilagine, *πάλατι* nuncupati, quæ cilia seu palpebrarum pilos erectos, neque aliorum pilorum modo concidentes sustinent, instar aridi durique soli, in quo arbores firmius figuntur: eo uidelicet pacto, quo in longis nauibus remos, quoties non nauigatur, sua serie firmatos, & ex aqua subleuatos conspiciamus. Præter hæc rerum Opifex nudas & prominentes corporis particulas, & ossium fines alteri ossi non commissas, cartilagine adauxit, nimirum ut tali cōstarent substantia, qualis neque frangi propter mollietatem, neque rumpi propter siccitatem queat. Quod autem cartilago non minus quam ungues ea formentur substantia, uel pueri nos docent, qui maiusculam cartilaginei piscis, aut uituli cartilagine nacti, eam in globulum scindunt, ac ut ualidissime frequentissimeque resiliat, lapidi cuiquam iniiciunt. Is enim resultus liquidò cartilaginis temperiem ita arguit, ac quum cæsim punctumque cartilago superficietenus cultro petitur, & ab illo dein resilit. In cartilaginum, quæ nudis partibus contigerunt, numero, obseruabis nasci cartilagine, eam quæ in mucronem gladii modo à pectoris ossis fine exacuitur, spuriarum costarum cartilagine, & eam quæ ossis coccygis termino adnascitur: & auris cartilagine, quæ tenuis mollisque est, & cute obducta, ossis uicē auris corpus pulchrè suffulcit. Cæterum isti cartilaginum inter se uariantes usus, earundem quoque differentias explicant, adeo ut nunc neque has, neque cartilaginum formas, prolixius enarrare conueniat, præsertim quum singulæ cartilagine perinde ac ossa à nobis priuatim ueniant describendæ. Quamuis fortè aliquis hinc adhuc additum uelit, in minoris ætatis corporibus cartilagine molles

molles esse: in grandioris uerò ita subinde indurari, ut fragilis ac friagilis ossis naturam referant. quod potissimum laryngis cartilaginibus, & illis accidit quas superiores costæ educunt. Hæ enim temporis successu, idq; maximè in brutis, osseæ fiunt, exterius duntaxat cartilagine ueluti membrana quapiam succinctæ, quæ ab ossea illa cartilaginis substantia per elixationem leui negotio abscedit & diuellitur.

NOMINA QVIBVS OSSIVM PAR-

tes sedesq; indicantur. Caput III.



PRAESENTIS TABVLAE EIVSDEMQUE
characterum index.

Proposita modò tabula aliquot ossi in hoc tantù delineantur, ut ossium partes & sedes, quarum nomina hoc Capite persequar, in nonnullis saltem ossibus appositè exprimant. Vnde si in huius Capitis contextu alicuius ossis hic non delineati mentio incidet, id ex figuris proprij sūt Capitis, aut ex integris quæ primi libri calci adhibebuntur, opportunè petes. Quamquam non opus est, in cuiusque partis sedisq; descriptione, omnia ossa, quæ exempli loco adferam, contemplari, quum hic abunde erit in uno osse quod traditur perpendere, & quum alibi id nomen occurreret, memorem esse. Quæ uerò ossa hic delineantur, characterum index docebit.

A Dextrum femur, cuius appendices sua sede dimouimus, ac ueluti quodam interstitio à reliquo osse disiunximus.

B Dextrum femur, cui appendices suis sedibus adhuc adnatæ hærent.

C Maxilla inferior, unà cum humiliori dentium serie.

A 3 D Hic

D Hic os dextro sacri ossis lateri coarticulatum, externa sede exprimitur: cui aliud nullum peculiare nomen cum Galeno indimus, sed triplici nomine, uidelicet ilium & coxendicis & pubis, pro ipsius sedum ratione comprehendimus, id uigesimo nono Capite descripturi.

Sub iam cōmemorato osse, & inferiori maxilla, pedis dextri ossa ita uidetur, ut quatuor tarsi
 1. 2. & c. ossa his notis, 1. 2. 3. 4. insignita, cum osse cymbæ non absimili, ac **E** indicato, & talo **F** inscri-
 E. F. G. pto, & calcis osse **G** significato, à quinque pedij ossibus **I**, **II**, **III**, **IIII**, **V**, notatis, &
 H. I, II, digitorum ossibus **H** & **H** ostensis, adeo remouentur, ut sedes qua pedij ossa tarsi ossibus
 III, etc. committuntur, intueri possit. Hac nanque ratione sinus in superficie tantum insinuati, & capita
 H H. leuiter admodum protuberantia, opportunè commonstrantur.

I Pedi subiacet brachij os, seu humerus, anteriorem ipsius sedem ostendens.

K Scapulae dorsi portio, in hoc depicta, ut spinam ipsius cum summi humeri appendice lineis in-
 terstincta, & uarijs partibus efformata ostenderet. Atque hæc ossa præsens commōstrat ta-
 bula. reliqui uero characteres ossium partibus ostendendis hunc in modum seruiunt.

L & c. Quatuor **L** in priori femore **A** notato positus, quatuor femoris appendices indicantur.

M & c. Quatuor **M** in altero femore locatis, etiam quatuor femoris appendices insinuantur, quarum
 circumscriptionem lineæ notant, quibus illæ à femoris osse, ut ita dicam, dirimuntur.

N N Superius **N** in osse sacri ossis lateri commissio, ac **D** insignito, appendicem notat ossis ilium.
 inferius autem **N**, appendicem ossis coxendicis.

H

O & c. Aliquot **O** in pedij ossibus, **I** scilicet, **III** & **V** signatis ponuntur, & deinde in primo se-
 cundoq; pollicis osse, & primo secundoq; medij digiti etiam **O** conspicias, appendices in his os-
 sibus insinuantia: non quod tantum ossa **O** insignita appendicibus donentur, sed quia aliquot cha-
 racteres eandem in similibus ossibus rationem esse, satis doceant.

P Humeri appendix.

Q Appendix spinæ scapulae, seu summi humeri.
 scapulae appendicis portiones intercedunt.

R Lineæ, quæ plures spinæ sca-

S & c. In utroque femore duo scripsimus **S**, femoris notantes processus.

T Processus acutus inferioris maxillæ, atq; ita etiam **T**, *λογών* insignitur.

V V Duo sunt processus in osse alteri sacri ossis lateri coarctato.

X Processus appendicis superioris pedij ossis **V** notati, paruoque digito præpositi.

Y Y Duo processus, seu tubercula inferioris sedis humeri, qua cubiti ossibus articulatur.

a & c. In utroque femore ter **a** ponitur, tria femoris ostendens capita. Cæterum in priori femore
A notato, in elatissima appendice **a** posuimus. In femore uero **B** insignito, extra appendicem,
 ne fortè quis solam appendicem hic caput coxendicis ossi inarticulatum esse arbitretur.

b Caput maxillæ inferioris dextrum.

c Caput tali, ossis quod cymbam refert sinum subintrans.

d Caput tali, tibiæ sinum subiens, quod & **F** notatur.

e & c. Aliquoties in pedis figura e occurrit, capita notans pedij & digitorum ossium

f Caput humeri superius, quod scapulae articulatur.

g g Duo capita inferiora humeri, seu potius sedes quibus ulna & radius articulantur.

h h In utroque femore semel **h** ponitur, ceruicem capitis indicans quod coxendicis ossi immittitur.

i Ceruix in inferiori maxilla.

k Ceruix in talo.

ll Ceruices pedij ossium. Ponitur autem **l** in **II**, & in **IIII** tantum, ne reliquæ ceruices
 obscurarentur.

m Ceruix in humero.

n Acetabulum in coxendicis osse, cui femur inarticulatur.

o Acetabulum in humero. latitat autem **o** inter duo **Y**.

p p p Superficietenus exculpti sinus, qui in tarsi ossibus uidentur.

q q Pedij ossium minimè extuberantia tubercula. duo autem **q** tantum his ascripsimus, quod reli-
 qua in umbra latitassent, & picturæ quoque obfuisent.

r r Supercilia in coxendicis osse, ad superiorem acetabuli sedem conspicua. Si fortè in cartilagi-
 nibus has quoq; ossium partes aut sedes contueri lubet, omnes quæ in cartilaginibus spectari
 possunt, effigies cartilaginum trigesimo octauo Capiti præpositæ commonstrabunt.



TCVNQVE uocum multitudo & uariis illarum apud alios & eundem subinde authorem usus rerum descriptionem arduam reddit, nulla tamen æquè uaria pugnansq; dictionum est congeries, atque nominum, quibus ossium partes sedesq; indicantur, & quibus in ossiū descriptione perpetuò est utendū. Vt enim nunc ad sequens Caput uarias appellationes asseruē, quibus commissurarū ossa iungentiū species significatur, huc modo refe-

*Varias esse
uoces quib. os-
sū partes se-
desq; indican-
tur.*

runtur, *καλόν, ἐπίφυσις, ἀπόφυσις, κορώνη, κορωνίς, κεφαλὴ, κεφαλαιον, ἄρθρον, κόνδυλος, προχῆλος, αἰχμή, κοτύλη, κοτυληδών, ὀφθαλμός, γλῶττις, ἵτυς, ὀφρυς, ἄμβων, χεῖρ, βαθυμύς, eiusq; generis uoces quamplurimæ, quæ Græcorū sunt nomina: Latinis autē, & si priuatim nōnulla tantum habentur, interpretum tamen lasciuiā tot nominum myriades passim ita sunt obuiæ, ut iam seorsum unumquodq; Græcorum nomen assumendum ueniat, & quid ueteres qui pueros do-*

*Καλόν.
Artus.
Membrum.*

mi sedulo dissecandi rationem docebāt, illis intellexerint, addendum, quò tandem cuiusmodi uoce nos quoque sumus toto sermonis contextu usuri, statuatur. *Καλόν* itaque, quo etiam no-

*ἐπίφυσις.
Appendix.*

mine Græcorum interpretes subinde utuntur, aliquando autem artum, interdum uerò mem-
brum uertunt, Græcis quatuor duntaxat membris accommodabatur, brachio scilicet, cubito, femori, & tibiæ: neque etiam aliam partem ea uoce Galenus usquam intellexisse uidetur. Ve-
rū quum rarò, aut nunquam huius uocis usus mihi incidat, illi prolixius inhærendum non ar-
bitror. *ἐπίφυσις*, quam Latini appendicem, applantationem, adnexam, additamentum, adna-
tum, & alijs innumeris profectò modis reddunt, perpetuò appendicem appellabo. Est autem
ἐπίφυσις seu appendix, os alteri ossi adnatum, & peculiarem obtinens circumscriptionē, neque
illius ossis cui committitur, uera portio. Huiusmodi appendicis naturam, quoties aut uituli,
aut hœdi, aut agni, aut alicuius iunioris animalis pars aliqua mensæ apponitur, discere licet.
Emundato enim femore, humero, tibiā, aut radio, aut ulna, aut alio his simili osse à cæteris libe-
rato, & ualidius non nihil attrectato, ab illo ueluti aliud quoddā os decidere cōspicimus, appen-
dicis nomine donatum. Atque id in iunioribus duntaxat animantibus intuemur. In ætate enim
prouectis appendices adeò pertinaciter suis ossibus adnascuntur, ut ab osse auelli nequeant,
uixq; coniunctionis lineam exprimant, & ueræ suorum ossium portiones esse uideantur: cū
interim in nuper natis magnam cartilaginis portionem inter appendicem & os cui ea adnecti-

tur,

intercedere appareat, quæ appendicem ossi glutinis modo connectit. Coalitus hic non^a læ-
ui plana q; perficitur superficie: uerū os cui appendix committitur, sinibus quibusdam & aspe-
ritatibus abundat, quibus appendicis tubercula sinusq; mutuo ingressu ualidius accommodan-
tur. Præterea^b connexus iste hoc quoque priuatim nanciscitur, quòd os nulla prorsus sui sede
mollius, & in duritia ac soliditate infirmius quàm circa ipsum connexum cernatur. Perpetuò
enim os inibi pumicis spongiæ ue modo multis cauernulis intus plenum est. & quamuis id
subinde reliqua propemodum ipsius longitudine unum sinum ampliter cauum & duntaxat
medulla oppletum obtineat, ac durissimum ualidissimumq; secundū sinus illius longitudinem
existat: nihilominus tamen priusquam appendici os annectitur, sinus ille deficit, & ipsum mol-
lius redditum, cauernulis, quemadmodum & appendix ipsa, scatet. Atque id ita perficitur, ut
Galenus appendices sinuum medullam continentium opercula esse tradiderit. Quasi uerò ap-
pendicum cauernulæ medulla destituerentur, & non quamplurima ossa sinibus quibus me-
dulla ossuosis fibris non intertexta continetur carentia, appendicem asciscerent. Amplis enim
ossibus quæ sacri ossis lateribus coarctantur, eiusmodi sinus neutiquam adest: nihilominus ta-

*In u. de Usa
partium.
Appendices
sinuū medullā
continentium
non esse oper-
cula.*

men toti ilium ossis spinæ^c appendix coalescit, quemadmodum & toti infimæ sedi coxendicis
ossis. Quin & scapulæ nulla ferè ex parte medullosæ,^d quatuor appendices annectuntur, duæ
quidem ad ipsius basim, una ad mucronem interioris processus scapulæ, & quarta ad summū
humerum: quæ peculiariter ex pluribus particulis extruitur. Demum dorsi uertebræ eius ge-
neris sinu carent: attamen ipsarum corpora superius inferiusq; sibi^e appendices uendicant. Imò
non modò uertebrarum corpora appendices habent, sed etiam transuersorum in thorace ac
lumbis uertebrarum processuum & spinarum apicibus appendices annectuntur. Insuper &
costarum radici uertebris coarticulatæ appendix committitur, etiam si costarum os nullo am-
plo sinu medullam recipiente donetur. Cæterum uertebræ & puerorum dentes, qui etiam ap-
pendicibus decorantur, non solum indicant ossa his sinibus destituta appendices obtinere, ue-
rum etiam argumēto sunt non solis grandibus ossibus Naturā appendices dedisse, quantūuis
antehac Anatomicorum præcipui oppositum asseruisse uideātur, appendices magnis tantum
ossibus adscribentes. Porro ex ossibus eiusmodi sinus habentibus, femori quidem^f quatuor
annectuntur appendices: unus capiti, quo coxendicis ossi inarticulatur: unus inferiori ipsius
parti, quæ tibiæ committitur: & duo alijs duobus ipsius processibus, quos ferè rotatores uoca-

*Non solum
grādib. ossib.
appendices con-
tingere.*

*Galen. lib.
de Ossibus.*

*Expēde fe-
moris appē-
dices si. A.*

*fig. capiti
inserta in-
ter G & A.*

N, N si. D.

X, Y, E, K

fi. 1. 2. ca. 21.

Q, R, si. K.

1, 2 si. ca. 17

A, B & C.

Quatuor

1 si. A. de in

4 M si. B.

mus. Tibiæ ossi & fibulæ ad genu & ad pedem appendices adnascuntur. Radius quoque iuxta brachiale & humerum appendicibus donatur. Humero autem tantummodo superius, quæ scapulam spectat, appendix contigit: quemadmodum ulnæ duntaxat iuxta brachiale. Atque hæc ossa grandia sunt, quibus insignes Natura sinus largitur. Parua autem, quæ & nos quoque eius generis sinu contra Galeni placitum donari docuimus, haudquaquam appendice carent: quippe postbrachialis & ^apedij ossa ad unum omnia manifestissimum appendicem exi-
gunt, ubi primorum digitorum ossium sinus ad articulationem subeunt. Superius uerò quæ hæc ossa brachiale & tarsum respiciunt, subinde appendicem quidem adipiscuntur, at firmiter semper quàm ima parte, ipsorum ossi coalitam. Item omnia digitorum ossa superius & inferius appendicibus plerunque decorantur, si ultima excipias, quæ superius tantum appendices habent. Hæc omnia in puerulis admodum sunt cōspicua. In ijs uerò qui iam ad summum incrementum uenere, appendicum connexus spectatu est difficilis, in senibus autem prorsus occultatur ac latet. *Ἀπόφυσις*, quem interpretes processum, excessum, explantationem, additamentum, & nescio quibus alijs uocibus uertunt, nobis processus appellabitur: estq; ossis pars nihil à suo osse differens, quàm quòd tuberculi seu gibbi instar ex osse procedit, quemadmodum ex arboris trunco radices ramiq; extuberare ac procedere uidentur. Eiusmodi processus in ossibus sunt quamplurimi. Nulla enim dorsi est uertebra, quæ non multis donetur, quandoquidem aliquot ^bcervi-
cis uertebras etiā plures undecim processus habere, thoracis autem uertebras septem, lumborum uertebras nouem, suis locis docebimus. Deinde & ^cinferior maxilla processibus utrinq; duobus donatur, & ^dhumerus quoque, & omnia corporis ossa processus exigunt, quoties extra simplicem planamq; superficiem aliqua sui sede extuberant. Porro processum, sicut & appendicum, nonnullæ sunt differentiæ. Quibusdam enim processibus appendix adnascitur, nam femoris processus rotatores nuncupati, & scapulæ spina (quæ processus scapulæ est) appendicem obtinent: quemadmodum & interior quoque scapulæ processus, qui ancoræ imagini confertur. Alijs processibus nulli sunt appendices. nam maxillæ inferioris, calcis ossis, tali, & reliquorum fungosorum ossium processibus appendices rarissimè contingunt, modò & eorum quoque ossium processus fungosi sint. Humeri etiam processibus, qui ad cubiti articulum consistunt, nulli appendices adnectuntur: quemadmodum neque ulnæ processibus, qui humero articulantur. Rursus ipsi appendices plerunque sibi processus uendicant. Ulnæ enim appendici processus accidit, quem columnæ, & quo scribimus stilo, dissectionum periti assimilarunt. Tibiæ quoque ossis inferiori appendici ^aprocessus obtigit, quem interiorē malleolū nuncupamus. Deinde & pedij ossis paruum digitum sustinentis superior appendix ^bprocessum exigat, cui octauus pedem mouentium musculus inferi ostenditur. Humeri quoque appendix, quemadmodum & appendix infima femoris, in duos processus adeò insignes diuiduntur, ut utrosque capitis nomen seorsim mereri audias. Ad appendicem itaque & processum referuntur, quæ iam explicabimus ossium capita, ceruices, sinus, tubercula, & supercilia. Quanquā tamen processus nomen illis tantū processibus adhiberi satius erit, qui alteri ossi non articulatur. Femoris namq; & humeri capita processus non nuncupamus, quemadmodum sanè acutos maxillæ inferioris processus, & tubercula humeri, quæ ad cubiti articuli latera prominent. Deinde & processus appendicibus ornatos, non appendices, sed processus simpliciter appellare opportunius fore putamus. Femoris enim rotatores, & scapulæ & uertebrarum processus, etiam si appendices habeant, processus aliorum Anatomicorum more (qui subinde *ἐπίφυσις* cum *ἀπόφυσις* confundunt) nuncupabimus: Appendicis autem processum simpliciter nunquam, non addito appendicis nomine, proferemus. quippe interiorē malleolū inferioris tibiæ ossis, appendicis processum esse dicemus. At hæc omnia obiter tantū intellectis nominibus, in ossium descriptionibus erūt obuia, ut & processu quoq; usus in singulis ossibus manifestus euadet. Cōferunt autē processus præcipue ad cōmodam articulationem, & ossium cōmissuram, deinde ad multarū partium exortum, aut insertionem. Si enim ossa nullibi extuberarent, neq; collū ritu educerētur, ac rursus ualliū modo exculperētur, paucissima ex ipsis nasci, ipsisq; inferi possent. Nunc autē processus montis instar prominent, à quo plura quàm ex plano pronascuntur, aliaq; ei dein (ut sic dicam) inseruntur, & super ipsum exedificantur. Quinetiam processus propugnaculi uice esse, scapularum & uertebrarum processus testabuntur. *Κορώνη*, seu *κορώνις*, interpretibus quibusdam cornix dicitur. At ueteres Græci in ossibus hac uoce acutum significabant processum, quem ad arcus cornu & incisio-
nem, ubi neruus sedet, referebant. Huius generis unus utrinque in inferiore maxilla habetur, cui temporalis musculi tendo inseritur. Deinde in temporum osse ^dalius cernitur, quem mammarum papillis assimilant. Sic & in eodem osse ^dalius consistit, qui gallorum calcaribus, & scri-
ptorio

ἀπόφυσις.
Processus.

Processum
& *appendicū*
differentiæ.

Processuū
usus.

Κορώνη.

00 in fi.
pedis.

8 fi. 15 cap.
numeri no-
tantur.
c T. i. fi. C.
d Y Y fi. I.

SS fig. A.
B.

fi. 1. 2. cap.
24 R.
a fi. 3 ca.
31 i.
X in pede.

c T fi. C.
et 6 muscu.
tab. A, B.

d 4, 5 fi. 6
cap. unus k.
alter i.

ptorio stilo comparatur. Verum Galenus non eiusmodi acutos processus musculorum insertionibus & exortibus paratos, ita solum appellasse uidetur, sed & nonnulla ossium capita, quæ aliorum ossium sinus articulationis ergò subeunt. Occipiti enim ossis capitula primæ cervicis uertebrae sinibus articulata, non semel eo nomine appellauit, quum interim, idque potissimum in homine, acuti processus nomen neutiquam mereantur. κεφαλή, & κεφάλαιον, Latinis nomine capitis explicantur. qui hac uoce appellant ossis tuberculum, alterius ossis cauum articulationis motusque arbitrarij occasione subintrans. Et caput rursus prominens aut depressum nuncupamus, ad ipsius ceruicem id referentes. Femoris enim caput, coxendicis ossis sinui in articulum prominens dicitur, quod ab ipsius ceruice ad uerticem usque longus pertingat ductus: quemadmodum & humeri caput scapulæ commissum, prominentis capitis loco numeramus, quoniam ipsius eminentissima parte ceruicem aut collum longè excedat. Verum pedis ossium capita, quæ tarsi ossibus committuntur, adeò depressa plana que sunt, ut uix dicere queas, num ipsa tarsi ossium sinus subintrēt, aut tarsi ossium tubercula in se recipiāt. Præterea neque in trium tarsi ossium cum osse cymbæ referente conexu à sinibus capita distinguere licet. dein eiusmodi capitula in plerisque uertebrae sinibus haberi, suo loco admonebimus. In præsentia enim sufficit addidisse, Græcos Naturæ operum studio flagrantibus, capita prominentia nuncupasse, quæ manifestum ostendunt tuber, & ipsorum medio (quantum ad superficiem spectat) magis quam lateribus, aut in orbiculo eminent & extuberant. Depressa autem, quæ adeò obscuro tubere gibbæ prædita sunt, ut num caput, num sinus ea uocari debeant, non satis constet. Atque hæc posteriora capita dissectionum periti κωνδύλως uidentur appellasse, priora autē simpliciter κεφάλαια. At de condylo non ita multo post quædam (quum ita uariè à multis id nomen usurpetur) adhuc subiiciemus. ἄρθρον, quem nos Articulū dicimus, Græci primum uocarunt, ossium commissuram ad motum paratam. Verum Hippocrates crebrò, idque potissimum in libris de Fracturis & articulis, ac Galenus etiam in eorundem librorum Commentarijs, articulum nominarunt rotundam ossis partem, in proximi ossis cauum sinum uel immissam, & capitis nomine dictam. Atque huiusmodi caput Latini etiam uertebrae seu uertebrae appellare uidentur, quando femoris caput coxendicis ossis sinum subingrediens, ita nominant. quanquam alijs rursum uniuersum coxendicis ossis cum femore articulum ita uocare libuit. Satius tamen fuerit, uertebrae nomen dorsi ossibus tantum accommodare, ut nobis uertebra idem significet, quod Græcis κωνδύλος, nimirum quoduis dorsi os: quod & uerticulū nonnullis dicitur, à uerticuli uidelicet forma, quo mulieres fusos aggrauant. Cæterum capita quæ iam dicto modo extuberant, quibusdam ossibus simplicia obtigerunt, ut femori quæ coxendicis ossi articulatur, pedis & postbrachialis ossibus, quæ digitorum prima ossa subeunt. Alijs duplicia sunt, ac gemina, & sinu quodam interstincta, ut femori quæ tibiæ committitur, primis & secundis digitorum ossibus, in inferioribus partibus, quæ subsequentiū ossium sinus subintrāt. Rursus capitula alia rotunda conspiciuntur, ut femoris supremum caput: alia à dextra sede sinistrorsum longius ducuntur, atque ita quodammodo lata fiunt, ut maxillæ inferioris capita. & alia à priori sede retrorsum longius feruntur, ut capita occipiti ossis primæ uertebrae sinus subeuntia. Verum & si à medico nomine medici digno huiusmodi capitula formæ ac differentia non minus quam proprii ungues, uel luxationum gratia, sint cognoscendæ, hæc tamen prolixius eas subdividendas esse haud existimaui, quod accuratissime singula in unoquoque osse persequi conabor. Porro ossium capita non semel Galeno ἐπιφύσδες, seu appendices uocantur, fortassis quod eorum nonnulla appendice consent: quemadmodum femoris capita, superius humeri caput, pedis ossium & postbrachialis capita, quibus primis digitorum ossibus coarctantur. Verum pleraque ossium capita neutiquam appendice formantur. Talus enim prorsus appendice caret, quemadmodum & humerus quæ cubito iungitur: & maxilla quoque inferior capita, non autem appendices exigit. Vnde non admodum recipienda uenit Galeni oratio, quæ κώλων, hoc est artuum capita, ἐπιφύσδες & κωνδύλως uocari docuit. Porro κωνδύλος Latini nunc articulum, nunc nodum, nunc gibberum, nunc caput, nunc capitulum, nunc digitorum ossa uertunt: quod admodum uariè hanc uocem à Græcis haberi cognoscant. In Galeni enim iam dicta oratione, artuum capita eo nomine nuncupari uidentur. In libris autem de Administrandis sectionibus, ita duo inferiora femoris capita uocat, & tubercula capita uel inferiora humeri, perinde ac si eo nomine indicarentur gemina ossium capita. quod & Hippocrates in libro de Articulis insinuat, ubi luxatum humerum κωνδύλοις, hoc est digitorum articulis restituere docet. Verisimile enim est, digitorum ossa ita ab aliquibus fuisse nuncupata, quod geminis capitibus, quemadmodum femur inferiori sede donentur. & potissimum prima quatuor digitorum ossa, quæ in luxationis restitutione humerum extrorsum, & dein sursum præcipue ducunt. Cæterum Galenus in primo

In libro de
Ossibus.

κεφαλή.
κεφάλαιον.
Caput.
Capitulum alia
prominentia,
alia depressa.

ἄρθρον.
Articulus.

Vertebra.
Vertebra.
κωνδύλος.

Capituli differ-
rentia.

In uide Vsu
partium.
κωνδύλος.

fi. 6 ca. 11.

Metire idā

Dad B pri.

fi. ca. 30.

Ab m ad f

in fi. I.

q. q in pede

Cōfer f. t. u

13 fi. ca. 33

cum n, m, l

fi. 10.

f. 9 fi. 15 ca.

d. et figuræ

16 ca. X, Y

a. b. Immit-

te A 1 fi. ca.

30 in e. f. g

fi. 1 ca. 29.

c. figuræ

ca. 14, 15,

16, 17.

G, H fi. 2

ca. 27.

mo de Musculorum motu *κόνδυλον* appellat, depressum ossis capitulum, quando *κεφαλῶ* seu caput *κοτύλη* seu acetabulo, profundo ue seu alto sinui cōfert; *κόνδυλον* uerò, seu depressum minimeq; extuberans & planum capitulum, *γλῶν*, quam sinum esse dicimus, adeò leuiter in osse cælatum, ut an sinus, an capitulum sit, diiudicare uix possis. Atque in hunc modum à primis dissectionis professoribus *κόνδυλος* nomen proculdubio institutum fuit. quamuis interim facile curauero, ne hoc nomen quicquam obscuritatis alibi in nostra oratione pariat, quum non minus promptum fuerit, obscure & leuiter extuberans capitulum, aut internum externum ue femoris caput iuxta genu dicere, quàm ambigua uoce condylum, uel nodum, uel quippiam simile sermoni inferere. Ac proinde etiam in cuiusque ossis descriptione perpetuò illud nomen nobis constituemus, à quo postmodum in musculorum, uenarum, arteriarum, & reliquarum corporis partium enarratione nunquam discedemus. *Τραχήλον*, & *αὐχένα*, Latini collum & ceruicem nuncupant, his uocibus ossis partem quæ collo nostro respondet significantes. Collum nanque & ceruix tenues ossium sunt processus, quorum extremum crassius redditum in ossis caput finitur. Huiusmodi ceruices nullibi perinde conspiciuntur ac in^a femore, iuxta elasticissimum ipsius caput coxendicis ossi inarticulatum. Dein in maxilla inferiori adeò insignis ceruix se offert, ut & caput inferioris maxillæ ceruicis nomine ab Anatomicis subinde donatum sciamus. Quinetiam in talo quoque^c ceruix apparet, ante orbiculatum ipsius caput conspiciua, quod nauiformi ossi inarticulatur. Ad hæc, ^dpedij & postbrachialis ossa, quæ digitis coarctantur, ceruices ostendunt. In reliquis autem ossibus illæ non æquè manifestò conspiciuntur. Cæterum aliquando non modò tenuiores ossium partes in capita extuberantes, ceruices dicuntur, quinetiā & tenues processus ita uocamus, qui latiores redditi sinum constituunt cui aliud os coarctatur. Quod si in aliquo osse conspicitur, sanè in scapula est manifestissimum, cuius^a artior pars ante sinum cui humerus inarticulatur posita, ceruicis quoque nomen ab Anatomes professoribus obtinuit. *κοτύλη*, & *κοτυληδὼνα*, ac dein *ὀφύβαρον*, Latini in ossium descriptione (nulla nanque nobis modò mensurarum est ratio) acetabulum & acceptabulum, & uulgò pyxidem, & interdum buccellam uocant: his nominibus sinus indicantes, qui altius profundius ue descendunt, excauanturq; ac ossium capita excipiunt. Obseruantur autē eiusmodi sinus seu acetabula, in coxēdicis osse, ubi femoris caput admittitur: dein & in^a osse cymbā referēte, in quem tali caput ingreditur. Neq; sanè in corpore aliq; sinus, quibus ossiū capita inarticulantur, illis duobus profundiores existunt. Verum arbitror à primis dissectionis professoribus, nō solum insigniter profundos sinus eo nomine appellatos esse, sed omnē sinum alterius ossis caput excipientem, modò quiuis illum primo intuitu sinum esse attestaretur. *γλῶν* autem ab ocularis sinus (quantum coniector) forma sinus dicitur, qui leuiter & superficietenus tantū cauatus est: ac talis occurrit, ut ignores num aliud os admittat, aut aliud os subeat, nihilo secus quàm si duo plani læuigatiq; asseres inuicem imponderentur. Atque sic *γλῶν* depresso responderet capiti, quod omnium primum *κόνδυλον* nuncupatum esse arbitror. Tales sinus habentur in^b tarso ossibus, quæ pedij ossa ipsis coarctantur. Item^c ossis cymbam referētis sedes, quibus id tarso ossa excipit, huiusmodi quoque sunt: ut &^d brachialis ossium nonnulla, quibus postbrachialis ossa articulantur. Præterea in prima ceruicis uertebra, ubi hæc depressa secundæ uertebrae capitula admittit. Verum hæc non ita dico, quasi inhibere uelim, sinus quosdam (qui & si manifesti sinus formam præferant, tamen non admodū profundè insinuantur) etiam *γλῶν* appellari. Nollē enim contentiose rixari, num tibiæ ossis sinus quibus inferiora femoris capita insident, *κοτύλης* aut *γλῶν* nomen mereatur. Attamen si articulationis species diligēter discusserimus, meritissimo *κοτύλη* uocabimus apparentem sinum, *γλῶν* uerò sinum adeò obscurum, ut ambigamus an uerè sinuum numero ueniat adscribendus. Quamobrem autem sinus nunc leuiter, nunc profundè à rerum Opifice insculpantur, sequenti Capite, quod ossium commissurarum differētias explicabit, ostendemus: quandoquidem articulationis gratia tam sinus quàm capita formantur. Hic autem suffecerit nomina duntaxat declarasse: & si cui interim uisum fuerit, licebit & sinuum differētias hīc quoq; sermoni obiter adiungere. Quippe præterquam quòd aliq; altè, aliq; uerò in superficie tantum inciduntur, aliq; rotundi orbicularesq; sunt, ut coxendicis ossis sinus femoris caput excipiēs, & digitorum ossium sinus, quibus postbrachialis ossa inarticulantur. Aliq; autē oblongi sunt, ut radii sinus brachiali admittens: & primæ uertebrae sinus, qui occipitis ossis capitula excipiunt: & maxillæ superioris sinus, admittendæ inferiori maxillæ parati, in horum quoque sinuum numero reponuntur. Aliq; gemini sunt, ut tibiæ ossis sinus, quibus inferiora femoris capita committuntur: dein digitorum ossium^b sinus plerique gemini quoque censentur. Aliq; trochleis rotulisq; respondent, ut humeri sinus ulnam admittens. Aliq; C referunt, ut^d sinus ulnæ, quem humerus ingreditur. Cæterum ut sinus & capita articulo-

rum

Τραχήλος.
αὐχῶν.
Collum.
Cervix.

Galen. initio
lib. de Ossib.

Gal. in libro
de Ossibus.
κοτύλη.
ὀφύβαρον.
Acetabulum
etc.

γλῶν.

Sinuum &
capitū usus.

Sinum diffe
rentia.

b, h. fi. A & B.

i. fi. C.

k in pede.
l, l in pede.

1, 2. fi. ca. 22
C, D.

f n. fi. D.
a 11. fi. 33
ca. k.

b p. p. p in
pede.
c. fi. 10 ca.
33. m. l.
d 6. fi. 25
ca. M, L,
K.

7. fi. 31 ca.
F, G.

f n. fi. D.
a 8. fi. 24
ca. x, z, y.
b 2. fi. 27
ca. l, k.
c 1, 2. fi. 23
ca. k, l, m.
d 1. fi. 24
ca. E, C, D.

rum gratia cōstituuntur, ita quoque & ἵπνες, ὀφρυνες, ἄμβονες, χείλη, quæ Latinis supercilia & labra nuncupantur. Sunt autem processus ad sinuum orbem instar laborum prominētes, & sinus profunditatem augentes. Hi tametsi in omnibus articulis ferè & ossium commissuris conspicui sint, euidentissimè tamen ipsorum naturam in profundissimis sinibus ostendunt. Quare etiam in coxendicis ossis sinu, cui femur inarticulatur, altissima maximèq̃ prominentia uidentur supercilia, ut sinum impensius cauum redderent, femorisq̃ luxationem accuratius prohiberent. Quò minus enim ossa promptè luxentur, supercilia in primis conducunt. *Βαθυμύδης* autem, sinus quidam sunt, qui basis firmamentiq̃ ritu, ultrà quàm animanti ex usu sit, os moueri haudquaquam sinunt. In^h anteriori enim humeri sede, & in^c posteriori sinus exculpitur, singulos ulnæ processus excipiens. Anterior nanque sinus priorem ulnæ admittit processum, quando cubitus extremè flectitur: posteriorē autem sinum posterior ulnæ processus in cubiti extensionibus ingreditur. Quoniam itaque posterior sinus in anteriorem non est peruius, hi ulnam ultrà quàm expedit haudquaquam moueri sinunt. Si enim essent peruij, neque processibus obuiam irent, cubitum æquè in acutum angulū extenderemus, atque modò flectimus. Meritò itaque primi dissectionum professores, hos sinus *βαθυμύδης* uocarunt: quamuis Hippocrati non huiusmodi tantū sinus ita appellentur, uerumetiam reliqui, in quos tubera ossium ingrediētia insidunt. Vlnæ nanq̃ sinum C modo exculptum, & quem humeri orbita subit, *βαθυμύδης* nuncupauit, quemadmodum alij totum cubiti cum brachio articulum. Illi quos prius in humero narrabam sinus, id priuatim sibi uendicant, quòd soli ferè omniū sinuū alterius ossis processus in articulorum motibus excipientiū, ij cartilagine uix incrustētur: quemadmodū alij plerique ossium sinus, articulandis ossibus non parati, sed solum in hoc incili ut ligamenta aut muscoli in ipsis ualidius aptiori q̃ sede inserantur, & interdū quoque aliqua ex ijsdem initium commo- dius ducāt. Cuiusmodi sinus in interno latere magni externiq̃ processus femoris obseruatur, & in talo & calce, in^e medio duorum articulorū, quibus hæc ossa inuicem coarctantur. At hæc omnia, (quemadmodū & sinus, quibus tendines uehuntur, atque ne sua aberrant sede cōtinentur, ^h quales in externa radij sede iuxta brachiale occurrunt) in priuatis ossium descriptionibus magis erunt obuia: & si aliud quodpiam nomen, quo in ossium descriptione utendum erit, hīc prætermiserim, id sequentibus Capitibus recensēbo. Vereor enim ne ista, utcunque utilis sit, ante ossis cuiusque enarrationem prolixitas, ab Anatomes studio aliquem properandi cupidum deterreat, isq̃ non mediocri dispendio aliud perquirat compendium. Quamuis non minus Galeni librorum occasione, quàm quæ subsequetur ossium descriptionis gratia, in hunc modum nomina prælibare operæ precium fuit.

DE OSSIVM INTER SE STRV-

tura & contextu. Caput IIII.



SSA humani corporis instar unius continuiq̃ ossis, lapideæ cuiusdam statuae modo, effingi nequierunt. Nam & si ita quidem hominis fabrica iniurijs minus foret obnoxia, & ipsius ossa firmiorem sedem adipiscerentur, neque luxari, neq̃ excidere ac distorqueri possent: tamen quia homo motu (qui animali maximè, si quid aliud, proprius censetur) neutiquam destitui debuit: & quum motus citra ossium diuisiones commissurasq̃ haud perficiatur, hominem è multis ossibus fabrefieri magnoperè cōdu-

xit. Quinetiam ossa inuicem componuntur non solum motus gratia, sed etiam alicuius corporis transitus occasione, aut securitatis, seu noxijs ferendis pertinaciæ causa, aut partium diuersitatis nomine. Propter motum quidem digitorum ossa inuicem committuntur, deinde ulna & radius cum humero, & humerus cum scapula, & femur cum tibia, præter eiusmodi innumeros ossium connexus. Transpirationis uerò seu transitus alicuius corporis gratia, futuras capitis efformari, tunc dicam, quando has fuliginosa cerebri recrementa transmittere, & duræ cerebri membranæ fibris uiam præbere docebo, ex quibus membrana caluariam succingēs conflatur. Pariter quoque & in capitis suturarū sermone (ne longius exempla petantur) caluariam non uno osse, sed pluribus efformari audies, ne fortè hæc quapiam ex parte læsa, latè rumpatur, uitiumq̃ ueluti in fictilem ollam longius quàm ad ossis circumscriptionem pertingat, sed ut ipsum unà cum osse ad futuram terminetur. Ad hæc, propter partium differentiam, uerticis ossa utcunque mollia duris temporum ossibus committi, in eorum ossium commissurarū sermone intelliges. Omnia igitur ossa inter se cōtigua sunt, & neque os ullum (nisi fortassis quod ab ^v imagine *ὁδὸς* nuncupatur, & si quod in cordis basi consistit) seorsim per se habetur, sed aut pars continui est, aut aliud os cōtingit, ac alteri adnectitur: adeò ut sagax rerum parens Na-

ἵπνες.
ὀφρυνες.
ἄμβονες.
χείλη.
Supercilia.
Labra.

Βαθυμύδης.

Libro de Fracturis.

Sinus articulationis nomine non parati.

Homine pluribus ossibus constare, motus gratia.

Transitus expirationis gratia.

Gratia difficultatis patiendi.

Partium differentia gratia.

tura

Li. 2. de Parti-
tib. animal. Ca-
pite 9. & lib. 3.
de Hist. ani.
Cap. 7.

tura, ossibus tanquam uno continuo & tanquam pluribus ad cōmemoratos usus hominem
uti uoluerit. Quòd uerò^a cartilago & interdum^b ligamenti portio inter ossa quæ inuicem com-
mittuntur interuenit, uilius pendendum arbitror, quàm ut eius gratia cum Aristotele minus
aptè possimus dicere, ossa inter se esse contigua: quamuis interim is ossa uenarum modo con-
tinua esse attestetur: præterea etiam asserens, hæc ex dorli spina non secus quàm uenas à corde
principium ducere. Hanc porrò^c integram ossium mutuò coherentiū seriem Græci σκελετον,
quali assicatum esset cadauer, nuncuparūt. Cæterum ut uariis compositionis usus est, ita quo-
que multiplex eiusdem est ratio: quam modò obiter in tabellam primū reiiciam, latius singu-
las commissurarum differentias dein explicaturus.


a 8 fi. 31
ca.
b fi. ca. 14
R, R.

Tres fig. ad
huius li. cal-
cē posite.

TYPVS COMMISSVRARVM

OSSA IUNGENTIVM.

Humani corporis ossa inuicem committuntur
structuris, quæ



Alicuius partis ope, aut

Ligamenti, ut uni-
uersi ossiū nexus qui
motu pollent uolunta-
rio. Atq; hæc com-
missuræ ratio synar-
throsis uocatur.
συνάρθρωσις.

Carnis, ut omnes ossi-
um commissuræ quas
musculi circundant.
Præterea dentes in
suis alueolis quasi car-
nis beneficio innecti
uidentur. Hanc syn-
sarcosin uocamus.

Cartilaginis, cuius
interuentu pubis ossa
inuicem neclūtur, &
in minoribus natu hu-
miliora pectoris ossa.
Insuper appendices
in prima adhuc ætate
cartilagine glutinis
modo mediante, suis
ossib. connascuntur.
Dicitur autem iste
connexus synchon-
drosis.

Nullius partis beneficio.
Ita enim in natu grandi-
oribus appendices ipso-
rum ossibus coalitas cer-
nimus. Deinde omnes su-
turæ, quemadmodum &
harmonia absq; corporis
alicuius auxilio hærent.

Huiusmodi itaque commissurarum differentijs ossa inuicem committuntur. Ac primum quidem uoluntarij motus gratia eorum naturalis fit compositio, quæ à Græcis ἀρθρωσις & ἀρθρον, nobis articulatio articulusq; nuncupatur. Verum motus huiusce in omnibus articulis non eadem est ratio, quandoquidem alij motus euidentes sunt, neque quenquam latent, nemo enim non caput super collum moueri sentit, femurq; ad coxendicis os, & extremam manum ad cubitum, ac præter innumeros articulos, ipsos quoque digitos. Hæc articulationis species euidentem motum ostendens, διαρθρωσις dicitur, quasi laxa esset dearticulatio: quemadmodum & Hippocrates eam ἀπάρθρωσις, quasi abarticulationem uocauit. Aliorum uero articulorum neque ualidus neq; manifestus, sed obscurus adeoq; difficilis latensq; motus sentitur, ut is neuiquam à singulis promptè dijudicari queat. Cuius enim postbrachialis ossiū ad brachialis ossa coarticulationis motus non est obuius: si tamen in planam superficiem primum digitos extenderis, ac indicem dein minimumq; digitum medio & annulari instar x aut decussatim subiceris, digitorumq; radicibus ueluti semicirculū statuere coneris, postbrachialis ossa nō prorsus immobilia apparebunt. Atque idem quoque in brachialis ossium inter se commissuris, & calcis cum talo, taliq; cum osse cymbam exprimente, ac rursus huius cum tribus tarso ossibus, & calcis cum tarso osse cubum referente, tarsoq; ossium cum pedij ossibus usuuenit. Harum namq; commissurarum ne obscurissimū quidem motum, nisi mente sedulo adhibita, animaduertes. Vocata est autem hæc articulationis species συνάρθρωσις, quasi coarticulationē dixeris, solius motus quantitate à dearticulatione discrimen recipiens. Cæterum utranque articulationis speciem Natura non simplici compositionis genere nexuit, quemadmodum etiam neque omnibus articulis par motus attribuitur. Alij enim flectuntur & extenduntur, atque in hoc illudq; latus adducuntur, & abducuntur, ac demum in gyrum quoque circumuertuntur. Femur enim & brachium hos motus ostendunt, quippe brachium pectori adducis, & retrorsum ad dorsum agis, dein sursum ad caput moues, deorsumq; ad ilia fers: ac demum circumagis quoq; quum pollice in mensam fixo, reliquis digitis circulū quàm potes maximè moliris. Ita & femur antrosum retrorsumq; & introrsum ad aliud femur, & extrorsum ab alio ducis, & circumuertis pariter, quum calce in terram firmato digitos huc atque illuc in latera agis. Hoc enim pacto circumuersionis motum subaudire conuenit, non autem quum brachium modò antrosum, modò sursum, modò retrorsum, modò deorsum, succedentibus motibus ueluti in circulū moues. quod in usibus musculorum explicandis diffusius persequemur. Alij articuli duntaxat flectuntur & extenduntur, atq; in latera mouentur, omnis motus circūuersionis expertes, ut prima digitorum internodia, & ipsum brachiale quæ cubito iungitur. Alij uero flectuntur & extenduntur, simulq; circumuertuntur, nullum interim in latera motum sibi uendicantes. Vt radius simul cum ulna ad humerum flectitur & extenditur, ac etiam ad humerum circumuertitur, seu in pronum supinumq; agitur. Alij solum flectuntur & extenduntur, ut ulna ad humerum, & tibia ad femur, & secunda & tertia quatuor digitorum internodia, & tertium pollicis. Alij duntaxat circūuertuntur, ut prima ceruicis uertebra supra secundam, uelut ad axem cum uniuerso capite circūuoluitur: & radius supra ulnam non nisi in pronum supinumq; circumuersionis motu ducitur. Quoniam igitur omnes articuli non simili pollent motu, nequaquam mirum uideri debet, diuersa quoque compositionis specie eosdem compingi. Ac species hæc seu forma est tripartita, à uetustissimis Græcorum qui filios dissectionis rationem docebant, triplici uoce donata, ἐναρθρωσις uidelicet, ἀρθρωσις & γιγλῶσις, quanquam fortassis hæc nomina à Diocle, & illis qui primum resecandi rationem commentarijs tradidere, postmodum fuerint confusa. ἑναρθρωσις itaque articulationis speciem notabat, in qua excipientis ossis cauum sinus ue altus, & acetabuli modo exculptus est. Caput autem quod illi inarticulatur extuberans, adde & sinum in hac articulationis differentia similiter ac caput esse simplicem, unicum scilicet sinum & unum caput, a perinde ac in femoris articulatione cum coxendicis osse, & in humeri cum scapula, & postbrachialis pedijq; ossium cum primis digitorum ossibus fieri conspiciamus. Commemorati modò articuli manifestis pluribusq; motibus donantur. Femur namque & brachium, cuius os humerum dicimus, flectuntur, extenduntur, ad latera ducuntur & circumuertuntur. Prima autem digitorum ossa non circūuertuntur, quod cum musculorum ratione & ossium quæ sesamo comparantur, tum etiam articuli constructionis gratia accidere audies. Huiusmodi etiam articulatione brachiale radio iungitur, quod flectitur & extenditur, & in latera agitur. Radius quoq; humero συνάρθρωσις committitur, quare etiā pluribus motibus donatur. flectitur enim & extenditur simul cum ulna, & deinde circumuertitur, adeò ut Naturam γνάθρωσις in simplicibus articulis, qui continua & non intercepta cartilaginis incrustatione, ut sic dicam, perficiuntur, confinxisse cōstet, quoties ipsi pluribus motibus idem os moueri uisum fuit, in illis motibus quàm

ἀρθρον.
Articulus.
Euidentes mo-
tus.

Διαρθρωσις.
Lib. de Arti-
cul. ossis iuga-
lis docens lu-
xationem.

Motus obscu-
ri.

συνάρθρωσις
Coarticula-
tio.
Articulos om-
nes nō iisdē ar-
gi motibus.

Tres articu-
lorum formæ.

γνάθρωσις.

a Immissū
hic finge A
1, 2 fig. 30.
cap. in c, g,
f, 1 & 2 ji.
29 Capitis.
b C, D 1 ji.
27 Capitis.

Quādo in sim-
plici articulo.
Natura enar-
throsin mol-
atur.

B simpli


simplicissimo minimeq̃ gemino utens ossium connexu.^a Tali uerò caput ossi cymbam referen-
 ti hac articulationis specie iungitur, ut etiam quædam brachialis^b ossa inuicem articulari suo lo-
 co docebimus, non minus quàm secundæ, tertiæ, quartæ & quintæ costarum cartilaginee hac
 articulationis specie pectoris ossi coarctantur. In præsentia enim abunde est, committurarum
 differentias naturasq̃ enarrare, & in illis scopum Cōditoris recensere, quibusdam tantum ad-
 ditis exemplis, qualia hæc posteriora in obscuris motibus censeriqueunt. Omnes enim articu-
 los semper enumerare, & si promptissimum mihi quidem esset, illi tamen Anatomes tyronem
 nondum explicatis ossibus remorarentur, ac negocij difficultate à pulcherrima Dei operum
 inquisitione absterrent. *Ἀρθροδία* itaq̃ articuli species est, quæ cauum sinumq̃ leuiter & su-
 perficietenus exsculptum, & caput ossis depressum adipiscitur, & ueluti planarum superficie-
 rum connexu fit. & quemadmodum in enarthrosi quis sinus caputq̃ sit indicare leuis est ne-
 gotij, ita è diuerso in arthrodia utraque adeò obscura sunt, ut ignores cui nam ossi sinus aut ca-
 pitis nomen opportunè debeas adscribere, perinde ac si duas superficies planas inuicem incum-
 bere fingeres. Hac specie committuntur^c tria interiora tarsi ossa cymbam referenti ossi, & pe-
 dij ossa tarsi ossibus, nonnullaq̃ brachialis ossa postbrachialis ossibus, dein quartum brachialis
 os quod rectum uocabitur, tertio brachialis ossi: & clauicula summo humero. Atq̃ in his com-
 mitturis adeò obscuri sunt motus, ut perquam arduè sentiri possint. Quasi Natura hanc articu-
 lationis speciem in simplici articulo tentaret, ubi uix tantillum os moueri statuit. Nullibi enim
 simplicem eandemq̃ ueram arthrodiam reperias, ubi manifestus sit motus: quemadmodū for-
 tē duplicem obseruabis manifesto motu præditam, sed illo ferè unico & simplici. Prima nan-
 que ceruicis uertebra nullo motu alio, quàm liquido circumactū super secundam moueri pro-
 babitur, & duobus interim locis prima hominis uertebra secundæ per arthrodiam iungitur,
 utrinque scilicet ad secundæ uertebrae dentis latera, & dens ipse quodammodo arthrodia pri-
 mæ uertebrae committitur. Quamquam in his uertebRARUM nexibus sinus capitaq̃ adhuc ma-
 nifestiora sint, quàm in simplicibus, quas antea enumerauimus, arthrodij. Ad hæc, eiusmodi
 quoque arthrodiam obseruabis in reliquis etiā ceruicis uertebRIS, & thoracis quoq̃ omnibus,
 ad eam usq̃ quam ab incumbēte ipsi uertebra & ab ipsi subiecta suscipi exponā. Nam earū uer-
 tebrarum connexus, qui ad radicem spinæ seu posterioris uertebRARUM processus consistunt,
 ita committuntur, ut subingredientes unius uertebrae partes leuissimè protuberent, & partes
 aliam uertebRā admittētes, superficietenus tantum sinuentur. Quamuis in his uertebRIS præ-
 ter flexionem & extensionem, etiam aliquis in latera motus obseruetur. Atque ita si eiusmodi
 duplicem uertebRARUM ad se inuicem articulationem arthrodiam esse dixerimus, hanc non ex-
 actè simplicis motus gratia perpetuò fieri etiam fatebimur. *Γίγγλυμος*, quæ tertia articuli spe-
 cies censetur, manifestis sinibus capitibusq̃ perficitur, sed nequaquam simplicibus. Fit enim
 ginglymos, quoties mutuo ingressu ossa inuicem iunguntur: ita ut unius gibba, alterius ossis
 caua subintrent; & rursus unius ossis sinus alterius gibba admittant, perinde ac si digitos mu-
 tuis ingressibus committas, aut ostiorum cardinibus hanc articuli speciem
 conferas, in quibus ferrum parieti infixum illud quod ostio cōmittitur ex-
 cipiat, ipsiq̃ etiam ostij ferro parietis ferrum subintret. Ab hac enim imagi-
 ne præsens articulationis species nomen inuenit.^h Hæc in genu occurrit.
 tibiæ enim os duobus donatur sinibus, in quorum medio tuberculū pro-
 minet: femoris autem inferior pars duo exigit capita, tibiæ ossis sinus ingre-
 dientia. dein in capitum medio sinus uisitur, tibiæ ossis tuber suscipiens.ⁱ Eadem ratio in secun-
 dis & tertijs quatuor manus ac pedis digitorum articulis seruat, & in tertio manus pollicis
 internodio, & in secundo pollicis pedis. Superius enim horum articulorum os duo obtinet ca-
 pita, in quorum medio sinus cōsistit: inferius uerò, ac (ut sic dicam) ungui uicini os, duobus
 donatur sinibus, tubere quodam diremptis. Ad hæc, humeri cum ulna articulus ginglymo ele-
 gantissimè perficitur. Vlnæ enim sinus humeri tubercula excipit, & rursus ulnæ tubera hume-
 ri sinus mirificè subeunt. Atque in dictis iam ossibus ginglymos in uno cōtinuoq̃ sit articulo,
 qui solam extensionem & flexionem nanciscitur, nullo interim alio motu præditus, non aliter
 quàm si hac articuli forma rerum Opifex utendum duxisset, quoties articulum duntaxat flecti
 extendiq̃, aut alio simplici tantum motu agi oportuit. Huc quoque (quantum coniectura
 assequi ualeo) ueteres Græci reposuerunt ossa inuicem distinctis remotisq̃ articulationibus
 commissa, quæ simplici motui præficiuntur. idq̃ tunc potissimum, dum illæ articulationes
 inter se in susceptione uariant.^k Radius nanque ulnæ duplici articulo committitur, & eius be-
 neficio tantum simplici motu, qui in supinum prouumq̃ fit, pollet. Iuxta humerum enim ulna
 in sinum sibi exsculptum radij admittit capitulū, & iuxta brachiale radij sinus ulnæ capitulum
 excipit.

Ἀρθροδία.

Quando Na-
tura arthro-
diam constitue-
rit.

Γίγγλυμος.

Hic A ferrū
seu cardinem
notat, parieti
infixum: B au-
tē, ferrū quod
ostio seu fene-
stræ neclitur.



Quando Na-
tura gingly-
mon formatur.

Quibus modis
duplices arti-
culi formantur.

a Iunge O 3
fi. 33 Ca. in
41 figura.
b 2 fi. ca.
25 numerus
7 m.

c Iunge 5
fi. 13 ca.
33. cum n.
m. 110 fi.
d fi. ca. 3.
qq ad pp.

e Iunge 4
fi. 15 ca. Y
cum c fi. 5.
Dein 4 fi.
a, b, cum d.
e, f, quintæ.
Postea L. 4
fi. cū g 5 fi.

f Iunge 8.
7 fi. cap. 15.
cum d 9 fi.

g Iunge X
et Y fig. 3
ca. 16, cum
a et b 2 fig.
aut cum c fi-
gura 3.

h Cōfer G, F
et I, 7 fi. 31
ca. cum E,
F et I 1 fig.
30 capit.

i In 2 fig.
27 cap. iun-
ge G, H, I ad
L, K, M.

kk 1 fi. 24.
ca. Aut com-
mittem 3 fi-
gura in 15
fi. et p 5 fi.
in o 7 fig.

excipit. Idem in calcis & tali cōnexu (ut & ginglymos obscurum motū edentes aliquot recen-
 seam) obseruatur.^a In posteriori enim sede talus calcis tuber assumit, in anteriori uerò calcis
 sinui caput tali inarticulatur, adeò ut meritissimò & hīc quoque mutuis ingressibus ossa articu-
 lari dicantur. Pariter huc quoque ueteres retulisse uidentur duplices articulationes, etiamsi mu-
 tuo eodemq; uario non fierent ingressu, sed simili utrinque modo, ut capitis ad primam uerte-
 bram connexus censerī posset.^b Duobus enim inuicem distantibus primæ uertebræ sinibus,
 duo occipiti ossis capita ueluti enarthrosi articulantur, neque quicquam dextri lateris articu-
 latio à sinistri, specie forma ue discrepat. Sic quoque & aliæ uertebræ inter se coarctantur.
 Nam inferior seu subiecta superiori seu superpositæ duplici articulo cōmittitur, illis nimirum
 articulis^c qui ad spinæ seu posterioris uertebrarum processus radicem haberi dicentur. Non
 enim de uertebrarum nexu,^d quem suis corporibus moliuntur, in præsentī loquor: quum is,
 quantum ad propositum spectat, uariis sit. quemadmodū etiam uertebræ supra duodecimam
 thoracis consistentes, quod ad articuli formam attinet, posterioribus articulis arthrodia mu-
 tuò iunguntur: quæ uero duodecimæ subiacent, quodammodo^e enarthrosi. Verum si huius-
 modi uertebrarum nexus, quia duplices (unus utrinque nimirum ad latus) sint, sub ginglymo
 complecteremur, etiam aliquot huius generis articulationes non simplici tantum motu dona-
 tas fateremur, quum uertebræ præter extensionem & flexionem, in latera quoque non nihil
 agantur. At non arbitror ueteres illos Anatomicorum præcipuos, uertebras ideo ginglymo
 articulari dixisse, quòd prima ceruicis & duodecima plerunque thoracis uertebrarum dunta-
 xat exceptis, semper una uertebra superiori parte suscipiatur ab alia, & inferiori parte inferio-
 rem suscipiat: aut contrà, superiori parte aliam suscipiat, inferiori autem suscipiatur. Quamuis
 id Galenus satis innuat, hac ratione ginglymon fieri autumans: & fortè non animaduertens, si
 uerum assereret, tunc oportere^f tria ossa ad articulationem concurrere, primum scilicet os uer-
 tebram, quæ superiori sua sede exciperetur: & secundum uertebram, quæ superiorem hanc se-
 dem exciperet: & tertium uertebram, quæ à mediæ seu primæ uertebræ inferiori sede suscipe-
 retur. Vt enim una suscipiat, eademq; suscipiatur, præter illam, & suscipientem & susceptam
 quoque concurrere necessum esset. Atque hac etiam ratione ad plurima ossa ginglymos refe-
 rendus esset, ad ea nimirum quæ ima sui parte aliud os subirent, & superiore aliud admitteret:
 aut ex aduerso, in superiori sede aliud ingrederentur, inferiori autem aliud exciperent, nullo ar-
 ticationis formæ habito respectu. Et huius generis censerentur^g prima digitorum ossa, quæ
 superiori sede per enarthrosin postbrachialis ossibus iunguntur, & ima parte subsequētis os-
 sis digiti sinus subeunt. Verum de digitorum uertebrarumq; connexibus suo loco cumulatim
 pertractaturus, nunc commissuras nullum prorsus motum ostendentes exequar, si prius ad-
 monuero, nullum hæcenus dictorum ossium contextum fieri, nisi sinibus & capitibus seu su-
 perficiebus læui lubricaq; cartilagine incrustatis, si modò^h uertebrarum corporum ad inuicem,
 & sacri ossis cum duobus ipsi coarctatis ossibus connexum secluseris, in quo cartilagineum li-
 gamentum priuatim interuenire posterius audies. Quæ uerò iam narrabuntur commissuræ
 omni prorsus motu destitutæ, læui lubricoq; contactu neutiquam fiunt. Atque harum pri-
 ma γόμφωσις dicitur. estq; cum instar clauī os ossi infigitur: quæ dentes ad unum omnes maxil-
 larum præsepiolis tanquam clauī adeò impinguntur, ut ne tantillum quidem moueantur.
 Cæterum ueteres interdum instar clauī connexum, etiam ad articulum, sed alia ratione contu-
 lerunt, quum ossa inuicem alterius ossis beneficio tanquam clauī cuiusdā interuentu coarctari
 dicerent, quemadmodum Aristoteles innuit, quum duo ossa caua in medio clauum habere scri-
 bit,^k tibiam & calcis os sinus obtinere, & talum suis tuberibus eos sinus clauī ritu ita subire arbi-
 tratus, ac si duo asseres eodem spiculo committerentur. Verum trigesimo tertio Capite tali na-
 tura tradetur, cuius connexus ad tibiam & calcem ginglymo, & in hominibus & in quadrupe-
 dibus articulatur. Homines enim talo non destituuntur, quamuis is à solipedū ac bisulcorū ta-
 lo forma (non autem situ) discrepet. Nam tibiæ omnibus subicitur, & calci, aut quod calcis ui-
 cem gerit ossi articulatur. Femoris enim os tam in auibus quàm in equis & porcis, & reliquis
 quadrupedibus, Aristotelem, & in tertio de Vsu partiū Galenum lussit, quòd in illis æque ac in
 hominibus femur uisu obuīum non sit: ut modò in suum locum asseruem, quæ in libro de Cō-
 muni animalium gressu Aristoteles, ob ignoratum ipsi in quadrupedibus & auibus femoris
 os, & brachij os, parum rectè posteris tradidit. Sutura, quam ῥαφὴ Græci appellant, compo-
 sitio quædam est, ad consutarum rerum similitudinem. Hanc nonnulli quū explicare student,
 ferratam compagem structuramq; alij in unguem commissuram esse definiunt. Sed illi nobis
 in memoriam reuocant, mutuum ferrarum contrario occursum ingressum, quo dentatæ alterius
 ferræ partes in alterius sinus subeunt. Hi uerò quæ in unguem committi dicuntur, quū gibbæ

Libro de Ossi-
 bus, & 3 libro
 Cōmentario-
 rii in Hippo-
 lib. de Ar-
 ticulis.

γόμφωσις.

Capit. 9 libri
 2 de Partibus
 animalium.

ῥαφὴ,
 Sutura.

videlicet partes ad unguium figuram structæ, in sinus quibus concinnè excipi possunt, inse-

Serrata com
pago.

Instar ungui-
um commissu-
ra.

Asserum ne-
rus.

Limborū u-
ria insuicio.
ἀγυονία.



runtur, qua connexus serie arcarum seu lecticarum asseres subinde inuicem compingi cernimus. Cæterum posteriores, futuræ formam accuratius quàm priores explicant. Quemadmodum omnium proximè eam assimilant, qui suturas ad limborum futuræ effigiem conferunt, quando, ut de unguibus diximus, panni unius flosculi in alterius sinus mutuis ingressibus consuuntur. Eiusmodi^a futuris ossa capitis magna ex parte compinguntur: & inter reli-
quas semper futuræ speciem elegantissimè ea ostendit,^b quam Δ literæ in occi-
pitiocomparamus. Porro ἀγυονία ossium structura est per simplicem line-
am, citra omnem tuberis, sinus & asperitatis mutuū ingressum commissā. Ad hunc^c modum quædam maxillæ superioris ossa, & præsertim nasi inter
se iungi putantur. Cæterum quia harmoniæ cōnexus uix unquam ad amuf-

sim instar simplicis lineæ perficitur, sed nonnullæ asperitates mutuò ingredienti-
perpetuò fe-
rè cum ossa rumpuntur, in harmonia occurrunt, ueteres futurarum uoce etiam harmonias plu-
rimum complexi uidentur. Σύμφυσις est naturalis ossium unio, qua commissuræ forma ap-
pendices suis ossibus connascuntur,^d in ætate quidem minoribus, quum ossa adhuc mollia fun-
gosaq̃ existunt, cartilaginis interuentu: in grandioribus uerò, ubi iam ossa induruerunt, appendi-
ces citra alicuius corporis interuentū ossibus adeò uniuntur, ut coalitus lineam uix cōscere
queas. Hac quoque unione ossa sacri ossis lateribus commissā inuicem^e in pube coalescunt.
Dein admodum pueris utriusque lateris os tribus formari ossibus apparet: quæ tribus lineis in
coxendicis ossis acetabulum concurrentibus interstinguuntur: ut etiam in agnis uidere est, in
quibus cartilago lineas has sicut in pueris intercedit. in paulo autem prouectioribus tres illæ
partes adeò connascuntur, ut ne linearum quidem species se offerat. At de his ossibus, ipsis di-
cando Capite pertractabitur: quemadmodum & de uertebribus, quæ in pueris quoque pluribus
constant partibus. quemadmodum & occipitis os, & alia corporis pleraque: quæ alioquin
unius ossis nomine ideo habentur, quòd coalitus imago planè in ætate prouectioribus lateat.
Libri Introductorij, seu Medici, qui Galeno ascribitur, author, ossium disciplinam instituens,
non eiusmodi unionem, quam nos iam descripsimus, σύμφυσις uocat, uerum futuras ad har-
moniam quodammodo accedentes. Maxillæ enim superioris ossium commissuras, συμφύσεις,

Quorum bene-
ficio ossa inui-
cem cōmittan-
tur.

Ligamen-
torum.
συνδύσσις.

Libro 2. de
Partibus ani-
malium, ca. 9.
Carnis.

συνστέγνω-
σις.

Cartilaginis.

συνχόνδρω-
σις.

Quæ nullius
corporis inter-
uentu commit-
tantur.

Quæ potissi-
mum a Gale-
ni placitis hoc
Cap. declinat.

(at non rectè interim) appellat. Omnes ossium constructuræ species, aut alicuius aut nul-
lius corporis beneficio committuntur.^f Vniuersi nanque articuli ligamentis inuicem alligan-
tur, quæ orbiculatim ossa inuestiunt. interdum uerò & hæc in ossium medio consistunt, ut in
femoris cum coxendicis ossis articulo, & in uertebRARUM corporū nexu. Hic ossium connexus
ligamentorum auxilio commissus, Græcis συνδύσσις nuncupatur: nerui interim uoce ad li-
gamenta propriè dicta, & ad tendines, neruosq̃ qui à cerebro dorsaliq̃ medulla prodeunt, de-
ducta. Hæc nanque omnia ueteres, ut & uulgi hodie, nerui nomine subaudierunt: & præci-
puè Aristoteles cum aliis semper, tum maximè quum ossium contextum recenset. Nonnulla
uerò carnis etiam ope committuntur,^g ut generatim omnes articuli musculis obducti. Musculi
enim quum ab uno ossis aut alio corpore principium ducentes alteri inferantur, uinculorum
etiam loco iure habentur, ossaq̃ inuicem neunt. Cæterum quia musculi ueteribus plerisque,
& potissimum Aristoteli carnis nomine appellantur, connexus qui musculis fit, συνστέγνωσις
meritò nuncupatur. Porro & dentes quoque in suis alueolis carne quapiam firmari uidentur,
adeò ut ea quasi ratione ossium cōstructio reperiretur, in qua caro non duntaxat musculorum
modò connexum exterius ambiret, sed & interueniret quoque. Insuper alia cartilaginis medio
connascuntur, quippe^h appendices in prima ætate cartilaginis medio suis ossibus committun-
tur, quemadmodum & pubis ossa, & ossis v imitantis ossicula. Hæc connexus species à car-
tilagine συνχόνδρωσις uocatur. Suturae autem & harmoniæ nullius corporis beneficio quàm os-
sium structuræ cōeunt. Nam & si duræ cerebrum inuestientes membranæ fibræ aliquot futu-
ras transeant, non tamen ob id eas cōnectunt: quemadmodum neque cartilagine in articulis
ossa oblinentes, ad ossium firmitatem & connexum quicquam auxiliantur. Præterea in senio-
ribus appendices non amplius cartilaginis, quæ glutinis uicem subeat, interuentu ossibus con-
nascuntur, sed cartilagine prorsus deperdita adeò committuntur, ut, quemadmodum iam an-
tea quoque dixi, coalitus regionem obseruare arduum sit. Institutum modò erat huic Capiti
finem imponere, atque ad singulares ossium descriptiones sermonē dirigere, nisi magnopere
Galenī authoritas me remoraretur: quæ meritò prohibet, adeò leuiter ea quæ in præsentī Ca-
pite ab ipsius placitis deflectūt, prætergredi. Vt enim ex multis præter prius etiam commemo-
rata, aliquid proponam, primum in libro de Ossibus, ubi is ex professo, & sui non mediocri in

a 1 fi. 6 ca.

b A, B, C,

D 3 fi. 6 ca.

b B inter-

tia integra

rum.

c 1 fi. ca. 13

d Z ad f.

fi. ca. 40 li.

secundi 1, 2.

4, 5.

1 figura in-

tegrarū.

fi. ca. 1. li. 2.

Passim in

musculorū

tabul. ut se-

pima tab.

Q, X.

h fi. ca. 40

lib. 2. chara-

cteres 1, 2.

4, 5.

i 1 fi. inte-

grarum.

k fi. 1, 2

ca. 13 G.

primo de Administrandis sectionibus libro commendatione, ossium struſuras enumerat, ipsius dogmati non accessi, quo futuram, harmoniam & gomphosim synarthrosis species esse docet. Ego enim synarthrosi obscurum, & non manifestum ascripsi motum: ipsidemq; articulationis differentijs ac formis illam atque diarthrosin fieri commemoravi: deinde futuræ, harmoniæ & gomphosi non obscurum aut difficilem, sed nullum prorsus motum dedi, & has connexus species nequaquam articuli nomine cum Galeno sum complexus. quod profectò neque ab ipso faciundum fuerat, nisi brachialis, & postbrachialis, & tarſi, & pedij, & costarū cum pectoris osse cartilaginum cōstructionem suis locis narrans, hæc per synarthrosin cōmitti falso asserere uoluisset. Quum enim inibi uerè hæc ossa synarthrosi coarctari diceret, non ne animaduertendū ipsi fuerat, hæc neque futura neq; harmonia neque gomphosi connecti? Quod sanè fieret, si modò synarthrosis species harmoniam, futuram & gomphosim rectè statuisset. Verum per me cuius integrum erit, de synarthrosi ex suo arbitratu constituere: si interim non ignoret, hanc longè secus in omnibus ferè Galeni libris accipi, quàm initio libri de Ossibus. Nam uel in XIII, XIX, XXI, XXIII, Capitibus eiusdem libri, aliter quàm initio, Galenus sentit. Deinde Introductorij seu Mediciauthor, Galeni decreto non acquiescens, & sibi priuatim ossium connexus diuidens, inquit: Ea aut ad motum componi, uocariq; eam compositionis seriem *αρθρον*, seu articulū: aut ad nullum motum, ac tunc *συνωσθησιν* appellari: cuius species futuram, gomphosim & symphyſin enumerat. Verum hac ratione brachialis, postbrachialis, tarſi & pedij ossium cōpositioni synarthrosis accommodari nequaquam possit, quum neque futura, neq; gomphosi, multoq; minus symphyſi inuicem connectantur. Insuper magis à Galeni dogmate recessi, quum omnes ossium cōmissuras aut alicuius corporis beneficio, aut nullius committi propositum fuit: quandoquidem Galenus id soli symphyſi, in libris de Ossibus tribuerit, atq; synneurosin, synsarcolin, & synchondrosin, symphyſeos tantū species enumerauerit. Quod autē illum non sim secutus, primam occasionem mihi ipsius præstitit oratio, qua fungosa molliaq; inter se nullis medijs per symphyſin cōnasci, sicciora uerò densioraq; nonnullis intermedijs coalescere docuit. Cōperio enim in mollibus adhuc & teneris ossibus, appendices cartilaginis interuētū suis ossibus uniri: in duris uerò & assiccatis, & in senibus, nihil prorsus symphyſin intercedere. Deinde nulla prorsus mihi se exhibet symphyſis, seu unio, quam ligamenti interuentu uerè unitam liceret asserere: adeò ut synneurosis sub symphyſi comprehendī nequeat: dummodo nulla unio ligamenti ope perficitur, uti sanè articuli ad unum omnes ligamenti beneficio coeunt, nunc (ut & antea dixi) orbiculatim obducti, nunc etiam in mutuo ossium contactu interueniētis. Præterea ad amulsim mihi singula perpendiculari, multo adhuc minus symphyſis sese obtulit, quam carnis interuentu committi quis rectè assereret. In nullo enim ossium connexu caro intercedit, nisi fortassis in dentium cum maxillis connexu, qui gomphosis, non autem symphyſis censetur: quantumuis etiā dentes nullū ostendant motum, non magis scilicet quàm harmonia, aut futura. At carnis interim, hoc est musculorum auxilio, omnes ferè cōmittuntur articuli: quem cōnexum *συνωσθησιν* à ueteribus appellatum fuisse diximus, quam symphyſis speciem nemo dicere possit. Ad hæc (ut huic Capiti finis aliquādo tandem imponatur) Aristotelis quoq; locus secundi libri de Partibus animalium, ut promptius à Galeno dissentire admonuit: ubi Aristoteles ossa neruis, carne & cartilagini cōmitti affirmat, eum connexū uniuerſim ad omnes ossium cōmissuras doctissimè referens. Quamuis etiā hanc Aristotelis sententiā Galenus haud oscitanter præterijt, quando eorū quæ in libro de Ossibus docuit oblitus, ad finem secūdi de Administrandis sectionibus libri, ossiū cōstructiones perfunctoriè, licet sanè elegāter, percurrit, & quodāmodo Aristotelis uerba recenset.

Capite
nonc.

CAPITIS STRUCTURAE RATIO, quotq; eiusdem figuræ. Caput V.


QVINQUE SEQUENTIVM FIGVRARVM INDEX.

PRIMA quinti Capitis effigie naturalis capitis, seu caluariæ figura instar oblongæ sphaeræ utrinq; leuiter depressæ efformata, & antèrius postèriusq; extuberās, delineatur. Secūda effigies, primā non naturalē capitis figurā demonstrat, in qua anterior eminētia perijt. Tertia effigies secūda capitis figurā nō naturalē ostēdit, in qua anterior eminētia depditur. Quarta effigie tertia nō naturalis capitis figura indicatur, in qua utrunq; tuber, antèrius nimirum & postèrius, intercidit. Quinta effigie, quartā non naturalem capitis figuram expressimus, in qua ambæ eminētiae ad latera, non autē antrorsum retrorsumq; spectant.

PRIMA FIGV-
RA V. CAPITIS.

SECUNDA.

TERTIA.



QVARTA.

QVINTA.

Caput oculo-
rum gratia for-
matum.
Li. 7 de Vsu
partium.



Quia Natura
oculos muniue-
rit.

Cerebrum ocu-
lorum gratia in
capite locari.
et deinde cerebri
nomine reli-
quos sensus.

HUMANVM caput oculorum gratia efformari, cancrorum, scarabeo-
rum, & quorundam quæ capite destituuntur animalium oculos manife-
sto commonstrare, Galenus docuit. His siquidem oculi super processus
prælongos locantur, neque imi, quemadmodum os, nasus, & aures in
pectore ipsis conduntur. Oculos enim alta eguisse sede, attestantur ho-
stium incurfus latronumque speculatores, qui muros, montes & altas tur-
res eodem usu ascendunt, quo nautæ nauium antemnas, terram ocyus,
quàm qui subsunt in naui, conspecturi. Commemoratis igitur animalibus testacea & dura
cute obtectis, integrum fuit oculos in oblongis processibus tuto reponi, quòd illi duriores
erant futuri, & tunica extrorsum obduci poterant, quæ ab illorum animalium cute prognata,
simul durissima & testacea esset. Homini uerò propter corporis substantiam, & mollem te-
nuemque qua oculi inuestiuntur membranam, totos oculos necessario molles habituro, hi præ-
longis processibus citra periculum apponi nequierunt. Quando itaque in imo hominis ocu-
los locare non erat eorum functioni commodum, nudis uero ceruicibus eos adnectere haud-
quaquam decebat: & quum Natura nec oculorum usum prohiberi, neque eorundem securita-
tem uitiari uellet, partem extruxit altam, & eleganter oculos ab iniurijs uindicantem. Superius
enim palpebras, cilia, & frontis os collocauit: inferius uerò præter palpebras, maxillæ etiam & ge-
næ oculos tutantur. Internis autem partibus nasus muri instar oculis interiectus est, exterius
deinde ualidissimum os externum oculorum sedis angulum occupat, adè ut excelsis & extu-
berantibus undique partibus oculi sepiantur, utiliterque ueluti in sinuosa ualle latitent. Cæte-
rùm horum quæ oculos muniunt coaceruatio & congeries, caput minimè est: quamuis etiam
illa sine capite consistere nequeant. Quæ igitur fuit necessitas, hîc quoque alias componi par-
tes, quarum fabrica capitis nomen meretur: Singula sensus organa, uisus nimirum, odoratus,
gustus, & auditus, neruo indigent molli: neruo quidem, quòd ille sit sensus instrumentum:
molli autem, quoniam affici & disponi quodammodo oportet: quin & aliquid etiam organa
ab

ab incidenti extrorsum sensibili pati, ut sensus fieret, magnoperè conducit. Quando itaque oculi mollibus cerebri neruis indigebant, ac mollia omnia si ulterius procederent promptè diuulsa frangerentur, offenderèturq̃, cerebrū iure non procul ab oculis reponi debuit. His ita se habentibus, quod à principio de capitis structuræ ratione inquirebatur, iam inuenimus. Colligitur enim, cerebrum in capite locari oculorum causa, odoratus autem & auditus gustusq̃ organa propter cerebrum. Quanquam & hæc organa alioquin altissimam sedem opportunè fortiantur. Aures enim quum sonum percipere debeant, qui naturà in sublime fertur, rectè in altis corporum partibus locatæ sunt. Item nares, eo quòd omnis odor ad superiora ducitur, meritò sursum sunt: & quòd magnum cibi & potionis iudicium ad nares quoque pertinet, non sine causa uiciniam oris illæ sequuntur. Iam gustatus, qui sentire eorum quibus uescimur genera debet, commodè habitat in ea oris parte, qua esculentis & poculentis Natura iter patefecit. Tactus autem toto corpore æqualiter fusus est, ut omnes ictus, omnesq̃ nimios & frigoris & caloris appulsus sentire possimus. Cæterum caluaria (ut modò temporales præteream musculos, & capitis super colli uertebras connexum, & rotundam figuram iniurijs pertinaciter repellendis omnium aptissimam) ^a cerebri, cuius debet esse receptaculum & propugnaculum, figuram non iniuria mutuatur, nimirum sphæræ utrinque leuiter in anteriora depressæ. Quum enim cerebro cerebellum posteriori in parte subiiciatur, & dorsalis medulla illac è capite procidat, priori uerò cerebri sede processus ad oculos & ad odoratus organorum sedes pullulent, non ineptè cerebrum prælongam sphæram refert. Atque ob hanc etiam causam caluaria, ^b quæ secundum naturam se habet, ad oblongæ sphæræ imaginem potissimum extruitur, priorem posterioremq̃ partem obtinens prominentiorem, ac magis processuram. Omnes autem reliquæ ab hac euariantes figuræ, non naturales censentur: quemadmodum ea in ^c qua anterior eminentia à syncipite frontis ue elatiori sede producta perit, posterior autem quæ occipitis est reueruatur. Item ^d quæ huic planè contraria uisitur, ac posteriorem, occipiti nimirum, eminentiam manente anteriore perdidit. Deinde ^e tertia, naturali adhuc magis opponitur, in qua ambæ capitis eminentiæ, prior scilicet quæ in fronte, & posterior quæ in occipite consistunt, abolentur, & caput ad amulsim rotundum ac instar exactæ sphæræ obseruatur. Ista figura Thersites ab Homero fuisse traditur, hanc enim ab ipso *φῶφῶν* appellari, nonnulli asserunt: quanquam plerisque omnes acuminatas capitis figuras eo nomine, & *δῦκεφάλλον*, nuncupare libuerit. ^f Quarta species non naturalis figuræ ab Hippocrate quoque enumeratur, in qua caput in latera ad utranque aurem insignius, quàm in anteriori posterioriq̃ sede prominet. Ac hæc naturali capitis figuræ omni ex parte dissimilis est, haud secus quàm si ad alteram aurem in naturali figura faciem, ad alteram uerò posteriorem ceruicis sedem fingeres. Verum Galenus alibi hanc excogitari quidem, non autem in rerum natura consistere posse affirmat: quamuis interim Venetijs puer multis partibus deformis, & admodum amens hac figura hodie conspicitur. Imò apud Bononienses mendicus obambulat, cui caput quadratum, sed latius paulò quàm longius contigit. Præterea Genuæ puellus à mendica ostiatim circumfertur, & in nobilissima Belgarum Brabantia ab histrionibus fuit propositus, cuius caput citra omne mendacium duobus uirorum capitibus grandius est, & in utrunque latus extuberat. Cæteras autem non naturales capitis effigies, etiam in egregie prudentibus interdum conspiciamus. licet tales caluariæ nobis in cemiterijs nimis quàm rarò se offerant: uti profectò subinde occurrerent, si Alpium, quæ Stiriam spectant, accolarum cemiteria scrutaremur: quum illos homines non modò dictis capitis figuris, sed longè etiam magis differentibus, pluribusq̃ deformes esse, non semel mihi retulerit Naturæ operum studiosissimus, ac in primis generosus iuuenis, CHRISTOPHORVS PFLVG SALISPVRGENSIS, multiplici linguarum peritia, uariæq̃ cum aliarum artium, tum uerò potissimum Iuris Ciuilis cognitione ornatus: qui nuper sui longè præstantissimi animi egregium specimen edidit, quando Louaniensis Gymnasij studiosorum præfectus, tam alacriter ac repentè Louanium grandi obsidione secundò liberauit.

Naturalis capitis figura.


Prima nō naturalis capitis figura.
Secunda.
Tertia.

Quarta.

Lib. 9, de V. su partium. Variæ capitis figuræ.


Christophorus Pfluegel.

ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS
DE OCTO CAPITIS OSSIBVS,
& suturis hæc committentibus. Caput VI.



PRIMA SEXTI CAPITIS

FIGVRA, QVÆ DVAS VERTI-
cis ossium portiones inuicem nonnihil seiunctas
commonstrat, ut commodius artificiosissima sutu-
ra fabrica oculis subijceretur.



SECUNDA FIGVRA.

HAEC OSTENDIT CALVARIÆ
portionem à reliquo capite serra diuisam, ut ossis
appareret cōstructio duabus densis solidisq; squa-
mis seu laminis *ei* notatis efformata, in qua-
rum medio fistulosa seu fungosa ossis consistit sub-

stantia *α* indicata. Cæterum huiusmodi squamæ uulgò capitis tabulæ uocantur. ac superior
quidem exteriorue squama *ei* notata, prima appellatur tabula. interior uerò, quæ duræ cere-
brum inuestienti membranæ est proxima, & *oi* insignitur, secundæ tabulæ loco habetur, &
quidam hanc diploë quoque uocant. Neque desunt interim qui fungosam fistulosamq; ossis sub-
stantiam *α* indicatam, unius etiam tabulæ uice recensent, hanc mediam seu secundam appellan-
tes, hacq; ratione tres caluariæ tabulas constituentes, quæ crassitie duritiæq; in omnibus homi-
nibus neutiquam pares cernuntur.

TERTIA SEXTI CAPITIS


FIGVRA.



TERTIA figura integrā caluariam capitis naturalis figuræ (quæ oblongam sphæ-
ram utrinque leuiter in anteriora compressam refert) absque inferiori maxilla in sinistro latere
depictam exhibet, suturas in externa capitis sede spectandas pulchrè proponens.

QVÆ

QVARTA SEX-
TI CAPITIS
FIGVRA.



HÆC figura caluariâ sinistro lateri magis incumbente exprimit, ut & basis caluariæ in conspectu nonnihil ueniret. Aliquot suturarum causa, ab hac figura os iugale serra ademinus. Cuiusmodi uero illæ sint, ex subsequenti characterum indice, ac ex huius & succedentium aliquot Caputum contextu, promptè intelliges. Præsens namq; figura maxillæ superioris ossibus cognoscendis, quibusdamq; ossium foraminibus ostendendis, etiam pulchrè subseruit.

CHARACTERVM TERTIÆ ET QVARTÆ
FIGVRARVM INDEX.

PRÆSENS characterum index tertiae ac quartae figurae communis erit, quod scilicet eidem ferè characteres in utraq; collocentur. et si casu quis aut tertiae, aut quartae figurae duntaxat peculiaris occurreret, illi pro figurae ratione, aut hanc notam 3, aut istam 4, in indicis contextu subijciam.

A, B Coronalis anteriorue sutura earum quæ transversim ducuntur. Cæterum *B* & *A* in tertia medium notant coronalis suturæ, in sinistro latere consistens, dextrum autem ipsius latus, quarta figura exprimitur.

C, D Posterior sutura transversarum, quæ Λ Græcorum maiusculæ literæ assimilatur. In tertia huius suturæ sinistra pars conspicitur, in quarta uero dextra. Porro tertia figurarum integræ ossium compagem experimentium, huius suturæ totam sedem ad *B* commonstrat, quæ ueræ suturæ persimilis est. Quippe de ipsius additamentis per capituli basin perreptantibus, atque in quinta & sexta iam subsequentibus figuris, delineandis, alia est ratio.

E 3 Sutura à medio suturæ Λ referentis ad medium coronalis, seu à *D* ad *B* deducta.

F Squamosa cōglutinatio, ac in tertia quidē figura uidetur sinistra, in quarta autē dextra. Dein

G. in ambabus à *C* ad *G* intervallum conglutinationis notatur, à sutura Λ simili ad ueram conglutinationem squamæformem pertingens, quod non mutuo incumbentiū squamarum, sed ueræ su-

H. turæ constructionem ostendit. Quod uero à *G* ad *H* per *F* porrigitur, squamæformis est conglutinatio, uerticis ossi & temporis ossi communis. Ab *H* autem ad *A* indicatur glutinatio squamæformis, ossi uerticis & frontis ossi communis.

I 3 Sinistrum uerticis os.

K Dextrum uerticis os.

L Frontis os, quod unicum est.

M Occipitis os, similiter unum.

N Sinistri temporis os in tertia, dextri autem in quarta ostenditur.

O Os cuneo à dissectionis professoribus assimilatum, quod succinctiori nomine sæpius cuneiforme

P. (uoces duntaxat sectantiū uenia) appellamus. Hoc unicū est, & cōiugis expers. Verū *P* priuatim notat huius ossis processum, quos uespertilionum alis cōparabimus. Hi utrinq; duo sunt, in

2, 3, 4, quarta figura conspicui & præter *P*, etiā numeris his 2, 3, 4, & 5 notati, quos quinta huius capituli figura accuratius proponet.

- QQQ Hoc os maxillæ superioris ossium primum erit, hic aliquot Q insignitum, ne forte sedem Q quod d uicinius est notatā, aliud os à præsentī esse arbitrareris. Linea inter duo Q consistens, ac * insignita, processum eius ossis delineat, qui cavitatē in tempore exculptā ualdē auget.
- R R R Lenis in frōtis osse & uerticis asperitas, à qua semicirculi ritu tēporalis musculus pronascitur.
- SS Quartū maxillæ supioris os: in tertia sinistrū, in quarta dextrū notatur. T incuria elapsū est.
- V, X 3 Caluariæ sedes, quam os iugale appellamus, ac sequenti Capite describemus. V hic notat processum temporis ossis, N indicati, ad iugalis ossis constitutionēeductum. X uerò, processum primi maxillæ superioris ossis, Q insigniti. Z autem sutura indicatur, dictos nuper processus V, X 4. nec tens, quibus iugale os efformatur. Porro V & X in quarta figura notant sedes, à quibus processus illos serra reseruimus.
- a a Sutura cuneiforme os circumscribentis interuallum illi ossi ac temporis ossi commune.
- b Sutura cuneiforme os circumscribentis interuallum ipsi & frontis ossi commune.
- c 4 Pars hæc cuneiformis ossis interdum peculiare uidetur ossiculum, squamæ modo tenue, & linea
- Φ 4. à cuneiformi osse diremptum, quam q̄ indicauimus. Verū hæc non ita crebrò se offert.
- c Sutura os cuneiforme circumscribentis interuallum, ipsi & maximo superioris maxillæ ossi paulo antè S insignito commune.
- ff 4 In quarta figura f conspicis, præsentī Capiti nihil seruiens: notatur enim sutura ossi Q indicati, & ossi S notati communis, quam cum reliquis maxillæ superioris suturis persequar. Hic enim obiter eius memini, quod huius uidendi gratia in quarta figura os iugale executerim.
- g g Sutura, frontis os à cuneiformi & maxilla superiori dirimens.
- h 4 Sinus, cui capitulum inferioris maxillæ inarticulatur.
- i Temporis ossis processus, scriptorij stili modo prominens.
- k Mammillaris processus, è temporis osse productus. Quarta figura utriusq; processum k notat.
- ll 4 Capita occipitij ossis, quæ primæ ceruicis uertebrae sinibus articulantur. In horum medio foramen occurrit, dorsalis medullæ causa cælatur. Verū ut præsentī Capite ossiū foramina enarrare non instituimus, sic neque eadem hic characteribus insignienda duximus. Quamuis priuatim in quarta figura Φ ponatur, ad quod à duodecimo Capite foraminibus dicando remittēris.

QVINTA SEXTI CAPITIS FIGVRA.

BASIM CAPITIS ABSQVE INFERIORI MAXILLA

AD ANVSIM REPRESENTANS.



INDEX

QVINTAE figurae multos characteres tertiae & quartae figuris communes, in hunc modum adhibuimus.

A Coronalis suturae extremum, in temporis cauo conspicuum.

CC Sutura Λ exprimens: atque hi characteres inferiorem partem huius suturae crurum notant, ubi haec non amplius suturae effigiem accurate comonstrat. Sagittalis sutura hic se nusquam offert.

F Squamaeformis conglutinatio non omni ex parte hic uisitur. quare etiam alios characteres tertiae & quartae figurarum, ipsi non accommodauimus. Quanquam hic K idem, quod in tertia & quarta indicabat, notare possit.

K Verticis sinistrum os, uerum modica ipsius conspicitur portio.

L Frontis os, cuius etiam modica pars hic oculis subijcitur.

MM Occipitij maximam ossis partem hic cernere licet, totam nimirum quae in caluariae basi consistit.

NN Vtrinque unum temporis os notatur.

OO Cuneiforme os.

PP Processus cuneiformis ossis uespertilionum alarum imagini respondentes. Qui numero quatuor sunt, his characteribus 2, 3, 4, 5 notati.

Q Γ Primum maxillae superioris os, quod & Γ hic notauimus.

S Λ Maximum quartum uel maxillae superioris os, & hoc quoque peculiariter aliquot Λ indicatur.

VX Os iugale.

Y Sutura ossis iugalis.

aa Suturae os cuneiforme, circumscribens interuallum ipsi & temporum ossi commune.

b Suturae os cuneiforme, circumscribens interuallum illi ac frontis ossi commune.

d Hac sede occultatur suturae os cuneiforme, circumscribens interuallum commune ipsi & ossi externum angulum sedis oculorum constituenti, ac Q insigniti.

e Suturae os cuneiforme, circumscribens interuallum ipsi & quarto maxillae superioris ossi commune.

f Hac sutura superiori maxillae peculiaris censetur, ac proinde hic non uenit explicanda.

g Sutura frontis ossi & superiori maxillae communis.

h Sinus, cui capitulum inferioris maxillae inarticulatur.

i Processus scriptorio stylo non dissimilis.

k Mammillaris processus.

ll Capita occipitij ossis, quae primae ceruicis uertebrae coarctantur.

m m m His characteribus, qui quinta, ut & subsequentes, proprii sunt, notatur suturae Λ imitantis additamenta, per caluariae basin antrorsum deducta, atque ad se inuicem, nempe ad n, tendentia.

nn Linea dicta nunc additamenta iungens, ac ossi cuneiformi & occipitis ossi communis.

op Sutura a linea n indicata, in dextrum latus repens, inter os cuneiforme & sinistri temporis os. Verum ab n ad o non proprie sutura est, quemadmodum neque ab anteriori m ad n, sed rima & ossis ab osse notabilis distantia, secus nimirum quam in alijs futuris harmonijsue occurrit.

qq Suturae os cuneiforme, circumscribens interuallum ipsi & sextis superioris maxillae ossibus


II notatis commune. Verum ut cuneiforme os suturis circumscribas, hanc quintam figuram & tertiam cum quarta intueri, singularum animaduertens characteres. Ab n igitur ad o, hinc ad p, a, H, b, d, e & q, procede, atque ita utrinque cuneiforme os suturis terminatum fingito, sed non nisi hominis caluaria inspectioni adhibita, ut quae in omnem partem prompte uerti poterit. quum interim hic tres simul tabulae inspicendae sint, ut uel in externa caluariae sede id os circumscribas. quod quod leuius praestes, suturam Λ similem cum suis additamentis, & linea occipitis ossi et cuneiformi communi, sutura denique cuneiforme os circumscribente hic delineauimus, iisdem characteribus in hac atque in tertia, quarta & quinta undique adiectis.


r In hac figura, ut et in quarta temporis ossis linea notatur, inibi suturae modo os, cui auditorij meatus initium insculpitur, continens, & ueluti a osse (ut sic dicam) seiungens.

s Ossis temporis asperitas & processus, quo id transversam respicit lineam, cuneiformi ossi & occipitis ossi communem, & n notatam.

z Octauum capitis ossis processus, seu septum amplitudinem narium intercedens.


Reliqui characteres ostendendis superioris maxillae ossibus priuatim conferunt.





P R A E S E N S figura interna calvariae basis sedes oculis subijcitur. Hic namque calvariā delineauimus, in qua superior ipsius pars subsequenti figura exprimenda, ad eum modum ablata est, quo cerebri fabricam ostensuri caput serra diuidere consueuimus.

SEPTIMA SEXTI CAPITIS
FIGURA.



SEPTIMA figura reliquam internae sedis calvariae partem monstrat, figura sexta non expressam.

DVAE proximè præcedentes figurae pluribus ornantur characteribus. uerum huc potissimum seruiunt maiusculi Graecorum, capitis ossium suturas indicantes: quæ in interna caluariae sede, qua cerebrum continetur, etiam se spectandas offerunt. Reliqui autem characteres in his figuris conspici, caluariae foraminibus ostendendis conducent.

ΓΓ In septima figura coronalis notatur, non adeo exactam suturae compagem, atque in caluariae externa sede, exprimens.

ΔΔ Sutura Λ literam referens, notatur in septima. Verum & in sexta Δ etiam uisitur, dictam nuper suturam notans.

ΘΘ In septima, sagittalis sutura indicatur. Sequentes modò notæ ad sextam duntaxat referuntur.

ΛΛ Squamosa sinistri temporis conglutinatio.


ΞΞ Additamentum sinistri lateris suturae Λ imitantis, quod per caluariae basin contendit.

Π Linea cuneiformi ossi & occipitis ossi communis, quæ duo suturae Λ imitantis latera additamentâ ue iungit.

ΣΣ Sutura cuneiforme os, circumscribens interuallum commune ipsi & frontis ossi, & octauo capitis ossi, in octaua figura *A, B* indicando. Si itaque à Π ad Σ , & hinc ad aliud Σ , hinc uerò ad primum Ψ , ac inde ad secundum Ψ perrexeris, cuneiforme os in sinistro latere internaq; caluariae sede circumscripseris. Vnde si eosdem characteres in dextro latere ad suas suturas poni sinxeris, eodem modo ut in sinistro latere, per characteres pergens, uniuersum cuneiforme os hoc loco descriptum fueris complexus.

OCTAVA SEXTI CAPITIS FIGURA.

QVAMVIS modò tabularum frequentia lectori minime molestus esse uelim, eoq; potissimum nomine singula capitis ossa adhuc priuatis figuris nò exprimam: tamen quia ossis cuneo comparati, & dein octauo capitis ossis, quod cribri instar foraminibus peruium est, circumscriptio, non ita promptè ac cæterorum capitis ossium intelligitur, præsentī figura cuneiforme os cum octauo capitis osse, à cæteris omnibus liberum, ea facie exprimitur, qua internam caluariae superficiem cerebri sedem respicit. quod ideo maxime præstitimus, ut cauernæ in cuneiformi osse plerunq; occurrentes in cōspectu essent. Indicetur itaq; *A, B, A* octauū capitis os. Verum *B* priuatim insinuatur septum, sedes interstinguens, quæ cerebri processibus parantur, qui neruorum modo à cerebro educti, olfactus organorum loco habentur.



A, B, A formi osse plerunq; occurrentes in cōspectu essent. Indicetur itaq; *A, B, A* octauū capitis os. Verum *B* priuatim insinuatur septum, sedes interstinguens, quæ cerebri processibus parantur, qui neruorum modo à cerebro educti, olfactus organorum loco habentur.

C D Duæ præcipuæ cuneiformis ossis cauernæ.

E Septum indicatas modò cauernas interdiuidens.

F Alterius cauernæ seu antri foramen, in narium amplitudinem pertinens.

G Cautas in humiliori sede septi posita, quod duo potissima antra intersepit. Reliqua foramina in hac figura passim obuia, cum cæteris caluariae foraminib. duodecimo Capite enarrabuntur.

H Cuneiformis ossis processus uespertilionum alis similes, & hic aliqua ex parte conspici. Cæterum iam tempestiuū est Capitis contextum aggredi, hæc q; omnia seriatim persequi, atq; Conditoris nostri industriam in condenda caluaria expendere. Licebit enim opinor, solis uocibus addictorum uenia, uniuersam struem tertia, quarta, quinta, sexta & septima figuris expressam, caluariae nomine complecti, ut cunq; alij solam partem crinibus ornata ita appellari uelint. Atq; ita c moles nobis in caput & maxillâ superiorē, doctrinæ studio, diuiditur.

Quale domici-
lium Natura
cerebro para-
rit.



Caluaria cur
non solido osse
constet.

Suturarum u-
sus.

Naturalis fi-
gura capitis
futurae.

Coronalis fu-
tura.

Λ literam refe-
rens.

Sagittalis, &
uarius ipsius
ductus.

Virorum capi-
ta à mulierum
non perpetuo
uariare.

7 Capit. lib. 3.
Histor. ani-
malium, & 2.
de Partib. ani-
malium.

Lib. 2. cap. 7.
de Hist. ani-
malium.

EREBRVM rationis sedem (quæ instar reginæ in altissimo corporis sita, duabus cōcupiscibilibus animis dominatur ac præest) tuto quodam munimento custodiri magnoperè expedit. Quocirca etiam prouidus rerum Opifex, non soli cuti carnosissq̃ partibus ut in abdomine, aut per interualla à se inuicem remotis ossibus ut in thorace, cerebri commisit custodiam, sed undique os ipsi instar galeæ circumposuit. Verum quum caput tectum quoddam domus calidæ referat, fumida uaporosaq̃ subiectarum partium recrementa, quæcunque sursum conscendunt, excipiens, atque huius gratia copiosiore euacuatione caput ipsum egeat, galeam cerebro inductam non omni ex parte solidam, sed^a cauernosam, ^b futurisq̃ intertextam sagax rerum Parens efformauit, non quidem spongiæ modo tenuibus inæqualibusq̃ foraminibus, uelut quibusdam cauernulis, utrinque os perforans: at utraque parte^c cauernulas, ^d intus^e ac foris scilicet, in læuam & densam ossis squamam desinere uoluit, quòd illic occursum erant duræ cerebri membranæ, hîc autem membranæ quæ caluariam ambiens, *παρακρανίου* nuncupatur. Si enim tota caluariæ substantia seruaretur fistulosa, & cauernulæ nullo obducerentur cortice, ea substantia sua asperitate uicina raderet uulneretq̃. Dein si prorsus spongiosa fistulosaq̃ foret, nullo donaretur robore, ac pumicis ritu fragilis atque infirma esset. Verum uidebitur fortasse alicui, caluariæ os inter duas squamas frustra fistulosum & cauernosum esse: quum ipsius futuræ propter illarum copiam & magnitudinem ab aliquo ad transpirationem iuuari nihil indigeant. Si itaque huius iudicio uniuersa caluaria simul tenuis & densa solidaq̃ fuisset, nihilo sanè tutior hac ratione redderetur subiacentium organorum constructio. quandoquidem quæ ossa uulnerant, intrò promptè ob uia breuitatem penetrare possent. Si uerò caluaria sine omni cauernularum specie simul crassa densaq̃ crearetur, homini onus haud secus præberet, quàm si obligata capiti sarcina nunquam remitteretur. Reliquum igitur erat tertium, scilicet neque tenue neque densum, solidum uel, sed crassum, rarumq̃, ac cauernosum caluariæ os fabrefieri. Ita enim neque grauaturum erat, neq̃ uia in cerebrum breuis ipsum percutientibus futurum. Cæterum caluaria non ad excrementorum tantum transpirationem futuris indiguit, sed conducebat ex multis ossibus ipsam compingi, ut si quādo percussa rumpatur, ipsius rupturæ in totam caluariam ueluti per fictile uas, non procedāt, sed detineantur, & in illis sedibus cessent, in quibus ipsum quoque os futuris terminatum desinit. Quinetiam cerebri uentriculos, aliæq̃ nonnulla in cerebro corpora, ne cōcidant, distendi ac eleuari oportuit: id quod optimè futurarum perficitur beneficio. Duræ siquidem membranæ cerebrum conuestientis^f fibras, unā cum uasorum quorundam finibus futuras transeuntes, in membranam extrinsecus caluariam succingentem explicari, atque ita cerebrum cur minus in se collabatur sustinere, septimo libro ostendimus. Atque huius potissimum usus ratione, iustissima caluariæ futurarum cernitur distributio, nimirum ut sustinendæ in cerebro partes accuratè subleuentur. Quod enim oblongum cerebriq̃ modo rotundum est, non aptius quàm transuersis, & alijs secundum longitudinem ductis apprehensionibus attollitur. Naturalis nanque capitis figura primū tres futuras obtinet: duas quidem transuersas, quarum^g altera in syncipite est, in occipitio^h altera: ⁱ tertia à medio posterioris, seu eius quæ in occipitio consistit, per capitis longitudinem ad medium usque anterioris extenditur. Anteriorem coronalem uocant, quandoquidem coronæ potissimum in ea capitis parte collocantur: posteriorem à Græcæ literæ Λ imagine, *λαμβδωειδῆ* nominant: tertia per uerticem capitisq̃ longitudinem procedens, *δελταία* Græcis nuncupatur, quod uelut sagittæ uel instar rectæ in cedit. unde etiam à uirgæ ductu *ῥαβδωειδῆς* fuit appellata. Hæc interdum per^k frontis mediū ad nasi usque summum non adeò insigni atque in ipso uertice complexu, aut exquisita adeò futuræ compage proripit. Atque id nonnulli uiris omnibus, alij autem mulieribus peculiare esse falso contendunt: quum rarissimè in uiris, atque adhuc multò rarius, aut uix unquam in mulieribus id accidere, non obiter animaduuerimus. Et hoc uel inde conijcias, quòd ex uiginti quæ in cemiterijs occurrunt caluarijs, uix unam, cui frontis os diuidatur, reperiās: neque ulla, etsi secus tradiderit Aristoteles, in futurarum enarratione prorsus aberrans, uiris ac mulieribus hac in parte uidetur differentia. Cæterum quadrupedibus à posteriore futura Λ referenti, sagittalis futura ad superciliorū usq̃ mediū protenditur: ^l id quod canum caluariæ, equorū, boum, & id genus animalium manifestè attestatur. Non enim audientus est Aristoteles, qui canibus continuā, nullisq̃ futuris distinctam ascribit caluariā, quū commemoratas hætenus futuras, & quæ hoc toto Capite enumerabuntur ferè omnes, canum caluariæ eleganter exprimant. Non desunt etiam, qui infantibus hanc futuram per medium occipitij ossis ad^m foramen usq̃ dorsali medullæ uiam porrigens descendere, totumq̃ occipitij os diuidere

a b i et 2 fi
gura.
c, d, e, 2 fi.
au 9 01, et 6
fig. chara-
cter &.

1 fi. 7 libri
G, H, I, de
F.

g, 3, 4 fi. A,
B, in 7 r.
h 3, 4 fi. C,
D, in 6, 7
ΔΔ.
i 3 fi. à D
per E ad B.
in 7 00.
Tale quid
ostendunt
2, 4 fi. 5 ca.

Canina
caluariæ fi-
gura ca. 9.

6 fig. e.

diuidere afferāt: quod sanè & nos quoque obseruauimus. uerùm potius ea diuisio ad *σύνουσις* coalitumq̃, quàm ad futuræ speciem referenda est. quoniam hæc cartilaginis beneficio in pueris perficitur, in ætate autem prouectioribus nullum eius diuisionis rudimentum occurrit. Vnde etiam eiusmodi diuisionis ratio non hîc in futurarum sermone, sed in occipitijs ossis descriptione enarranda uenit. Quòd autem Herodotus, ac præter illum plerique etiam alij in Persia caluarias reperiri scribunt, nullis prorsus futuris interstinctas, ipseq̃ Aristoteles suo tempore uiri caluariam absque futuris repertam tradit, neuiquam miror: quum ualde senum caluariæ nobis futurarum situm duntaxat, idq̃ per quàm obscure etiã referant, nulla interim futuræ imagine conspicua. Neque profectò mirum est senibus futuras con crescere, siquidem illis uertebrae uniri cōnasci q̃ cernimus, & ossium quoque supercilia processusq̃ ita ex crescere ipsis animaduertimus, ut cōsuetis motibus illorum ossa agi nequeant. Nam & si nunquam senum ossa à iuuenum ossibus, & puerorum rursus à iuuenum uariare cognouissem, in postrema Bononiensi Anatome id sanè didicissem, ubi præter quamplurima ossa, iam nati pueruli ossa, & nonagenarij senis, & mediæ ætatis hominum ossa in scholis sedulo à medicinæ candidatis adferebantur, quum Galeni librum de Ossibus ante musculorū sectionem istic enarrarem. Quando enim permulti effractis monumentis, atque ex xenodochijs conquisitis corporibus ossa ad inspectionem sibi parabant, facile accidit ut alius in senis, alius in pueri, ac rursus alius in huius illiusq̃ ætatis hominum ossa inciderent, atque in scholas deportarent. Tunc itaque (ut ad se reuertatur oratio) in puerulorum ossibus omnia esse læuia, disiuncta, mollia, pleraque cartilaginea, & processus minimum prominere, & quamplurima quæ in adultis unius ossis loco habentur, in illis ex pluribus cōstrui expendimus: quæ in singulis ossibus fracturarum, luxationum, distorsionum, & plicationum gratia, sermoni addere haud grauabor. Quanti enim momenti sit hæc nouisse, abunde intelligunt, tum qui ueræ medicinæ studiosi Hippocratis libros euoluerunt: tum qui appēdices in pueris ab ossibus sæpius quàm articulos luxari, quotidiana experiētia didicere, ac ab ineunte ætate luxatos, aut aliter in ossibus affectos, aliquādo sectioni accōmodarunt. Cæterum iam tres futuras ut frequentius in naturali capitis figura obuiæ sunt recensuimus. quæ caluaria in latus cubante, literā H, aut potius *π* exprimunt. In capitum autem formis à naturali structura euariantibus, futuræ ad hunc modū se habent. ^a Vbi anterior capitis eminentia perit, futura coronalis aboletur, seruata ea quæ *Λ* exprimit, unā cum sagittali, quæ tunc ad mediū usq̃ superciliorum porrigitur. ^b At posteriori eminentia deficiente, futura *Λ* referens deperditur, manente coronali, & sagittali interim per occipitijs mediū ad caluariæ usq̃ basim ducta. Quapropter si hanc capitis figuram occipitio inniti sinxeris, utraq̃ remanentium futurarum effigies T literæ similis erit: quemadmodum & primæ quoque figuræ non naturalis, futuræ T referunt, quum illa fronti innititur. ^c Anteriori uerò posterioriq̃ eminentia simul cōcidentibus, binæ quæ tunc uidentur futuræ ad rectos angulos se inuicem intersecantes, X literam repræsentāt. Altera nanque transuersa ab unius auris regione ad alterius auris regionem per mediū caput deducitur. Altera autem à ^d foramine in occipitis osse dorsalis medullæ gratia inciso, per capitis longitudinem ad summum usque nasi pertingit, illius ritu quam sagittalem uulgo dicimus. Hæc siquidem semper in tribus prioribus capitis figuris à naturali differentibus seruatur. Reliquæ autem duæ cum totius capitis figura uariè intercidunt. ^e Quinta capitis figura, ut prorsus naturali est contraria, sic quoque omnino pugnantes cum ipsa futuras exigit. Transuersæ enim seu coronalis, & illa quæ *Λ* refert, secundum capitis procedunt longitudinem, recta interim seu sagittali transuersim lata. Verùm nunc & ad reliquas capitis commissuras sermonem dirigamus. Suntq̃ primum ^f duæ à sagittali futura quodāmodo æquæ distantes lineæ, per capitis longitudinem una utrinque supra aures porrectæ. His ^g principium ab humillima futuræ *Λ* imitantis sede pendet, qua hæc propter occipitijs inferiora uix amplius futuræ effigiem egregiè refert. Hinc nonnihil præsentis lineæ rectā quodammodo feruntur, & ^h mox sursum ascendentes, instar semicirculi quodammodo ad coronalis futuræ terminum perrepunt. Hæ maxima ex parte constant duobus ossibus mutuò sibi incumbentibus, connexisq̃: non per futuram quidem, sed paulatim ⁱ uerticis os descendens, instar squamæ attenuatur, atque in ^k os infra ab auribus ascendēs, similiterq̃ in squamam attenuatum subintrat: utrisq̃ ossibus quæ inuicem compinguntur, asperitatem quandam mutuam nanciscentibus. Vnde etiam neque Hippocrates, neque aliquis eorum qui accuratè corporis fabricam expendunt, futurarum nomine eas dignatus est, sed à squamæ similitudine dissectionū periti eas *λεπιδωδον* *πετοκονήματα*, hoc est squamosas cōglutinationes appellarunt. Non enim propter falsa quorundam dogmata arbitrandum est, has cōglutinationes minus quàm tres futuras prius enarratas, in caluariæ amplitudine qua cerebrum reponitur apparere, ob idq̃ futurarum nomine

Capita futuris destituta.

Senum, iuuenum, & puerorum ossa inuicem uariare.

Non naturalium capitis figurarum similitudo.

Squamosæ temporum commissuræ.

Suturas capitis etiam in interna caluaria sede conspici.

neutiquam donari.^a Harum enim effigies in caluariæ amplitudine perinde ac futurarum con- 6 fi. A, A.
spicitur, quæ non æquæ futuræ speciem in interna caluariæ superficie exprimunt: sed quia mi- 7 fi. r, r.
nus implicantur, idq; potissimum^b coronalis, magis ad lineæ harmoniæ ue figuram accedunt.
Præsentes squamosæ cōglutinationes non toto ipforum ductu instar mutuò incumbentium
squamarum committuntur.^c Quà enim primùm à futura^d imitante procedunt, notabili
interuallo foris & intus in caluariæ amplitudine speciem futuræ adipiscuntur. Præterea ha-
rum cōglutinationum portio,^e quæ coronali futuræ proxima existit, etiam uerticis ossi, &
Cur squamo-
sa cōglutina-
tiones reliqua-
rum futurarū
specie non cō-
pingantur.
ossi quod cuneo assimilabimus, communis censenda est. Quod uerò hæc commissuræ, quem-
admodum dictæ capitis futuræ omni ex parte serrata compage, aut in unguem connexu non
extruantur, hinc præcipuè fieri credimus, quod raram & fistulosam cauernosamq; oportebat
fieri totam caluariæ partem, quanta à uertice & ex lateribus crassæ cerebri membranæ cir-
cumponitur. reliquam autem solidam ac duram, idq; in primis temporum ossa, ob cavitatem
temporalis musculo exculptam tenuia, & sonorum fortè etiam gratia (quum in illis auditus
organum consistat) omnium corporis ossium facilè durissima. Hac itaque occasione ossium
fines in squamam attenuantur, uerticis quidem osse intus locato, ut propinquet ac occurrat lon-
giori spacio duræ membranæ: alio autem ab auribus ascendente, uelut aliquo propugnaculo
ipsi uerticis ossi facto. Ad hæc, uerticis ossa duris ac densis temporum ossibus non potuisse u-
niri, nobis persuademus, quoniā non ita promptè laxum cum duro ad unionem peruenit ami-
cam, ægreq; solubilem. Hactenus ergo quinque peculiare, nulliq; alteri ossi quàm capitis os-
sibus communes futuras explicauimus: coronalem scilicet, & quæ^f imaginem refert, & quæ
Quot futura
hactenus com-
memorata.
recta per capitis uerticem ducitur: duas item ab hac æquedistantes, quas squamosas cōglu-
tinationes uocauimus. Est &^g alia soli quoq; cōmunis capiti in caluariæ interna amplitudine,
Sutura occi-
pitis os
circumscri-
bens.
qua cerebrum continetur, potissimum apparens, ac frontis ossi^h illiq; ossi communis quod
olfactus organorum sedes constituit, ac instar cribri peruium cernitur. Id enim os ueluti fron-
tis ossis basi insertum, hac futura ipsum ambiente in capitis amplitudine obscure circumscribi-
tur, aliam quoque futuram obtinens, ipsi & superioris maxillæ ossibus communem. Præsens
enim os,^k osseum septum foramina narium interdiuidens producit, quod^l futura quadam se-
cundum humiliorem septi sedem, ipsiusq; longitudinem ducta à maximis superioris maxillæ
ossibus quæ dentes cōtinent, dirimitur: perinde ac ab osse cuneum referente^m inibi etiam sepa-
ratur, quā narium foramina in fauces pertinent. Cuiusmodi autē hoc cribri modo perforatum
sit os, postquam alias futuras capiti alijsq; ossibus communes expressero, in ceterorum capitis
ossium enarratione persequar. Sunt enim & aliæ futuræ capiti cum alijs ossibus cōmunes, ni-
mirum cum superiori maxilla, &ⁿ eo osse quod à cunei similitudine *σφλωδὲς* uocant, quod si-
Sutura capi-
tis ossib. & a-
lijs cōmunes.
militer unicū, ac, ut nonnulla corporis ossa, coniugis expers est: ab aliquibus inter capitis ossa,
ab alijs inter maxillæ superioris ossa (quum inter utraque medium sit) cōnumeratum. Quam-
uis capitis ossibus longè rectius, quàm superioris maxillæ ascribetur, quum haud minimam
caluariæ amplitudinis, qua cerebrum reponitur, sedem cōstituatur, cum cæteris ossibus quæ ab
omnibus Anatomicis capiti attribuuntur. Sed cuius nam id formæ, & quantæ magnitudinis
sit, quibusq; circūscribatur futuris, recensere nunc conabimur. Sutura^o imitantis^p extrema,
Sutura imi-
tantis addita-
menta.
quæ propter occipitij humiliora non amplius exactā futuræ compagem exprimit, t, uersus ca-
pitis inferiora basim ue protenduntur, ac per mediā basis sedem (quæ prærupta rup. & imagi-
ne & duritia similis est) & quā caput primæ ceruicis uertebrae articulatur, in anteriora prore-
punt, mutuò sensim appropinquantia. Quum autem extrema hæc iuxta narium foramina oris
amplitudinē spectantia pertigerint,^q transuersa linea simul iunguntur, quæ nec futura neque
Cuneiformis
ossis circūscri-
ptio.
harmonia meritò dici potest: sed ad symphysim coalitum ue prorsus est referenda. In pueris
enim cartilagine in eum modum oppletur, quo in illis appendicem cum suis ossibus unio com-
mitti uisitur. in natu uerò grandioribus præsens linea omnino latet, perinde ac unio appendi-
cum in ætate prouectis occultatur. Vtunque sit, hæc linea & occipitis ossi, & ossi cuneum
imitanti communis est.^r Ab hac utrinque in latera, futura per temporum caua obliquis anfra-
ctibus sursum ducitur, uersus^s anteriorem squamosarum cōglutinationum sedem. Vbi uerò
futura hæc^t anteriorem illam cōglutinationum sedem attingit (quod notabili interuallo à co-
ronalis in cauis temporum extremo est) in priora modicè deorsum ad coronalis extrema du-
citur.^u Hinc rursus parumper deorsum repit, quousque superioris maxillæ contingat os, quod
externum oculi sedis angulū constituere docebitur. Hinc decliuus per caua quoq; temporum
incedit: inde ad posteriorem intimorum dentium sedem ducta,^v per totam narium amplitudi-
nem transuersim fertur. Hæc futura à transuersa linea, quam futuræ^w referentis extrema com-
mittere diximus, in hunc modum sursum ad caua temporum utrinque ducta, & deorsum ad
pala-

6 fi. A, A.

7 fi. r, r.

c 3, 4 figu-
ra à C ad

G.

d 3, 4 fi. ab

H ad A.

e 3, 4 fig.

O.

4 musculo
rum tabu-
la, r.

g 6 fig. ad

characte-

res n, L, r.

h 8 figura

A, B, A.

i 13 fi. 7 lib.

L, deim D.

k 35 fi. de

in O. fi. 9

capitis.

l 1 fi. 9 ca-

pitis g.

m 2 fi. 12 ca-

pitis secun-

dū w, u, v, f.

n 3, 4, 5, fi.

O, P, & to-

ta ferè 8 fi.

o 5 fi. C, C.

deim utrin-

que m, m.

Sed potissi-

mum fi. indi-

ci characte-

rum inserta

huc facit.

p 5 fi. n n. 6

fi n.

q in 5 fi. ab

n per o &

p in dextro

latere: in si-

nist. per a et

a ad A. in 3,

4 fi. per a, a

uersus H.

r 3, 4 fig. ab

H ad A.

s 3, 4 fig.

ab A ad b.

t 3, 4, 5 fi. à

b per d

ad c.

u 5 fi. q. q.

tum usque ab utroque latere, eo quo scriptum est modo, rursus descendens, cuneiforme os exterius circumscribit. Interius uero in capitis amplitudine os quoque cuneiforme eadem futura terminatur, inibi quoque etiam huius ossis circumscriptio leuiori negotio, quam externa sede deprehenditur, si modo quis accurate dictae iam futurae progressum expendit: nam haec passim ac pluribus locis sedibusque sese offert. Linea enim primum ossi occipitis & cuneiformi communis, pariter & exteriorius, & interiorius apparet: quemadmodum & futurae etiam interuallum, à linea oblique sursum ad caua temporum usque ad anteriorem conglutinationum squamiformium sedem pertinens, etiam interiorius & exteriorius cernitur, & commune est ossibus temporum & cuneiformi, ac demum uerae futurae speciem ostendit. Quod autem ab hac sede antrorsum ad coronalis extrema ducitur, squamosam refert conglutinationem, uerticis ossi & cuneiformi commune. Interuallum uero à futurae coronalis extremis ad ossa externos oculorum sedium angulos constituentia procedens, etiam squamosae conglutinationis formam commōstrat, estque frontis ossi & cuneiformi commune. Praesentis futurae interuallum ductus uel conglutinationi squamosae respondens, exteriorius tanto elatius, quam in interiori caluariæ superficie, apparet, quanto interuallo cuneiforme os instar squamæ attenuatum, frontis & uerticis ossibus committitur. Atque idem etiam in temporum ossium cum uerticis connexu accidit. Squamosae enim eorum ossium conglutinationes, multò elatius in exteriori capitis superficie, quam in interiori, ubi cerebrum consistit, ascendere uidetur. Cæterum futurae cuneiforme os circūscribentis interuallum, quod per caua temporum deorsum fertur, in interna caluariæ sede non conspicitur, sed tantum in cauis temporum & oculorum sedibus, in externis scilicet earum sedium angulis. Atque hoc futurae interuallum commune est cuneiformi ossi, & ossibus externos oculorum sedium angulos occupantibus. Interuallum autem eius quam modò prosequimur futurae, iuxta posteriorem intimi dentis sedem prorepens, exteriorius apparet, & in narium etiam amplitudine: estque commune cuneiformi ossi, & superioris maxillae utrorumque laterum maximis ossibus. Interuallum uero eius futurae in superiori narium amplitudinis sede conspicuum, in interna caluariæ sede melius quam in externa, spectanti occurrit: & commune est ipsi ossi cuneiformi, & illi ossi quod cribri modo perforatum dicitur. Porro interna caluariæ sede, non solum praesentis futurae interuallum illi ossi & cuneiformi commune obuium est, uerum etiam utrinque ad id interuallum aliud eiusdem futurae interuallum sese offert, quod cuneiformi & frontis ossi commune censetur. atque id etiam in oculi sedis radice liquido cernitur, iuxta eminentiorem illius regionem. Adeo, ut si ad amussim oculorum sedes (quae λέγχοι Græcis dicuntur) expendis, radicem ipsarum, & magnam externi earum lateris ad interiora portionem, à cuneiformi osse constitui spectabis, si modò in hominis fabrica huiusmodi etiam duxeris intenda, atque illis caperis, quae & si ad artis usum non magnopere conducunt, immensi tamen Creatoris admirabilem arguunt industriam, & proculdubio à ueteribus Anatomes professoribus sedulo ac studiose examinata fuerunt. Porro hoc futurae interuallum, quod & cuneiformi & frontis ossi commune dicebam, magna pars alterius futurae est duarum, quas capiti cum alijs ossibus Galenus communes esse retulit: tunc scilicet, quum unius loco illam enumerat, quae cuneiforme os inibi circumscribit, quae id occipitis ossi, & temporum ac uerticis ossibus contiguum esse narrauimus: alteram uero, postquam cuneiforme os circūscribentem futuram, sua oratione absoluit, à cauis temporum per mediam oculorum sedem ad nasi summum, seu superciliorum medium pertingere ait. quemadmodum etiam pertingit, illic incipiens ubi cuneiforme os circūscribens futura, per caua temporum deorsum uersus intimum dentem primum descendit. Atque haec futura primo ipsius interuallo, frontis os à superioris maxillae osse externum oculi sedis angulum constituyente seiungit: dein magno interuallo cuneiformi ossi & frontis ossi communis efficitur, toto nimirum ductu, quo cuneiforme os frontis ossi in oculorum sedibus & caluariæ interna superficie contiguum esse uisitur. Vnde etiā id interuallum in futurae cuneiforme os circūscribentis dimensione, non autem in frontis ossis à cæteris maxillae ossibus separatione, habendum uenit. Vti sanè subsequens futurae transuersim per oculorum sedem ductae interuallum, frontis os à secundo, tertio, quarto & quinto maxillae superioris in altero latere ossibus dirimens, frontis ossi & illis maxillae ossibus commune existit, tota nimirum sede, qua praesens futura internum sedis oculi angulum, & nasi summum seu superciliorum medium occupat. Verum de superioris maxillae ossibus futurisque nono agemus Capite, illic necessariò rursus futurae huius sermonem instituturi. nunc autem capitis ossa separatim sunt recensenda, quae enumeratis hactenus futuris, octo circūscribuntur, simul capitis amplitudinem qua cerebrum continetur efformantia. Sunt enim duo uerticis ossa, utrinque uidelicet unum: duo item infra, ad utranque nimirum aurem unum, quae temporum ossa huc

Quibus sedibus futura occurrit cuneiforme os circūscribens.

Galenus locus in libro de Ossibus explicatur, & futura frontis os à maxillae ossibus, &c. dirimens.

usque uocauit. quintum frontis est os, ut sapius, unicum. sextum occipitis, similiter unum. septimum cuneiforme, unum quoque. octauum id os censebitur, quod sedes constituit, quibus duo neruis non absimiles cerebri processus incumbunt, quos ferè olfactus organa nuncupamus.

*Verticis os
suum circum-
scriptio.*

^a Verticis ossibus in superiori parte ea futura peculiaris est, quæ recto tramite secundum capit-
tis longitudinem ducta, hæc ossa inuicem dirimit. In anteriori autem sede uerticis ossa coronali
futura, & posteriori ^Λ imitanti ab alijs discernuntur. Inferioribus uerò sedibus squamosis
conglutinationibus circumscribuntur: quo fit, uerticis ossa quadrilatera uideri, undique sibi
similia, præterquam ubi instar squamæ attenuantur, temporumq; ossa subeunt. Hic enim te-
nuissima sunt, sed solida, & nequam fistulosa: quemadmodum^b reliqua ipsorum sede, qua
temporalibus musculis non obteguntur, fistulosa cauernosaq; inter suas squamas cernuntur,
eandem ferè crassitiem undique ea sede obtinentia. Dein quæ frontis ossi committuntur, te-
nuiora quàm iuxta occipitijs os apparèt. Si uerò aliquibus donantur sinibus, aut foraminibus,

*Frontis ossis
circūscriptio.*

illa duodecimo Capite ipsis dedicando percurram. ^c Frontis os circumscribitur coronali fu-
tura, & ea quæ octauum Capitis os olfactus organorum sedes constituens terminat: & illa quæ
à temporum cauo incipiens, ac per medium oculorum sedium ducta, ad superciliorum usque
congressum fertur, ac frontis os à maxillæ superioris ossibus separat, inq; futurarum numero
ultimum locum sibi uendicauit. Frontis itaque os quodammodo orbiculare est, nullibi tenuius
quàm^d ubi superiorem oculorum sedis regionem constituit, & octauo capitis ossi cōmittitur.
Hic enim ueluti duobus tenuibus efformatur squamis, in medio uacuis, & aëre oppletis,
quemadmodum & ipsius^e concauitas, quam inter suas squamas ad supercilia nasiq; summum
haberi audies. Vbi etiam hoc os cavitatis ergò reliqua ipsius sede, crassissimū est, ac ueluti pro-
tuberat. Verum altera illarum squamarū, quæ oculi sedem respicit, exteriorq; est, læuis uisitur.
quæ autem internā capitis spectat amplitudinem, ^f inæqualibus quasi nubis forma tuberibus
extuberat, quæ cerebri reuolutionibus mutuò correspondent. In temporibus, ubi temporales
musculi consistunt, id tenue etiam est, ac solidum, minimeq; cauernosum, ^g præterquam ubi
cum uerticis osse inibi iungitur. Natura enim illic utrunque os uersus interiora priuatim cras-
sius effecit, ne fortè nimia ossium tenuitas caluariam ibidem plus æquo infirmam redderet.
Cæterum frōtis os in fronte paulo supra supercilia, & reliquam dein ipsius sedem, quæ excar-
nis est, nullam cavitatē ostendit notabilem, & multo crassius spissiusq; quàm uerticis ossa sen-
titur. Quæ tamen illud his committitur, ^h & sagittalis futura in coronalem incidit, frontis os

*Mollissima
rarissimaq;
caluaria
pars.*

tenuius infirmiusq; est, quàm in ipsa fronte. Hæc sedes qua dictæ iam futuræ inuicem commit-
tuntur, totius caluariæ pars mollissima rarissimaq; censetur. est enim illa, quæ in nuper natis
infantibus adhuc membranea, ac recenti caseo similis tangentibus occurrit: & quæ in puerulis
quum manducant & respirāt, moueri uisitur. Porro quoniam hæc sedes Arabibus Zeudech
nuncupata, inter excarnes capitis partes tenuissima est, & futuræ nusquam laxius hærent, me-
dici huic cauteria uulgò dicta, uel candesciente auro, uel ferro, uel urente quopiam medicami-
ne, pro affectus ratione (sed parum tutò interim) adhibēt. Locus autem iste in nobis, apice me-
dijs digiti promptè coniicitur, si brachialis principium superciliorum medio nasiue summo,
quis accommodauerit, ac medium digitum ad capitis uerticem rectà depresserit. ⁱ Occipitis

*Occipitis os-
sis circūscrip-
tio.*

os futura ^Λ simili, & eiusdem futuræ additamentis, & linea hæc iungente terminatur. Vnde
etiam quinque quodammodo lateribus constat. duobus quidem à ^Λ imitantis futuræ cru-
ribus efformatis: & alijs duobus, quæ ab eiusdem futuræ additamentis sepiuntur, ac demum
quinto à linea quæ occipitis ossi & cuneiformi communis habetur, descripto. Hoc os in cras-
sitiæ admodum inæquale est, neque omni ex parte sibi respondet. Quicquid enim ipsius in oc-
cipitio excarne ac à musculorum exortibus insertionibusq; liberum est, insigniter crassum
cernitur, tanto scilicet osse frontis crassius, quanto illud uerticis ossium crassitiem uincit. Ne-
que etiam occipitis os tota excarni sede, parem adipiscitur crassitiem, uerum ad eius sedis ra-
dicem^k in medio longè crassissimum apparet, ^l illa nimirum regione, qua duos maximos
duræ cerebri membranæ sinus, sanguinem & spiritum uitalem uenarum arteriarumq; mo-
do continentes, iungi, aliosq; duos sinus educere, in cerebri uasorum enarratione audies.
Videtur enim Natura ossis crassitiæ huic sinuum concursui prospexisse, tum quòd ex ipsius
læsione extremum homini impenderet periculum, tum quòd hanc occipitijs sedem oculis
destitutam, subinde percutiendam, ac crebrò in terram uarijs casibus illidendam, haud igno-
raret. Crassissima hæc occipitijs ossis sedes, similiter atque tota excarnis ipsius ossis pars, in-
tus cauernulis constant, utrinque ualida obductis squama: quemadmodum uerticis & fron-
tis ossa, ubi excarnia sunt, constare retulimus. Verum reliqua occipitijs ossis sedes, cui poste-
riorem colli regionem sibi uendicantes muscoli partim inferuntur, & à quo partim princi-

*Occipitis os
ubi crassissi-
mum.*

pium

fi. 1. fi. 4. K
In utraque
autè os cir-
cūscribitur
B, D. A. 1.
C, D. C, G.
F, H, A.

Supra R, R.
3, 4. fi.

3, 4. fi. L. cir-
cūscribitur
uerò B, A.
A, b, g, g. In
6. fi. secundū
extra 7,
L, r.
d Ad latus
7, L fig. 6.
e 6, 7 fi. K.

Tale quid
ostendit 12
7 lib.
8 6. fi. cha-
racter &.

3. fi. B.

3, 4, 5. fi. M.
M. Circū-
scribitur au-
tē in 3. C, D:
dein in 5. m,
m, m &
n, u.

k 6 fi. k.
l 7 fig. 7 li-
bri R.

Hec ex 6 fi-
gura petun-
tur. Sed ma-
nifestius ex
9 fig. 7 li-
bri.

in 6 fi. d. h. ad foramen e notatum.
 in 6 fi. ab e ad n.
 4.5 fi. l. l.
 d 3, 4, 5 fi. alteru os N notatur, & in 3, 4 circūscribitur à C per G, F ad H, de in in 5 à C p m, m ad n, & illinc p a, a ad H figuræ 4, 3.
 e 3, 4, 5 fi. h.
 f Inter T et i 6 fi. aut 8 fi. li. 7 Z.
 3, 4, 5 fi. i.
 i 3 fi. Z. & 5 fi. Y.
 h 4, 5 fi. h.
 l 4, 5 fi. r.
 5 fi. f.
 fi. ca. 14 li. 3 L.

pium ducunt, solida admodumq̃ densa, sed perquam tenuis, neque cauernulis donata, cernitur. Est autem hæc sedes, quam cerebellum implet. Ne uerò ob insignem illam tenuitatem ossis robori malè consuleretur, in huius sedis, qua os tenue est, medio, oblongum & instar lineæ exprorectum eminet tuberculum, ossis robur inibi plurimum adaugens. Porro quia id in internam caluariæ amplitudinem uergit, duos quasi sinus utrinque uidelicet unum efformat, quos cerebellum infarcit. Hoc tuberculum, quemadmodum & tenuis ista occipitijs ossis pars, pertinet à radice excarnis partis occipitijs ossis ad posteriorem usque regionem foraminis dorsali medullæ parati. ^b Ab anteriori enim parte foraminis dorsale transmittētis medullam, & quæ occipitis os maximè in angustū cogitur, id sensim ita crassescit, ut insigniter etiā crassum uideatur, quæ cuneiformi ossi cōmittitur. Hoc os in externa sede ad latera foraminis medullæ dorsalis gratia exculpti, ^c duo exigit capitula, quæ primæ ceruicis uertebræ articulantur, quorumq̃ beneficio caput proprio motu flectitur & extenditur. Hæc capitula in puerulis, appendicibus constant: in senioribus autem, ut & reliquæ appendices, hæc etiā latent. Præterea puerulis id os tribus extruitur partibus, quæ lineis tribus cartilagine oppletis dirimuntur. Atque harum una à sagittalis futuræ termino ad foraminis dorsali medullæ parati posteriorem pertingit sedem. aliæ duæ à foraminis lateribus transuersim, in futuræ ^Δ referentis additamēta pertinent. Adeò, ut admodū pueris in occipite duo habeantur occipitis ossa, & unum in basi capitis cuneiformi ossi cōmissum. Occipitis os intus læue minimeq̃ asperum est, perinde ac exterius tota ipsius sede excarni, etiam læue cernitur. Sede aut̃ huic subiecta, & ubi occipitis os non minimam capitis basis portionem constituit, id egregiè asperum inæqualeq̃ se offert, ut commodius ab ipso ligamenta & muscoli quidam pronascerentur, & rursus quidam alij tutius firmiusq̃ illi infererentur. ^d Temporum ossa circūscribuntur squamosis conglutinationibus & futuræ quæ ^Δ refert additamentis, itemq̃ futuræ cuneiforme os terminantis interuallo, quod utrinque à transuersa linea, quæ occipitis ossi & cuneiformi communis est, sursum per caua temporum ad squamosas conglutinationes oblique contendit. Hæc ossa non perperam dicerentur circularia, nisi extra circuli descriptionem ea ossium pars promineret, quæ ^Δ referenti futuræ proxima est, capitisq̃ ^e māmillarem educit processum, qui in utroque temporum osse unus habetur, non solum ad opportunam caput mouentium musculorum, qui à petoris osse & clauiculis principium ducunt, insertionem protuberans, uerū ut auditus organo apta hīc constitueretur sedes, magna cavitae indigens. Ac proinde etiam temporum ossa non hīc modò māmillari processu extuberant, ^f sed etiam in internam capitis amplitudinem, ut ampla uacuaq̃ sedes in temporis osse constitueretur, qua auditus organum tum suo neruo dilatando, tum etiam sinibus efficiendis, & peculiaribus ossiculis reponendis, opportunum locum adipisceretur. Cuiusmodi uerò hæc sint ossicula, secundo ab hoc Capite exequar, nunc temporis ossis historiam absoluturus: cuius iam unum recensui processum, qui à uaccini uberis papillæ forma Græcis quidem *μασoειδης*, nobis autem mammillaris nuncupatur. maior enim est, quàm ut aptè teneris muliercularū papillis assimilari possit. Deinde temporis os ^g alio donatur processu, non procul à mammillaris processus interno latere initium ducente. Hic oblongus, tenuisq̃, & perquam solidus est, unde etiam ab acus imagine illum Græci *Βελονοειδης* uocant, à styli uerò scriptorij specie *γραφοειδης* & *στυλοειδης*, ac dein à galli calcaris imagine *πληκτρον*. Qui etsi solidus uideatur, quum tamen tenuis existat, & admodum promineat, leuīq̃ occasione abrumpatur, in caluis è terra effossis rarò occurrit. Ex hoc processu ad os ^h referens, & ad linguam muscoli porriguntur, quemadmodum & ad inferiorem maxillam, illi nimirum quorum beneficio ea deorsum trahitur. Deinde ⁱ referens os, aut oblongorum teretiūq̃ ossiculorum, aut ualidi teretisq̃ ligamenti interuentu huic processui cōmittitur. His ^j alius adhuc in temporis osse accedit processus neutiūquam infimus, qui mediā ossis iugalis partē efformat: quod proximo Capite nihil aliud esse audies, quàm duorū ossium processus obliqua ^k futura inuicē nexos. Ad huius processus radicem ante auditorium meatum ^l sinus ossi insculpitur, cui inferioris maxillæ capitulū inarticulatur. & hīc auditorij meatus initium, quod impense crassum est, ueluti ^m futura quapiam exigua obscuraq̃ à reliquo temporis osse alicubi, & potissimū anteriori inferioriq̃ sede discernitur. Cætera ossis amplitudo uerticis spectans os, ampla & tenuis admodum, sed solida & cauernulis destituta cernitur, exterius læuis, intus uero inæqualiter extuberans, secundū cerebri reuolutionū quæ intestinorum gyris comparatur effigiem. Ad basim uerò capitis asperum & insigniter inæquale est, & potissimū ⁿ ubi processus ritu transuersam respicit lineam, occipitis ossi & cuneiformi communem. Hac enim parte inæqualiter extuberat, pumicisq̃ modo asperum occurrit, transuerso foramine peruium, quo soporalis arteriæ ^o præcipuam sobolem in caluariam ferri audies.

Occipitis ossis capitula.

Temporum ossium circūscriptio.

Māmillaris processus.

Temporis ossis cavitae.

Processus scriptorio stylo similis.

Temporis ossis processus iugalis ossis portionē constituens.

*Cuneiforme
os.*

*Libro 9 de
Vsu partium.
Cuneiforme
os spongiæ mo-
do non esse per-
uium.*

*Processus al-
lis similes.*

*Octauum ca-
pitis os.*

*Os quo canis
caluariæ inter-
na superficies
abundat.*

Cæterum quibus futuris^a cuneiforme os circumscribatur, superius abundè diximus. Hoc, si quod aliud, insigniter uarium est: unde etiam non iniuria à multiplici forma Veteres id πολύμορφον nuncupauere. Ad latera enim, & in temporum cauis, tenue & perquam solidum est. in medio autem, capitisq; basi omnium caluariæ ossium longè crassissimum uidetur, & intus plerunque uacuum.^b in qua uacuitatis sede tunc ostendit duo grandia antra, tenui quo-^cpiam osseo septo interstincta, in cuius inferiori etiam sede paruum conspicitur antrum. Hæc undique ossis squama obducuntur, aut (ut sic dicam) omni circumferentia osse sepiuntur, nusquam peruia, præterquam in narium amplitudinem. Duo enim præcipua antra singulis foraminibus illuc pertinent, inter spirandum aërem ex narium amplitudine assumentia, quem simul cum molli quadam medulla complectuntur. Atque hæc cuneiformis ossis antra intus lati-^dtantia, effracto osse eo uelim expendi diligentius, quo mirabiliori artificio conficta sunt, & quo magis à dissectionum peritis ignorantur. dein etiam ideo accuratius ueniunt obseruanda, quòd Galenus perperam hoc os cribri aut spongiæ modo perforatum, & cerebri pituita transmittere scriptum reliquit. Nequaquam enim eiusmodi foraminulis peruium est, at continuum & solidum undiq; in superficie cõspicitur. & si quando eiusmodi antris non donatur, nihil prorsus à substantia & conformatione tali, aut calcis, aut alterius cuiuspiam ossis differt, quod exterius continua incrustatum obuolutumq; est squama, & intus tantum paruis cauernulis, tenuissimi pumicis modo, oppletur. Cuneiforme os ubi ita crassum est, & internam caluariæ sedem respicit,^e sinu quodam donatur, cui Natura^f glandulam imposuit, defluxum pituitæ excipientem. Ab hoc enim sinu deinde utrinq; leues meatus deducuntur, pituita deferetes. Impossibile enim esset, etiam si id os spongiæ modo in superficie perforatum donaremus, illis foraminibus pituitam ferri. At satius erit meatus aut sinus pituitæ gratia cælatos, unà cum capitis ossium foraminibus duodecimo Capite persequi, & de pituitæ expurgatione in septimo libro, qui cerebro dedicabitur, differere: potissimum quum hinc nuda ossium tradenda sit cognitio. Quinetiā processus cuneiformis ossis, quos in interna caluariæ sede ad dicti sinus latera ostendit, tunc de-^gnum melius intelligentur, ubi illum sinum ossisq; foramina pertractabimus. Verum præter illos processus, cuneiforme os in externa sede ad caluariæ basim^h alios quatuor exigit, utrinq; binos, & uespertilionum alarum modo prominentes, unde etiam πτερυγοειδῆς nuncupatur. In duarum alarum medio sinus cauitasq; conspicitur, à quaⁱ ualidus enascitur musculus, qui in ore delitescens, maxillam inferiorem sursum trahit. Atque huius musculi exortus gratia hi processus extuberant, cum ut is aptum ex illis duceret principium, tum etiam ut principium ab illis tuto custodiretur. ^jOctauum capitis os in frontis ossis basi contentum, futura illa circumscribitur, quæ id à frontis osse & cuneiformi terminat. & ^killa etiam quam in humiliori narium septi sede ducta hoc os à maxillæ superioris ossibus dirimere antea diximus. Præsens os præter narium septum ab ipso eductum, olfactus organorum sedes constituit, & multis foraminibus odorum gratia peruium est: at tenue interim substantiaq; solidum se spectantibus offert. Dein in caluariæ amplitudinem oblongum educit^l processum, septi ritu sedes interdiuidentem, quibus olfactus organa reponuntur. Quinetiā processui illi duræ cerebri membranæ^m pars pertinacissimè connascitur, quæ dextrâ cerebri partem à sinistra interdiuidit. Ad hunc itaque modum capitis ossa se habent, sedem qua cerebrum continetur efformantia. quibus aliquis fortè ex Galeni libro de Ossibus aliud os putauerit adijciendum, quod in cerebro repositum arbitrabitur. Galenus enim ad eius libri finem, inter ossa medicinæ Candidatis non descripta, aliquod etiam in cerebro obuium, enumerasse uidetur. quod fortassis est occipitis ossis processus in canibus admodum conspicuus, & nihil minus quam in homine apparens. Canibus nanque inter cerebellum ac cerebrum, latum, sed tenue os interuenit,ⁿ ubi duntaxat in hominibus duram cerebri membranam obseruamus. Quum itaque eius ossis apud Galenum alia nulla fiat mentio, diuinandum est, num ille canis processus ab ipso intelligatur: an uerò ante ipsum aliquis (ut Marinum fecisse opinor) illius meminerit, & Galenus postmodum in bobus suis, quorum cerebra potissimum aggrediebatur, id nunquam obseruauerit: ac proinde ita solum perfunctoriè, ne quicquam saltem, cuius alij dissectionum periti quouis pacto meminissent, ab ipso in Anatomes tractatione omissum uideretur, ossis illius mentionem facere uoluerit: id quod & de summo humero, seu superiori scapulæ processu accidisse (quum scilicet tertium quoddam os, nonnullorum Hippocratis uerborum occasione, præter clauiculam & summum humerum^o in illorum ossium connexu obseruari tradit) in sequentibus liquidò demonstrabitur.

3, 4, 5 fig.
O, P. & pri-
uatum 8 f.

8 f. C, D,
E, F, G.

6 f. M.
d f. 16 lib.
7 A.

4, 5 f. P, P,
& dein nu-
meri 2, 3,

4, 5-
f 6 muscu-
lorum tabu-
la.

8 8 fig. A,
B, A in 6 fi-
secundum
A Y.

h 1 f. ca. 9.
g.
i 12 f. lib. 7
C, D, E.
k 6 figur. 1.
l 12 f. lib.
7. H.

7 fig. li.
7. O, O.

In integris
fi. Q ad n.

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I.
DE OSSE IUGALI, ET OSSIBVS QVÆ
rupi præruptæ assimilantur. Caput VII.

33

Huic Capiti nulla præfigitur figura, quòd iugale os in præcedētis Capitis tertia et quinta figuris V & X notatum fuerit. quemadmodum & ipsius sutura in tertia quidem Z, in quinta autem Y indicabatur. Ossa uerò quæ rupi præruptæ assimilantur, seu quæ lapidea uocamus, etiam quinta præcedentis Capitis figura ostenduntur, tota nimirum sede, qua C, C, M, M, M, m, m, m, k & huiusmodi in caluariæ basillic repositi characteres occurrūt.



INTER reliqua corporis ossa, quædam proprijs circūscriptionibus terminisq; destituta, non secus quàm si peculiaria essent ossa, dissectionū professoribus describūtur, in ossiumq; numerū cum cæteris referūtur. Huius generis est os iugale Latinis, Græcis uerò ἰγυαία ob hoc nuncupatum, quòd utraq; ossa (sunt enim utrinq; singula) boum equorum ue iugis ab Anatomes peritis assimilentur. Cōstat autē os iugale, aut potius caluariæ sedes hoc nomine dicta, ex duorū ossium processibus inuicem obliqua sutura coeuntibus. ac posterior quidem eius pars temporis ossis processus est, anterior autem pars, illius ossis processus censetur, quod uniuersum oculi sedis externum angulū efformans, maxillæ superioris ossium primum numerabitur. Adeò fanè, ut os iugale proprijs destituatur terminis, aliudq; nihil sit, quàm duorū processuū mutuò futuræ beneficio cōmissorum regio. Cæterum os iugale medullæ expers est, solidū, durum, & lapidis modo ad patiendū pertinax.

Quibusdam ossium sedibus perinde ac si undiq; circumscriberentur nomina imponi. Os iugale.


Huiusmodi nanq; efformari decuit, quòd temporali musculo operimentū ritu fuerat proponendum. Hoc enim os foris gibbum, intus cauum, illi musculo sagacissimè opponitur. Quamuis interim Natura hoc propugnaculo minimè cōtenta, temporalem in capitis ossibus magna ex parte occultauit, sinum ossibus insculpens musculo recipiēdo apprimē idoneum, & hunc undique uicinarum partium tuberibus promontorijsq; circumsepientem. Atque id meritissimò Natura molitur, quando quidem temporū musculi malè affecti, conuulsiones, febres, sopores, amentias inferunt, quia neruorum principio proximè accedunt, & solum os eos à cerebro ipsiusq; membranis dirimit. Adde quinos neruorum cerebri surculos (præter tres enim alijs notos Anatomicis, duos adinueni) singulis musculis implantari: ob idq; non iniuria diuū Hippocratem pronunciauisse, plagas præcipuas ac stuporem inducentes, esse temporales. Sed horum musculorum præstantiam in secundo libro cum reliquis ad unum omnibus abundè prosequemur. ubi etiam docebitur, iugale os in hoc præcipuè formatum, ut ab ipso masseter siue manforius musculus opportunè principium ducat. Cæterum ueteribus λιθοειδὴ ossa uocabantur, quæ petram & effractam rupem non duritia modò, uerum etiam imagine referūt. Huiusmodi autem est inferior capitis pars, qua dorsalis medulla è caluaria delabitur, ac ubi māmiliares & stylum referētes temporū ossiū processus exoriūtur. Eius enim regionis ossa omnium uniuersi corporis durissima & solidissima existunt, atq; re uera cōmodi musculorum exortus ac insertionis gratia, præruptæ asperæq; rupi quàm similima. Vnde etiam hanc partem meritò ita nominandā arbitror, nullumq; in corpore os propria finitū circūscriptione petrosum lapideum ue à ueteribus fuisse appellatū reor. Quanquam rursus non ignorem plurimos, duntaxat temporum ossa hoc nomine indicauisse, nō quidem adhuc uniuersa, uerum illam ipsorum portionē, quæ dictos antè processus educit. Per me igitur, ita temporū ossa nominare licebit: modò neminè lateat, dictā nobis caluariæ basis regionē Anatomicis creberrimè petrosum os nuncupari, & dein interdū ossa quædā ab ipsis cōmemorari, ac si propria donarētur circūscriptione: quū tamen nihil aliud uerè cēsenda ueniāt, quàm duorū ossiū mutuò coeuntū (ut iam diximus) fines, & aliquando unius alicuius ossis una sedes, uti euenisse audies in ossibus quæ sacri ossis lateribus coarctantur, ac triplici nomine pro sedium ratione donantur.

Iugalis ossis usus. Quia Natura temporalibus musculis prospexit.

Manforium musculus à iugali osse principium sumere.

Ossa præruptæ rupi similia.

DE OSSICVLIS AUDITVS ORGANI constructionem ingredientibus. Caput VIII.



HUIVS FIGVRAE INDICEM sequens pagina proponet.

OCTA

PRÆCEDENS figura auditus organi ossicula exprimit. præcipua enim illius figuræ effigies, portionem ex dextri temporis osse exactam abruptamue commonstrat, quæ dein per mediū dissecta, duas quæ in eius ossis cavitare reponuntur, membranas, unā cum ossiculis ob oculos ponit: uti characterum index hunc in modum explicabit.

- A** Foraminis portio, quod ab aure introrsum ad membranā **B** notandam pertinet.
B Membrana transversim foramini obducta, quod ab aure in cavitatem fertur, in temporis osse auditus organi nomine exculptam.
C Unum auditus organi ossiculum, malleolo assimilatum.
D Quinti nervorum cerebri paris nervus.
E Quinti paris nervorum cerebri ramus, per cæcum foramen ad musculum temporalem potissimum digestus.
F Quinti paris nervorum cerebri ramus, per foramen procedens, quo uena auditus organum petens excipitur.
G Series quinti paris nerui ad planam lævemq; concavitatis eius sedem, hic auditus organi occasione cælatam.
H Sedes orbicularem circulum referens, cuius anteriori sedi alterum auditus organi ossiculum
I. committitur, quod incudi & molari denti comparatur, & **I** hic insignitur.
K, K Cauernulæ indicantur, quibus cavitates auditus organo parata, intus scatet.
L Mallei ab omnibus conterminis partibus liberi anterior facies.
M Mallei ab omnibus partibus similiter liberi posterior facies.
N Incudis, seu molaris dentis ab omnibus partibus liberi anterior facies.
O Incudis seu molaris dentis ab omnibus partibus liberi posterior facies.
P Incudis ac mallei ita ut in aure committuntur, simul nexorum anterior facies.
Q Incudis ac mallei unā iunctorum, posterior facies.



Cavitas audi-
tus organo pa-
rata, & fora-
mina in ipsam
pertinentia.

Quinti paris
nervorum ad
auditus orga-
num series.

Ossiculum in-
cudi compara-
tum.

MODUS quidem haud instituumus organi auditus constructionem omni paratam industria commemorare, quum hæc unā cum reliquorum sensuum instrumentis septimo libro enarranda relinquatur, nihilo minus tamen duo ossicula, quæ in ossis temporis cavitare auditus organi nomine exculpta reponuntur, hic opportunè describentur, ne fortè quicquam ossis in humani corporis fabrica hoc libro oscitanter præterisse uideamur. quanquam neq; Galenum, neq; ante illum quenquam alium hæc ossicula cognovisse, satis hinc colligatur, quod nusquam horum mentio inciderit. Quando igitur auditus organi constructionē recensebo, amplam anfractuosamq; cavitatem temporis ossi insculptam audies, quæ tortuoso foramine in capitis amplitudinē cerebri sedē pertinet: & alio longè ampliori minusq; tortuoso, in externā capitis sedē uersus aurem exporrigitur. Deinde ab hac cavitare alia duo deducuntur foramina, quorum alterum cæcum nuncupabitur, alterum uerò hoc quoq; nomine appellari posset: uerum non similiter ipsi cæco anfractuosum angustumq; est, & uenæ ad auditus organi enutritionem accedenti uiam præbet. Atque hæc quidem foramina suis characteribus notisq; duodecimo Capite indicabuntur, nunc autem tantum ipsorum meminimus, quantū ad ossiculorum historiā duximus sufficere. In foramen itaque capitis amplitudinem qua cerebrum cōtinetur spectans, quinti paris cerebri nervorum alter^c nervus subintrat, ac præter^d ramos per angustiora illa tenuiaq; foramina ab ipso digestos, insigniori sui portione cavitatem temporis ossi incisam membranæ modo oblinet: non quidem uniuer^e sam, at quibusdam tantum sedibus, quasi ea nerui portio in plures diuideretur membranas, aliquot eius cavitatis regionibus obductas. Verum inter reliquas cavitatis sedes, quæ uarię sunt, & alicubi planæ, alicubi rarioris spongiæ pumicisq; modo foratæ, una est orbicularis & plana, & osseo circulo parumper extuberante septa. Ad huius circuli quinti paris nervo obducti exteriorē atq; auri proximā sedem, ossiculum obseruatur, quod duobus tenuibus acutisq; processibus tanquam cruribus huic osseo circulo astabiletur, superius, ubi crura ipsius coeunt, spissius crassiusq; incudis instar effectum. Hoc alterū auditus organi ossiculum est, quod sanè leuiori negotio inter secandum cōmonstrare soleo, quàm in præsentia, ut ab aliquo qui id nunquam

a n fig. ca.
14 libri 3.
b a, a, b, c,
figur. 12 ca.

c D.
d E, F.
e G. Aut 1,
2 fi. ca. 2 li.
3, a, b, c, d.

H.

I, N, O.

quam uiderit, intelligat, describere possem. Nihil enim aliud quo dilucidius cognoscatur, sermoni adhuc adijcere possum, siquidē illius & forma & situs uix manifestius explicari queant. Quippe, uti dicebam, ad circuli in temporis ossis cauitate, effracto iam osse, cōspicui externū latus, hoc ossiculū reponitur, & bina quibus firmatur crura exigit, quorum exterius ac auri uicinius, est breuius & crassius, latiusq̃, ac in acutū definit apicem. Alterū crus quod interiūs consistit, & membranæ orbicularem illam cauitatis sedem succingenti magis, quàm exterius crus, innascitur, longius nōnihil & tenuius uisitur, ipsiusq̃ extremum quasi in unculum cessat, quo membranæ cauitati tēporis ossis obnatæ implicatur, firmiusq̃ innectitur. Ossiculi huius pars extra membranā prominens, superius partim plana, partim rotunda cernitur: quemadmodū minores incudes effingi solent, quorū amplior pars plana est: altera, quæ ueluti in mucronem definit, instar conī rotunda. Grandiores enim incudes penitus plani depressi ue & quadranguli fiunt. Cæterū si hoc ossiculū, quia tantū binis donatur cruribus, incudī assimilare minus placuerit, nihil profectō obstititⁿ molarī denti duabus tantum radicibus ornato, id conferre.

Alterum ossiculum auditus organi fabricā ingrediens, à iam cōmemorato plurimū uariat, & alterī membranæ innascitur. Foramen enim concauitatis seu antri in temporis osse incisi, quod aurem spectat, ea parte qua cauitatis amplitudini uicinū est, membranula tenuissima & prorsus pellucida in eum modum obtegitur, quo uas suo inferiori fundo obtegi obturari ue dicimus. Huic membranulæ transuersim aliud ossiculū innascitur, itaq̃ illi intus transuersim insternitur, quemadmodū in tympanis fidem unam atq̃ alteram crassio rem membranæ obtendi conspiciamus. Ut uerò ossiculū ualidius firmaretur, oblongū tenuemq̃ exigit processum, quo membranæ secundū ipsius latitudinem innascitur. Hunc processum liceret^l femoris ossis parti comparare, quæ ab ipsius processibus, quos rotatores uocamus, ad inferiora usq̃ femoris capita pertinet, imò si hæc inferiora capita à reliquo femore resecta sinxeris, uniuersum ossiculū tunc femori opportunè assimilabitur. Quemadmodū enim femur iuxta ipsius ceruicem duos asciscit processus, sic etiā ossiculū hoc eadē sede processulos aliquot sibi uendicat, quorū beneficio membranæ suæ firmius innascitur. Dein, ut femoris ossis ceruix oblique uersus corporis interiora ad coxendicis ossis sinum uergit, atq̃ in caput ad amussim rotundum cessat: ita etiam præsens ossiculum, à membrana introrsum abscedit, in rotundū caput desinēs, quod læue minimeq̃ asperum est, & superiori parti alterius ossiculi, quod molarī denti, aut incudī assimila-

Ossiculū malleolo non admodum dissimile.

Secundi ossiculi ad femoris os cōparatio.

Auditus organi ossiculorum usus.

Marcus Anton. Genui & Volphangus Heruort, huius operis et inchoandi & ab soluendi auctores præcipui.

uimus, ita tenuissimarum membranarum interuentu^m committitur, ac si malleus incudī laxè alligaretur, non secus, quàm si ossiculum postremò enarratū malleoli præstaret munus: alterum uerò incudis uicem gereret, sed pro mallei mole nimis quàm parui. Num autem ossicula incudis & malleoli officio ita fungantur, quemadmodum sanè formam referūt, & leuissimo afflatu secundum ossiculum cum membrana cui innascitur inter disse candū mouetur, primo ossiculo inter in quodammodo quiescente, à me haudquaquam assertum uelim, quando quidē auditus rationem non satis ex sententiā percipiā. Non quòd mihi animo exciderit, commune illud medicorum ad partium temperiem asy lum & aëris gyri, quos ex huius percussu in aurem ferri, & quandam membranam ferire, uulgò nobis è lapillorum in aquam iactu persuademus, interim organi huius cōstructionis prorsus ignari. Longè enim diuiniora rerum Opifex callidissimo artificio hīc machinatur, quorum fabricam satis dilucidè in scholis quidem cōmonstro, usum autem & operandi rationem non magis quàm oculi ipsius assequor. Verū quia de auditus organo postea prolixius pertractabitur, hīc sat fuit ossicula recensuisse: quæ si hoc sermone non affecutus fueris, uiculi, aut agni, aut alterius animalis capite in mensam posito, temporum os nunc hoc nunc illo modo diuides, horum ossium cōstructionem animaduersurus. Quamquam multò satius est hæc in crudo capite, quàm in cocto examinare, & in homine potius, quàm alio quouis animali. Non enim illa administratione, tam spectatu iucundissimam ossiculorum cōstructionem adinuenies, quàm omnium ferè musicorum instrumentorum fabricæ rationem ex auditus organi compage desumptam perinde admiraberis: ac uel hoc in primis nomine auditus organi harmoniam summa uoluptate intueri solitus est, non modò musicorum absolutissimus, uerum & nostræ ætatis philosophorum eximium decus MARCVS ANTONIVS GENVA, primarius, uariaq̃ disciplinarū eruditione excultissimus apud Patauinos philosophiæ professor, cui rerum naturalium studiosi tantum debebunt, quantum frugis ex hoc meo conatu ipsis accedet, quippe qui ad hunc inchoandum primus auctor, ac sedulus mōnitor haud minus extitit, quàm rarum uirtutis exemplar VVOLPHANGVS HERVVORT, patricius Augustanus, ob incredibilem erga literas earumq̃ cultores amorem, immortalitate dignissimus, ac mihi dum uiuam unice colendus, quòd ad huius operis ab solutionem, quantum in ipso fuit, nihil fecerit reliqui.

ΛΛ Quartum maxillæ superioris os. Λ in oculi sede positum huius ossis partem notat, quæ inferiorem oculi sedis regionem magna ex parte cōstituit. Dein eodem etiam Λ indicatur principium foraminis, quod in genis B insignitur. Verum id os circumscribitur h, g, e, Y, X, c, d, b, D, a, N, in prima hac figura positus, & in super e, u, t, & y in sequenti figura ponendis.

Ξ Quintum maxillæ superioris os. Vnum Ξ dextri lateris os, alterum Ξ sinistri lateris os insinuat, quod & in alijs characteribus observatum uides.

Π In altera secundæ huius capitis figura Π se offert, sextum superioris maxillæ os indicaturum, quo etiam character sexti ossis coniux notabitur, ipsum uidelicet alterius lateris sextum os.

Ο Narium septum, quod octavi capitis ossis cribri modo perforati processus putatur. Atque his iam explicatis characteribus, ossa præsentis figura occurrentia insigniuimus.

Ρ Sutura duos ossium processus committens, quibus iugale os efformatur.

Q A Q ad S sutura notatur, cuneiforme os à primo maxillæ superioris osse dirimens, ac hic in oculi sede conspicua, in dextriq; oculi sede ad characterem Q clarius fere, quam in sinistri, apparens. In tertia uerò figura, & quarta, quæ sexto Capiti præponuntur, hæc sutura in cauis temporum d insignitur.

R, S, T, V, X, Y, & Z Sutura frontis os à maxilla superiori & cuneiformi diuidens. Ab R enim ad S suturæ pars notatur, frontis ossi & primo maxillæ ossi communis, quæ in cauis temporum in tertia figura sexti Capitis conspicitur, inibi à b ad proximum ipsi b pertinens. Hic uerò ab S ad T suturæ huius interuallum notatur, frontis ossi & cuneiformi commune.

A T ad V interuallum metitur, tertio maxillæ ossi & frontis ossi cōmune. Ab V ad X interuallum præsentis suturæ insignitur, cōmune frontis ossi & secundo maxillæ ossi. Inter X & Y huius suturæ interuallum consistit, quarto maxillæ ossi ac frontis ossi commune. Ab Y uerò ad Z suturæ illius significatur interuallum, cōmune frontis ossi, & quinto maxillæ ossi.

a Maxillæ sedes aspera inæqualisq; qua primum maxillæ os quarto committitur. Verum ab a ad b sutura indicatur, duobus illis ossibus communis, ubi hæc in anteriori caluariæ sede est conspicua. Pars autem ipsius quæ in temporis cauo latitat, ex quarta figura sexto Capiti præposita, sub characterē f in temporis cauo posito per opportune petes.

b A b ad Q suturæ primū os à quarto diuidentis pars indicatur, quæ in oculi sede est cōspicua. Hæc in præsentis figuræ sinistra oculi sede characterib. pauciorib. occupata, est manifestior.

c Ab V ad c sutura notatur, secundo ossi et tertio communis. Quicquid autem sursum iuxta C & Δ ad X usq; ducitur, secundū os à quarto dirimit.

d d seruit describendo tertio maxillæ ossi. T enim ad V superiorē eius ossis sedem describit, V ad c anteriorem, T ad d posteriorem, qua cuneiformi committitur ossi. c uerò ad d eius ossis inferiorem partem circumscribit, quarto maxillæ ossi contiguam.

e e ad Y suturam notat, quarto maxillæ ossi & quinto communem.

f f ad Z suturam insinuat, quinto unius lateris ossi & quinto alterius lateris ossi communem.

g In narium amplitudine g ponitur, suturam indicans, qua septum narium à quartis maxillæ superioris ossibus disiungitur.

h Sutura, aut harmonia potius, quartis maxillæ superioris ossibus communis, cuius beneficio illa inuicem in mustacis regione dirimuntur.

i Ad superiorem foraminis B notati sedem, i ponitur, indicaturum quarti ossis suturam, quæ elatius quam id foramen consistit, ipsiq; quarto ossi duntaxat peculiaris est.


Hominis caluariæ, cuius modò indicem prosequor, figura, nullo præterea insignitur characterē, neq; aliud in illa enarrandum superest. Subsequentes itaq; notæ canis caluariæ hunc in modum propriæ censebuntur.

k Sutura à malis sursum ad medium ambitus oculi, in inferiori regione sedis oculorum ascendens, usq; ad l.

l m l usq; ad m suturam notat, ad supercilia usque iuxta internū oculi sedis angulum cōscendentem.

n Sutura ab illa quæ externum nasi ossium latus circumscribit, inter caninum dentem et incisoriū ipsi proximū delata. Licuisset hanc caluariā pluribus characterib. occupare, nisi existimassem hominis maxillam Lectori in præsentia satis negotij exhibituram.

SECUNDA NONI CAPITIS FIGURA.



SECUNDÆ FIGURÆ EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

P R A E S E N S figura, calvariae basim in hoc exprimit, ut palatum maxillæq; superioris ossa in priori figura commonstraret. Huic autem permulti adsunt characteres, quæ capitis ossibus suturisq; enarrandis superius adiuuerunt. ac proinde quid illis indicetur, ex sexto Capite petas licet. Quamuis interim hic eos annotare operæ precium sit, quibus ad propositam enarrationem indigemus.

L Hic modica ossis frontis portio in conspectum uenit.

O O P P Cuneiforme os.

Q Γ Hoc os prior quoq; figura *Γ* notatum habet, estq; primum maxillæ superioris os.

S Λ Hoc os prior figura etiam *Λ* indicat, estq; quartum maxillæ os.

V X Calvariae sedes, quam os iugale *Anatomes* peritis uocari, iam antea dictum est.

Y Sutura, quæ duos processus os iugale efformantes committit.

d Hic latitat sutura, primum maxillæ superioris os à cuneiformi discernens: deinde et suturæ primum à quarto dirimentis pars, in temporis cauo conspicua.

e Sutura quarto maxillæ ossi & cuneiformi communis.

f Sutura primum maxillæ os à quarto separantis pars, in anteriori maxillæ regione apparet, ac priori figura ab *a* ad *b* indicata.

g Sutura frontis ossi & primo maxillæ ossi communis, quam superiori figura *R* insigniuimus.

Π Sextum maxillæ superioris os.

q Ab e uersus *q* sutura sexto maxillæ ossi & cuneiformi communis indicatur.

Σ Septum narium, & sedes qua id à cuneiformi osse dirimitur.

t. u A t ad u transuersa notatur sutura, sextum os maxillæ à quarto dirimens.

x Ab *x* ad *t* sutura indicatur, duo sexta maxillæ superioris ossa ab inuicem sciungens, & duobus illis ossibus communis.

y Sutura notatur recta per palatum ducta, & quartis maxillæ ossibus communis.

z Priuatim indicatur foramen in anteriori palati sede posterioriq; dentium incisiorum regione apparet, ad cuius latus interdum obscura occurrit sutura, transuersim aliquousque in

α. quarto superioris maxillæ osse prorepens, & α insignita.



VPERIOR maxilla non unico quidem, sed pluribus efformatur ossibus, atque id potissimum, ut ad patiendū fiat pertinacior, ne scilicet statim una eius particula laborante, uniuerſa infestetur, sed quò malum unà cum osse (ut in capitis ossium structura dictum est) desinat. Deinde quum nō omnes eius partes æquē solidas, spissas ac duras fieri oportuerit, illā quoque ex pluribus constitui ossibus fuit necesse. Atque hæc præcipuē duris, sed admodum leuibus componitur ossibus. nam narium foramina adeò am-

Cur maxilla pluribus constet ossibus, et ijs causis ac leuibus.

Lib. ii. de V. su partium.

Constructura ossium maxillæ ratio.

Libro de Ossibus.

Breuis maxillæ ossium enumeratio.

Quot ossibus oculi sedes efformetur.

Primum maxillæ os.

pla patentiaque sunt, ut tantæ moli maxillæ insignis accedat leuitas. Dein alij in ossibus sinus, ac intus latitantes cauernæ, quas aer opplet, adeò amplæ cauæque existūt, ut maxilla superior utrinque ad latera narium cauitatis, simile quid nanciscatur cum cereis imaginibus, quas in uarias formas fundimus, ac intus cauas relinquimus. Non enim Galeno hac parte assentiendum est, qui superiorem maxillam medullæ expertem, durisque ossibus, nec leuitate indigentibus efformatam docet: quòd hæc nihil, uti inferior, moueatur. Quum interim inferior multo sanè sit ualidior, & osse constet iniurijs ferendis longè pertinacior, multoque minus à Gallica scabie erodi apto. Compinguntur uerò maxillæ superioris ossa inuicem futuris, ita tamen ut ea quæ per harmoniam committuntur, futuras quoque modò appellare liceat. Nam uel Galeni suffragio eas omnes futuras nominare nemini uerendum est, quum exactissimæ (si modo quæ sint) harmoniæ intus quendam mutuū ingressum futurarum quasi ritu ostendāt. Cæterum quæ nam futurarū superioris maxillæ sit series, quisque illius ossium numerus, longè facilius demonstratu quàm scriptu arbitror. Quò minus tamen hîc rei difficultati cedam, primum hominis superiorem maxillā aggrediar, ac deinceps obiter in quibus Galeni descriptio canibus aut simijs, non autē hominibus cōueniat, subiungā. Vocabitur itaque superior maxilla, quicquid ossium in caluaria præter superiorem dentium seriem nobis adhuc enarrandum superest. Capitis igitur ossa octo, suis futuris circumscripta, iam antea enumerauimus: præter quatuor ossicula, auditus instrumentorum constructionem ingredientia. Maxillæ autem superioris ossa (præter tenuia quædam fungosa & ueluti membranea ossicula, quæ in narium amplitudinis summo, in exiccatis, aut nuper coctis caluarijs impense cartilaginea obseruantur) duodecim sunt, ab utroque scilicet latere sena. Atque horum^a sex, unum sedis oculi externum angulum constituere dicemus, secundum uerò & tertium ad oculi sedis internum angulum referentur. quartum omnes sui lateris dentes superioris maxillæ suscipere docebimus. quintū ex duobus (quæ ita uocamus) nasi ossibus alterum erit. sextum cum suo coniuge ad palati finem collocabitur, quā narium foramina in oris amplitudinē spectāt. Accepta igitur in manus caluaria, illam cum figuris huic Capiti præpositis confer, sexque horum ossium suis characteribus insignitorum circumscriptionem tuo Marte aliquantisper inquirito: & quemadmodum in scholis facere consueui, rudiori penna omnes quæ tibi occurrent futuras, in altero caluariæ latere atramento oblittera, ut inde futuras quibus ossa distinguuntur, ex sententia promptius adinuenias. Ac primum omnium oculi sedis animū accōmoda, cōsideraturus quot nam illa efformetur ossibus: quorū nonnulla maxillæ superiori, alia capiti ascribuntur.^b Superior nanque huius sedis pars, frontis osse constat.^c Vertex autem huius sedis, quæ instar coni pyramidisque in arcum cogitur, osse componitur cuneiformi, magnam quoque exterioris lateris oculi sedis portionem (sed profundam) efformante, adeò ut cuneiforme os, secundum os: frontis autem, primum, in oculi sede numerari nihil prohibeat.^d tertium autem, ossium maxillæ primum numeratur, quod totum externū oculi sedis angulum, & inferioris ambitus mediam portionem constituit, reliquam autem inferioris ambitus oculi sedis partem ad superciliorū usque mediū, maximum seu quartum maxillæ os occupat, atque hoc etiam ipsius sedis inferiorem partem quodammodo totam efficit, inter ossa oculi sedem efformantia numero quartum.^e Quintum uerò oculi sedis os, in interno consistit angulo uersus anteriora, & iuxta sedis ambitum, estque id ossium maxillæ secundum.^f Sextum autem ossium sedem oculi constituentium, in interno etiam sedis reponitur latere, & posterius nuper dicto locatum, nobis maxillæ ossium tertiū censetur. Duo itaque oculi sedis ossa, ad capitis ossa referuntur, duo nimirum priora. & quatuor ad superiorem spectant maxillam, quatuor uidelicet postremò enumerata. Postquam hæc in oculi sede non oscitanter animaduuerteris, & futuras inspexeris quibus sex oculi sedis ossa terminantur, licebit exactius unumquodque maxillæ os priuatim suis futuris ad hunc modum circumscribere.^g Primum maxillæ superioris os, alteram ossis iugalis partem constituit, & nonnihil temporis superciliijque ac sedis oculi, totum uidelicet exteriorem angulum, in se comprehendit, non minimam malæ etiam portionem efformans. Committitur autem hoc primum maxillæ os, temporis ossi, interuentu^h futuræ, quæ duos processus os iugale efformantes iungit. Dein com-

D 2 mittitur

Primum r,
r, 1, 2 figur.
sec. Δ 1 figur.
ter. Θ 1 figur.
quart. Λ, Δ.
1, 2 fi. quintū
tū 2 figur.
sextū n 2 fi.

b 1 figur. in
sinist. oculi
sede.
c 1 fi. G, H.

d 1 figur. r.

e 1 figur. Δ.

f 1 figur. Δ.

g 1, 2 figur. Θ.

h 1, 2 fi. r, r.

i 1 fi. P. 2 fi.
gura Y.

mittitur ossi cuneiformi^c eius futuræ beneficio, quæ per caua temporū decliuīs ducta^d etiam in oculi sede conspicitur, huicq; primo maxillæ ossi & cuneiformi cōmunis est. In superiori parte^e necitur frōtis ossi, ea sede qua superciliij extremū habetur. Fit uerò hæc cōmissura illius^f futuræ beneficio, quæ à cauis temporū per oculorū sedes ad superciliorū medium fertur, frontisq; os à maxilla superiori & cuneiformi discernit. Inferiori autē parte insigni amplitudine primum os quarto ea futura cōpingitur, quæ tribus locis in cōspicuo est: ^g in cauo scilicet temporū sub osse iugali,^h in anteriori maxillæ regione iuxta malam,ⁱ & in oculi sedis inferiori parte. Sutura pars in cauis temporum conspicua, ab inferiori parte interualli futuræ os cuneiforme à primo maxillæ osse diuidētis incipit. à fine enim illo hæc futura oblique deorsum nonnihil in priora fertur, quousq; ad^k infimam malæ sedem, ubi hæc aspera inæqualisq; est, pertingat. Pars autem huius futuræ in anteriori maxillæ sede apparens, à mala oblique sursum ad oculi sedem contendit, ad mediā regionē inferioris ambitus oculi hīc sedem circumscribētis. Pars autem seu interuallum huius futuræ, primum os quarto cōmittentis in oculi sede cōspicuum, à medio inferioris ambitus sedis oculi per humiliora eius sedis retrorsum oblique uersus exteriora tantisper conscendit, dum ad infimam futuræ partem, cuneiforme os à primo maxillæ dirimētis pertingat. Ad hunc igitur modum primum os circūscribitur, quatuor (uti diximus) ossibus commissum: temporis scilicet ossis processui alteram ossis iugalis partem efformanti, dein cuneiformi ossi, frontis ossi, & quarto maxillæ ossi. ^a Secundum maxillæ os cæteris omnibus longè minus, & squamæ modo tenue, in interno oculi sedis angulo consistit, ubi^b foramen habetur, cui^c caruncula præest internum oculi angulum occupans: quæ in hoc creata dicitur, ne quid pituitæ ad oculorum sedes à cerebro expurgatum, in genas defluat, sed tota per id foramen in narium amplitudinem procumbat. Ossiculum hoc superiori parte^d modico interuallo futuræ terminatur, frontis os à superiori maxilla distinguētis. Quare etiam futuræ illius interuentu ossiculum id frontis ossi committitur. Ab hac futura, alia secundum posterius ossiculi latus descendit, quæ secundum ipsius ossiculi inferiora repens, per anterius ipsius latus sursum in eandem futurā denuò ascēdit, quam frōtis os à maxilla superiori dirimere diximus. Cæterum futura, quæ à iam dicta frontis os à maxilla discernente ad eum modum in orbem penè fertur, in posteriore ossiculi regione (quæ oculi sedis conum respicit) secūdo ossiculo cōmunis est, & illi quod tertium maxillæ nobis enumeratur. Ad inferiorem uerò ossiculi partem, & secundum anterius ipsius latus, futura hæc communis est ipsi ossiculo, & quarto maxillæ superioris ossi. Contingit itaque præsens ossiculum superiori parte frontis os, posteriori tertium maxillæ os, inferiori uerò anterioriq; quartum maxillæ os. Ossiculum istud quia laxè hæret, & anteriori parte quarto ossi harmonia uerius quàm futura iungitur, ipsumq; admodum tenue est, in caluarijs è terra effossis rarò occurrit: quòd in humida hac sede positum, facile putrescat: & ob laxum nimis cōnexum, promptè decidat. In coctis uerò caluarijs, & arte ad ossium disciplinam paratis, absque negotio seruatur. ^a Tertium maxillæ superioris os similiter ac secundum tenue, & squamæ modo cernitur pellucidum: & quando effringitur, intus sinibus aëre oppletis amplisq; scatere cernitur. Hoc paulo minus toto quadrangulū est, in interno latere sedis oculi repositum. ^b Superiùs terminatur futura frontis ossi, & superiori maxillæ communi. ^c Anterioriùs communem futuram cum secundo maxillæ osse adipiscitur. ^d Posterioriùs cum cuneiformi osse futuram communem exigit. ^e Inferiori parte, cum quarto maxillæ osse, communi futura donatur. Vnde etiam quatuor ossibus tertium hoc os cōnectitur, superiùs scilicet frontis ossi, anterioriùs secundo maxillæ ossi, posterioriùs cuneiformi, inferioriùs quarto maxillæ ossi. Interioriùs uerò quæ narium spectat amplitudinem, cum inordinata ossium compage intus in narium summo reposita, coit. ^a Quartum maxillæ os reliquorum ipsius ossium longè maximum, omnes sui lateris dentes excipit, ac uarijs futuris circumscribitur: quemadmodum & ipsum quoque os uarium est, huc atque illuc in plures locos pertingens. Primum itaque futura illa terminatur, quæ primum os à quarto discernit, eam dico quæ simul in^b cauis temporum, & in anteriori maxillæ regione, & ^d in oculi sede conspicitur. Deinde quartum os terminatur futuris, secundum maxillæ os & tertium ab ipso dirimentibus. ^c quæ secundum totam sedis oculi longitudinem in inferiori eius sedis parte, & in anteriori regione secundi maxillæ ossis, ducuntur. Ad hæc, iuxta superciliorum medium, quartum maxillæ os^f futura finitur, superiorem maxillam ab osse frontis disiungente. Hoc futuræ interuallum ducitur ab anteriori sede secundi ossis, ad exterius latus ossis nasi, eius lateris, cuius maxillæ superioris ossa nunc intueris, quod quintum maxillæ os cōstituetur. à quo quartum dirimitur, ^g futura à nasi summo iuxta ipsius externum latus deorsum ad nasi ossis longitudinem porrecta. Secundum uerò longitudinem ductus foraminum nasi, quartum maxillæ os ab illorum foraminum septo^h futura interstinguitur, secundum

Secundū maxillæ os.

Tertium maxillæ os.

Quartū maxillæ os.

c 3, 4. fi. 6
capitis d.
d 1 fig. Q.
e 1 fig. R.
f 1 fig. R, S,
T, V, X,
Y, Z.
g 4 fi. 6 ca.
ff.
h 1 fig. ab a
ad b.
i 1 fi. à b per
D ad Q.
k 1 fig. a.

a 1 fi. Δ.
b 1 fig. C.
c fi. 19. cap.
14. l. 7 a.

d 1 fi. ab V
ad X.

e 1 fig. ab V
secundū Δ,
et c deorsum,
ac illic rursus
sursum ad
X.

a 1 fi. e.

b 1 fi. à T ad
V.

c 1 fig. ab V
ad c.

d 1 fi. à T ad
d.

e 1 fig. à c
ad d.

a 1, 2 figura
Δ, Δ.

b 4 fi. cap.
6 ff.

c 1 fi. ab a ad
b.

d 1 fi. à b ad
D.

e 1 fi. ab X
secundum C

ad c, dein
ad d.

f 1 fig. ab X
ad Y.

g 1 fig. ab Y
ad c.

h 1 figura g.

i. fi. a. d. ad dūm humilimam septi sedem prorrepente. In posteriori uero sede quartum os à cuneiformi di-
H. stinguitur, ⁱ tum in oculorum sede, ^k tum etiam iuxta intimum dentem, ubi futura cuneiforme
k. fi. N. 2. os à superiori maxilla terminans cōsistit. In palati sine uersus interiora quartum os ^l transuersa
figura e. futura ab illo osse seiungitur, quod sextum maxillæ appellamus, quodq̃ hīc ad narium forami-
l. 2. fi. ab u. na cum suo coniuge reponitur. Atque has omnes futuras quartum os cum alijs sibi contermi-
ad t. nis ossibus habet communes, quibus ^m alia accedit quarto ossi dextri lateris, & quarto sinistri
m. 2. fig. à t. lateris ossi propria, secundum palati longitudinem prorrepens: & non solum in palato, uerum
per x ad z. & in narium amplitudine conspicua. ⁿ Deinde & in anteriori maxillæ sede eadem quoque fu-
n. 1. figur. h. tura sub naribus ea sede cernitur, ubi superioris labri sulculus consistit. Hīc enim futura appa-
ret utrorumq̃ laterum, quartis ossibus propria: quamuis linea potius quàm futura censi de-
beat. Ex hac suturarum frequentia quartum os terminante, haud difficulter colligitur, ipsum
sedecim ossibus committi. primo enim, secundo, tertio, quinto & sexto maxillæ superioris con-
nectitur ossibus, deinde frontis ossi, cuneiformi, & octauo capitis ossi, ipsi uidelicet foraminum
narium septo, ac demum quartum maxillæ os suo coniugi, seu alterius lateris quarto ossi iun-
gitur: quemadmodum & octo dentibus quarto ossi infixis, quoties superior maxilla sedecim
dentibus decoratur. Præsens os magna ex parte latera & inferiorem sedem narium constituit,
& ad hæc latera impenſe cauum est, & neutiquam solidum, sed cereis imaginibus intus uacuis
admodum eleganter simile. Huic ossi, præter alia ipsius foramina ^o unum accidit, quod ab infe-
riori oculi sedis regione incipiens, deorsum in anteriorem maxillæ partem porrigitur. Istud
ubi primum in oculi sede inchoatur, notabili interuallo superius ueluti ossea constat squama:
o. 1. fig. A in ubi autem in anteriorem maxillæ partem pertinet, iam penitus in osse exculptum uisitur, atq̃
oculi sede etiam interuallū notatu dignum apparet inter oculi ambitū & superiorem foraminis sedem.
positū, dein Hoc interuallum creberrimè non continuum est, sed ^p futura donatur, quæ huic quarti ossis
B. particulæ (ubi foramen consistit) propria peculiarisq̃ est. Quis uerò huius foraminis usus cen-
p. 1. figura i. scatur, in communi omnium caluariæ foraminū sermone exequar. in præsentia autem obiter
in illius mentionem incidi, quò aptius futuram quarto ossi propriam hīc recenserem: ne quis
forte, quum ipsam obseruaret, illam plura cōstituere ossa, ac altius quàm ab oculi sedis ambitu
ad foramen usq̃ ferri arbitraretur. Præterea in anteriori palati sede ad posteriorem incisioriorū
q. 2. fig. z. dentium regionem, aliud ^q foramen se offert, quartis maxillæ superioris ossibus commune, &
ex palato in narium amplitudinem spectans. Ad huius foraminis latera interdum ^r futura ap-
r. 2. fig. a, a. paret, aut potius linea, in pueris cartilagine oppleta, quæ quasi ad caninorum dentium antè
latus pertingit. Verum nusquam adeò penetrat, ut huius futuræ beneficio quartum maxillæ
s. 1. fig. cani- os in plura diuisum censi queat: ^s quod (ut paulò post dicam) canibus & simijs porcisq̃ ac-
na calua- cidit, in quibus futura quartum os in duo diuidens, non solum in palato, uerum exterius in an-
ria n teriori maxillæ sede, etiam conspicuè cernitur, neque ullam appendicum cum suis ossibus coa-
a. 1. fi. z. litus speciem refert. ^a Quintum maxillæ superioris os ex duobus nasi ossibus alterum est, os-
ficulum uidelicet durum, solidum, latum, tenue, oblongū, & quadrangulo potius quàm trian-
gulo simile. ^b Superiori enim parte non in acutum desinit angulum: uerum adeò obtusum est,
b. 1. fig. ab Y ut inibi duobus donetur angulis. Terminatur autem illic futura, frontis os à superiori maxilla
ad Z. dirimente. ^c Externum ossis latus communem futuram nanciscitur cum quarto maxillæ osse,
c. 1. fig. ab Y quæ secundū nasi latus tantū decliuſ pertingit, quanta quinti huius maxillæ ossis est longi-
ade. tudo, quæ in homine longè breuior quàm canibus & simijs uisitur. ^d Internum uerò ossis la-
d. 1. fig. à Z tus quo coniugi suo committitur, futuram obtinet harmoniæ non admodum dissimilem, ac
ad f. utrisque nasi ossibus communem. Hæc à medio superciliorum ex futura frontis ossi ac maxil-
læ superiori communi incipiens, decliuſ secundum ossium nasi longitudinem porrigitur.
^e Inferiori autem parte, quintum os futura haud intercipitur, neque alteri ossi iungitur, uerum
e. 1. fig. ab f hoc unà cum suo cōiuge asperum inæqualeq̃ est, & ^f in cartilaginem finit deorsum proceden-
ad c. tem, eoq̃ molliorem, quo longius ad nasi apicem defertur. hanc cartilaginem cum reliquis nasi
f. 4. museu- & totius corporis cartilaginibus priuatim post ossium enarrationē prosequemur. ^a Sextum
lorum tabu- maxillæ superioris os, cum suo pari non minimam palati & narium amplitudinis portionem
l. 2. K, L. constituit. Reponitur enim ad palati extremum, quā nares in fauces pertinent: estq̃ os tenue,
a. 2. fig. n. sed solidum, latumq̃. Id ^b posteriori sede partim cuneiformi committitur ossi, partim liberum
b. 2. fi. ab x est, semiparenthesis (formam referens. Vbi cuneiformi ossi cōmittitur, ^c illa circumscriptum
uersus c. est futura, quæ iuxta posteriorem intimi dentis sedem fertur, maxillamq̃ superiorem à cuneifor-
c. 1, 2. fi. c. mi osse dirimit, ea potissimū parte, ubi cuneiforme os ipsius educit ^d processus uespertilionū
d. 1, 2. fi. P. alis similes. ^e Anteriori parte & externo latere sextum hoc os futura terminatur ipsi & quarto
e. 2. fi. à t ad maxillæ ossi communi, ac transuersim in palato ducta, ^f Interiori autem latere, quo se coniugi
u. ^g suo
f. 2. fi. à t ad
x.

Quintum ma-
xillæ os.

Sextum ma-
xillæ os.

*Vniuersa su-
perioris ma-
xillae ossa esse
duodecim.*

*Non omnia
praesenti Ca-
pite haecenus
tradita, Ga-
leni placitis re-
spondere, quo-
rum quaedam ad
Capitis usque
finem recen-
sentur.*

suo iungit, futura quadam dirimitur, quae utriusque lateris sexto ossi duntaxat communis est, portioque illius existit, quae per palati longitudinem prorrepens, quarta maxillae ossa inuicem separat. Contingit igitur sextum os, cuneiforme os, quartum maxillae, & suum coniugem, & postremo narium septum: quod etiam a sexto osse, quemadmodum a quarto, ea dirimitur futura, quam ad septi humiliorem sedem duci, antea commemoratum est. Haecenus itaque sex alterius lateris maxillae descripsi ossa, quae si senis oppositi lateris connumerentur ossibus, omnia maxillae ossa confurgent duodecim, quibus nullum octo capitis ossium adieci. Ceterum si adamussim singula quae hoc Capite persecutus sum excusseris, ac demum non perfunctorie Galeni superioris maxillae descriptionem euolueris, permulta iam occurrerunt, in quibus ab illius placitis declinem, quae etsi omnia in praesentia (tuae fidens industriae) non commemorauero, nonnulla tamen subiiciam, e quibus meae siue diligentiae, seu oscitantiae (prout mea ueritati aut consona, aut dissona intueberis) specimen aliquod animaduertere queas. Galenus itaque in libro de Ossibus, futuras maxillae peculiare describitur, earum seriem a mala infima & extrema sede aggreditur, quam ego asperam inaequalemque esse recensui, quod hinc masseter musculus sui principij ualidissimam nerueamque admodum portionem educat. Hic igitur Galenus futuram describit, primum maxillae os a quarto dirimentem, primam appellans, eius futurae partem in cauo temporis conspicuam. Secundam uero numerat huius futurae partem in anteriori maxillae sede occurrentem, quae ab illa mala asperitate sursum ad medium inferioris ambitus sedis oculi pertingit. Hanc postmodum tripartito ait discindi, ac primam huius secundae futurae partem prope magnum seu internum oculi sedis angulum exteriori in parte ad medium superciliorum, & communem frontis & maxillae futuram inquit procedere. Hac futurae parte homines destituuntur, uerum in canibus caudatisque simijs est manifestissima. quamuis interim non exacte ad superciliorum feratur medium, sed ad eam tantum sedem, in qua quartum maxillae os a secundo dirimi dictum est. Hanc itaque partem, ut Galenum assequaris, ex canis caluaria petes. Porro secundam partem secundae futurae, inquit per concauum sedis oculi sub magno angulo ad communem capiti & maxillae futuram pertinere, hancque eundem angulum comprehendere. Haec pars ea esset futura, quam secundum & tertium maxillae ossa in inferiori ipsorum sede, a quarto dirimere docuimus. Verum haec in homine nequaquam secundae Galeni futurae committitur, multoque minus primam partem secundae futurae contingit, quum haec in canibus tantum & simijs, non autem hominibus cernatur. Porro foramen, quod huic secundae parti Galenus subiici scribit, id esse opinor, quod in oculi sede oblongum admodumque patulum est, inter quartum maxillae os & cuneiforme conspicuum. Terciam partem secundae futurae Galenus appellat portionem futurae primum os a quarto diuidentis, quae in oculi sede spectatur, una cum illa quae cuneiforme os a primo maxillae osse disiungit, atque in oculi sede etiam spectatur. Galeni enim est sententia, sub dictis duabus futuris (quae duae primae partes sunt ipsius secundae futurae) tertiam eiusdem partem inferiorem in sede oculi ambitum inscendentem interius ad imum contendere, ibique communi futura capiti & maxillae superiori iungi. His futuris Galenus tria maxillae superioris ossa circumscribi postea subiecit, quibus haec capiti committitur. Primum esset, quod ego primum maxillae statui, secundum, ea quae mihi secundum & tertium numerabatur: duo enim illa unius ossis loco ex Galeni placito recenserentur. Tertium, pars esset nostri quarti ossis, quicquid scilicet ipsius in oculi sede consistit, ea nimirum pars in qua foramen incipit, quod ab oculi sede in anteriorem maxillae regionem pertinet. Hic modo considerate exquirito, num Galenus maxillae ossa hucusque uerius quam ego, in homine enarrauerit, & quantum adhuc Galenus in simijs & canibus omiserit. dein, num Galenus ego ex rei potius cognitione, an interpretis uersione intellexerim, & cuiusmodi natatore Delio Galeni de maxillae ossibus tractatio indigeat: potissimum quando communis utilitatis uel parum studiosi quidam, uel etiam inuidi, Graecum exemplar ita supprimunt, ut nullis id rationibus quod aliquandiu mihi usurpandum traderetur, ab ijs obtinere licuerit: qui tamen praer Balamium, & Cardinalem Rodolphum, id se etiam habere fatebantur, sed ea conditione, mihi ne communicaretur. Verum interea omnem nauabo operam, ne illo libro, quemadmodum neque alijs etiam quibusdam Galeni libris ad Anatomen eguisse uidear, quos aut totos citra omnem usum recondunt, aut saltem correctiores a tineis (quum ipsis usui esse nequeant) erodi malunt. Quod uero Galenus peculiariter constituat ossa, quibus incisori dentes insignantur, hinc accidit, quod suis nimium fauens simijs, eas homini plus satis similes effingebat. In canibus enim & simijs porcisque ac alijs animalibus, quibus canini dentes ualidi exerciti obtigerunt, duae (uti prius dixi) uidentur futurae, aut harmoniae potius, admodum conspicuae, quibus homo destituitur. A futura enim quintum maxillae os, quod nasi alterum existit, a quarto

g. 2. fig. 1. 2.

h. 1. fig. 2.

a. 1. fig. a. in homine, in cane k.

b. 4. fig. 6. ca. pit. f. in temporis cauo. c. 1. fig. ab a. ad b. in homine. in cane d. k. ad l. d. 1. fig. in cane ab l. ad m.

e. 1. fig. ad x, non ad z. f. finge in. fi. a b per c. & d. ad T. continuam duci futura, uti in cane est conspicuum. g. 1. fig. D. h. 1. fig. ab secundum D. per Q. ad s.

i. 1. figurat. k. 1. fig. a. & o.

l. 1. fig. a. in oculi sede positum. atque id Galeni os quodammodo illic circumscribitur. b, c. d. h. d. m. 1. fig. a. in oculi sede.

Canina caluaria n.

distin

distingente, alia educitur futura, oblique deorsum inter caninum & incisorium canino proximum delata, quæ cum illa communis efficitur, quæ in palati extremo iuxta incisorios dentes transuersim in illis animalibus fertur. Hæc futura citra omnem cartilaginis interuentum adeo insignis est, ut quartum à me enumeratum maxillæ os, canes in duo diuisum commonstrent. Verum non arbitrandum est futuram hanc, inter dentium præsiapiola in canibus aut simijs ductam, à superciliorum medio deorsum continuo progressu (& si Galenus ita doceat) ferri, sed uti iam admonuimus, ex medio ferè ductu illius futuræ incipit, quæ externum nasi ossium latus terminat. Quod ubi in cane simia ue inspexeris, accuratè expendito, quàm impossibile sit, hanc futuram porrigi inter dentes hominis, maxillam adepti breuissimam, & dentibus caninis prorsus exiguis donati. Insuper animaduertito, quid in libris de Partium usu Galenus sibi uoluerit, quum duodecim superioris maxillæ ossa esse obiter scripsit: uti & Introductorij seu Medici autor, duodecim tantum maxillæ ossa, è Veterum indubie placito, enumerat: aut quum Galenus hæc ossa prolixius cōmemorans, nouem tantum recenset, nullumq; os priuatim incisorijs dentibus tribuit, in eo etiam numero cuneiforme os haud complectens.

Libro unde,
cimo.

DE MAXILLA INFERIORI, Caput X.



VTRARVMQVE DECIMI CAPITIS FIGVRARVM, ET
earundem characterum Index.

PRIOR seu dextra huius capitis figura, inferiorem maxillam unà cum dentibus anteriori facie exprimit. **Posterior** figura, inferiorem maxillam simul cum humiliori dentium serie posteriori sede delineatam exhibet. **Tabula** autem tertio præsentis libri Capiti præposita, ad characterem C, maxillam à latere delineatam ostendit.

- A**_{1,2} Maxillæ inferioris alterum caput, quo hæc superiori maxillæ dearticulatur.
B_{1,2} Ceruix, seu collum capitis A insigniti.
C_{1,2} Alterius lateris acutus processus, in quem temporalis musculus insertionem molitur.
D₂ D in umbra latitat, sinistræ figuræ amplum indicans sinus, cui in ore delitescens musculus inseritur, qui simul cum temporali & mansorio attollendæ seruit maxillæ.
E_{1,2} Asperitas ad posteriorem inferioremq; maxillæ sedē conspicua, ad quam mansorius inseritur.
F₂ In sinistræ figuræ umbra F foramen notat, tertij paris neruorum cerebri sobolem admittens.
G₁ Foramen, quo surculus nerui nuper dicti in humiliori labrum procidit.
H₂ In hæc tubercula maxillam detrahentes musculi implantantur, & quidā linguæ ab ipsis oriuntur.



NIMALIUM omnium homo inferiorem maxillam, pro totius corporis mole, breuissimam adipiscitur: asinus autem & equus inter quadrupeda ferè longissimam. Homini enim facies obtigit rotunda, non longa, ut reliquis animalibus: quæ, quoniam manibus carent, cibum assumptura, inclinantur. Duram autem hominibus maxillam, ut & cæteris animalibus fieri decuit, quod sola mobilis sit, & uarios atq; fortissimos motus in mordendo mandendoq; sustineat. Cæterum ne sic dura solidaq; nimio pondere ipsam mouentibus musculis incommode foret, sinus & cauitates notatu dignas, medulla p̄ infarctas exigit, interim appendicis undiq; expers. Sinus hi non adeo in posteriori maxillæ parte, ac in quadrupedibus exculpuntur, sed antrorsum magis uersus menti regionem, & ad maxillæ latera. Plurimis animalium maxilla duobus constat ossibus in summo mento, ubi ma-

Homini breuissimam obtingisse inferiorem maxillam.

• *Maxillā ho-
mini ferē uni-
co osse extrui.*

*Duo utrinq;
maxillæ pro-
cessus.*

*Peculiaris in
maxillari arti-
culo cartilagi-
nis effigies.*



*Maxillæ fo-
ramina.*

*Dentium al-
ueoli.*

*Maxillæ in
posteriori se-
de amplitudo,
tenuitas, sinus,
asperitates.*

xilla illis in acutum definit, mutuò per unionem nexis. Homini autem, unico conformatur osse, ac in summo mento lata, neque ut in cæteris animalibus, acuta cernitur. Nulla enim parte maxilla difficilius quàm hîc discinditur. Præterea coctione, aut carie in terra illam dissolui, nōdum animaduerti. & quanquam cū alibi, tum præcipuè Parisijs in Innocentiū cemiterio maximam inferiorum maxillarum (uti & cæterorum ossium) frequentiam conspexerim, nullam tamen unquam in duas bipartitam partes adinueni. Canum uerò, boum & asinorum maxillæ, etiam citra coctionis beneficium, inuicem paruo conatu interdum diuelluntur. Quamuis interim Galenus, & alij plerique post Hippocratem dissectionum periti, maxillam non unicum esse os asseruerint, sed coctum in summa menti extremitate laxari, ob idq; ipsum coaluisse manifestum indicium esse. Vtunque sit, hætenus nulla hominis maxilla mihi gemino constructa osse (uti & prius dicebam) occurrit. & quamuis fortè inter tot hominum myriades in canino aliquo homuncione, aut puerulo talem quampiam maxillam aliquando obseruarem, non tamen ideo mox asseram, hominis maxillam duplici osse constare: quin Celso potius, aut illi Græco auctori ex quo Celsus quicquid de ossibus prodidit mutuatus est, accedam, qui cum Galeno canes parum curans, maxillam simplici osse componi docuit. Et quamuis hæc in pueris duobus ossibus per unionem nexis efformaretur, non ideo tamen simpliciter duplici osse maxillam formari rectè diceremus, nisi etiam occipitijs os, uertebras, & ossa quæ sacri ossis lateribus committuntur, pluribus effingi ossibus donaremus. si quidem hæc in pueris compluribus ossibus mutuò per unionem commissis extrui, nemo negauerit. Inferior maxilla utrinque in duos definit processus, quorum^a alter in mucronem productus, musculi temporalis tendinis insertionem ualidissime excipit, totus ab illo tendine complexus.^b Alter, qui posterior est, in capitulum transuersum oblongum finit, quod sibi correspondenti^c sinui inarticulatur, qui ad iugalis ossis radicem & anteriorem auditus organi sedem in temporis osse incisus est. Huic sinui, ut & capitulo maxillæ, cartilago crustæ modo obducitur. Verum præter hanc cartilaginem omnibus articulis pariter communem, inter sinum capitulumq; alia reponitur cartilago læuis, tenuis, & mollis, ligamenti^d naturæ quod ad substantiam spectat, nō nihil compos. Hæc ossibus nusquam adnascitur, sed tantum ligamenti articulum in orbem continentibus. Istius cartilaginis beneficio, durorum præsentis articuli ossium impetus exoluitur, & quo minus mutuo affricu in ualidis assiduissq; maxillæ motibus ossa rumpantur, scitè præstat, unà cum cartilagine sinui & capitulo obnata. Ad hæc, inferior maxilla duobus utrinque donatur foraminibus, atque^e alterum quidem in interiori ipsius regione, non procul à nunc commemoratis processibus, cernitur: ^e alterum uerò, in exteriori sede ad labri inferioris radicem, latusq;. Interius, quod & amplius, & inæquale seu asperum est, uiam præbet^f portioni nerui tertij paris neruorum cerebri ad dentium radices dispersæ, unà cum uenula & arteria, quæ dentibus & inferiori maxillæ nutriendis, hoc foramen subeunt. Exterius uerò, eius nerui^g sobolem ex maxilla in humilior labrum finit procidere, estq; longè minus interiori. Porro si setam exiccatae maxillæ interno foramini indideris, eam ab hoc foramine ad externum usque leui opera ferri conspicias, & si maxillam effregeris, continuum iter ab uno foramine in alterum canalis modo cælatum obseruabis. Præter hæc foramina in maxillæ externa superficie alia prorsus nulla reperiās, nisi fortè & alueolos præsepiolæq; illis annumerare lubeat, quibus dentes instar clauorum infigi mox trademus. Quod uerò horum sinuum alueorumq; gratia, inferior maxilla crassior sit, hinc potissimum constat, quod in uetulis, illisq; quibus dentes eruti sunt, ac in quibus ipsi dentium sinus succreuerunt, maxilla ab imo sursum multo tenuior & angustior efficiatur. Maxilla ubi dentes ipsi non infiguntur, ea^h sede qua commemoratos nuper educit processus, latissima, & si latera spectes, tenuissima,ⁱ intusq; acⁱ exterius quasi amplo & in superficie tantum cauato sinu insculpta uisitur, quò aptius musculi maxillam, præter temporalem musculum attolentes, insertionem molirentur, ^k isq; qui illorum in ore delitescit, minus sua crassitie ac mole faucium angustiam infarciret: adeò, ut intus magis quàm foris, maxilla meritò insinuetur. Quinetiā huic latiori maxillæ sedi id separatim accidit, quòd aspera inæqualisq; cernitur, idq; potissimum iuxta huius sedis^l inferiorem posterioremq; regionem. quod etiam musculorum insertionis occasione rerum Opifex machinatur, non ignorans asperis inæqualibusq; locis promptius aliquid adhærere, adnasciq; quàm planis & glabris. Cæterum hac etiā gratia interior maxillæ sedes ad mentum^m aliquot tuberculis asperitatibus ue extuberat, utⁿ musculi (quorū ope ipsa deorsum trahitur) suam insertionem ualidius conficerent, ac deniq; ^o nonnulli linguæ peculiare musculi hinc aptius enascerentur. Tale quid etiam usuuenit in externa inferioris maxillæ sede, ad summi menti regionem,^p ut hac ratione labri humilioris musculi commodius illinc, pronascerentur,

*a 1, 2 figura
C. & 6 mus-
culorū ta-
bulæ, A, B.
b 1, 2 fig. A.
B.
c 5 fi. 6 ca-
pitis h.*

*d 2 fig. F.
e 1 fig. G.
f 2 fi. carie
quæ 2 ca. 4
lib. præpo-
nuntur T.
g dictæ fi-
gure V &
h musculo-
rum tab. G.*

*h 2 fig. D.
i 1, 2 fi. E.*

*k 6 muscu-
rum tabulæ
D.*

l 1, 2 fi. E.

*m 2 fig. H.
n 5 muscul.
tab. H, I.
o 1, 2 fi. 19
cap. l. 2 H.
p 4 mus-
tab. N.*



PRAESENTIS VNDECIMI CAPITIS FIGVRAE,
ac ipsius characterum Index.

H A C figura tam superioris maxillæ, quàm inferioris dentes, in altero latere exprimuntur. quum enim utriusque lateris par sit ratio, abundè est alterius lateris dentes ex maxillis erutos delineasse. Si uerò dentes maxillis adhuc infixos contemplari uisum sit, superioris Capitis, figuræ inferiorem commonstrant seriem, quemadmodum tertia & quinta sexti Capitis figuræ superiorem. ubi & quarta eius Capitis figura alueolos promptè ostendit, quibus dentes infiguntur. Quandoquidem ex caluaria, quam illa figura expressimus, studio superioris maxillæ dentes euulsimus.

A A. Dextri lateris octo superiores dentes.

B B Dextri lateris dentes octo inferiores.

1, 2 Duo dextri lateris incisori.

3 Dens caninus dexter.

4, 5, 6 Quinque molares dextri. Hunc numerum & inferiori & superiori dentium classi accommodare integrum est. Nomina autem dentium, cum uarijs reliquorum ossium nomenclaturis, ex huius libri calce sumenda ueniūt: quòd in eum locum nomina, quæcunque mihi hætenus occurrere, duxerim reijcienda.

C Basis notatur molaris dentis.

D Acies dentis incisori.

E Media molaris dentis pars hic delineatur, sinum in dentibus conspicuum ostensura.



L X OSSIBVS solos dentes sentiendi uim obtinere, Galenus nō perfunctoriè attestatur, asserens se quoque dentium dolore uexatum, atque tum diligenter animum adhibuisse num dentes ipsi doleāt: sensisseq; manifestò dentem nō modò dolere, uerum etiam pulsare, carnibus inflammatione obsessis non dissimiliter. Applantātur enim dentium radicibus molles quidam neruuli, à tertio neruorum cerebri coniugio propagati, quorum gratia dentes duntaxat euidenti inter ossa sentiendi facultate donatos credimus. Cæterum nonnulli Galeno haud acquiescentes, colligunt, dentem, quum os sit, citra dolorem affici: quemadmodum cum lima excessus dentium præsecare, aut ignitis ferris eos aliquando exurere cogimur. At quum in huiusmodi artis operibus ipsos sensu præditos subinde experiamur, & à frigore potissimum molestari cognoscamus, meritò laudandus est immēsus rerum Opifex, quem cæterorum ossium solis duntaxat dentibus notatu dignam sentiendi facultatē largitum arbitramur. Nouerat enim hos crebrò occursuros ijs quæ secant, uel frangunt, uel rodunt, uel ualide excalefaciunt, aut refrigerant, uel alia quauis occasione alterant: quibus omnibus dentes multò aliter, quàm reliqua ossa, nudi exponuntur. Quamobrem, si nulla sentiendi ui pollerēt, à dolore homo neutiquam admoneretur, neque denti succurreret, quod infestat amoturus, priusquā molestati dentes uitarentur. Porro dentes non solum sensu, & quòd nudi sint, ab alijs ossibus distingui creduntur, uerum etiam quia hos plus cæteris ossibus semper enutrirī, & quouis tempore uitæ incrementum accipere, ideo præcipuè arbitramur, quod dentes illis quos exemimus oppositi, subinde in eruti dentis locū extra reliquam dentium seriem succrescant: ob hoc uidelicet, quod contrarijs dentibus non amplius atterantur. Reliqui enim dentes tantum augentur, quantum læuigandis cibis comminuuntur. Sunt autem plurimum dentes numero triginta duo, una serie in utraque maxilla sedecim, instar iustissimæ choreæ siti. ^b Quatuor priores aduersiue quia secant, incisori uocantur: sunt enim lati & acuti, quò oblatum ipsis cibum mordendo cultri modo promptè abscindant, diuidantq;.

*Dentes senti-
re.
Libro quinto
de Medica-
mentorū com-
positione secun-
dum locos.*

*Dentit à cæ-
teris ossibus dif-
ferentia.*

*Dentium nu-
merus.*

Incisori.

Deinceps

Canini. Deinceps^c canini utrinque singuli constituuntur, ampli quidem sua basi gingiuis proxima: ipforum autem fine à gingiuis remoto, acuti, ut si quid propter duritiem ab incisorijs non præscinderetur, hoc illi confringerent. Porro ipsis id nomen inditum est, quòd exercitis canum (qui *Charact. 3.* hos habent insignes) dentibus respondent. Post hos, maxillares seu molares quini ab utroque latere habentur, asperi, ampli, duri & magni, quòd incisa ab incisorijs, effracta à caninis in læuorem exactum terere possint. Si enim prorsus læues crearentur, idonei ad proprium munus minimè existerent: quoniam ab inæqualibus asperisq; omnia melius teruntur. Propter hoc ipsum & molas, quibus fruges moluntur, temporis processu diuq; minuendo læuigatas, rursus incidi atque exasperari uidemus. Neque si asperi quidem essent, non autem duri, plus commodi ex ijs esset, ut qui prius contererentur, quàm cibos in læuorem comminuerent. sunt enim dentes omnium ossium durissimi. Quinetiam, si asperi & duri facti, non essent unà & ampli, neque tales plus accommodarent illis concredito muneri, si modo quæ læuissimè atteri debeant, in amplis firmari basibus oporteat. Incisorijs enim & caninis nihil cōminuitur, propter strictam & angustam ipsorū aciem. Quid si hæc omnia molares adipiscerētur, at interim parui essent, nonne & hoc solo illorum usus corrumpetur: quum plurimo atterendis cōminuendisq; cibis tempore indigeamus. Dentes ad unum omnes in maxillarū sinibus clauorū ritu infiguntur, qui propter imaginem, quam cum præsepibus brutorum habent, Græcis *ποδωνια*, Latinis præsepiola nuncupantur. Hi nanq; singulis circundantur dentibus, hosq; stringunt atq; adeò exactè retinent, ut non promptè uel tantillum commoueantur. Neque paribus radicibus omnes suis inseruntur præsepibus, quando quidem paruis una radix, duæ uerò maioribus, tres & quatuor maximis obtigerunt. Incisorijs enim singulis immittuntur radicibus. Canini quoque radices singulas exigunt, qui incisiorum radicibus multo altius infiguntur, tantoq; maiores sunt quantum caninorum robur excedit. Quanquam & inter incisorios duo medijs insignioribus hæreant radicibus, quàm duo laterales, caninis proximi, nimirū quòd medijs latiores grandioresq; sint. Molares radicibus inter se uariant, nam qui maxillæ inferiori sunt infixi, binis radicibus: qui superiori, ternis, subinde infiguntur. Differunt tamen & hi interdū, qui nanq; suprā sunt, quaternis: qui infrā, ternis radicibus immitti aliquādo deprehenduntur, præsertim duo denti intimo proximi. Dein frequentissimè duos molares superiores canino denti succedentes, duobus tantum immitti radicibus spectabis, tres reliquos ternis: sic & duos inferiores canino proximos una radice, tres reliquos duabus. Præterea obseruabis quoque omniū intimos minoribus infigi radicibus, quàm illis attiguos. Incisiorum & caninorum numerus, rarò in hominibus ut molarium, mutatur. Interdum enim in utroque latere quinque molares occurrunt, interdum quatuor: nonnunquam quatuor à sinistris, quinque uerò à dextris: uel contrā in sinistris quinque, ex dextris quatuor: uel infrā quatuor, suprā autem quinque. quam differentiam potissimum pariūt postremi dentes, quos plerique genuinos uocant, etiam si Cicero ita molares uocauerit. Sunt autem illi, qui primum post pubertatem uenerisq; usum hominibus cum maximis subinde cruciatibus prodeunt: id quod medici parum obseruantes, aut alios dentes euellunt, aut humorū uitio eos infestari sibi persuadentes, ægros catapotijs atq; id genus pharmacis obruunt, quum dolore affectis nullum leui gingiuarum ad postremum dentem scarificatione, ac interdum ossis pertusione, præsentius remedium adferri possit. id quod ipse etiam modò experior, cui hæc scribenti trigessimus secundus dens ætatis uigesimo sexto anno succrescit. Atque id etiam arguunt permultæ caluariæ in cemiterijs occurrētes, in quibus posteriores illi dentes ueluti in cauea quapiā adhuc reponuntur ac latitant, quibusdā suæ basis apicibus os tenuissimum perforantes. Cuiusmodi caluariam nuper mihi exhibuit humanæ fabricæ quàm studiosissimus ac ualde peritus iuuenis, IOANNES PAVLVS GVLDCIVS VRBINAS, mihi amicissimus. Cæterum Aristoteles, alijsq; complures uiris copiosiores dentes quàm mulieribus ascribunt: quòd cuius non minus promptum est experiri, quàm mihi falsum id esse dicere, quum nulli nō dentes numerare liceat: ex quorū frequentia plerique etiam uitæ longitudinem breuitatemq; arguunt. Dentes non solum dictos nunc præstant usus, uerum etiam ad uocis modulationem iuuant, quum dura lapideaq; conformentur substantia, exiguas, sed notatu dignas cauitates intus obtinente: quæ ut dentes leuiores sint, commodiusq; accipiant nutrimentum, occasionem præbent. Atque huius cauitatis causa, si quādo dentibus foramina ex humorū acrium erodentiumq; influxu oboriātur, quæ ad eam cauitatem usq; pertingāt ocyssime dentes ad radicis usq; extrema eroduntur. Deinde puerorū dentes imperfectis & mollibus & quasi medullosis cōstare radicibus, non prætereundum est: quemadmodum & pueris dentium partem extra gingiuas conspicuam, dentis radici appendicis modo committi. Atque id quidem uel pueri didicimus, quum nobis socijsq; uacillantes dentes,

Dens molaris C insignitur.

In ca. initio cam quæ sepius occurrit radicem seriem expressimus.

Dens E insignitus.

dentes, & præcipuè incisorios, unguibus aut filo denti circumdato, eximere cōsueuimus. Quin & in mulis quoque, ac multis canibus dentium reſeruatis radicibus, ipſorum appendices proci dere indies obſeruamus. Atque poſtremum illud proſectò accuratiſſimè expendendū eſt, ne pueris effracti alicuius ex caſu dentis reliquam portionem unquam eruamus, ſed duntaxat ap pendicem, in cuius locum alia (modò radix ſeruetur) promptè ſuccreſcet. Dein plurimum id quoque in pueris animaduertiſſe cōducit, quibus mox ab ineunte ætate molares dentes erodi uitiariſq; ſolent. In hiſ nanque operæ præcium eſt, molarium dentium appendices (quæ non ita ut incisoriorum proci dere in ipſis ſolent) auferre, quò nouæ earum loco ſuccedant, dentesq; integri ſeruentur. Si enim appendicum unio ætatiſ progreſſu firmetur, appendix nunquam decidet. quinimò uel pubertatiſ tempore aliquot dentes cum radicibus, ob eroſionis uitium, plerunque ueniunt eruendi.


DE OSSIVM CAPITIS ET MAXILLÆ
superioris foraminibus. Caput XII.



VANDO QUIDEM in uenarum, neruorum & arteriarum deſcriptio nibus, foraminum capitiſ ignorantia non modicum obſcuritatiſ paritura eſſet, dein quia in illiſ enarrandiſ (quū cognitu ſint difficillima) Anatomicorum præcipui multum aberrauerunt, operæ præcium iam duxerim, hoc Caput omniſ capitiſ foraminib; dedicare, ac ſingula quæ accurata di ligentiſq; ſectiōne maniſeſtò deprehendi, modò recenſere, ut in uaforum & neruorum quarundamq; membranarū cerebri enarratiōe, huc ſtudioſuſ diſcendiſq; cupiduſ lector recurrere poſſit, & foramen cuiuſ mentiō incidet, perpetuò in pro cinctu habeat. Vt uerò id fiat compendioſiuſ, quatuor figuraſ præſenti negotio famulanteſ, huc reponam, unumquodq; foramen cum ipſi præfixo caractere ſeorſum ita enarraturuſ, ut ſermo ſimul caracterum Indiciſ & Capitiſ contextuſ uiceſ opportune ſuppleat. Inde ſi caſu, aut ex induſtria aliquiſ ſinuſ uel proceſſuſ antea fuerit omiſſuſ, illum etiam nunc deſcribam.


Cur foraminū
deſcriptio inſti
tuatur.

PRIMA XII CAPITIS FIGVRA.




PRÆSENS figura anteriorem caluariæ ſedem exprimit, ac proinde omnia etiam foramina in oculi ſede maxillaq; ſuperiori, in hac ſuperficie apparentia, proponit. Caninum autem caput humane caluariæ ſubiectum, iam priuſ maxillæ ſuperioris oſſibuſ ſutu riſq; indicandiſ unice, perinde ac tota hæc figura, iuuat.


SECUNDA DVODECIMI CAPITIS FIGVRA.



HAC figura calvariae basis exteriorem faciem, quā palatum respicit, delineauimus. Nos enim hic caluam, seu caluariam, aut capitis ossa non octo illa quae prius in sexto & nono Capitib. ossa capitis uocata sunt, nominabimus: aut cum Aristotele capitis tantum partem capillis tectam: uerū octo illis ossibus maxillā superiorem adijciemus, idq; caluariam seu caput modò dicemus, quod in cemiterijs passim reperitur, & calvariae loco pingitur. Quòd autem suprā capitis ossa à maxillae superioris ossib. distinxerimus, Galeni nomine & euidentioris doctrinae studio factum fuisse, haecenus abundè licuit colligere.

TERTIA DVODECIMI CAPITIS FIGVRA,
INTERNAM CALVARIAE BASIM COMMONSTRANS.

QVARTA



QVARTA, internam caluariæ sedem superioris ipsius partis ostendit, quam à tertiæ figuræ caluaria ferra ita resecuimus, ut caluariam cerebri harmoniam ostensuri diuidere solemus. Age igitur characterum indicem aggrediamur, & singulis characteribus eius figuræ cui peculiare sunt, numerum subijciamus, prius adhuc admonentes, nō parum foraminibus quibusdam intelligendis eam figuram iuuare, quæ octaua sexti Capitis habebatur, interiorem ostendens ossis cuneum referentis, & octauæ capitis ossis, quæ cerebrum spectat superficiem. Eam enim figuram cum interna tertiæ huius Capitis figuræ sede, secundum cuneiformis ossis & octauæ capitis ossis descriptionem, conferre plurimum conduxerit.

A 1 Foramen ad medium superciliij incisum, quo^a ramus minoris tertij paris nervuorum cerebri radicis ex oculi sede ad frontis musculosam cutem dispergitur. Hoc in utroque latere non semper perfectū orbiculareq; existit foramen, sed subinde sinus duntaxat semicirculū ritu exculptus apparet. Aliquando in uno quidem latere foramen, in altero autem semicircularis tantū sinus, perinde atque hīc in prima figura, cernitur. Foramen hoc frontis ossi proprium est, quod aliquot I prima huius Capitis figura insignitum cernitur. Verū non est, quod aut hīc in orationis contextu, aut in margine os aliquod adnotem, quum character foramen indicans, etiam os cui id insculpitur, promptē doceat.

B 1 Foramen, quo dictæ minoris tertij paris nervuorū cerebri radicis^a foboles, ex oculorū sede in genas ad superioris labri & alarū nasi musculos procidit. Præsens foramen instar oblōgi meatus in quarto superioris maxillæ ossē sculpitur, & in anteriori maxillæ sede ubi in prima figura B ponit, foraminis huius ductus penitus in ossē cælatur. Per oculi uerò sedem, tantū tenui ac squamæ similimo ossē tegitur: quam regionem ^a in oculi sede conspicuo, insigniuimus.

C 1 Foramen nunc cōmemorato amplius, quod ex magno interno ue oculi angulo in narium cauitatem rectā deorsum pertinet, secundo superioris maxillæ ossi, & quarto pariter cōmune. Istud^a portiunculæ minoris tertij paris nervuorum cerebri radicis uiam præbet, & nonnihil pituitæ ex cerebro ad oculi sedem confluentis, ad nares transmittere creditur. Cæterū præter id foramen, aliud quoque grandius pituitæ ex oculi sede in narium amplitudinem, hincq; magis ad fauces quàm nasum defluxui, præparatur. Quod quū profundius latitet, neq; ullo pacto præpositis iam figuris indicari possit, quartam adito figuram sexto Capiti præpositam, à qua iugale os (quò cauum temporis exactius oculis subijceretur) execuimus, illi figuræ ^a ascribentes, ut saltem foraminis huius in cuneiformi ossē incisi sedes indicaretur. Quo autem id magis in caluarijs cōspectum fugit, eo minus quoq; mirandū est, hoc quacunq; etiam dignum sit animaduersione, dissectionis procures latuisse.

D 1, 2 Præfens foramen omnium quæ in oculi sede conspiciuntur, facile maximum occurrit, & dictæ iam sæpius minoris tertij paris neruorū cerebri radicis^a ramulo uiam dat, in temporalem musculum & mansorium ex oculorum sede porrecto. Neque huius duntaxat neruuli nomine patens illud oblongumq; foramen exculptum est, at musculi temporalis exortui hinc quoq; robur accedit. Ad hæc pituitæ, ad grandius in narium cavitatem pertinens foramen (quod ^o expressimus) defluenti, uiam præbet. Quinetiā præparatum uidetur^b neruulo cuidam, quem iuxta quinti paris neruorum cerebri radicem educi, nos primū obseruauimus. Quippe neruulus ille per proprium foramen paulo posterius **H** notandum porrigitur in temporalem musculum & mansorium, illumq; qui in ore delitescens, etiam attollendæ maxillæ famulatur. Cæterum rima hæc, seu oblongum foramen **D** insignitum, ad cuneiforme os, & quartum os maxillæ superioris pertinet.

^a 2 fi. 2. ca.
lib. 4. Q.

^b 2 fi. 2. cap.
libri 4. d.

E 1, 3 **E** in tertia figura posito, & **E** in utrisq; oculorū sedibus primæ figuræ foramen indicatur, in sedis oculi radice seu uertice elatissimū, & in cuneiformi ossē incisum, quod foris quæ oculi sedē spectat, prorsus orbiculare cernitur, neruo uisorio (cuius gratia exculptum est) amplitudine respondens. Verū interius ubi cerebro propius accedit, iuxta externū ipsius latus, exiguum eundemq; acutum obtinet angulū, qui uenulæ cum uisorio neruo hac excidente paratur. Angulum hunc **γ** notat. Is namq; inter **E** & **γ** in tertia huius Capitis figura consistit.

^a 13 fi. l. 7
N. O.

F 3 Huic sinui cuneiformi ossi inciso, uisoriorum neruorum^a coitus innititur.

^a 13 fi. lib. 7
M.

G 1, 3 **G** in primæ figuræ sinistra oculi sede occurrit, in tertia autem figura **G** dextrum eius figuræ latus ideo occupat, quod in sinistro latere foramen **G** indicatum, nusquam obuiū sit, eò quod

Lib. 9. de V.
supartium.

Quoniā præfens foramen obscure in huius Capitis figuris cernitur, hic foraminis dextri lateris effigiem delineavi, atq; humiliores ipsius partem **d**, superiorem uero seu eiusdem foraminis angulum insigniui. Quamquam utriusq; lateris foramen etiam pulchrè in octaua sexti Capitis figura in conspectu sit.



huius figuræ caluaria in latus uel istius foraminis aliquo modo uidendi nomine, inflexerimus. Insculpitur autē cuneiformi ossi, ac humiliori sui parte paulo minus toto orbiculare est, elatiori uerò in acutum longumq; & angustum desinit angulum. Foramen hoc, etiā si Galeno secus uisum sit, nerui uisorij foramen amplitudine uincit. & si similiter atq; illud prorsus orbiculare esset, facile triplo, aut quadruplo amplius efficeretur. Nihilominus tamen humilior ipsius pars, quam paulo minus toto orbicularem esse diximus) uisorij nerui foraminis amplitudinem adhuc

^a 14 fi. 7 li
bri G.
^b eadem figuræ H.
^c fig. ca. 14.
lib. 3. X.
^d eadem figuræ G. & 13 fig.
lib. 7 H.

longè superat. Præfens foramen cælatur gratia^a secundi paris neruorum cerebri, in oculi sedem ad mouendos oculi musculos progredientis, dein gratia^b minoris tertij paris neruorum cerebri radicis, quæ frontis cuti, superioris maxillæ in facie musculis, in nares & musculos inferioris maxillam attollentes, digeritur. Hæc quidem per humiliores foraminis sedem procedunt, unā cum^c insigni ramo soporalis arteriæ, quam reticularem plexum in homine quidam efformare comminiscuntur. Verum per elatiorem foraminis sedem, quæ in angustum longumq; angulum cogitur, uena ex oculorū sede, ab illis quæ temporalem adeunt musculum, duræ membranæ hinc distribuitur, & suæ distributioni in caluariæ basi sinus inibi exculptos gerit, uenularum tuberibus congruentes, & in ea caluariæ sede conspicuos, cui in tertia figura **2** inscribitur. Neque profectò neruis his duntaxat, & uenæ, & nuper dictæ insigni arteriæ, amplum id foramen excuatur: uerum etiam pituitæ ex cerebro in oculi sedem, & hinc in narium amplitudinem promananti, quemadmodum sectio luculentissimè iuxta ac iucundissimè ostendit, adeò ut nulla ratione magna hæc foraminis amplitudo, neruis illis, & uenæ, & arteriæ par conspiciatur.

H 1, 3 Foramen orbiculare, & in ossē longius quàm duo proximè commemorata procedens, & arctius quoq;. Hoc in cuneiformi ossē cum reliquis^a neruuli gratia exculpitur, quem nō procul à præcipua quinti paris radice pronasce audies. Præfens foramen in tertiæ figuræ dextro latere sub **G** positū, paulo grandius uisitur foramine in sinistro latere conspicuo, quod interdū præter neruulū illum etiam tertij paris^b minorem radicem transmittat, quam per foramen **G** insignitum deduci, paulo superius commemoratum est.

^a 14 fi. lib. 7
L.

^b 14 fi. 7 li
bri H.

I 3 Hac sede in octauo capitis ossē^a multa, sed exigua spectantur foramina, odorū & aëris in inspirationibus ad cerebrum ingressus nomine, incisa. Hæc non ut hætenus dicta, ipso ductu recta sunt, & utrinque peruia, sed obliqua, & anfractuosa, spongiarumq; foraminibus similia. Inter reliqua tamen utrinque unum est rectum & grande satis, quod primū in quodāmodo est, & anticæ frontis ossis sedi proximum, uenam ad duram cerebri membranā ex narium amplitudine exporrectam transmittens. Verum cætera interim foramina, etiam recta & utrinque pertusa uiderentur, si modò interiora narium ossicula in ipsorum summo nō pari semper numero reposita, & insigniter fungosa, & nonnihil membranæ cartilagineæq; eximerentur.

^a 12 fi. lib. 7
E.

^b 13 fi. lib. 7
G. & fi. ca. 14 lib. 3 H.

Num

C12 fig. 7 li.
bri E.
d eadem fi-
gura D.

α 8 fi. 6 ca.
C, D.

M 3

A diagram of a wine glass with a cross-shaped base. The bowl of the glass is labeled 'B'. The four arms of the cross-shaped base are labeled 'C', 'D', 'E', and 'F'.

ratius intelligen-
do nō inutilis est,
hic illā adieci, A
glandulam indi-
cans, cui pituita
influit. B peluim
ex tenui membra
na cerebri extru-

a 15 ft. 7 li

a. b 14 fi. l
bri 7 l, K
C 2 fi. 2 ca
4 li. M Z

R 2,3 Rursus ad externum foraminis *Q* indicati latus, aliud multo minus hoc, & exacte orbiculatum, in cuneiformi osse cernitur, quo internæ iugularis uenæ portio à soporali abscedens arteria, caluariam subintrat. Aliquando exiguum foramen ad internum latus foraminis, duo nuper cōmemorata neruorum paria transmittentis, obseruatur, eiusdem uenæ ramulo paratum. Verum id in uno caluariæ latere rarò uisitur, atque adhuc multo rarius in utroque. Nos tamen id foramen sinistro lateri (quod inter cæteras caluarias una hoc donata foramine obtigisset, quæ cæteris omnibus elegantior uisa est) hîc quoque appinximus, ac **S** in secunda & tertia figuris insigniuius. Ab hoc foramine sinus per interiora caluariæ ascendunt, conuexo dimidiatæ uenæ congruentes: & in hoc cælati, ne caluariæ os^d sinus in dura cerebri membrana uenarum modo ductos, premat constringatq̃. Hos caluariæ sinus in tertia figura & quarta aliquot **T**, **T** notauimus.

c fi. ca. 14. libri 3 F.

d 1 fi. 7 lib. D, D.

T T.
V 2 Foramen hoc in externa caluariæ basis sede obuium, cōmodè uideri nequit. hinc enim oblique uersus exteriora protensum, in auditorij organi cavitatem temporis ossi insculptam desinit. Quare etiam id paulo post cum aliquot auditorij organi foraminibus delineatum, rursus subiiciam. Efformatur autem id, ut uiam porrigat quintæ coniugationis neruorum cerebri^b ramulo, ab auditus organi cavitatem hâc ad musculos inferiorem maxillam attollentes excurrenti. Insuper hoc etiam foramine iugularis internæ^c soboles, auditus organum petit. ac aer etiam in temporis ossis antrum auditus organo proprium, per id foramen fertur. Id quod facile perciperis, si attracto in os aëre, illum quasi per aures propellere conaberis, in auribus sonum percepturus uentorum, aut aquæ turbinum sonis parum ab similem.

a Præcipua pars figuræ 8 capitis. b 2 fi. 2 cap. libri 4. b. c fi. ca. 14 libri 3 n.

X 2,3 Insigne foramen maiori soporalis arteriæ^a ramo caluariâ ingredienti excauatum, quod non rectâ caluariâ perforat, sed instar oblongi meatus, ex posterioribus oblique introrsum in priora temporis ossi insculpitur. Ossis pars hoc foramine peruiâ, ubi deorsum ad fauces spectat, ac in secunda figura ce notatur, instar pumicis aspera inæqualisq̃ uisitur. Cæterum huius foraminis progressum commonstrât **X** in secunda & tertia figuris positum, & deinde hæc quam modò adiicimus figura, in qua **X** & **Y**, ut & in maioribus figuris, situ inuicem minimè respondent. Hunc uerò obliquum & in osse longo tramite procedentem ductum, Natura effinxit longioris obliquiorisq̃ arteriæ soporalis progressus gratia, nimirum ut uitalis spiritus hoc errabundo ductus itinere, cerebro exquisitius præpararetur. Quare etiam Galenū in primis admiror, quem cum plerisque alijs foraminibus grande hoc foramen, non obiter expendendum, latuit: & qui per foramen tertij & quarti paris neruorū cerebri *Q* indicatum, soporales arterias caluariam ingredi in suo de Simiæ uenarum arteriarumq̃ dissectione libro, scriptum reliquit. Et quemadmodum de hoc foramine, neque canes, neque simias hîc intuitus, falsa posteris tradidit: ita non mirum est, ipsum mirabilem illum reticularem plexum sua imaginatione in hominibus quoq̃ confixisse, ac uasorum cerebri seriem non undique ueram memoriæ prodidisse.

Præsens figura foraminib. **X** & **Y** notatis, promptius ostendendis inuat, complectitur enim



utriusq̃ lateris foraminū ductus, ea serie positos, quæ illi in caluaria immixtis, aut ex plumbo filis


ferri cernuntur. **V** triūq̃ igitur **X** sinistrum foramen notat, maximo sinistræ soporalis arteriæ ramoparatum. utrumq̃ uero **Y** foramen indicat, soporalis arteriæ ramulo in narium amplitudinem excurrenti incisum.

Y 3 E regione foraminis nunc dicti, ac **X** insigniti finis, qui caluariæ amplitudinem respicit, aliud foramen inchoatur, rectâ antrorsum in narium usq̃ amplitudinem, meatus oblongi modo protensum, & arteriæ^a ramo uiam exhibens, qui à soporalis arteriæ maiori portione caluariam ingrediēte, ad nares usq̃ exporrigitur, inibi cum alijs eò porrectis arteriæ furculis pulsum edens sensibilem. Hoc foramen cuneiformi ossi peculiare censebis.

a fi. ca. 14 libri 3 ft.

a 2,3 Quinti neruorum cerebri^a paris meatus, auditorius uel porus, cuius principium interius in caluariæ amplitudine, a notat in tertia figura positum. Extiorem autē ipsius partem, quæ ab aure excipitur, ac auriculæ quodammodo respondet, aspera q̃ uisitur, a secundæ figuræ indicat. Meatus iste etsi intus admodum amplius cauiusq̃ sit, adeò tamen tortuosus & anfractuosus ac impense uariis inueniē, ut nō nisi rarissimè impulsam transmittat setam. licet quo minus seta transmittatur, non ipsius meatus gyri anfractus uel in causa tantum sint, uerū etiam quòd is ad aurem, & dein quā cerebrum respicit, arctior euaserit, quàm in^b medio, ubi admodum amplius latusq̃ uisitur. Verum interim haudquaq̃ audiendus est Aristoteles, quum ab aure ad cere

Hanc rudem figuram in hoc apposui, ut foraminum ductus in conspectu esset, quæ **V** et **a** et **b** notamus.



Significet igitur rudi *Minerva*, utrumq̃ a auditorium meatum. **V** foramen, superius **V** notatum. **b** autem, id quod mox sub litera **b** explicabitur.

Præsens figura ad sinistrum latus est referenda.

b fig. 8 cap. libri 1.

brum

a brum nullum asserit pendere meatum. At in oris palatum usque semitam pertingere, & uenam de cerebro eodem descendere, inquit. In caluariæ enim amplitudinem auditorius meatus pertinet, & uenam quoque admittit; non quidem illam à cerebro deducens, uerum eam ab interna iugulari caluariam ingredienti ad auditus organum assumit, & uti antea monuimus, quinti paris neruorum cerebri ramulo uiam præbet. Præterea si setam auditus meatui exterius indideris, hancq; modicè in anteriora introrsumq; oblique protruseris, in foramen v notatū, illam multo facilius quàm in caluariæ amplitudinem ferri conspicias.

b 2 Foramen ex auditus organi amplitudinis medio exortū, ac illinc in posteriora porrectum. Hoc anfractuū & labyrinthorum occasione, & quia in internam caluariæ sedem non pertinet, immittam non transmittit setam. Preparatur autem^a ramulo nerui quinti paris, quem quū Natura indurescere uoluerit, admodum callidè hunc per durissimi siccissimiq; ossis anfractuosum foramen deduxit. Vocatur uerò omnibus dissectionum professoribus *τρυλὴν*, cæcum & monoculum, non quòd uerus peruiusq; meatus non sit, sed quòd uix ad auditus organi amplitudinem usque setam aut plumbeum filum admittat. Istud foramen lupis & canibus, quibus id supra māmillaris processus radice sedem habetur multo amplius grandiusq; cōtigat, quàm hominibus. Forsitan nonnulli foramen ex auditorio meatu in priora protensum, ac v insignitum, cæcum appellant. Vtuncq; uerò sit, hoc foramen v, aut illud b notatum ignorarunt. quanquam sanè hætenus apud neminem, uel unum foramen digna descriptione expressum reperi, quum interim foraminum speculatio sit iucundissima, illaq; maximam Naturæ arguant industriam.

Foramen cæ-
cum.

c 2,3 Foramen occipitis ossi & temporis ossi commune, ac^a sexto pari neruorum cerebri, & b maiori internæ iugularis uenæ ramo, minoriq; soporalis arteriæ soboli exculptū. Istud, quia hæc transeuntia organa grādiora sunt, amplum uisitur, transeuntium corporum formæ respondens. Non enim examussum circulare est, sed quodammodo geminum intortumq;, & ipsius una pars (quæ interior est) neruo ex caluaria antrorsum quodammodo elabenti paratur; altera uerò (quæ exterior est) uenæ & arteriæ caluariam ad posteriora ingredientibus subseruit.

Hæc seorsim quod
modo describitur fo-
ramen expressimus;
interiori quidē ipsi-
us parti d, exteri-
ori autem i ascri-
bentes.



d 2,3 Foramen in occipitijs ossi gratia^a nerui septimi paris neruorum cerebri incisum, quod quidem orbiculare est, sed ductu oblongum obliquumq;. Ex posterioribus enim, internaq; caluariæ sede decliue fertur, quò citius septimi paris neruus hoc ductus foramine, sexto pari committeretur, unaq; ambo simul hærentes, deorsum tutò descenderent.

e 2,3 Foramen unicum, cæterisq; omnibus facile maximum, quod occipitis ossi insinuatur, gratia^a dorsalis medullæ ex cerebro originem ducentis.

f 2 Non insigniter amplum foramen, quod ab externa caluariæ sede, ex posteriori nimirum sede^a capitis occipitijs ossis, quod primæ ceruicis uertebrae articulatur, incipiens, in internā caluariæ sedem longo ductu per os fertur, in elatiori sede septimi paris neruorum cerebri foraminis d notati cessans. Hoc^b uenæ & b arteriæ gratia cælatur, per transversos uertebrae ceruicis processus sursum conscendentiū. Cæterum in quibusdam caluarijs id foramen in altero latere aliquādo deesse reperies, interdū etiam in utroq; uerum tunc huius foraminis uices gerit septimi paris neruorum cerebri foramen d insignitum, quod tunc non ad amussum orbiculare cernitur, sed oblongum, neruo simul cum uena arteriaq; transmittendo idoneum.

g 2,3 Foramen id ad posteriorem regionem processus māmillaris, iuxta futuræ Λ referentis^a latus in temporis ossi cælatur, & transversim caluariam ingrediens, uiam externæ iugularis uenæ^b ramo hac caluariam petenti, offert. Animaduerti interdum id foramen, modò in altero latere, modò in utroque defuisse.

^a In tertia figura, non oscitanter sinus in interna caluariæ amplitudine, qua cerebrum continetur, animaduertendus uenit, in quem tria foramina c & f & g insignita, & uenis arterijsq; transmittendis parata subeunt. A sexti enim neruorum cerebri paris foramine c notato, & interna parte foraminis f insigniti, in dextra sinistraq; caluariæ sede sinus incipit, quem in sinistro latere h, h & h indicauimus. in dextro autem tribus i. Sinus isti oblique instar quartæ circuli partis sursum in posteriora tantisper conscendunt, dum dexter sinistro inibi committatur, ubi k reposuimus. Huius enim coitus sedes in media regione occipitis ossis uisitur, quæ inter elatissimam futuræ Λ exprimentis^b regionem, & posteriorem foraminis dorsalem medullam transmittentis, ac e insigniti regionem, media consistit, & k inscribitur, ubi occipitis os crassissimum densissimumq; esse, in eius ossis historia retulimus. Ex hoc duorū sinuum congressu, alius rectā sursum fertur, sub eminentissima parte futuræ Λ similis, & sub tota sagittali futura,

Caluariæ si-
nus durae mē-
brane uasis ce-
dentes.h, h, h.
i, i, i.

k.

ll
m & frontis osse usque ad olfactus organorum sedium septum, * quodammodo in tertia figura insignitum. Hunc sinum quarta figura aliquot l notatum gerit. tertia autem in frontis osse, li-
tera m eundem indicat. Cæterum sinus hi exculpantur duræ cerebri membranæ gratia, cuius uasis ipsos ne illa caluariæ ossibus præmeretur, cedere tunc audies, quando cerebri uasorum non minus elegantem quàm arduam, parumq; ab alijs dissectionis professoribus animaduersam seriem, in tertio libro exequar.

n, o 2 Animum accommoda quartæ figuræ palato, in quo his characteribus ampla narium foramina septo quodam insigni x notato interstincta, & in faucium amplitudinem è naribus tendentia, n ac o indicantur. Hæc etsi homini ad plurima conducant, præcipuè tamen naturali inspirationi uociq; idonea censentur.

p 2 Foramen hoc iuxta posteriorem dentium incisiorum sedem ex palato in narium amplitudinem definit, quartisq; maxillæ superioris ossibus commune habetur. Deinde hominibus unicum adest, equis uerò & canibus geminum. Paratur autē gratia connexus, consensusq; tunica palatum succingentis, cum illa^b quæ narium amplitudini obducitur. Portiuncula enim illius tunicæ simul cum uenula, & item arteriola, id pertransit.

q 2 Ad palati finem iuxta maxillæ superioris sexta ossa, utrinque duo uisuntur foramina: unum a quidem altero prius, & amplius. prius enim antèrius ue ac a insignitum, notatu dignæ est amplitudinis, ex palato sursum in posteriora ad oculi sedis uerticem radicem ue properans. Inibi enim definit, ubi foramen occurrit, quod alterum pituitam in nares expurgantium esse retulimus, atque sub litera φ iam antea descripsimus. Posterius autem * notatur, estq; cingulum omnino, & sursum ascendens, aliquando in idem foramen cum anteriori a insignito terminatur. Interdum uerò peculiarem terminum, in sutura cuneiformi ossi & quarto superioris maxillæ communi adipiscitur.

Foraminula
per caluariæ
amplitudinem
hæc obuiæ.

Præter foramina hæcenus commemorata, si caluariam in manus sumpseris, alia quamplurima (sed exilia) obseruabis, uenis transmittendis & membranarum nexibus exculpta. Visuntur uerò huius generis aliqua è directo maioris interioris ue anguli sedis oculi, iuxta futuram secundo & tertio maxillæ superioris ossi & frons ossi communem. Hæc in cavitatem pertingunt, inter frontis ossis squamas comprehensam, & K prius indicatam. Horum quoque sedes in prima præsentis Capitis figura, T & V indicatur: quibus characteribus nuper dictam futuram suo loco expressimus, quemadmodum & commemorata iam ossa r, Δ & o inibi insigniuntur. Deinde in frontis quoq; osse iuxta superciliorum sedem huiusmodi quoque occurrunt foraminula. quemadmodum & in utroque nasi osse, quod quintum superioris maxillæ recēsuimus. Insuper in primo maxillæ osse, quod externum oculi sedis angulum cōstituit, unum aut alterum huius generis foramen inuenitur. Præterea ossis cuneum referentis latera, quæ temporum caua cum alijs ossibus constituunt, tali quoque foramine donantur. Ad hæc, in lateribus sagittalis futuræ in uerticis ossibus, & potissimum iuxta futuram

f f. Δ similem, talia etiam apparent, quorum sedes in quarta figura aliquot f in umbra latitantibus indicatur. Verum præter cōmemorata unum notatu dignæ magnitudinis habetur interiùs in frontis osse, quæ octauæ capitis ossis anterior pars ipsi cōmittitur, & anterior septi pars olfactus organorum sinuum cernitur, nimirum inter tertiæ figuræ m & * conspicuū. Pertingit autem hoc foramen in frontis ossis concavitatem, superius K indicatā. In quarto quoq; superioris maxillæ osse, iuxta magnū interiorem ue oculi sedis angulū, dicti iam ordinis foramen etiam se offert. In basi uerò ossis cuneum imitantis extrinsecus, quæ id septo narium cōmittitur, subinde quina numero uisuntur, ac tria quidē μ, ν, ξ insignita posteriùs consistūt, utrinq; nimirum unum, & in horum medio tertium, quæ antrorsum instar arctissimorum meatuum producta, in narium amplitudinem definunt. quamuis interim medijs foraminis ν indicati finis setam rarius admittit. Alia autē duo quæ ω & ω insigniuius, antèriùs incipiūt, & recto tramite antrorsum quoq; cōscendentia, in oculi sedis uerticē radicemq; terminantur. Cæterum horum foraminum termini hinc cōmode delineari nequeunt. quare etiā eo uehementius hortor, ut ex hominum caluarijs potius, quàm ex nudis ossium picturis hæc discas, foraminis cuiusq; sedis coniecturā hinc à characteribus sumens, & cōsideratē, an me aliquod foramen notatu dignū præterierit, expendēs. Superfunt adhuc in tertia figura & quarta Græci maiusculi characteres, quibus in futuris caluariæ indicandis, iam pridē usi sumus: adeò ut nullus præter Ω enarrandus sit reliquus, quo sinus quidam in uertice notantur, quibus^a durā cerebri membranā innasci audies. Atq; horum sinuum non eadem semper est series. quippe modò nulli, modò pauci, modò plures, atq; hi uarij, cernuntur: profectò (si quis me audit) illis animaduertēdi, qui nimis promptē hanc uerticis sedē urunt, aut in ossium fracturis nimium intrepidē ac confidenter terebrant. Huc quoq; referrē sinus duos cuneiformis ossis, in ipsius medio antrorum modo repositos, nisi iam antè in eius ossis historia ipsos

a 2 fig. 2 c. d. pili libr. 4. præpositæ inferius Z. b Eiusdē figuræ humilior P.

a 1 fig. lib. 7 K.


ipfos descripsissem, perinde ac amplas cauitates in quartis maxillae superioris ossibus ad narium amplitudinis latera repositas.

DE OSSE V GRÆCORVM LIT E,
ræ imagini comparato. Caput XIII.

PRIMA
DECIMI-
tertij Capitis fi-
gura.



SECUNDA
FIGURA.



PROPOSITARVM HIC FIGVRARVM ET EARVN-
dem characterum Index.

PRIMA præsens Capitis figura, anteriorem faciem exprimit ossis v imaginem referentis, unâ cum minoribus elatioribus ue ipsius lateribus, & ossiculis, quæ his usque ad temporum ossium processus in styli modum efformatos connectuntur.

ALTE RA figura, posteriorem ossis v referentis regionem commonstrat, simul cum elatioribus costis: uerum interim illis ossiculis nō delineatis, quæ ad processus styli speciem exprimentes pertingunt, prioriq; figura delineantur.

ABC 1 Grandius mediumq; ossis hyoidis ossiculum, anteriori sede conspicuum. Verum *A* & *B* gibbam huius sedis regionem indicant. In horum characterum medio peculiare huius regionis apparet tuberculum * notatum. *C* autem indicat sinum transuersum oblongum, & in superiori medij istius ossiculi sede obuium.

D 2 Posterior grandioris ossiculi sedes, sinuata & caua.

EF 1,2 Humiliora ossis hyoidis latera, quæ cum medio ossiculo figuram v similem repræsentant.

G 1,2 Connexis humilioris lateris, cum latiusculo grandiori q; hyoidis ossis ossiculo.

H 1,2 Humilioris lateris apex, qui laryngis cartilaginis scutum exprimentis processui alligatur.

IK 1,2 Superiora hyoidis ossis latera, humilioribus longè tenuiora, magisq; teretia.

LMN 1 Tria ossicula, superioribus lateribus utrinq; ut plurimum commissa. Cæterum ad hyoidis ossis inspectionem etiam faciunt præter quintam musculorum tabulam ad characterem *L*, priores aliquot figuræ duodecimi Capitis libri secundi ad *A*, *B*, *C*, *D*.



LARYNGIS eminentissimæ parti os unitatis nomine comprehensum, sed uarijs multiplicibusq; ossiculis extructum, præponitur, quod nonnulli à literæ v figura ὑποϋδης, alij succinctius ὑοδης appellant: qua uoce dissectionum rudes delusi, in Galeno os suum referens uerterunt. Alijs rursus id os à Λ imagine λαμβολοδης nuncupatur: quo etiam nomine interpretes decepti, a futuram capitis Λ literæ similem uertere consueuerunt. cuiusmodi tamen mendas pro nostra uirili nuper

Ossis hyoidis
situs & nomi-
na.

434 fig. 6
ca. C, D. &
3 integrari
B.

b 22, 23 fig.
li. 54 & ad 1.
c eisdem fi-
guris f.
B.

d 1 fig. A, B,
*, C. 2 fi. D.
e 4 muscu-
rum tabula
R.

ex Galeno, quem & Italia & Germania latinū dedit, subduximus. Herophylus quoq; id os ῥα σκῆλω appellasse dicitur, fortè quòd linguæ, aut laryngi, aut faucibus apponatur, quæadmodū ipsi in organis generationi famulantibus quædam ῥα σκῆλω λεγομένη, & ῥα σκῆλω ἀδενωδής uocantur. Non desunt etiā, qui quum in faucibus consistat, id φάρυγγος nuncupauere. Nos uerò passim id os v referēs, aut uoce contractiore hyoides nominare instituiamus. Homo igitur hoc os longè aliter, quàm quadrupeda, quæ hactenus aggressi sumus, extructum obtinet, ac maximum hyoidis ossis ossiculū est latiusculū, & foris gibbum, priuatoq; tubere prominēs: intus autē, seu posteriori sede, cauum. in anteriori etiam sede superiūs quasi in oblongū sinum deprimitur, pro figuræ nimirum ipsi idoneæ, & musculorū ligamentorumq; illi cōmissorum ratione. Superiori enim sinui implantātur tertius & quartus huius ossis peculiare musculi:

Medium hy-
oidis ossis ossi-
culum.

*Latera hyoi-
dis ossis.
Humiliora.*

*Superiora la-
tera & com-
missa ipsis ossi-
cula.*

*Qui hyoides
os firmatur.
Ipsius usus.*

ad tuberis uerò in hac sede conspicui latera, quæ quodammodo in gibba sede sinuantur, in-
sertionem tentant¹ duo primi huic ossi peculiare musculi. Ex posterioris autem sedis cauo-
musculi² duo priores linguam mouentes præcipuè enascuntur. Præterquam quod gibba ex-
trorsum, caua uerò introrsum, atque ab iniurijs extrinsecus occurrentibus remotius opportu-
nè collocentur. Grandius id ossiculum supra laryngem paulò cōsistens, tangentibus occurrit,
ipsius interim lateribus penitus ferè latitantibus. Huic enim latiori ossiculo utrinq³ alia duo
uniuntur. Atq⁴ horum alterū humilior est, alterum elatius. Humilior ossiculum nonnihil bre-
uius, latiusq⁵ superiori est, nulliq⁶ alteri ossi committitur,⁷ quàm lateri medijs ac latiusculi hyoi-
dis ossis ossiculi, ad quod cartilaginis ligamenti⁸ cartilaginei interuentu ualidè, & notatu di-
gna amplitudine nectitur. Verum⁹ finis ipsius¹⁰ superiori processui cartilaginis laryngis, quæ
scuti imaginem exprimit, colligatur. Inferius hoc ossiculum seu latus unà cum suo coniuge, qui
in altero cōsistit latere, humilior hyoidis ossis latus meritò appellamus, aliquot musculis admit-
tendis & producendis aptum. Atque hæc humiliora latera simul cum medio grandiori ue of-
ficulo, u¹¹ imaginem pulchrè conficiunt. Porro superiori ossiculo seu lateri quod magis teres
uifitur,¹² alia rursus oblonga teretiaq¹³ ossicula tantisper cōtinua serie uniuntur, quousque ipso-
rum fines propter radicem¹⁴ processus temporis ossis, quem scriptorij styli formam ostendere
iam sæpius commemoratum est, temporis ossi inferantur, uti in quadrupedibus uidere est
manifestissimè. Hæc ossicula superioribus hyoidis ossis lateribus commissa, non pari semper
obseruantur numero, ut plurimum tamen terna quaternæ ue utrinque cernuntur. quanquam
etiam interdum, idq¹⁵ maximè in mulieribus, hæc ossicula uiderimus simul cum superioribus la-
teribus omnino deesse, & ipsorū uicem teres quoddam, ualidum & oblongum ligamentum
gerere, hyodi¹⁶ ossi & stylum imitanti processui colligari. Quod etiam non semel animaduer-
tit mihi admodum familiaris RENA LDVS COLVMBVS, nunc sophistices apud
Patauinos professor, Anatomes studiosissimus. Hyoidis igitur os neque liberum, neque ulli
contiguum esse ossi, superiora ossis indicant latera temporum ossibus cōnexa. Deinde & infe-
riora quoq¹⁷ latera, cartilaginis scuto similis processibus ligamenti beneficio cōmissa, idem atte-
stantur. Cartilagine enim laryngis, ut & costarum cartilagine, ossium præbēt usum, & quod
ad contiguitatem spectat, in ossium quoque classem recensentur. Verum quoniam hyoides os
non adeo firma basi, atque reliqua ossa, nititur, proprijs id musculis in omnem positionis diffe-
rentiam ita trahi in secundo libro narrabimus, ut neque in latera, neque sursum aut deorsum,
neque prorsum aut retrorsum promptè ex sua sede dimoueri queat. & quamuis id minimum
homini obtigerit, maximos tamen plurimosq¹⁸ usus præstat: qui tunc enarrabuntur, quum¹⁹ ali-
quot linguæ musculos ab ipso enasci, linguæq²⁰, fundamenti tutissimæq²¹ basis modo subijci, &
²² musculorum laryngis quædam principia porrigere ostendemus.

DE DORSO, ET GENERATIM DE

ipsius ossibus. Caput XIII.

SUBSEQUENTIS FIGURAE AC IPSIUS characterum Index.

FIGVRA proximam paginam occupāte dorsum, quod Græcis *ῥῶς* & *ὄστρον* di-
citur, à latere expressimus, ut primū totius dorso ossium contextus cerneretur, ac postmodum
singulæ ipsius partes priuatis Capitibus delinearentur. Cæterū quum tres figuræ, & earum
præcipuè tertia, ad præsentis libri calcem posita dorsum pariter commonstrent, non abs re il-
las etiam obiter intueberis, unà cum tertij libri figuris, neruorum à dorsali medulla originem du-
centium seriem exprimentibus, atque ad undecimi eius libri Capitis initium repositis.

A, B Collum septē constans uertebis, quæ numeris internæ ipsarū sedi appositis sigillatim notātur.

C, D Dorso pars thoracem constituens, quam nonnulli simpliciter dorsum nuncuparunt. alij uerò,
quod ueluti post septum transversum consistat, metaphrenum. alij, uti iam dicebamus, dorso par-
tem, qua thorax constituitur. Hæc ut plurimum duodecim formatur uertebis, quibus thoracis
costæ articulantur, unde etiam illæ costarum, ut & thoracis uertebrae nominantur.

E, F Dorso pars quinque lumborum uertebas complectens.

G, H Os sacrum, quod tantisper sex ossibus seu uertebis in homine effingi dabis, quousque ossis sacri
descriptionem priuatim persequutus fuero.

I, K Os coccyx, quod etiā quatuor ossiculis efformari tantisper annues, dum & id descripsero.

L, L & c.

f 4. musc. ta-
bule S. T.
& alij eius
ossis muscu-
li Q, V.
g 1, 2. fi.
ca. 19. lib. 2.
D, D.
h Vnū 1, 2
fi. E, F. Alic-
rum I, K.
i 1, 2. fi. G.
k 1, 2. fi. H.
l 3, 4. fi. ca.
38 A, B.

m 1. fi. L, M.
N.
n 3, 4. fig. 6
ca. i.

o 1, 2. fig. 19
ca. lib. 2. D,
D & E.
p 1, 2. fi. ca.
21. lib. 2. F,
dein 2, 3.
figura K.

L, L Aliquot uertebras *L* insigniuimus, nimirū in tota dorsi compage secundam, nonam, decimam, &c. octauam & uigesimā quartam: ita indicaturi uertebrarum partem, seu sedem, quam ipsarum corpus nuncupamus.

M, M *M* in iisdem uertebris uisitur, in quibus *L* occurrit, processus &c. notans in latera ex porrectos, atq; ideo transuersos, aut laterales nobis appellatos. Quod uerò nō solæ uertebræ *L* insignitæ corporibus, & *M* indicatæ transuersis processibus donentur, neminem latere arbitror, etiam si singulas uertebras characteribus non obruamus. Atque id etiam de subsequētib; notis existimandum uenit: quippe si quid proprii cuipiā obtigerit uertebræ, hoc Capite id explicare haud instituiamus.


N, N *N* in octaua totius dorsi fabricæ obseruabis uertebræ, dein in &c. decima septima, & uigesima tertia. Notatur autem *N* quidam uertebrarū processus ad inferiora nutātes, quibus superiores seu incumbentes uertebræ subditis articulatur uertebris. Hos processus ob id quod deorsum ferantur, in orationis serie descendentes nominabimus.

O, O *O* uisitur in uertebris, quæ nuper cōmemoratis subiiciuntur, indicatq; uertebrarum processus sursum spectantes, quibus superpositæ subiacentibus articulantur. Hos, rectè descendentes processus nuncupabimus.

P, P *P* illis inscribitur uertebris, quas prius *L*, *M* & *O* insigniuimus. &c. notantur autē uertebrarū processus in corporis posteriora exerti, & aculeo ac spinæ non absimiles. Vnde etiam Græcis ἀκανθὰς, Latinis uerò spinæ nuncupantur, atq; hinc quoq; totam uertebrarum compagem, ἀκανθαὶ & spinam uocamus. In orationis autem contextu, hos processus ferè posteriores uertebrarum processus aut spinas nominabimus, totum dorsum hoc nomine rariùs appellaturi.

Q, Q *Q* prope easdē reperis uertebras, quibus postremò enarratos &c. characteres inscripsimus. Ac *Q* nullā uertebræ notat partem, sed foramen in uertebrarum consistens lateribus, & neruos à dorsali medulla pullulatos transmittens. Quàm uerò hoc foramen in dorsi ossibus uarium sit, in peculiari ipsorum descriptione pertractabitur.

R, R Cartilagineum notatur ligamentum, uertebrarum corpora interueniens. quod Galenus cartilaginem puram esse, contra ueterum placita contendit: uerum quàm rectè, secundi libri uigesimo septimo Capite docebimus, inibi figuram proposituri huic narrationi non inutilem, qua aliquot uertebrarum delineabuntur corpora, cartilagineum hoc ligamentum, uertebrarumq; corporum appendices, & cartilaginem quæ corpus uertebræ ac appendicem intercedit (ut in pueris hæc se habent) exprimentia.



In triū subse
quentiū ca.
figuris id fo
ramen ob
uium est.

R *R* V *M* parens Natura homini dorsum instar carinæ cuiusdam, fundamentiq; machinata est. Dorsi enim ope recti ambulare, & erecti consistere ualemus. Quanquam neq; illa in hoc dorsum homini duntaxat dedit, sed perinde atq; aliās in unius membri cōstructione, eo ad uarios simul usus abuti consueuit, ita ne hīc quoque minus industriam ipsius ostendit. Primū enim omnibus uertebris ad suorum corporum posteriorem regionem, foramen exculpfit, idoneam dorsali medullæ per ipsas deicenturæ uiam præparans. Secundò, non ex incompósito simpliciq; osse uniuersum consti-

Naturæ in
dorsi creatio-
ne industria.
Vt id susti-
neat.

Vt dorsalis
medullæ uia ef-
ficiatur, & in-
terim mobile
sit.

tuit

*Dorsi ossium
multitudinis
causa.*

*Libro 12 de
Vsu partium.*

*Dorsi ossium
nō par magni-
tudo, neq; dor-
salis viæ æqua
amplitudo.*

*Foramina ner-
uis emittēdis
parata.*

*Vertebrarum
spina.*

tuit dorsum, quamuis id ad stabilitatē & tutā dorsalis medullæ sedem satius fuisset: quū neq; lu-
xari, neq; excidere aut distorqueri posset, nisi ita uariē esset articulātū. Verum si rerum Opifex
tantū patiendi pertinaciæ animū adhibuisset, neq; in organorū fabrica ullum priorem dignio-
rem uē spectasset scopū, non aliter sanē quā prorsus incompositū simplexq; dorsum creasset.
Quippe si quis lapideum, aut ligneum animal confingit, non aliter dorsum quā unica conti-
nuaq; parte fabricat. Homini uerò dorsum inclināturo, aut erecturo, non erat melius id uni-
uersum unico osse fabrefieri, quinimo cum dorsi beneficio hominem multis ac uarijs motibus
agi oporteat, satius fuit hoc ex pluribus constitui ossibus, utcunque etiam hoc nomine iniurijs
magis redditur obnoxium. Quamobrem uerò dorsum non ex duobus uel tribus ossibus, tam
longis quā in manu est humerus, & ulna cum radio; in crure autem femur, & tibiæ os cum fi-
bula: sed ex quatuor & triginta efformetur ossibus, uariē mutuò articulatis, in præsentī subiici-
endum est, à præcipua totius dorsi particula sumpto orationis exordio. Est autem hæc^b dor-
salis medulla, quam instar cerebri partibus sub capite locatis esse tunc nitemur ostēdere, quum
quarto libro neruorum seriem pertractabimus. Quoniam itaque hanc similiter ut cerebrum,
duro & promptē iniurias repellente munimēto custodiri oportebat, dorsum instar carinæ hu-
mano corpori subiectum, omnino insculpi, iterq; simul & tutissimum uallum ac (ut Græci di-
cunt) στήλη ἰσπᾶ, ipsi medullæ confici debuit. Huius enim natura cerebro respondet, & noxæ
quæ hac affecta hominem afficiunt, illis conferuntur, quæ cerebro laborante indies oboriri
cernimus. Motus siquidem & sensus omniū partium quæ læsæ subsunt uertebrae, uitiantur.
Sed hæc quidem neminem latere, Galenus attestatur. Quamobrem uerò diuinus Hippocra-
tes libro de Articulis prodiderit, si plures uertebrae uno ordine inuicem subsequentes transmo-
ueantur, graue esse: si autē una ex cæterarū compage exiliat, perniciosum esse: haudquaquam
perinde notum est omnibus. Hippocrates itaq; causam symptomatis nos edocet. nam si simul
plures uertebrae dimoueantur, ita ut quæque paululum transmutetur, & sua sede declinet, tunc
circularis, ac proinde nō uehemens dorsalis medullæ obtinget euersio. Si uerò, inquit, una uer-
tebrarum suo contextu dimoueatur, tunc dorsalis medulla paruo interuallo inflexa, afficietur,
& quæ exiliit uertebra ipsam comprimet, nisi sanē & rumpat. Quum itaque dorsalis medulla
angularem, eamq; subitam & acutam flexionem nequeat perferre, dorsum nō potuit magnis &
laxis articulis insignem transpositionem habentibus, innoxie moueri. Vnde etiam melius fuit,
ex multis & paruis ossibus quæ singula ad motum conferunt, dorsum coaceruari. Cæterum
his ossibus non par adest magnitudo, neque omnibus foramen medullam dorsalem transmit-
tens æqua amplitudine exculpitur. Coordinationis enim occasione melius fuit, minores sem-
per fieri superiores: modò id quod portatur ab aliquo, minus esse conueniat portante. Hinc
igitur^c maximum dorsi ossium sacrum os à Natura creatum est, & ueluti basis quædam uigin-
ti quatuor uertebri subijcitur, duobus cōmissum^e maximis ossibus, quæ unā cum ipso cor-
pus maximē stabiliunt. Secundum uerò dorsi os magnitudine, si à sacro sursum ascendas, uer-
tebra est sacro ossi coarticulata, à prima quidem iacēs quarta & uigesima, ipsarumq; in lumbis
uertebrearum ordine quinta. Porrò aliarum singulæ quantum positu ab infima discedunt, tan-
tum & mole. Atq; hæc magnitudinis diminutio usque ad ipsum caput perficitur, præterquam
si quando uertebra interueniat paulò maior subiecta. quod sanē non absq; magno usu fieri,^f pri-
mæ ceruicis uertebrae descriptio ostendet, quæ illam reliquis ceruicis uertebri latiore esse
docebit, gratia commodæ^g quinti & sexti caput mouentium musculorū insertionis, & secun-
di scapulum attollentis musculi exortus. Atque inibi etiam articulationis nomine, secundam
ceruicis uertebra ualidiorem grandioremq; tertia esse audies. Quia uerò Natura nullius oc-
casione uertebra in posteriori suorum corporum sede exculpsit, quā ut iter^h dorsali me-
dullæ pararet, oportuit sanē foramen magnitudine cum dorsali medulla congruere. Hæc au-
tem quum in singulis uertebri sit impar, & in primis uertebri maxima (gignendis enim ner-
uis sensim constringitur, attenuaturq;) optimo iure superiorum uertebrearum foramen inferio-
rum foramine amplius est. Dein quū superiores uertebrae amplo foramine exculpi debuerint,
& interim alijs innitantur uertebri, promptē colligitur, illas quoque simul tenues necessariò
extructas esse. Neque dorsali medullæ duntaxat uia in uertebri exculpitur, uerū etiam^k tri-
ginta neruorum paribus in homine à dorsali principiū ducentibus^l tutissimæ uia foraminaq;
in uertebri cælantur, quæ in neruorum serie exequar. quamuis in priuatis uertebrearum descri-
ptionibus quædam illorum foraminum mentio subinde incidet: præcipuē quòd in omnibus
uertebri non eadem specie, neque pari etiam numero insinuentur. Quum igitur dorsalis me-
dulla ueluti alterum cerebrum omnibus propemodum quæ sub capite consistunt organis ha-
beat, & dorsum ipsi uia & uallum quoque tutum fabricetur, rerum Opifex alia permulta mi-
randaq;

*b Tres figu-
re u capiti
li. 4. præpo-
sita.*

*c G, H. Aut
in integris
fig. M cū o.
d F, aut cha-
racter 24.*

e A, aut 1.

*f. I. H. musc.
tabulæ 14.
g Eadem ta-
bula L, K.
h 13 musc. ta-
bula Q.
i fig. ante
u ca. li. 4*

*k Tres fi. ca-
piti u li. 4.
l præposita.
Q Q*

P.P.P. randaq; circa uertebras molitus est, quippe ex medio posteriorum partium^m spinam produxit, instar sepi & ualli totius dorſi; hanc primam proponens, frangendam & conterendam, modisq; omnibus passurā, priusquam noxa inferatur cuiuspiam uertebræ, & ipsa dorſalis medulla lœdatur. Posterioribus his processibus inⁿ plurimis uertebris appendice donatis cartilago obnascitur, idoneū subditorum propugnaculū, ut quæ nec frangi nec rumpi, modo fragilium friabiliumq; ac durorū, neq; incidi & quassari perinde ac mollia carnosaq; queat. Præterea singulorum processuū quos spinæ modo extuberare diximus, magnitudo in omnibus uertebris inæqualis quodāmodo cernitur, mirificè & hoc pariter prouidente Natura. Nequaquā enim in ijs locis in quibus eandem sedem cum dorſali medulla pars quæpiā primaria sibi uendicat, æquum erat negligere eius partis dignitatem: neq; in locis sola occupatis medulla, prælongas educi spinas, erat iustum. Quemadmodum neque expediebat ē paruis uertebris longam enasci spinam, neq; ē grandibus breuem. Ratione igitur optima, quoniam in thorace cor locatur, & magna arteria dorſo incumbit, in his dorſi partibus Natura longissimas produxit spinas, in alijs uerò sedibus breuiore. Vertebrarum quidem lumborum corpus grande est, illisq; intus magna arteria & cōcaua uena suffulcitur. sed ossis sacri moles est maior & insignior, nullum tamen interim præcipuū ei præiacet organum. Par igitur erat posticos processus secundū uertebras thoracis, maximos in lumbis educi, in sacro autem ossē breuissimos. Cervicis uerò uertebræ quum tenuissimæ omnium sint, non potuere nancisci processus longos simul, & innoxie iniurijs ferendis aptos: quum hi leui occasione propter tenuitatem rumperentur. Quemadmodū itaq; dicti nunc processus spinā efficientes, propugnaculi uicem gerunt: ita & alijs processibus, nimirum^o transuersis uertebræ donantur, quæ partim ueluti sedes quædam dorsum mouentibus musculis submittuntur, quemadmodum & spinæ ad musculorum productionem insertionemq; eo usu potissimum iuuant, cuius gratia generatim omnes ferè ossium processus montium colliculorumq; ritu extuberare ac educi, prius nō semel relatū est. Omnibus enim his uertebrarum processibus muscoli accumbunt cum arterijs, uenis, neruis, ad ipsos & per ipsos delatis.^p Verū alius quoque tertius usus transuersorum thoracis uertebrarum processuum prædictis accedit, quo aptam costis sedem porrigunt, cui illæ articulantur. Quia autem dorsum instar unius corporis ex uertebris efformari debuit, quod simul firmum, & forte, & ad motus promptum esset, magnoperè laudanda uenit Natura, quæ dorsum ambobus usibus (etſi contrarijs) idoneum construxerit. Omnes enim uertebræ ad sacrum usque os (si duas priores exceperis)^q in anterioribus quidem sedibus sibi mutuò amplis corporibus tutò colligantur, posteriori autem sede duplicibus articulis coarctantur, ubi etiam robur propter anteriorem compagem nanciscuntur. Moueri itaque uertebræ non prohibentur, quòd corporibus mutuò non connascentur, & postica sede non obscuris articulis sint distincte: atque hac etiam ratione antrorsum ualde inclinari possumus, retrorsum uerò nequaquam. Rumpes enim, si coëgeris membranea, quæ uertebrarū corpora colligant, ligamenta, cum alio cartilagineo ligamento inter uertebrarum corpora reposito, itaq; corpora connectente, ut uertebræ non admodum à connatis differant. At horum ligaminum naturam substantiamq; ut & cæterorum omnium, sequens liber accumulatè pertractabit. Quoniam uerò nō æquè tutum erat dorsum antrorsum retrorsumq; flecti (ita enim infirmum ac instabile & laxum penitus esset) Natura quod satius est, iure prælegit. Ad uniuerſa etenim uitæ munia cōmodius est, dorsum in priora flecti. dein hæc quoq; flexio ualis dorſo ibidem incumbentibus, magnæ scilicet arteriæ, & cōcauæ uenæ, minus molestiæ infert, quum aliàs plurimū extenderentur. Quia igitur oportuit dorsum anteriori sede ad amussim stringi, meritò uertebræ in posteriore sede laxius articulantur. Cuius autem formæ ipsarum sint articuli, unā cum his quæ de singulis uertebris dicenda sunt persunt, iam addemus. Sunt enim in uertebris pleræque differentiæ, passim incredibilem Naturæ industriam ostendentes, ob idq; quatuor modò sequentibus Capitibus non perfunctoriè aut obiter enarrandæ, quorum primum colli cervicis uel uertebris, secundum thoracis, tertium ijs quæ in lumbis habentur, quartum autem sacro ossi coccygicq; ossi dedicabitur.


Cartilago spinarū apicibus obnata.

Transuersi processus.

Vertebrarum coarticulatio.

Cōmodius fuisse dorsum flecti antrorsum.


PRIMA XV CA-
 PITIS FIGURA.




SECUNDA.




TERTIA.




QUARTA.



QVINTA.




SEXTA.



SEPTIMA.

OCTAVA.

NONA.



DECIMA.

VNDECIMA.

VNDECIM

figurarum & earundem characterum Index.

P R I M A. præsentis Capitis figura, occipitij ossis partem ab alijs ossibus liberam, & in externa caluariæ basis sede hic conspicuam exprimit.

Secunda, primam ceruicis uertebam anteriori superioriꝛ facie expressam proponit.

Tertia, primæ ceruicis uertebæ superiore posteriorẽ imaginem oculis subijcit.

Quarta, primam ceruicis uertebam inferiori posteriorẽ facie delineatam exhibet.

Quinta, secundæ ceruicis uertebæ anteriorem commonstrat faciem.

Sexta, secundæ ceruicis uertebæ posteriorem faciem designat.

Septima, secundam ceruicis uertebam inferiori facie spectandam offert.

Octaua, terciæ ceruicis uertebæ anteriorem superioreꝛ faciem ostendit.

Nona, terciæ ceruicis uertebæ posterior superiorẽ facies delineatur. Quoniam uerò huius ceruicis uertebæ inferior sedes secundæ uertebæ inferiori sedi respõdet, illam hic non apponimus, ne fortè præsentis Capiti nimius tabularum aceruus præponatur. Atq; hac etiam ratione, cæteras ceruicis uertebas terciæ subiectas singulatim non depinximus, præcipuè quum illarum descriptio ex triũ superiorum uertebRARUM figuris, promptè desumi queat.

Decima, trium primarum ceruicis uertebRARUM compago, anteriori parte depicta cernitur.

Vndecima, trium primarum ceruicis uertebRARUM contextus posteriori facie exprimitur.

A in 1 Foramen in occipitis osse, dorsalis medullæ gratia excisum.

B 1 Dextrum occipitis ossis capitulum, quod primæ coarticulatur ceruicis uertebæ. Sinistrum uero capitulũ, *C, D, E & F* insignitur. Siquidem *C & D* capituli notant longitudinem, seu du-
E, F 1. tum, quo longitudinem in horum capitulorum descriptione metimur. Dein *E* insinuat internũ latus capituli, quod magis deorsum, quàm externum *F* insignitum, deprimitur, aut non æquè sursum prominet.

G 1 Anterior foraminis dorsalem transmittentis sedes, quæ ob teretis cuiusdam ligamenti insertionem aspera & inæqualis est.

H 1 Sinus in posteriori sede utrorumq; capitulorum occipitis ossis incisus, ac uiam primo dorsalis medullæ neruorum pari porrigens.

I 2, 3, 4 Foramen transmittendæ dorsali medullæ in prima ceruicis uertebra exculptum.

K 2, 3 Hic primæ uertebæ corpus exculpitur, secundæ uertebæ dentẽ, qui *Γ* notabitur, suscepturum.

L 3, 4 Sinus in posteriori sede corporis primæ uertebæ incisus, ac cartilagine incrustatus.

M 2, 10 Processus & tuberculum, in anteriori corporis primæ ceruicis uertebæ sede prominens.

N 2, 3, 10, 11 Dexter primæ uertebæ sinus, quo dextrum occipitis ossis capitulum excipitur. Sinistrum sinum in secunda & decima figuris *O, P, Q, R* notauimus: *O* quidem & *P* eius sinus longitudinem indicaturus: Querò, internum latus, longè ipso exteriori *R* insignito declinuius.

S 2, 3, 4, 10 & 11 Transuersus primæ ceruicis uertebæ processus dexter. Sinistrum uerò characterẽ non insigniuius, quòd utriusq; eadem sit ratio. Sic etiam ipsius foramen in sinistro tantum latere secundæ & undecimæ figuræ *T* notauimus.

V 3, 11 In dextro tantum latere sinus indicatur, qui cum occipitij ossis sinu *H* notato commune efficit foramen, quo primum dorsalis medullæ neruorum par elabitur.

X 3, 4, 11 Hac sede prima ceruicis uertebra posteriori destituitur processu, & inibi duntaxat uisitur acutum exiguumq; instar lineæ prominens tuberculum, ad cuius latus hæc sedes aspera est.

Y 4 Dexter primæ ceruicis uertebæ sinus, dextrũ secundæ uertebæ tuber c signandum excipiens.

a, b. Sinistrum sinum *a & b* notauimus: *a* quidem internum ipsius latus, *b* autem externum indicantes.

c 5, 6 Dexter secundæ uertebæ tuber, seu insigniter depressum capitulũ, cõmemoratum iam prius primæ uertebæ sinum *Y* insignitum subingrediens. *d, e, f*, sinistrum ostendunt capitulum. *V e*

d, e, f. riũ *d* priuatim latus ipsius notat internum elatiusq; *e* uerò externum, & depressius. *f* autem eam capituli partem, quæ ad posteriora ueluti extra circuli circumferentiam educitur.

Γ 7, 10, 11 Secundæ ceruicis uertebæ processus, quẽ à dentis imagine dentem uocabimus, quiq; in quinta figura & decima & undecima etiam conspicitur. Verũ hunc in septima, decima & undecima *Γ* insigniuius. In quinta autem & sexta figura pluribus notatur characteribus priuatim

F aliquid

- g. h.* aliquid significantibus. *g* enim in quinta tuberculum ipsius notat cartilagine obductum. *h* in sexta, notat posteriorem dentis sedem, quæ crassior est, magisq; quam dentis radix in posteriori ora extuberat. *i* sinum indicat, ad quem transversum ligamentum aduoluitur, quod dentem in pri-
- k, l.* ma uertebra constringit ac continet. *k* & *l* utrinq; sinus insignitur ad dentis principij radicis uel latera incisus, atque anterioris secundi neruorum dorsalis medullæ paris propagines admodum exiguas transmittens. Cæterum foramen, hoc sinu & primæ uertebrae sinu, efformatū in un-
- m. n.* decima figura *m* signatur. Postremò *n* in quinta figura dentis notat mucronem.
- o 3, 11* Sedes dextri lateris notatur aspera, inter primæ uertebrae superiorem sinū *N* indicatum, & inferiorem *Y* indicatum consistens. ubi foramen non peruium conspicitur.
- p 6* Sinus dextri lateris, ad posteriorem dextri secundæ uertebrae tuberis *c* insigniti sedem exculptus: & commune foramen uiam uel constituens, qua secundum neruorum dorsalis medullæ coniugium in posteriora prosilit. In quartæ figuræ sinistro latere *q* positum cernis, sinum hunc primæ
- r.* ceruicis uertebrae notans. In dextro autem latere decimæ & undecimæ *r* reposui, ipsam neruorum uiam in altero latere utcunque significans.
- f 5, 6, 7* Posterior processus, seu spina secundæ ceruicis uertebrae, quæ etiam in decima & undecima figuris parte superiori, in septima uero inferiori est obuia.
- t 9* Tertiæ ceruicis uertebrae spina, quam & undecima figura ostendit. Spinæ autem huius apices in octaua *z* & *w* notantur, ipsa uero spina illic numero *11* indicatur.
- u 5, 6, 7* Dextri lateris transversus secundæ ceruicis uertebrae processus. Sinister etiam citra characterum operam in illis figuris, quemadmodum & in decima & undecima utriusque lateris processus promptè cognoscitur.
- x 5, 6, 7* Foramen transversi secundæ ceruicis uertebrae processus.
- y, z, 9, 10* Transversus sinistri lateris processus, tertiæ ceruicis uertebrae. Verum *y* internam partem, *z* autem externam notant. Porro octaua figura transversum dextri lateris processum his notis *7* & *8* indicat, sinistri autem lateris processum istis notis *9, 10*.
- a 8, 9* Foramen transversi tertiæ ceruicis uertebrae processus.
- b 6, 7, 11* Dexter descendens secundæ uertebrae processus, cuius sinus formam septima figura indicat.
- γ 9, 11* Dexter descendens tertiæ ceruicis uertebrae processus, uerum *γ* in nona & undecima posteriorè ipsius indicat sedem. Inferior autè ipsius sedes seu sinus, sinui respōdet in septima *β* insignito.
- δ 9, 11* Dexter ascendens tertiæ ceruicis uertebrae processus, ac nona quidem figura ipsius tuber ostendit, quemadmodum & octaua utriusq; ascendentis processus tubera indicat notis *3* & *4* insignita.
- ε 5, 6, 7, 10* Sedes, qua secundæ uertebrae corpus deorsum porrigitur.
- ζ 9* Sedes, qua tertiæ corporis uertebrae corpus decliuus fertur.
- η 9* Superior tertiæ uertebrae ceruicis sedes sinuata. & *η* quidem sinum indicat, θ uero & *η* utrinq; prominentè processum. atq; hi etiam processus numeris *1, 2* in octaua figura insigniti cernuntur.
- λ μ ν 10* Anterior secundæ uertebrae corporis sedes, in qua *λ* prominens indicat tuber, *μ* uero & *ν* utrinque depressa tuberis latera.
- 1, 2, 3, & c.* Numeri characteres in octaua figura conspici, processuum tertiæ ceruicis uertebrae numerum indicant. Quandoquidè *1, 2* notantur duæ eminentes partes superioris superficie corporis uertebrae. *3, 4* duo ascēdentes processus. *5, 6* duo descēdentes processus. *7, 8, 9, 10* transversī pro-
- ξ, ω, ρ.* cessus. *11* spina, cuius apices notantur *z* & *w*. uti & huius uertebrae inferior pars *9* indicatur.
- s 8, 9* Sinus inferiorem partem foraminis constituens, quo tertium dorsalis medullæ par exilit.
- t. t 7* Sinus superiorem dicti iam foraminis partem efformans.

Homo pulmo
num occasione
collo donatus.



V L M O N V M gratia homini collum dari, hinc potissimum cōstat, quòd id perpetuò unà cum pulmonibus deperditur. Quippe hac occasione pisces (quibus & pulmones defunt) collo destituuntur. Animalibus uerò, quibus Natura pulmones dedit, his quoque & collum elargita est.^a Asperam enim arteriam qua inspirantes aërem in pulmones ducimus, & rursus expirantes eundem efflamus, ab ore ad pulmones ferri, atque ob id inter os & pulmones spacium intercedere debebat, si quidem opportuna efflatione (quæ uocis est materia) hominem donari decuit. Nam citra asperæ arteriæ beneficium uox minimè perficitur, unde etiam nō miramur, nullū animal collo carens uocem edere.

Quum

^a Hæc ostēdit fig. 1 ca. 38. Vasa autē per collū repentia et pulmones si. calci 3 li. apposita, ut & illa quæ 4 li. si ni insuntur.

Quum itaq; pulmones in thorace contineantur, & aspera arteria (quam in os desinere omnino decuit) ex pulmonibus cōfurgat, interuallum elatiorem thoracis sedem & fauces intercedens, arteriæ illius gratia creatur. Quia uerò thorax & os inuicem separantur, quantum inter utrumque interualli mediat, uia eorum efficitur, tam quæ desuper deorsum procedūt (ut dorsalis medulla & stomachus) quàm eorū quæ ab inferioribus sursum (ut aspera arteria, & multæ læues arteriæ ac uenæ) porriguntur. Homo igitur collum asperæ arteriæ gratia nanciscitur, asperam uerò arteriam uocis respirationisq; causā. Quare etiam colli longitudinem homo tantā fortitus est, quanta asperæ arteriæ ad dictas modò functiones exusu erat. Quinetiam conueniebat partes scapulis conterminas, & brachium, & cubitum, extremamq; manum, præterea & septum transuersum, à dorsali medulla collum perreptante^b neruos adipisci: quocirca & propter illorum propagationem, necessum fuit in spacio inter caput & thoracem medio uertebras reponi, quibus collum texeretur. Sunt autē humanæ ceruicis^c uertebræ septem, quarum nunc naturam usumq; explicare contendā, à capitis colliq; motibus sumpto sermonis exordio. Non enim hīc auium quadrupedumq; quibus longa obtigerunt crura, colli usum recensere propositum est, quum nemo nō intelligat Naturā his, quod manibus destituātur, colli maxillarumq; prolixitate ad cibum assumendū prospexisse, hacq; ratione pluribus uertebris collum illis confinxisse. Galenus itaq; rarum Naturæ miraculum, ipsiusq; operum exquisitissimus interpres, in nullius partis constructione expendenda adeò eruditum solertemq; ac industrium requirit auditorem, atque in capitis motuū, eiusdemq; cum duabus summis uertebris articulorū descriptione. Quid multa? tam paucos quæ in duodecimo de Vsu partium, de capitis motibus tradit, assequuturos cōtendit, ac uelut rei difficultate lectorem ita deterret, ut nemini mirum uideri debeat, me quoque hac in parte præceptoris opera penitus destitutum, ea qua licuit diligentia & Anatomes discendæ à puero, prorsus obfirmato animo ea perlegisse, ac ut Galeni sensa intelligerē, res ipsas orationi eius sedulò adhibuisse. An uerò frustra negociū attentauerim, tum demum nosces, ubi didiceris me non solum quæ Galenus docere conatur percepisse, uerū Naturæ in articulis hisce artificium, capitisq; motus ab ipso parum rectè tradi, tandem etiam intellexisse. Galenus enim capiti duos motus ascribēs, unum in annuēdo renuendoq; alterum in latera fieri docet. ac priore quidē intelligit, quo caput antrorsum flectimus, inclinamus, annuimusq; ac deinde quo caput retrorsum reflectimus & reclinamus, ea prorsus functione, qua Thraces & Cretensium plerique hac etiam ætate uidentur abnuere. Illi enim abnuentes, in posteriora caput rectā remouent, subleuant ue: non autem ut nos renuentes, id circumagunt, seu circumducunt. Cæterum altero motu, quem Galenus in latera fieri præcipit, illum subaudit, quo caput in latus inclinamus, ac ueluti humeris seu scapulis admouemus. Quod autem hæc de laterali motu, atque adeò de renuendo annuendoq; ipsius sit sententia, ex quarto de Administrandis sectionibus libro doceberis, si modò accuratè expendas, quo situ Galenus occipitis ossis^d capitula, quæ primæ uertebræ dearticulantur, locari, assurgere, innitiq; asserit, quum in hoc illudue latus caput agitur, & quum ex Galeni placito renuimus annuimusue. Huiusmodi enim profectò ipsius de capitis motibus est dogma: quorum priorem, qui annuendo renuendoq; fit, secundæ ceruicis uertebræ beneficio, aut super secundam perfici affirmat: posteriorem uerò motum, quo caput in latera ducitur, super primam ceruicis uertebam fieri ait, quemadmodum cum ex pluribus Galeni locis, tum præcipuè ex quarto de Administrandis sectionibus libro colligere promptissimum est. Vt enim illos libros omnium postremos scripsit, ita quoque suam sententiam & breuius & apertius in illis, quàm aliàs, explicuit. Num uerò hoc eius placitum ueritati sit consonum, ipse nunc mecum inquirito, atq; aliter quàm Galenus capitis motus (affectu interim aliquandiu represso) cōstituito. Primum itaq; caput aut primario motu, quiescente collo mouemus: aut secundo, quum scilicet caput colli motum sequitur, etiam si id in aliam partem, quàm collum mouetur, ducere coneris. Proprii capitis motus duo sunt. priori, id antrorsum flectimus, retrorsumq; inclinamus, extendimusue: quem motum conficis aut rigido immotoq; collo, aut collo etiam simul moto, siue id pari motu cum capite agas, siue contrario. Quamuis enim in anteriora collum ducas, caputq; necessariò collum insequatur, nihilominus tamen caput proprio motu in posteriora possis reflectere, atque leui negotio obseruare, collum caputq; proprios & priuatos in flexu reflexuq; motus obtinere. Alter proprius capitis motus, is censendus est, quo caput ita circumducimus, seu in gyrum agimus quodammodo, ut rota ad axem reuoluitur. Atque hunc motum etiam quiescente collo obibis, si modò dextra, modò sinistra uicissim intueri studueris, caputue circumuerteris. Præsens motus capiti omnino est proprius, & collum illo destituitur. quapropter etiam quocunq; modo collum moueris, hic capitis circumactus commodè perficitur. Flexo enim collo, capiteq; cum

Ceruicis uertebræ septem.

Galenus de Capitis motibus sententia.

Lib. 12 de Vsu partium. 4. de Administrandis sectionibus. lib. de Ossibus, capite 8.

Alia quàm Galeni de Capitis motibus sententia.

1

2

Articuli ca-
pitis motibus
parati.

Descriptio
occipitij ossis,
quod primæ uer-
tebræ articula-
tur.

Primæ cerui-
cis uertebrae
descriptio.

illo inclinato, id facile in gyrum ducis. sic etiam si collum fuerit extensum, aut in latus humero admotum, caput promptè circūagis. Cæterum ut caput uno circumactus motu, quo collum caret, priuatim donatur: ita collum quoque alterum peculiarem motum, quo in latus ducitur, sibi uendicat. Caput enim nullum obtinet peculiarem motum, quo in latus inclinetur, sed colli tantum beneficio motuq; secundo in latus fertur. Quippe nobis denegatum est, caput huic illi uel scapulæ uel minimum admouere, nisi collo illuc ducto. Duobus itaque proprijs motibus caput donatur, quorum prior, qui flexione ac reflexione perficitur, capitis cum prima ceruicis uertebra articuli fit beneficio: super primam enim uertebam caput flectitur, & reflectitur. Posterior motus, quo caput in gyrum ducitur, super secundam ceruicis uertebam celebratur. Caput enim simul cum prima ceruicis uertebra, super secundam, ueluti ad axem, circumducitur. Atque hæc mea de capitis motibus & articulis est sententia: quæ quantum à Galeni declinet placitis, promptissimè quidem colligis. num autem magis ueritati accedat, ex ossium constructione ligamentisq; hæc committentibus, & musculis illa mouentibus, discito. Cæterum ligamenta & musculos in secundo libro exequar, in præsentī ossa tantum aggressurus, in quorum sermone forsitan quæpiam quoque ligamentorum mentio incidet. Occipitij os ad latera foraminis dorsali medullæ uiam porrigentis, utrinque unum exigit^s capitulum, magis ad anteriorem foraminis sedem, quàm posteriorem uergens. Hæc capitula, si^h prioremⁱ posterioremq; ipsorum sedem spectes, oblonga sunt & arcuata, atq; ita prorsus extructa, quasi rotundum aliquod ossis caput, ^k ut femoris scilicet, quod coxendicis ossi articulatur, in duas partes dissectum esset, ac utrinque ad latera foraminis in occipitis osse insculpti, una illius capitis pars, reposita. Si enim utraque occipitis ossis capitula internis lateribus iuncta singas, ex ambobus rotundum (quanquam interim in homine satis depresso) caput constitui cernes. Quæ quum ita sint, facile constat, utrumque capitulum, uti diximus, oblongum esse, atqueⁱ interno latere magis quàm^m externo protuberare, ad eum nimirum modum quo in osse rotundi alicuius capitis media ac in tota superficie magis prominens pars, procerius, quàm partes in orbiculo posita, extuberat. Hæc erunt capitula, quæ primæ ceruicis uertebrae inarticulari, paulo posterius scribam. Nunc autem adhuc in occipitij osseⁿ asperitas crassitiesq; expendenda uenit, inter duonuper commemorata capitula, in hoc parata ut ualidior efficeretur insertio^o teretis ligamenti, ^p dentem secundæ uertebrae occipitis ossi colligantis. Hæc asperitas interdum adeò insignis uisitur, ut tuberculum aliquod dici mereatur, prominens gratia dicti ligamenti, & nonnihil etiam insertionis^a musculorum collum flectentium nomine. Posterior autem sedes foraminis dorsalem transmittentis, aspera quoque, sed non adeò ut anterior crassa est. ac etiam ad posteriorem utriusque capituli regionem, ^r sinus leuiter impressus conspicitur, in hoc paratus, ut cum alio primæ uertebrae sinu utrinq; foramen efformaret, quo^s primū dorsalis medullæ neruorum par procideret. Prima ceruicis uertebra reliquis omnibus dorsi ossibus solidior, densior, sed secundū longitudinē tenuior, & forma à cæteris omnibus plurimū differēs est. ^t Foramen namq; ipsi dorsalis medullæ gratia incisum, habet maximū, quod & hîc dorsalis sit crassissima. Deinde ipsius corpus^u interiori sede exculpitur, & ^v sinum in posteriori sui corporis sede leuiter incisum ostendit, qui cartilagine incrustatus secundæ uertebrae^y dentem excipit. Corpus enim primæ uertebrae hac ratione cauatur, ut dens ille in primā uertebra inibi reponi queat. Cæterum ne prima uertebra hoc modo in suo corpore exculpta, & corpore propemodū destituta, plus æquo imbecillis inualidaq; redderetur^z processu quodam & tuberculo in anteriori sede augetur, cuius beneficio illa crassescit, robustiorq; euadit: præterquam quod ipsum etiam tuberculum accommodum est suscipiendæ insertioni, primi dorsum mouentium musculorum paris. Eiusmodi itaque huius tuberculi usus est, non autē in hoc producitur, ut nimium capitis flexum prohiberet, caputq; in flexione sustineret: aut in causa esset, ut flexum caput alacrius denuò sursum & in posteriora reflecteretur, quemadmodum Galenus in quarto de Administrandis dissectionibus parum rectè asseruit. Nam (ut nihil hîc de capitis motu, super quam uertebam scilicet is fiat, dicam) caput nulla ratione eò usque inclinari potest, ut occipitis os id tuberculum contingat, tantum abest ut illo capitis moles suffulciretur. Cæterum prima uertebra ad latera^a cauitatis, quæ secundæ dentem admittit, est ualidissima, & crassissima, & utrobique^b unum ostendit sinum, quo sui lateris occipitij ossis capitulum excipitur. Sinus hi utrinque singuli, ut illis capitulis exquisitè responderent (si^c priora^d posterioraq; spectes) oblongi sunt, & ^e exterioribus lateribus sursum educti, ^f internis uerò profundis: non secus profectò, quàm si ambo sinus ex uno rotundo profundoq; sinu essent discissi. ^g Si enim coxendicis ossis, aut alterius ossis rotundo sinu donati, sinum diuideres, atque utrinq; ad primam ceruicis uertebam, ubi nunc sinus habentur, unam partem collocares, huius primæ uertebrae sinus tibi cōstituerentur. Vel

fi. A.
g. dextrū
figuræ B o-
stenditur.
h. i. fig. C.
i. i. fig. D.
k. i. 2 fig. 3 o
cap. A.

l. i. fig. E.
m. i. fi. F.

n. i. fig. G.
o. fig. margi-
gini paulo
post adhi-
benda I.
p. eiusdem
fi. H.
q. 8 muscul.
tab. A, B.
r. i. fi. H.
s. fi. 3 ca. 11.
lib. 4. F.
t. 2, 3, 4 fi-
gur. I.
u. 2, 3 fig. K.
x. 3, 4 fi. L.
y. 5 fig. 8, n.
dein 6, 11 fi
gur. r.
z. 2, 10 fig.
M.

a. 3 fig. K.
b. 2, 3, 10. fi.
dextrū no-
tant N.
c. 2, 3 fig. O.
d. 2, 3 fi. P.
e. 2, 3 fi. R.
f. 2, 3 fi. Q.
g. 1, 2 fig. 29
ca. 6, 8.

fi

si uertebrae sinus simul iunctos fingeres, unicum sinum rotundum profundumque ex ambobus efformatum cerneris. Quod tanto manifestius adhuc in prima canum & simiarum ceruicis uertebra contueberis, quanto illis animalibus sinus hi altiores profundioresue, ac capita occipitij ossis extuberantiora acutioraque obtigerunt. His itaque primae uertebrae sinibus occipitis capitula excipiuntur, atque in illis flectuntur & extenduntur, seu antrorsum retrorsumque rectissimo ducuntur motu. Nulla autem ratione caput huius duplicis articuli auxilio, in latera agitur: quamuis id Galeno Anatomicorum principi tot locis proditum fuerit. Primum nanque immoto collo, caput ne tantillum quidem in latera mouere possumus. Et, si caput super primam uertebra in latus ageretur, quis ambigit in eo motu primam uertebra debere immotam feruari: si modò in motu alterum articuli os oportere semper quiescere, Aristoteles in libro de communi animalium gressu recte demonstrauerit. Vt interim taceam Galeni impietatem, quae rerum Opifici rudem negligentiam turpiter imponit, quum se abunde Opificem celebrare arbitrat, tam proluxa praefatione attentum lectorem, & in demonstrandi methodo exercitatum, desiderat. Quid enim turpius (si modò uerum dicere licet) Naturae, nobis longè quàm Galenus est chariori, praeter meritum impingi potuit, quàm in dignissimo totius corporis articulo, extrema oscitantia? Nemo enim ignorat hunc articulum esse illum, qui ne minimo quidem temporis momento paruam inclinationem sustinet, multoque minus exarticulationem ac luxationem, qua homo mox respirationis expers, mutus & absque motu & sensu, tanquam affecta neruorum radice, redditur. Quis obsecro articulus totius corporis est, in quo ossis caput in alterius ossis sinu ita mouetur, ut caput non amplius sinum contingat: nullus profecto, praeterquam, si Galeno credimus, capitis cum prima ceruicis uertebra articulus. Ipse enim caput huius articuli beneficio in latus duci arbitrat, in quarto de Administrandis sectionibus asserere coactus est, quādo caput in dextrum latus ducitur, dextrum tunc occipitij ossis caput in dextrum uertebrae sinum stringi, sinistram uero caput ex sinistro sinu assurgere: & contra, si quando caput in sinistram latus inclinatur. Non igitur huic gemino capitis cum prima uertebra articulo in latus motum, sed flexum reflexumque tribuamus. neque adeò in Galeni uerba iuremus, ut tantam oscitantiam immenso rerum Autori in praecipuo corporis articulo imputemus: neque etiam in Galeni excusationem studeamus comminisci, ab illo motum in latera intellectum, quem ego in gyrum & circumactu fieri dico: neque etiam illum motum super primam uertebra fieri cum Iulio Polluce fateamur. Praeter id enim quod Galenus illum motum minime intellexit, quis adeò stupidus esse poterit, ut duo oblonga occipitis ossis capita mutuò distantia, & duos primae uertebrae sinus altos, seu profundos, & similiter oblongos subeuntia, circumagi posse autumat? Quis enim unquam circum utriusque cruribus asseri infixum, circumagi animaduertit? Neque est quod quis Galeno patrocinator, occipitis capita sibi depressa fingat, atque ita caput super primam uertebra circumagi posse contendat, quum Galenus inter reliqua ossium capita *κορώνης* nomine nulla unquam dignatus sit, his tantum occipitij capitibus demptis, quae passim *κορώνας* (sed non recte admodum) uocat, eo nomine rarum, quae in canibus potius quàm hominibus occurrit, mucronem insinuans. Huiusmodi itaque capitis cum prima uertebra est articulatio, & aliqua etiā eius uertebrae descriptionis pars. Reliquam autem nunc prosequemur, sensim ad alium capitis motum accessuri. Ad exteriora igitur sinuum occipitis ossis capitula excipientium latera, prima ceruicis uertebra utrinqueⁿ unum exigit transuersum processum, procerius multo quàm ceteri uertebrae ceruicis transuersi processus, eductum & latiusculum, non tamen aequè in hominibus ac in canibus caudatisque simijs instar alae cuiusdam latum. Educuntur autem transuersi primae uertebrae processus insigniùs, ut opportunam praeter reliquos ceruicis transuersos processus, duorum musculorum insertionem singuli acciperent. Illis enim processibus priuatim¹ quinta &^k sexta musculorum caput mouentium paria inseruntur. Hi processus magno perforantur^l foramine, per quod^m arteria & uena hac caluariam petentes feruntur. Ad posteriorē sinuum quibus caput inarticulatur sedem,ⁿ sinus utrinque in prima uertebra exculpitur, illi respondens,^o quem in occipitij osse ad posteriorem capitulum sedem caelatū dixi. Ambo enim sinus, occipitis ossis nimirum & primae uertebrae, simul uiam praebent primo pari neruorum dorsalis medullae. Canibus uero in prima ceruicis uertebra non sinus, sed proprium foramen hac elabenti neruo inscinditur, quod illis prima uertebra admodum ampla altaque sit. Caeterum hic hominis uertebrae sinus, etiam ad posteriorem foraminis partem pertinet, quo transuersus perforatur processus: ut ita sinus ille non neruo duntaxat, sed uenae arteriaeque etiam cedat. quas hac caluariam adire paulo prius relatum est, per^p foramen scilicet ad radicem capitulum occipitij ossis exculptum. Prima ceruicis uertebra posteriori processu, seu spina ob hoc inter reliquas uertebrae sola destituitur, quod is aliquot mus-

Caput flecti
& reflecti super primam uertebra.

Lib. 12 de V.
super partium.

Articulus totius corporis dignissimus.

Non semel in
lib. de Ossibus,
& 4 de Administr. sect.

Reliqua primae uertebrae descriptio.

*Sinus primæ
vertebræ tube-
ra secundæ ex-
cipientes.*

Tubera secundæ.


*Hic peculiarem
utriusque la-
teris cartilagi-
nem nonnunquam
a nobis obser-
uatam depinxi-
mus.*

*Secundæ uer-
tebræ dens.*

*Libro de Ar-
ticulis.*


*Dentis cum pri-
mæ uertebra
contextus.*

sculorum paria aculei modo uulnerasset, neque illis & præcipue⁴ tertio musculorum caput mouentium pari aptum iter, aut sedem tribuisset. Ea tamen parte, qua aliæ uertebrae in spinam definunt, hæc aspera est, & ueluti acuta linea extuberat, quo facilius quartum caput mouentium musculorum par hinc principium duceret. In inferiori primæ ceruicis uertebrae regione, sub duobus, quibus caput excipitur, sinibus, alij totidem insculpuntur leuiter ac in superficie caui, ob idque etiam γαλωφιδῆς appellati. Horum circumferentia orbicularis est in medio uix aliquid, quod diiudicari possit, caui obtinens, sed exteriora sinuum supercilia longe inferius, quam interiora descendunt, idque si hanc uertebam in erecto corpore secundæ inniti singas. His sinibus cartilagine obcrustatis, duo secundæ ceruicis uertebrae excipiuntur tubercula, quæ ad latus corporis eius uertebrae habentur minimum prominentia, uti & sinus primæ uertebrae leuiter excauantur. Tuberculorum circumferentia etiam sinuum modo orbicularis est, quamuis interim nonnihil^a posteriori parte extra circuli circumferentiam deduci uideatur. Ad hæc, b internum latus tuberum, elatius^c exteriori latere assurgit. Verum ea laterum altitudo depressioque non adeo insignis est, atque superciliorum primæ ceruicis uertebrae sinuum. Deinde tubera in medio seu centro non æque prominent, ac primæ uertebrae sinus inter supercilia cauti sunt: non secus sanè, quam si tuberum latera procerius quam ipsorum medium exurgeret. Unde etiam fit, in nudis ossibus inuicem adaptatis, sinus non ad amussim tuberibus respondere, & in illorum sinuum medio spacium non prorsus oppletum apparere. atque id priuatim hominibus accidit: canibus autem & equis aliisque animantibus plurimum caput circumducētibz, unum continuum utriusque lateris in secunda uertebra est tuberculum, & sinus quoque in prima ceruicis uertebra continuus apparet, tuberculo concinnè respondens. Hanc in hominibus inæqualitatem, Natura subinde peculiari cartilagine corrigit, quæ præter cartilagine ossibus crustæ modo obnatas, sinum & tuber intercedit, ac ligamenti in orbem articulum continentibus duntaxat adhaerescit, & superius inferiusque admodum uiscoso humore, tanque smegmate, oblinitur. Huiusmodi igitur primæ uertebrae sinuum cum secundæ uertebrae tuberibus duplex (utrinque scilicet unus) est contextus, eius quem statim dicam motus gratia efformatus. Nunc enim tertius secundæ uertebrae ad primam contextus adhuc fermoni est adiciendus, qui secundæ ceruicis uertebrae^d dente cum prima uertebra efficitur. In medio enim duorum tuberum secundæ uertebrae, ex superiori mediaque sui corporis regione, processus quidam insignis & altus, admodumque durus & solidus nascitur, quem quod denti ac potissimum hominis canino assimile, ὀδονταῖδῆς & ὀδόντα Græci uocarunt, quo etiam nomine Hippocrates secundam uertebra nuncupauit, non autem (ut Iulius Pollux, & Cælius, dissectionum imperiti male recensent) primam. Verum alij hunc processum à turbinis, seu nucis pinei imagine λεωφοδῆς: alij, quod cuspidis pyramidis uel modo extuberet, πυρίωνος & πυρινοδῆς appellarunt. Processus hic primæ uertebrae^e cauitatem subit, quam illic haberi scripsimus, ubi primæ uertebrae corpus deberet consistere, & ubi eiusdem sinum insculpi scripsimus, qui cartilagine oblitus, anteriorem dentis partem læui & lubrico^f tubere prominulam excipit. Posterior dentis pars, e regione eius tuberis^g posita, magis extuberat, crassiorque est quam ubi primum is à secunda uertebra producit. Hic enim utrinque ad latera^h sinus singulos, & tertium in posteriori sede, i^k exigat. Qui in lateribus conspiciuntur, inter dentis radicem & secundæ uertebrae tubera consistunt, unaque cum primæ ceruicis uertebrae sinibus, qui his respondent, k foramen utrinque parant, l neruulis transmittendis aptum, quos interdum hæc in musculos collum flectentes proci-



Quamuis præsens figura priuatim secundo libro sit propria, illam tamen hic reposui, quod ijs quæ hic traduntur intelligendis non mediocriter inuuet. Significetur itaque obiter A, B, C, prima ceruicis uertebra. D & D secunda. G secunda corpus. H dens. I transversum ligamentum à dente occipitis ossi insertum.

K transversum ligamentum, dentem in prima uertebra stringens.



quod firmiter ligamentum explantari inferi uel finit. Nullibi enim in ligamentorum enarratione interesse

q 14 musc.
tab. A, B.
r 3, 4, 10 u
fi. X.

s 14 musc.
tab. G, F.

t 4 fig. dex-
ter Y. fini-
ster 4, b uo-

tatur.
u 4 fi. inter
a & b.

x 4 fig. b.

y 4 fig. a.

z 5, 6 fig. c

dextrum si

nistr. d, e, f.

a 5, 6 fi. f.

b 5, 6 fig. d.

c 5, 6 fig. e.

d 5 fi. g, n. et
6 fi. h, i, k, l,
n. & 10, 11.
figure r.

e 3 fi. K de-
in L.

f 5 fi. g.
g 6 fig. h.

h 5, 6 fi. k, l.
i 6 figur. i.

k 11 fig. m.
l 2 fi. cap. 12
libri 4 N.

m 3, 11 fig.
o, o.

n. fi. 5, 6 n.
o. 10, 11 fi. r.

interessē puto, siue ea inseri, siue enasci dixerō, quum ligamentū pariter ad utrunq; os pertineat. Superior dentis pars, seu ipsius apex in mucronē testudinis capitis modo exacuitur, ut^o altius extra primam uertebra prominens, ex se robustum teresq; ligamentū educeret, quod occipitis ossi ad eam sedem alligari possit, quam in anteriori parte foraminis dorsalem medullā transmittentis, asperam, leuiterq; extuberantem cōspici scriptum est. Atq; eiusmodi profectō primæ uertebræ cum secunda cōtextus perficitur, duobus nimirū latis secundæ uertebræ tuberibus, totidemq; primæ sinibus, & uno rursus primæ sinu, cui dentis tuberculū committitur. Hunc contextum ex ipso potius rerum intuitu, quàm ex hac mea nō tam cōcinna quàm uera descriptione, disci malim, quò pressius dijudicaretur, num Galenus nos caput supra secundā flectere & extendere, seu horum articulorum ope annuere, ac Thracum modo renuere, uerè prodiderit: an ego perperam his contextibus caput unā cum prima uertebra uelut ad axem in gyrum duci, nihilq; minus quàm flecti ac extendi, contrā Galeni decretū tot locis grauiter repetitum, asseruerim. Si enim singula in ossium fabrica perquisiueris, secunda ceruicis uertebra tibi trabem referet, cui terræ infosso axem infigimus. ipse autem dens, axis erit. prima uerò uertebra, cui caput in hoc circūactus motu, ac si cum illa idem corpus esset, iungitur, trabi assimilatur ad axem reuoluto. Aut prima uertebra cardini confertur, ostio cōmisso: secunda autē, illi cardini quem parieti infixum uidemus. Præterea ligamentū transfuerim denti obductum, abunde commonstrat, primam uertebra nequaquā supra secundam flecti: si modò quiescente dente, prima uertebra antrorsum retrorsumq; in flexu mouenda esset. Quis enim ambigit, ligamentū id dentem in primæ uertebræ sinu continere? & illi non tantam laxitatem cum Galeno ascribi posse, ut primam uertebra adeò à dentis contactu in anteriora ferri sinat, ut caput iustum experiat flexum? Porro iam duo apud Iulium Pollucem nomina mihi succurrunt, quorum alterum primæ accommodat uertebræ, alterum secundæ. ac prima quidem ἐπιστοφὴς, secunda uerò ἄσφυς ipsi nuncupatur. Hæc nomina proculdubio à ueteribus, qui pueros in Anatome exercebant, manarunt: hoc nomine uolentes innuere uertebrā, axis modo quiescentem, ac super quam alia circumuertitur: illo autem, uertebram, quæ tanquam ad axem circumuoluitur. Atque id sanè meæ subscriberet sententiæ, qua caput super secundā in gyrum duci, iam sæpius asserui. Quòd uerò à ueteribus ante Galenum hæc nomina manarint, præter poëtas Celsus mihi autor est, qui tametsi ipsius codex ubi ceruicis explicat uertebras uiciatus sit, atq; ipse à se ne utiquam intellecta multorum Galeni interpretum more uerterit, attamen à ueterum quopiam, ex quo suum de ossibus Caput in latinam orationem conuertit, eam sententiā primū assumpsisse uidetur, quæ meæ, atque ipsi denique ueritati, proximè accedit. Neque profectō est quòd prolixius hæc referam, quum uel leporis, uel cuniculi, uel agni, uel hœdi ceruicem inter edendum contemplari integrum sit, & simul luce clarius intueri motum qui in gyrum fit, super secundam celebrari uertebrā: ac deinceps non amplius mirari, quam obrem Galenus auditorem adeò solertem, in Mathematisq; peregregiè institutum, in duodecimo de Vsu partium expectat: quum nemo ambigat, elegantem aliàs atque difficilem alicuius negocij descriptionem eo difficiliorem reddi, quo ipsa minus ab enarrāte intelligitur, isq; magis à Naturæ artificio, quod recensere proposuit, aberrat. Quòd uerò Natura præter flexum in anteriora, & in posteriora reflexum, etiam alios duos motus, quorū alter in latera, alter in gyrum circūactusq; fit, super primam uertebra non perfecit, quemadmodum brachium femurq; triplici motuum differentia moueri uoluit, hinc potissimum factū ducito, quòd primā uertebram magis ampliusq; quàm reliquas omnes dorsalis medullæ causa, perforari operæ precium fuerit, quodq; ob id unus duntaxat rotundus ampliusq; sinus in illa efformari nequiuert, neque etiam occipitis os foraminis sui occasione in unum tantum grande caput extuberare potuerit, quod in illo primæ uertebræ sinu perinde ac femur in coxendicis ossis sinu, omni motus specie agere. Quum itaque duplici articulo, dextro nimirum & sinistro, caput iungendū fuerit, omnisq; propemodum duplex articulus simplici solum motui famuletur, meritò Natura caput supra primam uertebrā flecti ac reflecti uoluit. Nam supra hanc in latera moueri nequiuert, nisi Natura hîc sui oblita, unum occipitis ossis caput in uno uertebræ sinu stringi, aliud uerò caput attolli, atque à prima uertebra prorsus disiungi cupiuiisset: quod in nullo tentauit articulo: id semper studens, ut articuli ossa mutuò essent cōtigua, neque ab inuicem abscederent, & nescio quam uacua à Galeno confictam sedem statuerent. Deinde caput in gyrum supra primā uertebram moueri minus potuit, nisi Natura acutum processum in capitis amplitudinem, qua cerebrum continetur, à prima uertebra produxisset, ad quem caput ueluti ad axem uolueretur, ac deinceps alia quam plurima nunc rectissimè formata, uitare proposuisset. Super secundā itaque uertebram

Caput cū pri-
ma uertebra su-
per secundam.



A unus car-
do, B alter.

Lib. 12 de V.
su partium.

ἐπιστοφὴς ὡς
ἄσφυς.

Cur Natu-
ra caput super
primam uerte-
brā simul quo-
que circumdu-
ci, & in latera
inclinari no-
luerit.

Libro 4 de
Administ.
sectionibus.

*Non potuiss.
se caput super
secundam fle-
cti & reflecti,
neq; etiam in la-
tus inclinari.*

*Quibus uerte-
bris motus late-
ralis committa-
tur.*

*Foramē secun-
dū par dorsa-
lis medullæ ner-
uorū in posteri-
ora transmittens.*

*Spina sex hu-
miliorum cer-
uicis uertebra-
rum.*

*Secundā uer-
tebram aliquot
sibi subditis ma-
iorem esse.*

*Transuerso-
rū ceruicis uer-
tebrarum pro-
cessū natura.*

caput artificiose in gyrum mouetur. si enim flecteretur, dens dorsalem frangeret medullam. Quum enim quieto dente prima uertebra antrorsum duceretur, posteriori sede sursum eleuata, tunc dorsalis medulla in primæ uertebrae foramine prorsus coarctata compressaq; abrumperetur. Deinde prima uertebra, supra secundā retrorsum nullo modo reflecti posset, nisi ipsa in anteriori sede, qua dentem continet, prorsus exculperetur, primaq; tunc uertebra à dente non præpedita, retrorsum liberè duceretur. Adde, caput neutiquam in latera supra secundam moueri potuisse, eadem ratione qua probauimus lateralem motum supra primam nequiuisse fieri. Alias enim necessum esset, primā uertebam in altero latere à secunda semper leuari, quod periculum nunc in circumactu non impendit. Porro lateralem motum Natura insigni profectò industria omnibus ceruicis commisit uertebis, quæ singulæ seorsum in latera moueri nequeunt, uerum simul omnes succedentibus motibus illuc adeò concinnè inclinantur, ut caput commodè secundario motu in latera citra omnem noxam feratur. At nunc rursus ad secundam ceruicis uertebam, ac sic deinceps ad quinque reliquas sermonem reflectamus, ueram duntaxat earundem constructionem enarrantes, ne casu quapiam noua disceptatione præfens Caput in immensum excrescat, atque ego nimium anxie Galeni (cuius diligentia alioquin cum omnibus medicinae studiosis plurimum debeo) sensa eruere, omnesq; ipsius Anatomicos lapsus studio commemorare, uidear. Secunda itaque ceruicis uertebra in posteriori tuberculo, quibus illa primæ uertebrae committitur, sede leuiter^s exculpitur, ut cōmune cū prima uertebra^t foramē utrinq; cōstituatur, quo^u secundū dorsalis medullæ neruorū par, in posteriora elabatur. Verum huius foraminis maiorem portionem prima efformat uertebra, insigniter satis ad posteriorem sedem sinuum, quibus secundæ articulat uertebrae, insinuata. Reliqua in secunda ceruicis uertebra commemoranda, cæteris etiam quinque inferioribus magna ex parte sunt communia.^y Hæc enim similiter atq; illæ, posteriori donatur processu: qui hoc priuatim in ceruicis uertebis sibi uendicat, quod suo mucrone^a bipartitur, ac præcipue secundæ uertebrae, triumq; ipsi subiacentium. Sexta enim uertebra admodum obscure sui processus diuisionem ostendit, atque adhuc multo minus septima. quæ priuatim hoc cum sexta sortitur, quod ipsius processus plerumque donetur appendice, ac procerius educatur, quodammodoq; ad superiorum thoracis uertebiarum^b processuum imaginem suo mucrone accedat, nisi quod ille his obtusior ampliorq; relinquatur. Cæterarum uerò ceruicis uertebiarum processus appendicibus carent, & lati, inæquales, asperi, & (ut ita dicam) ramosi, inferioriq; sede caui, ac superius gibbi cernuntur, ac utrinq; modicè depressi. quod extuberans linea facit, quæ secundum processus longitudinem porrigitur: quemadmodum etiam inferiori processus parte (quæ caua est) quidam lineæ instar ductus, secundum processus longitudinem ferri uidetur. Prominet autem in gibba sede, linea, ut ligamentum ab hac in cauæ sedis medium producat: quod secundum processus seu spinæ longitudinem porrectum, unam spinam alteri colligare, dextrosq; musculos à sinistris dirimere, in secundo libro scribemus. Verum hæ posteriorum processuum lineæ, in thoracis & lumborum uertebis conspectiores erunt, quod & illarum uertebiarum processus insigniores sint, & ualidiori duriori^c ligamento (quum minus moueri debeant) inuicem deligentur. Diuisionis autem in processulos potissima occasio musculi censentur, in posteriori ceruicis sede repositi, ut enim hi promptius principium ducerent, & ualidius quoque in uertebiarum spinas insertionem molirentur, hæ spinæ etiam in processulos dirimuntur. Atque id Natura in his colli uertebis peculiariter machinata est, quia non adeò longas spinas à paruis illis uertebis, atque à thoracis lumborumq; uertebis producere tutum fuerat. Deinde maior musculorum copia in ceruicis posteriori sede, quàm in alijs dorsi partibus collocatur, quemadmodum ubi musculos scapulas, thoracem, caput & dorsum mouentes persequar, auditurus es fusissimè. Porro musculorum etiam gratia secundæ uertebrae spina procerius, quàm aliquot ipsi succedentes spinæ, exeritur, cæterisq; latior uisitur, quod scilicet hæc priuatim^e tertio musculorum caput mouentium pari, & sexto quoque principium præbeat. Ne tamen iniuste Natura ex gracili uertebra prolixiorē latiorēq; educeret spinam, ipsa secundam aliquot sibi subditis grandiorē effecit: uerum non tam spinæ producendæ gratia, quàm ut secunda articulationi abundè sufficere posset, quam cum prima uertebra molitur. Atque hoc illud est quod antea asseruimus, Naturam semel atque iterum superiorem uertebam inferiori maiorem creauisse. Secunda enim crassior, & maior ualidiorq; est tertia: dein primam transuersorum processus occasione, omnibus ceruicis uertebis latissimam esse, supra docuimus. Cæterum transuersi processus in reliquis colli uertebis non admodum exporriguntur, & imprimis secundæ uertebrae, cui breuis & simplex utrinque transuersus obtigit processus. Videtur autem is in secunda uertebra minus quàm in alijs prominere, breuiorq; esse, propter huius uertebrae tube-

r 3, 4 fig.
re K, L.

s 6 fig. p.
t fi. 11 r.
u 3 fig. ca. 11
lib. 4. I.
x 4 fig. q.
y 5, 6, 7 fig.
guris f.
z 9 fi. t. c.
8 fi. chara-
ctere 11.
48 fi. f, w.

b 1 fi. ca. 16
N, O, P.
Hæc erunt
obuia, si 7
fig. spinam
cum spinis
cæterarū fi.
contuleris.
aut N, O, P
obserues 1,
2 figuræ ca-
pitis 16.

c 14 musc.
tabula A, B.
d eadem ta-
bula, K, L.

e 5, 6, 7 fig-
guris 11.

tuberum, quæ primæ sinus subeunt, amplitudinem, crassitiemq̃. Insuper hæc tuberum amplitu-
 do in causa etiam est, ⁱ foramen quo transuersus secundæ processus perforatur, non rectâ, sed
 obliquè exculptum uideri, secus atque in prima ceruicis uertebra, ⁸ & quinque secundæ subie-
 ctis, quarum transuersus processus recto amploq̃ foramine peruius est. Neque profectò hæc
 nus in homine ulla ceruicis mihi occurrit uertebra, quæ transuersum processum non gesserit
 perforatum. Verùm processus septimæ canum simiarumq̃ uertebre transuersum processum,
 absque foramine frequenter adinueni. Huiusmodi foraminibus solæ ceruicis uertebrae ornan-
 tur, in hoc perforatæ, ut ^h uenâ arteriamq̃ sursum ducant, quæ dorsali medullæ, ac tandem ipsi
 cerebro sanguinem spiritumq̃ deriuant. Præterea quatuor uertebrae, quæ statim secundam se-
 quuntur, hoc etiam peculiariter sibi uendicant, quòd illorum ⁱ transuersi processus ampli & bi-
 fidi sunt; non tamen interim, ut earundem spinæ, asperi & inæquales. Transuersi enim proces-
 sus forma inuicem respondent, & interior ipsorum pars semper latior est, elatiusq̃ ipsa poste-
 riori effertur. Spinæ autem partium impar in omnibus quasi uertebreis est forma, & illæ perpe-
 tuò uarijs modis protuberât atque exasperantur. Hæc transuersorum processuum amplitudo
 & bipartitio, eadem ratione accidit, qua spinas bifidas esse prius relatum est, nimirum muscu-
 lorum ortus insertionisq̃ gratia. Vt enim alios huius sedis præteream musculos, utrinque
 transuersis uertebrearum processibus priuatim ^k duos committi in secundo libro scribemus,
 quorum beneficio collum, & postea consecutionis motu caput in latera ducuntur. Hi muscoli
 in utroque latere ita collocantur, ut unus anteriori transuersorum processuum sedi, alter uerò
 posteriori ascribatur. Septima autem ceruicis uertebra transuersos processus latos quidem exi-
 git, at admodum obscure bipartitos. Quum enim ampli proceriq̃ sint, nulla incumbit necessitas,
 eosdem quoque bifidos fieri, præcipue quando muscoli collum in latus ducentes, non adeò ua-
 lidè septimæ ac cæteris comittantur, quòd hæc illis ueluti basis in dicto colli motu subiaceat,
 ac obscure non secus quàm thoracis uertebrae in latus moueatur. ^l Ascendentes descendentesq̃
 processus, quibus uertebrae mutuò articulantur, in omnibus ceruicis uertebreis secundæ
 subiectis similes sunt, & secunda quoque descendentes processus obtinet, aliarum processibus
 non dissimiles. Qui itaque deorsum spectât, & subditæ cõmittuntur uertebrae, orbiculari sinu
 nihil minus quàm altè inciso, & ab anteriori sede insigniter obliquè deorsum in posteriora
 ducto, ornantur. Ascendentes uerò processus, qui incumbenti articulantur uertebrae, tubercu-
 lum orbiculare habent, quod adeò leuiter superficietenusq̃ extuberat, ut ignores sinuum ne id
 an capitum numero ascribere debeas. Hoc tuberculum ascendentium processuum sinui con-
 gruit: & cartilagine perinde ac sinus incrustatum, ab anteriori sede deorsum in posteriora ad-
 modum etiam obliquè fertur. id quod non obiter considerandum est. Nam obliquus ille du-
 ctus in ceruicis uertebreis, quæ thoraci propiores sunt, minor semper, ac secundum corporis
 longitudinem rectior euadit, quòd illæ uertebrae nō adeò laxè ac superiores moueri, atque ob
 id etiam non tam laxè articulari, debeant. Ascendentes itaque processus suo tuberculo, sinum
 descendentium processuum subingrediuntur, atque ita secunda ceruicis uertebra tertiæ dupli-
 ci articulo alligatur, ut tertia quartæ, & sic reliquæ omnes ad thoracem usque consequentes.
 Septima enim ceruicis, primæ thoracis ascendentes processus excipit. Verum Natura non so-
 lum ceruicis uertebreis laxiores communicauit articulos, sed ut commodius aptiusq̃ quàm reli-
 quæ dorsi partes, collum insigni & quo maximè indigemus usu, moueri possit, ipsa aliud quo-
 que proprium colli uertebreis adhuc elargitur. Quum enim uertebrearum thoracis & lumborū
 corpora inuicem planis minimeq̃ extuberantibus cõmittantur superficiebus, ad eum modum
 quo duo læuigati ampli q̃ asseres mutuò incumberent, Natura ⁿ inferiorē ceruicis uertebrearū
 corporis partem oblongam, capitisq̃ alicuius articuli ad motum euidentem facti ritu, extube-
 rare uoluit, ac ^o superiorem corporis uertebrearum partem amplo sinu ita excauauit, ut oblon-
 gum superioris uertebrae corpus in hunc subditæ uertebrae sinum ingreditur, uertebrearumq̃
 compago ad mouendum promptior confurgat. Atque hæc compactionis species in secundæ
 uertebrae cum tertiâ, & deinde in aliquot subiacentium uertebrearum nexu magis est cõspicua.
 Colli autem septima, primæ thoracis quasi omnino plana innititur superficie, ac etiam ipsius
 corpus elatiori sede non adeò atque superiorum uertebrearum excauatur: quod præcipue acci-
 dit, quia superiores laxius inferioribus moueri, ex usu fuit. Cæterum quàm tutò uertebrae inui-
 cem ligamentorum ope colligentur, quamq̃ studiose Natura laxis his ossium connexibus pro-
 spexerit, muscoli & uertebrearum ligamenta in secundo libro affatim ostendent. Nunc interim
 DE I opificium summopere admiremur, quòd is simul & securitati, & multiplici motui tam
 incredibili industria prouiderit: & quāuis fortè crebriores ceruicis noxas luxationesq̃, quàm
 reliquarum dorsi partium fieri conspiciamus, nihilominus tamen adhuc magis obuersetur ani-
 mo,

Foramentū
transuersorum pro-
cessuum.

Ascendentium
& descenden-
tium processuum
natura.

Metire obli-
quum ductum
ab a ad b.

Corporū cer-
uicis uertebra-
rū contextus.

f. 7, u. fi-
gur. x.
8 fi. n.

h. ultima 3
lib. figuraf.
i 8, 10 fig. y.
2. & 9 figu-
re numeri
7, 8, 9, 10.

k 8 musc. ta-
bul. alter C
notatur. 14.
autem tab.
alter N.

l 9, u. fig. d.
& numeri
8 fi. 3, 4.
m 6, 7, 9,
u. fig. y.

Hic confer
ceruicis uer-
tebras, tho-
racis et lum-
borum uer-
tebris si. ca-
pit. 14.
n 9 fi. 3. &
8 fig. p.
o 9 fi. u, l,
n. Non au-
tem figuræ
numeri, 1, 2.

mo, tantam hominum frequentiam in collo eius laxae articulationis uitio ne utiquam affici: & expendamus pariter, quantum ad omnia uitae munia incommodi rigida immobilisq; ceruix adferat. Quod uero secundae uertebrae corpus in^p anteriori sede non planum reliquorum colli uertebrae corporum modo uisitur, at tubere secundum longitudinem ducto amplioris lineae forma extuberet, & utrinque ad eius tuberis latus deprimatur,^q musculi illi in causa cernendi sunt, qui collum flectentes, & hac sede coeuntes, in istam uertebrae corporis formam ualidius inferuntur. Verum quum tertia ceruicis uertebra secundae subiaceat, & utriusque lateris collum flectens musculus supra hanc etiam inferatur, non mirum est, anteriorem corporis tertiae ceruicis uertebrae faciem secundae uertebrae nonnihil esse consimilem: imò dictorum musculorum occasione omnium ceruicis uertebrae sedem ueluti compressam, non autem ut thoracis lumborumq; uertebrae semicirculi instar, protuberantē uideri. Quae quum ita se habeant, neminem latet, omnibus ceruicis uertebri non eundem processuum numerum obtigisse. Ne autem aliquid hinc praetermisisse uidear, necessum fuerit uel Galeni nomine alicuius uertebrae ceruicis processus ita recensere, ut undecim numero in illis processus adinuenias: totidem namque processus colli uertebri à Galeno ascribuntur. Assumito itaque tertiam, aut quartam, aut quintam, aut sextam colli uertebra, ac primum duos numerato processus in superiori corporis sede, utrinque uidelicet unum ad latus sinus, cui incumbentis uertebrae oblongum corpus infidet. tertium autem & quartum recense duos ascendentes processus, qui incumbentem subeunt uertebra, quintum uero & sextum, duos descendentes, quibus subditae uertebrae ascendentes processus excipiuntur. Porro septimum, octauum, nonum & decimum numerabis, transuersos processus: qui quum utrinque sint singuli, ac illi rursus gemini bifidiq; cernantur, quatuor constituunt processus, undecimus erit ipse posterior processus, seu spina. Verum quum uertebrae, quibus geminis utrinque transuersus accidit processus, spinam quoque^r bipartitam gerant, nihil obstiterit, cur minus hinc duodecimum quoqueingas, Galeni numerum aucturus. Item quia^s oblongum uertebrae corpus inferiori sede processus modo quoque educitur, quid prohibebit & id pariter decimi tertij processus loco, caeteris adijcere? Quod autem in prima ceruicis uertebra, & secunda, septimaq; alius processuum obseruetur numerus, atque ille adhuc in istis uariis, uel me tacente citra negocium prompte colligitur. ^t Foramina in uertebrae lateribus neruis à dorsali medulla transmittendis, & uenis quoque ac arterijs ad illam admittendis parata, eadem serie sub secunda ceruicis uertebra ad sacrum usque os constituuntur. Inter latus enim posterioris sedis corporis uertebrae, & ascendentes descendentesq; processus, sinus quidam^s supra^h infraq; in ambobus lateribus exculpitur, qui cum proximae uertebrae sinu commune foramen efformat, quo neruus profilit. Isti sinus in omnibus uertebri non pari se habent modo. in ceruicis enim uertebri semicirculus in superiori uertebra, & semicirculus in inferiori exculpitur, utraque uertebra parem operam ad foraminis constitutionem praestante. Aut si quis ad amussim singula excutiat, inferior uertebra in ceruice paulò maiorem portionem foraminis constituit, ipsa superiori. ⁱ Sinus enim in superiori uertebrae parte exculptus, ^k inter processum ascendente, & processum quem elatior corporis uertebrae pars producit, profundior est ^l sinu, qui ^m inter descendente processum, & corpus uertebrae caelatur. In lumborum uertebri prorsus contraria est ratio. superior enim uertebra, superiorem foraminis sedem lateraq; efformat, inferiori interim uertebra inferiorem foraminis illius partem, seu ueluti tertiam circuli partem duntaxat constituyente. Sinus enim in illis uertebri inter corpus ac descendente processum exculptus, multis numeris eius cavitatem superat, qui in superiori uertebrae parte inter corpus ipsius & ascendente processum caelatur. Thoracis autem uertebrae medio se habent modo. quae enim ex illis collo propius accedunt, colli uertebri hoc neruorum foramine respondent: quae iuxta lumborum uertebrae consistunt, lumborum etiam uertebri in foraminis forma asimilantur. Quamobrem uero Natura, in alia sede neruorum foraminaⁿ inter occipitis os & primam uertebra, ac rursus^o inter hanc & secundam caelauerit, quam in reliquis uertebri, cuius obuium esse arbitror, qui primae uertebrae cum capite, & eiusdem uertebrae cum secunda articulorum compagem sedesq; ex praecedentibus intellexerit. Haec namq; liquidò commonstrant, in lateribus articulo occupatis, uertebrae illas insculpi ne utiquam potuisse, nisi prorsus infirmum inualidumq; Natura hinc fecisset contextum, & mutuo ossium in assiduus motibus affricu, neruos rumpi uitariq; cupiuisset. Qua uero prouidentia haec foramina^p in sacro osse exculpit, in eius ossis historia percurram. Caeterum quod ad praesens Ca put adhuc spectat, colli uertebrae aliud nihil sibi priuatim affiscunt. Nam etsi omnium uertebrae secundam sequentium corpora superius inferiusq;, & ipsius etiam secundae corpus infra appendices in minoribus natu ostendant, id quoque omnibus uertebri secundae subditis commu

Processuum numerus.

Lib. 13 de V. su partium.

Foraminum neruos in latera transmittentium natura. In colli uertebri.



In lumborum uertebri.



In thoracis uertebri.

Vertebrae appendices.

p 5, 10 fi. 2, 4, 5.

q 8 muscul. tab. A, B.

Obseruato hic 8 figurā cuius numeri, processus seriatim de notant.

r 8 fi. 3, 4, 5. s 8 fig. 6, 7, 8.

ifi. ca. 14. Q2Q.

g 8, 9 fig. 1. h 7 fig. 2.

i 8, 9 fi. 1. k 9 fi. inter d & e. l 7 fig. 3. m 7 fi. inter 8 & 9.

n 2 fi. ca. 11. lib. 4 H, & 3 fig. F. o 2 fi. ca. 11. li 4 N, & 3 figura 1.

p 2 fi. ca. 11. lib. 4 cha. ract. 25. ad 30 usq;. & 3 fig. E. ad 56.

commune est. Quemadmodū & uertebras non uno osse in puerulis efformari, nulli negatum est uertebræ. Prima enim ceruicis duobus constat ossibus, inuicem appendicū more cōmissis. Apparet autem hæc unio, ubi primæ^q anterior pars consistit, & quā aliæ in spinam exacuuntur. Reliquæ autem ceruicis & thoracis & lumborum uertebræ præter appendices, tribus extruuntur partibus. Vna enim linea cartilagine oppleta, secundū spinæ ducitur longitudinem, à foramine dorsali medullæ parato ad spinæ usque apicem pertinens. Aliæ autem duæ ab eodem foramine productæ, corpus uertebræ à duobus transuersis processibus reliquisq; uertebræ posterioribus partibus dirimunt, quemadmodum in agno ac hædo est cernere. Quamuis id in puerulis obseruari malim, quòd ipsis ossium noxæ crebrius quàm ætate confirmatis oboriantur. Cæterū in ætate paulò prouectioribus, hæc ossium frequentia aboletur: appendices tamen etiam uigoris tempore aliquando non ita difficulter distinguuntur. In senibus autem non solum appendicum connexus oblitteratur, uerū uertebrarum corpora aliàs magno interuallo ob cartilaginei ligamenti interuentum diffita, adeò coalescunt, ut modò tres modò quatuor uertebras in illis ita concreuisse, ac simul in cemiterijs effodi uideas, ut inuicem diuelli nulla ratione queant. Coalitus iste quorundā processuum fit interuentu, quos corpus unius uertebræ ab externa ipsius superficie in aliud producit. Cæterum coalitum hunc in causa esse, cur minus dorsum moueant senes, & quòd nequaquam dorsum extendant, ipsiq; magis incuruentur, neminem ambigere reor, præcipuè si quis aliquando gibbosi uertebras inspexerit, hasq; incuruatas, & suis corporibus pertinacissimè unitas. Quanquam ad hæc, difficilem in senibus motum augent ossium superciliorū mira asperitas, & ossium tubercula, quæ capita in suis sinibus moueri prohibent. Postremò & insignis ligamentorum duricies, promptè uertebras moueri uetat.

Vertebra in pueris pluribus constare ossibus.

Vertebrarum in senibus nexus.

DE THORACIS VERTEBRIS.

Caput XVI.

PRIMA XVI CAP. SECVND-
PITIS FIGVRA. DA.

TERTIA. QVARTA.



QVATVOR PRÆSENTIVM FIGVRARVM ET EARVNDem characterum Index.

DVODECIM thoracis uertebrarum eas hic delineauimus, quas ostendendæ illarum descriptioni sufficere duximus. Integra enim dorsi uertebrarum series, figura decimo-quarto Capiti præposita, ac dein tribus integram ossium compagem ad huius libri calcem exprimentibus proponitur. Thoracis autem uertebræ simul cum costis, quæ illis articulantur, etiam seorsum duabus prioribus figuris exprimuntur, quæ decimo nono Capiti præfigentur. Prima uero huius Capitis figura unam ex medijs thoracis uertebris anteriori parte delineatam ostendit, cui ferè decem superiores thoracis uertebræ correspondent.

Secunda, eandem uertebram, quæ prima explicatur figura, posteriori facie spectandam offert.

Tertia, thoracis undecima uvertebra posteriori facie ostenditur.

Quarta duodecimam thoracis uertebram posteriori etiam facie expressimus.

A 1, 2, 3, 4

- A*_{1,2,3,4} *A* in omnibus obseruatur figuris, superiorē corporis partem notans, qua superposita cōmittitur uertebrae. Cæterum quia superiori parti inferior prorsus respondet, abs re fuisset uertebra thoracis ab inferiori facie delineare. Quod in tertia figura positum, appendicem notat superiorē corporis uertebrae, quæ adhuc post ossiū coctionē & emundationem ferè relinquitur.
- B*₁ Medium eius sinus, quem duabus uertebraarum corporib. communem esse dicemus, cuiq; costæ radix inarticulatur.
- C*₁ Eiusmodi sinus pars in inferiori uertebrae corporis sede sculpitur, quæ tanto minor est superiori parte *B* insignita, quanto communis sinus costæ articulandæ paratus, ad subiacentem uertebra magis, quàm ad superpositam pertinet.
- D*₃ Sinus undecimæ uertebrae, cui undecima dextri lateris costæ inarticulatur.
- E*₄ Sinus duodecimæ uertebrae, cui duodecima dextri lateris costæ coarctatur.
- F*₄ Sinus asper & profundus, ex quo ligamentū prodit, duodecimā costā suæ cōnectens uertebrae.
- G*_{2,3,4} Foramen grandius posteriori uertebrae corporis sedi, quæ dorsale medullam respicit, incisum.
- H* & *I*_{1,2,3,4} Transuersi processus uertebraarum thoracis.
- K*₁ Sinus in apice transuersi processus, cui costæ articulatur, conspicuus.
- L*₁ Sedes transuersi processus, quam gibbam esse dicemus.
- M*₁ Sedes transuersi processus caua. Quod autem in reliquis tribus figuris posteriorem uertebraarum faciem exprimentibus, transuersi processus nonnihil decliues ferri apparent, ob hoc euenit, quod in his delineationibus superioris uertebraarum partis magna conspicitur portio. Oculi enim acies ad posterioris sedis medium, studio non fuit directæ.
- N*, *O*, *P*_{1,2} Spina, seu posterior processus, ac in secunda quidem figura superior spinæ exprimitur sedes, in qua *N* & *O* & *P* tres lineas notant, triangularem figuram simul constituentes. & interuallū inter *N* ac *O* una est superficies superior, & aliud interuallū inter *N* & *P* altera est superficies superior. Verum prima figura tertiam ipsius processus superficiem notat, quæ inferior est, ac inter *O* & *P* consistit. Quod autem iuxta *N* in prima figura inumbratum cernitur, alterius superiorum superficierum est portio.
- Q*₁ Linea in tertia superficie extuberans, quæ aspera & inæqualis est.
- R*₃ Spina undecimæ thoracis uertebrae.
- S*₄ Spina duodecimæ thoracis uertebrae.
- T*, *V*₁ Uertebraarū thoracis, quæ supra duodecimā consistunt ascendentium processuum anterior sedes.
- X*, *Y*_{2,3} Ascendentium thoracis uertebraarum processuum posterior sedes, qua illi processus extuberant, & cartilagine incrustantur.
- a* *b*_{2,3} Descendentium thoracis uertebraarum processuum exterior sedes.
- c*₁ Hic uidetur dextri descendentis processus anterior sedes, quæ sinuatur, cartilagineq; obductur, & ascendentis subiectæ uertebrae processus tuberculum excipit.
- e*, *f*₄ Ascendentes duodecimæ thoracis uertebrae processus, undecimam subcuntes uertebra.
- g*, *h*₄ Descendentes duodecimæ thoracis uertebrae processus, qui ascendentium primæ lumborum uertebrae processuum sinibus inarticulantur.

Plurimū duo
decim thoracis
esse uertebra.



Quandam uer
tebram supra
infraq; ab alijs
suscipi.

THORACIS uertebrae numerantur² duodecim, præterquam quod aliquando, tametsi rarò, aliquibus uel deest una, uel superest. Sed deesse rarius, quàm superesse, inuenitur. Patauij nanque duo corpora, tredecim singula thoracis donata uertebriis mihi occurrerunt, quum interim hæcenus undecim tantum uertebrae nunquam uiderim. Neque etiam lumborum ceruicisq; uertebraarū numerus tam crebro, atque thoracis, uariatur. Præterea, etsi thoracis uertebrae pari constant numero, non tamen in omnibus eandem articulationis commonstrāt speciem. Quum enim una thoracis uertebraarum sit, quæ uertebra ipsi superpositam ascendentibus processibus & subiectam descendentibus pariter subeat, duabus uel excipitur uertebriis, hæc tamen nō eadem (licet duodecim tantum thoracis sint uertebrae) se offert. quandoquidem nunc undecima, nunc uerò duodecima, aut alia quæpiam interdum hoc articuli genere proximis committitur uertebriis. Quò igitur accuratius, quænam hæc sit, quæq; ratione alijs coarctetur, quiuis promptè intelligat, præsens negocium descriptu utcunque arduum, sed demonstratu mihi per facile, quàm potero diligentissimè modo

fi. cap. 14.
C, D. Inter
græ K ad
L. Deim totus
uertebraarū
textus 1, 2
fig. cap. 19.

dò aggrediar, omnes thoracis uertebraŕum partes ordine enarraturus, ut in quibus illæ inuicem pugnent, ocyus quis adinueniat. Quippe in thoracis uertebriŕis nō mediocris occurrit differen-
tia.^b Primū itaque thoracis uertebraŕum corpora tantum magnitudine inter se discrepant, quantum una, alia collo uicinior consistit. Primæ nanque thoracis uertebrae corpus magnitu-
dine admodum duodecimæ corpori cedit.^c Deinde corpus primæ, superiori sua sede, qua se-
ptimæ ceruicis cōnectitur, non omnino planū est, sed modicè utrinque ad latus extuberat, cer-
uicisq; uertebraŕum^d corpora obscurè imitatur. Inferior autem huius corporis pars, plana con-
stat superficie,^e quemadmodū & inferior superiorq; omnium thoracis uertebraŕum corporum
superficies. Nullum enim thoracis uertebraŕum corpus inferiori parte, uel leuissimè in longum
decliue protenditur, & in subsequētis uertebrae corporis sinum (^f ceruicis uertebraŕum ritu)
desinit. Vt cunque etiam aliter Galenus attestetur, parem quodammodo articulationem tho-
racis uertebriŕis tribuens, quam in præcedenti Capite ceruicis uertebraŕum corpora moliri do-
cuimus. Ad hæc, primæ secundæq; thoracis uertebrae corpus, nō adè anteriori parte rotundū
seu orbiculare prominet, atque reliquarum thoracis uertebraŕum corpora, quæ multo magis
quàm supremarū corpora ad circuli seu literæ C conuexi imaginem accedunt, proceriusq; in
thoracis amplitudinē protuberant. Videntur enim duæ superiores thoracis uertebrae, ceruicis
uertebraŕum modo, in anteriori corporis sui sede depressæ, multoq; (ut sic dicam) ampliores,
quàm profundiores, ac ad cōuexum semiparenthesis (potius quàm C formatae. Quod ipsis
priuatim cū articulationis laxo motui aptæ gratia, tum^g musculorum collum flectentium oc-
casione oboritur. Musculi enim illi, ita utrinque primarum thoracis omniumq; ceruicis uerte-
braŕum corporibus insternūtur, ut liquidò constet, ea corpora ab illis comprimi. Reliquarum
autem uertebraŕum corporibus huiusmodi musculi neque adhaſcuntur, neque incumbunt
quoque. Præterea omnibus thoracis uertebraŕum corporibus hoc commune accidit, quòd
utrinque sinus habeant, quibus costarum capitula inarticulantur. Verū ut costarum capitula
in illo articulo uariant, ita etiam iſdem omnino sinibus non omnes uertebrae decorantur. Vbi
enim prima thoracis secundæ committitur, & secunda tertiæ, atq; ita deinceps ad nonæ usque
cum decima conuexum,^h sinus quidam in ambobus lateribus iuxtaⁱ foramina neruorum no-
mine parata inſculpitur, qui utrarumq; inuicem colligatarum uertebraŕum corporibus com-
munis existit, ac partim in superioris uertebrae corpus, partim in inferioris excinditur. quan-
quam interim huius sinus grādiōr portio ad inferiorem uertebraŕam potissimum pertineat. Si-
nus iste incrustatur cartilagine, & obtusi anguli penè forma cælatus est, quemadmodū & costa-
rum^k capitulū sinum subiēns anguli obtusioris modo extuberare, in costarū tractatione com-
monstrabimus. Cæterū prima thoracis uertebra hoc proprium cum undecima & duodeci-
ma adipiscitur, quod utrinque peculiarem habeat sinum alijs uertebriŕis non communem, in
ipsiusq; corpore duntaxat in cūsum. Ad superiorem enim sedem corporis primæ thoracis uerte-
brae, sinus utrobique exculpitur rotundus, & satis insigniter cauus, ac denique cartilagine obli-
tus, cui primæ thoracis costæ radix rotundo capitulo inarticulatur. Deinde ad inferiorē huius
sinus sedem alius insigniter profundus cōspicitur, asper & inæqualis, & foraminibus quibus-
dam oppletus, neque cartilagine inunctus, à quo ualidissimum prodit ligamentum costam in
suo sinu robustissimè stringens. Pari ratione sinus in duodecima uertebra duodecimæ costæ
gratia inſculptus, ad inferiorem ipsius sedem alium quoq; asperum, sed minus quàm postremò
dictus primæ uertebrae sinus, profundum adipiscitur, qui ligamenti duodecimam costam fir-
mius uertebrae adnectenti nomine cælatur. Postremò thoracis uertebraŕum corporibus etiam
substātiæ ratione quædam accedit differentia. quanto enim cuiusq; uertebrae corpus grandius
maiusq; est, tanto etiam minus apparet solidum, sed fungosum, & multis inæqualibus uarijsq;
foraminibus incerta serie interſtinctum, in quæ uenæ arteriæq; corpus uertebraŕum enutrituræ
subintran. Nisi enim uasorum surculi crassorum ossium substātiæ insinuarentur, impossibile
esset mediam intimamq; & à superficie remotissimam ossis substātiā, sibi nutrimentū (quan-
doquidem ita distat) allicere. Inter cætera huius generis foramina, nullibi insigniora se offerūt,
q̃ in posteriori corporis uertebraŕum sede dorsale medullā respiciēte. Vbi in plurimis uertebriŕis
unū peculiare cernitur foramen, pro uertebrae mole magnum, & asperum, & in multa desinens
foraminula. Et quamuis Galenus huiusmodi foramina, priuatim lumborū uertebriŕis uideatur
adscribere, si tamen quis singula studiosè rimabitur, conspiciet primam lumborū & thoracis
duodecimam, & undecimam, aliquotq; uertebraŕas ipsis superpositas, hæc foramina pro illarum
magnitudine insigniora, plura & altiora exigere, harumq; uertebraŕum corpus fungosius, quàm
cæterarum omniū esse. Quòd scilicet magnæ sint uertebrae, & cauæ uenæ^m caudicem sibi inni-
tentem non fortiantur, ac duntaxatⁿ uenæ paræ carentis propaginibus implicentur. In^o trans-
uersis

*Thoracis uer-
tebraŕum in cor-
poribus diffe-
rentia.*

*Libro de Os-
sibus Cap. 9.*

*Ex sinibus
quibus costæ
articulantur
differentia.*

*Differentia ex
corporum sub-
stantia.*

*Libro de Os-
sibus Cap. 10.*

*Differentia a
transuersis
processibus.*

*Libro de Os-
sibus, & octa-
uo de Admi-
dissec.*

*In Lib. de Os-
sibus.*

*Tum alibi se-
pius, tum maxi-
me 8 de Admi-
dissec.*

*A spina diffe-
rentia.*

uerfis processibus, uertebrae thoracis etiam inuicem uariant, uerum non adeo ut Galenus in decimotertio de Partium usu prodidit, decimam & duas ipsi succumbentes transuersis priuans processibus. Omnibus enim thoracis uertebriis utrinque unus transuersus obtigit processus, qui magnitudine in nouem superioribus uertebriis uix quicquam differt. decimae autem uertebrae transuersi processus minus, quam superiorum uertebrearum, extuberant, ut etiam decima, quae ipsi committitur costa, admodum parua spuriaque est. Undecimae uero uertebrae transuersi processus minores adhuc decimae sunt, & duodecimae processus adhuc minores ipsius undecimae: nimirum quod non tantus horum processuum usus, atque superiorum uertebrearum processuum, sit. Caeteris enim omnibus costae articulantur, quarum gratia thoracis uertebrae ualidissimi crassissimosque processus transuersos sibi uendicant. Duodecimae uero & undecimae transuersis processibus costae non articulantur. duae enim infimae utriusque lateris costae, unica tantum ad uertebrearum corpus articulatione committuntur, reliquis interim ad uertebrearum corpora & processuum transuersorum apices dearticulatis. Ad^p apices nanque transuersorum processuum nouem superiorum thoracis uertebrearum sinus cartilagine incrustati uidentur, quibus costarum^q capitulum articulatur. In transuersis autem decimae uertebrae processibus eiusmodi sinus aut nulli, aut interdum obscuri conspiciuntur: in duarum uero infimarum processibus prorsus nulli occurrunt. Praeterea sinus in transuersorum processuum apicibus sculpti, omnes quidem anteriori processuum sede habentur: uerum alij superiorem, alij mediam magis occupant. Primae enim uertebrae transuersorum processuum sinus deorsum spectant, nonae uero sursum, mediae autem medio se habent modo. Quod Galenus quidem parum animaduertisse uidetur, quum costarum nexus explicans, huiusmodi sinus omnes deorsum spectare, atque inferiori apicis transuersorum processuum sede insculpi arbitratur. Qui decimam thoracis uertebrae, & duas huic subiectas nequaquam transuersis processibus ob id debebat priuare, quod illi totius dorsi in latus motum essent praepedituri. Si enim motus illius ratione Natura transuersos processus illis uertebriis abesse uoluisset, non magis uertebrae decimae (quam Galenus supra infraque suscipi tradidit) subditas, quam superpositas, debuisset illis processibus priuare. Nam si inferiorum uertebrearum transuersi processus motui laterali obstaculo erant futuri, profecto superiores non minus motui, quam inferiores obstitissent. Quemadmodum enim dorsi pars, quae uertebrae supra infraque exceptae subijcitur, sursum in illo motu ducitur: ita etiam superiacentem partem deorsum ferri necessum est, si modo ueluti in semicirculo dorsum in latus duci debeat, cuius semicirculi circumferentiae medium punctum uertebra illa merito censetur, quae supra infraque suscipitur, quaecumque etiam haec sit. At quid opus est huic sermoni, adhuc propter uertebrae utrinque susceptam intellectu difficili, immorari? quum decima & duae ipsi succumbentes thoracis uertebrae tam insignes transuersos processus habeant, quam illorum usui in musculorum exortu insertionemque expedit. Quinetiam Galenus uini nescio quam memor, passim omnes costas duobus internodiis articulari prodidit, uno scilicet uertebrae corpori, altero autem transuerso processui. quod si esset (uti sane non est) nunquid & decima thoracis uertebra, & duae ipsi subditae necessario transuersis donarentur processibus? Quo autem ductu illi aut sursum aut deorsum porrigantur, tunc dicemus, quum thoracis uertebrearum spinas sermoni subnexuerimus. Natura enim omnibus thoracis uertebriis spinam toto ductu simplicem, minimeque bifidam largitur. Atque huius spinae in omnibus uertebriis non eadem forma uisitur. Nouem enim superiores^s longissimas exigunt spinas, non admodum amplas, at tamen ex ampla basi in mucronem sensim desinentes, triangulique imaginem ita referentes, ac si triangulari constarent pyramide. Superiori nanque sede^r rectam acutamque ostendunt lineam, secundum ipsarum longitudinem exporrectam, & deinde utrinque ad^u latera iuxta inferiorem ipsarum sedem, simile etiam obtinent lineam, adeo ut spinae unius, tres longae acutaeque lineae, ternas superficies efforment: quarum^x duae superiorae spinae sedem constituent, quae superiorae uertebrae respicit, atque harum una utrinque habetur. ^y tertia superficies inferiorem constituit sedem, subiacentis uertebrae spinae incumbente. Tres istae superficies in eadem spina in nouem superioribus uertebriis, ut plurimum pares & aequae amplae cernuntur, et duae superficies exacte laeues sunt. tertia autem & inferior aspera est, & ueluti^z linea secundum ipsius longitudinem ducta interdiuiditur. Ab hac tertiae superficiei linea ligamentum prodit, quod lineae duabus superficiibus communi inferitur, ac inuicem spinas colligas, interuallumque earundem opplens, dextros spinae musculos a sinistris dirimit, illi respondens ligamento, quod^a inter ulnam & radium, ^b ac inter tibiae os & fibulam consistere dicam. Interdum superiores superficies inferiori ampliores apparent, ipsaeque spinae a lateribus magis (quemadmodum in quadrupedibus cernitur) sunt depressae. Decima thoracis uertebra non ita prominentem, atque superiores uertebrae, spinam exigit: neque haec triangula-

p 1 fi. K. &
3 fig. cap.
19 c. b.
q 4 fig. ca.
19 M.

r 8 fig. 15
cap. f. w.
s 1, 2 fig. N.
O, P.
t 2 fig. N.
u, 2 fig. O.
P.

x 2 fig. una
ab O ad
N. altera
ab N ad P.
y 1 fig. in-
ter O et P.
z 1 fig. Q.

a 1 fig. cap.
1 lib. 2 a in-
ter E & I.
b 7 mus. ta.
S, T, V.

rem

rem illam imaginem adeò scitè commonstrat. Duæ enim superiores superficies, amplæ admodum sunt. tertia autem inferior ue angusta cernitur, nec ualde depressa, sed insigniter aspera & inæqualis. Præterea spinæ huius mucro obtusus ampliusq̃ est, non ut superiorū uertebRARUM spinæ acutus & strictus. Vndecimæ uertebRæ^c spina, adhuc minus quàm decimæ exporrigit, & utrinq̃ magis adhuc deprimitur, ampliorq̃ (si superiora inferioraq̃ inspexeris) efficitur. Deinde inferior ipsius superficies in lineam insigniter extuberat, neque amplius depressa, sed arcuata & aspera uisitur, huiusq̃ spinæ mucro admodum obtusus est ac spissus. Duodecimæ^d spina, adhuc magis à superiorum uertebRARUM spinis uariat, ad lumborum uertebRARUM^e spinæ imaginem magna ex parte accedens, quæ utrinque admodum depressa est: & si summum imumq̃ spectes, admodum lata & ampla. Cæterum ut omnibus uertebRIS non eadem spinarum forma accidit, sic etiam spinæ ductu inuicem discrepant. Nouem nanque superiorum thoracis uertebRARUM spinæ, ut & ceruicis, insigniter decliues feruntur, seu à summo ad imum tendunt. Decimæ autem thoracis uertebRæ spina minus quàm superiorum spinæ deorsum conniuet, magisq̃ rectà retrorsum fertur. Vndecimæ spina adhuc rectius erigitur, & huius rectitudinem duodecimæ spina uincit. Verum interim harū nulla adeò rectà fertur, quin ipsius mucro semper magis deorsum, quàm sursum, uergat. quod etiam omnium in lumbis uertebRARUM spinis accidit, deorsum magis quàm sursum spectantibus. Atque hæc in hominis dorso subaudienda sunt. Canibus enim, simijs, leporibus, & alijs ferè quadrupedibus prorsus contraria est ratio, Galeni dogmatibus pulchrè quadrans. His enim decimæ thoracis uertebRæ spina neque deorsum neque sursum uergit, & duæ deinceps, quæ statim decimæ subiiciuntur, spinam habent obscure superiora suo mucrone spectantem. Reliquæ uerò has adhuc subsequentes spinas exigunt ab imo sursum porrectas. longè profectò secus, quàm homo, cui ne unius quidem uertebRæ spinam sursum magis, quàm deorsum, inclinare, nemo uerè asserturus sit. Transuersi colli uertebRARUM processus, quemadmodum & nouem superiorum thoracis, ex Galeni sententia, decliues, seu à summo ad imum deberēt porrigi: uerum id adeò obscure leuiterq̃ fit, ut uix mentione dignum uideatur. Quandoquidem si transuersos colli uertebRARUM processus non perfunctoriè consideraueris, dices illos^f externo seu posteriori eorum latere, deorsum respicere: interno autē seu anteriori latere, quod posteriori latius est, sursum tendere. Transuersi autem nouem superiorum thoracis uertebRARUM processus, toto ipsorum corpore retrorsum & sursum magis, quàm deorsum, feruntur. Verum^h superior eorundem pars gibba uisitur, inferior caua, & nonnihil sinuata, quasi hac ratione descensus ad inferiora speciem processus illi referrent. Transuersi autem processus duodecimæ thoracis, non solum sursum conniuet, uerum etiam egregiè retrorsum ducuntur, quemadmodū & undecimæ & decimæ processus nonnihil sursum spectāt. Transuersi lumborū uertebRARUM processus admodū obscure sursum ducuntur: quanq̃ uertebra sacro ossi cōmissa, paulò manifestius suos processus sursum efferre cernitur. In canibus transuersi processus colli uertebRARUM perquam conspicuè & manifestò deorsum tendunt. Thoracis autem uertebRARUM processus, aut non deorsum feruntur, aut admodum leuiter. Verum lumborum uertebRARUM processus insigniter in altum oblique porriguntur, & Galeni descriptionibus adamussim conueniunt: si modò uertebRARUM numerum exceperis, plures enim lumborum uertebRæ canibus & caudatis simijs obtigerunt, quàm hominibus, qui etiam plerunque à canibus una thoracis uertebra superantur. Ad hunc igitur modum transuersi posterioresq̃ thoracis uertebRARUM processus constituuntur. illi ueròⁱ quos ascendentes & descendentes uocamus, ea quæ nunc subsequitur serie disponuntur. VertebRARUM omnium quæ suprà sacrum os habentur, articulationis, quæ nuper dictis efficitur processibus, duplex est ratio: aut enim succumbens uertebra superiacentem subintrat, ac ab illa suscipitur: aut succumbens superiorem in suis sinibus excipit. adeò ut omnis uertebra, duabus tantum demptis, una parte suscipiat, altera suscipiatur. Prima enim ceruicis uertebra & superiori & inferiori sede suscipit, ^m superiori quidem occipitis ossis capitula, ⁿ inferiori autem secundam ceruicis uertebRā. ^o Duodecima uerò thoracis (nisi alia quæpiam interdum sit) utrinque suscipitur, nullam interim suscipiens. Omnes itaque hac uertebra superiores, ad primam usque ceruicis, priori articulationis genere committuntur. superior enim semper inferiorem excipit, ut decima thoracis undecimam. Quæ autem sub utrinque suscepta locantur, superiori quidem sui parte superiacentem excipiunt, inferiori autem parte subiacentē ingrediuntur. atque ita prima lumborum uertebra à secunda suscipitur. Thoracis uertebRæ supra utrinque susceptam repositæ, eandem in ascendentibus descendentibusq̃ processibus speciem cum ^p colli uertebRIS obtinent. Sunt autem hæc thoracis uertebRæ, secundū Galeni sententiam in libro de Ossibus, nouem superiores: aut alicubi in libris de Vsu partium decem. Is enim hîc undecimam, illic ue-

Spinarum ductus.

Libro de Ossibus, & libro 13. de Vsu partium.

Transuersorum processuum ductus.

Tum alibi, tñ in lib. de Ossibus.

Differentia ab ascendentibus & descendentibus processibus, eorumdemq̃ articulationis ratio.

rò decimam thoracis suscipi tradidit, uti in simijs & canibus cernebat. mihi autē nunquam decima utrinque suscipi in homine uisa est, sed plurimum duodecima. Aliquādo enim cum sacrum os quinque tantum ossibus efformatum repperi, undecima mihi utrinque suscepta occurrit. Verū Bononiæ Galli cuiusdam sacerdotis ossa contexuimus, in quibus prima lumborum utrinque suscipitur, & illa suos processus perinde sibi articulatos gerit, ut duodecima thoracis uerterbra duodecimas costas. Quum itaque duodecima thoracis frequentissimē utrinque suscipi appareat, ab hac orationem instituamus. Undecim thoracis uerterbrarum^q processus ascendentes protuberāt, ac in^r exteriori posteriori ue sede, notatu digna orbiculari^q circumferentia cartilagine incrustantur, atque horum processuum tuber adeò leuiter ac in plana superficie extuberat, ut num sinus, num tuber censendū sit, uix internoscas. Descendentes autem processus^s interna anteriori ue ipsorum sede, qua foramen dorsalis medullæ gratia cælatur respiciunt, sinum quoque adipiscuntur amplum, & quodammodo orbicularem, & cartilagine incrustatum, & nuper dicto tuberi ad amussim respondentem. Hi sinus & tubera, à colli uerterbrarum sinibus tuberibus^q in ductu duntaxat uariant. Colli enim uerterbrarum sinus, ac tubera oblique ab anterioribus sursum porriguntur, aut contrā oblique deorsum tendunt. Nihil enim refert, siue sursum, siue deorsum porrigi dixeris, modò obliquitatem illorum intelligas, & cum thoracis uerterbrarum sinuum tuberum^q ductu conferas. qui quandantenus recto perficitur tramite, quò firmior minus^q ad motum se quax thoracis uerterbrarum cōtextus foret. Quum igitur thoracis uerterbrarum, ut & colli, ascendētes processus posteriori sua sede protuberent, descendentes uerò interna sede cælentur, meritò ascendentes inferioris uerterbræ processus subintrant descendentes superioris uerterbræ processus, inferior^q uerterbra à superiori excipitur.

Cæterum lumborum uerterbræ, alia ratione coordinantur. Ascendentes enim illarum processus interno latere, quo se inuicem illi respiciunt, sinum habent oblongum, & ampliter satis cauum. Descendentes autem processus latere suo externo (modicè interim uersus anteriora) oblongo protuberant capitulo, quod in inferioris uerterbræ ascendētis processus sinu aptè excipitur. Adeò, ut in lumborum uerterbris inferior uerterbra suis sinibus superioris admittat capitula: secus quàm in ceruice & thorace, ubi superior suis sinibus inferioris uerterbræ tubercula excipit. Duodecima autē thoracis uerterbra, ascendentes processus similes gerit cum ascendētibz ceruicis ac thoracis uerterbrarū processibus, quos posteriori sua sede extuberare diximus. Atq; ideo duodecima ascendētibz suis processibus undecimæ thoracis uerterbræ descendentes subit, ipsa^q ab undecima excipitur. Descendentes uerò duodecimæ processus extuberant quoq; descendētiū in lumbis uerterbrarum processuum ritu. deinde hi subeunt sinus ascendētiū processuum primæ lumborum uerterbræ. quæ quum duodecimā excipiat, quid promptius colligi possit, quàm duodecimam suprā infra^q suscipi? Verū interim non ita multum refert, an duodecima, an undecima, an alia quæpiam utrinque suscipiatur: modò nos indicibilis Naturæ industria hīc non lateat, quæ in dorfi medio uerterbram effinxit, stabilem, & utrinque ita susceptam, ut in cameratis & arcualibus ædificijs architectos inter utriusque lateris lapides unum locare cernimus, qui utrinque suscipitur, ipso interim nullum suscipiente: quemadmodum cæteri omnes unum lapidem suscipiunt, & ab alio excipiuntur, sustinentur^q. Ut enim dorsum sibi dicatis ageretur motibus, hanc uerterbram utrinque susceptam quiescere, firmari^q necessum est, reliquis interim omnibus ab hac & à se inuicem leuiter secedentibus: Illa enim quiescente quum dorsum flectimus, superiores deorsum ducimus, inferiores autem quodammodo sursum incuruamus. In tensione uerò rursus opposito motu uerterbras agimus: si quidem dorfi motus circulari, non autē prorsus angulari figura celebrantur. Quàm parum uerò hæc cum Galeni in decimo tertio de Partium usu, placitis conueniant, si mutuò loca contuleris, promptè animaduertes. Cæterum dorfi motus unà cum ipsius musculis parum rectè hæcenus cognitis, in secundo libro exequemur. Iam autem ad thoracis uerterbras reuersis, inter utriusque lateris ascendētem & descendētem processum, insignes nobis^r obseruandæ sunt asperitates, inæqualiter^q protuberantes processuli, in hoc parati ut ualida hinc pronascerentur ligamenta, tanto robustius firmius^q thoracis uerterbras colligantia, quanto obscurior motu thoracis uerterbras, quàm ceruicis moueri, ex usu fuerit. Quæ quum ita sint, omnes thoracis uerterbræ septem donantur processibus: ^a duobus nimirum transuersis, ^b duobus ascendētibz^c & totidem descendētibz, ^d uno^q posteriori, seu spina. Si uerò undecima, aut aliqua hac superior, utrinque susciperetur, tunc duodecima, aut omnes utrinque susceptæ humiliores, duobus abundarent processibus, quandoquidem ascendentes singuli duorum loco, propter sinum illis incisum enumerarentur. Veteribus enim nonnullis, hic sinus tam insignis habebatur, ut singulos ascendentes lumborum uerterbrarum processus, geminos enumerasse uideant.

Ab a ad b colli uerterbrarū processuum ductus metitur. à c uerò ad d thoracis.

Quo modo lumborum uerterbræ mutuò de articulantur.

Quamobrē uerterbram in dorfi medio utrinque suscipi oportuerit.

Thoracis uerterbrarum processuum numerus.

q1 fi. T, V. r2,3 fig X, Y.

s1 fi. c.

t2 fi. cap. 17 K, L, M.

u2,3 fi. ca. 17 O.

x4 fi. c, f.

y4 fi. g, h.

Figura O peris fronti adhibita uarios arcus ostendit.

z23 fi. circa G.

a1,2,3,4 fi.

H, I.

b1 fi. T, V.

2,3 fi. X, Y.

c2,3 fi. a, b.

d1,2 fi. N.

O, P.

e2 fi. ca. 17

K quidē si-

mus nota-

tur, tubera

autē M, L.


uideantur. At nunc satius erit, & illis quoque uertebis peculiare Caput consecrare, hæc q̃
inibi accumulatiſſe perſequi.

DE LUMBORVM VERTEBRIS.

Caput XVII.

PRIMA XVII CA-
PITIS FIGURA.


SECUNDA.

TERTIA, CUIVS VT
ET DVARVM PRIMARVM,
ac earundem characterum Indi-
cem iam ſubiungemus.

QVONIAM omnes lumborum uertebrae eadem forma constant, unam duntaxat ipſarum
triplici facie hic expreſſimus: Prima quidem figura anteriorem uertebrae faciem, Secunda la-
tus, Tertia poſteriorem faciem proponentes.

- A_{1, 2, 3} Appendix ſuperior corporis uertebrae.
B_{1, 2} Appendix inferior corporis uertebrae.
C, D, E, F, G His characteribus non in eadem figura obuijs, ſpina ſimul notatur, ac ſinguli priuatim
in ſpina aliquid hunc in modum indicant.
C_{1, 2, 3} Indicatur ſpinae lumborum uertebrae ſuperior pars, ſeu lata aſpera q̃ ipſius linea.
D₂ D latitat in umbra ſub ſpina ſecundae figurae, notans lineam inferiorem ſpinae.
E₂ E non procul à D diſtat, notans alterius lateris ſinum, ad latus lineae D inſignitae conſiſtentem.
F & G_{2, 3} Appendix ſpinae, triangulum referens, ac in baſi G, in acuto autē angulo F inſignitus.
H_{1, 2, 3} Alterius lateris tranſuerſus proceſſus.
I_{1, 2, 3} Aſcendens alterius lateris proceſſus. Verum K, L & M in ſecunda figura et tertia expreſ-
ſi. K, L, ſuiſ alterius lateris aſcendens notatur proceſſus. K enim ſinus inſignitur. L uero anteri-
us eius. M. dem ſinus labrum ſeu ſupercilium. M autem poſterius ſupercilium.
O_{2, 3} Descendens alterius lateris proceſſus. O in tertia figura poſitum, eius proceſſus tuberculum
notat, ſeu caput.

QV O leuiori opera proceſſuum hoc Capite priuatim de-
ſcribendorum ſedem formamq̃ aſſequaris, praſenti figura cau-
data ſimiae lumborum uertebrae dextra facie, expreſſimus. in
qua A & A' uertebrae illius notant corpus. B tranſuerſum
proceſſum hic maniſeſto ſurſum ſpectantem. C ſpinam, quae etiā



fursum uergit. D & E, duos indicant ascendentes processus. F uero & G, duos descen-
dentes processus insinuant. Postremo H indicatur processus, quo humanæ lomborum uertebræ
(uti paulum infra audies) priuantur.

Cuiusmodi
sint lomborū
uertebrarum
corpora.



Foramina.

Foramen uero dorsali medullæ in his exculptum, tanto minus est incumbentium uertebrarum

foraminibus, quanto iam toto progressu dorsalis medulla gignēdis neruis^b tenuior graciliorq̃

euasit. ° Foramen emittendo neruo & admittendæ uenæ arteriæq̃ in ambobus uertebrarum

lateribus cælatur, ferè uniuersum ad superiorem refertur uertebra, quæ eius foraminis supe-

riorem sedem ac latera constituit, quum interim subiecta inferior ue uertebra duntaxat humi-

liorem foraminis sedem efformet. ° Transuersi harū processus utrinque singuli, longè tenuio-

res sunt thoracis uertebrarum ° transuersis processibus. At interim admodum pro cerè educun-

tur, quasi costarum usum in lumbis essent præstaturi. ° Prima & quinta lomborum uertebræ,

breuioribus transuersis donantur processibus quàm mediæ. Præterea nullius uertebræ trans-

uersi processus sursum manifestò assurgunt, præter quintæ uertebræ processus, quibus quò mi-

nus transuersim aliorum modo porrigantur, ° ilium ossa obstant, quæ illius uertebræ corpori

uiciniū accedunt, quàm mediarum in lumbis uertebrarum transuersorum processuū est lon-

gitud. ° Spina his est ualida & crassa, at pro ipsarum mole non admodum procera, aut lon-

ga. Si dextrum sinistrumq̃ in spina species, ipsa tenuis est: ° si autem superiora inferioraq̃ con-

sideres, latissima. ° superius quidem acuta, & in asperam desinens lineam: ° inferius uero cras-

sior, & quasi duobus donata sinibus. in quorum medio linea seu oblongum educitur tubercu-

lum, à quo ligamentum superiorem in spinæ inferioris uertebræ lineam pronascitur, quod spi-

narum interuallum opplens, dextros musculos à sinistris ita dirimit, ac ° ligamentum inter ul-

nam & radius sedem sibi uendicans, internos cubitum occupantes musculos quodammo-

do ab externis interdiuidit. Spine ° mucro appendice, ut et thoracis uertebrarum spine, cōstat:

& ualde obtusus, ac quodammodo triangularis uisitur. si modò utrinque ad latera unam trian-

guli costam, & tertiā (quæ alijs breuior est) in spinæ appendicis basi constituas. ° Ascendentes

processus interno latere, quo se inuicem e regione spectant, ° sinum adipiscuntur profundum,

& si animum anteriori & posteriori sinus partibus accommodaueris, oblongum. ° Descenden-

tes processus insigniter decliues feruntur, & externo ipsorū latere in ° oblongum tuberculum

desinunt, quod magis uertebræ anteriora quàm posteriora respicit. Tubercula hæc in subie-

ctæ uertebræ ascendētes subeūt processus, quemadmodum etiam antea fusiū exequutus sum:

adeò ut huic Capiti haftenus, quod prius non recensui, nihil adiectum sit. Neq̃ etiam aliud sub

necterem, nisi Galenus lomborū uertebris, ex abundanti unum utrinq̃ tribueret ° processum,

quem ad inferiora uergentem iuxta foramen situm scribit, quo neruus à dorsali medulla prin-

cipium ducens prolabitur. Ego hunc processum in humanis uertebris nunquam obseruauī,

unde etiam in hoc inquirendo eadem ratione & uia mihi utendum duxi, qua ea indagare soleo,

quæ à Galeno descripta in hominis cōpage mihi haudquaquā occurrerēt, quæ ue secus quàm

ipse tradidit habere cernerem. Consueui enim hæc omnia mox in brutis animantibus, & potis-

simum (quorū copia nunquā defuit) canibus examinare, qui per sæpe Galeni descriptionē mi-

hi ostenderunt, aut ueluti manu ducentes, quid sibi uoluerit, edocuerūt. Hic itaq̃ processus me

tantisper latuit, donec omniū partium anatomen Bononiæ in simia illa aggrederer, cuius ossa

præter humanum sceleron, IOANNI ANDREAE ALBIO, Hippocraticæ medi-

cinae apud Bononienses professori clarissimo, compegi: quum is, ut uir est splendidissimus,

suæq̃ Academiae studiosis summè addictus, omni humanitate admodumq̃ liberaliter in ipsius

ædibus me Bononiā hominis fabricæ docendæ gratia uocatū, secundo, excepisset. In simiarum

igitur lomborū uertebris ad radicem ° transuersi processus in inferiori ipsius sede, ° acutus con-

spicitur processus rectà deorsum protensus, & sinus qui nerui nomine incisus est, externum

latus constituens, ac ueluti interuallum quoddam cum descendente processu efformans, in

quod ascendens inferioris uertebræ processus subintrat. Cæterū, etsi huius processus natu-

ram in simia ob eius penuriam intueri non dabitur, canis tamen tres humiliores thoracis uerte-

bras

IO. ANDREAE
 ALBII
 hospitalitas.

a fi. cap. 14.
 E, F. tres in
 tegra L ad
 M.

b 1 fig. ca. 11
 libr. 4 E, F.
 c fig. capit.
 14 Q.

d 1, 2, 3 fig.
 H.

e 1, 2 fi. ca.
 16 H, I.

f Ostendit
 id 1. fig. in
 integrarum.

g 1 fi. inte-
 grarū 0, 1.

h 2 fi. C, D
 E, F, G.

i 2 fi. à C
 ad D.

k 1, 2, 3 fig.
 C.

l 2 fig. D li-
 neam. E au-

tem alterū
 sinū notat.

m 7 musc.
 tab. V.

n 2, 3 fig.
 F, G.

o 1, 2, 3 fig.
 I, K.

p 2, 3 fi. K.

q 2, 3 fig.
 N, O.

r 3 fi. O.

s 4 fi. H

t 4 fig. G.
 u 4 fi. H.

bras contemplator, etiā eiusmodi processu donatas: uti & in senioribus canibus perpetuò lum-
borum uertebrae eiusmodi processum obtinere uidimus. In homine autem ne signum quidem
eius processus ulla in uertebra reperitur. Lumborum igitur uertebrae in homine septem do-
nantur processibus, uno scilicet posteriori, seu spina, duobus transuersis, totidemq; ascenden-
tibus & descendantibus. Simiæ uerò adhuc duos habent, quos ad transuersorum radices consi-
stere diximus, adeò ut his nouem adsint processus: quot etiā in homine quidam recensuere,
quum singulos ascendentes processus, * in duos processus subdiuidunt, idq; sinuum ipsorum
gratia. Verum hac ratione simiis undecim processus in lumborum uertebis consurgerent.
Porro Galenus interim (ne id prætereamus) parum sibi consentiens, in decimo tertio de Par-
tium usu, foramina neruorum occasione cælata exprimens, non uidetur peculiarem in lumbo-
rum uertebis processum fingere, quum descendētib; harum uertebiarum processibus illum
usum ascribat quem aliàs dicto nobis simiarum processui tribuit.

Lumborum uer-
tebrarum pro-
cessuum numer-
us.

x Illi duo
processus es-
sent M. L
fi. 2. 3. Sinus
autem K.

DE OSSE SACRO, ET OSSE COC-
cyge. Caput XVIII.

PRIMA DECIMIOC-
TAVI CAP. FIGURA.

SECUNDA.



TERTIA.

TRIVM QVAE HIC PROPONVNTVR FIGVRARVM ET
earundem characterum Index.

PRÆSENS tabula, uniuersum dorsi ossium, quæ lumborū uertebis subiiciun-
tur, contextum exprimit. ac prima quidem ipsius figura, quæ dextrum latus occupat, anteriorem
horum ossium faciem spectandam proponit. Secunda uerò in sinistro cōsistens latere, poste-
riorem ostendit faciem, modicè in latus delineatam, sinus commonstrandī gratia, cui dextrum
ilium os coarctatur. Tertia autē figura in dictarum medio consistens, integrum coccyx os
ea forma magnitudineq; oculis subiicit, quā id in uegetæ ætatis hominibus plurimū obseruatur.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K Hi characteres in prima figura nouem denotant ossa, quin-
tam lumborum uertebra subsequeantia, quorum sex superiora sacri ossis loco in homine habitu-
rus sum: quatuor uerò inferiora (quæ etiam G, H, I, K in tertia figura insinuantur) mihi
coccyx, seu (uti interdum loquimur) coccygis os, appellabuntur.

L, L, R In prima figura notatur transuersi ossiū sacrum os constituentium processus. uerum hic L &

G 4 L, pri

L, priuatim indicant amplitudinem processus secundi ossis. *R* autem, & in hac, & in secunda figura ostendit processus transuersi quinti ossis tuberculum, cui nonnulla ligamenta implantari *M*. audies. In secunda itaque figura *L*, *M*, *L* & *R* transuersos processus ossis sacri ossium insinuant.

NN deinde *OO*, postremo *PQ* & in secunda figura ossis sacri dextrum sinum notant, cui dextrum ilium, aut (ut alijs forte placebit) ilis os connectitur, & qui postmodum in plures sinus & tubera subdiuiditur. *N* enim & *N* notatur ipsius oblongus sinus, & anterior. Ouerò & *O* tuberculum indicant instar amplæ cuiusdam lineæ prominens, ac anteriorem sinum *N* & *N* notatum à posteriori *P*, & *Q* insignito dirimens. *P* enim superiorem sinus posterioris sinum notat. *Q* autem inferiorem. Ouerò tuberculum designat, superiorem sinum *P* notatum ab inferiori sinu *Q* insignito interdiuidens.

S In prima & secunda figura, primi ossis dexter ascendens processus notatur.

T, *V*, *X* Hi characteres in secunda figura tantum apparent. ac *T* quidem notat sinum ascendētis processus, *S* indicati, cui tuberculum descendētis dextri processus quintæ lomborum uertebræ inarticulatur. *V* uerò & *X* sinus huius antèrius posteriùsq; notant supercilium. quanquam in terius etiam superciliū in secundæ figuræ ascendente sinistri lateris processu, *X* insigniuimus.

Y In secunda figura connexus frequenter apparens significatur, quo primi sacri ossis descendentes processus ascendētibus secundi ossis ad eum modum committuntur, quo hac sede lomborum uertebras articulari, iam multò antea didicisti.

Z In prima secundaq; figuris connexus notatur transuersi processus primi ossis, cum transuerso secundi ossis processu.

a In prima figura & secunda, indicatur inferior extuberansq; sexti ossis pars, quæ primo coccygis ossis ossi coarticulatur.

bb In tribus figuris insinuatur cartilagosum ligamentum, coccygis ossis commissuras intercedēs.


c In secunda & tertia insignitur cartilago, mucroni coccygis ossis adnata.

dd In secunda sacri ossis ossium spinæ, posteriores uel processus ostenduntur.

e, f, g, h, i, k Hi characteres in secunda figura admodum latitant, notantes dorsalis medullæ in osse sacro iter, foraminaq; hic inter spinarum interualla subinde conspicua.

1, 2, 3, 4, 5, 6 His numeris in prima & secunda inscribuntur foramina neruorum à dorsali medulla in sacro osse complexa originem ducentium, quæ sex constituunt paria, in anteriori ac posteriori sacri ossis sede excidentia. Horum primum par inter primum os sacri ossis & quintam lomborum uertebram exilit, ipsiusq; sedes *1* insignitur. Secundi autem paris foramen inter primum & secundum os consistens *2* indicatur: & ita seriatim reliqua suis numeris ostenduntur.

QVARTA
FIGURA.



QVINTA.



QVONIAM in præsentis Capituli contextu, Galeni gratia simiarum & canum sacri ossis & coccygis mentio incidet, non ab re duximus, & hic quoq; ea ossa, uti in simijs obseruantur, exprimere: quarta quidem anteriorem sedem sacri ossis, & dein coccygis explicantes: quinta uerò eorundem ossium posteriorem sedem. Numerus igitur ille *1, 2, 3, &c.* sex indicat ossa, quorum tertio cartilago priuatim subnascitur. Neq; est quod hæc ossa prolixius characterib. depingam, quum illa ex humanis ossibus promptè intelligantur.

QVEM.



VE M A D M O D V M permulta hactenus commemorata, aliaq̃ postmo-
dum & in hoc & subsequentibus libris frequentissimè recensenda omniū
qui Galeno successerunt medicorum in dissectionibus oscitantiam ac insi-
gnem prorsus incertitiam attestantur: ita profectò non minus & ossis sacri,
& coccygis quæ apud omnes obuia est descriptio. Quid enim prohibet
obsecro, illos Anatomes imperitos rudesq̃ dici, qui Galeni descriptiones
in aliquibus falsas, in plerisque simijs & canibus, nō autem hominibus con-
uenientes, ac si eas in homine spectassent, posteris prodiderunt: ac nunquam ab ipsis ne per
somnia quidem uisa, & sæpe perperam in Galeni libris intellecta, scribarum modo recensere
haudquaquam sunt ueriti? Apud quem quæso, Galeni tempora secutum, alia ossis sacri & coc-
cygis sit mentio, quàm à Galeno uarijs locis sibi nō constante, proditur? quum interim nulla
prorsus imagini ossis humani accedat. At in præsentī reliquos Galenum secutos, qui hominis
partibus cognoscendis obfuere potius, quàm profuere, missos faciamus, Galeni omnium disse-
ctionis professorū facile coryphæi placitum altius resumētes, quò minus turpiter ipsius quo-
que auctoritatem neglexisse uideamur. In libris itaque de Partium usu, sacri ossis non semel inci-
dit mentio: idq̃ inibi quatuor ossibus extrui docetur, nullo interim uerbulo de coccyge osse
asscripto. Et præterquam quod coccygis ossis Galenus inibi non meminerit, abundè constat,
hoc ipsi quū illos libros scriberet, fuisse incognitū. Quandoquidē quatuor ossis sacri ossa esse
docens, illorum extremo talem^a cartilaginem adnasci subiungit, qualem nos coccygis ossis
mucroni in sermonis progressu obnasci dicemus, & in quam ossium fines alteri ossi non com-
missi, perpetuò ferè degenerant. Præterea in duodecimo de Partium usu,^b transuersos sacri
ossis processus tenues & subtiles esse asserit: quū in libro de Ossibus eos (uti mehercule sunt)
crassos & amplos esse doceat. Verū Galenus in hoc de Ossibus libro, quem post libros de
Partium usu, iam in simiarum sectione peritior, aggressus est, sacrum os^c tribus efformari ossi-
bus perceret. illiusq̃ libri ossis descriptio utcunque breuis sit, simiarum tamen & canum ossi
sacro eleganter & scitè congruit. Dein sub tribus ossis sacri ossibus^d alia tria enumerat ossicula,
simul coccygis nomine ab ipso donata, & succinctè ut in simijs sese habent enarrata. In libris de
Administrandis dissectionibus, quos omnium Anatomes librorum postremos secundò exa-
rauit, ut semper simiæ magis quàm hominis constructionem inibi pertractat, sic quoque sacri
ossis & coccygis ad eum modū meminit, ut nihil omnino ipsius oratio inibi à libro de Ossibus
discrepet. Quando enim inter femoris motuum autores^e musculum recenset, quem à coccyge
osse principium ducere inquit, promptissimè colligitur, illum tria ossicula in simijs tertium os
sacri ossis subsequentia innuisse, quum interim in libris de Partium usu (dum magna ex parte
aliorum Anatomicorum niteretur placitis) eum musculum à sacro osse (uti etiā in homine fieri
audies) enasci scripserit. Cæterum quo minori negotio Galeni dogmata assequaris, & eorum
oscitantiam pariter expendas, qui ex aliorum libris ea quæ nunquam uiderūt ridiculè transcri-
bunt, iam me non pigebit & sacrum & coccyx os, ut in simijs canibusq̃ se habent, describere, ac
postmodum hominis ossium historiam instituere. In canibus itaque & simijs sub infima lum-
borum uertebra, f os quoddam reponitur tribus efformatum ossibus, ita inuicem commissis,
ut in anteriori sede iuxta earundem medium talem connexus speciem ostendant, qualem uerte-
brarum corpora mutuò compacta exhiberēt, si quando ita coaluissent, ut ne tantillum quidem
moueri possent, & ex ipsorum medio omnis cartilago temporis successu iam euanuisset. quan-
quam & in catulis sacri ossis ossium unio cartilagine etiam aliqua (ut in appendicum cōnexu)
repleri conspiciatur. In lateribus anterioris iam dictæ sedis, hæc ossa in ætate prouectis uix ali-
quam coalitus imaginem ostendunt, sed continuæ ab initio fuisse uidentur. quemadmodum
& posterior ipsorum ossium sedes prorsus (nisi fortè in admodum catulis) continua apparet.
Tria hæc ossa inuicem ad hunc modum coalita, Galeno in libro de Ossibus, & libris de Ad-
ministrandis sectionibus sacrum seu amplum & latum os dicuntur. Sunt enim hæc à lateribus
ampla, continuæq̃: & quum uertebRARUM imaginem quodam modo exprimant, hic amplos la-
tosq̃ transuersos processus efformant, qui inuicem continui in se insignem & inæqualem aspe-
rumq̃ sinum in externo latere excisum gerunt, quo ilium ossibus ualidissimè coarctantur. In pō-
steriori parte hoc os tres exiguas efficit spinas, minus quàm Galenus arbitratur sursum spectan-
tes, & subinde instar continuæ lineæ constitutos. Hoc sacrum os superius inferiusq̃ magna ex
parte lumborum respondet uertebRIS. superior nanque pars, superiori earum uertebRARUM sedi:
inferior autem, inferiori assimilatur. Superior enim ossis sacri pars tanta amplitudine protube-
rat, & appendice donatur, quanta est inferior corporis infimæ lumborum uertebRę pars, quæ
sacro ossi eadem prorsus ratione cōmittitur, qua lumborū uertebRę inter se coarctantur. Præ-
terea

*Medicorum
in Anatomie
oscitantia &
ignorantia.*

*Galeni de sa-
cro osse et coc-
cyge sententia.
Lib. 12, 13, 15,
& alibi.*

*Libro decimo
quinto.*

*Simiæ ca-
nisq̃ sacri os-
sis descriptio.*

a

a 2, 3 fig. c.

*b 1, 2 fig. L,
L. R.*

*c 4 fi. cha-
racteres 1,*

*d 4 fi. cha-
racteres 4, 5, 6.*

*e 11 muscul.
tab. 4.*

*f 4 fig. cha-
racteres 1,
2, 3. Verū
dein illi fi-
gure nullas
notas adhi-
bui, quod
humani os
abunde no-
tauit, &
postea ex-
plicabitur.*

*g Hunc 5 fi.
ostendit u-
trinq̃.*

*Coccygis
canini de-
scriptio,*

terea sacri ossis superior pars duos exigit ascendentes processus, eodem modo insinuatos, quo ascendentes in lumbis uertebrae processus caelari diximus. His excipiuntur infimae lumborum uertebrae descendentium processuum tubercula. Porro inferior sacri ossis pars (quae tertij & angustissimi trium ossium sacri ossis humilior sedes est) orbiculari quoque protuberat corpore, lumborum uertebrae corporibus forma admodum simili. Nulla enim ratione illud ab his uariat, quam quod sacri ossis corpus lumborum uertebrae corporibus tanto minus sit, quanto hoc corpus ab illis mole uincitur. Praesens sacri ossis corpus uni committitur^h ossiculo, quod ex tribus ossibus coccygis ossibus iam primum enarrabitur. Sub sacro itaque osse tribus ad hunc quem diximus modum ossibus concinnato,ⁱ alia tria collocantur ossicula ordine inuicem succedentia, & lumborum uertebrae in conformatione non absimilia. In nullo namque ab illis imagine differunt, nisi quod transuersos processus latiores, quam lumborum uertebrae, obtinent, & eosdem magis deorsum quam sursum coniucentes: dein spinam aut nullam, aut perquam exiguam a se porrigunt. Corporum enim forma penitus illis respondet uertebrae, nisi forte pro ossiculorum mole haec aliquis, minima quaeque expendens, ampliora esse astrueret. In ascendentibus autem & descendentibus processibus ne minimum quidem differunt. Horum itaque trium ossiculorum supremum, suo corpore tertio sacri ossis ita coarctatur ossi, ut lumborum uertebrae inter se. Suis enim ascendentibus processibus descendentes ossis sacri processus excipit. Tria haec inferiora ossicula Galeno coccyx proculdubio appellantur. Inter tria enim haec ossicula, & inter horum supremum & sacri ossis inferiorem partem, non minus interuenit cartilaginis, aut potius cartilaginei ligamenti, quam inter lumborum uertebrae, quum inter tria sacri ossis ossa nihil, uti iam diximus, cernatur cartilaginis, & praecipue in aetate prouectioribus. Deinde in canibus simiisque musculus femur mouentium quartus, a tribus illis ossibus principium sumit. eum dico, quem in tertio de Administrandis sectionibus a coccyge osse enasci Galenus testatur. Quinetiam foramina neruis transmittendis incisa, Galeni in libro de Ossibus descriptioni accuratè conueniunt. Tria enim neruorum paria sacro ossi, & totidem coccygi a Galeno tribuuntur, quae in hunc se habent modum. Veteribus Anatomes professoribus is in neruorum paribus recensendis mos fuit, ut neruorum par semper ad neruis subiectam referrent uertebrae, ac proinde primum dorsalis medullae neruorum par enumeraret, quod inter occipitis os & primam colli uertebrae profilit: secundum, cui inter primam & secundam colli uertebrae uia exculpitur. Sic itaque primum neruorum ossis sacri par id censetur, quod inter primum ipsius os & infimam lumborum uertebrae elabatur, cui foramina ad eum modum inciduntur, quo in lumborum uertebrae ea haberi iam pridem proditum est. At secundum & tertium par, non a lateribus primi paris ritu exiliunt. Quum enim ossis sacri latera articulatione cum ilium ossibus praepedirentur, impossibile fuit & hic quoque per latera neruos excidere. Quocirca in anteriori & posteriori ossis sacri sede foramina in ossium compage caelantur, ut hac Naturae industria ab illis neruorum paribus, quemadmodum & a ceteris fere omnibus antrorsum retrorsumque soboles opportunè dirigerentur. Ac secundo quidem pari foramina in primi ossis cum secundo compage excinduntur, tertio autem pari uia paratur, quae secundum ossis sacri os tertio coalescit. Caeterum tribus a coccyge osse pullulantibus neruorum paribus foramina perinde ac in lumborum uertebrae exculpuntur. quum enim horum ossium latera (ut ossis sacri ossium) articulatione non occupentur, satius fuit eandem hinc foraminum seriem obseruare, quam in alijs uertebrae laterali articulatione non praepeditis fieri docuimus. potissimum quum horum ossiculorum articulatio illi par sit, qua lumborum uertebrae inuicem coarctantur. Primum itaque par in utroque latere uno inciso foramine inter tertium sacri ossis os & primum coccygis prodit: Secundum uero inter primum coccygis os, & secundum: Tertium autem par, inter secundum os & tertium egreditur. Ab humiliori uero sede tertij ossis, quod dorsalis medullae reliquum est, coniugis experts, nullique associatum excidit. Singulis enim ossibus sacri ossis & coccygis ossis dorsali medullae uia exculpitur, medullae hinc crassitie respondens. Extremo tertij ossis coccygis ossis in canibus & caudatis simiisque solida & non perforata ossa, oblonga & superius inferiusque crassiuscula, in medio autem tenuia quadam continua serie annectuntur, caudamque constituunt. Interdum uero, neque id infrequenter, in multis canum & simiarum speciebus etiam plura tribus uidentur coccygis ossis ossa, eiusdem prorsus cum tribus superioribus formae, atque ita etiam illis tunc plura neruorum paria ab illorum ossium lateribus profiliunt. Non caudatis simiisque infimo coccygis ossis ossi cartilago tantum adnascitur: quanquam tamen ex illis non adeo concinne, atque ex canibus, Galeni sententia intelligatur. Quum igitur haec ita in illis animalibus se habeant, ex hisque Galeni descriptionem optimè percipiam, & pariter in scholis adeo amice ostendam, ac postmodum

*h 4 fi. cha.
raet. 4.*

*i 4 fi. cha.
raet. 4, 5, 6.
quae conser-
ues cum in-
tegrarum fi-
gur. lumbo-
rum uerte-
bris.*

*Hac fere se-
riatim peti-
tur ex 2, 3
fi. Cap. 11.
lib. 4 praepo-
sitis.*

in homine secus omnino inueniam, cur quæso scioli quidam, & in Galeni uerba iurati, ad aliudq; nihil quàm ad detrahendum & inuidè de aliorum laboribus (quum ipsi nihil possint) iudicandum nati, nunc mihi obstrepent, quòd toties Galeni placitis inter disseccandum minime acquiescam? Quasi uerò & ipsi oculis priuarentur, ac mihi quæ meo Marte adinuenio, non liceret, ob nescio quam in Galenum religionem, apud eruditissimos sæpe nostræ ætatis uiros proferre. quum interim hisce rabulis, nullus nec bonus nec malus genius silentium possit imponere, si quid dignum de medicinæ subiecto, & arsne an scientia sit, & num prædicatorum tractatio ad logicum an ad metaphysicum spectet, & de intellectu possibili, & num scientia de anima omnium sit præstantissima, alijsq; ineptijs reperissent. Verum illos ridiculos (quamuis interim superciliosos) homines, modò (uti longè minus adhuc præfens consueui) neutiquam moror: quin potius gratiam à ueritatis studiosis expecto, quod Galeni sententijs subinde commemoratis, ueram hominis cōstructionem ipse pertractem, etiam si fortè longius alicubi expatiatur oratio. Neq; arbitror Galeni (qui toties inter scribendū ingemuisse uidetur, quòd simul cum ipso Anatomes studium prorsus, uti sanè accidit, collaberetur) manes mihi ob id infestos fore, quod ipsum potius simiæ quàm hominis fabricā edocere, ac propter aliorum Anatomicorum qui illum præcesserunt libros, à simiæ cōstructione ad hominis demigrare, simulq; ambas confundere, ostendam. Quod non eò dico, quasi in sacri ossis & coccygis descriptione Galenus hominis ossa cum simiæ miscuerit (nisi uolens pauciora coccygis ossa, quàm subinde in caudatis simijs occurrunt, enumerauerit) sed quod quinque tantum uertebras lumborum recenseat, quum canes & caudatæ simiæ plures habeant; nihilominus tamen Galenus & uertebras & sacrum os & coccyx os simiæ describat. Quod uerò ueteres illi pueros in Anatome exercentes, hominis ossa sedulò uersauerint, nomina attestantur partibus ab ipsis indita. Vix enim ambigo, quin *κόκκυγα* appellauerint os quoddam à similitudine quæpiam, quam cum aue à Plinio quoque coccyge (nobis uerò cucculo) nuncupata, obtinet: præcipuè quum carne ligamentisq; adamussim nō est purgatum. Quæ autem hæc esse possit similitudo, tunc promptius exponam, quum horum quoque ossium in homine descriptionem succinctè addidero. Sub lumborum itaque uertebis in homine plurimùm^a decem reperiuntur ossa, quorum sex sacrum hominis os, quatuor uerò coccygem constituunt.^b Sex enim superiora inuicem ita committuntur, quemadmodum^c tria ossa canis sacrum os efformantia, uniri relatum est. In medio enim anterioris sedis connexum ostendunt,^d qualem uertebrarum constituerent corpora, si adeò coaluissent, ut nihil cartilaginis in sex horum ossium unione uideretur, nisi forsitan in admodum pueris, quibus ossa adhuc prorsus non coaluere. In lateribus quoque anterioris partis, ubi (ut ita dicam)^e transuersi sex horum ossium processus inuicem uniuntur, admodum obscura cōnexus apparet species. In posteriori autem sede, unio prorsus aboletur, unumq; os ex illis sex efformatum conspicitur. Nulla enim hîc unionis se offert linea, nisi interdum in primi ossis cum secundo coalitu.^f Quippe non rarò primum os secundo posteriori sede ea articulationis forma cōmitti spectatur, qua ascendentes descendentesq; in lumbis uertebrarum processus articulari solent. Verum etsi illi processus ita iungantur, transuersi tamen eius ossis processus, omni ex parte secundi ossis processibus coalescunt: & omnes isti connexus adeò sunt ualidi, ut primum os ne tantillum quidem super secundum moueri queat. Aliquando tamen sacra ossa in cimiterijs obuia primum os abruptum ostendunt, idq; ac si lumborum esset uertebra seorsum inuenitur. Nisi enim id primum os crassis & amplis donaretur transuersis processibus, à lumborū uertebis forma uix discerni posset. Porro in pueris sex horum ossium coalitus etiam in posteriori sede cōspicius est, quemadmodum in anteriori parte est spectatissima. Deinde ut in nullis hominibus in anteriori sede coalitus omnino obliteratur, ita etiam perpetuo in posteriori sacri ossis sede ea coalitus species se offert, quæ ossium corporibus perficitur.^g Si enim foramini dorsali medullæ in sacro osse intiso, animū accommodaueris, per foraminis progressum, ossium corpora ita liquidò coaluisse cernes, atque in anteriori sede. Præterea sex horum ossium series tribus ossibus quæ canis sacrum os efformant, respondet. quemadmodū enim his supremum maius est medio, & medium maius infimo: ita quoq; hominis ossa tanto minora uidentur, quanto humiliorem in sacro osse sedem occupāt. Quanquam secundū os, hoc sibi priuatim uendicat, quòd inter reliqua ossis sacri ossa^h amplioribus crassioribusq; & antrorsum retrorsumq; magis prominentibus transuersis constet processibus.ⁱ Primi seu supremi ossis superior pars, omnino superiori sedi cuius lumborū uertebræ respōdet. Et corpus etiā quintæ lumborum uertebræ ita primo ossi adaptatur, ut lumborū uertebræ superioris uertebræ processuum tubercula suscipiunt. Sexti uerò ossis^m humilior pars insigniter ab inferiori sede tertij canum ossis differt. Hominis enim os nullos descendentes adipiscitur processus,

Lib. 10. Naturalis hystoriae Cap. 9.

Homini sacri ossis descriptio.

a fi. cap. 14.
G, H, I,
K. dein integrarum.
fig. M, N.
et huius ca.
totali & 2
fig.
b 1 fi. A, B,
C, D, E, F.
c 4 fig. cha
ract. 1, 2, 3.
d fig. cap.
14 R.
e 1, 2 fig. L,
L, R.
f 1, 2 fig. Z.
h 2 fig. Y.

i 2 fig. f, g,
h, i, k.
k 1 fig. à Z
paulò sub
inferiori L.
l Conser superiorem
partem i et
2 fig. cum
figuris ca.
17. aut con
nexum spe
ctat in inte
gris fig. &
fig. cap. 14
m 1 figur. a

processus, quibus sibi subdito osse coarticularetur. Verum duntaxat in orbiculare, sed paulo latius definit tuberculum: quod primo ossi, coccygis in homine ossis, eo modo committitur, quo uertebrae corpora inter se, aut potius quo caudarum ossa mutuo coartantur. Quin etiam transuersis humani ossis sacri ossium processibus in externo latere, parumper uersus posteriora, sinus exculpitur, cui alterius lateris ilium os ualidissime coartatur. Est autem hic sinus admodum asper & inaequalis, ac primum quidem secundum ipsius longitudinem in medio extuberantem habet lineam, aut amplioris lineae modo prominens tuberculum, quod sinum rursus, in anteriorem & posteriorem sinus, dirimit. Anterior utcumque simplex est, asper tamen, & inaequaliter admodum incisus. posterior altius cauatur, uerum in medio processum ostendit transuersim extuberantem, qui sinum posteriorem denuo in superiorem & inferiorem interdiuidit. His sinibus aptissime respondent ilium ossa, mutuis tuberibus, sinibusque donata. Sinus hi & tubera cartilagine aliorum sinuum modo non obducuntur. Quum enim alia tubera & sinus laeui continuaque & plana cartilagine incrustentur, isti sacri ossis sinus nihil praeter cartilaginea educunt ligamenta, sacrum os robustissime ilium ossi connectentia. Hi sinus praeterea ad tria potissimum superiora ossa sacri ossis referunt. inferiora enim processus transuersos habent tenues, at amplos interim, & inter se continuos, ex quibus musculus ille pronascitur, qui femoris motorum quartus habebitur. Verum transuersus quinti ossis processus ea parte, qua transuerso sexti ossis unitur processui, tuberculum exigit, utcumque prominens & crassum, in hoc formatum ut opportunè duo ligamenta hic sacro ossi implantarentur, quorum alterum ab acuto coxendicis ossis processu enasci docebitur, alterum ab elatiori sede appendicis, qua coxendicis os donari audies. Foramina nervis transmittendis in sex istis ossibus exculpta, imagine, quamuis non numero, illis omnino conueniunt, quae tribus canis ossibus inciduntur. In anteriori enim sede homini quina utrinque iuxta corporum compagem foramina caelantur, & totidem in posteriori sede: adeo ut haec ossa sex neruorum paribus uiam praebant. Primum namque inter primum os & quintam lumborum uertebrae perinde egreditur, ac reliqui nervi ex lumborum & thoracis uertebrae lateribus profilientes. Secundum par inter primum ossis sacri os, & secundum: & alia hac serie deinceps ita elaboratur, ut excidens par ad subditum os perpetuo referatur. Praeter haec foramina nervis exculpta, in posteriori sacri ossis sede alia apparent, inter spinas ossium, in uiam spectantia quae dorsali medullae est parata. Haec foramina ligamenti opplentur, perinde ac interualla foraminaque inter spinas reliquarum uertebrae conspicua. Caeterum haec inter sacri ossis spinas interualla, interdum continua apparent, neque ullis foraminibus perinde ac in canibus ferè peruia. Verum interim ossis sacri ossibus spinae obtigerunt, tanto in singulis ossibus proceriores, quanto os ipsum unde prodeunt grandius superiusque est. Nulla tamen spina (si modo quid iudico) ne minimum quidem sursum conuiuet, sed deorsum potius omnes spectant, & ut in alijs uertebrae cum transuersis processibus interuallum quoddam & sedem constituunt: in quam nonnulli dorsum mouentes muscoli aptè reponuntur, & à qua illi iustissime cum alijs hinc prodeuntibus musculis originem ducunt. Tota autem ossis sacri sedes posterior gibba est, & curua, quò ita tutius propugnaculi modo eas quibus praest partes tueretur, ac ab occurrentibus muniret. Anteriori autem sede, laeue est, neque asperum, sed sinum cauumque, quo aptiorem illis organis quae cum alijs ossibus instar peluis cuiusdam complectitur, sedem efformet. Ad hunc modum hominis sacrum os se habet, quod interdum quinque tantum constat ossibus, & tunc in anteriori sede duo desunt foramina, in posteriori tamen perpetuo sex neruorum coniugij iter paratum cernitur. Coccyx os quatuor extruitur ossiculis: quorum supremum, sinum exigit, quo sexti ossis sacri ossis tuberculum excipitur: quod ipsi corporum uertebrae modo ligamenti admodum cartilaginei interuentu committitur, nulla interim alia accedente articulationis specie, nisi fortè quinque tantum ossibus sacrum os extruatur. Tunc enim ad foraminis cuiusdam in posteriori sede constitutionem, neruumque sexti in sacro osse coniugij deducendum ac defendendum, primum hoc os in posteriori sede duos acutos educit processulos, qui sursum spectantes, quinti ossis sacri ossis processibus ualide coalescunt, ipsumque primum coccygis os uix cartilaginei ligamenti interuentu quinto committitur, sed propemodum ossis sacri ossium ritu coalescit. Porro primum coccygis os, quando sex sunt ossis sacri ossa (quod frequentissime euenit) eiusmodi nullos educit processus. Verum ad sinus eius, quo sexto ossi sacri ossis coartatur, latera, superiori ipsius sede latius ad transuersa extuberat: inferiori autem parte sensim angustatur, ac rursus secundo ossi ita omnino committitur, ut id sexto ossis sacri ossi diximus committi. Huic dein tertium & quartum succedunt, eodem penitus modo inuicem commissa, tantoque minora, quanto unumquodque in ipsa serie humiliorem locum obtinet. Quatuor his ossiculis nullum foramen unquam

Foramina
neruos in sa-
cro osse trans-
mittentia.

Sacri ossis
spinae.

Anterior
et posterior sa-
cri ossis sedes
cuiusmodi.

Coccygis os-
sis historia.

n fig. cap.
14 R aut in
1, 2, 3 fig.
huius ca b.
o 2 fig. N,
N, C c.
p 3 fig. cap.
29 A, B, C
C c.
q 2 fig. O,
O.
r 2 fi. N, N,
s 2 fig P,
Q, P. Veru
P & Q du
os sinus, &
autem tu
ber notant.
t u musc.
tab. f.
u 1, 2 fig. R.
x 10 musc.
tabula,
unum, al-
terum d.
y 2 fig. cap.
29 d.
z Eadem
fig. l.
a 1, 2 fig.
charact. 1,
2 ad 6 spe-
cta tamen
magis 2 &
3 fig. cap.
11 libro 4
praeposi-
tas.
b 2 fig. c, f.
g, h, i, k.
c 2 fig. d, d,
d.
d 10 musc.
tab. & de-
in subsequē-
tes ad 16 us-
que in hac
dorsi par-
te.

e 1, 3 fig.
G, H, I, K.
fig. cap.
14 I, K.
in integris
N.
f 1 fig. 6.

g 2 fi. inferi-
us b.

unquam in scinditur, quo dorsalis medulla prorepat, aut ex quo ulli exiliāt nerui. In sexto enim ossis sacri osse dorsalis terminatur, neque ipsius^h extremum in coccyx os descendit. Hæc ossicula fungosa sunt, & pectoris modo rubicantia, ac in pueris admodum cartilaginea, uniuerso contextu ex ampliori basi in mucronem definūt, cucculi^q rostri modo introrsum curuantur. Infimum ossiculum suo mucrone, quoⁱ recti intestini posticam infimam^q sedem contingit, in^k cartilaginem degenerat, eiusdem usus occasione qua uertebrarum spinis cartilagine obna sci relatum est. Hinc sanè liquet, quàm in Galenum essemus impij, si hominis fabricam illum contenderemus enarrasse, ac non potius semel simiarum constructionē illum persecutum fa-
 teremur. & dein si non ipsi statim initio tertij libri Commentariorum in Hippocratis librum de Articulis crederemus, quum ait se de Ossibus librum conscripsisse, cū sigillatim quale unumquodq; os esset, præcipuè quidem in ipsis hominum aridis cadaueribus, sin minus, in simijs certè diligenter inspexisset: ita indicans se omni studio saltem simias descripsisse, hasq; homini in ossium constructione esse simillimas. Deinde si quis ipsius enarrationem ad hominum, non autem simiarum fabricam cogere uolet, is Galenumⁱ quatuor ossa latuisse annuet, quæ nos coccygis loco recensuimus: & deinde Galeno falsò imponet, ipsi^m sex foramina fuisse incognita. Quandoquidem in homine utrinque in anteriori sede sacri ossis sex sunt foramina, quum in canibus tria tantum occurrant, nam foramina in coccyge canum conspicua, tantum in posteriori sede, seu potius lateribus consistunt, uti & Galenus uerissimè recenset, anteriorum foraminum nullam faciens mentionem. Ad hæc, cogermur Galenum oscitantia turpiter insimulare, quòd non eundem contextum in tribus inferioribus ossis sacri hominis ossibus esse dixerit, qui est in tribus superioribus. Non enim plus cartilaginis in inferiorum ossium unione, quàm in superiorum interuenit. Et interim nulla cartilaginei ligamenti portio hominis coccygis ossicula cōmittit, quam cartilaginem, ut & in uertebrarum corporibus, Galenus esse existimauit. Adeò ut si prescius singula inquirenda duceremus, tandem Galenum ex ueris aliorum Anatomicorum descriptionibus falsas fecisse uelimus nolimus concederemus. Nulli enim dubium esse debet, à formæ obliquitate & in mucronem ductu ac rubore, quatuor illa hominis ossicula *κόκκυγα* ueteribus fuisse appellata, quod illi hæc omnia ad cucculi rostrū pueris suis referrent. quum interim nulla sit in canibus cum hominis ossibus similitudo. Ea enim quæ Galeni conueniunt descriptioni, uertebris lumborū, uti diximus, omni similitudine accedunt. Porro sacrum os *πλάτυν*, seu latum & amplum uocarunt, quod eius amplitudo facile reliquarum uertebrarum, quibus instar basis tutissimiq; fundamenti subijcitur, amplitudinem uinceret. Non enim arbitror eos id in amplitudine omnibus contulisse ossibus, quum ilium ossa sacro osse ampliora esse cognoscantur. Vnde uerò id *ισόρον* seu sacrum uocarint, non satis constat: nisi id ita dixerint à rara quadam effigie formaq; , aut quod adeò diuini propugnaculi imaginem referat: aut quòd diuina ope, citra musculorum auxiliū, in partu huius cum ilium osse connexu referari, ac denuò naturali instinctu committi plerique (sed falso) arbitrentur, aut fortè quòd grande magnumq; sit: quemadmodum apud poetas Ilium, mare, famem, atque id genus, sacra uocari putamus. Verum tunc, uti de amplitudine dictum est, sacrum os uertebris duntaxat esset conferendum, quum ossa ipsi utrinque commissa, & femur ac tibiæ os sacro osse grandiora sint, & interim unico tantū (ut sic dicam) hæc cōstent osse, quum sacrum senis compingatur. Alij huius nominis rationem indagantes, nescio quid de ueterum sacrificijs in medium adferunt. Porro quandoquidem nominum rationem perlubens ad alios remittere passim soleo, etiam huius nominis inuestigationi non grauatim concessero.

Impios in Galenum esse, qui hominis historiam docuisse eū contendunt.

Coccygis & sacri ossis nominum ratio.

DE THORACIS OSSIBVS.

Caput XIX.

CHARACTERVM SEPTEM DECIMINONI CAPITIS figurarum Index.


QUONIAM subsequens characterum Index septem præpositis figuris habebitur communis, ut leuiori opera ad quam figurarum characteres referantur cognoscas, singulis, uti consueuimus, numeri notam subiungemus.

1, 2, 3, 4, 5, &c. In prima & secunda figura hoc numero indicantur duodecim thoracis costæ: quarum septem superiores pectoris ossi articulantur, quinque autem humiliores nō item. Thoracis uerò uertebrarum numerus, etiam citra notarum subsidium, modò è notatis costis obuius euadit: si singulis uertebris utrinque unam costam articulari spectes.


H AA

A, A1, 3 Quicquid costarum hucusque à uertebis fertur, osseum omnino est: hicq; primum costæ in cartilaginem degenerant. Reliquarum notarum index figuris subijciatur.

PRIMA DECIMINONI CAPITIS FIGURA, QVA THORACIS OSSIVM INTEGRA COMPAGO
anteriori facie exprimitur, duodecim nimirum thoracis uertebrae, & duodecim utrinque costæ, unâ cum pectoris osse pluribus efformato ossibus.



SECUNDA PRÆSENTIS CAPITIS FIGURA, POSTERIOREM INTEGRÆ THORACIS OSSIVM compagis faciem proponens.
Iuuerit modò obiter tres figuras contueri, quibus in huius libri calce totus ossium contextus triplici facie delineatur.





**TERTIA FIGVRA EX
MEDIIS VERTEBRARUM** thoracis, tres continet uertebras, dextro latere expressas, unâ cum eiusdem lateris media costâ. Atque huius figuræ beneficio, costarum ad uertebras articulatio, dein & costarum quoq; ductus ostenditur.



QVARTA, EXPRIMITVR COSTAE POSTERIOR ET VERTEBRIS PROXIMA portio, ut tubera exactè in conspectum uenirent, quibus nouem superiores costæ uertebris articulantur. Præterea huius costæ partem effregimus, ut ossea costarum ostenderetur substantia, & indicata.



QVINTA FIGVRA PORTIONEM EXHIBET DVODECIMAE COSTAE posteriori facie, & qua duodecima thoracis uertebræ coarctatur depictam. Hanc quoque, ubi & positum cernis effregimus, osseam costæ substantiam ostensuri.

SEXTA FIGVRA, PECTORIS ossis à cartilaginibus costarum liberi anteriorem partem proponens.



SEPTIMA, PECTORIS OSSIS cartilaginibus costarum liberi posteriorem commonstrans faciem.

- B B₁**, 3 Nobis modo ad characterū indicem reuersis, B, B indicetur cartilagineæ costarum substantiæ principium. Linea enim B & A intercedens, eius substantiæ cum ossea coalitum notat.
- C₁** Primæ costæ cartilaginis cum pectoris osse coalitus.
- D₁** Secundæ costæ cartilaginis cum pectoris osse articulatio, à qua etiam promptè subsequentiū quinque costarum articuli species colligitur.
- E₃** Cartilaginis tuberculū, quo secunda costā ac quinque subsequentes, pectoris ossi articulantur.
- F F₁** Terminus cartilaginis illegittimarum costarum, qui acutus spectatur.
- G₁** Sedes, qua undecimæ costæ cartilago à decimæ cartilagine frequenter dehiscit.
- H₁** Sedes, qua duodecimæ costæ cartilago ab undecimæ perpetuò dirimitur.
- I I₁** His sedib. costarū cartilagines inæqualiter protuberāt, ipsarū interualla plerunq; opplentes.
- K K_{1, 4}** Hac regione internæ mediarum costarum sedi sinus oblongus exculpitur, cui uena, arteria, & neruus insident.
- L₄** Tuberculum, seu capitulum, quo costæ uertebrarum corporibus articulantur.
- M₄** Tuberculum, quo costæ transversorum processuum apicibus articulantur. Atque hæc quorundammodo nouem superioribus costis sunt communia.
- N₅** Species tuberculi, quo undecima & duodecima costæ uertebris articulantur.
- O_{4, 5}** Tuberculum, in costarum posteriori sede iuxta apicem transversī processūs consistens, cui undecimus dorsum mouentium musculus insertur.

- Q**₄ Interuallum, inter **L** & **M** apparens, quod asperum ligamenti producendi gratia efficitur.
- R**₄ Hæc quoque sedes, musculorum quos in Capitis contextu numerabimus occasione exasperatur.
- S, T, V**₃ Tres simul contextæ uerteræ, aut harum uerterarum corpora. Alias autem uerterarum partes, processus uel suis locis indicauimus.
- X**₃ Sinus duobus uerterarum corporibus communis, cui costæ capitulum inarticulatur.
- a**₃ Costæ ad uerteræ corpus articulus.
- b**₃ Sinus in transuerso uerteræ exculptus processu, cui costæ etiam articulatur.
- c**₃ Costæ ad transuersum processum, articulus.
- d, c**₃ In suprema uerteræ insignita, etiam **d** sinus indicatur, talis qualem inter mediam & infimam uerteram **X** expressimus. ac **e** is notatur, cui in infima uerteræ **b** inscriptum cernis.
- f**₃ Costæ regio in posteriora maximè exporrecta, adeo ut in hunc modum opportune costarum ductum hinc metiaris. Ab **a** enim & **c** ad **f** costæ à uerteribus deorsum oblique in posteriora fertur. ab **A** uero & **B** ad **E**, sursum in anteriora circulatim costæ reflectitur.
- g, b, i, k**₁ His characteribus in prima figura pectoris os notatur. ac **g** quidem ad **b**, primum pectoris indicatur os. **b** uero ad **i** usque, secundum. **i** ad **k** usque, tertium. **k** autem, mucronatam pectoris ossis notat cartilaginem. Verum iam exactius pectoris os in sexta & septima aggrediemur.
- l**₆ In anteriori primi ossis sede protuberans instar triaguli pars, quæ **t, q, & r** posset circumscribi.
- m, n**₆ Sedes utrinque ad partem eam protuberantem depressa.
- o**₇ Posterior primi ossis sedes, quæ utcunque caua cernitur.
- p, q, r**_{6, 7} Sedes primi ossis, cui primæ costæ cartilago innascitur.
- q, r**₆ Sinus primi ossis, quibus clauicularum capitula articulantur, ac **r** etiam in septima figura dextrum indicat sinum.
- s**_{6, 7} Sedes inter duos clauicularum nomine insculptos sinus consistens, ac lunæ modò excavata.
- t**_{6, 7} Hac sede primum os secundo committitur.
- u**_{6, 7} Communis primi & secundi ossis sinus, cui secundæ costæ cartilago coarctatur.
- x, y, z, æ**_{6, 7} Sinus secundi ossis, quibus cartilagine tertie, quartæ, quintæ, sextæ & septimæ costarum inarticulantur.
- y, æ, e**_{6, 7} His sedibus interdum in pueris secundi ossis distinctiones apparent, perinde ac si id ex pluribus efformaretur ossibus, per unionem mutuò coalescentibus.
- z**_{6, 7} Hoc tertium pectoris ossis os censetur, quod in cartilaginem ensis mucroni non absimilem, ac **u** notatam finitur. Foramina, quibus interna pectoris ossis sedes abundat, etsi notis non indicentur, sese facile demonstrant.

Quid thorax.
Libro 1. Hist.
storiæ animalium
Cap. 7.
Pectus.
Pectoris os.



Opificis rerū
in thorace cre-
ando indu-
stria.

THORACEM uocabimus, quicquid costis interceptū circumscriptumque est: non autem cum Aristotele^a uniuersum corporis truncum, quem à iugulo ad pubem usque metimur. Anteriorem uero thoracis partem, pectus opportune nominabimus. ob idque etiam^b latum in hac sede os, cui costæ coarticulantur, pectoris seu pectorale os ritè uocabitur. quò minus tres Græcorum & præcipuè Galeni uoces, *θώραξ*, *σῆθος* & *σῆπρον* oscitanter uideamur confundere. Pectoris itaque os, & costæ, itemque duodecim dorsi uerteræ, quas thoraci hætenus ascripsi, thoracis sunt ossa. Est autè admirabilis summi rerum Opificis industria, qua totus thorax neque osseus, neque carnosus efficitur, uerum os cum musculis uicissim alternatimque commutatur. quanquam interim caluaria quidem uniuersa ossea, abdomen uero musculosum magna ex parte extruitur. Cæterum decet hæc non per transennam aut obiter considerare, uerum accuratè præcipuoque studio expendere. Quum enim tria sint principia hominem dispensantia, os quidem immobile ac nullis interstinctum musculis primo principio circundatur, musculi uero tertio: at secundo ex ossibus musculisque medium quid circumtextitur. Cerebrum namque in nullos usus musculis eguit, quum nulla caluariæ pars aut dilatatione, aut compressione indigeat. Quare etiā meritò caluaria ueluti galea & murus immobilis ipsi circumponitur. Porro si organis iecori famulantibus, uentriculo scilicet, & intestinis, & uescis, ac demum ipsi utero aliquod tale septum in circuitu oppositum fuisset, ubi cibum & potum uenter susciperet: quorsum utero gestantium tumor emeretur: quæ excernerentur excrementa, aut quomodo partus foelici conatu propelleretur: nullo hinc opem ferente

Omnium
thoracis os-
sum stru-
em 1 & 2
fig. osten-
dunt.
a integræ
figur. a' o
d.
b' si g, h, i.

Hæc osten-
dunt 7 &
8 musc. ta.

Hæc com-
monstrant
priors s. li.
figuræ.

rente musculo? Thoracis autem motus, quem maxime ad aeris inspirationem requirimus, omnino aboleretur, si solis duntaxat ossibus thorax constaret. Si uero is rursus ex solis musculis motuum opificibus conformaretur, ij pulmonibus & cordi, nulla etiam re externa eos urgente, inciderent. Vt igitur aliqua thoracis capacitas intus fiat, ac thorax etiam motu agatur uoluntario, musculi^c alternatim sunt interpositi. Mox autem & hoc ad securitatem non parum cordi pulmonibusque conducit. magis enim nunc muniuntur, quam si solis musculis thorax fabricatus esset. Quinetiam ossa thoracis moles firmandis sustinendisque scapulis, ac demum brachijs quoque, mirifice confert. Scapulas enim solis inniti costis, & clauiculas nullo osse quam scapulis & pectoris osse firmari, docebimus: ad quas rursus brachia, & postea cubiti & extremæ manus quadam serie coarctantur. Præterea si nullis ossibus thorax constaret, nullus esset locus unde scapulis & brachijs & abdomini ac alijs quibusdam membris musculi pronascerentur: neque ullis fundamētis musculi hæerent, aut consisterēt. Atque hanc sanè ossei thoracis necessitatem, si quid aliud, profecto testudines non absque summa Creatoris nostri admiratione, pulcherrime edocent, quæ etsi tam tuto sepiantur domicilio, tamen in pectoris & thoracis laterum sedibus elegantissimum & iucundissimum spectatu ossium demonstrant textum, in hoc duntaxat incredibili artificio creatum, ut illi priora crura innituntur: utque musculi testudinis brachia mouentes, commodè originem sumant. Sed fortassis in medium aliquis adferet, Cur esset peius, thoracis modo abdomen quoque osseum extrui: quum si talis ossa strues uicissim ex musculis formata uentri circumponeretur, contractionem ac dilatationem non præpediret, ad hæc maior securitas ita abdomini conciliaretur? Qui sic quærit, docendus est, ea quæ uentre continentur, non potuisse adeo, atque interdum ex usu est, dilatari comprimique, si extrinsecus ossibus sepiantur. Si autem hoc uerum est, neque mulieres concipere possent: deinde neque ad saturitatem semel comedere homini liceret, uerum assidua egeret comestione, quemadmodum & respiratione. Sed hac quidem perpetuo hominem indigere, nihil est absurdi: quippe qui in aëre uersatur, ac uiuit. Si uero esculentis poculentisque similiter egeremus, uitam duceremus admodum à philosophia & musis alienam: cibisque perpetuo dediti, operam optimis pulcherrimisque rebus nunquam nauaremus. Rursus, si ossa moles tanta esset, quantam mulieres ultimis mensibus utero gerentes requirunt, quid hac mole esset ineptius? si excluso foetu, illa tam moleste extuberaret: & interim nulla re alia quæ ex usu humanæ fabricæ esset impleta non consideret, ut intestina & uentriculum debite amplexaretur, & penicilli modo, uel calefaciendi causa, proximè illis applicaretur? Verum hæc in quinto libro exequemur fusius, & ostendemus pariter, in uentris fabrica tantam Naturæ fuisse solertiam, ut uentris organa neque dilatatione neque compressione uicissim egentia, aut alijs subiecerit partibus, aut etiam non minus quam pulmonem muniuerit. Iecur nanque & lien costis sepiuntur, & renes quoque tot alijs organis ob hoc potissimum ad dorsum succumbunt, quod horum nullum dilatari debeat. reliqua autem uentris organa insigni qua diximus prouidentia, osseo contextu suis functionibus haudquam præpediri Natura uoluit. Quum itaque neque respiratio, neque uox absque thorace fieri possit, ac dein thorace primum quidem cor, insuperque cum ipso pulmo, muniri debeant, ad quatuor uelut scopos rerum Opificem in thoracis fabrica attendere oportuit, uocem nimirum, respirationem, cordis & pulmonis magnitudinem. Thorax enim, qui quodammodo ouali constat figura, tam amplius est,^d quantam pulmonis molem esse oportuit. At pulmo interim thoracis sequitur formam, non autem thorax pulmonis. In pulmonis enim historia, mediocri negotio ostendam, ipsum nulla peculiari eguisse forma, ut neque iecur, neque lienem, neque quodammodo cerebrum. Porro iam tempestiuū erit, thoracis ossa seriatim describere, & cum uertebrae eiusdem prius^e enarrauerimus, à costis sermonē auspicari. Costæ igitur uiris & mulieribus ab utroque latere^f duodeno constāt numero: rarius enim undenæ tantum uidentur. quamuis interdum etiam tredecim obseruauimus: quemadmodum tredecim quoque thoracis uertebrae sæpius quam undecim tantum occurrere, supra retulimus. Singulis enim thoracis uertebrae, singulae in ambobus lateribus costæ articulantur. Quod autem uiros costa quapiam in altero latere destitutos, ac uiros unius costæ numero à muliere superari, uulgus opinatur, ridiculum planè est: etiam si Euam ex Adæ costa à Deo procreatā, Moyses in secundo Geneseos Capite prodiderit. Quamuis enim forsitan Adæ ossa, si quis ea in skeleton compegisset, ex altero latere una caruissent costa: non ob id tamen omnibus quoque uiris unam deficere necesse est. Aristoteles homini octo costas tantum tribuit, concessurus etiam quosdam gentis Turdulorum septenis costis creari, si modò id alicuius idonei autoris testimonio ipsi constet. Verum ut hinc Aristoteles aliorum duntaxat suffragijsuum dogma firmaret, ita quoque non dissimile uero est, illic octo costas homini ex aliorum relatu eundem ascripsisse, hæcque

Cur abdomen
non etiam sit
osseum.

Quò potissi-
mū Natura
thoracem con-
ditura atten-
derit.

Costarum nu-
merus.

Viris ac mu-
lieribus idem
costarum nu-
merus.

Lib. i. Hist.
animalium
Cap. 15.

Corporum in
Ligurib. sym-
metria.

Costarū sub-
stantia & ap-
pendix.

Ossea substan-
tia.

Cartilaginea
substantia.

Lib. 8 de Ad-
ministr. sect. &
partim in lib.
de Ossib. Ca.

Costis omni-
bus non paritudo.
Non par am-
plitudo.

Costarum læ-
uitas & asperi-
tas.

Costarum si-
nus.

ratione rem non uisam parum recte nobis tradidisse. Quod si toties in hominis fabrica ipsum fecisse nobis occurrit, quid de reliqua animalium historia censendum putabimus? Quanquam interim dum memoratum iam Aristotelis locum aliquando Patauī in scholis enarrarem, à summæ (propter singularem literarum ac iuris ciuili cognitionem) spei adolescentibus IACOBO NIGRO & FRANCISCO PINELLO patricijs Genuensibus accepi, generosissimos Ligures in ueterū monumentis *ἐν τῷ ἀγάλματι* fuisse appellatos, quum tamen is populus ut est nauali terrestriq; pugna strenuus, optima quoq; membrorū symmetria ac numero sit spectatissimus. Sunt itaq; plurimū utrinq; duodecim costæ: ac septem superiores pectoris ossi & uertebri, ut postea dicemus, articulatur; quinque autē humiliores solis alligantur uertebri, neq; ad pectoris os pertingunt, sed in thoracis lateribus desinentes, suarum cartilaginum finibus^s inuicem cōmittuntur, duodecima duntaxat excepta, quæ ab undecima penitus^h dehiscit, neq; aliqua ex parte ipsam cōtingit, id quod & undecimæ non rarò usu uenit, decimæ cartilaginem tunc nonⁱ attingenti. Quinq; istæ humiliores, quòd pectoris ossi non articulatur, *κόσται*, quasi dicas spurix & illegittimæ, Græcis appellatur. Omnibus costis commune est, quòd^k ossea^l cartilaginosaq; cōstent substantia, quodq;^m appendice ea sede qua uertebRARUM corporibus cōnectuntur, & qua in capita eas protuberare audies, donetur. Ossea costarum substantia nō omni ex parte sibi similis est. Vbi enim costæ uertebri coarticulatur, ac ubi dorsum efformant, solidiores multò durioresq; sunt, quàm in thoracis lateribus & iuxta pectoris regionē, ubi magis fungosa extruuntur substantia, quæ tenui squama, seu lamina obducitur, atq; hæc illic demum tenuissima est, ubi in cartilaginem degenerat. Cartilago etiam non parem undique ostendit speciem. inferiorum enim costarum cartilago mollior est: unde etiam fortassis nonnulli illegittimas costas *χόνδρους*, quasi cartilaginē dicas, uocari tradunt. Superiorū uerò costarum cartilago durior est, solidiorq;, ac in senibus intus ossea efficitur, quemadmodū in ouibus & bobus, alijsq; ferè omnibus eius generis animantibus experimur, quorū cartilago intus friabili alboq; ac fragili constat osse, exterius cartilagine ueluti mēbrana quapiā obuoluto. Atq; id etiā in simijs canibusq; adeò est manifestū, ut Galenus uerarum costarū cartilagines osseas, spuriarum uerò exquisitas cartilagines esse dixerit. In hominibus autem nisi ætate admodum prouectis, cartilago in osseam naturam desinisse uidetur, quum interim in iunioribus adhuc canibus, & quæ iam proximè recensuimus animantibus ossea admodū efficiatur. Huius cartilaginis moles in omnibus costis nō eadem est, ut etiam omniū costarum non par est longitudo. prima nanq; & duodecima breuissimæ sunt, mox secunda & undecima, quæ omnes breuib; donantur cartilaginibus. Sexta uerò, septima & octaua, longissimæ sunt, ac longissimas etiā obtinent cartilagines. Primæ costæ cartilago amplissima est, quemadmodū & prima costa cæteras quoq; amplitudine superat, mox hanc secunda, & deinde tertia subsequuntur. duodecima uerò & undecima omniū sunt tenuissimæ, & in tenuissimas quoq; terminantur cartilagines. Mediæ autem medio se habēt modo, quarum cartilagines subinde in progressu ab ossea costæ substantia latiores efficiuntur. Quum enim cartilagines sex superiorū costarum interualla efforment, totq; ductu ab inuicem æquè distent, sextæ, septimæ, octauæ & nonæ interdum costarum cartilagines uariè in progressu latefcunt, inuicemq; continuatæ interualla ipsarum suamet substantiaⁿ implent. Ad hæc quinq; spuriarum costarum cartilagines in acutum^o mucronem desinunt, Verarum autem costarū cartilagines non item. Primæ enim costæ cartilago,^p suo fine qui pectoris ossi ualidè cōnascitur, amplior fit, quàm quaprimū ab ossea costæ substantia educitur. Secundæ ac tertiæ triumq; subsequentiū costarum cartilagines modicè in progressu arcantur, & singulæ in^q tuberculū finiunt, quo postea has pectoris ossi coarticulārī docebimus. Costis non omni ex parte eadem adest læuitas. interna enim sede, qua membranā ipsas succingentem spectant, omnes læues minimeq; asperæ apparent. tertia tamen, & quæ illam ad decimam usq; subsequuntur, in interna ipsarū sede uersus humiliora^r sinum ostendunt, ipsis secundū earum longitudinem exculptum, non quidem per uniuersam costæ longitudinem conspicuū, sed maxime ea sede qua primum à uertebri abscedunt, atque in thoracis latera ferri incipiunt. Sinus iste paratur uenæ cauæ^s ramo, quem uena cōiuge carens costis exporrigit, deinde etiam hæc uelitur arteriæ magnæ^t soboles, &^u neruus à dorsali medulla pronatus. Verum quia hæc uasa in medijs costis grandia sunt, ac pari semper feruntur serie, in tribus autē superioribus minima & errabunda ducuntur, nō mirum est medias costas his sinibus ornari, superiores uerò nō item. Porro tres costæ humiliores, etiāsi magna illis attendatur uasa, quum tamen tenues & interna sede depressæ cernantur, etiā citra huiusmodi sinuū operam illis uasis tutum iter præbent. Hic sinus uasis deducendis cælatus, inferiorē costæ partem acutiorem tenuioremq; efficit, quàm sit superior, quæ obtusior magisq; (ut sic dicam) teres cernitur. Externa costarū sedes, quæ gibba est,

g. fig. F.
h. fig. H.
i. fig. G.
k. fig. ab a
per f ad A.
l. eadem fi.
à B ad E.
aut i figur.
A, B.
m. 4 figur.
L, M.
4, 5 figur.
fractam o-
stendunt co-
stam ad 9.

n. 1 fig. I, L.
o. 1 fig. F.
p. 1 fig. C.

q. 1 fig. D.
dein 3 fi. E.

r. 1, 4 fig. K.

s. fig. 6 cap.
lib. 3 G, G.
t. fig. cap. 11
lib. 3 h, k.
u. 2 fig. cap.
11 libri 4
præcipui
rami costa-
rum ductū
seruantes.

est, non omni ex parte læuis occurrit, ea enim^x parte qua costę uertebri alligantur, præterquam quod tubercula & capitula efformant, quibus uertebRARUM inarticulantur sinibus, etiam asperæ inæqualesq; sese offerunt, quo aptius hinc ligamenta educantur costas uertebRARUM corporibus & transuersis earundem processibus colligantia. Præterea in hac externa costarum sede, ubi primū à transuersis uertebRARUM abscedunt processibus,^y tuberculum quoddam asperum inæqualeq; uisitur, tendinibus^z undecimi dorsi mouentis musculi excipiēdis paratum. Tendines enim huius partim in apices transuersorū processuum, & partim in hæc costarū tubercula inseruntur. Deinde, quā costę adhuc magis à transuersis uertebRARUM abscedūt processibus, in hac posteriori externaq; ipsarum sede,^a asperæ inæqualesq; sunt, ac etiā ueluti tubere quodam modicè prominēti donantur, ut in illas apta insertionis sedes eius musculi efficeretur, quem in homine thoracem mouentiū quartum, in simijs uerò & canibus sextū numerabimus. Dein hæc asperitas nō duntaxat illius musculi insertioni idonea est, imò etiam^b externi intercostales musculi hinc enasci docebuntur, qui hac iuxta uertebRAS regione non solum ab inferiori sede superioris costę in humilioris costę elatiore nascuntur partem, uerū etiam ab externa unius costę sede ad externam alterius hinc exporriguntur. Reliqua autem regione costę læues æqualesq; sunt, nisi fortè quispiam eas modicè asperas in superiori & inferiori sede esse contenderet, à qua intercostalium musculorū pendet origo, in quamq; eorundem etiam insertio perficitur. Prima costa superiori sede, qua latissima est, priuatim aspera inæqualisq; cernitur, ut musculus dorsi mouentium quartus hinc principium opportunè sumat. Costis omnibus non par ad uertebRAS obtigit articulatio, nouem enim superiores^c duplici coarctantur articulo, undecima autem & duodecima simplici, quemadmodum & decima quoque rarissimè duobus articulis suæ committitur uertebRę: ut cunq; etiam secus Galeno uisum fuerit, qui singulas costas duplici articulo uertebRIS coarctari docuit. Cæterū costę duobus nodis articulatae^d duo exigunt tubercula, unum quidem, quo^e sinui uertebRARUM corporibus inciso inarticulantur: alterum autem, quo^f internæ sedis apicis transuersi processus firmantur. Atque hæc tubercula sinibus illis respondent, quos uertebRIS, quum earum recenseretur constructio, in sculptos retulimus. Prima igitur costa rotundo tuberculo primæ thoracis uertebRę corpori inarticulatur, ac deinde transuersum eiusdē uertebRę processum tantisper ascendit, quousq; ipsius apici alio capitulo tuberculo ue articuletur. Secunda uerò costa & septem subsequentes communi semper duarum uertebRARUM corporum sinui nō rotundo, sed instar obtusi anguli protuberante capitulo inarticulantur: transuersis autem processibus pari modo cum prima coarctantur costa. quam & hinc quædā in articulis, propter sinus non eadem sede in transuersis processibus exculptos differentia cōsurgat. Superiorum enim uertebRARUM transuersi processus, suos sinus in humiliori parte internæ illarum sedis incisos gerunt, inferiorum autem (uti suprā etiam cōtra Galeni suffragium admonuimus) in superiori parte, mediarum uerò uertebRARUM sinus medio se habent modo. Cæterū quod costarū articulatio, quæ ad uertebRę corpus efficitur, tantò elatior sit illa, quam costę ad transuersos processus moliantur, quantò apex transuersi processus demissior est, sinu uertebRę corpori exculpto, uel me tacente notum esse arbitror. Porro trium inferiorum costarum articulatio, quæ ad uertebRARUM duntaxat corpus perficitur, sinibus quoq; non admodum altè cauatīs, neq; ualde protuberantibus^h capitulis perficitur. Atq; hac ratione costę uertebRIS committuntur, quam autem articuli speciem cum pectoris ossē moliantur, & quo ductu à uertebRIS antrorsum contendant, tunc primū opportunè explicabimus, quum pectoris ossis constructionē sermoni addiderimus: quæ profectò enarratu esset facilis, si humanos, simiarum & canum & uitorum, eiusq; generis animantium ossi responderet. In his nanque animalibus (ut etiam inter edendum uidere est) pectoris os septem cōstat ossibus, non admodum inter se forma differētibus. In canibus enim, porcis, & ouibus, inuicem cōueniunt: in simijs uerò, & sciuris, propter clauicularū articulationem, primum supremumq; os aliquantulo cæteris amplius uidetur. Septem hæc ossa latiora, quàm profundiora crassiora ue sunt, & qua inuicem committuntur latiora nonnihil, quàm in ipsorum medio existunt. Horum connexus cartilaginis interuentu interdum tam laxè perficitur, ut à uertebRARUMⁱ compage modicè differat: est tamen is cōnexus ad symphy sim seu unionem ita referendus, ut appendicum cum suis ossibus connexus, nisi quod hunc connexum etiam in admodum decrepitis bobus est cernere. Vnde etiam Galenum in libro de Ossibus miror, qui pectoris ossa synarthrosi scripserit committi, quum tamen neque harmonia neque futura, multoq; adhuc minus gomphosi componantur, quas compositionis species Galenus in eius libri initio sub synarthrosi cōplectitur. In harum commissurarum lateribus sinus utrinque exculpitur, cui cartilaginis in quam costę degenerant, tuberculum aliquod inarticulatur. Ad primi enim ossis cum secundo contextum,

Costarum asperum tuberculum.

Costarum ad uertebRAS articulatio.

Tum alias sepius, tum maxime de Admirist. sect.

Quadrupedū pectoris ossis descriptio.

*Humani pe-
ctoris ossis de
scriptio.*

secundæ utriusque lateris costæ cartilago articulat. Ad secundæ ossis cum tertio commissuram
tertiæ utriusque lateris costæ cartilago ipsius serie suorum ossium commissuris coarctatur. Ve-
rùm primæ ossis lateribus primæ costæ cartilago adarticulat, aut potius adnascitur. Hæc
enim commissura ad coalitum potius, quàm ad articulationem spectat. Septimum autem os,
quod reliquis gracilius, magisque teres est, in cartilaginem exacuitur, ipso osse latiore, ensisque
mucroni quàm similimã. ac huiusmodi sanè pectoris ossis in canibus & simijs est ratio. quam
Galenum spectasse annues, quum ipsius de pectoris osse historiam, his quæ modo prælibau-
mus, contuleris. ^k Verùm si humanum pectoris os (quod ut generatim dicam amplum, licet
si cum aliorum animalium ossibus cõferatur longè breuissimum est) intuitus fueris, multò aliter
id habere animaduertes. Nunquam enim quod certò affirmare possim, in humano pectoris
osse mihi septena occurrerunt ossa, neque etiam hæc in homine eodem semper numero cernun-
tur. In adultis tria ferè conspiciuntur, prorsus inter se uaria. ac ^l primum quidem insigniter am-
plum est, & nonnihil etiam crassum: ita tamen, ut ipsius crassities ab amplitudine plurimum
uincatur. Os id ^m interna seu posteriori sede, qua thoracis respicit amplitudinẽ, modicè cauum
est: in anteriori autem gibbum, & in medio secundum ipsius longitudinem longè crassius,
quàm in lateribus. uidetur enim in anterioris sedis ⁿ lateribus depressum, atque ut aptè primæ
costæ cartilaginis crassities ^o responderet, extenuatum. In medio autem, roboris gratia ^p trian-
guli modo protuberans. ^q Superior etiam ossis pars multò crassior ampliorque est ^r inferiore, &
utrinque uno ^s sinu longo ac uersus posteriora inciso, & cartilagine incrustato donatur, cui cla-
uiculæ ^t caput inarticulat. In horum sinuum medio propter extuberantia illorum interiora
latera, primum hoc os in superiori hac sede ^u lunatum cernitur, & ueluti foueam ostendit, quam
^v σφαγλὴ & iugulum propriè uocamus, uulgò autem furculam superiorem. ^x Inferior ossis pars
utrinque aspera est, & secundo, quod iam describam, ossi cartilaginei ligamenti interuentu adeò
laxè committitur, ut nunquam horum ossium lateat connexus, imò & ipsius quoque motus in
magnis respirationibus interdum animaduertitur. ^y Secundum os multò amplius est, quàm
crassum, ^z superiori sede qua primo connectitur ossi, strictius est ^a quàm prope inferiorem. At
nullibi interim æquè amplum cernitur, atque primæ ossis elatior sedes. Quà secundum hoc os
primo committitur, in utroque connexus latere ^b sinus instar obtusi anguli insculpitur, ambo-
bus ossibus communis, & cartilagine incrustatus, cui secundæ costæ ^c cartilago instar obtusio-
ris trianguli uerticis protuberans inarticulat. Præter hunc sinum, præsens os utrinque ^d alios
multos exigit pari modo, instar obtusioris anguli insinuatos: uerùm hi paribus interuallis ab
inuicem nequaquam distant. Primus enim in altero latere huic ossi proprius sinus, qui terciæ
costæ cartilagini paratur, à sinu secundæ costæ gratia inciso longius distat, quàm secundus
huius ossis peculiaris sinus, quartæ costæ gratia cælatus. Rursus, plus interualli consistit inter
secundum sinum & tertium, quàm inter tertium & quartum, adeò ut sinus sextæ & septimæ co-
starum nomine in hoc osse sculpti, se inuicem contingant, uixque mutuò remoueantur, & non
tam altè, atque superiores, excauentur. Suscipit enim hoc secundum os priuatim terciæ, quar-
tæ, quintæ, sextæ & septimæ costarum cartilagines, secundæ costæ cartilaginis ^e modo protu-
berantes. Secundum hoc os in pueris ex ^f plurimis efformatū uidetur ossibus inuicem symphy-
si seu unione cartilaginis interuentu contextis. Verùm is cõtextus neutiquam canis aut simiæ
ossium compagi uenit conferendus, quū longè magis lateat, inferioraque ossa multò breuiora supe-
rioribus cernantur. Et in cemiterijs secundū os integrum, & à primo disiunctum ferè semper
effoditur, quemadmodum uertebrae mutuò diremptæ eximuntur, etsi fortuito in secundo osse
aliquam compaginis speciem, ac si ex pluribus id constaret, obseruabis, ea potissimum appare-
bit, ^g ubi terciæ costæ cartilago ossi articulat, & deinceps ^h ubi quarumarum costarum cartilagi-
nes pectoris ossi iniunguntur. ⁱ Tertium uerò os exiguum est, & inferioris secundæ ossis sedi in-
terna parte eadem ratione committitur, qua primum secundo iungi relatum est, illicque secundo
ossi necitur, qua septimarum costarum cartilagines infimæ secundæ ossis sedi articulatur. Hoc
os modicè amplum est, ac tenue, humiliori que sede in mucronatam cartilaginem degenerat. Ve-
rùm id non infrequenter deesse reperies, & ^k mucronatam cartilaginem inde enasci conspicias,
ubi septimarum costarum cartilagines mutuò coeunt, secundoque pectoris ossis ossi articulan-
tur. Iam si tria pectoris ossa simul iunxeris, manubrij alicuius gladij imaginem conspicias. pri-
mi nanque ossis superior pars, quæ lata admodum est, illi manubrij parti respondebit, quæ sub
paruo digito in apprehensione consistit. Secundū autem os, illi parti congruet, quam manus
tota intus complectitur, in qua sinus costarum cartilaginibus parati instar fouearum erunt,
quibus digiti firmari possent. atque huiusmodi foueæ eum præstarent usum, quem in gladijs
ex manubrij asperitate quaerimus: quoties intortis nodosisque funiculis, aut scabra piscis cute,

*Pectoris os-
sis ad ensẽ
comparatio.*

*k tota 6, 7
figur.*

*l 1. fi. d. g. ad
h. 6 autem
e 7 ab f
adt.
m fi. 7 o.
n 6 fi. m. n.
o 6, 7 fi. p.
p 6 fi. q. r. l.
q 6, 7 figu.
q q. s. 2.
r 6. 7 figu.
t. u.
s 6, 7 figu.
q. r.
t 1 fig. cap.
22 A.
u 6, 7 fig. f.
x 6, 7 fig. t.
y 1 figur. ab
h ad i.
z 6, 7 fi. t.
a 6 figur.
iuxta u.
b 6, 7 fig. u.
c 1 fig. D.
d 6, 7 fi. x.
y, z, a, b.*

*e 3 figur. E.
f 6 fi. y, d, i.*

*g 6 fig. y
h 6 fig. d
i 1 figu. ab i
adh. 6, 7 fi.
l.*

*k 1 fig. k. 6
7 figur. u.*

ma-

manubrium obduci curamus. Tertium os unà cum cartilagine, reliquæ gladij parti posset assimilari, adeò, ut nonnulli uniuersam hanc ossium struem *ἑποδῶν* ab ensis imagine uocarint, alij, qui canes potius ac simias quàm homines spectarunt, mucronatam cartilaginem duntaxat illo nomine dignantur: quod hæc scilicet gladij mucronis formæ accedat, ipsumq; canum pectoris os ensis imaginì non ita aptè ac humanum os conferri queat. Hæc imaginum collatio attestatur, ueteribus illis hominum cadauera, Galeno autem simiarum dissectioni fuisse adhibita. cui sententiæ Celsi quoque oratio, qua ille os pectoris utrinque lunatum esse scripsit, suffragatur. id enim de simijs & canibus falso protulisset, quum tale quid in illis nihil appareat, quippe in homine primum pectoris os superius, & secundum inferius, multò latiora sunt, quàm ubi hæc inuicem committuntur. Pectoris ossis substantia admodum fungosa molisq; est, & anteriori sede magis continua squama quàm posteriori obducitur. Posterior enim fedis squama multis inæqualibusq; donatur foraminibus, quæ haud peruia sunt, sed¹ uasis solum uiam præbent, quibus id os enutritur. Atque hæc foramina in primo osse tanto magis sunt conspicua, quanto huius ossis crassities secundi ossis crassitiem superat. Quòd itaque pectoris os, illis costis quæ orbiculatim thoracis amplitudinem efformant, stabiliendis procreatum sit, neminem latere arbitror: quemadmodum neque, quod propugnaculi etiam uicem secundario gerit, eosq; usus hominì præstet, quos generatim thoracis ossa præbere in huius Capitis initio retulimus. Cartilago, in quam pectoris os excutitur, subditorum quoq; est propugnaculum, & malum granatum uulgò appellatur, quòd (ut arbitror) unius balaustrij apicis imaginì illa accedat. A qua etiam forma, uulgus ipsam epiglottalem appellat cartilaginem, ab imagine uidelicet laryngis^m operculi, pectoris ossis cartilagini specie non admodum absimili. Verum huiusmodi nominum copiam ad præsentis libri calcem unà cum cæterorum ossium nominibus subiiciemus. Modò autem nihil addendum superest, nisi fortè costarum ductus in costarum ossibus longè quàm in cartilaginibus diuersus. Costarum enim ossaⁿ quum primum à uertebis abscedunt, in posteriora deorsum obliquantur, &° hinc ad thoracis latera deorsum semper oblique uersus anteriora declinant,^p quousque in cartilaginem desinunt oblique ac circulatim sursum in anteriora porrectam. adeò ut costæ ubi cartilaginem primum educunt, arcuatim, & in angulum quodammodo sursum flectantur.^q Iste costarum ductus non in illis solum quæ pectoris ossi committuntur, euident est: uerum & in reliquis omnibus, si fortè duodecimam exceperis, cuius cartilago admodum obscure sursum spectat. quanquàm interim hic inflexus potissimum in medijs, quinta nimirum, sexta, septima, octaua & nona uisitur, in superioribus uerò ac inferioribus magis latet.

Pectoris os utrinq; lunatum.


Pectoris ossis substantia.

Pectoris ossis usus.

Mucronata cartilaginis usus.

Costarum ductus.

DE CARTILAGINE A QUAE COR- dis basi ascribitur substantia, seu cordis osse. Caput XX.



HÆC figura magnæ arteriæ & arterialis uenæ radices perfunctoriè exprimit, ab omnib. connatis corporibus partibusue diuisas, & duobus circulis similimas. *Ac* *A* quidem arteriæ magnæ radicem notat, *B* uerò arterialis uenæ radicem. *C* autè connexum indicat, quo uasa inuicem in ipso exortu connascuntur. Iste connexus, qui potissimum cartilagineus est, non ex hac rudi figura petendus est, uerum cum ex alijs sexti libri figuris, tum maxime ex octaua & decima, quas non obfuerit obiter cum suorum characterum indicibus modò perlustrare. Parum autem opportunè facerem, si easdem tabulas uarijs in locis frequenter proponerem.



E FORSITAN præsentì libro, os aliquod prætermisisse uideamur, hoc loco etiam osseæ cordis substantiæ mentionem faciendam duximus. Galenus nanque ab elephantis corde, à quopiam suorum familiarium os eximiæ magnitudinis exectum prodidit: & grandium quidem animalium cordibus os, minorum uerò cartilaginem ascribit. Ego autem hætenus, uti in nullo corde, ita neque in humano exquisitum os repperi, eaq; sede, qua Galenus cordis os constituit, substantiā obseruo cartilagineam, quæ mea quidem sententiâ nihil est aliud, quàm^a magnæ arteriæ &^b uenæ arterialis radices à corde principium ducentes. Quippe radices hæ, in quibus membranarum bases consistunt, quæ arterierum

Li. de Ad. ministr. sect. 8.

Humanum cor uero osse constituit.

Cartilaginea cordis substantia.

a 10 fl. lib.
b sub B, C, D.
b 8 fig. lib.
c sub E, F, G. quibus characteri mebrane notantur.

terierum ē duobus illis uasis in cor refluxui præficiuntur, multò duriores sunt, quàm reliqua illorum uasorum substantia, adeò ut radices cartilaginis natura participare nonnihil uideantur. quæ in bobus ita interdū indurefcit, ut quadrupedū costarum cartilagine in album & friabile os extrinsecus cartilagine tanquam membrana obductum degenerare, prius scriptum est. Hæ itaque uasorum radices^c perinde ad se mutuò sunt conterminæ, ac si^d duos circulos in puncto inuicem committeres continuaresq̃, ita ut dexter circulus uenæ arterialis esset radix, sinister uero (qui amplior esset) magnæ arteriæ. Vbi autem circuli mutuò committerentur, is locus esset, quo hæc uasa suis orbibus simul connascuntur uniunturq̃, ac ubi optima cartilaginis consisteret portio, quæ oblonga & ueluti teres esset: tota nimirū sede qua illæ radices inuicem cōmittuntur, & reliquæ interim circuloꝝ portiones essent resectæ. Ac proinde per me licebit radices has, aut cordis cartilaginem, aut os uocare, modò accuratè ipsarū naturā quis intueatur, neq̃ unā cum Galeni sectatoribus ipsius sensa admodum oscitanter eruentibus tam stolidus sit, ut cordis os instar Δ aut v efformatum sibi persuadeat. Qui enim post Galenum humani corporis historiam scribere aggressi sunt, in cordis basi os quoddam extructum recensent, quod laryngis superiori sedi^c præposito, & ab v imagine *voesides* nuncupato, assimulant. Neq̃ sat fuit illis hominibus ad hunc modum, os in humani cordis basi confingere: quin imò sermoni adiecere, cordis basim, atq̃ ideo etiam uniuersum cor, ab ipso nō secus firmari quàm linguæ radix illo osse quod laryngi præponitur. Arbitrantur nanq̃ cor eiusmodi osse firmatū, moueri: non expedientes cor etiam si eiusmodi donaretur osse, ipso nō minus suffulciri posse, quàm ferreus palus lectum in aëre sustineret: quādo is lecto alligatus, simul cum ipso deorsum ex alto proijceretur. Quamuis interim quatuor cordis uasorum ad conterminas sedes connexum nonnihil cor sustinere, haud inficiari possumus. Cæterum huiusmodi hominum figmenta misla faciamus, & illorum quoq̃ oscitantiam negligamus, qua in cordis (ut ipsi existimant) affectibus magno supercilio os cordis cerui, nescio quibus gemmis & auro mixtum, propinant: quum interim ceruo non aliud os, quàm uitulo, aut canī, aut sui insit, cartilagineæ nimirum magnæ arteriæ & uenæ arterialis radices. Et ossiculum illud quod ē ceruorum cordibus exemptum pharmacopolarum officinæ mihi hætenus ementitæ sunt, aliud nihil esse censeo, quàm grandius agni hyoidis ossis ossiculum, quod continuum est, & λ simillimum: nisi quod dextrum crus etiam transuersim in hunc modum λ sinistrum decussatim secet, & alterum crus altero breuius sit: quod etiam ouina lingua, quoties mensæ apponetur, luce clarius edocebit. Porro qua administrandi ratione cartilagineæ uasorum radices inquirendæ sint, in sexto libro, ubi cordis sectio pertractabitur, describemus.

Anatomico
rum lapsus.

Medicorum
& pharmacopolarum im-
postura.

Os cordis cerui


c C.
d A, B.

c 1, 2 fig. 13
cap.

DE SCAPVLIS. CAPVT XXI.

PRIMA FIGVRA VI^a SECVNDATA.
GESIMIPRIMI CAP.

TERTIA.



TRIUM QVAE HIC PROPONVNTVR FIGVRARVM ET
earundem characterum Indicem, proximè sequens pagina exhibet.

PRI

P R I M A uigesimi primi Capitis figura internam, seu anteriorem scapulae dextrae sedem exprimit, quae costis innititur.

Secunda, dextrae scapulae externam posteriorem uel sedem ostendit.

Tertia, scapulam dextri lateris in latus depictam continet, ut sinum gibbae exteriorisq; scapulae sedis proponeret, qui inter elatiorem scapulae costam, et scapulae spinam consistit. Verum id iam ex characterum indicibus reddetur explicatius.

In prima figura **Z**, **X** & **Y** scapulae ostendunt basim. Est enim scapula quodammodo triangularis. **Z** uero, & **a**, & **A**, superiorem scapulae notant costam. **Y** autem, & **B**, costam scapulae inferiorem: adeo ut **Z** superior sit basis angulus, **Y** inferior angulus: **A** & **B** tertius scapulae angulus, quem scapulae superior et inferior costae constituunt. Atq; haec obiter isti notant characteres: singulis autem seorsum aliud cum caeteris in hunc modum insignitur.

A, B 1, 2 Scapulae sinus, cui humeri caput articulatur. In secunda figura **B** notatur inferior sinus sedes, quae quodammodo orbicularis est. **A**, superior sedes magis stricta, contractaq; in prima figura **A** indicat protuberantem sinus seu cervicis scapulae partem, a qua duo huius articuli peculiaria ligamenta, una cum externo capite musculi cubiti flectentium anterioris pronascuntur.

C, D 1, 2 Cervix seu collum scapulae. Verum **C** etiam insignitur radix interioris scapulae processus, qui **E**, **f** & **F** insignitur. Deinde **C** in prima figura sinum quendam indicat, sub interiori scapulae processu conspicuum.

E, f & **F** in prima figura, & **E** & **F** in secunda, interiorem insinuant processum scapulae, in quo **F** protuberantem notat partem, cui clavicula alligatur, & penè innititur. **E** uero, processus huius appendicem. **f** autem, asperam commonstrat partem, a qua ligamentum pronascitur, hinc in summum humerum (qui **K** indicabitur) pertinens.

G, H 2 Radix spinae scapulae, seu ipsa scapulae spina, quae in homine summum producit humerum, quem **K**. **K** in prima & secunda & tertia notat, et **L** etiam in prima ac tertia. Est itaq; **G** & **H** spinae exortus longitudo. Quod uero ab **H** ad **K** fertur, summus est humerus. Vbi enim **H** cernitur, illic spinam a scapulae dorso abscedere dicemus. Verum **K** priuatim notatur summi humeri appendix.

L 1, 3 Sinus summi humeri admodum leuiter caelatus, & admittendae claviculae paratus.

I 2, 3 Scapulae spinae pars crassior, interdum appendice decorata. Ad **G** enim, & **I**, & **H** spina scapulae est crassior, quam alibi. **A** **G** uero per **I** ad **K** aspera pars notatur spinae, & summi humeri. Quod autem in secunda inter **I** & **H** consistit, & in prima inter **L** & **a**, laeue est, & minime asperum.

M, M & c. 1 Instar obliquarum linearum tubercula sinus perinde constituentia, ac si illi a costarum conuexis scapulae cauo essent impressi.

N, O, 1 Sedes in interna scapulae regione magis caua, quae secunda figurae literis **G** & **H** respondet.

P 1 Protuberans crassiorq; inferioris costae pars, quae in internam scapulae sedem prominet.

p 1 Hac sede inferior scapulae costa latus uel efficitur acutius, ideoq; magis prominet, ut tertius brachium mouentium musculus hinc promptius exoriretur.

Q 1 Scapulae inferioris costae asper sinus, unde interior cubitum extendentium pronascitur musculus. **R** incuria elapsus est.

S 2 Ad scapulae externam sedem protuberans inferioris costae pars.

T 2 Impressio & amplitudo inferioris costae, unde tertius brachium mouentium musculus nascitur.

V, V 2 Hic externa scapulae sedes propter crassitiem inferioris costae insigniter caua cernitur. Quod enim inter **V** & **V**, & **G** & **H** consistit, tenuissimum maximeq; subtile & solidum est.

X 1, 2, 3 Appendix basis scapulae, ad principium ipsius spinae coalita.

Y 1, 2, 3 Appendix inferioris anguli basis scapulae.

Φ 1 Superioris anguli sedes, in internam scapulae regionem modicè protuberans.


Z, 1, 2, 3 **Z** superiorem basis angulum antea notauit.

a 1, 3 Semicirculare foramen, seu sinus, in superiore costa scapulae conspicuus.

b, c, 3 Sedes in externa scapulae regione inter spinam & elatiorem scapulae costam consistens. Verum **b** priuatim scapulae sedem hic notat tenuissimam, maximeq; subtilem: et quodammodo pellucidam. **c** aut foraminulum indicat hic frequenter apparere, et uenulae inibi scapulam nutriturae uiam praebens.

QVARTA VIGESIMI PRIMI

CAPITIS FIGVRA.



P R A E S E N T I figura externam seu posteriorem canis scapulae sedem in hoc delineauimus, ut promptè expendetur hominis scapulae ad canis, aut ouis differentia, quam in summo humero, aut superiori scapulae processu notabimus. Significet igitur *A* & *B* scapulae gibbum, seu dorsum, ac *A* quidem ipsius inferiorem sedem, *B* autem superiorem, & animantis collo capitae propiorem. *C* & *D* spinam scapulae notent, super scapulae ceruicem non excedentem. *E* scapulae ceruicem.

Scapularum
situs et nexus.



Scapulae u-
sus.

Scapulae for-
ma triangula-
ris.

Basis sca-
pulae.

C A P V L A E ² utrinque singulae posteriori thoracis regioni uersus superiora innituntur, ac occipitis ossi, ceruicis, thoracisque uertebrae, costis, & ossi *v* literam referenti, musculorum duntaxat interuentu copulantur. Occipitis quidem ossi beneficio ^h secundi scapulam mouentium musculi, qui etiam hanc multarum uertebrae spinis committit: uti & ^c tertius scapulae motuum dux, qui ceruicis uertebrae illam nequit. ^d Quartus uero scapulam mouentium, illam aliquot thoracis & ceruicis uertebrae spinis firmat. Costis scapulam committunt ^e primus illam mouentium musculus, & thoracem mouentium ^f secundus. Ossis uero *v* referenti ^g septimi eius ossis peculiarium musculorum ope scapula copulatur. In hominibus, simijs, ac sciuris, & si quae alia clauiculis donantur, ex abundanti ligamentorum auxilio, ^h scapula ⁱ clauiculis coarticulatur, clauiculaeque contermina est. In omnibus uero animalibus ^j brachij os seu humerus ipsi articulatur. ac proinde si hominem scapulis destitutum finxeris, nulla ratione humeri articulum sermone constitues. Ad eius nanque articuli constructionem necessum est, humeri caput alicuius ossis sinum subire, atque ut moueatur, in aliquo osse ueluti in basi quapiam firmari. Porro huiusmodi sinus occasione, ^k collum quoddam seu ceruix scapulae protuberat, in cuius extremo ^l sinus tam alte lateque exculpitur, quantum humeri articulo uarijs admodumque differentibus motibus mouendo ex usu est. Atque hinc sane primus praecipuusque scapularum usus censetur, cui alius mox subsequitur, neque ipse quidem poenitendus, thoracis uidelicet partium costis interectarum communitio atque custodia. Anteriores enim thoracis partes tuemur, multo ante prouidentes quae occurrunt laesuraeque sunt, & anticipantes uel transilire, ut id quod ingruit declinemus, aut obijcere pectori munimentum aliquod, aut manibus quippiam quo defendamur assumere. Quinimo plerumque & solis manibus ante periclitamur, satius esse rati has uulnerari, rumpi, ceteri, abscindi, quam quod laesurum sit, ad pectus pertingere concedamus. Thorax enim respirationis est organum, quemadmodum & ab illo complexus pulmo: cor autem insiti caloris fomes, irascibilisque animae sedes censetur, propugnaculis ob id etiam egens ualidioribus. Porro quum posteriori thoracis sedi, & anteriori aequale ab occurrentibus periculum impendeat, eorum uero quae obesse possunt praecognitio, in anteriori & posteriori regione nequaquam par sit, non praesentibus nimirum in posteriori regione oculis, oportuit sane & hinc quoque Naturam artificium quoddam machinari, posterioremque thoracis sedem neuiquam negligere. Quocirca instar ualli & mirabilis propugnaculi uertebrae thoracis inibi compegit, & scapulas tanquam duos clypeos & scuta, firmissimosque muros obiecit, hinc rursus alium usum homini accessurum minime ignorans, quo complures musculi motuum brachij autores, sedem qua fulciantur, & a qua originem aptissime ducant, commodè adipiscuntur. Atque id profecto summæ opus est iustitiae, eodem osse ad tam uarios prorsusque necessarios usus abuti, & undequaque ita scapulas efformare, ut priuatim ad singulos usus confictae censeriqueant. Scapula enim inaequalis est admodum, omni ex parte sibi dissimilis. praeter uarios enim ipsius processus, sinus, tubera, appendices, eiusque generis reliqua, e quibus ossium differentias desumpsimus, scapula trianguli differentibus lateribus efformati imaginem quodammodo exprimit. ^m Primum nanque ipsius latus, quod basim scapulae perpetuo uocabimus, ea scapulae sedes est, quae secundum dorsum longitudinem thoracis uertebrae spinis proximè exporrigitur. basis haec obliqua constat linea, quae superius & inferius, uersus corporis latus oblique ueluti in circuli conuexum inclinata, in medio autem crebro paululum lunata cauaque uisitur. Interdum enim continuo ductu tota scapulae

atrium in-
tegrum R.

b 9 musc.

tab. 7. d.

c 12 musc.

tab. G.

d 10 tab. r.

e 5 tab. r.

f 7 tab. L.

g 5 tab. R.

h.

i integra-

rum Q. ad

l.

i integra fi.

S ad R.

k 1, 2 figur.

C, D.

l, 2 figur.

A, B.

m 1, 2, 3 fi.

a Z per X

ad Y.

pulæ basis, hunc in modum (gibba est. deinde basis hæc tenuis admodum uisitur, quamuis inferiori tamen parte & superiori modicè quàm alibi crassior appareat, & inferioris partis crassities partis superioris crassitiem adhuc uincat. Huic basi plerunqueⁿ duæ adnascuntur appendices: una quidem, quæ grandior crassiorq; & longior est, ac perpetuò apparet, ad basisq; inferiorem consistit angulum insigniter obtusum, ac ueluti orbicularem: altera autem appendix aliquantulū sub superiori habetur angulo, illiq; basis sedi coalescit, à qua scapulæ^o spinam principium ducere audies. Præter has appendices etiam basi mollis quædam cartilago adnascitur, eius cartilaginū generis quo ossium extrema nulli commissa ossi, augeri solent. Verum in hominibus hæc cartilago longe breuior minorq; est, quàm in ouibus & bobus, alijsq; animalibus, quorum scapulæ thoracis potius incumbunt lateribus, quàm, ut in homine, posteriori thoracis sedi uertebri proxima. Atq; ita primum scapulæ latus basis ue se habet, duo autē reliqua inter se uariant. ^p Inferius enim, ab humiliore basis sede admodum obliquè sursum in anteriora ducitur: ^q superius uerò (quod tanto breuius est inferiori, quanto inferius est ipsa basi breuius) nonnihil deorsum in exteriora fertur, quodammodo transuersim procedens. Duo hæc latera in ^r angulum coeunt, & latiusculam scapulæ partem suis extremis finibus continent, in qua ceruix scapulæ sinusq; conspicitur, humeri caput excipiens: adeò ut hæc sedes (si modò anguli loco censerì possit) tertius scapulæ angulus futura sit, quando quidem^s primum angulum superiorem basis angulum numeramus, ^t secundum uerò humiliorem. Cæterum duo hæc latera suis finibus tertium angulum constituentia, non solum ductu & breuitate inter se discrepant, uerum etiam crassitie. Inferius enim latus, quo altius à basi sursum conscendit, eo crassius & insigniterⁿ spissum efficitur. non aliter quàm si Natura huius lateris beneficio, scapulæ alioquin tenui & infirmæ magnū robur additum uoluisset, ac deinde secundariò quibusdam musculis commodi exortus locum præparauisset. Præter id enim quòd musculorū quorundam gratia (ut mox subiiciam) huius lateris crassities internam scapulæ sedem^x cauiorem reddit, & in externa sede seu gibbo, ueluti^y sinum efformat, ipsum quoq; in sua externa sede prope inferiorem basis scapulæ angulum^z compressionem obtinet, ac deorsum quadantenus educitur, ut ^z musculus illinc principium sumeret, cuius ope brachium ueluti à pectore reflexum, retrorsum ducitur. Quinetiā interna huius lateris sede, iuxta ipsius elatiorem partem, qua id scapulæ ceruicem terminat, etiam [†] oblongus sinus aliquantulum asper inæqualisq; conspicitur, [†] musculo principium porrigens, quem à scapula enatum cubiti extensionis autorem in secundo libro asseremus: inibi perpetuò inferius hoc scapulæ latus, inferiorem costam ueterum more appellaturi, qui superius inferiusq; scapulæ latera *πλευρὰς* uocauerūt. Porro superius scapulæ latus tenue, minimeq; crassum est, ad eam usq; sedem qua scapulæ ceruicis^b superior regio consistit, ^c interiorq; scapulæ processus exoritur. hac nanq; sede superius scapulæ latus impense crassescit. Deinde priuatim huic lateri iuxta interioris scapulæ processus radicem, ^d sinus quidam seu medium foramen instar semicirculi insculpitur, uiam porrigens nerui quinti paris neruorum dorsalis medullæ^e furculo, hac una cum uenula arteriaq; posteriorem scapulæ sedem^g adeunti. Cæterum scapulæ^f ceruix, quæ inter superioris & inferioris scapulæ costarum fines habetur, crassa est, ipsaq; scapula ex ampla tenuiq; sede inibi coarctata, & secundum latitudinē incrassata cernitur. Ceruicis tamen^h longitudo seu interuallum, quod à superiori corporis parte ad inferiorem metior, admodum ceruicis crassitiem superat, quæ ab anteriori parte in posteriorē pertinet. Ceruix insignius adhuc extrorsum ducta, dilatatur, & ut ipsa oblonga est, ita etiam oblongum efformatⁱ sinum, inferiori parte circulari circumferentia terminatum, superiori autem parte in acutum magis exporrectum. Atque id propter^j impressionem accidit, hinc internæ ceruicis sedi factam, tendinis eius^k musculi ducendi gratia, qui intrò antrorsumq; brachium circumuertit. Præterea sinus ceruicisq; scapulæ^l superior pars, in hoc procerius extuberrat, quò aptius hinc^m duo ualidissima huius articuli pronascerentur ligamenta, & ⁿ externum quoque caput eius musculi commodè hinc principium duceret, qui cubitum flectentium anterior censebitur. Hic scapulæ sinus cartilagine reliquorū articuli sinuum modo incrustatus, non admodum altè cælatur. neque etiam huius longitudo & amplitudo respondent, humeri^o capitis quod ipsi inarticulatur, lōgitudini & amplitudini. Quod sanè in hoc articulo Natura peculiariter machinatur. aliorum enim articulorum capita sinibus exquisitè congruunt, nisi fortè^p femoris cum^p tibia articulum excipere uelis, in quo tibie sinus femoris capitibus non respōdere, ac priuatim in illo quoq; articulo Naturā aliquid moliri intelliges. Quæ igitur parte genu ab aliorū articulorū ratione differt, suo dicemus loco: nunc uerò humeri articulus uenit explicandus. Quum ergo Natura hunc scapulæ sinum satis leuiter, laxorum motuum gratia, exculpisset, illumq; non ualde amplum longumq; creauisset (præter peculiaria huius articuli

Basis appendices.

Basis cartilago.

Superioris inferiorisq; laterum differentia.

Tres scapulæ anguli, ac laterum plenior descriptio.

Ceruix scapulæ.

Sinus humero excipiendo paratus.

Cartilago scapulae sinum frequenter augēs.

ligamenta, quæ in secundo libro unâ cum musculis prosequemur, & quosdâ scapulæ processus, quos articulum à luxationibus prohibere tum audies, ubi illos quoque iam in sermonis contextu pertractabimus) cartilaginem quandam ligamenti substantiæ compotem in hoc sinu crebrò effingit, qua sinum auget, profundiorēq; efficit, nimiamq; luxandi promptitudinem multum corrigit, parum interim laxissimos differentesq; brachij motus, quibus maximè indigemus, præpediens. In ambitu enim huius sinus ea cartilago ponitur, scapulæ interim, neque etiam humero connata, sed tantum ligamenti articulum in orbem amplexantibus adnexa. Huius cartilaginis externa sedes crassa est, sensimq; ad sinus centrum ducta gracilescit, ac multò ante centrum desinit: quasi quis sinum in ambitu anulo augetet, cuius orbis instar trianguli esset contusus: & istius trianguli externum latus, exteriorem articuli ambitum respiceret: inferius uerò latus sinui incumberet: superius autem humeri caput spectaret, adeò ut duo anguli ambitum articuli contingerent, tertius interim sinus centrum spectaret. Cæterum hanc Naturæ industriam spectatu iucundissimâ, etiam si hominis corpus ad manû non sit, in quadrupedum & auium genibus promptè intueberis, quum pari quoque artificio hîc tibiæ ossis sinus perpetuò augeantur. Huius itaq; cartilaginis quotiescunque reperitur, beneficio, sinus scapulæ profundior euadit, & interim cartilago impetui compressioniq; ossium facile cedit, laxum huius articuli motum minimè cohibēs.

Scapulæ processus.

Interior processus.

Processus uerò quibus præsentî articulo Natura prospexit, duo censentur: quorum alter^a superior est, summusq; humerus nobis uocabitur, atque mox à scapulæ spina pronasce docebatur. alter uerò est interior ac minor, qui ampla radice ex superiori sede ceruicis scapulæ principium ducit, & hîc utcunque latus antrorsum fertur, anteriori articuli parti uersus superiora magis oppositus. Inferior huius processus pars exacte læuis est, ac instar antiquæ Græcorû literæ C cauus, ob idq; etiam *στυμοδόν* appellatus. Alij uerò à quadam imagine, quam obtinet cum altera anchoræ parte, quæ terræ infigitur, *ἀγκυροδόν* hunc processum uocant. Nonnulli rursus, quòd corniculæ rostri modo inclinatur, *κορυμμοδόν* appellauere. Atque hæc nomina Galeni interpretes subinde luserunt, ad hoc etiam opitulante Galeno, sibi in nominibus hîc parum constanti. quum is enim alibi penè semper hunc processum *ἀγκυροδόν* uocat, in decimo tertio tamen de Partium usu, eo nomine illum scapulæ processum donauit, quem summum humerum uocamus. Verum huius processus nominum mentio, postmodum necessariò incidet. nunc autem quod de interiori processu adhuc enarrandum superest, percurramus. Inferna itaque sede is læuis est, in superiori autē parte asper & inæqualis. in elatissima enim sui principij sede crassior uisitur, & inæquali tubere prominet, cui clauicula ferè incumbit ac innititur, ualideq; alligatur. In apice uerò, ubi appendicem exigit, etiam asper est, ut aptius^v internum anterioris cubiti flectentium musculi caput ab ipso exoriretur, & ligamentum humeri articulo peculiare hîc principium obtineret. Inter apicem uerò & tuberculum, quo clauicula penè suffulcitur, hæc superior processus sedes etiam aspera existit, quòd felicius^a ligamentum educeretur, hîc ad superiorem scapulæ processum pertinens. Quemadmodum uerò hæc superior processus sedes in hoc aspera est, ut opportunè ligamēta illa & hoc musculi caput produceret: ita quoq; scapulæ ceruix orbiculatim foraminula quædam non peruia commonstrat, ex quibus commoda ualidorum huius articuli ligamentorum pendet origo.

Nunc tempestiuum quoque erit, alterum scapulæ processum sermone persequi: cuius naturam optimè inueniemus, anteriorem posterioremq; scapulæ sedes non oscitanter spectantes. Scapula itaque^b anteriori sede sima cauaq; est, ut commodè costarû conuexis respondeat, ac super ipsas stabilita debite moueatur. deinde etiam, ut opportuna hîc sedes aptaretur^c musculo, qui totam anteriorem scapulæ sedem implens, intrò antrorsumq; brachium circumuertit. Caua hæc scapulæ sedes læuis quidem est, sed non omni ex parte æqualis. nam iuxta inferiorem ipsius sedem^d tubercula quædâ exigit, modicè instar obliquioris lineæ extuberantia, quæ quodammodo sinus constituunt, ac si thoracis costæ, quibus scapula hac sede incumbit, temporis successu in scapulâ comprimerentur, ipsaq; scapula illarû effigiem cedendo assumeret. Hi enim sinus tuberaq; in senibus apparent magis, quàm aut in pueris, aut iuuenibus, quibus omnia minus conspicuè protuberant, excrescuntq;. Ad hæc, scapulæ anterior sedes^e ad radicem elatioris anguli basis scapulæ nonnihil protuberat, aptamq; regionem efficit, cui^f alter scapulâ attollentium musculorum ualide insertatur. Præterea scapulæ anterior sedes quâ summi humeri radii scapulæ uel spinæ respōdet, insignius quàm alibi excauatur, non secus quàm si Natura quum scapulæ spinam fingeret, cauam scapulæ partē in posteriora extraxisset, ac ita ipsius cauitatem auxisset: quemadmodū in fictilibus uasis, & ijs quoq; quæ ex massa uel cera parantur, indies fieri cernimus. Quando enim ollæ ansam externa ipsius sede locatam conspiciamus, plerunque caua ollæ pars ansæ respondēs, sinuata magis, ac ueluti ab ansâ extrorsum tracta cernitur, idq; in illis sedibus

Anterior seu costis proxima scapulæ sedes.

q1, 2, 3 fig.

K.

r 2 fi. G, H.

s 1, 2 fig. E.

F.

t 1, 2 fig. F.

u 1, 2 fi. F.

x 1, 2 fi. E.

y 6 muscu.

tab. n.

z 1 fig. f.

a 5 muscu.

tab. c.

b 1 figura.

c 7 muscu.

tab. r. 8 ta.

H.

d 1 fig. M.

M, M.

e 1 figur. 7.

f 9 muscu.

tab. r. 8 ta.

g Hic cōfer

N, O fi. pri

mæ cum H

et G fig. 2.

sedibus potissimum obseruatur, ubi crassiores anse partes consistunt. Vnde etiam illae scapulae
cauitatis sedes insigniùs impressae cauataeque conspiciuntur, quae extremis spinæ respondent.
mox enim spinam in tota ipsius exortus sede ad extrema impensius crassam, quam in medio
ductu, uideri audies. Inter reliquas interim scapulae cauitatis sedes, ea maximè caua se exhibet,
quae iuxta scapulae ceruicem existit, præter id enim quod in posteriora à scapulae spina, extra-
cta colligitur, hinc etiam scapulae^h collum impense crassum & introrsum protuberans, hanc ca-
uitatem insigniter auget: quemadmodum & inferior scapulae costa, quae quum crassa sit, huius
quoque sedis cauitatem profundiorē reddit.^k Posterior scapulae sedes insigni^l processu, ue-
luti spina, adornata, si obiter uideatur, gibba est, quod hanc figuram iniurijs citra noxam feren-
dis accommodatiorem esse Natura haud ignorauerit. Verum si pressius hoc scapulae gibbum
contemplemur, duæ in ipso sedes cauitatesque nobis occurrent, musculis suscipiendis aptissi-
mae.^m Vna enim sub scapulae spina inter spinæ inferiorē sedem, & extuberantiore crassioremque
inferioris scapulae costae partem consistit.ⁿ Altera uerò inter superiorem scapulae spinæ sedem,
& superiorē scapulae costam habetur. Atque hanc quidem^o musculus occupat, quem brachium
circumducentiū tertium statuemus. Inferior cauitas^p musculo oppletur, qui brachiū circum-
uertentiū secundus numerabitur. Porro etsi hæc externa posterior ue scapulae sedes, cum scapu-
lae spinæ, tum ipsius costarum gratia, duas has cauitates ostendat, nihilominus uniuersa (quo-
niam extuberare cernitur) scapulae dorsum à ueteribus nuncupata est, similitudinem à uero
hominis dorso sumentibus. Processum autem qui ab hoc scapulae dorso enascitur, spinam uo-
carunt, ad uertebrae posteriorum processum siue spinarum imaginem, quae quum uete-
ribus rectissimè sint instituta, ab his nominibus nunquam ne latum quidem unguem declina-
turus, externam scapulae sedem Dorsum nuncupabo: summi uerò humeri radicē, Spinam sca-
pulae. Dicitur autem mihi summus humerus, quod ueteribus ἀνωμυον nuncupabatur: quan-
quam non adeò promptum sit diuinare, quid quisque hac uoce intellexerit, neque etiam uel diuī
Hippocratis causa nomen id negligendum uenit, aut etiam de ipso obiter statuendū est, si mo-
do à Syropis & Iulepis interdū animum auocantes, diuina Hippocratis de ossium fracturis &
luxationibus, idque genus malis oracula, etiam ad nos pertinere duxerimus. Quare etiam non
ab re fuerit, scapulae spinam summumque humerum, uti nobis uisum erit describere, atque tunc
demum Hippocratis & Galeni sententiam sermoni adijcere. Ex tota igitur propemodū ampli-
tudine dorfi scapulae^q ualidus crassusque enascitur processus, non quidem è dorfi^r longitudinis
medio, uerū non procul à superiori ipsius sede. Processus iste (qui scapulae spina est) sensim ma-
gis magisque augetur, ac tandem à scapulae dorso iuxta scapulae ceruicem abscedēs, teresque quo-
dammodo apparēs, modicè antrorsum fertur, insigniter supra scapulae cū humero articulū^s la-
tescēs, & ampla donatus appendice, quae in pueris pluribus ossiculis cōformatur, cartilaginis
interuentu coalescētibus. Huius processus pars omnis anterior, & posterior, & humilior, leuis
minimeque aspera cernitur: superior autē ipsius sedes neutiquā laeuis est, sed rudis, & foraminu-
lis quibuscūque non peruijs decorata. idque potissimū in superiori sui appendicis sede, & ubi non
procul à scapulae basi, processus iste crassior apparet, ac subinde appendicē quoque nanciscitur.
Neque hæc sanè frustra machinatur Natura. musculorum enim gratia has molitur asperitates,
quibus maximus scapulā sursum ducens musculus implantatur. Dein processus iste ijs quibus
dixi locis asperior ideo euasit, quod musculus ille latiore ualidioremque insertionem inibi ten-
tat. Quinetiam hæc asperitas, principium præbet dignissimo brachium mouenti musculo:
quem, quod brachij cum scapula articulum eleganter integit, ἐπωμίδα dissectionum periti uo-
carunt. In anteriori processus sede^t sinus adeò leuiter & superficietenus insculpitur, ut num ca-
pitulum, num sinus sit, ægrè dijudices. Huic sinui modicè prominēs clauiculæ^u tuberculū ar-
ticularur, ualidissimisque ligamētis cōstringitur. Interueniēte hinc plerumque peculiari cartilagine,
illi prorsus simili quam in maxillæ inferioris cum superiori articulis obseruari retulimus. quae
scilicet utrinque quā ossa spectat, laeuis & lubrica sit, & tantū ligamentis articulum continentibus
affirmata & continua. Dicti modò processus pars, quae à scapulae dorso enascitur, ac (ut sic di-
cam) dorso proxima est, Spina opportunè nominatur, quae etiā in canibus, ouibus & equis
cernitur.^c Pars autē quae à scapula antrorsum uersus exteriora abscedit, ac sensim dilatescit, inque
solis hominibus, simijs, sciuris, et si quod aliud animal clauicula donatur, obseruari potest,
summum humerum appellabimus: id nomen à Græcis mutuantes, qui procul dubio brachij
ossis cum scapulis articulum ὤμων nuncuparunt. ac proinde ἀνωμυον hanc processus partem
uocarunt, quod articuli superiorem cōstituat sedem, ac ueluti illius tutissimū habeatur propu-
gnaculum. Atque ita sanè ab Hippocrate perpetuò accipitur, cum aliàs sæpius, tum præcipuè
quando humerum (quem ipse βραχίονα uocat) nequaquam ad superiora (impediēte nimirum

Posterior sca-
pulae sedes, seu
dorsum.

Summus huius
merus seu ἀνω-
μυον, cuius iam
diligens insti-
tuenda est des-
criptio.

Peculiaris
cartilago cla-
uiculæ cū su-
periori sca-
pulae processu
articuli.



*Tertium os à
Galeno in sum-
mi humerici
clauicula ne-
xu recenseri.*

summo humero) luxari docet, & quum de effracto summo humero pertractat. Quanquam & hîc Galenus etiâ in libro de Ossibus audiendus est, qui cōpaginem¹ præsents processus cum clauicula ἀκρώμιον nōnullis dissectionis professoribus uocari asserit. Vbi etiâ subiungit, hîc quosdam tertium os præter processum hunc, & clauiculam in solis hominibus ponere, idq̃ acromion & λατακλῆδα uocare. Tertium hoc os Galenus decimo tertio de Partium usu in hominibus recenset, & simias illo priuat; quemadmodum & in libris de Administrandis sectionibus, & in suis in Hippocratis de Articulis librum commentarijs. Scribit enim, præter hunc scapulæ superiorem processum, & clauiculam, tertium quoddam os esse cartilagineum, quod clauiculæ ad illum scapulæ processum cōtextui insternitur, & à quo membranæ ligamētāq̃ pronascuntur, quorum beneficio contextus iste ualidiùs cōmittitur. Galenus in quinto de Administrandis cōsectionibus libro huiusmodi os Hippocrati ἀκρώμιον uocari ait, ipseq̃ eo nomine ibidem id appellat, quemadmodū in libro de Ossibus testabatur, quosdā hîc tertiu quoddam os collocare, idq̃ ab illis ἀκρώμιον nuncupari. quum interim Galenus subinde in libris de Partium usu, & in libris de Administrandis sectionibus, ac ferè in omnibus in Hippocratem commentarijs, hunc scapulæ processum ἀκρώμιον uocitauerit, aut saltem huius scapulæ processus cum clauicula compagem. adeò ut non parum Galeni inconstantiam hîc admirer, multoq̃ magis tantisper admiraturus sim, dum in homine tertiu id cartilagineosum os mihi occurrat. Neutriquam enim arbitror Galenū, peculiarem superiùs cōmemoratam huius articuli cartilaginem ossis loco habere, quū eius generis cartilagines ad ligamēti naturam à uera cartilagine plurimū recedāt, neq̃ ossæ ullo pacto sint: quinetiam quum hæc in simia perinde ac in homine reperitur. Et si fortè ossis loco habenda esset, præterquàm quod Galenus aliter huius meminisset, & articulū interuenire, non autē ipsi insterni scripssisset, etiâ reprehensione nō careret, quod peculiare os in clauiculæ cum pectoris ossē⁸ articulo, & rursus in inferioris maxillæ ad superiorem articulis & in genu nō statuisset, quū interim illic huius generis cartilagines manifestius quàm hîc in summo humero appareant, etiā si illæ Galeno incognitæ & prætermittæ uideātur. Adeò ut adhuc multo satius sit, peculiare hanc cartilaginem (et si ossæ esset) ossis nomine nō haberi, quàm simul tot ossa Galenū latuisse, clam innuere. Hactenus itaq̃ mihi hîc nunquā, quantūuis diligēter Hippocratis nomine secanti, tertiu os animaduertere licuit. Satisq̃ perspectū habeo, Galenū id nunquam etiam uidisse: & si ausim eò usq̃ in ipsum impietatis progredi, affirmarem illum huiusmodi os cōfinxisse à quadā cum^k ossiū, quæ sesami semen referūt, similitudine, quæ aliorū ossium articulis contextibusq̃ ita apponi audies, quemadmodū cartilagineū os Galenus hîc consistere prodidit. Lubens igitur cōcessero, tertiu id os me in homine non magis quàm in simia reperisse, ut neq̃ qui mihi secanti adfuere ullus, utcunq̃ etiā ut à singulis id obseruaretur, sedulo semper monuerim. Ac proinde si quis id os, aut simile quodpiam præter¹ processum scapulæ &^m clauiculā mihi ostēderit, fidem do in humeri cum scapula articulo, me aliud eiusmodi quid longè dignius atq̃ in artis operibus egregiè perpendendū, ocyus cōmonstraturum. quod uel sola hac occasione sciens nunc prætereo. Quamuis interim neminē ignorare uelim, nullum unquam animal, præter hominē, simiā, & sciurum, & si rectè memini, glirem mihi occurrisse, hoc superiori scapulæ donatū processu: adeò ut uix ambigē, eum qui primus hominē duntaxat ἀκρώμιον donari scripsit, intellexisse solū hominē hunc processum obtinere: quando illum in canibus, ouibus, capris, leporibus (qui etiā interiorē scapulæ processum separatim nanciscuntur) & alijs quæ mensæ apponi solēt quadrupedibus, nullū superiorē scapulæ processum (at duntaxat spinā) spectaret, parū de simijs cum Galeno sollicitus. Liceat igitur superiorē hunc scapulæ processum nobis tantisper Summū Humerū, aut Superiorē processum, dum uerior occurrat sentētia, appellare. Porro cuius usus gratia is homini & alijs animalibus clauiculas obtinētibus detur, tum demū melius explicabimus, ubi clauicularū historiā aggrediemur. Præter hoc enim quod ad superiora humeri luxationē is processus prohibeat, & tutissimū humeri articulo propugnaculū sit, & quod musculorū insertioni & exortui elegāter famuletur, in hoc potissimum iuuat, ut accedēte clauicula humeri articulum à thoracis lateribus & costis quàm lōgissimè remoueat, illumq̃ in eo situ reseruet, quo maximè ad suos motus, quos uarios differentesq̃ admodum molitur, indiget. At hæc in clauicularū descriptionibus resumētur diffusius. iam enim ali quando opportunū erit, scapularū sermoni modum imponere: præcipuè quum aliud enarrandum nihil super sit, nisi fortè perquàm exiguū. cuiusmodi esse posset, basim scapulæ quæ appendicibus decoratur, utcunq̃ fungosam fistulosamq̃ uideri, & nōnulla foramina in scapulæ spinā porrigi, quæ ipsi (quum crassa sit) uenas deducāt, nutrimentum illi suppeditaturas. Cernitur autemⁿ unum subinde in illa amplitudine, quam superior scapulæ costa cum ipsius spina effor-

*Quibus tantū
animalibus su-
perior scapu-
la processus
obtigerit.*

*Summi humeri
usus.*

*f integra
rū Q ad n.*

*g Grandior
pars 4. figu-
re cap. 22.
h fig. mar-
ginis ca. 10.
i 8 fig. ca. 31.*


*k 1 fig. ca.
25 V, V.
l 2 fig. ca.
33 4, 10.*

*l, m integra
rū Q et n.*

n 3 fig. c.

PRIMA VIGESIMI SECVNDI

Capitis figura.



SECVNDI.



TERTIA.



TRIVM QVAE HIC PROPONVNTVR FIGVRARVM ET
ipsarum characterum Index.

PRIMA praesentis Capitis figura dextri lateris claviculam anteriori externaue & superiori sede expressam habet.

Secunda, posteriorem interioremue dextri lateris claviculae faciem, una cum superiori quoque ipsius sede ostendit.

Tertia inferiorem eiusdem lateris claviculae sedem monstrat.

*A*_{1,2,3} Claviculae capitulum, quo ipsa pectoris ossi articulatur.

*B*₁ Capituli huius primus angulus.

*C*_{1,2,3} Secundus capituli angulus.

*D*_{1,2,3} Capituli nuper commemorati tertius angulus. In prima tamen figura, uniuersa triangularis capituli circumscriptio est conspicua literis *B*, *C* & *D*. perinde ac in figura manifestioris doctrinae gratia, indici characteris *D* hic superposita.

*E*_{1,3} In anteriori claviculae sede protuberans linea est directio primi anguli *B* insigniti, notatur.

*F*_{2,3} *F* & *G* in tertia figura, protuberans linea inferioris sedis claviculae indicatur, quam *F* & *G* in secunda figura utcumque etiam ostendunt.

*G*_{2,3} *G* priuatim indicatur asperitas, ad lineam *F* insignitae posteriora apparens.

*H*_{1,2} Claviculae longitudinis medium, quod teres esset, nisi linea *F* inferiori ex parte protuberaret.

*I*_{1,2} Hac sede clavicula ad superiorem scapulae tendens processum dilatescit, superiori quoque sede (quae etiam *I* ad *K* usque notatur) gibba est.

*K*₁ Asperitas in ea claviculae sede conspicua, ubi haec anteriori sui parte maxime caua cernitur.

L, *M*₃ Latiusculae sedis claviculae inferior pars leuiter sinuata, & aspera, non autem superioris partis modo gibba.

*N*₃ Hac sede clavicula etiam aspera est, perinde ac iuxta *M*, ex qua ligamentum ad internum scapulae processum fertur.

*O*_{2,3} Claviculae sedes maxime retrorsum introrsumue protuberans, & huius sedis peculiare tuber.

*P*₃ Locus insigniter asper, in inferiori claviculae sede conspicuus, qua superiori scapulae processui coarticulatur.

*Q*_{1,2,3} In tertia figura *Q* tuberculum insignitur, quo clavicula superiori scapulae processui committitur. In prima uero figura & secunda *Q* sedes indicatur, qua id tuberculum consistit.

HANC figuram integrum erit praesentis Capitis quartam constituere, in qua dextri lateris pars *R* insignita cartilaginem exprimit, claviculae cum summo humero articuli peculiarem. Altera autem pars *S* indicata, cartilago est peculiaris claviculae cum pectoris osse articuli.



Clauicularum
numerus.

Earundem ad
pectoris os ar-
ticulatio.



Peculiaris
cartilago ar-
ticularis
clauiculae cū
pectoris osse.

Mira clau-
iculæ curuitas.

Curuitatis
usus.

Humerali arti-
culus cur à
costis remoue-
atur, & clau-
iculæ ac summi
humeri usus.

N VTRISQVE lateribus clauiculæ^a (quæ Græcis κλέδης, Latinis ue-
rò etiam furculæ & iugula nominantur) singulæ cōsistunt, pectoris ossi &
summo humero seu superiori scapulæ processui coarctatæ. Pectoris ossi in
illis articulantur^b sinibus, quos in primi ossis summæ sedis lateribus excu-
ptos diximus, ac quemadmodum sinus illi oblongi sunt, ab anteriori-
busq; partibus deorsum in posteriora ducti, & antica sede quàm postica
latiores, internoq; latere altiores quàm externo cernuntur, ita quoque se
habent clauicularum^c capita pectoris ossi cōnexa. Hæc enim sinuum modo oblonga sunt, ac
depressa: et si quis accuratius eorum circumscriptionem animaduerneret, illam quodammo-
do triangulam iudicaret.^d Vnus enim angulus in anteriori capitis parte ad humiliora consi-
stit, utcunque obtusus.^e Secundus etiam obtusus est, in superiori capitis parte nonnihil uer-
sus posteriora conspicuus.^f Tertius acutior longiorq; est, in posteriori sede repositus, deor-
sumq; declinans. Porro ut præsentis anguli obtusi sunt, ita etiam trianguli lineæ inæquales,
extrorsumq; obliquatæ occurrunt.^g Illa enim quæ à primo angulo ad secundum ducitur, bre-
uissima est: à secundo autem angulo ad tertium^h procedens, multò longior uisitur.ⁱ quæ ue-
rò à primo ad tertium fertur, omnium longissima curuaq; est. Atque ita se habet clauiculæ ca-
pitis circumferentia, quod multa cartilagine incrustatur, læueq; est: cartilagine tamen unà
cum tenuissima appendice effracta, caput asperum ac inæquale cernitur. Verum et si caput car-
tilagine non minus quàm & pectoris ossis sinus abundet, nihilominus tamen Natura hîc
cartilaginem effinxit, qualem priuatim in inferioris maxillæ ad superiorem articulis reponi
commemorauimus. Inter pectoris enim ossis sinum, clauiculæq; caput, cartilago quædam
adeò ampla interuenit, atque capitis & sinus est amplitudo. Hæc tenuis undecunque est, ac
æqua omni ex parte constat crassitie, & quæ sinum respicit, admodum læuis est, & unctuofo
humore perfusa, sinuiq; seu pectoris ossi nusquam connata. Item quæ cartilago clauiculæ con-
tingit caput, pariter quoque læuis & lubrica est, capiti interim non cōnnata, sed tantum liga-
mentis articulum in orbem amplexantibus. adeò, ut & hæc cartilago non minus triangula sit,
quàm clauiculæ caput pectoris ossi articulatam. Clauicula ab hoc cum pectoris osse articulo,
non rectò tramite ad^k alterum ipsius porrigitur articulum, quo scapulæ superiori processui
connectitur.^l A pectoris enim osse procedens, extrorsum sensim curuatur, & anteriori parte
gibba, posteriori uerò concaua efficitur.^m Verum ilico post medium ipsius longitudinis con-
trario ductu procedit. introrsum nanque curuatur, & gibba fit, anteriori autem sede concaua
uisitur: in anteriora insigniter illic prominens, ubi superiori scapulæ processui proxima est:
adeò ut bis gibba, bisq; caua reddatur. Pars enim ipsius pectoris ossi contermina, & πρὸς τοῦ στήθους
dicta, retrorsum, seu ad thoracis interiora magis pertinet. quæ autem superiori scapulæ arti-
culatur processui, ac ἐπὶ τοῦ ὤμου nuncupatur, antrorsum uergit, & ab interna thoracis sede extror-
sum remouetur, clauicula interim in medio ductu etiam obliquata. est itaque gibba anteriori
sui parte, in anteriori pectoris sede non procul ab ipsius cum pectoris osse articulo, cauaq; est
parte sua interna. non procul uerò à summo humero anteriori parte insigniter breuiq; flexu
caua cernitur: posteriori autem parte, gibba & conuexa. Atque ut res sedulo propter crebras
clauicularum luxationes fracturasq; expendenda breuiter dicatur, clauiculæ ductus huic no-
stro / respōdet, præcipue si id in medio ductu paulo magis maiusculi S ritu in hunc modum
obliquari fingeremus. Neque horum ullum temere & frustra à rerum Opifice factum est. ubi
enim clauicula iugulum spectat, meritò posteriori seu interiori parte caua est, quum hæc aspe-
ram arteriam, stomachum cum sexti paris neruorum cerebri neruis, & imprimis insignes ner-
uorum series à dorsali medulla axillam petens, ferri deberent. quibus potissimum neruis cla-
uicula uiam exporrigit, & propugnaculi etiam loco præfigitur. Quia uerò à iugulo, aut po-
tius à suæ longitudinis medio clauicula in posteriora porrigitur, neque alicuius usus gratia
hæc in anteriori sede gibba esse debuit, necessariò rursus iuxta superiorem scapulæ processum
antrorsum uergit, quousque processus illius^o partem contingat, cui aptè coarticulari possit.
Tantum autem hîc antrorsum porrigitur, quantum retrorsum abscesserat ipsius^p gibba par-
te in illius posteriori sede, quæ non procul à summo humero distat. Si enim clauicula à suæ
longitudinis medio duntaxat in posteriora tenderet, ad colli latera prorepens, neque elatiori
scapulæ processus apici articuletur, nihil profectò obstaret, totam scapulam clauiculæ be-
neficio non firmatam, super thoracem cadere, thoracisq; lateri proximè applicari,^q articu-
lumq; humeri costis uicinissimum fieri, hacq; occasione quamplurimos brachij motus præ-
pediri. Brachium nanque ob id potissimum in homine & simia atque alijs quæ clauiculis do-
nantur animalibus, tam uarijs differentibusq; motibus duci potest, quod ipsius cum scapula
arti-

a integra-
rum Q ad
O & A.

b 7 fig. ca.
19 r.

c 1, 2, 3 fi. A.

d 1 fig. B.

e 1, 2, 3 fi. C.

f 1, 2, 3 fig.

D.

g 1 fig. à B

ad C.

h 1, 2, 3 fig.

à C. ad D.

i 1 fig. à B

ad D.

k 4 fig. S.

l ad Q 1, 2,
3 figur.

m 1, 2 fig.

ab A uerius

H.

n 1, 2 fig. ab

H uerius

Q.

Hæc orga-

na ferè si-

mul osten-

dit ultima

fi. lib. 3 de

in ultima

quarti.

o 1 fig. cap.

21 L.

p 2, 3 fi. O.

q Hæc pe-

tes ab inte-

gris ubi ar-

tculus ex

R cum S cō

factus à co

stis remoue-

tur, pro-

pter nexū

Q ad A.

articulus à thoracis latere plurimum distet. Si enim articulus ille thoracis costas contingeret, uel quauis ratione ipsis proximè (quemadmodum in quadrupedibus) locaretur, ipsas manuum circulationes & iactationes ad pectus, dorsum, collum, & ilia nequaquam moliremur: quemadmodum accidere nouimus, quum luxatus humerus in costas procidit, uel scapula instar alæ ob effractam clauiculam dependet. Ne igitur adeò necessarijs destitueremur munijs, Natura humeri articulum à thorace plurimum distare uoluit. quod sanè præstitit superiori scapulæ processu, qui ita producit, ut clauiculæ beneficio à pectore detrusus, sustentetur ac stabiliatur, ipseq; articulus hac occasione procul à thorace disiungatur. Articulatur uerò clauicula huic processui minimè extuberanti^r tuberculo latiori, quàm longiori, & nonnihil obliquo: talisq; hîc confurgit articulatio, ut quodnam os suscipiat suscipiatur ue, dijudicare uix queas. fit enim hîc ea articuli species, quam Græcorum ueteribus *ἐξὸς ὀστέου* uocari diximus. Clauiculæ^s pars quæ superiori scapulæ processui connectitur, latiuscula est, quemadmodum & processus quoque latus ampliusq; cernitur. præterea hæc clauiculæ pars, ut & illa, quæ pectoris ossi committitur, intus fistulosa magisq; rara est, quàm reliqua clauiculæ portio, quod uidelicet hæc partes etiam crassiores spissioresque sint: & ossa intus tanto semper fungosiora, quanto crassiora & ampliora cernantur. Ipsa enim clauicula in suæ longitudinis medio solidissima est, quod etiam hîc sit tenuissima, quodammodoq; teres, non enim prorsus teres est. In humiliori nanque ipsius parte ueluti in^u lineam protuberat, quæ incipit non procul à clauiculæ capite, quod pectori articulatur, iuxta medium scilicet posterioris & anterioris eius capitis angulorum. Pertingit autem hæc linea paululum ultra clauiculæ longitudinis medium, in hoc parata, ut^x musculus thoracem mouentium primus ab ipsa principium duceret. Iuxta huius lineæ principium propter caput clauiculæ^y asperitas sinuosa conspicitur, unde ualidum pronascitur ligamentum, clauiculam pectoris ossi illic colligans, qua ipsi primæ thoracis costæ cartilago connascitur. Quinetiam ad aliud huius lineæ extremum, altera occurrit^a asperitas, & ueluti asper quidam sinus, quo clauicula^b tuberculo radiciq; interioris scapulæ processus penè incumbit, ac à quo ligamentum promitur, clauiculam illi tuberculo pertinaciter colligans. Porro inferior hæc clauiculæ sedes, ubi linea illa desinit, clauiculaq;^c ampla uisitur, sinuosa fit, & aspera, idq; potissimum iuxta conuexum clauiculæ ad superiorem scapulæ processum, ubi ligamenta articulū hunc continentia ualidiora quàm superiori sede enascuntur. Superior uerò totius clauiculæ regio læuis omnino est, præterquàm iuxta ipsius articulos, ubi ligamentorum producendorum occasione, quemadmodum & musculorum gratia nonnihil aspera est. A clauiculæ enim parte superiori iuxta pectoris os^d musculus ille enascitur, qui etiam à pectoris osse pronatus, in^e mamillarē capitis processum implantatur, capitisq; motorum decimus tertius, seu septimi paris alter numerabitur. Superiori uerò clauiculæ parti scapulæ superiori commissæ processui^f musculus ille inseritur, qui scapulam sursum ducentium primus recensetur. In anteriori clauiculæ parte ad radicem primi ipsius capitis anguli, linea quoque protuberat, ante medium longitudinis clauiculæ desinens, à qua non minima pars^h musculi brachium pectori adducentis principium ducit. Ad hæc, in anteriori clauiculæ sede, ubi retrorsum inflectitur, & ubi non procul ab ipsius cum superiori scapulæ processu articulatione caua uisitur, etiamⁱ asperitas notatu digna consistit^k musculo brachium attolenti parata, cuius principij magna pars hinc pronascitur. In posteriori clauiculæ sede nihil, quod non dictum sit, inæquale occurrit, præter quoddam^l tuberculum hîc protuberans ubi clauicula inibi maxime gibba est, idq; tuberculum ueluti illius gibbæ sedis angulum constituit, ligamentumq; ad interiorem scapulæ processum educit. Præter hæc in clauicula uix quicquam notandum est, nisi fortassis adhuc sermoni foraminula quædam nō prorsus peruia adijci uelis, quæ interdū duo, interdū tria in maxime solida clauiculæ parte, & potissimum in posteriori ipsius sede uidentur, in hoc parata, ut uenulas transmittant clauiculā enutrientes.

Clauiculæ ad
summum hume-
rum nexus.

Clauiculæ sub
stātia, tubera,
asperitates, læ-
uitates, & fo-
ramina.

DE HUMERO SEV BRACHII

osse. Caput XXIII.

CHARACTERVM DVARVM PRÆSENTIS CAPITIS
figurarum (quas sequens pagina proponet) Index.

A, B, C, D, E, F, G, H Horum characterum alij in prima figura, alij uerò in secūda obuij sunt, indicantes humeri appendicem, uti modo subiiciam, ualde uariam.

A, B, C In ambabus figuris humeri caput circumscribitur, quod scapulæ inarticulatur.

D, E Vtrique characteres in prima uisuntur figura, externum caput appendicis humeri notantes,

cui ligamenta articuli inseruntur. Verum D externi huius capitis anterius caput indicat. E uero posterius, quod in secunda figura magis quam in prima est conspicuum.
 F, G Duo isti characteres in prima, & G in secunda, sinum indicant patulum, qui interius caput ab exteriori dirimit. Reliquum characterum Indicem ponendis modo figuris subiiciemus.

**PRIMA VI
GESIMITER**
 tij Capitis figura, dex-
 tri humeri anteriorem
 faciem referens.



SECUNDA
 HVIVS CAPI-
 tis figura, dextri hume-
 ri posteriorem faciem
 proponens.



- H, I 1 Sinus externum caput in duo diuidens, ac externo capiti anterioris musculi cubitū flectentium paratus. Ac H quidē ipsius sedē in appendice notat, I uero eā quæ in humeri ceruice cōsistit.
 K, L, M 1, 2 Humeri rotula, ad quam ulna flectitur & extenditur. ac K quidem sinum rotulæ notat, L uero & M sinus latera. & L rursus internum latus, M autem externum.
 N 1 Sinus ad rotulæ superiorem partem in humeri anteriori sede incisus.
 O 2 Sinus ad superiorem rotulæ partem in humeri posteriori sede admodum altē excavatus.
 P 1, 2 Humeri caput seu tuberculum, cui radius articulatur. In prima figura huius Capitis pars ap-
 paret, quæ cartilagine incrustatur. In secunda uero ea pars, cui radius non committitur, uerū
 musculorum exortui eleganter subseruit.
 Q 1, 2 Hac sede humerus ad magnum ipsius longitudinis interuallum instar acutæ lineæ protuberat.
 R 2 Sinus in hoc externo humeri capite quartis manum petentium nerui gratia exculptus.
 S 1, 2 Internum humeri tuberculum.
 T 1 Sinus anterioris tuberculi, tertio neruo manum adeuntium paratus.
 V 2 Sinus interioris tuberculi, in quo quintus brachium petens neruus uehitur.
 X, Y, Z 2 Posterior humeri sedes. ac X quidem notat partem superiorem, quæ sinuata est: Z ue-
 rò inferiorem, quæ gibba cernitur. Y impressionem indicat, ad quam quartus neruus brachi-
 um accedens reuoluitur.
 a, b, c, d 1 Anterior sedes humeri, in qua b insinuat prominentem extuberantem ue eius partem: a uero &
 c locum, qui utrinq; ad hanc protuberantem partem deprimitur. Deinde tres isti characteres si-
 mul notant anterioris humeri sedis inferiorem partem sinuatam: d uero superiorem, quæ gib-
 ba uisitur.
 e 1, 2 Asperitas iuxta externum latus anterioris sedis humeri consistens.
 f 1 Asperitas in anteriori humeri sede conspicua, ad radicem sinus externum caput musculi dedu-
 centis, qui cubitum flectentium anterior recensetur.

a integra-
rum S ad
R, dein
T, V.



Confer hic
integrarū
S cum A,
dein cum Q
& V. Insuper
cum O.

b 1. fi. A, B,
F, H.

c 1, 2 figur.
A, B, C.

d 2 figur. cap.
21 A, B.

e 1 figur. D.
1, 2 figur. E.

f 1 figur. G.
F. 2 figur. G.

g 1 figur. H, I.

h 1 figur. D.

i 1, 2 figur. E.

k 6 mus. ta.
musculus

o notatur.
caput au-

tem m.

l 1 figur. I.

m Quatuor
prioris

ca. sequētis
figuræ.

n 1, 2 figur. K,
L, M.

o 1, 2 figur. L.

p 1, 2 figur. M.

V M E R V S Celso, atque alijs compluribus^a id os uocatur, quod scapulæ & cubito articulatū, Græcis (uti & Latinorum quamplurimis) *βραχίον* nuncupatur. Vt uerò totam ossis & musculorum molem cum nervis, uenis, arterijs, cute, & alijs si quæ brachij constructionem ingrediuntur, ab ipso osse in sermonis contextu distinguamus, quum solius ossis mentio incidet, id Humerum, aut interdum Brachij os appellabimus: quum autem reliquas membri partes unà cum osse indicabimus, Brachij

Humerus.
Brachium.

*Humerū post
femur non esse
omnium ossiū
grandiorem,
uti Gal. in li.
de Ossibus cen
set.*

*Superioris
humeri partis
descriptio.*

*Inferioris hu
meri partis de
scriptio.*

ro

ro proxima, quàm in alio, protuberare citra noxam potest (quod scilicet nullus metus sit, funem à latere quod murum proxime tangit, è rotula elapsurum) ita quoque externum humeri orbitæ latus, non ita atque internum periclitatur. Ad externum enim latus, aliud^q caput constitui mox subiungemus, cui radius articulatur, quodq; muri uice censerì potest, prohibentis ulnam extrorsum à sua orbita luxari. Verùm est & aliud humeri rotulæ cum ueris rotulis discrimen, quod non ad omnem ipsius partem ulna similiter ac funis ad rotulam circum-moueri potest. Quamuis enim in^r superiori mediaq; orbitæ sede, humeri os insigniter sinuat-um sit, longeq; tenuissimum, & squamæ modo pellucidum, tamen nequaquam est peruium, & hoc magni cuiusdam usus gratia. Summus enim rerum Opifex quum ulnam ad hanc hu-meri orbitam flecti & reflecti uoluit, ita sanè rotulam parauit, & ipsi etiam ulnæ^s sinus, tu-bera^q & processus elargitus est, ut cubitum flectere & extendere possimus, & tamen in his motibus robore non destituamur: quod sanè periret, si in superiori rotulæ sede humerus esset peruius, nihilq; esset in quo ulna in extrema extensione firmaretur, sed funiculi modo, citra renixum basimq; & obstaculum obuolueretur. Exculpit itaque Natura in superiori rotulæ huius sede duos insignes sinus, ^t unum quidem anteriori in parte, ^u alterum uerò in postero-ri, qui multo amplior, profundior, & quouis modo insignior est anteriori. Sinus hi quasi squa-ma duntaxat dirempti, ulnæ processus (quos *κορύνες* priuatim uocant) excipiunt. Atque ho-rum anteriorem, quum cubitus flectitur, anterior sinus admittit: quum uerò cubitus exten-ditur, posterior sinus posteriorem ulnæ processum excipit. Sunt enim hi sinus extremæ fle-xionis ac extensionis termini, tanta prouidentia facti, ut cubitum in acutissimū angulum flecti sinant, & uix ultra rectam lineam eundem extendi permittant, quod scilicet nulla prorsus in an-gulum extensione, sicuti sanè flexione, indigeamus. Quia uerò præsentēs sinus in cubiti moti-bus ueluti bases & obstacula sunt, quæ ulnam non ulro ferri sinunt, Hippocrates eos *βαδμίσ-τας* nuncupauit, cui etiam humeri orbita à quadā cardinum imagine *γυγλιμοειδής* appellatur. Cæterum istorum sinuum usum tunc demum accurate intelligemus, quum & ulnæ descri-ptionem sequenti Capite absoluerimus. in præsentia autem inferior humeri pars adhuc est de-scribenda. Ad externum itaq; humeri orbitæ latus, ^x rotundum & oblongum quodammodo habetur caput, quod similiter atq; orbita, cartilagine incrustatum & læue, radij cum humero articulationi subseruit, & in radij superiorem^y sinum subintrat, radiusq; (ut aliàs fusiùs exe-quar) ad id caput in prouum supinumq; mouetur. Deinde capitis longitudo, quam à superio-ri ipsius parte ad inferiorem secundum humeri longitudinem metior, in causa etiam est, quod in cubiti flexione ac extensione, caput id à radij sinu (qui rotundus, non autem oblongus est) haud elabatur aberret ue. atque hac etiam occasione tota capitis pars cartilagine obducta, anteriorem humeri sedem spectat, nihil prorsus in posteriora erectum, quod in nulla cubiti extensione radius posteriorem humeri sedem adeat. Veruntamen ad externum huius capitis latus, humerus insigniter protuberat, montis rupis ue imaginem ostendens, in hoc paratam, ut quamplurimi muscoli hinc opportunè principium ducant. ^z Ab hac enim humeri sede, & acuta linea quæ ab hoc tubere sursum aliquousque secundum externum humeri latus conscen-dit, sex enascuntur muscoli, quorum^a primus is censerì posset, qui cæteris est latior, quiq; inter radium mouentes facile est longissimus, radiumq; in supinum ducit. ^b Secundus sub illo exo-ritur, qui bicorni tendine brachiale extendit. ^c Tertius is est, cuius ope index, medius & anula-ris extenduntur. ^d Quartus, quem præcipuum parui digiti extensionis autorem ponemus. ^e Quintus, qui ulnæ exporrectus, extensionis quoque brachialis opifex est. ^f Sextus, alter ra-dium in supinum agentium numerabitur, cuius etiam portiuncula ab illo humeri tuberculo seriatim ac in fima ex parte educitur. Porro tuber istud quoties musculorum, neruorum, ue-narum, arteriarumq; hanc sedem perreptantium mentio incidet, perpetuò externum humeri tuber seu tuberculum uocabimus. est enim, uti diximus, musculorum producendorum gra-tia paratum, ac in posteriori ipsius sede iuxta^g externum latus orbitæ humeri^h sinum exigit, quoⁱ quartus brachium adeuntium neruus uehitur. Sed ut externum hoc humeri latus protuberat, ita quoque & internum latus musculorum quoq; & neruorum ratione^k insignem acutumq; processum seu tuberculum adipiscitur, nullius articulationis gratia, quemadmodum externum, cui radius articulatur, prominens. Ad^l internum itaq; latus orbitæ humeri proces-sus educitur, ex cuius apice, qui utcunque amplius est, ^m musculus enascitur, qui lato tendine cu-tem internam summæ manus adit. deinde ⁿ duo brachialis flexus autores, insuper ex infima processus huius (quem semper internum humeri tuberculum nuncupabimus) sede portio eius^o musculi oritur, qui inter radium in prouum mouentes, superior habetur. postremò & quorundam digitos flectentium^p musculorum obscura hinc pendet principij portio. Neque etiam

q 1, 2 fig. P.

r 1 fig. N.
2 fig. O.s 1, 5 figur.
24. cap. C.
D, E.t 1 fig. N.
u 2 fig. O.

x 1 fig. P.

y 9 fig. ca.
24 O.z 2 fig. P.
uersus 1 et
2 fig. Q.
quo linea
notatur.
a 12 musc.
tab. 6.
b 11 tab. A.
c 9 tab. z.
d 9 tab. 6.
e 9 tab. A.
f 11 tab. m.g 2 fig. M.
h 2 fig. R.
i 2, 3 fig. cap.
11 lib. 4. 6.
k 1, 2 fig. S.
l 1, 2 fig. L.
m 3 muscu.
tab. n.
n 3 tab. A.
o 7 tab. Q.
p 5 tabul.
6. de in 6 ta.
3.

etiam tuberculum id musculis producendis duntaxat famulatur, uerum etiam duobus cubitum adeuntibus neruis idoneam efformat sedem, ipsisq; propugnaculi loco censendum est. In anteriori enim ipsius sede iuxta humeri orbitam, ^q sinum leuiter exculptum ostendit, quo ^r tertius brachium petentium neruus dirigitur. In posteriori autem ipsius sede, ^s alio sinu, ^t quintum brachij neruum deducit. Porro utcunque internum humeri tuberculum grande sit, & in nobis tactu promptè deprehèdatur, obserueturq; non tamen ob id Galeno credendū est, qui id externo grandius esse prodidit, quum externum multo grandius interiori sit. nam quòd tactui non ita atque internum sese offert, non ipsius quantitas in causa est, uerum radius, cui id articulatur, quicquid quò minus tactu id dijudicari possit, prohibet. In canibus autem, equis, ouibus, & id genus animantibus parum admodum ab hac constructione hæc humeri tubera differunt. quanquam externum humeri caput radio articulatū, tanto minus ab externo humeri orbitæ latere distinguitur, quanto illis radius cum ulna magis connatus, connexusq; est, quàm hominibus quibus admodum manifestò radius in prouum supinumq; agitur, & cum ulna laxè articulatur. Cæterum non ambigo, hîc Aristotelis sectatores, eosq; qui de animalium motu quicquam ipsius suffragio, tum aliàs sæpius, tum maxime in libro de Comuni animalium gressu repetito, freti prodiderunt, è quorum numero Galenus in tertio de Partium usu est, & Plinius, & cum plerisq; alijs noster Erasinus Roterodamus in suo de talorum lusu parum anatomico Dialogo, non mediocriter admiraturos, quod adeò exiguam inter homines & quadrupeda in hac humeri sede, seu humeri cum cubito articulo differentiam statuam: quum interim, ut reliqua mittam, Aristoteles, & quotquot illum sequuntur, diuersum flexum in nobis & quadrupedibus enarrent, quum nos antrorsum, illa autem retrorsum hanc flexionem moliri docent. quod nō solum falsum est, uerumetiā Aristoteles uno osse quadrupeda priuat, ipso nimirum humero, arbitratus illic cubiti cum humero articulum in illis esse, ubi cubitus brachiali iungitur. quem articulum illa animalia nobiscum habent communem, ac ipsa parem nobiscum flexionem moliuntur, ut etiam in cubiti ad humerum articulo. At illorum animalium humerus, quemadmodum & femur eorundem, & auium, pariter Aristotelem latuit, forte quòd in corporis trunco in illis aliter atque in nobis occultetur. Porro hæc aliàs fortassis diffusius prosequuturi, nunc ad reliquas humeri partes redimus, quæ secundum longitudinem teretes quodammodo sunt, uerum posteriori sede magis quàm anteriori ampliores & depressæ. Anterioris enim sedis ^x medium, quodammodo secundum longitudinem protuberat, & ^y utrinque hæc anterior sedes compressa uidetur, latera autem humeri magis, ut & anterioris sedis medium, protuberare quàm deprimi conspiciuntur. Atque hæc omnia accumbentium musculorum ratione, qui, ubi eorum naturam habueris perspectam, os suo uoto eleganter compressisse tibi uidebuntur. Ex abundanti autem, in posteriori humeri sede iuxta ipsius longitudinis medium, ^z quædam apparet compressio, ad quam ^a neruus manum adeuntium quartus ab interno brachij latere per posteriora, in externum latus oblique deorsum repit. Quomodo autem sedes humeri anteriores quidem & exteriores gibbæ, posteriores uerò atque interiores simæ Galeno in libro de Ossibus uisæ fuerint, & cur in secundo libro de Partium usu humerum exterius gibbum esse, interiùs autem simum prodiderit, nō satis assequor. Nam nisi humerum statuerimus rectum esse, gibbus censebitur ^b anteriori superiori q; parte, simus uerò ^c posteriori ac superiori: rursus ^d anteriori inferiori q; simus, ^e posteriori & inferiori gibbus. Deinde, ni fallor, interiùs, & potissimum ad inferiora, gibbus, exterius uero simus. Atque hanc formam musculi potissimū inducunt, cubiti flexionis & extensionis opifices. quamuis interim minor humeri sit obliquitas, quàm quæ in dissensionem uocari debeat. ^f Asperitas autem quæ in anteriori humeri sede uersus exteriora & supra medium ipsius longitudinis consistit, in hoc parata est, ut ualidior musculorum brachium mouentium hîc succederet insertio, & ^g posterior cubitum flectentium musculus hinc idoneum educeret principium. Atque hæc asperitas tanta est, ut in admodum senibus hinc insignis processus enasci conspiciatur, imprimis ad ^h musculi brachium attollentis insertionem paratus. Præter hanc asperitatem, ⁱ alia occurrit iuxta sinum, quo externum musculi caput uehitur, qui cubitum flectentiū anterior est: cuius interioris capitis ^k carnosâ pars, huic asperitati adnasci docebitur. Foramina notatu digna in humero nulla occurrunt, præter pauca iuxta sinuum & capitum supercilia, in hoc forata, ut hinc ligamenta ualidius educerentur, aut eadem hîc implantarentur. Sunt etiam nonnulla, sed rara foramina, in humeri longitudine conspicua, & uenis admittendis potissimum in interno ipsius latere (quâ maxima uasorum fertur series) cælata, atque in amplum

^l sinum medullæ asseruandæ gratia, & ossis læuitatis occasione paratum, pertinentia,

Tum alibi, tū etiam libro de Ossib. Ca. 16.

Aristotelis
et quamplurimorum aliorum
lappus.



Mediarum
humeri partium
descriptio.


PRIMA VI-
 GESIMIQUARTI
 CAPITIS FIGURA.



PRÆSENS figura
 sinistri cubiti duo exprimit ossa, an-
 teriori facie delineata. Quod uerò in
 hac, uti & in subsequentibus ferè hu-
 ius Capitis omnibus figuris, sinistri
 lateris ossa sint obuia, quum tamen ali-
 oquin quodammodo semper dextra po-
 tius, quàm sinistra explanentur, fortui-
 tò & casu accidit, quòd in lignis seu
 formis hic pro sinistris dextra depin-
 xerimus. Quamuis interim in ossibus,
 dextrum ne an sinistrum propona-
 tur, nihil intersit.

SECVN- TER- QVAR- QVIN- SEX-
 DA. TIA. TA. TA. TA.





QVID DECEM FIGVRÆ QVAS SERIATIM PRIMÆ
huius Capitis figuræ subiecimus, denotent, ac omnium characterum
quæ undecim figuris inscribuntur, Index.

SECVNDÆ uigēsimi quarti Capitis figura, utrumque cubiti os, radius nimirum & ulna, exteriori facie proponitur. Tertia, solus radius interna sede. quarta autem radius externa sede delineatur. Quinta internam ulnæ sedem, sexta uerò externam exprimit. Septima dextri radij inferiorem ostendit portionem, cui brachiale inarticulatur: atque hanc partem ueluti ex inferiori, seu aliàs ulnam spectante facie, ita delineauimus, ut sinus in conspicuo sit, quo ulnæ tuberculum caput ue hic iuxta brachiale excipitur. Octaua figura, ut et tres ipsam subsequentes, & sex priores, ad sinistrum cubitum pertinens, inferiorem radij portionem exteriori facie sic delineatam continet, ut sinus oculis pateat, cui brachiale inarticulatur. Nona superiorem radij portiunculam indicat, in qua sinus obseruatur, quem externum humeri caput subintrat. Decima inferiorem ulnæ portiunculam exhibet, partem quæ brachiale spectat ostendens. Undecima superiorem ulnæ partem expressam offert, in qua sinus tuberaq; et processus occurrunt, quibus humeri orbita seu rotula adaptatur.

A, B 1,2 Interuallum his characteribus inclusum, Cubitus uocatur. ac *A* superiorem ipsius notat partem, quæ humero coarctatur: *B* uerò inferiorem, quæ brachiale spectat. Si quæ interim huius sedis horumq; ossium nomina desideras, ea ex præsentis libri calce non inopportune petes.

C 1, 5, 11 Anterior processus ulnæ, humeri sinum subiens, in elatioris humeri rotulæ sedis anteriori parte cælatum. Et *C* quidem in prima figura internam processus notat sedem cartilagine incrustatam. in quinta uerò & undecima externam sedem indicat, asperam & inæqualem.

D 1,2, 5, 11 Posterior ulnæ processus sinum intrans, in humeri posteriori sede ad elatiorem ipsius rotulæ regionem exculptum. Ac *D* in prima quidem, & secunda, & quinta internam processus sedem indicat, in undecima autem externam seu posteriorem.

E 1,2,5 Ulnæ sinus humeri rotulam excipiens. Hunc sinum undecima figura exactius ita notat. *F* & *F*

F, F. tuber quod secundū sinus huius longitudinem fertur. *G* et *G* latus tuberis internum. *H* *H* latus

G, G. tuberis, seu, si mauis, sinus ulnæ, externum. *I* & *K* sinus huius sedes, qua in suis lateribus infi-

H, H. ma ipsius parte à læui circumferentia nonnihil intermittitur, ligamentorumq; producendorum

I, K. gratia aliquantulum asper & modicè foratus cernitur.

L 1,5,11 Processuli magnaq; asperitas in radice anterioris ulnæ processus *C* insigniti conspicua, & quorundam musculorum exortui & insertioni aptam sedem parans.

M 1,2, 3,4,9 Ceruix seu collum radij.

N 1,2, 3,4,9 Radij capitulum, cui sinus insculpitur, quem externum humeri caput ingreditur. Sinum *O.* hunc *O* in nona figura indicat.

P 1,2, 5,6,10 Ulnæ ceruix.

Q in iisdem figuris, ulnæ appendix notatur.

R 1,2, 5,6,10 Ulnæ appendicis processus, quem stylo scriptorio comparamus.

S 10 Sinus appendicis ulnæ, cui cartilago quædam adnectitur, seu potius innascitur, *T* notāda, atq; à radij sinu, quo is brachiale continet, pronata.

T 1,2, 3,4,7,8 Cartilago cuius iam meminimus, quæ ulnæ appendicis maximā portionem à brachiali dirimit. ac *T* quidem in prima & octaua cartiliginis sedem indicat, qua primum à radij appen-

K dicis

dicis sinu x, y & z indicandum pronascitur. In secunda uero partem notat, qua cartilago radij appendici adnascitur. In tertia, cartilaginis sedes indicatur, brachiale respiciens. In quarta cartilaginis sedes ulnae incumbens.

V 2, 6, 10 Sinus in ulnae appendice & ossis ulnae cui appendix adnascitur, sede in hoc paratus, ut alterius brachiale extendentium musculi tendinem deducat.

X, Y, Z Hi tres characteres in sexta, & X ac Z in secunda triangulum circumscribunt, qui in ulna excarnis gibbusque est. Verum Z priuatim trianguli uerticem notat.

a, a 1, 2, 6 Prima protuberans ulnae linea.

b, b 1, 2, 5 Secunda protuberans ulnae linea. Verum β priuatim in prima & quinta figuris huius lineae secundum β. dem insinuat, oblique secundum ceruicem ulnae ductam.

c, c 1, 2, 5 Tertia protuberans ulnae linea.

d 1, 6 Ulna latus prima linea & secunda circumscriptum.

e 2, 6 Ulna latus prima & tertia linea circumscriptum.

f 1, 5 Latus ulnae inter secundam lineam & tertiam consistens.

g, g 2, 6 Linea lateri illi peculiaris, quod prima linea tertiaque continetur.

h, i 1 Duo hi characteres sedem utranque notant, qua radius ulnae coarctatur. ac h quidem sedes indicatur superior, & humero proxima. i uero inferior, & brachiali contermina.

k, k 1 Tota hac sede (eo quod radius arcuatim obliquatur) duo cubiti ossa inuicem debiscunt.

l 5, 11 Sinus ulnae incisus, in quo radij capitulum uoluitur.

m 3, 4, 9 Radij capituli sedes, quae ulnae sinui, l insignito insidet.

n 1, 3 Inferioris radij appendicis interior sedes notatur: in reliquis autem figuris, secunda nimirum, quarta, septima & octaua exterior sedes ostenditur, alijs characteribus ornata.

o 7 Sinus in radij exculptus appendice, in quo ulnae appendix excipitur.

p 5, 10 Protuberans ulnae appendicis pars, radij sinum o indicatum ingrediens.

q 1, 2, 3, 4, 9 Amplius abruptusque radij processus, cui tēdo musculi cubiti flexorii anterioris inseritur.

r, r 1, 2, 3, 4 Acuta radij linea ipsius inferna sede, qua secundum cubiti longitudinem ulna respicit, extuberans.

s, s 1, 3 Internum lineae r prius insignitae latus. t, t 2, 4 Externum lineae r indicatae latus.

u 2, 4 Hac sede radius asper est, ut duo, ex quatuor ipsi peculiaribus musculis, hic ualidius infererentur.

x, y, z 1, 8 Sinus in radij appendice, articulando brachiali incisus. Et z quidem notat tuberculum sinus nonnihil prominens, & sinum ipsum ueluti geminum constituens, cuius partes x & y indicari possunt.

α 1, 3, 4, 6, 7, 8 Radij appendicis maxime prominens portio, quae sinum cui brachiale articulatur superiori aut interiori sede adauget, & procerius quam appendicis ulnae processus stylum referens, ac R. insignitus, protuberans.

γ A, ε, ζ, η His characteribus in secunda & quarta figuris gibba externaque inferioris radij appendicis regio cum ipsa ossis sede cui appendix coalescit, notatur. & singuli characteres, huius sedis priuatim sinum indicant. γ quidem primum sinum, α secundum, ε et ζ tertium, η quartum. In secunda

θ. autem figura θ sinum indicat radio ulnaeque communem.

Cubitus.



Ulna.
Radius.

Ulna ad humeri articulationem, & ipsius hic processum & sinum describitur.

UNIVERSA pars inter brachium & brachiale consistens, Graecis *ωκυς*, Latinis uero Cubitus appellatur. haec duobus constat ossibus inuicem incumbantibus & coarticulatis, quorum ^b inferius, quod & longius est, *ωκυς* quoque & Cubitus nuncupatur. Ne autem homonymia sermoni aliquid obscuritatis conciliet, quoties integræ duobus illis ossibus extructae partis cum ligamentis, uenis, arterijs, neruis, membranis, & cute, mentio incidet, Cubiti uoce utendum duximus, inferius quidem os ulnam, superius uero Radium (uti hactenus fecimus) toto sermonis contextu nuncupaturi. Duo haec ossa longa sunt, & omni propemodum ex parte inter se uaria. Primum itaque inferiori humeri sedi diuersa prorsus articuli specie coarctatur. Ulna enim ad humeri ^d orbitam rotulam ue aptis in hoc exculpta sinibus, & idoneis donata processibus articulatur. In superiori nanque ipsius sede, qua admodum crassa solidaque, & appendice non minus quam humeri inferior sedes, destituta est, ^e duos insignes adipiscitur processus, quorum alter altero prior anteriorue habetur. ac anterior quidem is est, qui ^f sinum in anteriori humeri sede ad elatiorē rotulae regionem exculptum spectat, suisque tuberibus illi sinui ad amussim congruit. est enim processus hic amplius

a 1, 2 fi. A.
B. integra-
riū fi. T, V.
b tota fig. 5
& 6. aut
2 fi. integra-
rum Y.
c tota 3, 4
fig. aut 2 fi.
integra-
rum X.
d 1, 2 fi. ca.
23 K, L, M.

e 1, 2, 5, 11.
fig. C ante-
rior, D po-
sterior.
f 1 fig. cap.
23 N.

plus, & obtuso angulo similis, & perquam durus, ac solidus. Posterior autem processus anterioris formæ quodammodo respondet, ^g sinum subintrans, qui in posteriori illius sede ad elatorem rotulæ regionem cælatus cernitur. cum tamen sinus iste anteriori sinu profundior ampliorq̃ multo sit, processus etiam posterior anteriori crassior ampliorq̃ meritò euasit, adhuc magis obtusi anguli speciem referens. Processum hunc Athenienses quidem ὠλέκρανον, Diores autem λύβηρυς, Hippocrates uerò ἄγκωνα, Galenus porrò iam ὠλέκρανον, iam ἄγκωνα uocauerunt. Quæ uoces magno eorum qui latina legunt incommodo ab interpretibus cōfunduntur, non hæc solum unica cubiti uoce crebrò uertentibus, sed & ulnam, & totam partem inter brachium ac brachiale repositam, & humeri cum ulna ac radio articulū, & internam eiusdem articuli sedem, ipsiusq̃ flexum : quum interim plurimum intersit, quid singulis uocibus ab illo quem uertunt autore, intellectum fuerit. Quamobrem ne rem alioquin plus satis arduam, obscuriorem reddam, id lubens à lectore cōtenderim, ut perpetuò eadem uoce toto contextu me uti patienter ferat, neque haud scio cuius copix gratia, aut obscuri nominis proprii occasione, omnia turbari uelit. uocentur igitur nobis hi ulnæ processus, ille quidem anterior, hic uerò posterior, quem gibberum plerique & gibbum appellarunt: non expendentes inde ipsos humeri ^h tubercula quæ ad rotulæ ipsius latera habentur, & deinde ⁱ inferiora femoris capita, aliosq̃ nonnullos ossium processus, simpliciter se gibberos nuncupasse. ^k In horum ulnæ processuum medio, quæ se inuicem è regione spectant, grandis exculpitur sinus humeri rotulam excipiens, illiq̃ omnino respondens. Primum enim instar semicirculi, aut paulo etiam profundius quàm semicirculus, cælatur : nostriq̃ C, ac Græcorum C imagini accedit. unde etiam ab eius characteris forma Græcorum ueteres hunc sinum σιγμοειδὴν appellarūt. Sinus iste non obiter tantū C modo exculpit, uerū ut ad amussim humeri rotulæ respōderet, in ipsius medio ^l tubere obtuso ampliq̃ protuberat, quod secundū sinus illius longitudinem fertur, & utrinq̃ ad ^m latera ita comprimitur sinuaturq̃, ut funi chordæ ue quæ ad trochleæ rotulam uoluitur, possit cōferri. Quemadmodū enim teres chorda, rotulæ sinui (ut sic dicam) pariter secundum concauum tereti inuoluitur, ita quoq̃ hoc ulnæ sinus tuber sinui rotulæ conuenit. & depressa sinuataq̃ rursus tuberis latera, rotulæ sinus extuberantibus æquatur lateribus. Quod ut fiat exactius, ulnæ sinus internum latus, altius ipso externo cauatur: quò uidelicet internū rotulæ latus, multo procerius externo promineat, extuberetq̃. Vniuersus hic ulnæ sinus læuis est, & cartilagine incrustatus, & unà cum suis processibus rotulæ ita coaptatus, ut si uel minimū quid, aut magis extuberare, aut profundius insculpi, aut ampliari, aut stringi illum finxeris, ilico uniuersam læseris articulationem, in hoc duntaxat affabre constructam, ut eius beneficio cubitus flectatur, & extendatur, citra luxationis periculum. ad quod nō solum spectatu iucundissimus ille qui mutuo ingressu perficitur ossium contextus opitulatur, uerum etiam ligamentorum articulum stringentiū robur. Vt enim ualida articulum ambirent ligamenta, processuum ⁿ sedes sinum non respiciens, aspera inæqualisq̃ est. Quanquam denuò non ligamentorum tantum, sed & musculorum nomine processus asperi cernantur. Posterior enim posterioris processus sedes admodum inæqualiter protuberat, quodammodoq̃ sinuata conspicitur, ut cubitum extendentium musculorū insertionem fortius exciperet. Ita & anterior prioris cubiti processus pars, in hoc aspera est, ut ualidior ^p musculi cubitum flectentium posterioris insertio efficere-tur, & musculi ^q secundos ac ^r tertios digitorū articulos flectentes, hinc promptius originem ducerent. Neque solum hæc anterior prioris processus regio exasperatur, uerum & iuxta eius processus radicem eorum musculorū nomine asperis ^s quibusdam tuberculis Natura ulnam decorauit. Ad hæc, ut ualidioribus ligamētis hic articulus amplexaretur, in infima ulnæ sinus C litteram referentis sede, ^t utrinque ad latera sinulus instar anguli cuiusdam imprimi cernitur, & ipse sinus C similis à sua circumferentia inibi desinit, asperq̃ redditur, non alia sanè occasione, quàm ut ex hac ulnæ parte foraminulis non perujs obsita, ligamentorum fortium penderet exortus. Atque in hunc modum ulna humero articulatur, radius autem quæ humero iungitur, utcunque tenuis est, & ex ^u oblonga tenuiq̃ ceruice in amplum orbiculatumq̃ porrigitur ^x capitulum, quod ea parte, qua humerum spectat, ^y sinum exigit rotundum, & non ampliter cauum, quem humeri ^z caput subintrat. Ad hoc caput radius in prouum supinumq̃ agitur, & interim quo minus cubitus flectatur, extēdaturq̃ radij cum humero articulus, nequaquam obstat, quinimò radij sinus ad id humeri caput quoq̃ inflectitur & extenditur, ad quod præcipue iuuat humeri capitis lōgītudo, amplaq̃ ipsius sedes cartilagine incrustata, quæ nunquam à radij sinu in cubiti motibus abscedit. adeò ut non oscitanter Naturæ prætereundum sit artificium, quæ ita humeri cum radio articulum adaptauit, ut & radius unà cum ulna flecti reflectiq̃ possit, & is interim eleganter in prouum supinumq̃ quiescente ad humerum ulna, ducatur.

Radix ad hui
merum articu
latio.

Ulna ad brachiale ductus, & inferioris ipsius sedis historia.

Qui ulna secti dum ipsius longitudo habet.

Cæterum ulna à suo cum humero articulo deorsum^a rectà quodammodo uersus brachiale fertur, sensim gracilescens, tenuiorq; tantisper facta dum ad brachiale usq; pertingat, illic enim ex^b tenui longaq; ceruice rursus nonnihil aucta, c^e appendice donatur instar capituli cuiusdam rotunda, sed uaria interim. Hæc nanque inferiori ipsius parte^d processum obtinet, quem, quia in acutum procedit, Græci dissectores à scriptorij styli imagine *γραφωδὸν* & *στυλοειδὸν* appellāt: in hoc formatum, ut sinum adaugeat, quo brachiale ad cubitum articulari docebimus: utq; ab ipso^e ligamen articulum cōtinens pronascatur. Verum huius processus usum paulo pōst, uel Galeni huic processui nimum tribuentis nomine, explicatius aggrediar. Inferior igitur ulnæ appendicis sedes brachiale respiciens, ad internū latus acuti illius processus inæqualem quendam nanciscitur^f sinum, in quem^g cartilago firmatur, quam à radio pronatam magna ex parte ita inter brachiale & ulnam audies repositam, ut neq; brachiali neq; ulnæ adnascatur, eiusq; generis cartilago sit, hⁱ quam priuatim in maxillæ inferioris ad superiorem articulis, & in clauicularum cum conterminis ossibus nexu, contineri dudum retulimus. Porro si sinum illum appendicis ulnæ exceperis, tota sedes brachiale spectans, ad eum modum cartilagine incrustatur, quo sinus capitaq; articularum obduci læuigariq; solent. Præter hunc sinum appendix ulnæ, in externa ipsius sede^k sinum sibi insculptum gerit, qui oblongus, & (ut sic dicam) teres est, tendini paratus, eius musculi qui postbrachiali ante paruum digitum insertus, brachialis extensionis autor habetur. Verum præter hanc appendicem, ulnæ secundum ipsius longitudinem forma & impressiones quædam, & ipsius instar linearum tubera, adhuc expendēda ueniunt: Primum itaque humilior ulnæ sedes ad posterioris ipsius iuxta humerum processus radicem, quæ cubito innitimur, aliquousq; m gibba est, sua amplitudine triangulum referens, qui excarnis & musculis intectus, mox adempta cute conspicitur, duntaxat neruofam tenuitatem n musculorum excipiens, quorum beneficio cubitus extenditur. Huius trianguli o uertex deorsum per ulnæ longitudinem exporrigitur, & lineæ modo ob hoc maxime protuberat, quod huius lineæ latera à musculis duobus comprimantur, ipsa uel ulna musculis illis cedat, quorum p alter exteriori lineæ lateri exporrigitur, postbrachiali ante paruum digitum insertus, ac brachiale extendens. q Alter, qui interno lateri exporrigitur, & cui ulnæ os impensius cedit, brachiali ante paruum digitum inseritur, idq; flectit. Hæc ita protuberans linea, secundum inferiorem ulnæ sedem ultra medium ipsius longitudinis fertur: & præter hanc aliæ adhuc duæ cernuntur, quæ cum nuper dicta sic ulnam efformāt, ut ipsa ab humero uersus brachiale procedens non teres, sed triangularis uideatur. r Secunda igitur protuberans linea ab interiori latere radicis anterioris processus ulnæ rectà deducitur, quæ commune s latus cum prima linea constituit, quod ab illo musculo impressum est, quem modò brachiale flectere diximus. t Aliud autem latus cum u^u tertia linea efformat, quæ trium linearum acutissima asperrimaq; est, & ab externo latere radicis ulnæ processus anterioris longissimè procedit, atq; in hoc producitur prominet uel, ut ab ipsa ualidum pronasceretur x ligamentū, quod radium ulnæ secundum cubiti longitudinem robustioris membranæ ritu connectit. Porro y latus inter secundam lineam & tertiam repositum, musculorum gratia comprimitur, qui internam cubiti sedem occupāt, quibusq; hīc ab ulna & radio apta sedes paratur. Horum præcipuus est, z quem tertium quatuor digitorum articulum flectere audies. Verum quia illi musculi in ipsorum quoq; per ulnam progressu etiam sui ortus portionem assumunt, hoc tertium latus inter secundam & tertiam consistens lineas magis asperum occurrit, quàm latus inter secundam lineam & primam conspicuum, à quo nullus pronascitur musculus, nisi iuxta ulnæ cum humero articulum, ubi a is principium ducit, qui radium in prouum ducentium superior est. Latus tertia & prima lineis circumscriptum, reliquis duobus minùs est cōpressum, & priuatim b lineam obtusam, sed longam & modicè prominentem, ac uiciniùs tertiæ lineæ quàm primæ deductam adipiscitur. Hanc Natura c trium musculorum gratia produxit, qui ab ipsa triplici principio originem ducunt. Ac primum quidem eius musculi est, qui inter radium in supinum ducentium breuior habebitur, secundū autem & tertium pollicis ac indicis famulari motibus, in secundo libro docebimus: quem eo leuiori negotio intelliges, quo consideratius ea quæ modò narramus, in ossibus spectaueris. Sunt enim hæc non minus uisū ac cognitū iucunda, quàm cerebri & aliarum, quas hodie solum miramur, partium sectio. ut interim de summo in artis nostræ operibus usu nihil dicā, dum ad has lineas scopum figentes, fractum ac luxatum os rite nos reposuisse certissimò cognoscimus. Ad hunc itaq; modum ulna multum etiam ultra mediū ipsius longitudinis se habet. Vbi uerò brachiali propinquius accedit, teres omnino esset, nisi secūda linea insigniùs inibi d protuberaret, ac obliquè deorsum protensa sedem adaptaret e quadrangulari musculo, qui radij in prouum motus opifex hinc principium sumere docebitur. Porro si quid de ulna adhuc dicendū superfit, id iam unā

d 1, 2 fig. ab
A uerjus B.
b 1, 2, 3, 5, 6,
10 fig. P.
c eisdem fi.
Q.
d eisdem fi.
gur. R.
e 12 musc.
tab.

f 9 figu. S.
g 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8 fig. T.
h in margi-
ne cap. 10.
i 4 fig. ca.
22 R, S.

k 2, 10 fig.
V.
l 9 muscu.
tab. A.

m 6 fig. X,
Y, Z. & 9
musc. ta. V.
n eadem ta.
S, T.

o 2, 6 fig. d
Z per d, d.
uti & 1, 2
fig. d, d.
p 9 muscu.
tab. A.

q eadem ta
bul. z.

r 1, 2, 5 fig.
b, b.

s 1, 6 fig. d.
t 2, 6 fig. e.

u 1, 2, 5 fig.
c, c.

x 7 muscu.
tab. V.

y 1, 5 fig. f.

z 6 musc.
tab. z.

a 7 muscu.
tab. Q.

b 2, 6 figu.
g, g.

c 10 musc.
ta. A, z, n.

d 1, 5 fig. B.
e 7 muscu.
tab. X.

f, fig. b. in radij enarratione persequar, qui obliquus est, quatenus ulna recta. Radius nanque ^f supra
g, figur. i. ^g infraq; ulnae committitur, in ^h medio autem ac per reliquam longitudinem ita arcuatim obli-
h, fig. inter ^h quatur, ut admodum ab ulna dehiscat. quod partim motus ratione perficitur, ut obliquo scilicet
k, & h. ductu radius ulna suffultus, in prouum supinumq; promptè ageretur: partim, quò apta se-
des & fundamentum musculis constitueretur, quos necessario internam externamq; cubiti sedem
occupare oportuit. Quamquam magis obliqui sui motus occasione, quam musculorum gra-
tia radium obliquari, plurimumq; in medio ductu duo cubiti ossa inuicem abscedere, illa nos
doceant animalia, quibus neq; radius, neque radij beneficio manus extrema, in prouum supi-
numq; ducitur. Equus nanque, ouis, eiusq; generis animalia solidis, aut bifulcis donata ungui-
bus, tota cubiti longitudine radium ulnae adeò connatum a stabilitumq; obtinent, ut ne tantil-
lum quidè citra ulnam radius moueatur. In canibus uerò & felibus, & ijs animalibus quibus
pedes in digitos dirimuntur, radius mouetur quidem, sed tanto obscurius ac difficilius, quanto
nos manuū motus perfectiores obimus. Distat igitur in his quoq; animalibus radius ab ulna,
uerum longè minus quam in homine, neq; etiam adeò laxam articulationis speciem in illis, atq;
in homine, est cernere. Articulatur autem radius ulnae supra infraq; differenti omnino articu-
lo. supra enim ulna radium excipit, infra uerò à radio ulna excipitur. Ad externum itaque latus
anterioris ulnae iuxta humerum processus, ⁱ sinus quidam instar quartae circuli partis transuer-
sim exculpitur, laeuis, & cartilagine incrustatus. Huic sinui ^k internū latus capitis radij, cui sinus
in sculpitur humeri externum caput excipiens, appositè congruit, ac laeue & orbiculatum hinc fa-
ctum, in illo sinu uoluitur. Infra autè iuxta brachiale, ubi radius crassescit, dilataturq; & insigni
^l appendice donatur, huius appendicis humillimae sedi ^m sinus in sculpitur, illi non absimilis,
quem paulo antè in ulnam incisum retulimus. In hunc sinum cartilagine incrustatum superior
appendicis ulnae ⁿ sedes capituli modo protuberans, cartilagineq; obducta, reuoluitur: hacq; ra-
tione radius utriusq; articuli beneficio tantummodo in prouum supinumq; agitur. Non pro-
cul à superiori articulo, ubi radij ^o ceruix consistit, radius ^p asperum abruptumq; educit proces-
sum, qui internam cubiti sedem respicit, & insertioni anterioris cubiti flexentium musculi
aptam sedè parat. Rursus reliquo ab humero uersus brachiale ductu, radius non omnino teres
& laeuis est. Verum secundum ipsius longitudinem humiliori sua sede ^q acutam & insigniter
extuberantem producit lineam, quae tertiam ulnae lineam respiciens, ^r ligamentū admittit mem-
branae ualidissimae ritu ambo cubiti ossa, quae inuicem dehiscunt, colligans. ^s Externum huius
lineae latus perinde ac ^t internum quoque, compressum sinuatumq; est, ut hoc internam cubiti
sedem occupantibus musculis, illud uerò ijs qui in externa consistunt, cedat. Porro internum la-
tus externo asperius est, quòd priuatim ^u musculus tertium pollicis os flexens, nō infimam sui
exortus portionem ab illo latere sibi asciscat. Deinde superior radij sedes è directo dictae nu-
per lineae consistens, penè teres est, & iuxta medium suae longitudinis aliquousq; aspera occur-
rit, ut in hanc duo musculi ualidiores molirentur insertionem: quorum ^v alter radium in supi-
num agentium breuior est, ^w alter uerò radium in prouum ducentium superior, cuius potissi-
mum occasione asperitas illa caelatur, quòd ipse nerueam potius quam carneam insertionē effi-
ciat, longiusq; in osse producat. ^x In radij sede brachiali contermina, quam crassescere dila-
tariq; dictum est, pleraq; examussim inquirenda ueniunt. Primum enim hanc partem ita auge-
ri oportuit, ut tandè apta constitueretur sedes, cui ^y brachiale articulari queat. necessum etenim
erat, brachialis cum cubito articulū, in hominibus paulò minus toto ad radicem referri: si mo-
dò quiescente ad humerum ulna, summa manus radij beneficio, & secundario in prouum supi-
numq; agi debuit. Si nanque in radio & ulna sinus, cui brachiale articuletur, æqualis portio
exculperetur, & ipse interim sinus superiorè brachialis sedem imitatus necessario transuersim
oblongus esse deberet, impossibile profectò fuisset & radium & summam manum in prouum
supinum ue ferri, ulna interim ad humerū quiescente, ac ueluti huius motus basi ac fulcimentò.
Pars enim brachialis quae ulnae sinui infereretur, inarticularetur ue, clauī modo obstaret, quo
minus uel tantillum radius immota ulna moueri posset. Operæ precium igitur fuit, inferiorem
radij partem adeò crassescere, ut efficiendo sinui, cui brachiale articuletur, apta esset. Verum
quia tenue os nimium crassescere nequaquam expediebat, Natura etiam brachialis portio-
nem ab ulna sustineri uoluit: at ita, ut uix puncto ulna brachiale contingeret. contingit autem
^z acuto ipsius processu, quem stylo dissectionum periti assimilant. Ne enim ulna, reliqua sui ap-
pendicis sede, brachiale citra alterius corporis interuentum contingeret, Natura ab inferiori
sede ^a sinus in radij appendice brachialis gratia exculpti ^c cartilaginem deduxit: quae ulnae ap-
pendicem ascendens, illam à brachiali dirimit, itaq; articulum hunc aptat, ut ulna brachiale
quidem sustineat, uerum proximè non contingat, totusq; sinus (uti sanè oportuit) ad radium
K 3 spectet.

Radij obli-
quitas.Radij adul-
nam articula-
tio.Radij secun-
dum ipsius lon-
gitudinem lae-
uitas & aspe-
ritas.Inferioris ra-
dij partis bislo-
ria.Cartilago
brachiale ab
ulna dirimens.

*Libro de Of-
sibus.
Primo de Ad-
ministr. diffec.
Secundo de
Vsu part.*

spectet. Atque hæc sanè tanto uelim inquiri diligentius, quò magis cum Galeni dogmatibus pugnant. non enim lubet in hoc negocio alioqui satis prolixo, passim Galeni loca, à quibus prudens dissentio, subnectere, rationemque cur aliter sentiam subiungere, quum diligens lector etiam non admonitus, hæc abundè animaduersurus sit. Verum ne nimium Galeni Anatomicorum coryphæi placita, eaque potissimum quæ à studiosis in publicis sectionibus, ut expendantur requirere soleo, iam præterisse uidear, in radij ulnæque Galeni historia portionem & particulam modò assumam, quæ prolixius sæpiusque ab ipso inculcatur. est autem hæc, acutus ulnæ processus, quem stylo comparamus. Vt itaque præteream, quòd magnam, & (quantum ex ipsius scriptis assequor) dimidiam sinus cui brachiale inarticulatur portionem, ulnæ ascribit, acuto huic processui priuatum ad brachiale connexum inibi tribuit, ubi ulnæ radijque historiã in libro de Ossibus pertractat. Vbi autem paulo post brachialis ossa recenset, conexus speciem exprimit, quandoⁱ tertium superioris brachialis ossium ordinis os quod paruū digitum spectat, sinuatum esse, atque in illud acutum ulnæ processum ingredi recenset, ac ueluti duos brachialis cum ulna & radio articulos proponit: quorum unum quidem ad radium & ulnam simul refert, alterum uerò ad acutum ulnæ processum. atque ad hunc quidem nexum pertinere asserit, brachiale in obliquum ducere: ad illum uerò, in rectum, cuius opera summam manum extendimus inflectimusque. Arbitror autem Galenum per obliquum motum, illum intelligere, quo manus in utrumque latus ducitur, pari nimirum motu, quo digitos inuicem adducimus & reducimus: ita enim obliquum lateralemue motum aliàs ferè semper Galenus intelligit. Quod si est, quid dici posset absurdius, quàm hunc motum acuti illius processus munere celebrari: quum tantum absit ut quicquam ad illum motum auxiliari queat, ut illum non secus impediret, quàm si palum bacillumue aliquem brachiali & cubito simul ad latus sic obligares, ut sedulas matres puellorum sinistrae manus pollicis & cubito pariter baculum alligare uidemus, quando pueros nimium sinistra manu uti cernunt, metuuntque ne progressu temporis sinistra pro dextra utantur. Porro si Galeni locum in secundo de Partium usu excutere uolueris, inibi illum quoque duplicem articulationis speciem recensere, atque eam quæ acuto fit processu in hoc factam dicere, animaduersurus es, ut manus eius articuli ope in prouum supinumque, & deinde etiam in latus ducetur. Hanc sententiam re ad amussim perpensa, non minus quàm priorem ueritati repugnare fateberis, idque tunc potissimum, quando omnem ferè brachialis articulationem, ad radium ob hoc præcipue referri disces, ut radij motum, qui in supinum & prouum fit, extrema manus secundario sequeretur: & insuper colliges, illos motus debere impediri, si acutus ille processus ex Galeni sententia brachiali articuletur. Quod (ne longius in re clarissima immorer, oues, bouesque liquidò ostendunt. nam ipsorum brachialis ad cubitum articulatio Galeni descriptionibus quodammodo respondens, neque in latera, neque in prouum, neque supinum aptè moueri potest. Illis nanque animalibus acutus ulnæ appendicis processus oblongus est, & sinum priuatim in brachialis ossibus sibi uendicat, nullaque cartilago peculiaris ulnam ac brachiale interuenit, præter eam quæ ossibus crustæ modo obducitur, cuiusmodi tamen cartilago in homine spectatur, in quo etiam processus ille non tantum cartilaginis illius altitudinē excedit, quantum^a superior illius qui in radij appendice sculpitur sinus pars porrigi educique cernitur. Eminent autem illa radij pars eadem cum acuto illo processu ratione, ut scilicet sinum efformaret brachiali aptum,^b hincque ualidiora articulum continentia producerentur ligamenta. Quum uerò huic radij sinui non unicum tantum brachialis articulatur os, uerum inter tria brachialis ossa, quæ radio ulnæque coarctari docebimus,^c duo ad solum radij sinum referuntur, &^k tertium, cartilaginem illam à radio peculiariter pronatam & acutum ulnæ appendicis processum, respicit, radij sinus^l geminus esse apparet, eo quòd sinus modicè^m inibi protuberat, ubi secundum brachialis os primo committi, illo quod subsequitur Capite dicturi sumus. Ad hunc igitur modum brachiale radio committitur. in quo præterea considerandum uenit, radij partem, cui appendix ipsius coalescit, ipsamque appendicemⁿ interna parte sinuatam & leuiter cauam uideri, cum ut^o musculo cederent radium in prouum ducentium inferiori, tum ut exactum iter^p tendinum seriei aptaretur, qui cubito exporrecti digitorum flexui famulantur. Externa autem huius radij sedis pars gibba est, quòd ita (quum extra ponatur) iniurijs ferendis pertinacior reddatur. ne tamen musculorum cubito exporrectorum tendines summam manum hanc petentes, & gibba illa sede deducti, hinc inde aberrarent implicarenturque, sinus multi huic sedi insculpuntur, quibus tendines^q transuersis obducti ligamentis, tanquam per anulos trañci, in secundo libro describemus. Sunt autem huiusmodi sinus numero quatuor. ac^r primus quidem amplus est,^s tendinibus paratus, qui indicem, medium & anularem extendunt. Secundus^t tendinem transmittit, indicem & medium à pollice in latus abducentem.^x Tertius quodammodo geminus

*Sinus radij,
deducendis lo-
catisque muscu-
lis & ipsorum
tendinibus apti.*

*f. 1, 2, 4, 5 fi.
charac. 3.*

*g. 1, 3, 4, 5 fi.
gur. a.
h. 12 musc.
tab. k & i.
i. 1, 2, 4, 5
fig. cap. 25
chara. 1, 2.
h. eandem
fi. chara. 3.
l. 8 fig. x, y.
m. 8 fig. x.
n. 1, 3 fig. n.
o. 7 musc.
tab. X.
p. in manu
5 & 6 musc.
tab.
q. 1, 2 musc.
tabulae nu-
meri hac se-
de positi.
r. 2, 4 fig. y.
s. 9 muscul.
tab. Z.
t. 2, 4 fig. d.
u. 10 musc.
tab. p.
x. 2, 4 figu.
1, 2.*

nus

^y 11 musc. ^{tab. A.} nus est, ^y bicornem transmittens tendinem alterius musculi brachiale extendentium, unà cum
^z 10 musc. ^{tab. O.} tendine ^z musculi pollicem uersus indicem euertentis, extendentis ue. ^a Quartus sinus leuiter
^a 2, 4 fig. ^b 10 musc. ^{tab. k, m, n.} admodum exculptus est, uixq; sinus nomen meretur: asper tamen locus est, qui ligamentum
^c 12 musc. ^{tab. o, b.} transuersim ^b tribus tendinibus obuolutum educit. quorum unus brachialis ossi pollicem susti-
^d 2 fig. ^e 9 muscu. ^{tab. o.} nenti inseritur: secundus primo ossi pollicis, tertius autem tertio pollicis ossi. Verum quarti si-
^f qualis ap- ^{paret in fi.} nus sedes, ligamenti illius gratia non duntaxat aspera est, protuberatq; uerum etiam ut ^c tendo
^{capiti in-} illi ualidius implantetur musculi longissimi radium in supinum ducentis. Et præter hos sinus,
^{serta.} etiam in externa articuli, quo radij appendix iuxta brachiale appendici ulnæ articulatur sede,
^a sinus etiam consistit, quo ^c musculi tendo uehitur. cuius potissimum beneficio paruus digitus
^f extenditur, atque is sinus & ulnæ & radio communis censetur. Iam de ulna & radio nihil dicen-
^{dum} dum superest, præterquam quòd solida undiq; constent substantia, illic tantum fungosa, ubi
^{appendices} appendices ipsis adnascuntur. intus ^f sinum exigunt, medulla oppletum, atque in hoc ulnara
^d diusq; humerum, femur & tibiæ ossa imitantur.



DE BRACHIALI. CAPVT XXV.

PRIMA FIGVRA EARVM

SECVNDV.

QVÆ VIGESIMOQVINTO



CAPITI PRÆPONVNTVR.



TERTIA.

QVARTA

QVINTA.



SEXTA FIGVRA, CVIVS

(VT ET QVINQVE PRÆCEDENTIVM
 figurarum) Indicem sequenti pagina subiiciemus, unà
 earundem characteres explicaturi.



DVÆ

D V AE priores figuræ non præsentant tantum subseruiunt Capiti, uerum etiam tribus ordine subsequenter, quibus summæ manus partes etiam explicantur. Vocamus autem summam extremam uel manum, quæ Hippocrati *ἐκδοχὴς* dicitur: ea nimirum pars quæ à cubito ad extremam usque digitorum aciem habetur, quamque in brachiale & postbrachiale ac digitos partimur. Hippocrati enim manus nuncupabatur, quicquid à scapulis ad extremum usque digitorum pertinet: quodque in brachium cubitum et extremam manum subdiuiditur. Prima igitur huius capitis figura, internam ossium summæ manus sedem proponit. Secunda uero, eorundem ossium externam faciem appositissime delineatam continet. Quatuor autem figuræ has seriatim subsequentes, huic Capiti sunt propriæ, ac duntaxat octo brachialis ossa uaria facie exprimunt. Illa namque quæ tertia inscribitur, octo brachialis ossium simul in sua sede commissorum internam faciem demonstrat. Quarta eadem ossa externa facie delineata continet. Quinta superiorem brachialis ossium partem notat, qua cubito articulantur. Sexta brachialis ossium infernam ostendit sedem, cui primum pollicis os, quatuorque postbrachialis ossa coarctantur. Characterum uero index erit huiusmodi.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Octo his numeri characteribus octo brachialis ossa in omnibus sex præsentibus figuris insigniuntur, si modo in illa superficie, in qua brachiale se offert, omnia in conspectum ueniant. Atque unumquodque os suo semper characterē indicatur, suumque nomen ita exhibet. Id enim primum uocabimus, quod 1. inscribitur. Secundum uero, quod 2. Sic itaque *1, 2, 3, 4* notant superiorem octo brachialis ossium ordinem, ipsa nimirum quatuor superiora, seu cubito proxima. Verum *5, 6, 7, 8* inferiora indicant ossa, quæ postbrachiali sunt contermina.

I, II, III, IIII In prima & secunda figura notantur quatuor postbrachialis ossa, quibus ab inscripto etiam numero nomen imponere nihil prohibet: nisi forte magis libeat illa à digito quem sustinent, aut cui præponuntur, nuncupare.

A, B, C 1, 2 Tria pollicis ossa, quæ ferè & internodia appellamus.

D, E, F 1, 2 Tria indicis ossa. atque eadem ratio in cæteris est digitis.

G 3, 6 Quinti brachialis ossis sinus, sedesque, cui primum pollicis os articulatur. atque sinus huius longitudinem transuersum in sexta figura ab *a* ad *b* metimur. Internam uero sedem *c*, externam autem *d* notat. ac *d* quidem in quarta figura etiam est conspicuum.

H 3, 4, 6 Sedes sextibrachialis ossis, cui postbrachialis os indicem suffulciens coarctatur. *h* uero in *b*. quinto osse sedem indicat, quam idem quoque postbrachialis os contingit.

K 3, 4, 6 Sedes in septimo brachialis osse, cui postbrachialis os medium digitum sustinens coarctatur. *k*. uero in eisdem figuris sedes indicatur, qua idem postbrachialis os, sextum brachialis os contingit.

L 3, 4, 6 Sedes octauibrachialis ossis, cui postbrachialis os anulari præpositum coarctatur.

M 3, 4, 6 Sedes octauibrachialis ossis, cui postbrachialis os paruum digitum sustinens coarticulatur.

N 1, 2 Ossiculum accumbens externo lateri articulationis octauibrachialis ossis, ad postbrachiale os, quo paruus digitus sustinetur.

O 2, 3, 6 Processus octauibrachialis ossis, in internam brachialis sedem protuberans.

P 2, 3, 6 Processus quinti brachialis ossis, ex quo transuersum pronascitur ligamentum, quod in octauibrachialis ossis processum *O* notatum insertionem tentans, tendinibus obducitur, ex cubito internam summæ manus sedem aduentibus.

Q 2 Appendix postbrachialis ossis indicem sustentis superior, quæ brachiali coarctatur.

R 2 Appendix postbrachialis ossis indici præpositi inferior, quæ capitulum constituit primi indicis ossis sinum subiens.

S 1, 2 Interuallum occurrens inter postbrachialis os indici præpositum, & id quod medium sustinet. In cæteris autem postbrachialis ossibus eadem appendicum interuallorumque est ratio.

T 1, 2 In prima figura ex duobus sesaminis ossibus internæ secundi pollicis articuli sedi præpositis, internum os notatur: in secunda uero figura, externum.

V, V 1 Duo sesamina ossicula, indicis articulo præposita.

X 1 Vnicum ossiculum sesaminum, aut potius sinapis semini simile, secundo indicis articulo appositum.

Y 1 Vnicum sesaminum ossiculum, tertio pollicis articulo allocatum. In reliquis digitis cum indice eadem est ratio, etiam si secundi & tertij articuli sesaminum ossiculum non appinximus.



EX TREMAE manus, ^a partem cubito articulatam Græci *λαγνὸν*, nos Celsum imitati Brachiale appellamus. ea octo ossibus duplici ordine distinctis construit. Quæ in natu gravioribus dura sunt & paruula, intusq; parum fungosa, modicaq; medulla appendicum modo oppleta, non autem prorsus medullæ expertia, & potissimum quæ horum maiora cernuntur. Haud parem enim omnia sortiuntur magnitudinem, ut nec formam etiam, neq; situm: quum ex omnibus nullū sit, quod alteri omnino respondeat: & singula priuatim aliquid adipiscuntur, quo promptè ab inuicè discerni queant. Porro utcunq; sint uaria, nihilo minus mutuò tam concinnè adaptantur, ad tantamq; compositionis harmoniam accedunt, ut eorum numerus non admodum inuentu facilis sit. ^b Nisi enim ualidissima cartilagineaq; ligamenta, quibus obducuntur, simul cum membranis resecueris, & accurate abraferis, unum esse tibi omnia uidebuntur, aut cum Celso ipsa incerto constare numero opinaberis. ^c Cæterum cuncta nerueis his cartilaginosisq; nexibus simul constricta (non autem ut nonnulli existimant connata) duas integras superficies unà efformant, exteriori quidem regione quantum manui ex usu est, gibbam, interiori autem sinuatam, quantumq; & hoc manui expedit, concuam. Atque hæ tantū superficies ligamenti obuinciuntur. ^d Superiùs enim, quæ ossa cubito committuntur, læuia sunt, & cartilagine incrustata, quemadmodum & inferiori, quæ postbrachialis ossibus, & primo pollicis ossi coarctantur. Quin etiam ubi ossa se inuicem contingunt, non undique aspera & inæqualia, ac ligamenti oppleta uisuntur, uerum omnibus apti læuesq; sinus incisi sunt, qui cartilagine læui & lubrica illiti, aliorum ossium tubercula capitā ue similiter læuia, cartilagineq; obducta, excipiunt. In medio enim contactu nullorum brachialis ossium ligamenta membranæ ue interueniunt, nisi in inferioris ordinis ossium connexu, ubi non nihil, sed uix animaduersione dignum, ligamenti cartilaginei ueluti in puncto intercedit, & ubi ossa inferiora non adeò conterminè inuicem atq; superiora sunt compacta. Quod etiam meritò Natura molitur, in hoc potissimum duos brachialis ossium ordines con-

Brachiale octo ossibus constructui, inter se forma differentibus.

Brachialis ossa quibus sedibus, ligamentis, & quibus cartilagine obducuntur.

Cur duo brachialis ossium ordines.

Brachialis ossium nomina.

Brachialis ad cubitum articulus.

Quæ quartum os sibi peculiariter uendicet.

a Integra-
rum V ad
Z. & om-
nes huius
cap. figure
charact. 1,
2, 3, 4, 5, 6,
7, 8.

b 8 muscu-
la. Δ & 12.
tab. I.

c confer si-
guram 2.
dein tertiā
quartā.

d 5 figura.
e 6 figur.

f omnium
ferè figur.
charact. 1,
2, 3, 4.

g omnium
fig. charac.
5, 6, 7, 8.

h quinque
primarum
figur. cha-
ract. 1.

i earundem
fig. charac.
2.

k earundem
fig. charac.
3.

l earundem
fig. charact.
4.

m seriatim
in omnibus
fig. charac.
5, 6, 7, 8.

n 1, 8 fig. ca-
24 x, y.

o 1, 2, 3, 8 fig.
cap. 24 T.

p 1, 2, 5, 10
fig. ca. 24 R.

q 1, 2, 7 fig.
cap. 24 a.

r Non est
quod post-
hac ossa in
margine ad-
notem, quā
numeri cha-
racteres in
omnibus se-
re cap. figu-
ris sint ob-
uij.

tingens, quod ^e superior cubito, ^s inferior autem alia prorsus ratione postbrachiali & primo pollicis ossi debuerit cōmitti. His namq; ut distinctis diremptisq; coarticulatur ossibus, cubito autem unius ossis modo: sic ut iure superioris ordinis ossa, uiciniùs propinquiusq; ac nullius corporis interuentu inuicem coarticulentur, quàm inferioris ordinis ossa. Atque hanc brachialis ossium copiarum ratione dissectionum periti potissimam esse referunt: huic secundariò patien- di difficultatem addentes, quum arbitrentur brachiale iniurijs ferendis pertinacius fieri, quia multis componitur ossibus occurrentium uim articularum nomine cedendo exoluentibus, eo modo quo hastam sagitam ue difficilior laxa quàm tensa penetrare conspiciamus. Quanquam rursus & ad innumeras manus motuū differentias, hanc ossium uim & copiam à Natura non postremo loco extructā esse animaduertimus. Cæterum quibus nam sinibus tuberibusq; brachialis ossa donentur, iam enitar persequi. In superiori brachialis sede, aut ordine qui cubitum spectat, quatuor reponuntur ossa, quibus ex ipsorum qua ordinantur serie, nomina non ab re imponemus: ¹ primum perpetuò uocantes, quod superioris ordinis internum constituit latus: ² secundum uerò, quod huic subsequitur, atq; magis ab interno abscedit latere: ³ tertium, quod secundo ad externum latus proximum est: ⁴ quartum uerò, quod externum latus iam omnino occupat. Pariter quatuor inferioris ordinis ^m ossa, quintum, sextum, septimū & octauum nuncupabimus, atque in hunc modum singulorum historiam aggrediemur. Primum, secundum & tertium inuicè ualidissimè proximèq; cōmittuntur, & uno ordine iuncta, ac si unum essent os, superiorè brachialis sedem ita efformant, ut instar unius alicuius ossis lati oblongiq; capitis, in radij ulnæq; sinum, ea concinnè articulentur. Ac primū quidem, & secundū, in sinu radij appendici insculpto reponuntur: tertium uerò ^o cartilagini innititur, quam à radio pronatā, magna ex parte ulnam à brachiali dirimere scripsimus. Quanquā externū tertij ossis latus etiam ^p acutum appendicis ulnæ processum tunc cōtingit, quum in externū latus summam manū inclina- mus. Verum interim tertium id os sinum cartilagine oblitū, qui uisu dignosci queat, in homine nequaquam adipiscitur, quem processus ille sibi propriū haberet, quum etiā processus ipse nisi secundum sinus, quo brachiale arcatur, latus perinde extuberet, ac reliquorū sinuū supercilia, ipseq; radij appendicis in hac regione ^q apex. Atq; id uel tactu leuiter dijudicatur, si manu in la- tus internū ducta inter brachiale & ulnā, alterius manus pollicis apicē inferere quis fuerit adni- sus. Tria igitur prima brachialis ossa, superiori sede ita simul iunguntur, protuberantq; ut ueluti unum brachialis caput læue & cartilagine incrustatū constituāt, quo id cubito articulatur, mul- tisq; & uehementibus motibus, ac si uno grandi efformatū esset osse, agitur. Quartū brachialis os ulnam haudquaquam contingit: at superiori sua sede eam huius articuli ligamenti portio- nem

nem admittit, quæ ab acuto ulnæ appendicis processu enascitur. Dein superiori quarti ossis sedi^s tendo musculi inseritur, qui brachiale flectentium inferior censetur. Ex inferiori autem ipsius sede^t musculus pronascitur, cuius beneficio parvus digitus à reliquis abducitur. Præterea &^u musculus suæ originis portionem hinc assumit, qui duorum primum parvi digitos flectentium exterior est. adeò ut quartum hoc os neque inferiori, neque superiori ipsius sede, neque etiam externo ipsius latere alteri ossi committatur, sed tantum interno ipsius latere, depresso admodum capitulo, tertij ossis externo lateri (magis tamen ad manus uolam) in eum modum coarticulatur, quo ossa per ἀρθρώλιαυ cōstrui diximus. Hoc itaq; quartum brachialis os id peculiare sibi uendicat, quòd uni tantum brachialis ossi iungatur, quodq; omnium brachialis ossium minimum sit, reliquisq; minus protuberet, sinueturq;. Est enim quodammodo sphaericum, sed paulo longius quàm crassius: quia scilicet inferiùs musculos educit, superiùs autem ualidissimi tendinis insertionem, uti diximus, excipit, eaq; ratione sursum deorsumq; magis quàm in latera protuberare debuit. Vnde etiam ueteres dissectionum professores, id (uti conijcio) Rectum appellarunt, ambigentes quem in ordinem ipsum referrent. nos autem superiori ordini ascripsimus, quòd tertio huius ordinis ossi coarticuletur, ac reuera in eo ordine consistat. Nuncuparunt etiam Anatomici præsens os, cartilagineum: non secus quàm Marinus^x os genu articulo præpositum eo nomine donauit, quod molam patellamq; uocamus. Non sanè (quantum reor) quòd id os molle cartilagineumq; esse arbitrati sint, quum omnium brachialis ossium facilè durissimum & solidissimum sit, at quòd coctum exteriùs cartilagine obductum uisatur, propter musculorū principia tendinumq; fines, qui post elixationem cartilaginis molliusculæ speciem referunt. Galenus hoc os octauum brachialis os uidetur recensuisse, id propriū ipsi tribuens, quod propugnaculum^y nerui cuiusdam sit, qui ab interna manus sede ad externam secundum id brachialis os reflectitur. Hic neruus me non latet, uerum ad hoc ossiculum in hominibus nō reuoluitur. est enim ille neruus, quem à quinto brachium petentium, paulo post medium cubiti longitudinis ab interna cubiti sede in posteriorem porrigi, atq; duos furculos paruo digito, totidemq; anulari, unum autem medio deriuare, in quarto libro audies. Præsens itaque neruus quartum brachialis os non contingit, ideoq; minus secundum illud ab interna manus sede in externam reflectitur. Porro præter quartum brachialis os, nullum penitus occurrit, non pluribus adnexum contiguumq; ossibus. Primum enim, præterquam quòd radio articulatur, etiā secundo brachialis coarticulatur ossi, amplo utcunq; tuberculo in secundi ossis sinum subiens. Deinde alio tubere multo ampliori, atque ab inferiori sua sede protuberante, communem sinum ingreditur, quem quintū brachialis os cum sexto efformat. Verum Natura præcauens, ne id os undique aliorum ossium sinus ingrederetur, & ipsum interim tyranni more nullum susciperet, insignem in ipso cælauit sinum, quo unà cum secundo brachialis osse (cui is sinus quoq; communis est) septimi ossis omnium facile maximi grande rotundumq; admitteret caput. atque ita primum os radio, & secundo brachialis ossi, & quinto, sexto, ac septimo committitur. Secundum os (quod tanto minus est primo, quanto ipsum maius est tertio) connectitur primo ossi, & septimo, uti iam diximus. tertio autem, amplo connexu per ἀρθρώλιαυ constringitur: adeò ut tertium os radio, & tribus brachialis committatur ossibus, primo uidelicet, septimo & tertio, neq; etiam multum ab octauo remouetur. Tertium os modicè protuberāte, sed amplo tuberculo in sinum subit octauū ossis: hincq; facile constat, id os & ulnæ, magisq; adhuc^z peculiari huius articuli cartilagini, dein & secundo ossi brachialis, & quarto & octauo conterminum esse. Quintum brachialis os, quod inferioris ordinis primum recensuimus, superiori sua sede in sinum sibi exculptū primi brachialis ossis capitulum excipit, & externo latere sinuatum quoq; sexti ossis capitulum admittit. adeò ut quintum os duobus brachialis ossibus, primo nimirū ac sexto coarctetur. & præterea id priuatim quoque^a primum pollicis os sustinet. In inferiori nanque ipsius sede^b sinum adipiscitur patulum &^c oblongum, ac in^d interna^e externaq; sede magis quàm in lateribus ac medio exculptum, cui primi pollicis internodij capitulum ea articulationis specie cōmittitur, quæ motum edit omnibus manifestum. aliter multo quàm brachialis ossium inter se cōnexus, cuius motus ita latet, ut uix dijudicari queat. Atque hac etiam articuli specie quatuor^f postbrachialis ossa quatuor inferioris ordinis ossibus adnectuntur. Primum enim postbrachialis os indici præpositum, magna ex parte^g sexto brachialis ossi coarticulatur, h^h portionem quoque quinti ossis attingens. Vbi enim quintum os sexto coarctatur, communis sinus utrique ossi exculpitur, cui capitis primi postbrachialis ossis pars articulatur. adeò ut quintum brachialis os, præter primum sextumq; brachialis ossa, etiam primum pollicis os unà cum primo postbrachialis osse contingat. Porro secundum postbrachialis os medium suffulciens digitum, depresso, sed obliquo,

s. 4. musc.
tab. A.
t. 3. muscu.
tab. r.
u. 4. tab. f.

x. 1, 2. fi. ca.
32. & inter-
grarum 2.

y. 2. fig. cap.
u. lib. 4. cha-
ract. 46.

Si uisum fue-
rit, hic figu-
ras cōspici-
es quot os-
sibus quod-
que os com-
mittatur e-
xaminatu-
rus.

z. 1, 2. fi. ca.
24. T.

a. 1, 2. fig. A.
b. 3, 6. fi. G.
c. 6. fig. a, b.
d. 6. fig. c.
e. 6. fig. d.
f. 1, 2. fig. I.
II, III, IIII
cū charact.
5, 6, 7, 8.
g. 3, 4, 6. fi.
H.
h. 3, 4, 6. fi.
gur. h.

quo, capiteⁱ septimi ossis brachialis sinui leuissimè ac obliquè exculpto articulatur acutiori sui parte latereq; interno^k sextum brachialis os modicè contingens. Duo autem reliqua postbrachialis ossa, ea scilicet quæ anularem & paruum sustinent, duntaxat octauo brachialis ossi^l lae uibus, ac in superficie tantum excauatis sinibus coarctantur. Sextum itaque brachialis os duobus committitur postbrachialis ossibus, illi nimirum quod indici præponitur, & obscure illi quod medio subiicitur digito. Brachialis autem tribus committitur ossibus: primum enim os suo sinu excipit, & suo tubere in quinti ossis sinum subintrat. dein septimo ossi leuissimè protuberante capitulo, aut potius plana superficie articulatur, estq; inferioris ordinis minimū, quemadmodum septimum maximum. quintum autem & octauum medio se habent modo, quam octauum quinto paulo grandius cernatur. Septimū os suo capite rotundo, ac impen sius protuberante, in communem primi secundiq; ossis sinum subit, hacq; ratione duobus illis ossibus cōmittitur, ab interno autem latere sexto ossi articulatur, ab externo uerò latere articulatur octauo ossi ampla admodum articulatione, quæ depresso fit capite, sinuq; in superficie tantum cælato. Hanc articulationem aliqua ex parte cartilaginei ligamenti interuenit portio, quæ etsi septimum os uehemētius octauo ossi cōmittat, attamen id omnium brachialis ossium creberrimè uersus interiora luxatur: tum quòd grandius sit, neq; ita facile, ac cōtermina, occurrentium impetum sustineat: tum etiam, quòd ligamentū interna sede hoc os uicinis colligans, nō æquè crassum sit, atq; in reliqua brachialis regione. Atq; id hinc potissimū accidit, quòd Natura ligamenti mole crassitieq;^m tendinibus iter occupare uoluerit, qui frequenti multitudine, hac ad digitos flectendos ab interna cubiti sede prorepunt. Vtunque uerò sit, septimum os quatuor brachialis connectitur ossibus, primo nimirum, secundo, sexto, octauo, & postbrachialis ossi medium digitum sustinenti. Octauum os cunei quodammodo ritu septimum & tertium subintrat, illisq; duobus cōmittitur: septimo quidem, ut paulo antè retulimus. tertium autem, in sinum sibi exculptum admittit: dein præter hæc duo brachialis ossa, duobus etiam postbrachialis coarctatur ossibus, quæ anulari & paruo subiiciuntur, adeò ut & id quoq; quatuor ossibus conterminum sit, quibus subinde paruulum acceditⁿ ossiculum, ex illorum numero^o quæ sesami seminis imagini assimilata, *σσεκουδόν* Græcis nuncupatur. Ad externū enim latus coarticulationis postbrachialis ossis paruū sustentis cum octauo brachialis osse, eius generis reponitur ossiculum, sedem quasi oppleturum, quæ ideo hîc quodammodo uacua relinquitur, quòd hoc postbrachialis os sua superiori parte totum octauo brachialis ossi inniti nequeat, atq; in externum latus paululum abscedat. Videtur itaque id ossiculum, quando adest, priuatim hanc articulationē firmare, ac postbrachialis os paruum sustinens digitum nonnihil suffulcire, atque hac etiam occasione octauum brachialis os ex abundanti huic quoque ossiculo, præter illa quæ nuper dixi, contiguum uisitur. Quinetiam & hoc adhuc octauum os sibi proprium uendicat, quòd ipsius interna sede, qua manus uolam quodammodo spectat, notatu dignum educit^p processum, ab externo latere uersus internum latus inclinantem, & interno suo latere C modo exculptum: ut aptam constitueret sedem, qua tendines musculorum digitos flectentium (qui ex cubito procedūt) opportunè uehi contineriq; possent. Vt uerò tanti tendinum moli sedes hæc aptior redderetur, etiam quintū brachialis os interna sua sede^q processum educit, uersus externum latus uergentem, & in externo latere pariter exculptum, eiusdem omnino usus quo octauū ossis processus gratia, nimirum ut tendinibus illis uia exhiberetur, ac postmodum ex processuum illorum apicibus ualidissimum^r ligamentum enasceretur, quod transuersim tendinibus circumdatum, ipsos, ne à sua sede^s aberrant exurgant ue, contineret, amplectereturq;. Hæc sedes tendinum nomine excauata, utcunque læuis est: quemadmodum & reliquos sinus esse dicimus, qui tanquam anuli tendines transmittūt. Cætera brachialis ossium pars extra hunc sinum, easq; sedes quibus ossa articulātur, inæqualis, & propemodum aspera est, ut fortiora educeret ligamenta, eademq; ualidius exciperet, quibus ossa inuicem obuinciri ac colligari iam antea proditum est.

Quot ossibus
sextum os con
terminum sit.

Quot septi
mum.

Quot octauū.

Ossiculum ad
nexum quarti
postbrachialis
ossis cum bra
chiali repositū.

Octauū ossis
processus.

Quinti ossis
processus.

DE POSTBRACHIALI.

Caput XXVI.

H V I V S Capitis figuræ ex prima secundaq; præcedentis Capitis figuris extre mam manum, ac proinde etiam postbrachiale (notis I, II, III, IIII) exprimentibus pe tendæ sunt. Quanquam & subsequenti Capitis prima figura, ad characterem *A* postbra chialis os indicem sustinens exprimet, omni osse liberum.

P A R T E M

Postbrachia-
lis uoce uten-
dum.



Quibusdam
postbrachialis
ossa quatuor,
quibusdā quin-
que enumera-
ri.

Quatuor post
brachialis of-
sa cuiusmodi
sint.

In longitudi-
ne.

In appendici-
bus.

In mutuo ne-
xu.

Postbrachia-
lis ossium in-
terualla.

Qui postbra-
chialis ossa mu-
sculis cedant.

ARTEM summæ manus à brachiali ad radicem usque digitorum^a dedu-
ctam, Græci quidem μετακρῆπιον nominarunt: Celsus autem, & Græcorū
interpretes permulti, palmam. alij rursus pectinem, ac pectus aliquando
uocarunt. uerū quia palmæ uocabulum latius patet, & brachiale quoque
in palma plerisque complectitur, ac reliquis rursus palma idem quod uola
denotat. & quum pedis pedio, pectinis & pectoris seu σῆθος nomen etiam
pariter accommodetur, ego hætenus μετακρῆπιον postbrachiale appella-
ui. Postbrachiale itaque Galeno quatuor conformatur ossibus. Eudemo autem & Celso, atque
(ut ex primo de Historia animalium est colligere) Aristoteli etiam, quinque: prout nimirum
pollicis^b primum os, quod quinto brachialis ossi articulatur, hi quidem postbrachiali, Gale-
nus uerò digitorum ossibus adnumerant. Porro nonnulli id postbrachiali ascribunt, quòd in
eodem ferè cum cæteris postbrachialis ossibus ordine locatū sit: & non, ut^c prima reliquorum
digitorum internodia, nudum exeratur, sed quodammodo postbrachialis ossium ritu lateat,
uulgoque pollicis tantū duo ossa tribuātur, quamuis interim id pollicis os postbrachialis ossibus
& breuius sit, & ipsis nō æquè atque illa, inter se conterminū. Præterea & hinc fortassis primum
pollicis os postbrachiali adiungunt, quòd secundum pollicis os, primo eodem ferè^d modo ar-
ticuletur, quo prima digitorum ossa postbrachialis ossibus, quæ simplici sinu illorum ossium
rotunda simpliciaque excipiunt capita. Postremò huc fortassis ducti fuere, quòd nullum tendi-
nem, qui primo pollicis ossi mouendo famulatur, ipsi inseri putauerint: quemadmodum etiam
nulli postbrachialis ossi tendo inseritur, qui illius priuato motui præsit. Complures enim mu-
sculi latuerunt alios dissectionū professores, qui primo pollicis ossi peculiariter implantantur.
Galenus uerò (quem etiā ut minimum^e tres quatuorue eius internodij musculos præterisse,
in secundo libro auditurus es) primum pollicis internodiū digitis, quibus singulis tria tribuit
ossa, connumerat, quòd id suprā infraque per ἀνέλεσσιον, hoc est laxam, & quæ manifestum mo-
tum edit articuli speciem articuletur: suprā quidem brachiali, infrā uerò secundo pollicis ossi:
& interim quatuor postbrachialis ossa, infrā tantum quā digitis committuntur, ea articuli spe-
cie coniunguntur. Suprā enim, uel Galeni suffragio, postbrachiali per συνωλεσσιον coarticulan-
tur: hoc est differētia articuli, qui perquam obscurum, & quem sentire uix queas, motum osten-
dit. Ita enim arbitror Galenum synarthroseos nomine in Capite libri de Ossibus decimo no-
no usum. Quandoquidem haudquaquam existimandum est, Galenum adeò perfunctoriè
postbrachialis ossa uel in simia, uel cane intuitum esse, ut aut futura, aut clauu ritu, aut har-
monia, hæc ossa brachiali coarctari uoluerit. quamuis illa ipsius esset sentētia, si illum sui dogmatis
non oblitum hinc dixerimus, quod initio libri de Ossibus synarthroseos species enumerans dif-
fusè exequitur. Vt ut uerò sit, quò rectius nos Galeni sententiæ accommodemus, quatuor qui-
dem postbrachialis, quindecim autem digitorum ossa, semper enumerabimus. Sunt itaque post-
brachialis ossa reliquis digitorum ossibus longiora, & magna ex parte teretia. Longissimum in
dici præponitur, atque ita sensim fiunt breuiora, ut omnium facile breuissimum tenuissimumque
paruo præponatur digito. Omnia^f suprā^g infraque appendice donantur, & superior quidem
(cuius cōnexus etiam in pueris aliquando latet) brachialis ossibus, uti antea diximus, coarctā-
tur, ipsaque ossa hinc externa sede nonnihil latiora quàm interna sunt, ut postbrachiale unā cum
brachiali superficiem exterius gibbam, intus uerò cauam aptius hinc efformaret. Quin etiam ap-
pendices hæ lateribus se inuicem cōtingunt, & cartilaginei ligamenti internētū inuicem alligan-
tur. Inferiores uerò appendices grandes quoque sunt, & in rotundū ac ab externa manus sede in
internum oblongū caput desinūt: quod cartilagine obductū, primi digitorū ossis sinum subin-
trat. Hæ appendices lateribus se etiā contingunt, sed non adeò pertinaciter atque superiores, quæ
brachiali coarctantur. nihilominus tamen quā inuicem respiciunt, sinuatae sunt, ligamentaque car-
tilaginea educunt, quorum opera ualide connectuntur. In medio autem ductu, & secundum
postbrachialis longitudinem, quoniam ossa suis appendicibus multo tenuiora sunt, inuicem
dirimuntur, & digno notatu^h interuallō inuicem dehiscunt. atque id magni cuiusdam usus gra-
tia, in quolibet enim trium interuallorum, quæ quatuor postbrachialis ossa constituunt,ⁱ duo
reponuntur musculi ex octo illis, qui primū quatuor digitorū os flectunt. Quemadmodum
itaque singulos digitos, duo illorum musculorum accedunt: ita etiam cuique postbrachialis
ossi duo attenduntur, atque in tribus interuallis sex collocantur. ad internum uerò latus post-
brachialis ossis indicem sustinentis, septimus protenditur. externo autem lateri ossis paruo di-
gito præpositi, octauus exporrigitur. Verum quum hi musculi suo ductu, horum ossium lon-
gitudinem uix superent, interuallaque hæc non tantum distent, ut sufficiens musculorū moles in
ipsis collocari queat, postbrachialis ossa meritò intus, ubi uolam constituunt, caua uidentur,

ut

d 1, 2 figur.
cap. 25 l. II,
III, IIII. &
integrarum
r.

b 1, 2 fi. ca.
25 A. ad chi-
ra. s.
c 1, 2 fig. ca.
25 D.

d 1 fig. cap.
27 C, D.

e 7 muscu.
tab. chara.
1, 2, 3. dein
6 tab. n.


f 2 fig. cap.
25 Q.
g eadem fi.
R. atque ita
reliqua de
inceps illinc
pete, primā
figuram se-
cundæ com-
parans.

h 1, 2 fig. ca.
25 S.
i Intuere 8
musc. tabu-
lam sub. Δ,
& 12 ta. m.

ut & hîc quoque musculorum portio tutam aptamq; sedem nancisceretur. In externam autem ossium sedem muscoli nihil prominent, neque inibi ossium gibbum uel minimum excedunt, parem cum ossibus superficiem constituentes. Quinetiam ut ulnam radiumq; attensis ipsis musculis cedere ostendimus, ita etiam postbrachialis ossa secundum longitudinem angulosa, & lineis quibusdam pulchrè extuberantia cernimus, pro musculorū uidelicet, qui ipsis exporriguntur, ratione: uti etiam non minus superiori sede eleganter exasperantur, ut opportunam^k trium brachiale flectentiū musculorū insertionem excipiant. Neq; id solum postbrachialis ossa cum radio ulnaq; exigunt cōmune, uerū etiam intus oblongum^l sinum medullæ reponēdæ aptum sibi uendicant. Porrò postbrachiale iustissimè quatuor ossibus efformatum esse, quatuor qui ipsis stabiliuntur digiti liquidò commonstrāt. quibus quintus ueluti opponi debuit, si modò manus commodum futura erat apprehendendi organum. At satius iam quoque fuerit, digitis peculiare Caput consecrare.

DE MANVS DIGITIS. CAP. XXVII.

DIGITORVM ossium seriem duæ priores figuræ ad initium uigesimi quinti Capitis repositæ commonstrant: quemadmodum & tres integrum ossium contextum exprimentes tabulæ, ad huius libri calcem locandæ. Tabula autem hic inserta, ac in tres ueluti figuras (ut singulæ duo proponant ossa) digesta, digitorum articulos oculis subiicit. Harum enim prima, duo exprimit ossa: quorum alterum *A* insigniui, estq; postbrachialis os indicem sustinens. alterum *B* indicatur, estq; primum indicis os ab externa sede, quemadmodum & illud postbrachialis os, delineatū. Præsenti itaq; figura primi digitorum articuli effigies proponitur. *C* enim caput rotundum notat postbrachialis ossis. *D* uerò sinum primi indicis ossis caput *C* insignitum excipiens.

PRIMA FL. SECVNDÆ. TERTIÆ
GVRA.

Secunda figura primum indicis quoque os indicat, *E* notatum: & secundum pariter *F* insignitum: ut horum ossium delineatio secundi quatuor digitorum articuli speciem oculis subijceret. *G* itaque & *H* duo indicant capitula primi indicis ossis. *I* uerò & *K* sinus secundi ossis, quos duo capita primi ossis subintrant. *L* autem sinum significat, in medio capitum primi ossis consistentem, ac in quem tuberculum secundi ossis inter duos sinus *I* & *K* notatos prominens, & *M* insignitum subingreditur.

Tertia figura secundum indicis os *N*, & tertium *O*, proponit, tertij cuiusq; digiti articuli speciem ostensura, quam quia penitus secūdo quatuor digitorum articulo respondet, alijs characteribus non oblitterauimus. Verū istas articulorum imagines etiam ex duabus primis uigesimi quinti Capitis figuris petere integrum est.



a1,2 fig.ca.
25. pollicis
ossa A, B,
C. indicis
uerò D, E,
F indican-
tur. qualis
ratio etiam
reliquorum
est.

MNES manus digitos³ ternis constare ossibus, (quæ & internodia, & articuli, & acies, seu etiam *φάλαγγες* & *συνταλίδες* & *κόνδυλοι* uocantur) superiori Capite comprehensum est. Atq; hæc ossa dura sunt ac densa, non tamen (ut aliquando contrà Galeni placitum monuimus) medullæ penitus expertia. Præter id enim quòd suprâ infraq; appendicum modo non nihil fungosa existunt, etiā singulis sinus cōtigit grandior, medullæ asseruandæ gratia, ut & in postbrachialis ossibus, paratus. Quòd uerò digitorum ossibus ad actionis robur in apprehendendo, & eisdem pluribus propter uarios qui manibus fiunt motus, ac eorum quæ illis apprehenduntur differentiam indigamus, neminem latere arbitror. Deinde quòd neque plura ossa, neque pauciora tribus fieri, digitis omnino ex usu fuit, uel hinc promptissimè colligitur, quoniā si illum excederēt numerum, præterquam

Singulos digi-
tos tribus ossi-
bus merito for-
mati.

L quòd

*Iuxta ossium
magnitudo.*

*Decens ossium
& integrorum
digitorum for-
ma.*

quod nulli auxiliarentur functioni (abundè enim omnes trium ossium ope obinus) perfectam ualidamque digitorum extensionem uitarent, hanc minus firmam, quam nunc sit, efficientia. Ex pluribus nanque constructa partibus læuiori negotio fatigantur, lassantur, & à suo robore exoluuntur, quam quæ paucioribus efformantur: tunc præcipuè, quum omnes particulæ simul coniunctæ commissæque (ut brachialis ossa) in uniuersis ipsarum munijs, reseruari nequeunt. Verum si paucioribus ossibus digiti constituerentur, in tot tam uarias pugnantesque figuras digitos agere nequiremus, ut igitur uariè mouerentur, patiendi que promptitudinem declinarent, trium ossium numerus sufficit. Quandoquidem autem prælocatum os postposito, aut uehens uecto, maius esse operæ precium est, meritò Natura quoque, primum cuiusque digiti os grandius secundo, & secundum rursus os tertio minus fabrefecit, non solum inferiora ossa longitudine, sed & crassitie, & latitudine minuens, hacque ratione potissimum digitos ex ampliori basi sensim in mucronem coarctans: & digitorum formam, quam in mulieribus pulcherrimam ducimus, extruens. Quanquam rursus mirabili industria non eandem figuram digitorum ossibus, & digitis adhuc unguibus cuteque obtectis largiatur. Totos enim digitos paulo minus toto teretes efformauit, quod eiusmodi figuram reliquis omnibus iniurijs minimum obnoxiam sciret: ut quæ nulla extuberet eminentia, à foris occurrentibus frangenda collidenda ue. Quod enim digiti extrinsecus quidem accurate gibbi sint, intus uerò ac in lateribus magis compressi, alicuius etiam usus occasione factum putato. Interna nanque ipsarum regione digiti molliunt, subigunt, terunt ac apprehendunt: quæ omnia deterius fierent, digitis inibi gibbis existētibus. ut interim præteream duriusculam neruisque oppletam adipem, internæ digitorum sedis, eorum quæ iam dicebamus officiorum causa, & tendinum defendendorum occasione, subtenfam, atque in secundo libro prolixius priuato Capite enarrandam. Porro quum externa digitorum regione neque horum aliquid tentemus, neque alio quouis munere fungamur, rationi consonum fuit, digitos ad solam patiendi pertinaciam examissim gibbos construui. Quum autem digiti in lateribus minus essent iniurijs obnoxij, quumque inuicem adducti, constringi, ac in ipsorum medio nullam sedem uacuam relinquere debebant, ipsos in lateribus gibbos fieri haudquaquam ex usu erat. Atque his quæ modò diximus pollex paruusque digitus cum indice satis suffragantur, siquidem ille utrunque latus, sed magis internum gibbum adipiscitur, paruus autem externum duntaxat, index uerò contrà internum: quod his sedibus ab aliquo non tutantur. adeo, ut non minimam Naturæ solertiam in totius digiti figura uideamus: à qua quantum ossa discrepent, iam enitar exequi. Nullum digitorum os se offert, quod non supra infraque crassius & spissius sit, quam secundum ipsius longitudinem: id quod etiam omnibus ferè longis ossibus commune cernitur, quæ ad articulationem perpetuò crassescunt, augenturque. Si enim undique pari constarent crassitie, animanti pondere moleque admodum incommodarent, ipsique articuli, nisi amplioribus basibus concinnè adaptarentur, penitus infirmi essent. In hoc igitur primum forma ossium à totius digiti figura differt. Si enim digitus in lateribus ossium imitaretur imaginem, quemadmodum in macilentis ac parum obesius uidere est, inter digitorum latera uacua confisteret sedes, quæ liquorem digitis complecti non mediocri incommodo prohiberet. Impletur uerò hæc ossium sedes duriuscula illa adipe, cuius paulo prius obiter meminimus. Deinde unumquodque digiti os externa sede teres & gibbum est, nullibi insigniter, neque etiam in articulorum regione, extra rectam lineam protuberans, uti etiam in lateribus ossa non admodum circa articulos prominent. si modò primum pollicis os hinc exceperis, quod externa sede amplum magis planumque & depressum, non autem aliorum modo gibbum uisitur. Ad hæc, tertia digitorum ossa sede externa quidem gibba sunt, sed ab ipsa articulatione qua secundis articulantur ossibus deorsum ducta, non ita atque reliqua ossa extrorsum protuberant, sed ungui quodammodo cedunt, tanto enim minus prominent, quantam sedem unguis occupant, quo minus scilicet integer digitus in tertio osse procerius, quam in reliquis, extrorsum exurgat. Interna cuiusque ossis sedes nihil minus quam gibba est, sed depressa prorsus, & sinuata potius, multò aliter quam externa digitorum sedes: dum modo & hinc quoque primum pollicis os seduferis, quod brachialis ossibus interna ipsius sede respondet. Nam et si supra infraque ad articulorum sedes in internam manus regionem magis protuberet, & in medio ductu inibi sinuatum, exterius autem curuatum conspiciatur, non tamen reliquorum digitorum ossium modo, amplum depressumque & planum est, at potius gibbum, magisque intus quam foris acutum. Quod sanè Natura haudquaquam fortuito casuque machinatur. secundi enim & tertij pollicis ossis internæ sedis, quemadmodum & tribus quatuor digitorum ossibus^b teretes tendines exporrigi debuerunt, qui profecto nisi ossium interna sedes ampla depressaque & ueluti sinuata esset, in ossibus nequirent subsistere: non magis quam teretia corpora inuicem nunquam inniti cernimus.

*Hic cernitur
nunc figura
ras inuere
quibus di-
gitorum os-
sa exprimi-
tur.*

*b Manus ex-
trema & mu-
sculorum
tab. & dein-
6 & septi-
ma hic sunt
consulendæ.*

Neque etiam teretes illi tendines, ipsis duntaxat applicari debuere. imò operæ præcium fuit, & ex hac ossium sede^c ligamentum enasci, secundum longitudinem ossium tendines illis ossibus committens, ipsosq; ne ab osse exurgant declinent ue complectens. Cuiusmodi uerò tendines ossibus exporrigantur, quæq; ligamenta ipsis obducantur, in secundo libro affatim recensēbimus. in præsentī autem, tantum illorum meminisse sat sit, quantum ad ossium constructionis rationem enarrandam expedit. Per secundū itaq; pollicis ossis longitudinem interna sede eius generis ligamentum enasci, eo libro audies, tendinem^d musculi deducēs, qui tertio pollicis ossi ualidissimè inferitur, ac eius articuli flexus autor est. Verum quia eiusmodi ligamentū Natura nullum in primō pollicis osse condidit, neque periculum est, tendinem hac ad tertium pollicis os prorepentem aliquò aberraturū (ut qui undique^e musculis primo pollicis ossi proprijs contineatur) haudquaquam necessum fuit, primum pollicis os aliorum ossium modo planum depressumq; interna sede extrui, præcipue quum & id musculis ipsi attensis insertisq; in idoneum extitisset. Primis uerò quatuor digitorum ossibus^f duo inuicem incumbentes porriguntur tendines, quorum unus secundo inferitur ossi^g; alter uerò, qui succumbit, tertio implanta-
tur: adeò ut tribus horum digitorū ossibus eiusmodi uehantur tendines, eiusq; generis ligamenti qui tendines anulorum ritu transmittunt, digitorum ossa donentur: præcipue autem prima & secunda quatuor digitorum ossa, & pollicis secundum. Tertijs enim non secundum totam longitudinem tendines exporriguntur, unde etiam neque ita ut inferiora uidentur depressa & plana. Æquum igitur fuit, hæc ossa non secus formari, quàm si una pars teretis corporis diuisi essent, tendines uerò ipsis exporrecti altera eius corporis pars, ut scilicet ossa simul cum tendinibus teretem digiti imaginem constituent.^h Externæ enim digitorum sedi eiusmodi nulli deducuntur tendines, at membranæ modo totī ossium longitudinē tendines ibidem duntaxat adnascuntur. Latera etiam ossium nequaquam digitorum ritu compressa lataq; sunt, neque ulla pollicis paruiq; digiti ac indicis ossium, hac ex parte cum reliquorum digitorum ossibus, est differentia. Respondent enim ossium latera, teretis corporis dimidiæ partis lateri. quamuis interim ab hac figura primum pollicis os tantum discrepet, quanto minus reliquis digitorum ossibus interna sede compressum amplumq; cernitur. Atque huiusmodi digitorum ossium est forma, longè profectò alia quàm Galenus ipsis tribuit, eam ad digitorū imaginem describens. Verum iam tempestiuum erit, Naturæ providentiā in digitorum articulis contemplari: neque obiter Galeni orationi acquiescere, qua superioris ossis caput in subsequenti sinum subire, ac exteriora sinuum supercilia insignius quàm interiora exporrigi seu extuberare simpliciter pronūciat, eandemq; articulationis speciem omnibus digitorum articulis ascribit. Vt modò nihil dicam de tendinibusⁱ musculorum, qui digitos in latera ducunt, & à Galeno non minus secundis ac tertijs digitorum articulis, quàm primis, communes censentur. quum interim nunc facile simus ostensuri, neq; tertium pollicis articulum, neque aliorum digitorum secundum aut tertium articulos, primario motu in latera agi. Primum itaque pollicis os, quinto brachialis ossi^j rara peculiariq; committitur articulationis specie, quæ & flecti, & extendi, ac dein moueri in latera potest: in eumq; modum parata est, ut priuatim magis motui qui in latera perficitur, quàm flexioni extensioniq; subseruiat. Quintum enim brachialis os amplum exigit sinum, qui transuersim ampliori tubere prominens, interiori exterioriq; sede insignius, quàm in lateribus, cælatur. Primum autem pollicis os superius transuersim, seu secundum internum ac externum latus insculpitur, & interius exteriusq; protuberās quinti brachialis ossis sinui eleganter cōgruit, & quasi mutuo ingressu ipsi articulatur. non tamen adeò insigni, ut id uno tantum agatur motu, reliquorum articulorum mutuo ingressu, nexorum ritu. Verum quum interna primi pollicis ossis sedes magis quàm externa promineat, & quinti brachialis ossis sinum altius inibi insculptum, profundius subeat, id primū pollicis os magis flecti quàm extendi potest. ^k Secundum pollicis os primō ea articuli specie articulatur, quam *συνεχθωσις* Græci uocant. Inferior enim primi pollicis ossis pars in rotundum quasi capitulum desinit, rotundum secundi ossis sinum subiens. Sed quia caput id transuersim, hoc est ab interno pollicis latere ad externum magis protuberat, ac ueluti transuersim oblongū est, in lateribusq; uix magis quàm in centro deprimitur, ac demum secundi ossis sinus huic capiti ad amussim aptatur, secundum pollicis os flectitur potius & extenditur, quàm in latera inclinatur. quum interim æquè in latera duceretur, si capitulum primi ossis ad amussim rotundum esset, & in lateribus æquè ac in anteriori sede compressum. Dein articuli etiam ratione (quum capitulū in interna sede ualde deprimatur) secundū os maxime ac in acutissimum angulum flecti deberet. uerum quo minus id fiat, duo hīc obstant^l ossicula sesami seminis imagini à Græcis assimilata. Quod uerò secundū pollicis os uix extra rectam lineam extendi queat, caput primi ossis in cau-

Primo de V^o
su part.
Ossium digi-
torum articu-
lationis ratio.

Primo de Ad-
ministr. dissect.

Primi polli-
cis ossis ad bra-
chiale nexus.

Secundi polli-
cis ossis cum
primo articu-
li species, ip-
siusq; motus.

*Tertij polli-
cis ossis cum
secundo arti-
culationis ratio.*

*Primi, secundi
& tertij arti-
culationū qua-
tuor digitorū
forma.*

*IOAN. CEN-
TVRIONIS
mobiles ac ele-
gantes digiti.*

*Tertij ossis
digitorum pro-
cessuli.*

*Quinq; digi-
tos iure fa-
ctos.*

*Digitorum
dignitas.*

sa est, inibi adeò leuiter depressum, hicq; (ut & in lateribus) æqualiter propemodum atque in ipsius centro protuberans. Quàm uerò affabre, quibusq; rationibus Natura hæc moliatur, nihil sanè promptius nos edocet, quàm pollicis officia, quæ post cognitam ossiū constructionem longe plura primo intuitu spectantium animis suggerunt, quàm prolixè aliquis multas in hoc chartas oblitterans, persequi possit. Secundū pollicis os tertio ossi, secus quàm primū ipsius os brachiali, & aliter quàm secundum primo, committitur. Inferior nanque secundi ossis pars, in duo capitula bipartitur, quadamtenus orbiculata, & in medio sinu oblongo dirempta, qui non minus quàm ipsa capitula cartilagine incrustatur. Superior uerò tertij ossis sedes duos obtinet sinus, tubere quodam oblongo disiunctos. Sinus hi, duo secundi ossis excipiunt capitula. ipsum autem tertij ossis tuber sinum subingreditur in secundi ossis capitulorum medio cauatum. atque hac ratione secundum os in tertium subit, uicissimq; tertium os excipit. ac mutuo ingressu ambo ossa tam scitè coarctantur, ut duntaxat tertium os extendi flectiq; queat, nequaquam uerò, uel minimū etiam, in latus ducatur. Quòd autem tertium os in angulum flectitur, & interim nō ultra rectam lineam extenditur, sed potius à flexione duntaxat erigitur, capitula sinusq; articuli in causa sunt. Capitula enim, quibus sinus ad amissim respondent, in interiora magis quàm exteriora feruntur, deprimunturq; : ac in externam sedem adeò obscure porriguntur atque consistunt, ut inibi uix capitis speciem ostendant, itaq; tertium os in posteriora inclinari prohibeant. quemadmodum etiam ipsi articulo cōducere tunc discimus, quum ipsius in flexu usum perpendimus : & unā colligimus, quibus modis articulus ipse infirmaretur, si æquè extendi, duciq; in latera posset, atque iam magna Naturæ prouidentia flectitur. Huiusmodi sanè articulationis specie reliquorum digitorum secundi tertijq; coarctantur articuli. Primus autem ipsorum magna ex parte, uti antea quoque monuimus, secundo pollicis articulo conuenit. Verum longè magis illo in latus ducitur, non tamen adeò insigniter atque flectitur. Postbrachialis enim ossium capita, in interiora multum porriguntur, deprimunturq; : in lateribus autem non admodum lateſcunt. sed modicè tamen etiam inibi deprimuntur : adeò ut promptior sit flexio, quàm aut extensio, aut in latus ductio. Quanquā rursus index & paruus in primo articulo priuatim id sibi uendicent, ut magis medio & anulari in latus ducantur, id quod potissimū ex capitis postbrachialis ossis, in lateribus compressione euenit. Quòd autem quatuor digitorum primi articuli, uix in æquè acutum angulum ac secundi & tertij articuli flectantur, nō ipsa postbrachialis ossium capita in causa sunt, ac si minus interna sede deprimerentur : sed ^m exigua quædam ossicula, quæ sesami seminis imagini comparantur, hoc præstāt, quia & articulum firman, ac ne plus æquo laxè flectatur, prohibent. Dein primi digitorū articuli reflectuntur extenduntur ue magis, quàm cæteri, quòd brachialis capita etiam externa sede compressiora cernantur, quàm digitorum ossium capita : quæ in nonnullis hominibus eo magis articulos extendi sinunt, quo externa sede impensius comprimuntur. Videmus enim quosdam non prima tantum digitorum internodia insigniter extrorsum inflectere, uerum & reliqua omnia, ac potissimū tertia. Cuius rei specimen pulchrè reddit, summæ spei accuratissimiq; iudicij adolescens, generis præterea nobilitate ac ingenuis moribus singulariq; bonarū literarum ac uariarū disciplinarū eruditione cum primis clarus, IOANNES CENTVRIO GENVENSIS, qui digitos (quos habet egregiè teretes, longos, & ad omne artificium quàm maximè idoneos, ac perelegātes) in posteriora adeò mirificè intorquet, ut illis aquam, perinde atque nos uola, continere queat : Quanquam is non digitorum modò articulis, uerum & alijs totius corporis, ac potissimum costarum ad thoracis uertebras, miram laxitatem nō mediocri robore iunctam, ostendat. Atque huiusmodi ferè digitorū est articulatio : quæ etiam haud difficulter attestatur, digitorum ossa iuxta articulos meritò crassiora euasisse, quàm in reliqua ossium longitudine. Quòd autem tertium os inferiori sua sede, qua nulli alteri coarctatur ossi, etiam protuberet, asperumq; capitulum duobus quasi unculis donatum obtineat, ideo impri- mis accidit, ut toti internæ huius ossis sedi ⁿ tendo qui ipsum flectit adnascatur, ac demum suo sine in ossis apicem ualidissime inferatur. est enim is tendo omnium digitorum reliqua ossa mouentium facile maximus, robustissimamq; insertionem tentans. Porro quinq; digitos oportuisse fingi, inuentu nequaquam arduum est, si expendamus, ad quæ officia digiti nobis ex usu sint. Si enim pauciores essent, permultæ actiones imperfectius obirentur, pluribus uerò in nulum usum indigemus. Quòd autem si pauciores formarentur, pleræq; actiones interciderent, promptè assequemur, si singulos priuatim sermone pertractemus. Pollice nanque (quem reliquis quatuor opponi expedit, quiq; ob id Græcis *ἀντίχειρ*, quasi promanū dicas, nuncupatur) deperdito, omnes cæteri potestate interciderent, quum absque huius ope illos nihil agere, uel iudices ipsi doceāt, qui furibus pollicem quo potissimum crumenæ aut loculi præscinduntur,

non

*Immitte
hic 2 figure
G, & H in
I, K. ac M
in L.*

*Hæc scri-
tim figuræ
proponūt,
huic Capiti
præfixæ.*

*m 1 fi. cap.
25 V, V.*

*Hæc refer
ad 1 & 2 fi-
guræ ca. 25
apices.
n 6 muscu-
tab. tendi-
nes muscu-
li = & n.
dein 7 tab.
c, b.*


non minus quàm aurem amputare solent. Ac eadem ferè ratione etiam Athenienses *Æginetis* qui classe ualebant, pollicem præcindi decreuerunt. Reliquorum uerò digitorum, index ac medius, quemadmodum post pollicem situ, ita etiam usu secundi sunt. Parua enim corpora his apprehendimus, omniumq; artium opera ipsis præcipuè confici cernimus: & si quid uiolentius operamur, illos potissimum in opus asciscimus. Anularis & paruus, minorem quidem alijs usum præbent, at is nihilominus in his cernitur, in quibus amplectendum corpus circulo comprehendimus. Si enim id humidum & exiguum fuerit, digitos ad amussim constrictos ipsi circumflecti expedit. quo in opere paruus quoque est accōmodus, operculi modo alijs adiectus. porrò si aliquod durum corpus tanta mole constet, ut digiti inuicem impenſe dirempti disjunctiq; id complecti debeant, præterquam quòd id pluribus digitis aptè comprehendì, pluribusq; suis partibus digitos accedere committiq; cernimus, promptè etiam expendimus, quantum homini ex usu fuerit digitos ad latera inuicè adduci abduciq; plurimum potuisse. Pollex enim intus eiusmodi corpus amplectitur, reliquis interim digitis externæ sedi circumductis, totoq; corpore in eum modum orbiculatim comprehenso. Quod si fit, quis ignorat plures quinque digitos prorsus fore superfluos, quum quinque ad id munus sufficere nouerit? Quamobrem uerò digiti inæquales extruantur, mediusq; longitudine cæteros uincat, hinc colligitur, quòd digitorum extrema ad æqualitatē pertingere satius sit, quoties molem aliquam grandiore in ambitu cōprehendimus: quumq; in ipsis liquorem, aut exiguum aliquod corpus continere studemus. Grandioribus enim corporibus ualide apprehendendis, retinendisq; uel fortiter emit tendis abijciendisq; æqualis undiq; apprehensio plurimū confert. Cōspiciuntur enim in unam circuli circumferentiā quinque digiti cōcurrere, si quando illis corpus exquisitè sphæricū amplectimur. Præterea ad manus accuratè occludendas, quādo uel exiguum corpus uel humidum ad amussim cōtinere animus est, digitorū inæqualitas usum præstat manifestū: atq; huic functioni non mediocriter pollicis situs conducit. Pollicē namq; quū cæteris digitis in officio opponitur, ipsis quoq; situ opponi necessum fuit. At si ex opposito prorsus locaretur, mediam brachialis regionem sibi uendicans, à pluribus sanè functionibus manum impediret: ac imprimis eas interciperet, quas seorsum alterius manus uola, aut simul utriusque uolis obimus. ac proinde ex transuerso ipsum oportuit reponi, & plurimum ab alijs disjungi adiungiq;. Quum uerò transuersa manus regio ad indicem æquè, atque ad paruum digitum, consistit, propter indicem locari pollicem potius fuit, ac (uti superius commemoratum est) inferiori brachialis ossium ordini laxè articulari. Oportebat enim manus indicibus ad inuicem conuerti, auerti autem paruīs digitis, quinetiam in extremis digitorum flexionibus paruus digitus nullā sedem finit uacuam, index uerò non paruam, quæ pollicis beneficio occludi obturariq; modo operculi potest.

*Digiti cur
inæquales.*

*Pollicem pul-
chre esse situm*

DE OSSICVLIS, QUAE SESAMI semini comparantur. Caput XXVIII.

HVIC Capiti præcipuè famulatur prima figura uigesimo quinto Capiti præposita, & internam summæ manus sedem unā cum ossiculis hoc Capite describēdis cōmonstrans: ad characteres nimirum *N, T, V, V, X & Y*. quorum etiam *N & T*, in secunda eius Capitis figura cernuntur. Item huc impensè facit secunda figura trigesimo tertio Capiti prælocanda, ad characteres *μ* (quod etiam inibi in prima uisitur figura) *ψ, ω & **. Quin etiam figuræ integram ossium compagem referentes, hæc ossicula *k* notata propomunt.



Cæterū priuatim hac tabella duo delineantur ossicula, primo pollicis in pede internodio subiecta, ac in nuper dicta figura *ω & ψ* insignita. ac *A* qui dem hic notat interioris ossis inferiorem sedem, terræ innitentem: *B* eiusdem ossis superiorē sedem, quæ caput spectat pedij ossis pollicem sustententis. *C* exterioris minorisq; ossis humiliorē sedem indicat: *D* uerò superiorem.



a Videntur hæc illis figuris, quæ in cap. initio recensui.

D I S S E C T I O N V M professores quorundam^a ossiculorū meminerunt, quæ quidem articulos implere, stringere, ac quò minus luxationi redderentur obnoxij, firmare docent. at interim in quibus nam reponantur articulis, quibusq; sedibus adinueniantur, neminem scripsisse scio. Quapropter etiam non inopportunè faciam, si modò quibus nam in locis eius generis ossicula repererim, hîc subiecero: unumquemq; interim admouens, ut etiam in pluribus articulis, quàm ego iam enarraturus sum, eadem inquirat. Sensim nanque & temporis successu illa in pluribus obseruauī articulis, quàm prima

*Quibus sedi-
bus sesamina
ossicula repo-
nantur.*

In manu.

fronte mihi occurrere. Primum itaque in interna sede secundi pollicis articuli, quo primum ipsius os secundo articulatur,^b duo reponuntur ossicula utcunque rotunda, & solida, & non multum ab orizæ seminis forma discedentia. sunt enim paulo quàm semen ipsum breviora, ut oryzæ semen una parte depressum uisitur, sic & horum ossiculorum pars depressa, modo diceq̃ cauata, & cartilagine ea parte incrustata est, qua primo pollicis ossi ambo cōmittuntur. Incumbunt enim primi ossis capitis internæ sedis ad ipsius capitis radicem, & ubi id primum cartilagine obduci læuigariq̃ incipit, ac unum ossiculum latus externum interioris sedis capitis, alterum uerò internum latus eiusdem sedis occupat: & utraque per illorum, quo inuicem dirimuntur interuallum^c tendinem ferri sinunt, tertium pollicis os flectentem. Quum uerò hæc ossicula illi pollicis ossi ualide colligentur, externa parte gibba sunt, & ossium sedem referunt quæ ligamenta educit, tendinumq̃ insertionem excipit. Ad hunc sanè modum, in primis reliquorum digitorum internodijs^d duo quoque ossicula reperiuntur, eodem situ posita, tantoq̃ pollicis ossiculis minora, quanto ad paruum digitum propius accesseris. Illius enim primo articulo, aut potius capiti postbrachialis ossis paruum sustentis minima & quodammodo cartilaginea adnectuntur ossicula. Reliqui autem digiti medio se habent modo. Præterea in senibus & ossis (ut sic dicam) hominibus^e unicum ossiculum aliquando in interna sede tertij pollicis articuli positū animaduerti, quod^f sinui capita secundi ossis dirimenti, in interna sede præponebatur. Huiusmodi etiam^g ossiculum nōnunquam in singulis digitorū secundis & tertijs internodijs mihi occurrit, sed adeò exiguum ut uix milij seminis magnitudinē æquet. adeò ut nisi in repurgandis ossibus accuratissimè cauēris, id (quemadmodum etiam à primis articulis) unā cum ligamenti abijciatur, neque unquam se spectandum offerat. Huius etiam generis^h ossiculum notatu dignæ magnitudinis illic plerunque obseruatur, ubi postbrachialis os paruum digitum suffulciens, octauo brachialis ossi articulatur. atque ita manus extremæ ossicula se habent. In pede autemⁱ unum similiter inuenimus, ubi pedij os paruum digitum sustinens tesseram imitanti ossi coarctatur, illi prorsus respondens, quod postremo loco in manu recensui. In primis uerò pedis digitorum articulis huiusmodi^k ossicula difficulter, præterquam in pollice obseruantur. in senibus tamen, quod maiuscula sint, promptius se offerunt. In secundis autem & tertijs articulis, illa nunquam inueni, præterquam in secundo pollicis internodio, cui grande satis^l ossiculum subiicitur. Quanquam quæ primo pollicis internodio subiiciuntur, multo insigniora ossicula sint, & horum rursus internū externo longe grandius. Hæc quæ capiti pedij ossis (quod pollicis primi ossis sinum subire dicemus) cōmittuntur, leuiter sinuata sunt, & cartilagine incrustata, illius capitis gibbo pulchrè conueniūt. Inferiori autem sede, qua terram spectant, orbiculata sunt, & dimidiæ parti emundatæ pisæ non absimilia. Hæc profecto longè sunt solidissima, & præterquam quod primo pollicis præficiuntur articulo,^m tendinem muniunt, quo secundum pollicis os flectitur. Ipsa enim utrinque ad tendinis latus protuberantia, quo minus à pedis in terram innixu tendo comprimatur, eleganter præcauent. Atq̃

*In pede quæ
ossicula habentur.*

Ossiculū magis ac occultæ philosophiæ sectatoribus familiare.

Albadaran.

alterum horum ossiculorum illud est, cuius magi & occultæ philosophiæ sectatores adeò prolixè meminerunt, quando in homine os quoddam esse tradunt ciceris imagini respondens, nulliq̃ corruptioni obnoxium, quod in terra post mortem reconditum instar seminis hominem in extremi iudicii die producturum affirmant. Est sanè utrumque os, sed potissimum exterius, mundato ciceri perquam simile, si modò id ad mediam ciceris partem referas: aut si utrumque os iunxeris, integrum cicer effeceris, quantum scilicet ad imaginem spectat. Dein in grandioribus hominibus internum id ossiculum etiam tantum est, ut tessera ex ipso promptè pareatur. In hoc tamen ab Arabum illorum commentis ossicula hæc differūt, quod aliorum ossium modo frangantur, exuranturq̃: quanquam sanè corruptioni admodum reluctantia, ac ut prius dictum est, solida sint. Dogma autem, quo ex eiusmodi ossiculo hominem, cuius nunc immensam narramus fabricam, propagandum contendunt, Theologis disceptandum relinquimus, qui sibi solis liberam de resurrectione animarumq̃ immortalitate altercationem & sententiam uendicant. Atque illorum etiam causa nunc de mirabilibus occultisq̃ dextri pollicis interni ossiculi uiribus nihil subiiciemus, quantumuis etiam suspēsi furis, ac interdum simul amatoris, uel ex publicis sectionibus eius ossis melior nobis suppetat copia, quàm illis tribus apud Venetos truculentissimis scortis, quæ nuper huius ossiculi, cordisq̃ pueruli uirginis masculi, comparandi gratia, infantem trucidarunt, uiuoq̃ cor exemerūt, ac (uti erant dignissimæ) flagitij sui grauissimas pœnas dederunt. Porro ossiculum id Arabibus ac uerè occultis tene-

bricosisq̃ illis philosophis, Albadaran nuncupatum esse, superstitiosus quibusdam uiris notius, quàm Anatomes studiosis, est: qui & quartum brachialis os ciceri alsimilare possent.

b 1, 2 figur. cap. 25 T.

c 6 muscu. tab. 9, de in 0.

d 1 figur. cap. 25 V, V.

*e respondet illi quod * notatur fi. 2 cap. 33.*

f 2 figur. cap. 27 L.

g 1 figur. cap. 25 X, X.

h 1, 2 figur. ca. 25 N.

i 1, 2 figur. cap. 33 u.


k 2 figur. cap. 33 u, u.

*l eiusdem figur. *.*

m 15 muscu. tab. sub M ossicula uidentur. tendo autem 14 muscu. tab.

PRIMA VIGESIMI- SECVND A.
NONI CAP. FIGVRA.

TERTIA.



TRIVM PRAESENTIVM FIGVRARVM ET EARVND E M CHA-
racterum (quipro Capitis contextus serie mutuò se consequentur) Index.

H I S tribus figuris os delineatur, dextro sacri ossis lateri cõmissum. ac prima quidem hu-
ius ossis anteriorem sedem eo situ exprimit, quo id in sceletò ab anteriori regione inspecto se of-
ferret. quemadmodum in prima figura trium illarũ est cernere, quas huius libri calci subiiciam.
Secunda figura huius ossis sedem undecunq; exprimit, quæ externa est, corporisq; interiora non
spectat, eo nimirum situ quo id os integram ossium compagem ex dextro latere intuenti occurre-
ret. Tertia autem figura opposito situ internam huius ossis sedem appositissimè ostendit. Cæte-
rũ et si omnes harum figurarum notæ priuatim aliquid, ut mox persequar, indicent, ipsis ta-
men obiter integrum quod hic delineatur os, in ilium os, & coxendicis, pubisq; subdiuidere lice-
bit. Vt scilicet in secunda figura à c, per b, ad S: ac rursus in tertia, ab S, per N, ad c lineam
duci fingeres, ilium os à coxendicis offe quodammodo terminantem. Quicquid enim supra hos
habetur characteres, ilium os nuncupabitur. Quod autem inter hos characteres, & in secunda
Φ. figura inter V, per s, & h, ad Φ: & in tertia inter V, per O, & s, ad Φ intercluditur, coxen-
dicis ossis loco nobis erit. Reliqua uerò totius ossis sedes, pubis os appellabitur: quæ scilicet in
secunda figura ad sinistram latus characterum V, s, h, & Φ consistit. In tertia autem ad dex-
trum V, O, s & Φ.

A, B, C, D, E, F, G in 3 Sedes ilium ossis notatur, quæ sacri ossis transuersis neclitur processibus.
ac A quidem, & B priuatim indicant sinus, quos anterior trium superiorum ossis sacri ossium
transuersorum processuum protuberans pars subit. Et B rursus ossis ilium partem indicat, in-
star cultri acutam tenuemq;. C & C oblongum tuber ilium ossis, sacri ossis processuũ oblongo
sinui congruens. D & D longus ilium ossis sinus, qui sacri ossis tuber dorsi spinæ modo protu-
berans admittit. E & F & G sedes ilium ossis, non ad amussim sacri ossis sinibus tuberibusq;
respondens. quanq̃ E & F duo ueluti tubera indicentur, sinus sacri ossis obscure ingrediẽtia.
G autem sinus notatur, qui ossis sacri tuber admitteret, transuersim duos illos sacri ossis sinus

intercedens. At huiusmodi non admodum accurate exprimuntur, quum hæc ossis sedes aspera, inæqualis & effractæ rupis modo uariam se spectandam offert.

H, I, 2, 3 Quicquid ad dextrum *H* & *I* in secunda figura habetur, & in tertia ad sinistrum, portio nem ilium ossis indicat, posterius quàm transversorum sacri ossis processuum amplitudoeducta.

L, R, 3 *R, P* in prima: Querò, *H, R, R, P* in secunda: & *P, L, H, Q* in tertia, Appendix ilium ossis indicatur. Cæterum *L* internum appendicis latus priuatim notatur. *R* uerò & *R* exter num appendicis latus, interno minus compressum. *P* anterioris appendicis extremum, *Q* posteri us appendicis extremum.

K, K, 3 Sedes ad horum characterum sinistrum consistens latus, nono dorsum mouentium musculo prin cipium præbet.

M, N, 3 *O* 3 Tuber, à quo principium decimi femur mouentis musculi pendet. Amplitudo autem, quam *P, L, K, K, M, N, S* in tertia figura notauimus, aut quæ illis characteribus circūscri bitur, principium offert septimo femur mouenti musculo.

T, 1, 2, 3 Sinus in elatiori coxendicis ossis sede cælatus, & sexto ac septimo femur mouentibus musculis unà cum primo crus petente neruo uiam præbens.

S, 1, 2, 3 Tuber externum latus dicti nunc sinus constituens.

X, 1, 2, 3 Tuber internum dicti nuper sinus latus efformans.

Z, Y, 2 Prima in ilium ossis dorso admodum obscure apprens lineæ.

a, b, 2 Secunda dorsum ilium ossis lineæ.

c, f, g, 1, 2 Sinus & acetabulum coxendicis ossis, cui femur inarticulatur. Porro *g* separatim huius sinus sedem notat læui lubrica & cartilagine non incrustatam, altius quàm reliqua sinus superfici es, insculptam.

i, i, 1, 2 Supercilia acetabuli in coxendicis osse cælati.

h, 1, 2 Sedes ubi supercilia intercidunt, ac ueluti sinu quodam insigni donantur.

c, 2, 3 Sedes, qua neruus cæterorum corporis maximus, atque ex pluribus neruis conflatus porrigitur.

d, 2, 3 Processus coxendicis ossis, à quo ligamentum ad sacrum os enascitur.

k, 1, 2, 3 Sinus coxendicis ossis, ad quem decimus femur mouentium musculus, ueluti ad rotulam mirabili Naturæ industria reflectitur.

l, m, n, o, p, q In secunda figura, *l* autem duntaxat in prima coxendicis ossis appendix notatur. ac *l* quidem posterior appendicis terminus insignitur: *q* uerò anterior, *m* autem prima appendicis impressio, *o* secunda, *n* tertia, *p* ad *q* usque quarta.

u, u, 1, 2 Sedes notatur, qua dextrum pubis os, cartilaginis interuentu sinistro coalescit. Sed *u* in prima figura priuatim notat ossis asperitatem, à qua cartilago abscessit. in secunda uerò, externa ei us ossis sedes uisitur, quæ musculorum educendorum occasione aspera est.

r, 1, 2, 3 Pubis ossis foramen, omnium ossium foraminibus patentissimum.

V, 1, 2, 3 Sinus superiori pubis ossis sedi incisus, quo maxima crus petens uena & arteria, ac in uiris se minaria uasa deducuntur.

f, 1, 2, 3 Sinus in elatiori foraminis pubis ossis sede insculptus, ac uenæ & arteriæ, tertioque crus peten ti neruo, uiam porrigens.

t, 1, 2, 3 Hac sede pubis os nonnihil crassescit, ne nimium extenuetur, & in uiris secundum penis muscu lum, & alterum ipsius corpus, educit.

*Lib. de Offi-
bus cap. 20.*

Ilium os.

Pubis.

Coxendicis.



*In lib. de Ar-
ticulis.*

TRANSVERSIS trium superiorum ossis sacri ossium² processibus, utrin que unum connectitur^b os, cui integro nullum nomen Galenus inditum affirmat. Lata enim ipsius, & superior, ac posterior, sacroque ossi commissa pars, Ilium os uocatur: anterior uerò eiusdem ossis pars, qua in pubis re gione cum alterius lateris osse committitur, ampliterque perforatum est, Pu bis os: media autem sedes ad femoris ingressum posita, Coxendicis os ap pellatur. adeo ut unius lateris os non secus denominetur, quàm si tribus propria circumscriptione terminatis ossibus extrueretur: posteriori scilicet, anteriori, & medio: seu ilium osse, pubis osse, & osse coxendicis. Cæterum Cello uniuersum os, coxæ os: auctori uerò Introductorij seu Medici, quemadmodum & Hippocrati nonnunquam *ἰχθυό* (quod est coxēdix) dicitur. quamuis interim & latiore posteriorēque huius ossis partem ilium, anteriorem uerò

pubis

42 fi. ca. 18
à superiori
L per M ad
L. Sinus au
tem tube
raque proces
suū, N, O,
P, Q, & in
dicantur.
b tota 1, 2
3 fi. Integra
rum uero
figurar. o.
Quo modo
autem ho
rum ossium
sedes circū
scribendæ
sint, ex cha
racterū in
dice peten
dum est.
c integra
fig. 1.

pubis os uterq̃, aliorum dissectionis professorum modo nuncupet. Arbitror autem sola nomina sectantium uenia etiam quum alterius tantum ossis latæ partis mentio mihi incidet, Ilium os posse dicere, quum ilis aut ile usurpatu minus frequens sit. His itaque ossibus maxima in usu cum scapulis est affinitas. ut enim scapulæ potissimum articulandis humeris formantur, ita sanè hæc ossa in hoc præcipuè sunt accommoda, ut femora ipsis articulentur, horumq̃ ope homo erigatur, & sedeat. Dein, ut scapula cernitur ampla, uarijsq̃ processibus donata (quo musculis pluribus admittendis, educendisq̃ aptior esset) sic hæc ossa omnem ferè constructionis rationem in eum modum fabricatam ostendunt, ut ab ipsis omnes propemodum femur mouentes musculi pronascentur, præter alios qui ab his ossibus principium ducentes tibiæ, & thoracis, & dorsi motibus famulantur. Cæterum quoniam musculi ab his ossibus enascentur, quiq̃ in ipsa implantentur, orationis series ossium partes enarrans, sensim edocebit. Nunc autem minimè prætereundus est horum ossium usus nequaquam infimus, quo communi ossium modo, reliquis corporis partibus instar fulcrorum subiiciuntur, reliquasq̃ partes continent & amplexantur. Duo enim hæc ossa simul cum sacro osse ueluti peluim quandam efformant, quæ intestina concinnè sustinet, & uesicam, & in foeminis uterum elegantissimè continet, ac demum eas, quas amplectitur partes, tutò munit. Primum itaq̃ ilium ossis, sedes sacro ossi commissa, egregiè uaria est: quemadmodum sacri ossis transuersus processus ea sede, qua ilium ossibus connectuntur, admodum uarios multiplicesq̃ effereulimus. Singulis nanque illorum processuum sinibus, ilium ossis tubera, & eorundem processuum tuberibus, ilium ossis sinus ita correspondent, ut uarijs partibus mutuo ingressu ilium os sacro committatur: non quidem connexu ad motum constructo arbitrarium, aut sinibus tuberibusq̃ læuibus & cartilagine lubrica incrustatis, uerum cōnexu ualidissimo, & in symphysis seu unionis classem quasi referendo. quæ cartilaginosa ligamenti, aut potius puræ cartilaginis interuentu perficitur. Cæterum ossis ilium sinuū, & tuberum quibus id sacro ossi cōmittitur forma, ex sacri ossis descriptione læui negotio petitur. Ut enim transuersos sacri ossis processus primum oblongo sinu donari dictum est, ita etiam ilium os, oblongum tuber sinui congruens obtinet. & quia processuum sinus anterior pars, sinus ue supercilia, satis insigniter protuberant, porriguntq̃, ilium etiam ossi ad anteriorem oblongi sui tuberis sedem sinus insculpuntur, quos protuberantes illæ processuum partes subeunt. Vbi autem humilima eorum sinuum sedes conspicitur, ilium os quasi in cultri modum exacuitur, ut eandem cum quarti ossis sacri ossis transuerso processu superficiem constituat. Rursus oblongo sacri ossis tuberi, quod instar spinæ in processuum sinibus eminere relatum est, oblongus etiam ilium ossis sinus conuenit, tuber id ad amulsim suscipiens. Porro duobus processuum sinibus ad posteriorem dicti nunc tuberis sedem consistentibus, & tuberi transuersim in illorum sinuum medio prominenti, ilium os nō æquè concinnè respondet, quum scilicet non adeò procerè extuberet, atq̃ illi processuum sinus altè cælantur. Neque etiam ilium os, illorum sinuum tuberi, sedem, qua id susciperetur, parat. atque (ut semel dicam) sacrum os ilium ossi non admodum hac sede, ubi duo illi ossis sacri processuum sinus conspiciuntur, conterminum est, sed plurima cartilago ligamenti natura participans, hæc ossa intercedit, totam amplitudinem, qua inuicem ossa dehiscunt, infarciens. Vniuersa igitur ilium ossis sedes sacro commissa, aspera est, ac inæqualis, & insigniter crassa: quemadmodum & reliqua ossa illis sedibus quibus inuicem compinguntur, ampla crassaq̃ ideo esse nouimus, ut ualidiorem amplioremq̃ connexum efficerent. Atque hæc crassa ilium ossis pars in posteriora longè magis quam transuersorum sacri ossis processuum amplitudo, porrigitur prominetq̃: tum quòd ilium os amplissimum latissimumq̃ scapulæ modo esse oportuit, ut femur mouentes & alios plerosque musculos paulo post enarrandos, à se pronasci sinat: tum, ut ad posteriorem sacri ossis sedem aptum cōstitueret locum, à quo quartus hominis thoracem mouentium musculus principium duceret: unà cum dorsum mouentium undecimo, qui simul cum illo thoracis musculo ab interno latere ossis ilium (quà id in posteriora ferri diximus) & ab ossis sacri posteriori sede, originem nanciscitur: similiter ac musculus dorsum mouentium decimus tertius, ab hac etiam ossis sacri, & ilium ossis sede, initium sumēs. Porro reliqua ilium ossis amplitudo planæ semicirculari figuræ non absimilis, superiori sua sede secundum totā semicirculi circumferentiam, appendicem obtinet, quæ ueteribus Spina ilium ossis dicebatur. Ipsi nanq̃ dorsum ilium ossis uocarunt, externam suæ amplitudinis sedem, quia hæc ampla est, & si cum interna conferatur, quodammodo gibba. Appendicis autem sedes extrorsum prominet, ac ueluti illius dorsi spina iure censetur. Verum & si ueteres hæc nomina rectè instituerint, & Galenus quoque eorum nomina, ut & ossis sedium differentiā, apud illos fuisse animaduertit, nihilominus is subinde Dorsum cum Spina in tibiā & femur mouentiū musculorum descriptione

Ossium sacri
ossis lateribus
cōmissorum
usus.

Ilium ossis se-
des sacro ossi
commissa qua-
lis.

Ilium ossis pars
retrosum ma-
gis quam sacri
ossis transuersi
processus
exporrecta.

Ilium ossis ap-
pendix.

Spina.
Dorsum.

Lib. 2 de Ad-
ministr. dissect.

d integra-
rum figur.
A in o.

e 1, 3 integ.
fi. o cū M.
f Petuntur
hæc ex 5 li.
figuris, præ-
cipuè autē
22, 24, 25.
g 3 fi. A, B,
C, D, E, F,
G.

h 3 fi. C, C.
et deinceps
riatum con-
fer cum 2
fig. cap. 18.
i 3 fig. A, B.
k 3 fig. B.
l 2 fi. cap. 18
humilius

L.
m 3 fig. D,
D.
n 3 fig. E,
F deinceps G.

o 2, 3 fig.
H, I.

p 12 muscu-
tab. A.
q 13 muscu-
tab. F.
r 14 muscu-
tab. T, V.

s 1 fi. L, R,
R. 2 fig. H,
R, R, P. 3 fi.
P, L, H, Q.

Quibus mus-
culis appen-
dix occupa-
tur.

Quibus inter-
na ilium ossis
amplitudo.

Sinus coxen-
dicis ossis supe-
riori sedi in-
sculptus.

Sinus tubera.

Quomodo co-
xendicis ossis
robori sit pro-
spectum.
Iliū ossis dor-
si lineæ, & ip-
sum occupan-
tes musculi.

Acetabulum
femori articu-
lando paratū.

ptione confudit: quod nos, quoad licebit euitātes, Dorsum ossis ilium suæ amplitudinis exter-
nam regionem appellabimus: Spinam uerò, semicircularem ipsius appendicem, quæ aspera
inæqualisq; & interno^a externoq; latere compressa uisitur. Comprimitur quidem interna
sede, ut hæc inibi amplior euadat, & carnosam^x transuersi abdominis musculi partem, illinc
aptius educat. Externo autem latere appendix cōprimitur, ampliorq; fit, ut potissima oblique^v
ascendentis abdominis musculi carnea pars hinc principium sumat, & oblique^z descendens
abdominis musculus ipsi inseratur. His enim tribus musculis uniuersa superior appendicis se-
des occupatur, atque ut illi ampliores carnosioresq; in iliū lateribus quàm iuxta dorsum, aut in
abdominis anteriori sede sunt, ita quoque appendicis^a pars, quæ abdominis latera respicit, an-
teriorq; est, unā cum ilium ossis sede, cui appendix committitur, crassior est, quàm^b pars uerte-
bris & dorso proxima. Anterior uerò appendicis extremū, anterior uel spinæ ilium ossis pars
ideo est crassissima, quod præter abdominis musculos ipsi commissos, duobus musculis princi-
pium porrigat, quorum^d alter tibiæ motorū primus, alter autē sextus censebitur. Ab interna
ilium ossis amplitudinis sede, primum^f musculus enascitur, qui dorso motorum nonus erit, qui
ex^g læui, sed utcunque ampla ilium ossis impressione (quæ ad regionem transuersi quintæ
lumborum uerobræ processus conspicua est) ortus sui portionem adipiscitur. Verum præter
hanc ilium ossis compressionem, alia magna ipsius est amplitudo caua, & minimum aspera,
quamⁱ musculus occupat femur mouentium septimus, quem carneo amploq; principio instar
semicirculi ex interna hac iliū ossis amplitudine pronasci, ac deinde sensim arctari, simulq; cum
sexti femur mouentiū musculi tendine, primoq; crus petēti neruo, per^m sinū ferri docebimus,
sibi priuatim in coxendicis ossis exculptum. In elatiori enim coxendicis ossis sede, iuxta superio-
remⁿ acetabuli, cui femoris^o caput inarticulari audies, regionem, sinus inciditur amplius, & mu-
sculis hac descendētib; respondens, qui in mundato ossis foraminulis quibusdam in hoc op-
pletus cernitur, ut is ligamentum educat, cuius beneficio os inibi læue lubricumq; ac ueluti
smegmate inunctum cernitur, ut recte ad hunc sinum septimus ille femoris musculus, unā cum
sexti musculi tendine, reflecti atque conuolui queat. Vtrinque ad huius sinus latera, unum
insigne satis prominet tuberculum hunc sinum augens, ac quo minus hæc descendentes muscu-
li ex sinu declinent, autor. Verum præter hunc usum, tuberculum ad externum sinus latus con-
sistens, nonum tibiæ mouentium producit musculus, cuius etiam usus gratia utcunque am-
plum inæqualeq; uisitur, paruum sinulum instar scissuræ sibi uendicans, à quo fortis ille mu-
sculus enascitur. Alterū uerò tuber, internū sinus nuper dicti latus constituens, plurimum ad
coxendicis ossis robur confert, quod necessariò crassum ualidumq; esse oportuit, tum articula-
tionis roborisq; nomine, tum etiam quod id totius corporis altissimo sinu, cui femur articu-
latur, celandum fuerat. Atque huius etiam usus occasione, ilium os interna ipsius sede ad elat-
torem sui cum sacro ossis connexus regionem, crassum ualidumq; redditur, & ueluti ad secun-
di tuberculi internam sedem continuo tubere porrigitur, quod non solum coxendicis ossis ro-
bur adauget, uerum etiā principium offert^t musculo femur mouentium decimo, qui internam
pubis ossis sedem occupans, femur extrorsum circumuertit. Porro ab ilium ossis dorso, seu
externa ipsius amplitudine, quæ interiori ipsius ossis sede asperior est, tres potissimum ena-
scuntur musculi, suis principijs totū ilium ossis dorsum occupantes. Ac primus quidem muscu-
lus femur mouentium primus numerabitur, magna ex parte posteriorē ilium ossis dorso sedem
suo principio opplens. Quantam uerò huius sedis portionem occupet, duæ admodum obscu-
ræ in ilium ossis dorso prominentes lineæ indicāt, quæ semicirculi instar ductæ, ilium ossis dor-
sum ueluti in tres sedes determinant. prima harum extra primam consistens lineam, à primo
femur mouentium musculo occupatur. Secunda uerò inter primam lineam & secundam con-
spicua, musculus educit, qui femur mouentiū secundus censebitur. Tertia sedes, quæ à secun-
da breuiori q; lineam ad coxendicis usq; articulum pertinet, tertio femur mouenti musculo prin-
cipium porrigit. Atque in hunc sanè modum ossis sacro ossi commissi ampla, & quæ ilium os
dicitur, pars sese habet: media uerò pars, quæ coxendicis os nuncupatur, etiam magna ex par-
te explicata est. Diximus enim ea parte os crassius ualidiusq; fieri, ut uniuersum corpus uni in-
nitens cruri, fortius sustineret, aptaq; sedes fieret, cui sinus articulando femori idoneus incide-
retur. Huic enim coxendicis ossis sedi^v amplius rotundusq; & omnium corporis sinuum cui
ossa articulantur profundissimus sinus insculptus, nō omni ex parte læuis, lubricaq; cartilagi-
ne in crustatus. In anteriori enim ipsius sede, non modica^z portio altius quàm reliqua illius cir-
cumferentia inciditur, ac aspera cæcisq; foraminulis quibusdam oppleta cernitur, ligamenti
producendi gratia, quod teres in medium, seu uerticem femoris capitis inseritur. Deinde præ-
sentis sinus^b supercilia in anteriori ipsius sede leuius, quàm in posteriori protuberant, quod sci-
licet

t 1,3 fig. L.
u 1,2 p. R.
R.
x 6 muscu.
tab. Δ.
y 4 muscu.
tab. n.
z 3 muscu.
tab. o.
a 2 fig. ab
R per R ad
P.
b 2 fi. ab R
per Had
Q.
c 1,2,3 fi. P.
d 3 mus. ta.
z. dein f.
e eiusdē ta.
f. dein x.
f 8 muscu.
tab. z.
g ad fini-
strum latus
K. K. figu-
ra 3.
h inter P.
L. K. K. M.
N. S fig. 3.
i 8 muscu.
tab. A.
k eiusdē
tab. o.
l 2 fig cap.
u libr. 4
charac. 57.
or 10 mus.
tab. f.
m 1,2,3 fi-
gur. T.
n 1,2 fig. e.
f. g.
o 1,2 fi. ca.
30 A.
p 1,2,3 fig.
externum
tuber S in-
signitur, in
ternum ue-
rò X.
q 4 musc.
tab. f.
r S in pri-
mæ figura
sinulo po-
nitur.
s 3 fig. M.
N. O.
t 16 musc.
tab. F. G. et
13 tab. r.
u primus 9
muscu. tab.
n. secundus
10 tabu. z.
tertium 11
tab. z.
x 2 fig. Z.
Y. una li-
nea, altera
a. b. eius-
dem figur.
y 1,2 figur.
e. f. g.
z 1,2 fig. 2.

a 2 fig. ca. licet femur sedentibus magis in angulum flecti oportebat, quàm stantibus aut aliud quid agen-
 49 lib. 2 P. tibus extendi, aut in posteriora duci. Præterea in humiliori coxendicis acetabuli sinus uel su-
 b 1, 2 fig. i. per ciliiorum sede, id quoque animaduertendū est, supercilia nō cōtinuo ductu orbiculatim ferri,
 c 1, 2 fig. b. sed incidi ac intermiti, ac ueluti iter parare^d uenulæ hac in asperam & cartilagine nō obductam
 d fig. cap. acetabuli sedem exporrectæ, articuloque alimentum suppeditanti, à quo uiscidus humor (quem
 6 lib. 3 præ posita u. in hoc articulo plurimum coaceruari decet) adaptetur, cuius demum auxilio articulus prom-
 ptè mobilis euadat. Ne tamen sinus huius in supercilio incisi ratione, articulus luxationi obno-
 xius reddatur, Natura ualidum cartilagineumque ligamentum orbiculatim supercilijs adnexuit,
 quod nullibi intermissum apparet, sinumque adhuc magis quàm supercilia adauget, & uenulæ
 illi uiam præbet, inter os & posteriorem ipsius ligamenti sedem prorepentis, ut uena simul tu-
 tò feratur, & sinus ille luxandi promptitudinē non adiuuet, utcunque etiam hæc femur crebrius
 luxari cernamus. At de ligamentis uenisque, suis agemus locis. Nunc autem perpendenda ue-
 niunt cæca foraminula, passim in coxendicis ossis acetabuli superciliiorum externa sede in hoc
 parata, ut ualidissimum educant^{*} ligamentum, orbiculatim femur coxendicis ossi colligans.
 * fig. ca. 1. Quinetiam in hoc osse^e sedes animaduertenda est, quæ inter ilium ossis anteriorem partem,
 lib. 2 P. P. quæ sacro cōmittitur ossi, & posteriorem coxendicis regionem conspicitur, & ut^f neruo uiam
 c 2, 3 fig. c. præbeat exculpta, qui crus adeuntium quartus, omniumque corporis neruorum ex pluribus
 f 2, 3 fig. ca. compositus maximusque existit. Est quoque hîc obseruandus coxendicis ossis^g acutus processus,
 11 li. 4 cha qui^h ligamentum educit, inⁱ transversum processum quinti sacri ossis pertinens, & qui^k mu-
 ract. 71. sculo principium porrigit, quem aut decimo femur moueti musculo ascribemus, aut priuatim
 g 2, 3 fig. d. undecimum femur mouentium numerabimus.^l Neque etiam prætereundus uenit sinus coxen-
 h 13 musc. dicis ossis posteriori internæque regioni sub dicto nuper processu exculptus, ad quem mira Na-
 tab. o. turæ solertia ueluti ad trochleæ rotulam decimus femur mouentium musculus reflectitur. In su-
 i 1, 2 fig. ca. per nō perfunctoriè coxendicis ossis^m appendix indagabitur, toti infimæ ipsius sedi, cui seden-
 18 R. tes innitimur, adnata. Appendix hæc ossis, cui coalescit, amplitudinem seruat: quod cum ro-
 k 13 musc. boris gratia, tum musculorum exortus causa insigniter crassum, & utcunque amplum uisitur.
 tabu. x. aut Ab hac enim appendice, ut minimum, quatuor grandes exoriuntur musculi, quorum singula
 12 tabul. p. capitaⁿ priuatim in appendice impressiōem sedemque sibi uendicant, in emundato osse satis con-
 vbi deci- spiciam.^o Ac primus quidem musculus tibiam mouentium tertius erit, qui ab elatiore eius ap-
 mus musc. pendicis sede principium ducit.^p Secundus tibiam mouentium quartus habebitur, atque huius
 a insigni- principium minus quàm primi musculi latum est, ac magis uersus anteriora, iuxta extimū
 tur. primi musculi latus pronascitur.^q Tertius autem musculus, mihi tibiæ motorum quintus ha-
 l hic specta bebitur.^r Quartus uerò, maxima portio est eius musculi, quem Galenus quintum tibiam mo-
 13 musc. ta. uentium recenset, mihi autem femur mouentium quintus constituetur: qui maximam præsen-
 r, s, t, u, x, tis appendicis sedem suo principio occupans, totius corporis musculorum facile maximus est.
 y, z. Sic itaque media eius, quod describimus, ossis pars se habet, quam coxendicis os nuncupa-
 m 2 fig. l po. mus. Anterior uerò, quæ Pubis os dicitur, tenuis utcunque cernitur, & dextrum os sinistro
 steriorem, cartilaginis interuentu quasi unionis modo cōmittitur. quo enim homo ætate fit prouectior,
 q autem an- co semper connexus iste minus cartilagine oppletur, minus uel cartilaginis ostendit. Atque id
 teriore ap- uiris pariter ac mulieribus commune est. Neutiquam enim ob uulgi sententiam arbitrandum
 pendicis se- est, pubis ossa uiris esse cōtinua, mulieribus autem in hoc cartilaginis interuentu compacta, ut
 dem notat. partus tempore remitti atque inuicem disiungi queant. Parturientibus namque mulieribus (uti
 n 2 fig. pri- neque quadrupedibus) hæc ossa inuicem haud disinguntur: uerum id mulieres in hoc ossium
 ma impres- coalitu peculiare sibi uendicant, quod ipsis non tam longa linea, atque in uiris, committuntur.
 sio m, secū- Deinde coxendicis ossium infimæ partes, dextram dico & sinistram, in mulieribus mutuo lon-
 d. 10, ter. n. gè magis distant, quàm uiris. Præterea infimæ pubis ossium partes inuicem sub ipsorum con-
 quar. à p nexu diremptæ, multo etiam magis mulieribus quàm uiris seiunguntur ac distant. Adeò ut in
 d d q. mulierum ossibus uacua sedes inter coccyx os & internas regiones infimarum partium coxen-
 o 10 musc. dicis ossium, multo amplior quàm in uiris occurrat. hæcque differentia tam est insignis, ut uel
 tab. o. ipsa abundè doceat, pubis ossa in partu non recludi, etiam si tactus inter pariendum, idem
 p eiusdem non leui opera attestaretur. Quantum uerò ad hanc amplam sedem magis adhuc partus tem-
 tab. x. et 11 pore dilatandam^r coccyx os iuuat, licet animalia, quæ caudā habent, id liquidò parientia osten-
 tab. u. dein- dant: tamen id quoque in mulieribus obseruare integrum est, quibus id os extrorsum caudæ
 w. modo adeò porrigitur, ut etiam huius ossis gratia ipsis sedes in circulum incisæ apud omnes
 q 1 tab. r. quas unquam uidî nationes adaptentur. Atque ideo etiam pleræque mulieres genibus innixæ,
 r 11 ta. cha & aliquantisper antrorsum inflexæ foelicius pariunt: quemadmodum contrā erectæ, aut re-
 ract. c. ac trorsum inclinatæ, difficilius. Atque ita excludendo foetui Natura sceminis prospexit. Quò au-
 12 tab. z. tem
 s integrariū
 fi g. c.

Sinus quo
 crassissimus
 corporis ner-
 uus fertur.
 Coxendicis os-
 sis acutus pro-
 cessus.

Sinus ad quē
 decimus femur
 mouentium mu-
 sculus uolui-
 tur.
 Appendix co-
 xendicis ossis.

Lib. 2. de Ad-
 ministr. dissect.

Pubis ossis
 historia.

Ossium sacro
 ossi nexorum
 in uiris & mu-
 lieribus diffe-
 rentia.

t 1, 3 fig. ca.
 18 G, H, I,
 K. c. 2, 3 in
 tegrariū N.

Cur pubis os
maximo forami-
ne peruium,
& dein ipsius
sinus & tube-
ra.

tem minori negotio leuiusq; uterum gererent, ilium ossa mulieribus multo ampliora sunt, ipsorumq; spina in latera longè magis quam in uiris, educitur, & etiam illa ossa extrorsum in-
gnius cauantur: & ut semel dicam, hæc commodam gestando foetui sedem efformant. Quod autem nuper natis puellis partus facilius gratia, apud nullas gentes pubis ossa aut compri-
mantur, aut disiungantur, neminem dissectionis studiosum latere arbitror: quantumuis id pertinaciter uulgo nunc de his, nunc illis nationibus affirmet. Quamobrem uero pubis os ma-
ximo totius corporis ossium^{*} foramine (quod etiam propter magnitudinem ab ostij imagine
Thugodæ nuncupatur) peruium sit, illi demum cognoscunt, qui ad amussim inter secandum di-
dicere, quoniam musculi à coxendicis & pubis ossibus pronascentur, illi enim arguunt pubis
os amplam & aptam educendis musculis sedem necessariò oportuisse fieri. Ne uerò interim fru-
stra animal grauaret, sed ut leue esset, eo quo diximus foramine donatur. Neque est quod hæc
aliquis^y uasa seminaria, aut maximas crurum^z uenas & arterias, aut etiam^b nervos deduci ar-
bitretur: quemadmodum nemo non credit, qui etiam Anatomes rudis, nudam ossium com-
pagem intuetur. Illa enim organa aliam nanciscuntur uiam, quippe maxima crus petens uena,
arteriaq; simul cum^c secundo crus adeunte neruo, proprium^d sinum exigunt, in superiori pu-
bis ossis sede^e insinuatū, è regione elatioris sedis nuper dicti^f foraminis. Porro seminarijs uasis
etiam elatius quam pubis os prominet in abdomine iter paratum esse audies. Deinde ingens
illud pubis ossis foramen ualida^g membrana oppletur, quæ^h musculus internæ foraminis sedi
proximum ab illo dirimit, qui externam foraminis sedem occupat. Neque profectò aliquid,
foramen hoc transit, præterⁱ uenam, & arteriam, neruumq; non ad genu usque ramorum
serie digestum. Præterea hæc uasa non per foraminis medium feruntur: sed in elatiori forami-
nis sede^m sinus cælatur, illis uasis deducendis paratus. Quod uerò superior pubis ossiumⁿ pars,
qua inuicem committuntur, aspera est, ideo contigit, quod^o rectos abdominis musculos hinc
enasci Naturæ uisum fuerit. Deinde anterior quoq; ossium sedes inibi aspera est, ut neruosum
caput^p secundi tibiae mouentium musculi hinc rite pronasceretur. Ad hæc, in anteriori pubis
sede^q à coxendicis ossis acetabuli interno latere, ad pubis ossium commissuram usque, tuber
& quædam ueluti prominentia conspicitur, à qua^r octauus femur mouentium musculus prin-
cipium ducit. Quemadmodum hæc anterior pubis ossis sedes protuberat, ita quoque poste-
rior^s acutam ostendit lineam, à qua^t musculus femur mouentium decimus sui exortus^u portio-
nem assumit. His omnibus accedit pubis ossis^v crassities, iuxta infimam pubis ossium conne-
xus sedem, & magni illius foraminis internum latus, ubi pubis os quodammodo teres crassumq;
ob hoc uisitur, ut ipsius ossis robur adaugeatur: utq; hinc præter quosdam penis^x musculos
alterum corpus^y eorum quæ penem constituunt, originem duceret. Atque in hunc modum
ossa se habent, sacri ossis lateribus connexa, quæ in ætate prouectis duo tantum apparent, sin-
gula (uti relatum est) duobus donata appendicibus. In nuper natis uerò pueris utrunque os
tribus constat ossibus, quæ tribus lineis cartilagine oppletis distinguuntur. Hæ lineæ à coxen-
dicis acetabuli centro simul commissæ porriguntur, una quidem ad superiorem acetabuli sedem
ducta, secunda ad externum acetabuli latus: tertia autem ad latus internum delata, etiam per pu-
bis os procedit, ubi id quodammodo teres esse, & penis alterum corpus producere diximus.
Verum quum hæc non minus in agnis hoediscq; quam hominibus sint conspicua, cuius uel
inter edendum ea obseruare est integrum.

Ossa sacri os-
sis lateribus, co-
missam pueru-
lis tribus effor-
mari ossibus.


DE FEMORE. CAPUT XXX.

CHARACTERVM QVI DVABVS PRÆSENTIS

Capitis figuris sequenti pagina proponendis adhibentur, Index.

- A^{1,2} Caput femoris acetabulum ossis coxendicis subiens.
B¹ Sinus femoris capiti insculptus, & teretis ligamenti insertionem à coxendicis osse excipiens.
C^{1,2} Appendicis, rotundum femoris caput efformantis, cum reliqua femoris portione coalitus.
D^{1,2} Ceruix femoris.
E, F^{1,2} Inferiora femoris capita. ac E quidem internum, F uerò externum notat.
G^{1,2} Hæc linea coalitum indicat appendicis, duo inferiora femoris capita constituentis.
H² Sinus, qui utrisque capitibus E & F insignitis est communis, ac quem patella subit.
I¹ Sinus ac interuallum, duo inferiora femoris capita inuicem dirimens.
K¹ Ab hac sede interioris capitis primus pedem mouentium musculus initium ducit.

- L* 1 Hinc secundus & tertius pariter pedem mouentes musculi exoriuntur.
M 1 Huic interni capitis sedi, quinti femur mouentium musculi tendo inseritur. Reliquorum autem characterum indicem figuris subijciemus.



PRIMA TRI

GESIMI CAPL
tis figura, dextri femo-
ris os posteriori facie
delineatum re-
ferens.

SECUNDA

FIGVRA, FEMO-
ris dextri anteriorem
faciem osten-
dens.

- N* 1, 2 Sinus in externo inferiorum femoris capitum exculptus latere, ac quartum tibiam mouentium musculum uehens.
O 1 Hac sede internum latus interioris femoris capitis compressum est, ut hac tendines primi, secundi, tertij & quinti tibiam mouentium musculorum porrigerentur.
P 1 Hac regione idem interioris capitis latus insigniter protuberat.
Q, R, S, V, X, Y Exterior femoris processus. uerum singuli characteres nō in utraq; figura simul obuij aliquid priuatim, ut modo subijciā, indicant. *Q* quidem in prima et secūda coalitum huius processus appendicis ad reliquum os, *R* in prima sinū internæ præsentis processus sedi cælatū.
T, T. S in prima figura exterioris processus prima indicatur impressio. Cæterū *T*, *T* in prima, insignitur aspera linea deorsum à prima impressione ducta: *V* in secūda, exterioris processus secūda impressio: *X* uerò, tertia impressio. At *Y* in ambabus figuris quarta indicatur impressio.
a, b, 1, 2 Interior femoris processus. *V* erum *b* priuatim in secunda, hic appendicis coalitum indicat.
c, c 1 Linea aspera, à radice interioris processus deorsum oblique gratia octauj femur mouentium musculi procedens.
d, d 1 Linea secundum femoris longitudinem protuberans, & quinti femur mouentis musculi insertio-
nem admittens.
e 2 Hac sede femur amplum est, quum interim reliqua ferè longitudine teres sit.
f, f 2 Aspera sedes, à qua octauus tibiam mouentium musculus sui exortus initium ducit.

M FEMO-



Femoris su-
perius caput.

Duo inferiora
femoris ca-
pita, & eorum
dem sinus.

Lib. 3 de Vsu
part. 2 de
Adm. st. dis.
sect.

Duo femoris
processus, seu
rotatores.


FEMORIS os magnitudine cunctis humanæ fabricæ ossibus præstat, in
auibus autē & omnibus ferè quadrupedibus tibiæ ossi & fibulæ (quum
hæc adest) longitudine cedit. Hoc suprâ quidem coxendicis ossi, infrâ au-
tem diuersa articuli ratione, ossi tibiæ coarctatur. Superiori enim parte,
qua similiter atque inferiori ^b appendice donatur, robustissimum caput
obtinēt, proluxæ quidem ^a ceruici ad interiora inclinatæ adnatum, coxen-
dicisq; ossis ^c acetabulo exquisitè congruens. Vniuersum hoc caput læue
& cartilagine incrustatum uisitur; at in sui medio nonnihil inferius, quàm ipsius uerticis (ut sic
dicam) centrum consistit, angustum profundumq; & inæqualem cōmonstrat ^f sinum, cui teres
^e ligamentum à coxendicis ossis acetabulo enatum, ualidissimè implantatur. Inferiori autē sede
femur insigniter crassum est, & in duo ^h capita omnium totius corporis ossium capitum maxi-
ma dirimitur, quæ in posteriorem femoris sedem longè magis quàm in anteriorem porrigun-
tur, quemadmodum etiam ipsorum cum tibiæ ossis articulo ex usu fuerat. ⁱ Hæc nanque ossi ti-
biæ mutuo ingressu ad eum modum articulantur, ut tibia duntaxat flecti extendiq; possit, ne-
quaquam uerò in latus, uel tantillum quidem, duci. utcunq; etiam id Galeno uisum fuerit, qui
in tibiæ motuum examine, femoris ad coxendicis os motu deludebatur. Cæterum femoris ca-
pita retrorsum ideo producuntur, quod tibiam in angulum flecti, nec extra rectam lineam ex-
tendi, aut antrorsum erigi satius erat: adeò ut motus illius ratione femoris capita in anteriori fe-
moris sede nequaquam promineāt. & quamuis hæc, in anteriori eorundem sede, ^k sinum osten-
dant utrisque capitibus communem, & impense patulum, læuiq; cartilagine incrustatum, ista
men aliquo tibiæ ossis tubere excipiendo non paratus est. at os orbiculare & breui scuto non
ab simile apto ^l tubere sinum illum subire audies, quum secundo ab hoc Capite eius ossis sermo
instituetur. In posteriori femoris sede capita hæc magno ^m interuallo inuicem dirimuntur, atq;
in ipsorum medio amplum profundumq; sinum utcunq; asperum, & cartilagine nequaquam
obductum exigunt. Is nanque asperum inæqualeq; tibiæ ossis ⁿ tuber excipit, quod in tibiæ
ossis sinuum medio protuberare, ac ^o ligamentū educere scribemus, quod ualidissimè illi sinui
inferitur, unâ cum alio admodum robusto à posteriori tibiæ ossis sede pronato. Iuuat etiam si-
nus iste, deducendo totius corporis maximo ^p neruo hac simul cum ^q uena & arteria in tibiam
contendenti. Humiliora enim femoris capita, quum tibiæ motuum gratia adeò in posteriora
ducantur, etiam id præstant, ut in illorum medio neruum illum simul cum uasis tutissimò deor-
sum repere sinant, atque etiam processuum modo aliquot musculorum pedem mouentium
principia porrigant. Ab elatiori nanque interni capitis ^r sede primus pedem mouentium ^s mu-
sculus enascitur. Ab externi autem capitis elatiori ^t sede, ^u secundus, & ^x tertius quoque, pedis
motibus præfecti exoriuntur. Dein si ^y musculus in poplite latitans ab osse aliquam sui exortus
portionem sumit, hanc sanè ab externo hoc femoris capite mutuatur, quanquam præcipua
ipsius origo ex ^z ligamento pendere docebitur, dictum nunc femoris caput tibiæ potissimum
colligans. Deinde in elatiorem capitis interni ^a regionem modicè uersus eius capitis internum
latus ^b tendo inferitur, quinti femur mouentis musculi, cuius etiam insertionis occasione hoc
femoris caput inibi compressam ostendit sedem, tendini excipiendo aptam. Canes in hac ossicu-
lum paruum, & illis ^c quæ sesamo comparamus simile ostendunt. Atque ita anterior & inferior
posteriorq; horum capitum sedes se habent. latera uerò eorundem multis cecis foraminulis op-
plentur, ut ualidissima genu articulum continentia ligamenta hinc apte pronascantur. Porro
externum exterioris capitis latus, priuatim ^d sinum exigit obliquè ipsi iuxta posteriorem eius la-
teris regionem insculptum, ac ^e quarti tibiam mouentium musculi tendini paratum, quo mi-
nus enim tendo ille hac obliquè reflexus, à suo ductu aberret, Natura ipsi hunc sinum præpa-
rauit. At internum latus interioris capitis, etiam si ad id plures reflectantur ^f tendines, tamen nul-
lum eiusmodi sinum adipiscitur. Verum emundato iam osse iuxta posteriorem lateris sedem
^g compressio apparet, qua tutò tendines deferri queant, à sua sede tuberis beneficio non reclin-
nantes, quod in medio dicti nunc lateris latè ^h protuberat, atque secundum ipsius posteriorem
sedem tendines opportunè deferri sinit. Tendines autē hac deducti, trium primorū & quinti
tibiam mouentium musculorum censebuntur. Ad femoris ossis ceruicem, cui superius femo-
ris caput adnascitur, duo conspiciuntur processus, quorum ⁱ alter externum femoris latus oc-
cupat, ac omnium corporis processuum nulli alteri ossi commissorum facile maximus est, ^k insi-
gni etiam donatus appendice. ^l Alter minor est, & quod ad magnitudinem spectat priori neu-
tiquam comparandus, multoq; inferius in interno femoris latere nonnihil uersus posteriora
conspiciuus, & ^m appēdice similiter adauctus. Græci ambos *ποχαντῆρας*, quasi rotatores dicas,
nuncupant: hunc interiorem, illum uerò exteriorem appellantes, quum tamen simpliciter

a tota 1, 2
fi. & Inte-
grarum 1,
superius cū
w, inferius
cum o arii
culatum.
b 1, 2 fi su-
prâ C, in-
frâ G.
c 1, 2 fig. A.
d 1, 2 fig. D.
e 1, 2 fi. ca.
29 c. f. g.
f 1 figur. B.
g 1 fig. cap.
49 lib. 2 P.
h 1, 2 figur.
E, F.
i Iunge E,
F, 11, 2 fig.
ad G, F, I
7 figuræ
cap. 31.
k 2 figur. H.
l 2 fig. cap.
32 A, B, C,
D.
m 1 figur. I.
n 7 fi. cap.
31 I.
o fi. ca. 1 li.
2 X.
p 10 musc.
tab. 3. dein
u, d.
q ultima fi.
lib. 3 r, u.
r 1 figur. K.
s 12 muscu.
tab. 4.
t 1 fig. L.
u 12 muscu.
tab. r.
x 13 tab. 4.
y 14 tab. r.
z fig. cap. 1
lib. 2 T.
a 1 figur. M.
b 12 muscu.
tab. 3, dein
4, f.
c 2 fig. cap.
33 v, u.
d 1, 2 fig. N.
e 10 musc.
tab. r.
f 16 muscu.
tab. tendi-
nes muscu-
lorum L, A,
R, V, V. aut
2 tabu. q, r,
s, d, d.
g 1 figur. O.
h 1 figur. P.
i 1, 2 figur.
Q, Y.
k femora fi-
guræ cap.
3 hic autem
Q.
l 1, 2 figur. a.
m 2 figur. b.


τροχαντήρα dicunt, perpetuò externum subaudiunt, quem etiam propter amplitudinē & quan-
 dam cum nate imaginem γλῶττον uocarunt. Horum processuum idem usus cum reliquis fe-
 re ossium processibus est, in hoc enim parantur, ut collis ritu musculorum insertionem probè
 admittant, alijsq; musculis eleganter principij sui sedem præbeant. Interior namque femoris
 processus, qui modicè oblongus, neque admodum inæqualis est, in hoc prominet, ut illi^m sexti
 & septimi femur mouentium musculorum tendines inserantur. Ad huius processus radicem
 in posteriori femoris sede aspera quædā ducitur^o linea, obliquè deorsum in posteriora aliquò
 usque ducta, & octauī femur mouentis^p musculi insertioni aptata. Exterior femoris processus,
 externa sui sede gibbus est: interna autem, qua femoris caput respicit, sinuatus. Hic enim aspe-
 rum inæqualemq; commonstrat^a sinum, cui^r nonus & decimus femur mouentes musculi in-
 feruntur. Externa autem sedes, quæ gibba est, in ossibus hominibus & ætate prouectis, quatuor
 impressiones sedesq; commonstrat, quatuor musculorum insertionibus excipiendis para-
 tas. Ac^t prima quidem ampla est, & gibba in posteriori processus sede apparens, cui primus fe-
 mur mouentium musculus ampla insertionē implantatur. Ab huius compressionis radice aspe-
 ra quædam^u linea deorsum per femoris posteriora nonnihil obliquè deducitur, cui primus ille
 femur mouens musculus ualidissimè etiam inseritur.^x Secunda compressio exterioris proces-
 sus in anteriori ipsius consistit latere, magis quàm prima inæqualis & aspera, & utcunque si-
 nuata, ac demum secundi femoris motuum autoris musculi seruiens insertioni.^y Tertia ad su-
 periores processus sedem uisitur, inter primæ & secundæ elatiores consistens sedes. Hæc gib-
 ba est, & insertionē tertij femur mouentis musculi excipit.^z Quarta in apice processus se offert,
 reliquis tribus longè arctior, & quarti femur mouentis musculi tendinem admittens. Atque
 horum sanè musculorum insertionem exterior processus excipit, ab ipsius uero radice in ante-
 riori externaq; ipsius sede^a musculo principium præbet, qui tibiæ motorum septimus recen-
 sebitur.^b Quòd uerò ad reliquam femoris formam spectat, uniuersum femur anteriori ipsius se-
 de, & in lateribus teres & utcunque læue est, undique ab^c octauo tibiā mouentium musculo
 circumdatum. cuius gratia anterior femoris sedes iuxta ipsius ceruicis radicem nonnihil ampla
 est, &^d aspera, quo ualidiùs & ampliori principio musculus ille enascetur. In posteriori au-
 tem sede femur in acutum quodammodo fertur, &^e lineam insigniter protuberantem & aspe-
 ram inæqualemq; ostendit. quæ à femoris processuum radice aliquò usque ultra medium lon-
 gitudinis femoris prorepat. Huic lineæ^f quintus femur mouens musculus pertinaciter inseri-
 tur,^g ipsaq; duntaxat ex reliqua femoris amplitudine, ab octauo tibiā mouenti musculo, non
 circumdatur. Porro ad inferiorem huius lineæ^h sedem, ac iuxta inferiorum femoris capitum
 radicem, femur amplum depressumq; nō autem teres cernitur, quo tutius hæc maxima tibiā
 petens uena cum arteria & neruo feratur. neque si femur hīc gibbum esset, à femore errabun-
 da declinet. Quamuis & femur hīc ad suorum inferiorum capitum productionem latefcere
 crassescereq; etiam debeat.ⁱ Cæterum femoris ductus non recto tramite à coxendicis ossis ace-
 tabulo deorsum tenditur. Verum femoris ceruix à capite ipsius ualde extrorsum obliquè, &
 quasi transuersim fertur, & hinc femur rursus reliquo ipsius corpore obliquè uersus interiora
 ad genu descendens procedit. Quam sanè figuram non obiter Natura excogitauit. est enim
 laudatissima, quamq; Hippocrates in libro de Fracturis in effracto femore sedulo seruandam
 præcipit. Quandoquidem omnes quibus à prima conformatione femur rectius, quàm ho-
 mini ex usu est, contigit, uari & claudi in genu redduntur. Hoc autem quàm non modò ad
 cursum, sed ad ambulationē, firmamq; stationem noxiū sit, quotidie uidentes discimus. Atqui
 si utriusque femoris ceruix non statim à coxendicis articulo, uti diximus, foras porrigeretur,
 quænam sedes internis femur amplexantibus musculis reliqua esset? quæ rursus neruis, ue-
 nis, ac arterijs in uniuersum crus distributis? quæ item glandulis horum uasorum propaga-
 tionī præfectis? Non enim per externas cruris regiones hæc descendere decebat, quum ita
 omnibus foris occurrentibus leui quaque occasione lædenda, exponerentur. Si igitur uenis,
 arterijs, glandulis, musculis pluris ipsdemq; maximis hanc regionem inibi parare oportuit,
 necessum quoque fuit, ex acetabulo femur foras extrorsum ue abscedere. Porro si quibusdam
 capitis femoris ceruix minus foras educitur, his statim inguinum sedes angustæ & inuicem
 compressæ redduntur, præterea his femur simul cum genu turpiter extrorsum abducitur. Me-
 ritò itaque uniuersa femoris forma curua gibbaq; exteriori regione existit, interiori uerò subca-
 ua. Pariter quoq; & magis adhuc femoris posterior pars sima cauaq; uisitur, anterior autē gib-
 ba, quòd ad sessiones is femoris ductus admodum sit idoneus: uti etiam ad multa quæ sedentes
 obimus munia, quando scilicet unum femur alteri innijcimus. Vt modò taceam, quàm elegtæ
 femur musculis cedit, posteriorem ipsius sedem occupantibus.

Femoris secun-
 dum ipsius lon-
 gitudinem for-
 ma.


plurimis

PRIMA. CAP. SECUNDA. TERTIA. QVARTA.
XXXI FIGVRA.

QVINTA. SEXTA. SEPTIMA. OCTAVA.



NONA. DECIMA. VNDECIMA.



TRI

UNDECIM præpositæ modo figuræ ad dextram spectant tibiam, ac prima utrumque in tibia locatum os anteriori facie exprimit, crassius nimirum interiusq; quod tibiæ os uocabimus: & gracilius, quod exterius positum fibula nobis potius quàm sura nuncupabitur. Secunda figura tibiæ os simul cum fibula posteriori facie appositissimè delineatur. Tertia solius tibiæ ossis anteriorem sedem commonstrat. Quarta tibiæ ossis posterior facies oculis subiicitur. Quinta fibulam anteriori facie exprimit. Sexta fibulam posteriori sede delineatam exhibet. Septima tibiæ ossis superiorem ostendit sedem, cui femur articulatur. Octaua duas continet cartilagine, quæ sinus adaugent, quibus femoris capita excipiuntur. Nona inam tibiæ ossis & fibulæ sedem anteriori parte proponit, ut cavitatis in conspectum ueniret, tali cum tibia articulationi parata. Decima solam tibiæ ossis infimam sedem posteriori ex parte delineatam offert, qua talus excipitur. Undecima internum latus inferioris fibulæ appendicis commonstrat, quod talo articulatur. Characterum autem index erit huiusmodi.

- A, B His duobus characteribus in prima figura, superior tibiæ ossis appendix notatur. In tertia uerò & secunda, indicatur linea coalitum commonstrans appendicis cum reliqua ossis portione.
- C Appendix superior fibulæ in prima figura indicatur, in quinta autem coalitus appendicis cum reliquo osse insignitur.
- D In prima appendix tibiæ inferior, in tertia appendicis coalitus indicatur.
- E In prima appendix fibulæ inferior, in quinta coalitus appendicis ad os notatur. & quamuis eius modi appendices coalitusq; non in omnibus figuris notauerim, nulli tamen non obuias esse appendices arbitror.
- F, G, 2, 4, 7 Sinus tibiæ ossis, quibus inferiora femoris capita articulantur.
- H, I, K 7 Tibiæ ossis tuber, sinus, quibus femoris capita excipiuntur, dirimens. ac H quidem ipsius anterior sedes indicatur. I uerò media & impensius prominens. K autem posterior. Atq; hi characteres in eius tuberis sedibus, quæ sinuantur, obuij sunt, & horum K & I in secunda figura, tertia & quarta idem quod in septima, indicant.
- L 8 Cartilago dextrum tibiæ ossis sinum adaugens, quo externum femoris caput excipitur.
- M 8 Cartilago sinistrum, seu dextræ tibiæ ossis internum sinum augens, cui internum femoris caput articulatur.
- N 8 Hac sede cartilagine, tibiæ ossis sinus augentes, uidentur crassissimæ.
- O 8 Hac sede nuper dictæ cartilagine sunt tenuissimæ, ac ante sinuum centrum deficiunt.
- P, P 8 His sedibus illæ cartilagine in apices terminantur.
- Q 5 Fibulæ sinus leuiter ac in superficie cælatus, cui tibiæ ossis tuberculum iam R indicandum, coarticulatur.
- R 4 Tuberculum, seu caput tibiæ ossis, quod fibulæ coarctatur.
- S 4, 10 Sinus tibiæ ossis, quo inferiorem fibulæ sedem excipit.
- T 5, 6, 11 Internum fibulæ latus, quod tibiæ ossi committitur. Cæterum V in secunda figura superio V, X. rem connexum fibulæ ad tibiam indicat: X uerò inferiorem. Y autem interuallum notat, quo Y. hæc ossa inuicem dehiscunt.
- Z 1, 2 Hac sede fibula nō recta ducitur, sed introrsum nōnihil obliquatur, exterioriq; latere summa fit.
- a, b 1, 3, 7 Anterior tibiæ ossis sedes, in quam muscoli tibiam extendentes inseruntur.
- c 5, 6 Superioris fibulæ appendicis processus, cui tendo quarti tibiam mouentis musculi inseritur.
- d, e, f, g, h 9 Sedes, cui superior tali pars, lateraq; articulantur. ac d quidem & e, & f superiorem huius sedis regionem in nona & decima figuris commonstrant. Deinde rursus d notat eius regionis tuber. e uerò & f partem huius regionis utrinq; ad tuberis d notati latus altius quàm ipsum tuber insinuatam. Porro g sedis huius internum latus indicat, quod ab externo latere constituitur processus inferioris appendicis tibiæ ossis, quem Φ in prima figura indicat. Cæterum h in nona & undecima externum huius sedis, quæ talo aptatur, latus ostendit, ab interno constitutum latere appendicis inferioris fibulæ in prima figura E notatæ.
- Φ, i Φ in prima figura processus indicatur inferioris appendicis tibiæ ossis, qui exterior est malleo-

lus. Cæterum i in secunda, tertia, nona, & decima eundem appendicis processum notat.

- k 4, 10 Sinus interioris malleoli, ex quo cartilagineum ligamentum talo inseritur.
- l 1, 3, 9 Sinus asper & inæqualis in anteriori sede inferioris appendicis tibiæ ossis conspicuus, à quo ligamentum cartilagineum ad tali cervicem pronascitur.
- m 2, 4, 10 Hac sede sinus spectantur, qui tres tendines ad pedis inferiora protensos deducunt.
- n 2, 5, 6, 9 E quidem in prima figura externum notat malleolum. is namq; aliud nihil est, quam inferior fibulæ appendix. Verum n in plerisq; figuris hunc malleolum exprimit.
- o, p 1, 5 Umbrata hæc fibulæ sedes ab o ad p usq; pertinens, ea fibulæ pars est, quæ nuda nullisq; musculis tecla ante sectionem se offert.
- q, q 2, 6 Hac septimi & octavi musculorum pedem mouentium tendines reflectuntur, quorum occasione fibula hic sinuata est.
- r 2, 6, 11 Sinus inferioris fibulæ appendicis, à quo ligamentum in talum fertur.
- s, s 1, 5 Prima fibulæ linea, seu primus eiusdem angulus.
- t, t 1, 2, 5, 6 Secunda fibulæ linea.
- x, x 1, 5 Primum fibulæ latus. Verum x & x priuatim huius lateris lineam indicant, inibi gratia musculi pollicem extendentis modicè prominentem.
- α, α 1, 5 Secundum fibulæ latus.
- γ, γ 1, 3 Prima tibiæ ossis linea.
- ε, ε 1, 2, 3, 4 Tertia tibiæ ossis linea.
- η 1, 3 Secundum tibiæ ossis latus.
- κ 2, 4 Aspera tertij tibiæ ossis lateris linea, cui musculus in poplite latitans inseritur.
- u, u 1, 2, 5, 6 Tertia fibulæ linea.
- β, β 2, 6 Tertium fibulæ latus.
- δ, δ 1, 2, 3, 4 Secunda tibiæ ossis linea.
- ζ 1, 3 Primum tibiæ ossis latus.
- θ 2, 4 Tertium tibiæ ossis latus.

Tibia.

Fibula.

Tibiæ os.



Tibiæ ossis
& fibulæ ap-
pendices.

Sedes cui fe-
mur ad tibiam
articulatur.

Cartilagine
quibus tibiæ of-
fis sinus augē-
tur.

Lib. 3^{de} Vju
part. & in cō-
mentarijs in
Hippo. librū
de Fracturis.

TIBIA similiter atque in cubito, bina reponuntur ossa, quæ Hippocrates perpetuò tibiæ ossa appellat. ac horū alterū interius est & crassius, quod totius membri nomine *levhūn*, & tibia nuncupatur: alterum uerò exterius locatur, & interiori crassitie admodum cedit, Græcis quidem *ω- γόνυ*, Latinis autem sura & fibula uocatum. Ego euidentioris doctrinæ stu- dio crassius os, tibiæ os appellabo, id à tibia, hoc est toto membro distin- guens, quod his ossibus, musculis, uenis, arterijs, nervis, & cute hæc om- nia ambienti formatur. Gracilius autem os fibula opportunè dicetur, ut id à sura, quam Græci, quia ueluti tibiæ uenter est, *γαστρονυχία* nuncupant, distinguatur. Tibiæ itaq; ossi & fibulæ supra infraq; appendix coalescit, ac superior quidē tibiæ ossis appendix admodū crassa lataq; est, anteriori tamen sede crassior, ac in anteriori tibiæ regione magis quam in posteriori deor- sum duci cernitur. Huic * duo oblongi insculpuntur sinus, inuicem aspero inæqualiq; tubere distincti, & lubrica cartilagine incrustati. His sinibus inferiora femoris capita excipiuntur, tu- ber autem sinus distinguens, grandem sinum subit, femoris capita posteriori in sede dirimen- tem. Dein tuber ex superiori mediaq; ipsius sede, quæ aspera & sinuata, neque ulla cartilagine inuncta uisitur, ualidissimum emittit ligamentum, nuper dicto femoris capitum interuallo sinui ue insertum. Adeò sanè, ut media huius tuberis sedes in hoc aspera sinuataq; sit, quò sceli- cius ligamenta in femur porrigat, hæc è maximè protuberante sua sede, ac deinde ex posteriori ipsius regione educens. Ab anteriori namq; tuberis regione, quæ minimum prominet, etiam si illa similiter aspera sit, ac latè sinuata, nullum tamen ligamentum femori inseritur, sed li- gamenta inibi producuntur, quæ cartilagine anteriori huius tuberis sedi colligant, quas ti- biæ ossis sinus iam augere dicam. Quum enim duo tibiæ ossis sinus femoris capita admitten- tes, quodammodo superficietenus duntaxat insculpantur, neque ad amussim femoris capitum gibbis (etiam si Galeno secus uisum fuerit) suis cauis respondeant, Natura mirabili artificio si- nuum profunditatem adauxit. quippe præter lubricas cartilagine tibiæ ossis sinibus & femo- ris capitibus crustæ modo obductas, utrique sinui unam adhibuit cartilaginem, neque femo- ri, neque tibiæ ossi aliter quam ligamentorum beneficio connexam. Hæc nanque orbiculatim ligamenti genu articulum amplexantibus solum connascitur, & præterea ligamenti interuen- tu anteriori posterioriq; sedi tuberis connectitur, quod tibiæ ossis sinus femoris capita excipi- entes dirimere dictum est. Istæ cartilagine exactè simplici cartilagine molliores sunt, & quasi li- gamenti naturæ participes. Dein quæ ossibus applicantur, impense æquales, lubricæ, læues, ac deniq; unctuofo humore oblitæ spectantur. Ad hæc, in articuli ambitu crassæ sunt, multo ante

sinuum

a tota, &
2 figur.
integrarum
et ad
et
b tota 3, 4
figuræ.
c tota 5, 6
figuræ.
d tibiæ of-
fis appen-
dices pri-
mum A, B
1, 3 fig. de
D 1, 3 si fi-
bulæ autem
C 1, 5 figur.
insuper E
et 5 figu-
ra.
† 1, 3 fig. B.
* 2, 4, 7 fi-
g. G.
e 7 fig. H.
I, K.
f 1, 2 fig. 30
cap. E, F.
g 1 fig. 30
cap. I.
h 2, 3, 4, 7
fig. I.
i fig. cap. 1.
lib. 2 X.
k 2, 4, 7 fi-
gur. K.
l 7 fig. H.
m tota 8
figura, u-
bi dextra
L, sinistra
aut M infi-
gnitur.
n 8 fig. N.

08 figur. O. sinuum centrum^o extenuatae, desinentesq̃. Harum siquidem figura lunaris est, quemadmo-
 dum interioris sinus internum latus, & exterioris sinus externum. Præterea nullibi crassiores
 p 8 fi. P.P. quàm ad lateris sui medium cernuntur. ^p quàm enim anteriori posterioriq̃ tuberis tibiæ ossis
 sinus distinguendis sedibus appropinquant, tenuissimæ sunt, & in acutos apices finiunt. quo-
 rum qui anteriori eius tuberis sedi committuntur, inuicem proximi sunt, dextraq̃ cartilago
 sinistrae ibidem alligatur. Apices uerò posteriorem tuberis sedem accedentes, magis mutuò
 distant, neque inuicem, ut anteriores cartilaginum apices, committuntur. Ligamentum enim
 crassissimum ex tubere in femur insertum, posteriores cartilaginum apices distinguit. Quæ
 quum ita sint, leui negotio colligitur, quàm concinnè harum cartilaginum auxilio ossis tibiæ
 sinuum cauitas adaugeatur, non solum quidem in hominibus, uerum in omnibus quæ hactē
 nus uidi quadrupedibus & auibus. His nanque in genu articulo eiusmodi cartilagine repo-
 nuntur, unde etiam in mensa cuius harum naturam contueri promptissimum est, si modò exa-
 ctè genu articulum quis inspexerit: neque passim cum Aristotele, & Galeno in tertio de Par-
 tium usu, quadrupedum genu illic esse existimauerit, ubi tibiæ inferior pars talo coarctatur.
 Atque hoc sanè modo tibiæ os femori articulatur. fibula autem non adeò altè conscendit, ut fe-
 mur contingat, uerum superior ipsius appendix in interno illius latere^q sinum gerit leuiter ad-
 modum insinuatū & amplum, cui minime protuberans tibiæ ossis appendicis^r tuber coarticu-
 latur, quod ad externum tibiæ ossis latus uersus posteriora cōsistens cartilagine, similiter atque
 sinus fibulae, incrustatur. Porro^s ima sede fibula tibiæ ossi diuersa articuli ratione quàmⁱ suprā
 coarctatur. Externum enim tibiæ ossis latus, oblongum exigit^u sinum, cui protuberans inter-
 num fibulae^x latus immittitur, quod asperum nōnihil est, quemadmodum & tibiæ ossis sinus
 asper quoque, & cartilagine nequiquam incrustatus cernitur. Sinus enim ille fibulam læui con-
 tactu non excipit, uerum quàm hæc ossa inuicem cōmittuntur, ualidum intercedit ligamentum,
 non quidem duntaxat in circuitu ipsa cōnectens, at etiam ubi mutuò se contingunt. Cæterum
 per reliquam tibiæ longitudinem fibula à tibiæ osse^v plurimum dehiscit. non quidem quòd
 hæc radij^z modo oblique ducatur, ac ueluti à tibiæ osse foras obliquetur, sed quòd tibiæ os su-
 prā infraq̃ adeò crassum sit, & in reliqua ipsius longitudine gracile, ut fibula illis tibiæ ossis se-
 dibus, quibus crassum cernitur, commissa, facile à tota tibiæ graciliori sede multum distet.
 Quamuis tanto adhuc minus fibula à tibia dehiscat, quanto minus recta conspicitur. Fibula
 enim^a paulo sub medio lōgitudinis tibiæ, introrsum ac uersus tibiæ os nōnihil curuatur, exter-
 noq̃ ipsius latere sima, seu cōcaua redditur. Cæterum tibiæ ossis fibulae^q ductus, & secundū
 ipsarum longitudinem extuberantes lineas impressionesq̃, tum demum opportuniùs descri-
 bam, ubi supernas infernasq̃ eorundem ossium partes, quibus alijs coarctantur expressero.
 Superior itaque tibiæ ossis appendix, ad eum quem dixi modum femori ac fibulae coarctatur.
^b anterior autem eiusdem appendicis sedes utcunque depressa aspera^q cernitur, unà cum tibiæ
 ossis anteriori sede appendici proxima, & à plerisque Græcorum *ἀντικνήμιον* uocata, quæ in
 hoc aspera est, ut ualidissimos^c musculorum tibiam mouentium tendines exciperet. quorum
 etiam tendinum gratia, superior fibulae appendix insigniter externo ipsius latere & superiori
 parte^d protuberat, robustissimum^e quarti tibiam mouentis musculi tendinem excepturus.
 Dein hæc fibulae sedes caput educit^f septimi pedem mouentis musculi. Inferiores tibiæ ossis
 & fibulae appendices, simul^g sinum sedemq̃ efformant, cui^h talus mutuo quasi ingressu articu-
 latur. Si enim tibiæ ossis ac fibulae sinus tubera^q sedulo perpenderis, tali cum tibia connexum
 ad ginglymon opportunè referes. Verum tali historiam suo loco explicabimus. nunc enim
 sinus tibiæ ossis examinandus uenit, qui in infimæ tibiæ ossis appendicis sede amplius admo-
 dum est, & quodammodoⁱ geminus. In medio enim amplo, sed modicè prominente^k tubere
 interstinguitur, liquidoq̃ altius ad tuberis latera excauatur. Ad internū huius sinus latus infe-
 rior tibiæ ossis appendix, ualido magnoq̃^l processu deorsum fertur, qui externo ipsius^m latere,
 quo sinum respicit, cauus, & similiter ac sinus ipse læuis & cartilagine incrustatus est: interno
 autemⁿ latere alterum crus respiciente gibbus est. ac quum^o excarnis sit, nullisq̃ musculorum
 partibus obtectus, in nobis tactu facile percipitur, estq̃ interior malleolus. Processus hic in infi-
 ma ipsius sede uersus posteriora^p sinum obtinet, ex quo^q ligamentum prodit, cartilagineum ti-
 biæ os talo colligans. Atque eiusmodi etiam ligamenti producendi gratia, anterior appendicis
 inferioris tibiæ ossis^r sedes, in humillima ipsius parte, etiam sinum exigit transuersim oblon-
 gum, & asperum, & inæqualem: à quo ligamentum prodit, tibiæ ossi^s ceruicem tali nectens.
 Posterior etiam huius appendicis sedes, ubi primū internū educit malleolum,^t depressa est,
 sinusq̃ ostendit, qui transuersis obducti ligamenti musculorum tendines hæc pedem adeun-
 tes, tutò, ne suis sinibus aberrant, ferri sinunt. Sunt autem illi numero tres,^u quintus scilicet pe-
 dem

Lib. de Com.
 muni animalū
 gressu.
 Fibulae ad ti-
 biæ os nexus.

Vbi fibula à
 tibiæ osse dehi-
 scat.

Tibiæ ossis fi-
 nus et tubera,
 quibus talo ar-
 ticulatur.

Interior mal-
 leolus.

cū ta-
 rculatio.

T alum ante
 sectionem ta-
 lūi non oc-
 currere.

Exterior mal-
 leolus.
 Lib. de Offi-
 bus Cap. 22.

Excarnis fi-
 bulae pars.

Fibula secun-
 dum ipsius lon-
 gitudinem tri-
 angul.

Tibia ossis se-
 cundum ipsius
 longitudinem
 figura.

dem mouentium, & duo digitorum flexui famulantes. Cæterum externum inferioris appen-
 dicis tibiae ossis latus, nullum educit processum interno malleolo respondentem. Verum^x ap-
 pendix fibulae externo tibiae ossis lateri adnexa, impenſe hîc crassescit, deorsumq; magis quàm
 interior malleolus fertur. ac in causa est, ut rarius in externum pedis latus, quàm in internum,
 talus luxetur. Tanto enim fibula hîc declinuius ipſo tibiae osse descendit, quanto altius tibiae os
 ad femur suprâ porrigitur: adeò ut fibula ne minimum quidem longitudine à tibiae osse uin-
 catur. Inferior hæc fibulae appendix, externum^y latus sinus cōstituit talum excipiētis. Verum
 appendix interno ipsius latere adeò protuberat, & cartilagine incrustatur, ut eam à^z talo ue-
 rius suscipi, quàm eundem excipere, meritò quis dixerit. etiam si externum tali latus appositè
 tegat, atque in eum modum unà cum interno malleolo talum comprehendat, ut nusquam in
 integris hominibus talus contingi queat. Tibia enim ossis appendix superiorem ipsius inte-
 git sedem, & internum quoque ipsius latus. fibula autem inferiori sua appendice externum ta-
 li latus occupat: anterior tali sedes, quæ in nuda ossium compage oculis subiicitur tendinibus
 occultatur, per pedis superiora ad digitos deductis. ita etiam posterior ipsius sedes non minus
 in nudis sceletis conspicua, tendinibus obtegatur in calcem insertis, & quibusdam hæc pedis
 inferiora subeuntibus. Imæ hæc fibulae pars talo commissa, externoq; suo latere gibba, & nulla
 prorsus musculi parte^b obtecta, exteriorem constituit malleolum, quem simul cum interiori
 malleolo à quibusdam talum perperam appellari Galenus testatur. Atqui is error ad nos usq;
 manauit. Nam, ut cæteros taceam, Erasmus noster Roterodamus in suo de talorum lusu Dia-
 logo, malleolos in hominibus talos simul cum Plinio uocari innuit: quod nonnullis Galeni
 interpretibus adeò arrisit, ut σφυγὰς, hoc est malleolos, subinde talos reddiderint. Externum
 itaq; exterioris malleoli latus gibbum ex carneq; est, similiter atq; interioris malleoli internum
 latus. Posterior autem exterioris malleoli sedes amplum ostendit^c sinum, qui transuerso obdu-
 ctus^d ligamento, sexti & septimi pedem mouentium musculorum tendines deducit, illos quo-
 minus à sua sede reclinent continens. Internum eiusdem malleoli latus in infima ipsius sede uer-
 sus posteriora, profundum asperumq; ostendit^e sinum, ex quo^f ligamentum prodit cartilagine
 um, hîc fibulam talo ualidissimè connectens. Cæterum ex uniuersa fibulae amplitudine, nulla
 ipsius pars nuda excarnis ue est, præter infimæ ipsius partis externū^g latus, quod etiam aliquo-
 usq; supra appendicem fibulae inferiorem ex carne cernitur. quum interim reliquæ ipsius ampli-
 tudo musculis obtegatur, ita fibulam amplexantibus, ut hæc passim ipsis cedere, ab illisq; com-
 primi uideatur. Si enim fibulam examinaueris, eam secundum ipsius in lōgitudine ductum tri-
 angulam esse conspicias, atque id potissimum iuxta ipsius longitudinis medium. In anterioris
 enim fibulae sedis medio, acuta & insigniter protuberans apparet^h linea, primum fibulae angu-
 lum constituens. In posteriori autem ipsius sede, depressa est, & plana, ac utrinque ad postero-
 ris sui sedis latera unam commonstratⁱ lineam, quæ insigniter satis protuberans, alium fibulae
 angulum efformat. Adeò ut ea quæ internum latus posterioris fibulae sedis occupat, secun-
 dus fibulae angulus appellari possit: quæ uerò externum eius sedis latus habet, tertius. Atque
 his tribus lineis angulis ue, tria fibulae continentur^k latera. ac unum quidem inter primum &
 secundum angulos consistit, quod unà cum tibiae ossis externo^l latere aptam sedem præbet il-
 lis musculis, qui à tibiae anteriori sede in pedis superiora feruntur. Sunt autem illi, pedem mo-
 uentium^m sextus, deinde quatuor pedis digitosⁿ extendens, simul cum^o nono pedem mouen-
 tium, & illo qui pollicem^p extendit, ac priuatim in primo hoc fibulae latere^q lineam quandam
 exiguit modicè protuberantem, à qua illi musculo principium offertur. Secundum latus, prima
 linea & tertia terminatur, & amplum est, egregieq; sinuatum^r septimo ac^s octauo pedem mo-
 uentibus musculis locum præbet. Quinetiam octauū musculi gratia, latus hoc utcunque aspe-
 rum cernitur, ut is hinc uniuersum ipsius principium pulchrè educat. Ab illis itaq; musculis qui
 primum fibulae latus occupāt, & illis qui secundo exporriguntur lateri, prima fibulae linea pri-
 mus ue angulus educitur. Tertium latus secunda & tertia lineis circumscriptū, à musculis com-
 primitur posteriorem tibiae sedem occupantibus, & potissimum ab eo^t qui pollicis secundum
 os flectit, ac ab hoc fibulae latere carneus enascitur. Quæ quum ita sint, tertia linea à musculis
 secundum & tertium latus occupantibus foras protruditur. Secunda autem linea ab illis pro-
 ducitur musculis, qui tertium & primum fibulae latus comprimunt. Verum secunda hæc li-
 nea priuatim^u ligamentum educit, fibulam tibiae ossi tota illa sede qua hæc ossa inuicem dehi-
 scunt, colligās, & in^x secundam tibiae ossis lineam insertum. Tibia enim os similiter ac fibula,
 in suæ longitudinis medio quadantenus triangulare est. ac prima ipsius^y linea in anteriori os-
 sis sede consistit, insigniterq; prominet. unde etiam Spina Anatomes professoribus appellatur.
 atque hæc adeò acutè porrigitur, ut nullibi potius concertantes pueros pedibus inuicem pe-
 tere

x 1 fig. E.
 de in 2, 5, 6.
 9 fig. n.

y 9, 11 fig. h.
 z 6 fig. ca.
 33 H.

a Confer fi-
 guras inte-
 gram ossi-
 um compa-
 gem expri-
 mientes, mu-
 scu. tabulis
 in pede.

b 1 muscul.
 ta. 1. 2 tab.
 z. c. inte-
 gram fi-
 gur. p.

c 2, 6 fig. q.
 d 2 muscul.
 tab. z. liga-
 mentum.

musculi au-
 tem x et y.
 e 2, 6, 11 fi-
 gur. r.
 f fi. cap. 1 li.

2. g.
 g 1, 5 fig. o. p.
 h 1, 5 fig. ff.

i 1, 2, 5, 6 fig.
 secunda li-
 nea t. nota-
 tur. tertia
 autem u. u.

k primum
 latus 1, 5 fig.
 x, secundum
 1, 5 fig. a. ter.

2, 6 fig. s.
 l 1 figur. f.
 m 3 muscul.

tab. x.
 n 4 muscul.
 tab. x.

o 4 tab. o.
 p 5 tab. o.
 q 1, 5 fig. x. x.

r 6 muscul.
 tab. o.
 s 6 tab. x.

t 14 tab. A.



u fig. ca. 1
 lib. 2 a.
 x 1, 2 fig. d.
 d.
 y 13 fig. n.

tere uideamus, quàm ad anteriore tibiæ sedem, ubi linea proximè cuti subiecta, hanc cultri modo scindit, quoties ipsa impetu ad tibiæ os colliditur. ^z Secunda & ^a tertia tibiæ ossis lineæ, posterioris sui ^b sedis latera constituunt: ac tertia quidem internum eius sedis latus efformat, parum acutè educta, sed obtusa admodum, & quasi teres. Secunda autè linea paulo est acutior, ac externum posterioris tibiæ ossis sedis latus efformat: estq; illa, cui ligamentum fibulam tibiæ ossi cōnectens inferi non ita multo antè relatum est. His tribus lineis, tria tibiæ ossis conficiuntur latera, ac ^c primum quidem prima secundaq; linea terminatur, sinuatumq; est ac planum, eorundemq; musculorum occasione cauatur, quibus primum fibulæ ^d latus cedere dictum est: ^e secundū uerò tibiæ ossis latus prima tertiaq; linea terminatur, & insigniter gibbum est, nulloq; prorsus obtectum musculo, Græcis *λεῖα*, & frequentius adhuc *ἀντικνήμιον* nuncupatur. ^f Tertium tibiæ ossis latus, secunda & tertia circumscriptum lineis, non ualde depressum est, ac musculis occupatur posteriorem tibiæ sedem sibi uendicantibus: præcipuè uerò ^g illo qui quatuor digitorum tertij ossis flexus autor habebitur, & ^h illo quem pedis motorū quintum statuimus. Ad hæc, tertium hoc latus in superiori ipsius sede asperam ostendit ⁱ lineam, oblique exporrectam, cui ^k musculus inferitur, quem in poplite latitantem uocamus. Atque huiusmodi sanè fibulæ tibiæq; ossis lineæ & latera læui negotio arguūt, quàm suffulciendis educendisq; musculis hæc ossa conueniant. Articuli uerò ostendunt, quàm affabrè motibus quos cruribus molimur obeundis Natura hæc extruxerit, illa ad eum quem diximus modum iuxta articulorum sedem adaugens: adeò ut citra summam Creatoris nostri admirationem, hæc nemo contemplari queat, & non promptè colligat, quàm uniuersam is uitaret cōstructionem, si quicquam eorum quæ modò scripsimus, immutatum fingeret.

DE PATELLA. CAPVT XXXII.

PRIMA TRI-

GESIMISECVN
di Capitis figura, anteri
orem patellæ faciem
ostendens.



SECUNDA,

POSTERIOREM
patellæ sedem specian
dam proponens.

CHARACTERVM SECUNDÆ FIGVRÆ, INDEX.

- A, B* Dextri cruris patellæ tuber sinum inferiorum femoris capitum subiens.
C Sinus qui interno femoris capiti adaptatur.
D Sinus patellæ, gibbo externi femoris capitis congruens.
E Hac parte patella inferiori sua sede tibiæ os spectat, & uelut i in processum excedit, qui similiter atque tota anterior ipsius sedes tendinibus tibiæ extendentibus innascitur, quemadmodum pulchrè ostendit octaua musculorum tabula, caractere *k*. qui innascitur caracteribus *g, h, i*. Foraminula uerò hac parte, ut & in patellæ anteriori sede conspicua, etiam citra caracterum operam promptè obseruantur.



ANTERIORI genu articuli sedi os quoddam præponitur orbiculare, & breui scuto non ab simile, quod posteriori sua sede, qua femur spectat, læui, lubricaq; cartilagine, magna ex parte obductum uisitur, apto tubere sinibusq; ^b anteriori inferiorum femoris capitum sedi eleganter congruens. Secundum ipsius enim longitudinem tubere amplo & medio-criter prominenti extuberat, quod patulum femoris capitum sinum in anteriori illorum sede exculptum subit. ^d Vtrinq; ad tuberis huius latera unus habetur sinus, prominentes & cartilagine incrustatas femoris capitum sedes excipiens. Verum ut exterius femoris caput antrorsum magis, quàm interius caput porrigitur, & ampliori sede læui cartilagine obducitur, ita sanè exterior patellæ sinus ad tuberis sui externum latus consistens, longè amplior latiorq; interiori sinu occurrit. Patella igitur illa parte qua femoris os contingit, læuis & lubrica cernitur. ^c Anteriori autem ipsius sede, & in lateribus aspera, & cæcis quibusdam foraminulis oblita spectatur: quemadmodum & in posteriori ipsius sede, ^f ubi infima sui parte tanquam acuto quodam processu deorsum ducitur, tibiæq; ossis elatiorem sedem respicit, aspera etiam & foraminulis illis ornata est, quò aptius firmitusq; tendinibus tibiæ extendentibus innascatur. ^g Vniuersa enim patella, tota ipsius amplitudine sedeq; ubi lubrica cartilagine nō obducitur, tendinibus illis innascitur, nec femori, neq; tibiæ aliter quàm tendinum

Patellæ situs
& forma.

Qui patella
femoris ossi
connectatur.

z 1, 2, 3, 4
figur. *a, d.*
a earundē
figur. *i, i.*
b 2, 4, figur. *d.*

c 1, 3, figur. *f.*
d 1, 5, figur. *x.*
e 1, 3, figur. *x.*
e 1, muscul.
tabul. *x, y, z.*
tabul. *θ, u.*
f 2, 4, figur. *θ.*
g 1, 4, muscul.
tabul. *z.*
h 1, 5, muscul.
tabul. *D, E.*
i 2, 4, figur. *u.*
k 1, 4, muscul.
tabul. *r.*

a tota 1, 2
fi. integra-
rum uerò fi-
gur. *z.*
b 2 figur.
cap. 30 H.
c 2 fi. *A, B.*
d 2 fi. *C, D.*

e tota 1 fi-
gura.
f 2 figur. *E.*

g 3 muscul.
tabul. *k.*

*Patellæ sub-
stantia.*

*Patellæ u-
sus.*

dinum beneficio commissa. Hoc enim priuatim patella sibi uendicat, quod alteri ossi ligamen-
torum ope non alligetur, sed tendinibus illis genu articulum transcendentibus innata, ad femo-
ris os ualidissimè cōstringatur. Patellæ substantia in natu grandioribus impenfè dura & solida
est, utcunque etiam Galenus eam extrinsecus cartilaginosa esse asserat: ac Marinus quoque
cum alijs Anatomicorū præcipuis, eam separatim cartilaginosa os uocauerit, & suum quod
patellæ dedicauit Caput, de Cartilaginosis ossibus inscripserit. Atq; isti fortassis animum adhi-
buere tendinū cui patella innascitur substantiæ, quæ elixa molliusculæ cartilaginis speciem obti-
net, earum partium modo, ex quibus neruosa musculorum capita, aut ligamenta principium
ducunt, aut in quæ eadem inferuntur, Verum quando patella debite à tendinibus emundatur,
nequaquam cartilaginea, sed perquam solida fortisq; cernitur, nō quidem in solis hominibus,
uerum etiam in bobus, ouibus, & cæteris quadrupedibus, quorum etiam genu articulo rerum
Opifex patellam præposuit, multo quàm in hominibus longiorem & angustiolem, quemad-
modum in plerisque auibus latiore & breuiorem. Datur autē patella hominibus, & illis quæ
modò dixi animantibus, ut genu articulus, antrorsum in angulum minus fallax extēdatur, &
duntaxat ad rectam lineā ab angulari flexu erigatur. Deinde patella præcipuè præstat, quo mi-
nus in tibiæ flexu femur ex tibiæ ossis sinibus in anteriora luxetur. Atque hunc fanè usum illi
demū nos edocēt, quibus patella sede sua dimouetur; aut quibus ex casu in duas partes fracta,
sursum multo elatius ascendit, quàm inferiora femoris capita cōsistunt. Hi nanq; infirmisimè
tibiā flectunt, & periculosissimè per decliua loca gradusq; descendunt, femore semper pror-
sum citra omne articuli genu robur elabente.


*h 2 fig. 30
cap. E, F.*

DE PEDIS OSSIBVS. CAP. XXXIII.


PRIMA
TRIGESIMI
TERTII CA-
PITIS FIGVRA.



SECUN-
DA.




TERTIA. QVARTA. QVINTA. SEXTA.
ATQVE HIS SERIATIM SVBIACENT SEPTIMA, OCTAVA, ET NONA.



DECI

DECIMA.



VNDECIMA.

DVO-
DECI-
MA.DECI
MATER-
TIA.TREDECIM PRÆSENTIS CAPITIS FIGVRARVM
earundemq; characterum Index.

PRIMA figura integram dextri pedis ossium struem superiori facie exprimit. Secunda dextri quoque pedis ossium compagem ea sede delineatam proponit, qua stantes innitimur. Tertia dextri pedis talus anteriori facie ita oculis subiicitur, ut ipsius superior pars in conspectum ueniat. Quarta, eiusdem tali inferior sedes ab anteriori facie exprimitur. Quinta, talus ab interno latere spectatur. Sexta talum conspiciendum offert externo latere designatū. Septima, dextri pedis calcis os interiori sede ita exprimitur, ut externum ipsius latus magis quam internum appareat. Octaua, calcis os ab interno latere ostenditur. Nona calcis ossis externum latus commonstrat, & perinde ac duæ præcedentes, superiorem calcis sedem depictam exhibet. Decima, pedis os cymbam referens anteriori facie, qua tarsi ossibus committitur, delineatum cernitur. Vndecima eiusdem ossis posteriorem refert sedem. Duodecima, quatuor tarsi ossium simul nexorum anterior facies conspicitur, cui pedij ossa coarctantur. Decimatertia, quatuor tarsi ossium posterior facies spectatur, quæ calci & ossi nauiformi est contermina.

I, 1, 2 Talus. Δ 1, 2 Calx. Θ 1, 2 Cymbam referens os.

1, 2, 3, 4 His numeri characteribus in prima figura, secunda, duodecima & decimatertia quatuor tarsi ossa indicantur, quibus ab inscripto numero nomina imponimus, hoc primum, illud secundum, atq; ita deinceps appellantes.

I, II, III, IIII, V Quinq; pedij ossa in prima figura notantur, quæ in secunda etiam citra characterum appositionem sunt conspicua.

Λ, Ξ 1, 2 Digitorum pedis ossa.

A, B, C, D 3, 5, 6 His quatuor characteribus tali tuber notatur, tibiæ ossis inferiori appendici articulatam. ac A quidem ad B primam huius tuberis costam seu latus indicat. C uero ad D secundum, & A ad C tertium, B autem ad D quartum.

E, E 3 Sinus tuberis tali secundum ipsius longitudinem insculptus.

F, F 3 Duæ tali tuberis partes, elatius quam sinus E indicatus prominentes.

G 5 Internum tali tuberis latus, quod compressum & cartilagine incrustatum, interno malleolo committitur.

H 6 Tali tuberis sinus externo ipsius lateri insinuatus, qui cartilagine similiter obductus, externum malleolum excipit.

I 5 Sinus tali asper, cui ligamentum cartilagineum ab interno procedens malleolo inseritur.

K 6 Tali sinus, cui ligamentum cartilagineum ab externo malleolo pronatum inseritur.

L, M 5, 6 Duo sinus, quos posterior tali regio uersus internū latus spectandos exhibet, qui deducēdis reflectendisq; musculorum tendinibus parantur, hæc pedis inferiora subeuntibus.

N 3, 4, 5, 6 Tali ceruix.

O 3, 4, 5, 6 Tali caput, ossis cymbam referentis sinum subiens, qui undecima figura k indicabitur.

P 7, 8, 9 Calcis ossis tuber, caput ue cartilagine obuolutū, & in tali sinum Q notandum ingrediens.

Q 4 Tali amplius sinus, calcis caput P iam indicatum admittens.

R 7, 8, 9 Calcis ossis sinus, cui inferior tali capitis sedes S iam indicanda articulatur.

S 4 Inferior tali capitis, quod ossi cymbam referenti articulatur, sedes, calcis sinum subiens.

T, T 4

- T, T 4 *Asper tali sinus, ex quo cartilaginea ligamenta calci inseruntur.*
- V, V 7, 8, 9 *Asper calcis sinus, cui cartilaginea ligamenta ex nuper dicto tali sinu immittuntur.*
- X, Y, Z 2 *Calcis ossis sedes, quæ pede in terram firmato, deorsum spectat. Verum Y, & Z in secunda, & Y in octava, & Z in nona priuatim huius sedis processum notant, musculis quibusdam educendis aptum, & propinquius reliqua calcis sede terræ innitentem.*
- a, b 7, 8, 9 *Ab a ad b superioris calcis sedis interuallum notatur, à posteriori tali regione ad posticam calcis deductum.*
- c 2, 8, 9 *Postica calcis sedes.*
- d, e 2, 8 *Internum calcis latus. Verum e priuatim sedem notat, qua tendines hanc pedis inferiora petunt.*
- f, g 1, 7, 9 *Externum calcis latus. Verum g separatim huius lateris regionem insinuat, cui septimi & octauæ pedem mouentium musculorum tendines exporriguntur.*
- h, i 7 *In septima figura anterior calcis sedes est conspicua. & h quidem eius sedem indicat, quæ talo committitur. i uero eam notat, quæ ossi tesseræ, seu cubum imitanti articulatur. Est itaq; i depressum calcis caput, sinum ossis cubum imitantis subiens. Atq; id caput in nona etiã est conspicuū.*
- k 11 *Admodum profundè exculptus ossis cymbæ imaginem ostendentis sinus, tali caput O signatum suscipiens.*
- l, m, n 10 *Anterior ossis cymbæ assimilati sedes, tres perquam leuiter prominentes commonstrans superficies, quibus tria interiora tarsi ossa coarticulantur.*
- o, p, 11, & o in 10 *Superior ossis cymbam referentis sedes, qua pedis superiora spectat.*
- q, r 10 et q in 11 *Inferior ossis cymbam referentis sedes, terram intuens. Verum q priuatim huius sedis sinum indicat, quò sextus pedem mouentium musculus deducitur.*
- s, t, u 13 *Tres planæ quodammodo superficies trium interiorum tarsi ossium, quibus hæc ossi cymbæ simili coarticulantur.*
- x 13 *Ossis cubum referentis sinus in superficie leuiterq; cælatus, quo calci id articulatur. estq; hic sinus huius ossis unum latus.*
- α, β 12 *Ossis cubi referentis sedes, cui pedij os anulare suffulciens digitum, & illud quod minimo præponitur, planis superficibus coarctantur. estq; hæc sedes secundum latus ossis cubo similis.*
- γ 12, 13 *Tertium ossis cubo assimilati latus, quod & os cymbam exprimens respicit, tertioq; tarsi ossium coarctatur.*
- δ 12, 13 *Quartum ossis cubo à dissectionis professoribus comparati latus, externā pedis sedem spectans.*
- ε 12, 13 *Quintum eius ossis latus, in pedis superiori consistens superficie.*
- ζ, η 2, & ζ in 13 *Sextum illius ossis latus, terræ innitens. Verum η peculiariter ipsius indicat sinū, ad quem septimi pedem mouentis musculi tendo reflectitur.*
- θ 13 *Processus tertij tarsi ossium, quod ossi cubum referenti articulatur, in hoc prominens, ut ipsi quintus pedem mouentium musculus inseratur.*
- 12 *Sedes intimi tarsi ossium, cui pedij os pollicis præpositum articulatur.*
- κ 12 *Huius secundi tarsi ossis sedi, pedij os indicem sustinens coarctatur.*
- λ 12 *Huius tertij ossium tarsi sedi, os pedij articulatur, cui medius innititur.*
- μ 1, 2 *Ossiculum ad externum articulationis latus obuium, quo pedij os paruo præpositum digito, ossi cubum exprimenti committitur.*
- ν, ν 1, 2 *Interualla, sedesq; quibus pedij ossa inuicem dehiscunt.*
- ξ, ξ 1, 2 *Capitula pedij ossium, sinus primorum digitorum ossium subeuntia.*
- ω 2 *Processus pedij ossis pollicem suffulciens, cui septimi pedem mouentis musculi tendo implatur.*
- ρ 2 *Processus appendicis superioris pedij ossis minimo præpositi, in hoc potissimum prominens, ut octauæ pedem mouentis musculi insertionem excipiat.*
- ς, τ, υ 1, 2 *Tria indicis ossa. atq; eadem ratio medij, anularis, minimiq; est.*
- φ, χ 1, 2 *Duo pollicis ossa.*
- ψ, ω 2 *Duo ossicula pedij ossi pollicem sustinenti supposita.*
- * 2 *Ossiculum secundo pollicis internodio præpositum. Reliqua autem sesamina ossicula in primis digitorum articulis nullis notis insigniuimus.*



VE M A D M O D V M canes, mustelæ, feles, cuniculi, lepores, & magis adhuc simiæ, & ursi, omniaq; quadrupeda, quibus pedes in digitos finduntur, eandem cum hominibus, femoris ad coxædicis os, & femoris ad tibiam articuli speciem obtinēt: ita sanè par quoq; in posteriorum pedum ossibus illis, & huic cernitur contextus. Quippe si pollicis in illis animalibus constructionem ab homine differre, atque magis & minus ad manus nostræ pollicem accedere, ac plures interdum pauciores ue digitos obtingere, no-

Quadrupedi cum hominis, cruribus ac pedibus similitudo.

strumq; pedem breuiorem esse subaudias, nullo prorsus osse humanum pedem donari spectabis, cui penitus simile, tum situ, tum forma, tum articulatione, tum mouēdi ratione in canibus & id genus animalibus non reperias. Cæterum posteriorem in illis pedem appello, totam eam crurum partem, quam terræ inniti conspiciamus, quoties canē aut ursum anterioribus cruribus à terra subleuatis, nulliq; baculo aut alio quopiam fulcro innixis erectum cernimus. non uerò illam duntaxat partem, quæ quum quatuor insistent pedibus, terram contingit. ea nanq; duntaxat pedum digiti est: quemadmodum & nos quoque, quum quatuor ueluti cruribus prorepere studemus, solis manuum & pedum digitis terram cōtingimus, brachiale & calcem à terra urforum canumq; ritu subleuantes. Adeo mehercule, ut dictis iam animalibus illic pes incipiat, ubi Aristoteles proportionalem nostro genu articulum in omnibus quadrupedibus finxit. Vnde etiam liquet, quàm hoc meum de quadrupedum ossibus paradoxum, Aristotelis, omniumq; (quod sciam) philosophorū, & inter Anatomicos facile principis Galeni de comuni animalium gressu in crurum flexione, extensione, sessione, ac femorum cum spina seu dorso ductu, & corporis erectione dogmata perturbet. Ab hac itaq; ossium in illis animalibus cum homine similitudine, pedis ossium sermonem aggressus sum, quò minus aliquis hinc mox initio à me requireret, quæ tot chartis in tertio de Partium usu Galenus persequitur. quando hominis pedem quadrupedum longiorem, & deinde latum mollemq; esse describit. adeoq; diffuse hominem in ossium compositione ab alijs animalibus distinguit, ac demum tam sollicitè cur homo erigatur sedeatq; ratiocinatur, in Euripide ridendo magis quàm spectandis ossibus occupatus. Quandoquidem etsi ursi & alijs eius generis animalibus eadem quæ homini adsunt, tamen Galenus docet Naturam nonnulla homini ut bipedi, nonnulla autem ut animali ratione prædita, in pedum constructione largiri. Arbitror itaq; posthac Aristotelis Galeniq; studiosos, hominum, & quadrupedum, & auium quoq; ossa inuicem collaturos, ac quoniam pacto nos quatuor ueluti cruribus innixi progrediamur, quæq; ratione felis aut canis sedeat, aut erectus parieti innitatur, ac denique singula seorsim in quo conueniant aut discrepent indagaturos, ut deinceps placita tantorum uirorum adeo diffuse lateq; pertractata, naturalium rerum studiosi rectius euoluant, ac tandem admoniti agnoscant, quàm manifestò huiusmodi ossium similitudo illa redarguat: quamq; Aristotelis & Galeni, multoq; minus Platonis in Anatome dogmata, non ex tripode sint dicta. Prolixum nanque foret, hinc omnium de talis & crurum motibus sententias recensere, atq; quid de singulis sentiam adhibere. potissimum quum hactenus pedis ossa nondum descripserim, quæ opportunè à talo (quem Græci ἀσφαλῶν & ἀσπίον uocant) aggrediar.

Li. de Cōmuni animalium gressu. Lib. 3 de V. su parte.

Homini itaque^a talus (qui forma canum, urforum, similibumq; animalium, quibus pedes in digitos dirimuntur, non autem bisulcorum, & solidis unguibus præditorum animalium talo respondet) sub tibiæ osse & fibula continetur, magna sui sede ab illorum ossium appendicibus comprehensus, quemadmodum in tibiæ ossis & fibulæ descriptionibus antea retuli. Elatior nanque tali pars, quæ sursum quoties totus pes terræ innitur spectat, insigni admodumq; læui prominet^b tubere, lubrica cartilagine incrustato, ac denique quartæ rotulæ cuiusdam parti non absimili. Est nanq; hoc tali tuber rotulæ illius partis modo orbiculare ac læue, & quatuor lateribus seu costis terminatū. ac^c prima quidem & ^d secunda ad tuberis latera secundum ipsius longitudinem ueluti in orbem ducuntur: ^e tertia secundum anteriorem tuberis terminum, ^f quarta autem secundum posteriorem terminum feruntur. Adeo ut orbiculare hoc tali tuber quadrangulare quodammodo sit, atque ob id Græcis τετραγών, Latinis autem quatrio appellatur. Neque uerò lateribus duntaxat præsens tuber quartæ illi rotulæ parti correspondet, sed rotulæ modo, ad quam funis reflectitur, hoc tuber^g sinu quodam in ipsius medio donatur, qui leuiter admodum cælatus, ad latera^h utrinque magis protuberat, illiⁱ sedi exactissimè conueniens, quam in ima tibiæ ossis appendicis sede talo excipiendo paratam scripsimus. Præsentis tali ad tibiam nexus beneficio pedem flectimus, & reflectimus, ac nimis quàm obscurè in latera ducimus. quanquam nos tanto perfectiorem in latera motum moliamur, quanto tali tuber, seu quatrio minus rotulæ modo exculpitur, & quò minus mutuo ingressu tibiæ ossi articulat^j

TALI situs, ac ipsius cum tibiæ osse & fibula articulationis ratio.

N ticular:

a 1, 2 fig. r.
b tota 3.
c 4, 5, 6 figuræ, ac integritas ad
d 3, 5, 6 fig. A, B, C, D.
e 3, 5, 6 fig. ab A ad B.
f 3, 5, 6 fig. à C ad D.
g earundem fi. ab A ad
h 3, 5, 6 fig. A, B, C, D.
i 3, 5, 6 fig. A, B, C, D.
j 3, 5, 6 fig. A, B, C, D.

articulatur. quemadmodum in canibus fit, quibus tali quatrio insignius secundum ipsius longitudinem cauatur, magisque ad rotule, cui funis aduoluitur speciem accedit, ob quod etiam firmiori mutuo ingressu canis talus tibiae iungitur. Ad hæc, præsens tali quatrio non in his solum quæ modò diximus quartæ rotulae parti respōdet, uerum uti rotulae latera, quibus ipsa ueluti in furcula, aut ut alijs placet in trochlea, suffulcitur, detrita & læuia unctaque uisuntur: ita quoque tali tuber ad latera, quibus malleolos contingit, comprimitur, læuique cartilagine incrustatum cernitur, quamuis non pari modo utrinque. In interno siquidem latere, ^k parua amplitudine & superficietenus tantum comprimitur, quod scilicet inferioris tibiae ossis appendicis processus anteriorem malleolum constituens, & hoc tali latus compræhendens, non admodum amplo ^l spacio læui cartilagine incrustatur. Externum uerò tuberis tali latus ^m ampliter sinuatum, & maiori interuallo cartilagine incrustatum apparet, ut aptam sedem constituat, cui ⁿ internum exterioris malleoli latus concinnè congruat, ^o qui magis deorsum, quam interior malleolus, exportigitur. Quemadmodum uerò internum interioris malleoli latus asperum ^p sinum exigere scripsimus, ex quo ^q ligamentum cartilagineum talum tibiae ossi colligans pronascitur: ita quoque eius ligamenti recipiendi gratia internum tali latus aspero ^r sinu insculpitur, perinde ac externum ipsius tali latus similiter ^s cælatur, ut ipsi ^t ligamentum inseratur ab interno exterioris malleoli latere eductum. Huiusmodi quoque ligamentorum ratione posterior tali sedes ad tuberis ipsius, seu quatrionis ^u radicem consistens aspera est, ut inibi ligamenta admitteret à tibia principium ducētia, & rursus alia in calcem porrigat. At præter eiusmodi asperitatem posterior quoque tali sedes, ^x sinus ostendit, musculorum tendinibus, qui hæc pedis inferiora subeunt, uehendis parati. ^y Descendunt autem hæc tendo quinti pedem mouentium muscoli, & musculi secundum pollicis os flectentis, & illius tendo qui tertia quatuor digitorum ossa inflectit. Atque ad hunc modum talus tibiae articulatur, & tali quoque superior ac posterior sedes, lateraque ita se habent. Ab anteriori uerò ipsius sede, idque magis ab huius sedis interno latere oblonga producit ^z ceruix, quæ aliquousque progressa, in ^a caput rotundum, lubricaque cartilagine incrustatum definit, quod nauicularis ossis alto ^b sinui inarticulatur, contextum efformans, cuius beneficio modicè obscuroque motu pedem in latera agi circumducique arbitramur. Inferior tali pars, duplici articulo calcis ossi articulatur, illique totus insternitur, ac unus quidē articulus in posteriori consistit regione, ubi calcis os amplo latoque prominet ^c tubere, amplum profundumque tali ^d sinum ingrediente. Alter uerò articulus anterior est, ac uersus internum pedis latus uergens, secus atque posterior articulus se habet. Calcis enim os oblongo ^e sinu exculpitur, qui cartilagine incrustatus, humiliorem tali capitis ^f sedem excipit. Talinamque ^g caput nauiculari ossi articulum, inferiori sua sede qua calci innititur depresso tubere, dicto iam calcis sinui examussim adaptatur. In horum articulorum medio ^h talus, & ⁱ calx pariter exasperantur, profundosque obtinent sinus, ex quibus cartilaginea pronascuntur ligamenta, talum calci ualidissime connectentia. Atque isti asperi horum ossium sinus adeo altè cælantur, ut in mundatis ossibus, & postmodum inuicem commissis, magnum inter talum calcemque inibi pateat interuallum, in uiuentibus cartilaginosis huiusmodi ligamentis oppletum, quæ adeo pertinaciter talum calci colligant, ut uix tantillum is supra calcem moueatur, ac sua inferiori sede tam sit immobilis, ut superior, qua tibiae articulatur, uersatilis uolubilisque obseruatur.

Sinus tali quibus à tibia ossis & fibulae ligamenta assuunt.

Sinus quibus tendines deducit.

Tali cum ossis cymbam referente articulus.

Tali ad calcem coeexus.

Sinus inter tali cum calce commissuras apprens.

CALCIS ossis sedes teretem spectans.

Superior calcis sedes extra tibiae rectitudinem retrorsum ducta.

^k Calcis os, quod omnium pedis ossium facile maximum est, parique cum talo constat substantia ^l ea parte qua ingredimur leuiter teres, sed tutæ formationis gratia quoque latiusculum existit, uerum interim asperum & inæquale inibi cernitur, idque quorundam musculorum occasione. Primum enim in inferiori ipsius sede transuersim iuxta posteriora deorsum prominet, ac asperum educit ^m processum, à cuius anteriori sede ⁿ musculus principium ducit, qui quatuor pedis digitorum secundum os flectit. Dein illic ^o musculosa substantia enascitur, quatuor particulas deducens, quibus quatuor digitos pollicis adducimus. Horum enim musculorum produciendi gratia, hæc inferior calcis sedes, latior & inæqualis est, & processus ille ob hoc prominet, terræque propinquius quam reliquum calcis corpus accedit, quo minus illorum musculorum capita inter calcandum comprimantur. Superior calcis sedes, ^p quæ à posteriori tali parte ad posticam usque ipsius calcis sedem ducitur, teretis corporis speciem refert, priuatim nihil præter exiguam asperitatem monstrans, in quam tibiae ossis & tali ligamenta inseruntur, quæque à musculorum exortu & insertionem, & articulationem libera est. Posterior hæc calcis sedes, tibiae ossis rectitudinem admodum excedens, in hoc in posteriora educitur, ut tibia opportunè instar perpendicularis lineæ in pedem tanquam in aliam lineam transuersim ductam fulciri possit, utque totius corporis robustissimus ^q tendo ^r posteriori calcis parti inferatur. huic etenim depresso & utcunque asperæ calcis parti tendo implantatur ex primo, secundo & quarto

to pe

k 5 figur. G.
l 9 fig. cap.
31 g.
m 6 fig. H.
n 9, 11 figu.
cap. 31 h.
o confer 1
figuræ cap.
31 E cum o.
p 4, 10 fig.
cap. 31 h.
q fig. cap. 1
lib. 2 f.
r 5 fig. I.
s 6 fig. K.
t fig. cap. 1
lib. 2 g.
u post B, D
figuræ s.
x 5, 6 fi. L.
M. aut 15
muscul. tab.
charact. 1.
2, 3.
y eiusdem
tabu. D, E.
O, P. muscul.
los notant.
z 3, 4, 5, 6
figura N.
a earūdem
figur. O.
b 11 fig. h.
c 7, 8, 9 fig.
P.
d 4 fi. Q.
e 7, 8, 9 fig.
R.
f 4 fig. S.
g 4 fig. O.
h 4 fi. T, T.
i 7, 8, 9 fig.
V, V.
k 1, 2 figuræ
Δ. & tota
7, 8, 9 fig.
integrarum
autem 2, 3
figura a.
l 2 figur. X,
Y, Z.
m 2 figur. Y,
Z. & 8 fig.
Y. 9 autem
figura Z.
n 14 muscul.
tabul. o.
o 14 muscul.
tab. λ, μ. &
15 tab. N.
p 7, 8, 9 fi.
ab a ad b.
q 13 muscul.
tabul. λ. aut
14 tab. tendo
ex n, o, q
coflatus.
r 2, 8, 9 fi. c.

to pedem mouentibus musculis conflatus. In quadrupedibus autem, ut canibus, ouibus, & equis, posterior hæc calcis ossis sedes ex abundanti sinum quendam oblongum sibi uendicat, quo tendo is tutò uehitur, qui in illis animalibus secus ac in homine latum tendinem plantæ cuti subnatum procreat. Cæterum calcis laterū quæ ampliter sunt depressa lataq̃, internum latus læue & insigniter sinuatum conspicitur, ut aptam constituat sedem musculorum tendinibus hæc pedis inferiora petentibus, atque ad internum hoc calcis latus tutissimò reflexis. Deducuntur autem hæc, præter præcipuam pedis inferiora petentem uenam, & arteriam, & neruum tendo quinti pedem mouentis musculi: & tendines duorum musculorum, qui ultimos pedis digitorum articulos flectunt. Hi tendines potissimum ad posteriorem processum calcis sedem conuoluuntur, cui Natura sinum insculpsit tali caput excipientem, & anteriorem tali cum calce constituentem articulum. Adeò ut is processus in internum pedis latus protuberans, internum calcis latus impense sinuatum efficiat, quemadmodum & protuberans posterioris calcis sedis internū latus hunc quoq̃ sinum ampliter auget. Id enim in hoc insignius prominet, ut musculus ab illo enascatur, cuius beneficio pollex introrsum à cæteris digitis abducitur. Externum autem calcis latus non sinuatur, sed asperum & inæquale ac excarne est, si modo humiliorem ipsius sedem exceperis, quæ musculum educit paruum digitum à cæteris digitis in externum latus abducentem. Deinde anterior huius lateris sedes aliqua ex parte læuis, modicèq̃ admodum in superficie sinuata cernitur, & tendinibus cedit septimi & octauissimi musculorum pedem mouentium, qui ad posteriorem externi malleoli sedem reflexi, secundum hanc calcis regionem porriguntur. Cæterum calcis anteriorum partium, ea quæ è regione magni digiti habetur, & processus modo in internum calcis latus excedit, talo quemadmodum antea diximus articulatur, nulli interim alteri ossi contigua. At calcis anterior pars minimo digito situ respondens, in anteriori sua facie læuis est, & lubrica cartilagine incrustatur, depressò amploq̃ prominens capite, quod ossis tesseram imitantis sinui coarticulatur, qui similiter lubrica obductus cartilagine, duntaxat superficietenus insculpitur, eaq̃ commissuræ specie hic articulus perficitur, quam ἀρθρωδία Græcis uocari diximus.

Naiculare seu nauiforme os, posteriori quidem sede admodum profundo donatur sinu: unde etiam à cymbæ imagine σκαφοειδὲς Græcis nuncupatur. Sinus iste (uti prius dictum est) tali caput excipit. Anterior ossis cymbæ comparati sedes lubrica cartilagine incrustatur, & tres admodum leuiter prominentes commonstrat superficies, tribus tarfi ossibus, quæ ipsi articulantur, paratas, adeoq̃ modicè protuberantes, ut num sinus, num capita sint, penè dijudicare nequeas. Harum superficierum intima & interno pedis lateri proxima, reliquis duabus amplior est, & insignius quàm illæ ideo prominet, quòd tarfi os ipsi coarticulatum maius & amplius sit, & profundius quoque sinuetur alijs duobus tarfi ossibus, quæ reliquis duabus ossis cymbæ exprimentis superficieribus committuntur. Læues has, adeoq̃ obscurè protuberantes superficies, dissectionum periti cubos uocāt, quoties tria tarfi ossa cubis eius ossis quod cymbam refert coarctari docent. Superior huius ossis sedes gibba, & quodammodo rotulæ modo orbicularis est, eam obtinens figuram, quæ pedi hac in sede fuit optima, iniurijsq̃ ferendis pertinacior. Atque hæc sedes uniuersa utcunque aspera est, quòd scilicet ligamenta educat, id os talo & tarfi ossibus connectentia. Inferior ossis cymbæ similis sedes utcunque sima uisitur, ut hac parte cauitatem pedi magnopere necessariam adaugeat. Verum hæc ossis pars, superiori parte asperior ac inæqualior cernitur: quòd hinc ualidiora ligamenta, quàm ex superiori enasci debuerint. Præterea inferior hæc sedes iuxta internum ipsius latus sinum exigit, ad quem sexti pedem mouentis musculi tendo appositissimè reflectitur. Nauiculari itaq̃ ossi, ut neque etiam calci, neque talo, in manu nullum proportionale os cōsistit, quæ autem adhuc in pede recensenda supersunt, extremæ manus partibus aliqua ex parte correspondent: cuiusmodi tarfi sunt ossa, brachialis ossibus conferenda.

Vocatur autem Græcis τάρσος quatuor pedis ossium series, quorum tria nauiculari coarctantur: quartum uerò, quod tesseræ assimilatur, calci. Quamuis interim Græci subinde tarfi nomen non his solum ossibus accommodent, uerum uniuersam pedis superiorem partem eo nomine plerunque intelligant: uti Galenus in libris de Administrandis sectionibus perpetuò facit, tendines, & uenas, & arterias, neruosq̃ secundum tarsum ferri scribens, quæ per pedis superiora exporriguntur, digitosq̃ accedunt. Latinorum quamplurimi hanc ossium struem plantam quoque nuncupant. uerum quando plantæ nomen latius patet, non ineptè tarfi nomine, dum aptius sese offerat, mihi utendum duxi. Tarfi igitur ad brachiale constructionis proportio non est obscura. ex quatuor enim ossibus tarsus, ex duplicatis autem brachiale cōstituitur. Ex pluribus namq̃ & minoribus particulis apprehendendi organū componi debuit. ex gran-

Internum calcis latus quod le.

Externum latus.

Anterior calcis pars.

OSSIS CYMBÆ referentis sinus.

Anterior ossis sedes, & tres ipsius planæ superficies.

Superior sedes.

Inferior.

Quibus pedis ossibus in manu nullum respondet.

TARSVS.

3 2, 8 fig. d. e. ac e sinuata tam indicat sedem. 4 ultimæ li. 3 figuræ d. ultimæ li. 4 figuræ. 14 musc. tab. 14. 7 14 tab. 7, 8, 9 figuræ. R. 4 2, 8 fig. Y. b 6 musc. tab. 7. 6 1, 7, 9 fig. d. 2, 9 fig. Z. e 2 musc. tab. 11 et 14 tab. 5. 1, 7, 9 fig. g. 6 musc. tab. 4, deinde. 6 6 tab. 11. 7 7 figuræ. h. 7, 9 fig. i. 13 figuræ. x. m 1, 2 figuræ. 10 et tota 10 figuræ. in integrarum autem b cū 11, et d, e, f. 11 figuræ. k. 13, 4 figuræ. O. p 10 figuræ. m, n. 1, 2, 12, 13 figuræ. charac. 1, 2, 3. r 11, figuræ. o, p. 10 figuræ. o.

10 figuræ. q. r. et 11 figuræ. q.

10, 11 figuræ. q. u 3 musc. ta. 1.

1, 2, 12, 13 figuræ. charac. 1, 2, 3, 4. in integrarum figuræ. d, e, f, g ad b, c, et h, b. 7 figurarum 25 cap. cha. ract. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

*Tria tarfi ossi-
sa interiora.*

*Quartum &
extimum os.*

*Tarfi ossium
forma et quan-
tatem uariā
esse.*

*PEDIUM hi-
storia.*

*Pedium quin-
que ossibus cō-
stare.*

*Pedij ad tar-
sum coarticu-
latio.*

dioribus uerò paucioribusq̃, ambulandi instrumentum. Tria tarfi ossium interiora plantis quodammodo ^a superficiebus nauiculari ossi coarctata, proprio carent nomine: at nonnullis simul omnia *χαλκοφῶν* appellantur. Quartum autem extrinsecus situm, à cubi seu tesseræ forma (quum quasi octo habeat latera) *κνέσσει* uocatum est. Atque unum ipsius latus posterius est, quo ^b calci committitur: ^c secundum anterius, quo continua superficie duobus pedij ^d ossibus coarctari docebitur. ^e tertium interius est, quo ipsi proximo tarfi ossi coarticulatur. ^f quartū pedis exterius respicit latus, uixq̃ lateris nomen meretur, quum admodum obscure planum sit. ^g quintum superius est, nulli etiam nexum ossi, sed pedis superiora spectans. ^h sextum terram respicit, nulli similiter ossi commissum, cæterisq̃ lateribus longè inæqualius, & priuatim oblongo quodam ⁱ sinu donatū, ad quē maxima Naturæ solertia septimi pedem mouentis ^k musculi tendo reuoluitur. Quia uerò aliquot huius ossis latera ad eum modum obscura & inæqualia sunt, & non ad amulsim tesseræ imagini accedit, Arabes ab inæquali effigie, & quadam grandinis imagine, id grandinosum appellarūt. Alij rursus à multiplici forma illi idem nomen cum cuneum referenti capitis ^l ossi indiderunt, id *πολύμορφον* uocantes. Hoc tarfi os (uti & antea monuimus) calci coarticulatur, terræq̃ innititur: reliqua autem tria simul cum nauiculari sursum à terra subleuantur, ut pedem hac sede cauum altumq̃ constituent. ^m Tarfi ossa, ut & brachialis, figura & quantitate inter se discrepant, nec superiori nec inferiori parte æqualiter porriguntur. Os enim cubum referens, & primum os interius pedis latus occupans, duobus quæ in medio habentur multò maiora sunt. atque illorum duorum rursus grandius est quod cubum referenti nectitur, quemadmodum & cubum referens intimo ossi grandius quoque uisitur. Quintum etiam os cubum referens posterius, ad calcem scilicet, uergit: intimum uerò os antrorsum uersus pollicem multo magis, quàm cætera, eminet. Ex medijs, quod intimo ossi proximum est, breue cernitur nō adeò antrorsum, atq̃ id quod cubum referenti committitur, productum. Omnia simul iuncta superiorem eorum superficiem gibbam orbicularemq̃ efformant, inferiorem uerò cauam simam ue, quemadmodum & pedis ex usu esse nemo nō nouit. Duo media cunei accedunt imagini. quā enim pedis superiora spectant, lata orbiculataq̃ nonnihil sunt: quā uerò plantam cōstituunt, non secus acuta uisuntur, quàm si cuneorum ritu inter intimum & extimum tarfi ossa hæc iniicerentur. Deinde tarfi os ossi cubo simili coarctatum, priuatim acutius & demissius in pedis inferiora porrigitur, quàm secundū tarfi os intimo commissum, quod ipsius huc deducto ⁿ processui tendo quinti pedem mouentis ^o musculi ualidissimè insecratur. Tarfi ossa, ubi lateribus inuicem cōmittuntur, tota connexus amplitudine leui lubricaq̃ cartilagine non obducuntur, sed duntaxat in posteriori laterum sede ossi cymbam referenti proxima, quippe in reliqua parte nonnihil mutuo distant, cartilaginoforum ligamentorum interuentu inuicem copulata.

Tarsum subsequitur pedis ^p pars, quam Hippocrates à costarum fortassis serie *σῆδος*, alij uerò Græci *πῆδιον*, Latini plantam, & nonnulli pecten, uestigiumq̃ appellant. Cæterū quum illæ Latinorum uoces in musculorum narratione, & in uasorum neruorumq̃ descriptionibus plurimum obscuritatis (si modo illis uteremur) adferrent, conduxerit profectò, & hinc quoque à Græcis nomen mutuare. est enim & planum (quo nomine alij *πῆδιον* uertunt) in hac significatione, qua pedis partem significat, penè inauditum. Pedion igitur manus ^q postbrachiali respondet: uerum quinque ossibus, non autem quatuor, ut postbrachiale, conformatur. In manu nanque pollicem reliquis digitis opponi decebat, atque hac ratione primum ipsius os brachiali articulo laxiori, quàm quatuor postbrachialis ossa, alligatur. quare etiam primum pollicis os digitis, non autem postbrachiali Galenum secuti ascripsimus, pollicis perinde ac cæteris digitis tria ossa tribuentes. Quinq̃ uerò pedij ossa pari articuli connexu tarfi ossibus una serie committuntur. Pes enim quum ambulandi sit organum, stabilitatis securitas illi maximè conuenit, quæ in uno ordine locatis indiget, non solum quidem pedij, uerum etiam & digitorum ossibus. Ac pedij ossa ^r tarfi ossibus læuibus & in superficie tantū protuberantibus capitibus coarctatur, tam obscure prominentibus, ut meritò planis superficiebus pedij ossa tarso coarticulari dixeris. & pedij quidem os pollicis præpositum intimo tarfi cōmittitur ossi, quod indicem suffulcit secundo, quod medium sustinet tertio ossi coarticulatur. duo autem reliqua ossi cubum referenti coarctantur: ^s quemadmodum octauo brachialis ossi ea postbrachialis ossa committi proditum est, quibus anularis & medius innituntur. Et quemadmodū articuli, quo postbrachialis os minimū digitum sustinens brachiali nectitur, externo lateri ^t ossiculum quoddam apponi diximus: ita etiam in pede ^u ossiculum uisitur, ad externum latus articuli positum, quo quintum pedij os cubiformi ossi articulatur. Porro quemadmodum tarfi ossa non eadem linea anteriori parte finiunt, sic etiam pedij ossium aliud alio magis in posteriora porrigitur.

Pe-

213 fig. 1b
u.
a 13 fig. x.
b 7 fig. i.
c 12 fig. a, b.
d 1 fig. III.
v.
e 12, 13 fig. 7.
f 12, 13 fig. d.
g 12, 13 fig. i.
h 2 fig. 3, 9.
i 13 fig. f.
j 2 fig. n.
k 15 musc. u.
l tab. V, X.
m 18 fig. ca. 6.

m Conser
in uicē tar-
fi ossa pri-
ma fig. cū
2. & rur-
sus duode-
cim cum
13 figura.

n 13 fig. 1.
o 15 musc.
tab. D. E.
dein c, d.
p 1 figur. I,
II, III, IIII,
V. integra-
rum uerò
fig. h, b. ad
d, e, f, g, ac
ii.
q 1, 2 fig. ca.
25 I, II, III,
IIII.

r sedes in
tarso ser-
tim notan-
tur 1, 2, 3,
a, b.
s 2 fig. cap.
25. charac.
III, IIII, ad
8.
t 1, 2 fig. ca.
25 N.
u 1, 2 fig. u.

Pedij ossa illic ubi tarso committuntur, lateribus sibi proxima crassaq; sunt, & aliqua ex parte planis laeuiusq; superficiebus per arthrodian inuicem coarctantur. Quà autem à tarso ad digitos abscedunt, tenuiora fiunt, atque in illorum medio^x interualla efformant, quibus^v musculosa reponitur substantia, cuius auxilio primi digitorum articuli flectuntur. Atq; ut pedij ossa illi substantiæ aptiorem sedem porrigant, non adeò acuta tenuiaq; superiori parte, atque ea qua terram spectant, uisuntur. Vbi autem digitis articulatur, omni ex parte postbrachialis^z ossibus respondent, & appendice donata in rotundum^a caput desinunt, sinum primi digitorum ossis subiens. Pedij os pollicis præpositum, ea parte qua tarso articulatur, in ipsius inferiori sede terræ contermina^b, processum exigit, cui septimus pedem mouentium^c musculus inseritur. Atque simili quidem occasione pedij os minimum suffulciens digitum, quà tarso articulatur insignem commonstrat^d processum in externum pedis latus excedentem, in quem octauus pedem mouentis^e musculi tendo insertionem molitur.

Pedij ossa^f digiti subsequuntur, qui ex ternis^g ossibus omnes ad eorum quæ in manu sunt, similitudinem extructis constant: pollice tantum excepto, qui inter alios duplici tantum^h osse extruitur, ut anterior pedis concauitatis sedes firmitus terræ innitatur, ad quod etiã plurimum iuuant magnaⁱ ossicula, quæ quum ossa sesami semen referentia persequeretur, ad primum pollicis internodium reponi dictum est. eo enim Capite non minus de manus quàm pedum ossiculis (quum utrorumque eadem sit ratio) egimus. Quòd uerò pes à summa manu uno osse uincatur, manifestum est. extrema enim manus uiginti septem constat ossibus, illis seclusis quæ sesamo comparantur. Sunt enim octo brachialis, quatuor postbrachialis, & quindecim digitorum. Pes autem uiginti sex tantum donatur ossibus, calce nimirum, talo, naviculari ossi, quatuor tarsi ossibus, quinque pedij & quatuordecim digitorum. Atq; id Galeni nomine hic addendum duxi, qui in secundo libro Commentariorum in Hippocratis librum de Fracturis (ubi is inquit, pedem hominis multis ac paruís ossibus nõ secus ac summã manum efformari) scribit, pedi non aliter quàm extremæ manui uiginti septem adesse ossa: parum mehercule perpendens, se bis cubum imitans os enumerare, aut præter id os, alia quatuor tarsi recensere. quemadmodum sanè facit eodem in libro, quum quatuor tarsi ossa cubum referenti ossi, & illi quod cymbæ assimilatur articulari tradit. Sed hæc de omnibus humanæ fabricæ ossibus sint satis: & nunc ungues ac cartilagines, quæ adhuc reliquæ sunt, recenseamus. si modò omnia, quæ corpus firmant, & suffulciunt, sustinentq;, hoc libro, uti institutum fuit, absoluenda ueniunt.

Pedij ossium interualla.

Ad digitos articulasio.

PEDIS DIGITI.

Pedem à manu summa uno osse cõtra Galeni placitum superari.

DE VNGVIBVS. CAPVT XXXIII.



HIS duabus figuris unguem ita expressimus, quemadmodum conspici solet, quum à manu ad sceleti præparationem cocta, aut pede, diuelli consueuit. Ac dextra quidem figura characteribus insignita, internã unguis regionem, seu cauum ipsius denotat, altera interim unguis gibbum ostendente. Quin & A hic unguis sedes indicatur, ante confecti-

onem apparens. B uerò sedes insignitur, quæ mollis est, nullibiq; detegitur, ac ueluti radix unguis censenda uenit.



AN VVM pedumq; digiti unguibus ideo à summo rerum Opifice decorantur, ut ipsis firmamenti uice apponerentur. Digni enim suis partibus carneis, quibus in extremo donantur, mollia duntaxat corpora apprehendunt. Dura autem, & propter hoc carnis naturam pellentia, uiolenterq; à se cogentia, digiti sine unguium adminiculo nequeunt amplecti. Ipsorum enim caro, quam postea duriusculam quandam adipem cuti substratam esse docebimus, tunc reflectitur subuertiturq;, & ob id firmamento indiget. Quinetiam pleraque deinde commoda ex unguibus, si neque summitatibus digitorum superiores, neque ipsidem inferiores sint, homini accedunt: quemadmodum si radere quid, aut scalpere, aut uellicare, aut excoriare, aut euellere oporteat. Cæterum summus rerum Opifex iustissime unguium (qui & munimenta uulnerantium conuassantiumq; censentur) duritiem effinxit. Si enim duriores quàm nunc sunt, instar ossis cuiusdam procrearentur, ita quidem ad apprehendendum magis essent idonei, ut qui ne minimũ reflecti reclinariq; possent, at rumperentur promptissimè, non secus quàm alia quæ dura fragiliq; constant temperie. Itaq; securitati simul & robori rerum Opifex prouidens, illos mediocriter dueros extruxit, ut neq; usui cuius gratia creati sunt, quicquam in commodaret, neque ipsi quum sua mollitie extrinsecus inciden-

Cur digiti unguibus donentur.

Unguium naturam esse iustam.


*Unguium ne-
xus.*

*Li. 2 de Admi-
nist. dissect.*

tium uim cartilaginum ritu facile exoluunt, leui quaq; occasione afficiantur. Ob eandem hanc causam gibba constant superficie, quod hac figura iniurijs resistendis melius cōparentur. Quò minus uerò suspensi uacillent, ligamento quodam extremi digitorum ossis radici, eorum superiori termino colligantur. Quoniam autem carni cutiq; illos connasci operæ precium fuit, hæc extrinsecus uniuersæ radici circūdatur, illa interius usque quaq; subnascitur. In radicem ipsam, non modò arteriam uenamq; sed etiam neruum porrigi Galenus attestatur, atque ungues ex his sensum, uitam & alimentum aliarum partium modo assumere scribit. Scio quidem non solum duos^a neruulos ad unguem usque radicem ferri, sed eosdem cum^b uenis sub unguibus quoq; ad digiti extremum reperere. ungues autem interim sensus omnis expertes esse arbitror. Ac proinde non leuiter illorum, qui ungues ex ossis, nerui, cutis (quidam & carnis addunt) concretione gigni censent, sententiæ accedo. Quò uerò uenæ, arteriæ & nerui, quemadmodum in hortis alueoli, in unguibus non dispensentur, uel hinc constat, quod pilorum modo ab radice procedentes augeantur. Satiùs enim erat, & hos pilorum ritu semper renouari, atque quum indies atterantur, nunquam non incrementū admittere, quod potius in longum quàm latum & profundum assumunt.

*a manus 2
figura cap.
11 lib. 4.
b manus fi-
gura cap.
6 lib. 3.*

DE PALPEBRARVM CARTILAGI- nibus. Caput XXXV.



HAC figura superioris inferiorisq; palpebræ cartilaginem à reliquis partibus liberam delineauimus, ac ipsam, quum alioquin sit nota, nullis characteribus insigniuius.



TRIQUE palpebræ, tam inferiori quàm superiori, una contigit cartilago, utcunq; mollis & longa, in palpebrarumq; extremo quæ illæ inuicem conuiuent, locata & inter cutem & membranulā palpebras intus succingentem reposita. Huic cartilagini palpebrarum pili (quos cilia uocant) infiguntur, in illaq; tanquam in durius quoddā solum inserti eriguntur. Ideo enim cartilagine hæ (quas ab illa pilorum serie, remorumq; in longis nauibus, seu, ut uocant, galeris, similitudine *ταγος* uocamus) potissimum creantur, ut pilos illos erectos, neq; cæterorum pilorū modo flaccidos dependentesq; contineant. dein etiam creantur, ut^a musculorum palpebras mouentium implantationi subseruiant, quemadmodum opportunè in secundo libro eorum musculorum naturam explicantes docebimus.

*a fi. cap. 10
li. 2 A, b, C,
D, e, ac 3
muscul. tabul.
C, D.*

DE AVRIS CARTILAGINE. Caput XXXVI.

QUONIAM auris cartilago cuti illi obducta exquisitè libera, auris ipsius formam, ablata eius pinnula, exprimit, abs re esset hic aurem nulli non obuiam delineare.



VIS potissimum auris in excipiendis aëris conuolutionibus gyrisq; usus censeatur, quibusq; nominibus auris sedes donetur, in auditus organi constructionis sermone libro septimo exequendum est. hinc autem obiter auris recensenda uenit cartilago, quæ auris formam referens in hoc formatur, ut cute uestita auris corpus instar uanni cōstituatur, idemq; commodè sustineat, & erectum seruet. Est autem hæc cartilago mollis & tenuis, tanto semper à capitis osse uersus auris extrema mollior euadēs, quātō auris orbiculo propius accedit, & quo minus sustinere aliquid debet. Ac proinde etiam in auris pinnula huius cartilaginis nulla exporrigitur portio, quòd scilicet hanc propendentem, neque erigi neque suffulciri oporteat. Porro ad temporis os hæc cartilago durior sentitur, & ut firmiori radice hereat, crassior. Enascitur enim ex orbiculo^a foraminis auditus meatui in temporis osse cælati, cuius circumferentia ideo exasperatur, ut promptius auris cartilaginem educat. Quamobrem uerò Natura ex huiusmodi cartilagine aurem constituerit, & non duriores aliquam ossæmque cartilaginem, aut uerum os ipsi indiderit, in secundo præsentis libri Capite executus sum, quum Naturam tanta prouidentia cartilaginis temperiem finxisse dicerem, ut hæc ossis modo sustineat quidem commodè: & interim adeò mollis sit, ut occursantium impetu non rumpatur, sed cedendo leuiter eum exoluat, atque ita extremas partes iniurijs ferendis pertinaciores, quàm si ossæ essent, reddat.

*a 2 fig. cap.
12 a.*

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER I.
DE NASI CARTILAGINIBVS.
Caput XXXVII.

151


QV ANQV AM nasi cartilagine tactu ante sectionem debite dignoscantur,
nihilominus tamen, quartæ musculorum tabulæ nasus has literis K & L utcunq; proponit.



ERV M opificem terminum extremumq; nasi cartilaginibus eadem ra-
tione extruxisse, qua auris cartilaginem paulo ante procreatā diximus,
quadrupedum nasi extremum ferè comprobatur, quod minori amplitudi-
ne, quàm hominis nasi terminus cartilagineū existit: qui etiam extra reli-
quam faciei superficiem magis, quàm quadrupedum nasus prominet.
Ab inferiori itaq; nasi ossium^a sede, qua hæc aspera & latiora, quàm supe-
riori^b sede sunt, duæ enascuntur cartilagine, quæ deorsum in anteriora
exporrectæ, inuicemq; cōiunctæ sensim molliores euadunt, ac in nasi extremo ueluti in cartila-
gineum ligamentum degenerantes, totam anteriorem nasi regionem constituunt, quæ à nasi
ossium inferiori sede ad nasi terminū apicemq; pertinet. Ab osseo autem^c septo narium forami-
na dirimente, quod octauū Capitis^d ossis partem esse suprā cōmemorauimus, alia enascitur car-
tilago, mollis quoq; ac ligamenti naturæ compos, quæ à tota anteriori septi illius sede antror-
sum procedens, internæ duarum primarū cartilaginum regioni secundum ipsarum longitudi-
nem adnascitur. Hæc parī ratione in ea nasi parte, quæ ueluti ex faciei planicie porrigitur, nasi
foramina interdiuidit, quemadmodū ossium illud septum ipsa^e foramina inibi disiungit, quæ
super palati regionem, à naso ad fauces usq; ducuntur. His tribus nasi cartilaginibus aliæ duæ,
utrinq; nimirum singulæ accedunt, quæ magis adhuc alijs cartilaginibus ligamentorū naturæ
participant, & orbiculatim singulæ unum nasi foramen constituunt. Cartilagine hæ internis
suis lateribus inuicem colligantur, & aliarum nasi cartilaginum extrema integunt, solæq; motu
donantur uoluntario, cuius ope sursum deorsumq; & introrsum extrorsumq; uellunt, proprijs
in hoc donatæ^f musculis. Harum cartilaginum latiores mollioresq; partes in nasi lateribus con-
sistunt, ac nasi alæ nuncupantur, quod quasi alarū modo nares occludant, referentq; ita homini
inter respirandū insignem usum præbentes. At quū hæ nasi cartilagine uel solo tactu cognosci
possint, nō est quod prolixius earū naturā exequar: utcunq; etiā uel solius Gallici morbi nomi-
ne (qui has crebrò infestat) ipsarū structuram medicis nō oscitanter expendendā duxerim.


DE ASPERÆ ARTERIÆ CARTI-
laginibus, ac quid Græcis in hac γλωτῆς & ἀργλωτῆς nuncupetur.
Caput XXXVIII.

PRIMA TRI-
GESIMI OC-
taui Capitis figura toti-
us asperæ arteriæ ab o-
mnibus partibus libe-
ræ anteriorem faci-
em expri-
mens,




SECUNDA
FIGURA, A.
asperæ arteriæ caudicis
posterior facies delinea-
tur. ab re enim fuisse,
& huic figuræ, quemad-
modum primæ, ramo-
rum in pulmonem sub-
stantiam pertinentium
seriem appingere, quū
illam prima figura
abundè oculis
subijciat.


N 4 TER.



IX.



X.



XI.



XII.



XIII.



XIV.



TREDECIM QVAE SERIATIM HIC PROPONVNTVR
figurarum, & earundem characterum Index.

H A R V M figurarum prima, quæ tertia inscribitur, primam laryngis cartilaginem, quâ quia scutum refert, scutiformem quoque vocabimus, ex dextro latere expressam ostendit. Figura autem quæ Quarta ordine est, eiusdem cartilaginis internam seu posteriorem faciem proponit. Quinta, eadem cartilago externa seu anteriori facie delineatur. Sexta, secundæ laryngis cartilaginis anteriorem commonstrat faciem. Septima secundam laryngis cartilaginem ex dextro latere expressam continet. Octava secundam laryngis cartilaginem posteriori ex facie depictam offert. Nona laryngis tertia cartilago ex dextro latere delineatur. Decima, tertiæ cartilaginis anterior sedes occurrit. Undecima, eandem cartilaginem posteriori facie oculis subijcit. Duodecima, laryngis operculi inferiorem sedem ostendit, qua id laryngis amplitudinem spectat. Decimater tia superiorem laryngis operculi sedem continet, quæ palatum respicit. Decimaquarta, unam asperæ arteriæ trunci cartilaginem C modo extructam anteriori externâ uel facie uidendam obijcit. Decimaquinta, eandem cartilaginem posteriori facie proponit, quæ internam asperæ arteriæ amplitudinem spectat.

A, B 3, 4, 5 Duo elatiores scutiformis cartilaginis processus.

C, D 3, 4, 5 Duo humiliores eiusdem cartilaginis processus.

E, F in 8, in 7 uero duntaxat *E*. Secundæ cartilaginis sedes, quibus inferioris scutiformis cartilaginis processus coalescunt.

G, H 3, 4, 5 Hac sede scutiformis cartilago arctissima breuissimaque uisitur, subinde lineam ostendens quæ dextram cartilaginis partem à sinistra instar duarum cartilaginum dirimit.

I 6, 7 His sedibus secundæ cartilaginis regio spectatur, laryngis internam amplitudinem respiciens. Reliquis autem sedibus, quæ his tribus figuris conspiciuntur, exteriorem laryngis regionem seu amplitudinem constituit.

K, L 6, 7 Inferior secundæ cartilaginis sedes, perfectum efformans circulum. ac *K* quidem huius partis anteriorem notat regionem, quæ tactu sub scutiformi cartilagine percipi potest. *L* uero posteriorem inferioris huius sedis regionem indicat, deorsum processus instar eductam, ac in octaua etiam figura *L* insignitam.

M 7, 8 Linea spinæ modo in posteriori secundæ cartilaginis sede protuberans.

N, O 8 Sinus in posteriori secundæ cartilaginis sede, ad lineam illius *M* notatæ latera incist.

P, Q 6, 7, 8 Duo secundæ cartilaginis tubercula, seu capita, sinus tertiæ cartilaginis subeuntia.

R, S 9, 10, 11 Duæ tertiæ cartilaginis partes.

T 9, 10, 11 Hæc tertiæ cartilaginis regio uacua est, ac duntaxat membranis ligamentis tunicisque laryngis occupatur.

V, X 9, 10, 11 Tertiæ cartilaginis sedes, quibus secundæ cartilagini articulatur.

Y, Y 9, 10 Tertiæ cartilaginis processus, qui lingulam laryngis efformant.

Z 9, 10, 11 Tertiæ cartilaginis regio, illi ollarum uasorum uel parti assimilata, qua manus lauaturis aquam affundimus.

a 12, 13 Laryngis operculi basis, quæ scutum imitanti laryngis cartilagini continuatur.

b 12,

b12,13 *Apex, seu in posteriora introrsumq; uersus dorsum maxime procedēs laryngis operculi regio. Præter quindecim figuras modò explicatas, huc comprimis faciunt figuræ Capiti uigesimo primo libri secundi præponendæ, quibus laryngis musculi explicabuntur. inter cæteras autē, illas opportunè non minus quàm si hic locarentur inspicias, quæ illarū figurarum tres postremæ habentur, quibus laryngis lingulæ seu rimæ imago, quàm fieri potuit accuratissime, delineatur.*



L I C E T sextus liber cordi respirationisq; organis dedicandus, asperæ arteriæ naturā diffuse pertractabit, in præsentia tamen ipsius cartilagine explicandæ ueniunt, ut omnes, quibus corpus sustinetur, partes, hoc libro absoluiamus, ac ne quicquam osseum cartilagineumq; hîc nō expressum, à musculorum enarratione in sequenti libro nos remoretur. In sexto igitur libro docebimus, asperam arteriam à faucibus in thoracis amplitudinem deduci, & multiplici ramorum sobole in pulmones diffundi, ut aërem illis reddat, & eundem rursus educat. Neq; solum hanc respirationis instrumentum ponemus, uerum etiam principalissimum uocis esse organum attestabimur, exactè ipsius substantiæ naturam sermone tunc pertractaturi. Constat enim partim cartilaginibus, partim membranis uinculis, simplicibusq; membranarum seu tuniceis, ac demum musculis ipsius capiti peculiaribus. Ac caput quidem hoc asperæ arteriæ (quod laryngem potius quàm guttur mihi appellandum putauerim) primū tribus constituitur cartilaginibus, quarum^b prima maxima amplissimaq; & anterior est, foris quidem gibba, intus autē lima, scuto quodammodo similis, non rotundo, sed prælongo, quali ueteres in prælijs usos, & Turcarum aliquot adhuc, in nauibus præsertim, uti cernimus. Atq; hanc ob causam dissectionū periti eam *bugoeidn*, uulgu autem scutalem & peltalem appellarunt, ac proinde nos quoque illam scutiformem, aut cartilaginem scuto similem in sermonis contextu perpetuò uocabimus: nisi etiam hanc primam cartilaginem appellare uisum fuerit. Ista in homine superiori sede amplior quàm inferiori conspicitur, secus multo quàm in bobus & porcis, quibus inferiori sede latior, superiori autem multo strictior est, minusq; in acutum quàm hominis larynx, antrorsum exporrigitur. Quod tamen ad imaginis speciem spectat, hominis cartilago superiori & inferiori sede sibi respondet. ^cSuprà enim infraq; ex suis lateribus binos educit processus, utrinq; singulos, ac horum quidem duo superiores procerius inferioribus educti, membranis uinculis ossis *v* referentis humilioribus lateribus^f alligantur. Inferiores autē scutiformis cartilaginis processus,^g lateribus secundæ cartilaginis uersus posteriorem ipsius sedem uniuntur, coalescuntq;. Scutiformis hæc cartilago uiris quàm mulieribus antrorsum magis prominet, tactuiq; magis exponitur: & subinde gemina, idq; potissimū in uiris obseruat. In ipsius enim^h medio, ubi cartilago hominis breuissima est, maximeq; antrorsum extuberat, secundum suam longitudinē crebrò linea ducitur, quæ ad amussim à membranulis emundata, duas cartilaginis partes mutuò commissas etiam ante sectionem fuisse arguit. Atque id sanè hominibus peculiare obtigit. Boum enim cartilago simplex est, & plurimum ab hominis cartilagine forma uariat: quam sedulo ab architectis spectari uelim. mirū nanque est, quàm boum scutiformis cartilago propugnaculi formæ accedat, quàmq; affabre id speculatoribus in ipsius elatiori sede (ob priuatos ipsi incisos sinus) accommodum sit, & quàm aptè bombardarum ictibus retorquendis comparatum. haud secus profectò, quàm si machina quæpiam esset portatilis, quæ duobus processibus suis humilioribus tanquā duobus palis terræ infigi, ac exercitui præponi possit. ⁱSecunda cartilago minor prima, maiorq; tertia est, ac maxima sui portione in posterioribus laryngis sedibus reponit, quæ cibi^k uia (quam stomachum cum Græcis uocabimus) deorsum à faucibus fertur. Quantum enim scutiformis cartilago à perfectâ circuli figura deficit, hoc ipsa superiori posterioriq; eius parte supplet. Ima enim ipsius^l sede perfectum conficit circulum, cuius anteriorem partem sub scutiformis cartilaginis radice, tactu in antica laryngis sede percipimus. Interna huius cartilaginis^m amplitudo exactè leuis est, posterior autem ipsius sedes stomachum spectans, longa extuberatⁿ linea, secundum cartilaginis longitudinem, quasi spinæ modo exporrecta. Hæc duos huius cartilaginis^o sinus dirimit, in quibus duo figuntur^p musculi, recto ductu à secunda cartilagine in tertiā inserti. Superior huius cartilaginis sedes, qua posteriorem laryngis regionem efformat, in duo desinit^q tubercula oblonga, & utrinque singula, quæ tertiæ cartilaginis^r finibus inarticulari mox audies. Secunda autem hæc cartilago primæ ad eum modum committitur, quem suprà exposui, quando humiliores primæ cartilaginis processus ipsi connasci dicebam. Vt uerò firmior eorum processuum fieret connexus, secunda cartilago inibi, qua processus ipsi coalescunt, modicè^s extuberat, crassiorq; est, & in hac protuberante parte sinus uisitur, qui

Vbi aspera arteria natura pertractabitur.

PRIMA LARYNGIS CARTILAGO.

SECUNDA LARYNGIS CARTILAGO.

a tota et 2
fi. de in fig.
ca. 9 lib. 4
H, I, K, L,
M, M.

b tota 3, 4,
5 fig. & fi-
gurarū ca.
40 lib. 2, 3
& h.

c 3, 4, 5 fig.
A, B.
de eundem
fi. C, D.
e 1, 2 fi. cap.
13, E, F.
f 2, 3 fig. ca.
21 lib. 2 C.
g 8 fig. E, F.
h 7 fig. E.
h 1, 2, 3 fig.
G, H.

i tota 6, 7,
8 fig. & fi-
gurarū ca.
21 lib. 2 i de-
in h.

k 2, 3, 5 fig.
cap. 21 lib.
2 H. & 14,
15 lib. 5 fi-
gur. A, B, C,
D.

l 6, 7 fig. K,
L.

m 6 fig. I.
n 8 fi. L, M.
7 fig. M.

o 8 fi. N, O.
p 6, 7 fi. ca.
21 lib. 2 P.
q 6, 7, 8 fi.
P, Q.

r 10 figur.
V, X.
s 8 fig. E, F.



TERTIA laryngis cartilago.

qui primæ cartilaginis processum ualidissimè excipit. Inferior cartilaginis secundæ pars, ubi laryngis posteriora constituit, nonnihil tenuis uisitur, deorsum magis, quàm reliqua ipsius inferioris partis sedes, porrecta. idq̃, ut musculi ex remotiori sede initiū ducerent, qui rectà per cartilaginis secundæ longitudinem expansi, tertiæ cartilagini inseruntur. Huic cartilagini nullum nomen inditū est, ac iccirco peculiari nomine nobis innominata nuncupabitur. Si tamen quis sedulò eius effigiem inspexerit, atque alicuius rei formæ illam conferre, tandemq̃ hinc ipsi nomen indere uoluerit, haud aliud illi conformiùs adinueniet, illo Turcarū anulo, quem sagittantes dextro pollicis imponunt, ut eius anuli beneficio arcus neruum robustiùs trahant. Is enim anulus illa parte, qua pollicis interiora respicit, anteriori secundæ cartilaginis sedi similis uisitur: qua uero externam pollicis sedem tegit, posteriori secundæ cartilaginis regioni utcunque conuenit: quemadmodum ex hac anuli effigie, quem margini adhibeo, est cernere. * Tertiam laryngis cartilagem Græci ἀρύνταινον & ἀρύνταινοειδὴν uocarūt, quòd quum integra adhuc est, & membrana tunica ue asperam arteriam intus succingente adhuc obducitur, illi ollarum parti similissima sit, qua aquam manus lauaturis affundimus. Illi nanq̃ ollarū oris sedi aptius congruit, quàm ligneis illis conchis, quibus nautas sentinam exhaurire, ac olitores irrigare hortos conspiciamus. siquidem & eiusmodi situlis seu uasculis Græci hanc cartilagem contulisse uidentur, non quidem toti uasi, sed ipsius mucroni. Vtunque sit, tertiam laryngis cartilagem unicam simplicemq̃ omnes dissectionum professores describere, quum interim membranis suis liberata, sit gemina: & duabus constituatur cartilaginibus, ligamentorum duntaxat beneficio & laryngem succingentis membranæ, inuicem admodum laxè commissis. Ac harum una quidem dextro secundæ cartilaginis lateri, altera uerò sinistro innititur, sinum læuem & alteri fatis cælatum obtinens, quo secundæ cartilaginis tuberculum excipit. itaq̃ articulatur, ut ad internam laryngis amplitudinem, ac rursus extra illam moueri possit, hæcq̃ cæteris laryngis cartilaginibus maximè mobilis existat. Vtriusque cartilaginis basis ampla est, & anteriori sede in longum processum finit, in interiora laryngis exporrectum. Superiores uerò harum cartilaginum partes sensim à basi inuicem dehiscētes, ac dein tenuiores mollioresq̃, & adiposæ reditæ, mutuò uniuntur, & dextræ cartilaginis superior pars sinistræ cartilaginis parti coniuncta, eam laryngis sedem extruit, quæ illi uasorum parti congruit, qua aquam manibus affundi suprâ commemorauimus. Atque hæc quidem laryngis sedes adeò mollis flexilisq̃ est, ut uomentibus in internam laryngis amplitudinem antrorsum reclinetur, asperamq̃ arteriam adeò exquisitè integat, ut ne minimum quidem ex uomitu arteriæ ipsi illabatur. Cæterum & si tertia hæc cartilago gemina sit, duabusq̃ cartilaginibus extruatur, ob id tamen eam duarum cartilaginum loco non enumerabimus: sed unius tantum aliorum Anatomicorum more nobis habebitur, tertiæq̃ nuncupabitur, quò minus illorum placita qui cartilagines numerarūt potius, quàm descripserunt, plus æquo turbare uidear. His tribus igitur laryngis cartilaginibus, alia quædam mollis, & substantia tertiæ cartilaginis superiori parti prorsus similis, accedit, quæ laryngis perelegans efficitur operculum, accuratè prohibens, ne quid cibi aut potus in laryngem defluat. Enascitur autem hoc laryngis operculum ampla & antrorsum curuata basi, ab interiori scutiformis regione iuxta partem ipsius elatiorem, hinc introrsum procedens, trianguli imaginem exprimit, cuius basim operculi à scutiformi cartilagine exortus, aut ipsius cum ea cartilagine cōnexus efformat. Trianguli uerò uertex, ea pars est, quæ introrsum ueluti ad stomachi regionem producit. Corpus hoc quæ palatum respicit, gibbum est ac mollius; quæ autē laryngi innititur, cauum sinumq̃, ac multo quàm superiori parte durius. In extremo autem ipsius, quo stomachum spectat, insigniter molle est, pinguiq̃ obductum membrana ligamenti quodammodo naturam refert. quæ uerò scutiformi cōmittitur cartilagini, etiam multa abundat adipe, neq̃ inibi adeò durum atq̃ in sui medio cernitur. Pleriq̃ corpus hoc præcipuū uocis organum esse putarunt, id temerè γλωττίδα & ἐπιγλωττίδα uocitantes: quum tamen hæc nomina penitus pugnātes, diuersasq̃ prorsus partes, ueteribus illis Anatomes professoribus significauerint. γλωττίς enim laryngis rimam indicat, quam duo tertiæ cartilaginis processus in media laryngis amplitudine pingui membrana obducti constituunt, & quam præcipuum uocis organum esse in quinto libro demonstrabimus. Illi nanque eiusmodi rimam γλωττίδα seu lingulam uocarūt, ab ea lingularum similitudine, quam ex duabus arundinū laminis inuicem compactis tibijs accommodari uidemus. Cæterum ἐπιγλωττίς nuncupatur laryngis operculum, dictæ nuper laryngis lingulæ impositū, & ne quid inter edendum in eam decidat cauens. Quòd uerò id nostri seculi medicos lateat, non ipsi tantum in causa sunt, nihil præter autorum sententia, citra omnem sectionis usum, sectantes: uerum & Celsus etiam hæc perperam (uti sanè quæ ad Anatomen spectant permulta) intelligens, illud laryngis operculum lingulam appellauit,

Laryngis lingula, seu rima et præcipuum uocis organum.

16, 7, 8, f. l.

u 6 fi. cap. 21 lib. 2 P.

x tota 9, 10, 11 fi. figurarum 64, 21 li. 2 l.

y 9, 10, 11 fig. R, S. 26, 7, 8 fi. Q, P. 4 10, 11 fig. V, X.

b 9, 10 fig. Y. c 9, 10, 11 figur. Z. d 10, 11 fig. T.

c 3, 9, 10, 11 fig. cap. 21 lib. 2 l.

f tota 12, 13 fig. 3, 4, 5, 6, 11 figur. cap. 21 lib. 2 l. g 12, 13 fi. d. h earundē fig. b.

i 11 fig. cap. 21 lib. 2 c de 12, 13 fig. d. h 9, 10 fig. Y, X. l Confer L cum c fi. 11 cap. 21 li. 2.

lauit, non expendens id Græcis ἐπιγλωττίδα fuisse appellatum, quod illi laryngis rimæ, quam lingulæ fistularum assimilamus, incumbit: aut ignorans aliam in larynge præter operculum illud, sedem partem uel esse, quam lingulæ conferri possimus. nam operculum hoc etiam humanæ linguæ imaginis satis accedit. Quinetiâ Celsi errore Theodorus Gaza delusus, in Aristotele ἐπιγλωττίδα lingulâ uertit, quum interim Aristoteles laryngis intelligat operculum: non autem eam partem, seu sedem, quam ueteres lingulam uocarunt, & quæ principalissimum uocis instrumentum merito censetur. Vt modo prætereâ, quoties apud Galenum, tum Interpretum, tum etiam Græci exemplaris scriptorum uitio, γλωττίς pro ἐπιγλωττίς, ac rursus diuerso ordine, legatur. Verum hæc latius suo loco exequar. hîc nanque tantum de laryngis cartilaginibus sermonem instituisse sat fuit, quanto ad musculorum in secundo libro tractationem indigemus. Ac proinde etiam reliquas asperæ arteriæ^m cartilagines, quæ C nostri formæ magna ex parte conueniunt, unâ cum omnibus quæ ad asperam arteriam pertinent, in sexto libro prosequar. Nunc autem tempestiuum erit, rationem ac modum subiicere, quo ossa & cartilagines ad disciplinam parentur, aut per Anatomen discantur, ad eam uidelicet methodum, qua semper post partium descriptionem, illarum secandi artificium (prout id suo loco aptius fieri putauero) subiiciam.

Lib. 3 de Partibus animalium, cap. 3.

Præcipue in 8. Lib. de V. su part.

Reliquæ cartilagines asperæ arteriæ C similes.

QVO ARTIFICIO HVMANI CORPO-

ris ossa & cartilagines inspectioni præparentur.

Caput XXXIX.



CONSUEVERUNT medici Hippocraticæ arti dignè incumbentes, neque ad solos syrnpos scribendos, hominibusq; imponendum nati, non mediocri labore ossa, quæ ad disciplinam asseruantur, extruere, siue ea inuicem iuncta, siue singula separatim erant inspecturi. Solent enim suspensum, uel aliàs mortuum cadauer, magna ex parte primum carnibus liberare, & uiscera nullo soluto corporis articulo, exsecare. Postea oblongæ arcæ ita dissectum corpus immittebant, uniuersam arcam calce opplentes, ac nonnihil aquæ dein aspergentes. Deinceps ubi arcam ad hunc modum octiduo obseruassent, eam undique angustis foraminibus perforatam, rapido illigabant fluuiio, ut calx unâ cum marcescentibus iam carniū reliquijs temporis successu deflueret, ac undique ab ossibus abscederet. Post dies aliquot, exemptum cadauer passim cultrorum beneficio emundabatur, mente adhibita, ne aliquis ossium connexus in eo opere dissolueretur, ligamentaq; ossa colligantia (quorum interuentu hærent) integra custodirentur, ac demum omnia præter ossium articulos niterent. Emundatum cadauer, eo situ quo id aut sedens, aut erectum, hacq; aut illa forma compositum spectari uolebant, soli exponebatur, ut ligamenta solis æstu resiccata, ossiū articulos in eo positu continerent. Verum hæc præparandi ratio præterquam quod molesta, sordida, ac difficilis est, nullos ferè ossium ostendit processus, appendices, capita, sinus, & eius generis reliqua in ossibus præcipuo studio spectanda: quod scilicet hæc omnia insigniter nigricantibus ligamentis adhuc obducantur. adeò sanè, ut hic ossium mundandi modus ad doctrinam penè nihil accommodet. Quemadmodum neque ridicula musculorum, tendinum, ligamentorum, neruorum, uenarum & arteriarum uidendi ratio (qua hætenus medicinæ candidatis nostræ artis professores imposuerunt) quicquam commodi adfert, sed duntaxat studioforum animos cohibet, ne eorum, quæ iam dicebam, organorū demonstrationem à Rabinis illis expetant. Hî nanq; asseriebant, illa solum è corporibus in aquarū gurgitibus (si dñs placet) emaciatas, non autem è nuper mortuis discenda esse, quasi uerò quicquam eruditione dignum, in corporibus ad eum modum adaptatis, prorsusq; hac ratione corruptis disci possit, & non hæc omnia in homine nuper mortuo melius multo à nobis ostenderentur, quàm ipsi iecoris, aut intestinorum, aut cordis superficiem studiosis commonstrare solent: quamuis illam quoq; satis ineptè proponebāt, interim à cæteris corporis partibus abstinentes. Cæterum quo nam pacto aliæ corporis particulæ sint aggrediendæ, suis locis affatim prosequemur: ossa autem, ut modò subiiciā, leui negotio adaptabis, si discendi saltem cupidus, & quod in dissectionum studioso Galenus imprimis requirit, laborum patiens ac industrius fueris. Alicunde itaque nactus cadauer, qualecunq; id sit (quamuis tamen morbo emaciatum longe aptius censebis) uas unum carnibus, uisceribus & cuti reponendis, & sanguini admittendo, ad manū esse curabis, unâ cum magno grandiçq; lebete, cuiusmodi illi sunt quibus lixiuium mulieres igni adhibent. is nanque coquendis ossibus est aptissimus. Huic igitur ossa iniicientur. Præterea & ampla papyrus in asserē distendetur, ut huic asseri cartilagines nō elixandæ applicari, seriatimq; imponi possint.

Ossium in calce macerandum, ac dein in flumine emundandorum ratio.

Ossium per coctionem præparandi modus. Tum alibi sepius, tum maxime lib. 3 de Administr. dissect.

m tota 14, 15 figur.

possint. Mox acutiori cultro orbiculatim per frontem & tempora & occipitium, sectionem tentabis, ad caluariam usque penetrantem. Ad huius deinceps sectionis orbiculum, serra caluariam diuides, parum sollicitus, etiam si cerebrum uities, aut paulo humilius elatius ue caluariam diuidas, quandoquidem nunc duntaxat ossa ac cartilaginez intueri seruareq; propositum est.

² Dissecta igitur caluaria, cerebrum solis manibus ex ipsa euulsum, uasi iniiciendum est, ac caluariæ pars à reliquo capite adempta, cacabo indetur, liberata tamen prius ab illa uerticis cute. Iam utranque aurem proximè à temporum osse absectam, seorsum in asserem, cui cartilaginez adhibentur, collocato, unà cum palpebris & nasi extremo, quod cartilaginibus constat, quæ uicinissimè ab illis quibus cōmittuntur ossibus simul cum cute sunt refecandæ. Deinceps maxillam inferiorem à suis cum capitis ossibus connexu liberabis, ac cartilaginez, quas priuatim in ipsius cum capite articulis haberi diximus, cultellulo à ligamentis articulum continentibus dissecabis, eas chartæ illi cui promptè hærebunt seriatim applicans. Quando inferiorem maxillam adimis, & eam obiter cute & lingua (relictis si uoles musculorū applantationibus) liberas, ac tandem in cacabum reijcis, cauendū est, ne os u referens aut laryngem corrumpas, sed integram laryngem cum eo osse, & lingua, & stomachi asperæq; arteriæ portione simul è faucibus auferas, ac asseri illi non aliter emundatā cum auribus imponas. Iam à pectoris ossis mucrone ad pubem usq; sectionē molieris, ad omentum usq; penetrantē, cui deinceps aliam sectionem, quæ transuersim à dextro ilio ad sinistrum pertingat, adiunges, & absque delectu omnia quæ peritonæo cōtinentur, laniorū more euelles, ea uasi iniiciens. Abdominis cutem unà cum musculis obiter ab ossibus dissecabis, & sanguinē spongijs excipiens, eum in uas exprimes. modò à iugulo ad pectoris ossis usque mucronem, adeò profundam duces sectionem, ut illa ad pectoris usque os penetrante, simul cum cute musculos thoraci instratos, à costarum ossibus, earundemq; cartilaginibus, adimere possis, & simul clauiculæ nudæ, carnibusq; liberæ appareant. Quippe hæ acutiori cultello à pectoris osse ueniūt liberandæ, & cartilaginez his articulis propriæ (quemadmodum inferioris maxillæ cartilaginez aggressus es) accuratè sunt adimendæ, & dein chartæ seriatim adhibendæ. Pectoris os unà cum costarum cartilaginibus studiosè à costarum ossibus liberabitur, sectionibus acutiori & nō admodum crasso cultro per cartilaginez inibi ductis, ubi costarum ossa in has degenerant. Atque id promptè obitur, si modo memoria non exciderit, primæ costæ cartilaginem à pectoris ossis medio magis in latus quàm secundæ costæ cartilaginem ferri. Neq; tantum cartilaginez pectoris ossi coarctatæ à costis sunt dirimendæ, uerum etiam omnes spuriarum cartilaginez, quæ uel intercostalium musculorum interuentu superioribus cartilaginibus hærebunt. Disiunctis hunc in modum cartilaginibus, pectoris os à iugulo attolles, & id uenis & arterijs à iugulo ad illud porrectis & membranis quoque liberabis, quæ thoracis amplitudinem intersepiunt. Postremò cartilaginez à septo transuerso refecabis, & ipsas simul cum pectoris osse non aliter mundatas, in chartam repones, dein scapulas unà cum clauiculis à thorace dissecaturus. Iam longa sectione in altera manu à summo humero per brachium & cubitum ad pollicem usque ducta, scapulam, humerum, cubitum, & extremam manum cute & carnibus enudabis, non admodum anxius, etiam si aliqua tendinum carnisq; portio ossibus adhuc appensa relinquatur. Adeò ut etiam suffecerit, relictæ summe manus cute, illam aliquot sectionibus hîc atque illic scindere, quo postea leuiori negotio manus elixetur. Modò clauicula à summo humero secabitur, mente adhibita, num præter scapulæ processum, quem summū humerum appellamus, & clauiculā, inibi aliud tertium os occurrat. Hoc ubi præstiteris, ac peculiarem eius articuli cartilaginem chartæ adhibueris, clauiculam in cacabum cōijcies, scapulamq; ab humero, & deinde humerum à cubiti ossibus separabis: & cubitum cum extrema manu cōnexum seruans, simul omnia in cacabum quoque locabis. Priusquam tamen scapula cacabo indetur, opportunè feceris, si cartilaginem scapulæ sinum, quo humeri caput excipitur, aliquando augentem, à scapula diremeris, chartæq; cum cæteris cartilaginibus applicueris. Atque id similiter in alterius lateris manu est præstandum, ac ilico ad thoracem denuò accedendum, ex quo primū pulmones cum corde & septo transuerso excabis: & priusquam cor in uas cōijcias, cordis basim per transuersum à reliquo cordis corpore diuides: & deinde basim rursus à uasis, quæ ab ipsa prodeunt, sic auferes, ut ita uenæ arterialis & magnæ arteriæ orificia illæsa habeas, ac postmodum (si uisum fuerit) in cartilaginum numero illa seruaturus, chartæ applices. Vbi igitur reliqua quæ in thorace inueniūtur, in uas reieceris, cadauer in prouum uertes, & utcunq; licebit, ceruicem reliquumq; dorsum, unà cum tota thoracis amplitudine carnibus emundabis, studiosè cauens ne costam aliquam (utpote fragilem) rumpas: aut nimium uicinè carnem dissecās, processum aliquem uities. Atque id adhuc magis cauendum est, quum iam singulas costas seorsum à uertebis thoracis liberaturus es. Etenim

Ita diuides, ut septima fig. cap. 6 à sexta si liberata cernitur. Verum non est ut tibi modò in ossib. cartilaginibusq; probè instituto, hoc Capite ali. quid admodum.

resupi-

resupinato cadauere, cultello acutiore costæ capitulū, à uertebrae corporis sinu uenit separandum, & deinde ligamenti sensim diuisis, à transuersis quoque uertebrae processibus costæ sunt adimendæ, obiterque emundatæ in cacabum mittendæ. Crura ad eum modum, quo manus aggressus es, attrectabis, femur uniuersum carnibus emundans, mox & tibiam, & pedem uniuersum. Quū tamen genu nudas, ex tendinibus anteriore genu sedem occupantibus, patellam excabis, & in cacabum nō secus ac femur cōiicies ilico, atque id à coxēdicis ossē tibiāque liberaueris, & cartilagine resecueris, quæ tibiæ ossis sinus femoris capita excipientes augent. quippe & illas non inopportunè chartæ agglutinabis, ac deinceps tibiæ os, unā cum fibula & pede, cacabo indes. Id ubi in utroque crure præstitum erit, & ossa sacri ossis lateribus coarctata aliquantulum repurgata fuerint, cartilaginea ligamenta uertebrae corpora intercedentia adammum ueniunt excanda, & chartæ seriatim accommodanda. Ligamenti igitur, quæ uertebrae corporibus in superficie obducuntur, acutiori cultro adeptis, inter ossis sacri summum & cartilagineum ligamentum, os sacrum ac infimam lumborum uertebrae interueniens, sectionem tentabis, quæ ligamentum id, seu cartilagineum, ut Galeno uisum fuit, ab ossē sacro diuidat. Rursus inter infimæ lumborum uertebrae corpus, & elatiorem dictæ nuper cartilagineis regionem, eandem duces sectionem, hacque ratione integram auferes cartilagineum. quam ubi chartæ imposueris, sequentes tantisper excindes, dum ad secundam usque ceruicis uertebrae deuentum erit. Quū itaque uiginti tres cartilaginea ligamenta uel cartilaginea ad hunc modum chartæ applicaueris, dorsum in tres quatuor uel partes cautè & leniter disiungendum uenit, ne impetu id tentans, casu aliquem uertebrae processum confringas. Quare etiam cauendum est, ne primam uertebrae à capite negligentius liberare studeas. Licebit enim cum capite ceruicis uertebrae cacabo imponere, ut & thoracis uertebrae cum lumborum uertebrae, modò illas à sacro ossē prius disiunxeris. Os sacrum autem, unā cum ossibus ipsi commissis (quæ ilium, coxendicis & pubis ossa constituunt) nihil prohibet cacabo indere, quum scilicet ilium ossa adhuc cruda à sacro difficulter & arduè separētur, & pubis ossium cartilago etiam tunc uitietur: quam aliàs integrā asseruabis, si pubis ossa non dirempta cacabo inieceris. Ossibus adhuc modum cacabo immissis, aqua is uniuersus implebitur, ut ossibus altè in aquam subsidentibus, nulla ossis pars emineat. Hoc enim imprimis toto coctionis tempore obseruandum est, ne os aliquod aqua non tegatur, multoque magis, ne id ex cacabo prominens fumum excipiat, cuius etiam occasione grandem cacabum esse conuenit. Vniuersæ coctioni nullum peculiare adhibetur artificium, sed, ut in cæteris elixationibus, spuma sedulo auferenda est, quo ius clarius reddas, ipsaque ossa minus sordida extrahas. Pari etiam ratione pinguedo omnis (quæ plurima supernatare solet) est haurienda, ac in uas aliquod uel uulgi nomine reponēda, quod illi in obliterandis cicatricibus, & neruis tendinibusque producendis multum tribuit. Coctioni nullum tempus præfinitur, quum id ex ætate ratione plurimum uariet. Duabus enim aut tribus horis plusquam satis sit, puerulorum ossa coquuntur præcipue, quum in illis studendum sit, ne inter mundandum ossa, appendices decidant: quarum coalitus in prouectioris ætatis hominibus uix unquam, quantumuis coxeris, dissoluitur. Is itaque coctionis scopus est, ut ossa cultorum beneficio, uti inter edendum sit, aptè mundari queant. ut autem id facias opportunius, pe detentim nonnulla ossa inter elixandum forpice eximes, eaque solus purgabis: nisi fortasse studiosus adsit sodalis, qui unā manus operi adhibeat. Summoperè enim cauendum est, ne imperitior aliquis ossium supercilia, processus, capita & sinus radendo uitiet, aut alicunde cartilagineum læuem, & crustæ modo ossibus obductā imprudens auferat. hæc namque, quum carnem, ligamenta, tendines & membranas ossa ambientes adimis, præcipue seruanda uenit. Neque uero officium id hac duntaxat ratione inepto alicui, & Anatomes parum studioso minus committi uelim, uerum ut, quum unumquodque os priuatim purgas, sinus ipsius & capita, & potissimum ligamentorum naturam, & tendinum insertionem, musculorumque exortum accurate contempleris. Non enim facile dixerim, quantum cognitionis partium eo opere tibi paraturus sis. Quando igitur hunc in modum seriatim ossa ex bulliente iure extrahis, ac mundata terræ, aut sportulæ alicui imponis, non admodum anxie expendito, quod nam os prius tibi occurrat. Summam tamen manum cum cubiti ossibus extrahens sedulo obseruabis, ne uiolentius brachiale à cubiti ossibus seiungas, sed cultro articuli ligamenta sensim diuidens, brachiale à cubiti ossibus accurate liberares. Idem facito in postbrachialis ossium à brachiali separatione. Id enim cauere uelim, ne brachialis ossa inuicem dirimas, unde etiā ilico atque id integrum à cubito, & pollicis primo ossē, & postbrachiali disiunxeris, obiter duntaxat tendines ligamentaque ipsi obnata diuelles, id studens, ne ossa in interna externaque ipsorum superficie penitus ligamenti emundentur, ut ligamentorum beneficio brachialis ossa inuicem hæreāt. Brachiali enim ita igni

adhibito ligamenta sensim resiccata, ipsius ossa firmiter continent, leuioriꝑ negotio in ossium connexu brachiale, cubiti & postbrachialis ossibus cōmittitur: nisi fortè in iungēdis ossibus peritior, brachialis ossa mutuò dirimere, ac ligamētis emū dare, postmodumꝑ æneis filis inuicem committere audeas, aut etiā disiuncta asseruare uelis. Mox ubi brachiale in eum modum igni apposueris, chartam assumes, cui postbrachialis & digitorum ossa, non prætermisissis sesaminis ossibus, exactè emundata imponas: quo minus hæc illi chartæ inuoluta, neque alterius manus ossibus confusa, in committendis ossibus negotium augeant. Conduxerit igitur, manuum pedumꝑ ossa separatim in quatuor chartas recludere. Priusquam tamen huius illiusue manus, aut pedis ossa chartæ implicas, antea semper indagandum est, num aliquod os nō mundatum super sit, ne quum putamina & ius abijciendum curas, unā aliquot ossa oscitāter simul auferenda porrigas. et si fortè unguem asseruare uisum sit, illum dum pedis manuumꝑ digitorū ossa expurgas, auelles. Nō minus enim humanos ungues, quā auium & quadrupedum ungues, à pedibus calenti aquæ impositis, elixatione recedere conspiciamus. Porro quum ulnam & radium emundas, cartilago non negligetur, quæ à radio profecta, magna ex parte ulnam à brachiali dirimit. Hæc nanꝑ ab ulna liberabitur, ut radio adhuc connata, in ossium connexu, rursum ulnam & brachiale intercedat. Quinetiam quando caput purgas, accuratissimè caueto, ne membranam, quæ auditus organi foramen succingit euellens, ossicula illa negligenter eximas, quæ eius organi constructionem subintrant. quippe illa stylo quopiam in foramen misso, sunt studiose euellenda, & pariter excutiēda. Hæc ossicula ad reliquā ossium colligationem, aliquò recondes, & uertebras omniū postremo è iure eximes, quemadmodū & sacrum os: nisi fortè post aliquam elixationem, coccyx os à sacro liberare lubeat, quòd scilicet huius ossicula, ob cartilaginea ligamenta, quæ ipsa connectunt, si diutius coquantur, ab inuicē seiungi soleant. Si tamen coccygis ossis præscindendi gratia, os sacrum eximeris, id denuò cacabo est immittendum, coccyxꝑ os priuatim in chartam reponendum, aut in sportulam conijciendum, in quam minuta locabis ossicula: cuiusmodi dentes sunt, si fortè ipsorum aliquis exciderit, aut aliqua ossis portio oscitanter effracta fuerit. Verum ut pubis ossium cartilaginem serues, priusquam ilium ossa à sacro liberas, pubis ossa anteriori posterioriꝑ sede leuiter sunt emundanda, ac dein inuicem solis manibus seiungenda, ut ipsa intercedens cartilago ab altero osse abscedat, unīꝑ duntaxat commissa maneat, leui negotio postmodū in ossium connexu, cum altero pubis osse iungenda. Ossa hac ratione purgata denuò numerabis, non quidem manuum & pedū ossa, quæ iam seorsum chartis prius inuoluisti, uerum recensabis caluariæ partem, quam serra à reliquo capite ademisti: in qua considerabis, num portiunculae temporum ossium, quæ instar squamæ uerticis ossibus applicantur, atque serra à cætera temporum portione auferri solent, ex elixatione deciderint, ne fortè illas cum ossium spolijs aut iure reiicienda cures. Solent enim facile à uerticis ossibus decidere, si casu ferræ sectio multum supra aurem ducta fuerit. Deinde num dens aliquis ex superiori inferioriue maxilla exciderit, perpendes, & uiginti quatuor uertebras totidemꝑ costas enumerabis, duas clauiculas, duas scapulas, duos humeros, duas ulnas, & radios duos, sacrum os, à quo iam antea coccyx os ademptū est: duo grandia ossa sacri ossis lateribus nexa, femora duo, tibię ossa duo, & fibulas duas, item patellas similiter duas. Atque ubi omnia enumeraueris, magnopere cōduxerit, ossa denuò mundæ & bullienti aquæ indere, ac mox exempta seorsum aspero rudiꝑ linteo abstergere, & si quæ ligamentorū, aut membranarum, aut musculorum insertionis exortusue sint reliquæ, eas defricare abstergereꝑ cōuenit, studio interim adhibito, ne lubrica, & crustæ modo ossibus adhibita cartilago simul auferatur. Interea uerò dum hæc in orbem igni apposita leuiter desiccantur, aurium cartilagines cute detegentur, chartæ cum reliquis cartilaginibus applicandæ. Idem quoꝑ in palpebrarum & narium cartilaginibus moliendum est, ac deinceps acutis cultellis os u referens, à musculis ipsi cōmissis, quā licebit exactissimè crudum emū dabis. Purgato illo osse, laryngis cartilagines similiter crudas accuratè carnibus membranisque liberabis, simul cum una atꝑ altera asperæ arteriæ trūci cartilagine, Cimagini cōparatę. Iam pectoris os, ipsiꝑ cōnexas cartilagines sedulo emundabis, quod eo minus promptè perfeceris, quo id pluribus obducitur membranis, pingueꝑ est, & interim coquendum ne utiquam uenit, uixꝑ calente aqua aspergendū. Quum uerò cartilagines carne spolias, cauendum est, ne membranam cartilaginibus proximè obductam, illiꝑ correspondentem auferas, quæ quòd os ambit, *μεγίστη* Græcis uocatur. Quippe hac membrana à cartilaginibus discerpta, illæ infirmius pectoris ossi cōmittuntur, & cōtractæ breues intortæꝑ euadūt. Et quo minus cartilagines hæ contrahantur, pectoris os ad ignem non est exiccandum, sed alibi tantisper, dum ossa nectere proposueris, in loco non nimis humido reponendum, ne rursus cartilagines plus æquo flaccescant, ac postea deformem thoracis ossium fabricam cōstituunt.

Quan-

Quandoquidem nihil prorsus est, quod æquè elegantem sceleti struem uitiat, atq; pectoris os cum cartilaginibus, si modo illæ negligentius obseruentur, & non iam compactis ossibus potius, quàm antea, exiccati permittantur. Reliquas autē cartilagines chartæ adhibitas, licetbit igni nonnihil admouere, at ita, ne nimium conuellantur: quum satius sit, & has quoq; post compactiōnem siccatī. Iam integrū tibi est ossa & cartilagines ad eum quem mox dicam modum contere, aut dissoluta asseruare: quod longè etiam præstiterit, si modò aut cōnexis, aut dissolutis carendum esset. Ossa namq; disiuncta, & in oblongam arcam seriatim posita, quouis tempore seorsum conspici, ac omnia quæ ad ossium cognitionem spectant, edocere possunt. quæ autem erecta cōmissa q; sunt, sinus, capita q; ossium non admodum accuratè cōmonstrant, sed ut uerè dicam, ad ostentationem potius quàm ad disciplinam conducunt. Quanquam rursus ad disciplinam illa ossa accommodatissima sunt, quæ subducuntur ex Italicis monumentis, penus modo (ut hīc ferè omnia) extructis, & sub impluuiō aliquo, aut alioquin aëri ita expositis, ut hæc pluuialem aquā quandoq; excipiant. Præter id namq; quod monumēta eiusmodi humida sunt, etiam aqua subinde accedit, cuius beneficio omnia quæ ossibus adnascuntur promptissimè marcescunt, adeò ut illa ossa post aliquot annos exempta, & obiter abluta, sint integerrima, nihilq; modo in ossibus spectandum commonstrent, si in arcam seriatim citra connexum reponantur. ad coniungendum enim prorsus sunt inutilia, cum propter egregiam duritiem, tum propter deperditas costarū totiusq; corporis cartilagines. quæ si fortè reperiuntur, ob putredinem sunt friabiles, & undiq; ab ossibus liberæ. Rursus ad hunc usum sunt inutilia, quæ è terra apud alias nationes effodiuntur, & cumulatim in cœmiterijs asseruantur. Præter hoc enim, quod illa carie ob terræ siccitatem afficiuntur, omnia eiusdem hominis ossa nunquam uelut in dictis nuper monumentis reperies, uel Parisijs etiam in Innocenti cœmiteriō. Vbi, si modò alibi, quamplurimos ossium quæ è terra fodiuntur, habes acervos: qui mihi quando primum ossa cum MATTHAEO TERMINO, in omnibus medicinæ partibus insigni medico, & dum uiuā mihi colendo studiōrū sodali doctissimo discerem, adeò nobis uberem suppeditarūt copiam, ut longo indefessoq; spectandi usu edocti, etiam obuinctis oculis cum sodalibus interdum deponere ausi fuerimus, unius mediæ horę spacio nullum os ex tot acervis porrigi posse, quod, cuiusmodi esset, tactu non diiudicaremus. atque id eo nobis faciendum erat studiosius, quo discendi cupidī, magis præceptorū opera, in hac medicinæ parte destituebamur. Porro quod ad coctorum ossium connexum erectionemq; attinet, ea mox post emundationem (ne nimium indurefcant) committenda sunt. nam statim à coctione, ossa solis subulis, quibus suppinguntur calcei, citra negotiū perforantur, æneisq; filis mutuò alligantur: quod quisque prout manum nactus est industriā, & ea quæ hæcenus toto libro descripsimus, minus obaudiuerit, suo Marte perficiet. Ac primū quidē aliquot paratis subulis, æneo filo partim crassiore, partim tenuiore, filum igni indetur, quo postmodū magis sequax, & quantumuis uariè intortum, minus rumpatur. His addentur duæ tenaculæ, seu forcipes: unus quidem quo filum intorquebitur, alter autem quo intortum iam absecabitur. Auspicaberis autē ossium colligationem à pedibus, ac primum calci talum iunges, & deinde cubiforme os calci, & cymbā referēs talo, & tria interiora tarfi ossa cymbam referenti, deinde his cōmittes pedi ossa, hisq; seriatim digitorū ossa, cum ossiculis sesamo cōparatis. quæ ideo cautius & tenuiori subula perforabis, quo duriora solidioraq; sunt, & ex subulæ impetu pròptius diuisa dissiliunt. Vbi utrunq; pedem iunxeris, tibiæ ossis tuber, quod sinus femoris capita excipientes dirimit, cultro aliquo oblongo, sed arcto perforandū est. quod excipiendo duriori baculo sufficiat, qui femori etiam intrusus clauī ritu ita tibiam femori committat, uti asseres absq; glutine necti cernimus. Est enim in femoris inferiori sede aliud foramen moliendum, illi è directo consistens, quod in tibia fieri uolebam, ut idem baculus & femori & tibiæ indatur, huiusq; ope articulus genu inflexus maneat. Præter hunc baculum tamen, femur tibiæ ossi utrinque crassiori filo committendum est, non prætermisiss cartilaginibus tibiæ ossis sinus augmentibus. quæ quum hæc ossa iungentur simul cum illis constricta, in articulo genu seruiabuntur. Mox fibula tibiæ ossi suprā infraq; alligabitur, & patella simul femori ac tibiæ firmabitur. Hoc ubi in utroque crure præstitum erit, sacri ossis lateribus ilium ossa crassiori filo sunt nectenda, ac deinde pubis ossa interueniente etiam illorum cartilagine iungenda. Iam ad manum erit orbicularis asser, in quem ossa erigentur. conuenit autem huius asseris orbem tantum esse, ut pedes illi eo situ, quo ossa erigenda ducis, aptè firmari queant. Huius asseris medio foramen in hoc paratur, ut quum ossa in erectam arcam recondes, inferior arcæ fundus axem habeat: quæ foramini illi indita, orbem conuolui sinat. Præter hoc foramen, aliud iuxta orbis circumferentiam aptabitur, in quo lignum firmari queat, quod instar teli, aut hastæ, aut falcis (utcunque uisum erit) paratum, sceleti manus suffulciat. Extructo

Quæ ossa ad
disciplinam
utilissima.

non

Emundata ossa
quomodo iun-
genda.

Huiusmodi
instrumen-
ta ferè se-
riatim pro-
ponit tabu-
la cap. 7 lib.
2 ad chara.
S, T, V, X,
Y.

in hunc modum orbi pedes impones, & astantis alicuius ope super pedes reliqua crurum ossa inniti curabis, ac deinde femorum capita in coxendicum ossium acetabulis indes, ut rectè filo aut uirgula interuallū metiaris, quod ab orbe ad humiliore sedem foraminis pertinet, in sacro osse dorsalis medullæ gratia incisi. Hoc etenim interuallum edocebit, qua mensura ferrū fabricandum sit, quod orbi affixum, & ossis sacri reliquarumq; uertebrarū foramini dorsalem medullam transmittenti inditum, uniuerſa ossa pulchrè sustinebit. Ferrū namq; ita aptandum est, ut ualide orbis medio clauis affigatur, & ab orbe ad infimam usq; nuper dicti foraminis sedem, teres aut quadratum sit, ab illa autem sede sursum latius quàm crassius esse conuenit, ut postmodum ad dorsi inflexum obliquari queat, uertebræq; ipsi ita adaptentur, ut immotæ ad id neutiquam circumuertantur. Atq; ideo ferrum inibi primū tenuius fiet, ubi sacrum os ne deorsum subsideat, suffulciendum uenit. Nisi enim hoc os firmetur, sustineaturq;, unā cum ipso reliquæ uertebræ sensim descendunt, temporisq; successu sceleti crura turpiter obliquabūtur. Accuratè igitur ab orbe ad sacri ossis foraminis infimā sedem, longitudo metienda uenit. De reliqua autem ferri longitudine non adeò curandum est, quum hæc si fortè longior sit, post ossium cōpactionem facillè præscindatur. Et etiā si ossa arcæ imponenda duxeris, magnopere iuuerit ferrum plus minus duabus palmis lōgius quàm uniuerſum sit sceleton, fieri, ut ipsius portio extra uerticem eminens, superioris arcæ fundi foramini possit indi, in ipsoq; conuolui. Ferro itaq; orbi perpendiculatim affixo, acutiori cultello ossis sacri foramen dorsalis medullæ nomine incisum, sensim ita exculpes, ut ferrum ipsi commodè intrudi possit. Nam quum hoc foramen natura arctius sit, & insigniter obliquū, nequaquam ferrum admittit, nisi quemadmodū iam diximus, sic augeatur, ut à ferri mucrone os sacrum ad eam usq; ferri sedem protrudere ualeas, quam nō amplius teretem, quadratam uel faciendam innuimus. & si casu hæc sedes os sacrum minus aptè suffulcitur uidebitur, operæ precium erit eam ferri sedem lima exasperare, ac dein nodum illi ex æneo filo obuoluere, qui os sacrum cōmodè sustineat. Osse sacro in hunc modum suffulto, crassiori filo femoris capita coxendicum acetabulis innectes, diligenter perpendens quantum hæc aut extrorsum aut introrsum intorqueas, ne fortè crura turpiter intorta committas, aut patellæ, interiora potius crurum, quàm anteriora respiciāt, quod sanè futurū est, nisi ad amussim capita suis sinibus iunxeris. Vt cunq; tamen feceris, in hoc connexu filum prorsus intorquendū non est, priusquam pedes orbi & tibijs eo situ commiseris, qui tibi apparebit elegantior. Hunc à baculi, quo manus stabilientur forma, potissimum petes: alium quippe situm messoria falx, alium telum, & alium rursus hasta, aut Neptuni tridens, aut aliud quoduis instrumentū expetit. Modò uertebræ omnes seriatim accommodandæ sunt, quo cuiusq; situm ordinemq; inuentu non arduum obserues. hunc namq; uertebrarū forma, & articulationis ratio promptè ostendunt. Quum primum itaq; ordinatim omnes in mēsam reposueris, quinq; lumborū uertebras inuicem duobus nexibus cōmittes, qui in corporum lateribus facti, unā cartilagineū ligamentum contineant, quod uertebrarum corpora interuenire dictum est. atq; huiusmodi ligamenta seriatim à charta cui illa applicasti, sunt assumenda, eo semper relicto, quod eas intercedit uertebras, quas inuicē non alligas. quemadmodum in præsentia est ligamentū seu cartilago, sacrum os & infimam lumborum intercedens uertebrā, idq; quod supremam lumborum & infimam thoracis uertebras interuenit. Iunctis enim lumborū uertebris, sex inferiores thoracis inuicē, & postmodum sex superiores unā cum ceruicis humiliori cōnectentur. Reliquæ enim ceruicis mutuo nō sunt colligandæ, sed eas interueniēs cartilago corpori inferioris uertebræ duntaxat est glutināda. quandoquidem ceruicis uertebræ etiam non nexæ, sed ferro tantū inditæ, suā seruant sedem: neq; thoracis uertebrarū modo immotæ, postmodum costas sustinere debēt. Illico igitur atq; uertebras ad eam, quam præcepi rationem, priusq; ferrum illis traiciatur cōmiseris, lumborum uertebras ita cōnexas ferro impones, idq; sedulo ad eorum situm inflexum uel obliquabis, ac infimā uertebrā unā cum sacro osse ita cōmittes, ut iam prius lumborū uertebræ mutuo uinxisti. Mox his inferiores thoracis adiunges, perpetuò quam licebit accuratissimè ferrū, uti necessum erit, complicans, & infimam thoracis uertebram supremæ lumborū adnectens. His pari modo superiores thoracis uertebræ addentur, & harum infima supremæ earum quæ iam ferro appositæ fuerāt, alligata, latiusculum & longum nigroq; colore intinctum adaptabis baculum, qui posteriori ferri parti appositus, quàm licebit demissè inter ferrum & uertebras intrudetur, ut huius baculi beneficio uertebræ ad ferrū firmius contineantur, neq; ulla ratione uersatiles sint, ne postmodum uniuerſus thorax in hoc illud uelatus turpiter conuolui queat. Vt autē caluaria ferro applicetur, necessum est uerticē foramine quodam perforari, ad amussim ferri amplitudini & crassicie correspondente, ne quando ipsi ferrum traieceris, caluaria quauis occasione quoquoersum circumuertatur. prout enim faciem anteriora exacte aut latera spe-

ctare

ctare uolueris, foramen id aut tranſuerſim, aut oblique inſculpere cultro quopiam oportet. quemadmodum & illic ubi caluaria denuo perforanda eſt, ut ligulis ea ſectio quam ferra in caluaria molitus es, committatur, & quum uiſum fuerit, caluaria à ferro adempta, rurius diſſolui queat. ſummopere namq; cōducit, internā caluariæ amplitudinē qua cerebrū cōtinetur intueri. quod ut fiat, utraq; caluariæ pars tribus foraminibus ſibi mutuò correfpondentibus candenti ferro, aut cultri mucrone eſt perforanda. ac unum quidē foramen opportunē in occipitio perficitur, & utrinq; in temporibus unum. At inferiore maxillā æneo filo cum ſuperiori cōmittes, nexu ſuis capitibus in ſinus ſuperioris maxillæ factō. Verum quum hic cōnexus nō adeo firmus ſit, ut accuratē dentes mutuò applicet, ſed inferior maxilla dependeat, elegās q; ſit, hanc ſuperiori modo iungi, modo diſiungi, præter dictū nexum, maxillæ inferioris acuti proceſſus etiā perforandi ſunt, & funiculus iſtis illigandus, qui ſubiugalibus traiectus oſſibus & uertici incumbens, nunc uerſus frontem, nunc uerſus occipitium tendi poſſit, dentes q; ita collidi queant. Vt cunq; uerò ſit, potiſſima ferri cura eſſe debet, ne illud ineptē nunc in poſteriora nunc in priora obliquatum, corpus indecorē erigat. quò minus autē id fiat, magnopere conduxerit dorſi ductum cognouiſſe. Porro nunc tempeſtiuū erit coſtas uertebriſ & ſuis cartilaginibus alligare, quod ſanē ut ad amuſſim & ſedulò facias, primū omnes dexteras coſtas à ſiniſtris diſcernes, coniectura uel à ſinu ſumpta, quo uena, neruus & arteria coſtis exporrigitur. dein à ſuperiori coſtarum ſede, quæ latior ſpiſſiorq; inferiori occurrit. Deinceps in hunc ferè modū ((())) coſtas menſæ ſeriatim impones, ut dextræ ſiniſtris reſpondeant curans. Promptū enim erit ſingulas ſuis ſedibus ponere, ſi ea modo memoriæ non exciderint, quæ ad internoscendas coſtas ſuprà cōmemorauimus. Ex hac coſtarū ſerie primā utriuſq; lateris coſtam ſuę cartilagini ad pectoris os adnectes, & deinde ſodali pectoris os cum ſuis cartilaginibus in ſua ſede tenendū porriges, ac deinceps primas coſtas primæ thoracis uertebre tranſuerſis proceſſibus alligabis. Inſuper ſecondas coſtas ſuæ cōmittes uertebre, & poſtmodū iſarū cartilaginibus, atq; ita ſeriatim omnes: obſeruās interim, ut illas coſtas toto interuallo prorſus dehifcere ſinas, quæ ante ſectionem cartilaginibus inuicem diremptæ fuerāt. Nunc humeros ſpiſſiori filo ſcapulis nectes, & deinde tenuiori filo clauiculas ſummis humeris, mox ſcapulas coſtis, & clauiculas pectoris oſſi. Quum tamen humeros ſcapulis aduincies, expendendū eſt, quonam ſitu manus collocādas duxeris. Hic enim multū refert, quomodo ſcapulæ ſinui caput humeri cōmittatur. in quo etiā connexu cartilago neutiſquam prætereunda eſt, cuius auxilio ſcapulæ ſinus interdū adaugetur, atq; ita etiā cartilagines maxillarū & clauicularū articulis peculiare nō neglectæ ſuis articulis nectentur. Cæterū cubiti oſſa humero uinciēda nō ſunt, priuſquam extrema manus tota fuerit nexa. radius itaq; ſuprà infraq; ulnæ eſt colligādus. deinde ſi brachialis oſſa diſiuncta, ſuisq; ligamentis libera ſunt, ea inuicem ſunt cōmittenda, aliās autē ſuorum ligamentorū interuentu abundē continētur. Inferiori iſſorū ſedi primum pollicis os, & quatuor poſtbrachialis oſſa, ac deinde hiſ digitorū oſſa, unā cum ſeſaminis oſſiculis adnectes. Poſtremo autē brachiale radio iunges, & deinde ulnam humero. Atq; ubi id in utraq; manu præſtitū erit, ſummas manus baculo illi alligabis, quem ualidè orbi infixū inſtar falcis, aut aliter extruendū dixi. Erectis nunc oſſibus, & ex oſſe u referenti, & auditus organi oſſiculis, ac aſperæ arteriæ, auriumq; & palpebrarū cartilaginibus, & ungue cordisq; cartilaginibus, monile licebit confingere, hiſ omnibus catenulæ, aut exiccato cruris aut manus neruo adnexis. Hinc liquet, quā leui negotio humani corporis oſſa, oppido quā medico exoptāda, parari queant: quo in opere nihil ipſo cōnexu, non aggredienti, difficilius uidebitur. qui tamen mihi primum experienti ſatis pulchrè ſucceſſit, exemplo ab illis ſumpto, quos effractas ſcutellas & lapideos cacabos cōpingere interdū uideram. Coctionis autem rationē, emolliēdi in medicina uis docuerat. Lutetia namq; ob bellum tumultus Louaniū reuerſus, atq; unā cum GEMMA PHRYſIO, æquē celebri Medico ac pauciſſimis conferendo Mathematico, oſſium uidendorū nomine ad eum locū quo magna ſtudioſorum cōmoditate omnes ultimo affecti ſupplicio in publica uia ruſticis proponi ſolent, obambulās, in eiufmodi incidi aſſiccatū cadauer, quale latronis erat, quod Galenus ſe ſpectaſſe commemorat. Vti enim hoc aues carne liberarāt, ita ſanē illud quoq; ipſas emundatſe coniſcio, quia homo ille ante annū ſtramine duntaxat obuſtus, & quaſi toſtus, paloq; alligatus, ita ſua uē elcam auib; exhibuerat, ut nuda undiq; eſſent oſſa, ea q; ſolis ligamentis hærerēt, muſculorum exortibus & inſertionibus duntaxat aſſeruatis. quod in ſuſpenſis nunquam uſu uenit, quum præter oculos (& ſi uulguſ aliter arbitretur) uolucres nihil ob cutis craſſitiem dilaniēt. ac proinde integra in hiſ cute, oſſa intus carie afficiuntur, prorſusq; ad diſciplinam ſunt inutilia. Aſſiccatum itaq; & nulla ex parte humidum ſordidum uē corpus intuens, haudquaq; inſperatam ac ſubinde expetitā mihi occaſionē prætermiſi. quiniſmò Gemmæ beneficio palum cōſcendens,

femur à coxendicis osse diuulsi. trahentiq; mihi, unà cum brachijs ac manibus, scapulæ quoq; subsecutæ sunt, deerāt tamen alterius manus digiti, & patella utraq; unà cum pede altero. Quū itaq; crura & brachia (relicto cū totius corporis trunco, capite) clam repetitis uicibus domum detulissē, ut thoracē qui catena alte firmabatur nancisceretur, extra ciuitatē me uesperī excludi passus sum: tantoq; obtinendorum ossium desiderio & studio ardebam, ut mediā nocte in illa corporum multitudine quod expetebā diuellere nō horruerim, haud mediocri labore ac industria, sine arbitris, palum cōscendens. Verū detracta ossa procul illinc deferēs, in secretiori loco condidi, frustatimq; altera die per aliā ciuitatis portā domū detuli. Porro quū ligamenta rescindere cœpissē, nihil ob egregiā eorum duriciē promouī, ac illa feruētē aqua emollire coactus sum: utq; uoti compos redderem, omnia ossa tandē tacite ita coxi, illisq; emūdatīs illud sceleton extruxi, quod Louani apud longē amicissimū mihi GISEBERTVM CARBONEM, insignē ac uario disciplinarū genere instructū medicū, meumq; à puero studiōrū commilitonē asseruatur. Atq; id sceleton adeo præproperē parauī, & manū ac pedem, duasq; patellas nō minori labore & industria aliunde conquisiui, ut omnibus persuaserim id me Lutetia aduexisse, quo omnē subreptorū ossium suspiciōnē delerem, quamuis eius urbis Prætor postmodū adeo medicinæ candidatorū studijs fauit, ut quoduis corpus à se impetrari gauderet: ac ipse nō uulgariter Anatomes cognitione afficeretur, mihiq; illic Anatomen administranti sedulō astaret. Quum igitur primum tentantibus nobis adeo promptē negociū successerit, quid nunc futurū existimandum, postquam cōponendi quoq; rationem alijs descripsimus: & præter subiungendas nunc tabulas, in plurimis Academijs, uel nostra opera, sceleta uisuntur. Verū non hominis solum ossa, sed, uel Galeni nomine, simiæ & canum, ac Aristotelis etiam gratia auium pisciumq; & reptilium inuicem connexa, aut saltem disiuncta apud medicinæ & naturalis philosophiæ studiosum esse oporteret. Nisi fortē hanc philosophiæ partē ad nos nihil pertinere arbitremur, satisq; esse nobis persuadeamus, si nostris syrupis, citra Anatomen imponere mortilibus, & loculos opplere possimus.


DE OSSIUM NUMERO. CAP. XL.



PARVM dubito plerosq; alicubi à me ossium quoq; numerū desideraturos: quibus nullum aliud consiliū dari uelim, quā, ut ex singulis huius libri Capitibus illū petant. prolixius enim esset, hīc omnia recēdere. Quāuis ne tantillum laboris subterfugisse uidear, non enumeratis appendicibus, & ossibus ita ut in prouectioris ætatis hominibus se habent, cōstitutis, ad hunc modum ea recensere nihil impedit. Caluariæ ossa uiginti sunt, octo quidem capitis, & maxillæ superioris duodecim: ita tamen, ut iugalia priuatim nō enumerentur, quum quorundam illorum uiginti ossium partes seu sedes tantū sint, propriaq; circūscriptione destituantur. auditus organi ossa quatuor sunt, duo scilicet ad singulas aures. dentes sunt triginta duo. maxillæ inferioris os unicum, ossis u referentis ossicula sunt ferē undecim. Vertebrae uiginti quatuor. sacri ossis ossa sex, coccygis autem quatuor. costæ uiginti quatuor. Pectoris ossis tria numerauimus ossa, alijs autē septena recensentur. sed age hac enumeratione tria tantum sint: & aliās ex tuo arbitratu, quot uisum tibi fuerit. scapulæ duæ: totidem clauiculæ. & humeri duo. ulnæ duæ. radij duo. brachialis ossa sedecim, utriusq; scilicet manus octo, octo item postbrachialis ossa, in utraque manu quatuor. digitorum ossa triginta: utriusq; manus nimirū quindecim. sesamina ossicula in singulis manibus ut minimū sunt duodecim, ac proinde iam uiginti quatuor illa in manibus recenseamus. Ossa sacri ossis lateribus commissa, duo. femora duo. duo tibiārū ossa, fibulæ duæ. duæ patellæ. duæ calces. tali duo. nauicularia ossa duo. tarso ossa octo, in utroq; pede quatuor. decem pedij ossa, in utroq; pede quinque. uiginti octo digitorum pedis ossa, cuiusq; nimirum pedis quatuordecim. pedis sesamina ossicula similiter atq; in manibus uiginti quatuor, quāuis nonnulla sint prorsus cartilaginea. Ac proinde si hæc ossa in unum numerū reijcies, uniuersa erunt (si rectē addo) trecēta & quatuor. quibus si pectoris ossa quatuor adhuc adijci uelles, & maxillæ inferioris duo ossa statueres, essent trecēta & septem. Verum si priuatim omnes appendices (quū ossa sint propria circūscriptione in pueris terminata) enumerare lubeat, facile dictum nuper numerū semel, ac rursus dimidio duplicares. quod uel hinc colliges, si uertebras, femora, tibiæ ossa, atque alia quæ multis appendicibus donantur, in memoriā reuocaueris. Rursus si ossa ut in pueris uisuntur subduxeris, Dij boni quantū ossium aceruum cumulabis: quum omnes uertebræ, aut tribus aut duobus constent ossibus: & ossa quæ sacro coarctantur, tribus, idq; generis reliqua: adeo ut cuiq; suo arbitratu ossium numerum confingere sit integrum.


HVMANI COR-
SIMVL COMPACTO-
EX FACIE EXPRES-

PORIS OSSIVM
RV M ANTERIORI
SIO.



HVMANI COR-
TERIS QVAS SV.
LIBERORVM, SVÆQVE
latere delineatio.


PORIS OSSIVM CAE
STINENT PARTIBVS
SEDE POSITORVM EX



VIVITVR IN-
GENIO,
CAETERA MOR-
TIS ERVNT.

CORPORIS
POSTERIORI.

HVMANI OSSA
FACIE PROPOSITA.



CHARACTERVM, QVI TRIBVS VNIVER-
SVM SCELETON EXPERIMENTIBVS FIGV-
ris adhibentur, Index.

T R I B V S præcedentibus figuris (quas integras nuncupare soleo) ijdem ferè inscribuntur characteres. quanquã si quis illarum alicui peculiaris tantum fuerit, ex numero promptè obseruabitur, quem singulis characteribus modò in Indice subiiciã, quo potissimum institui ossiũ nomina simpliciter ascribere: primũ ea collocaturus, quibus toto sermonis contextu præcipue utor: dein Græca, mox (si quæ alia sint) Latina probatioribus recepta autoribus, idq; ita ut ordo hic uim quandã habeat. His succedẽt Hebræa, sed & aliqua ex parte adhuc Arabica ex Hebræo Auicennæ interprete propemodum omnia, insignis medici mihiq; familiaris amici Lazari Hebræi de Frigeis (cum quo in Auicenna uersari soleo) opera desumpta. Atq; illis nominibus ideo Latinas literas subiungendas duxi, quòd horum pleraque in Arabum libris Latinitate donatis occurrant: ac proinde etiã merito post hæc locũ habebunt alia in Latinis Arabum interpretibus passim obuia, simul cum ijs quæ in scholasticis (ut dici gaudet) doctoribus, nostræq; ætatis manualium medicorum libris leguntur, non minus sanè quàm nomina Latinis recepta autoribus sedulo expendenda. Os itaque Græcis nominatur ὀστέον, Latinis uerò os. Hebræis autem עֵצֶם bezem. Cartilago autem χόνδρος, חֲשֵׁהוּסִים hascehusim. Cæterũ ossium nomina opportunè auspicabimur à capitis ossibus, seu caluaria, quæ Græcis dicitur λεγόμενον, λῳγγος, λῳτος, λῳδέα, σκεφῳν. Calua, cerebri galea, atque ita nonnulli totam capitis ossium sedem uocant cerebrum amplexantem, ὀστέον ossibus efformatam. aliqui uerò eam duntaxat, quæ crinibus ornatur, cuius circulus σκεφῳν & πρῳσῳον nuncupatur. תֵּקֶה חֲמוֹאֵה tkeck hamoah, קְרוֹתֵה חֲמוֹה che-derath hamoach, theca & olla capitis, testa capitis, & scutella capitis, asfoan. Sutura, quibus capitis ossa inuicem committuntur, generatim uocantur ῥαφαῖ, שְׁלָחִים scelauim. senan, direzan, adoren, complosa.

A 2,3 Sutura coronalis, σφαλαια, חֲבִלִּילִי hachlilij, חֲשֵׁתִי chascchij, arcualis, sutura puppis.

B 2,3 Græcorũ maiusculum Λ referẽs sutura, λαμβδωδής, & u ab similitudine ὑψιλωδής. לַמְדִּי lam-dij, laude, hypsili, sutura prora.

C 3 Sagittalis sutura, ὀβολαία, ῥαβδωδής. Instar teli, ueru, aut uirgæ secundum capitis longitudinem prorepens sutura. חֲצִי checij, שְׁפֻדִּי scfodij, nerualis, idq; potissimum ubi hæc coronali committitur: qui locus etiam zeudech, idq; imprimis Mesuæ uocatur.

D 2,3 Hæc compago ueræ suturæ imaginem non exprimens cum sua cõiuge uocatur, suturæ squamarum modo inuicem cõmissæ, λαμβδωδής κροταφία, temporales, squamæ formes. חֶלֶפֶיִם chelaphijm, corticales, menses. Reliquæ autem caluariæ suturæ proprijs destituuntur nominibus, cuiusmodi uerò illæ sint, non est quòd hic prolixius denuò repetam.

α 2,3 Hoc os unà cum suo coniuge, uerticis ossa uocatur, itemq; βεγγματῶ, ὀρεφῳς. sunt quibus syncipitis ossa nuncupantur. עֵצֶם הַסִּרְקֶר bezem bachodchod, nerualia, paria, arcualia: quanquã alij ita iugalia nuncupent ossa, parietalia, quo nomine nonnullis temporum ossa dicuntur, ossa rationis, seu cogitationis.

β 1,2,3 Frontis os, μετώπον, quibusdam syncipitis. עֵצֶם הַמִּצֵּחַ bezem hamezzech, coronale, os puppis capitis, os inuerecundum, os sensus communis.

γ 2,3 Occipitis seu occipitij os, ὀπίς, עֵצֶם הַעֲרֵר bezem haboreph, laude os, pyxis os, os prora, os memoria. Sunt qui & basillare (quòd magnam capitis portionem cõstituat) nuncupent, etiamsi id nomen cunei formi ossi priuatim inditum fuerit.

δ 2,3 Id os cum suo pari, temporum ossa, κροταφῳ, κροσῳ, κροτῳ λεγόμενα. aliqui etiam λιθοδῳ, lapidea, lapidosa. חֲצִדִּי hazedabim, עֲצֵמֹת הָאָזְנוֹת bazzamothe aauijm, auriũ: etiamsi id nomẽ duobus ossiculis accommodari possit auditus organi constructionem ingredientibus, & in scamno

φ.* cui secunda figura cubitis innititur, φ & * expressis. Quandoquidem φ ossiculum notat incudi aut molari denti assimilatum, * uerò id quod malleolo aut femoris ossi comparamus. Quum itaq; ea ossicula priscis Anatomes professoribus fuerint incognita, non mirum est illa etiã nominibus destitui. Cæterũ temporũ ossa quibusdam tymparũ, menses, parietalia, dura, armalia dicuntur.

ε 2 In temporis osse processus styli acus ue' imaginem referens, στυλοδῳ, γραφοδῳ, βελονοδῳ, πλῆκτρον. calcar capitis. חֵמֶר חֲמוֹה chemo marbez, os calaminum, sagittale, clauale, acuale.

- § 1, 2, 3 Temporis ossis processus, uberi papillâ referēs, μαστοιδίς, mamillaris, עַצֶם בִּטְמִי, bezē potmij.
 E 2, 3 Os cuneo comparatum, σφαινοειδής, Galenō ὡς τὸ πῶς ἐξ ὧν ὁσόν (etiam si palatum uix contingat) circūscribitur, σφαινοειδής. Cuneiforme palati os, basillare, quauis sic etiam appellant occipitis os, מוֹשְׁבַּת הַמוֹחַ moscau hamoach. Baxillare, paxillum, os colatorij, os cribratum, cauilla: quam & ita talum quoque uocent. 2 Sedes caluariæ, quam lapidosam dicimus.
 θ 2 Cuneiformis ossis processus, uespertilionū alis assimilati, πτερυγοειδής, עַצֶם כְּנָפִי, bezē chenaphij.
 F 1, 2, 3 Hæc sedes simul cum sua coniuge in altero latere, uocatur ossa iugalia. ζυγωματικά, ζυγοειδής, ζυγωδής. עַצְמוֹת הַזֶּקֶן haz amoth hazogh. Ossa paris, paria, quæ nomina illi etiam temporū asscribūt ossibus, ansæ ossium temporum, arcualia ossa.
 Superioris maxillæ duodecim ossibus nullum inscripsimus characterem, quod priuatis destituantur nominibus, quanquam interim septum narium, nonnullis cristæ os nuncupetur. Cæterum superior maxilla dicitur γένυς, mandibula, הַלְחִי הַעֲלִיוֹן halechi habelioi. quæ nomina & inferiori maxillæ G in trib. figuris notatæ accommodātur, quā Halyabatis interpres priuatim Faucē uocat. Dentes, ὀδόντες, שְׁנַיִם scinajm, plurimum in utraque maxilla sedecim figuntur, quorum quatuor medij, anterioresq; incisori uocātur. τομῆς, διχαστῆρες, λεῖνες, γελασίνοι. risorij, quaterij. הַמְּחַתֵּחִים ha mechatechim quadrupli. Verū duo medij, priuatim duales illis appellātur. Qui utrinq; incisorijs proximus est, caninus uocatur, sūtq; ita utriusq; maxillæ duo canini. λεωόδοντες. כְּלָבִיִּים אוֹ מַחְלָעוֹת. chelaijm aut metaleboth. mordentes, hos quidā quoq; risorios uocauerunt. Quinq; autem utrinque insequētes, molares appellantur. μολῶνται, γόμοφοι. molares, maxillares, paxillares, Cicero Geuinos, quo nomine alij eos appellant, qui post pubertatem ferē crescunt, ac Græcis σωφρονιστῆρες, λεγιστῆρες, ὀψιγόνου uocantur: nostris dentes sensus ac sapientiæ, dein cayseles. נַגְהִיד, naghuid. nequegidi, nanged, alhalm. Molares uerō, Hebræis dicuntur טוֹחַנוֹב tochanob.
 H 2 Os u referens. ὀσείδης, ὀφθαλμοειδής, λαμβανείδης, παρασπῆστη, φαρύγγειον. Os u aut Λ imaginem exprimens. עַצֶם לְחָמִי אוֹ לַמִּדְיָה bezem lhami aut lamdi. Linguae os, gutturis os, os laude, os morsus Adam. Auicenna Interpres Capite de Guttore habet: Alfac os habēs quatuor latera, duo inferiūs, duo superiūs, quod non obiter Anatomes studioso obseruandum uenit.
 I, K, L, M, & N His characteribus, in tribus figuris ferē conspicuis dorsum notatur, quod ῥαχίς, ἄκανθα, σπῖνα, tergū, hominis carina, שְׁדֵרָה scidra nuncupatū, multis extruitur uertebis, σπονδυλοῖς, חֻלְיִיִּת chulioth. Verticulis, ossibus fusi, quæ in posteriori sede acutū educūt processum, qui ἄκανθα, Siminea, adsenasem senasem uocatur. Cæterū ab I ad K indicatur ceruix. πρᾶχϗ, αὐχλῶ, collum. צוֹרֵא אוֹ גִּרְרֵן zaur uel gharron. Tenon athlas, quod nomen alij septimæ ceruicis uertebrae duntaxat tribuunt. Porro à K ad L uertebrae insigniuntur thoracis, θώραξ, aliquando & πῶσ, μετὰ φρένον. pectoris, interdum dorso simpliciter. חֶזֶה chaze. interscapilij. Ab L ad M uertebrae lumborum. ὀσφύος, ἰξὺς, ῥομφαία. renum. מוֹתְנַיִם mothnaim. alchatin. Ab M ad N os sacrū proponitur. ἱερόν, πλατύ. latum, עַצֶם בִּי הַטֵּבֶת bezen pi habatabath. lumbare, ossa clunij, clauij, alagas, agit, abbans, abbat, uetula, osamiū, osanū, quæ nomina coccygi ossi ab alijs asscribūtur. N inscribitur coccyx os. ὀσάκκ, σπονδυλοῖς, ὀφθῶ, πύγιος. עֶצֶם haaze. caudæ os, alhosos, dein reliqua, quæ ossi sacro ex quorundam interpretum sententia tribuimus nomina.
 O 1, 2, 3 Pectoris os. στήθον. quo nomine nonnulli superiorem ossis partem appellant, inferiorem tunc σῆθος nuncupantes. עַצֶם הַחֹת bezem hebace. thorax, asser, cōssos, scutum cordis.
 P 1, 2, 3 Mucronata pectoris cartilago, ensi cōparata. ξιφοειδής, ensiformis. עַצֶם בְּרִיִּי רַחֵב bezē bedelij rachauch. גִּהְרוֹנִי gheroni, אֶלְחַנְגְּרִי alchangri, quibus nominibus uniuersum pectoris os donatur. Malū granatū ensifoidis, cultralis, epiglottalis cartilago, scutū, clypeus oris stomachi, medium furculæ inferioris. 1, 2, 3, & cæt. usque ad 12. In tribus figuris duodecim thoracis costæ tam ueræ ac legitimæ, quàm nothæ spuriaue indicantur. πλευρά. זֶלָהוֹת zelaboth.
 Q 1, 2, 3 Clauiculæ. κλαδῆς. clauēs, iugula, sunt qui & has humeros appellarunt. כַּבֵּשׁ scechē. Furculæ, aut priuatim furculæ inferiores, quas ab humiliori pectoris ossis sede, ita distinguunt.
 R 1, 2, 3 Scapula. ὤμων, ὀμοπλάτη, ἐπινότιον, πλάτη. Scapula, Latinis plerunque etiam humerus nuncupatur, scoptulum opertum, scoptula. כַּתֵּף chatheph. Spatula, clypeus & scutum pectoris. Cæterū λ in tribus figuris, superior scapulæ insignitur processus, quem summum humerum ferē uocamus, ἄκρωμιον, aliquādo aut Hippocrati ἄκρωμιὸς ὀστέου, Galenō etiā ὡρανοειδής dictus. אֶגְרוֹסוֹ חֶרְטוֹם agrasso chartom, פִּי הָעוֹרֵב pi haboreub. Rostrum porcinum, caput a scapulæ.alacharam, manu. char, algorab, destructū. Processus autem scapulæ interior inferiorue, in prima figura μ indicatus

- tus, dicitur ἀγκυροειδής, & Galeno interdum ὑπεραγκυροειδής, στυμοειδής. Anchoræformis, C literā refe-
rēs p̄cessus. חַיִּין הַבָּתֵּן haijn hacateph. Oculus scapulæ, quo etiā nomine scapulæ spina nūcupatur.
- S 1, 2, 3 Humerus, seu brachij os, ὤμων. Brachiū, sunt quibus ulna uocetur. קַנֵּה חֲזָרָה chane hazeroha,
עֵצִי hazad. Paruum brachium, adiutorium brachij, canna brachij, aseth.
- T, V 1, 2, 3 Tota hæc sedes, cubitus nūcupatur. πῦξ, ὠλῶν, ὠλῶν. Cubitus, ulna, quæ nomina etiā infe-
riori huius sedis ossi tribuuntur. זַנְדִּין zandin, זֶרֶחַ zeroha, עֲמֻדֵי שְׁתֵּי עַמֻּדִים scete hamudim. Asaid,
aseth, alsabad. X 1, 2, 3 Superius in cubito os, radius nobis appellatū. ῥαχίς. עֲמֻדַת הַיָּד hamud haelion. Focile minus brachij, canna, arundo minor brachij.
- Y 1, 2, 3 Cubiti inferioris os, ulna nobis dictum, eisdemq; cum toto cubito uocibus donatum. παραπῶνχιον.
עֲמֻדַת הַחֲתָתֹן hamud batachthon. Focile maius brachij, cāna, ac arūdo maior et inferior brachij.
- v. Huius processū v in secūda insignitum Græci nuncupant ὠλέκρον, κύβιτον, ἄγκῶνα, Latinorū qui
ξ. dam Gibberū. Additamentū necatū. Processus autē ξ insignitus, ac stylū referens, στυλοειδής.
- Z, Z 1, 2, 3 Brachiale. καρπός. Palma quibusdam. רַסָּה rasēgh. Rascha, raseta, ascam, ossa rasete.
- Γ 1, 2 Postbrachiale. μετακαρπῶν, ὠστροειδής, σῆθρον, ἄλῆς, ἄλῆχιον. permultis palma, pectus manus, pectē. חֵיר
מִסְרַחַח masrech chaph haiad. alselamuat. Δ, Δ 1, 2, 3 Digiti. δακτύλος. אֶצְבָּעוֹת bezbahoth.
- Θ 1, 2, 3 Ossa sacri ossis lateribus commissā, quorū utrinq; unū est, in tres ueluti sedes (et si continuū sit)
o. à dissectionis professoribus distinctū, ac prima quidē o insignitur, ilium os nuncupata. λαγόνω.
ω. bezem hachefel. Alharta, anchæ, interdū lūbare. Secūda sedes mediāq; ac ω insi-
gnita, coxendicis os nuncupatur. ἰχίον. עֵצִי הַחֵיר bezem haiarech, coxæ os, quibus nominibus
plerisq; totū os etiā uocatur. Althauorat, pixis os, femoris os, sed ualde perperam. Tertia se-
g. des, anteriorq; ac g insignita, pubis os uocata est. ἄλῆς, pectinis. גְּבִי הָעֵרֶוֶה gabe haberua,
הֶלְהָוָה helhaua. Penis pudibundū, fenestratum os, quod etiā illi femoris os subinde appellatū.
Verū uniuersum os Hebræis dicitur עֲצֵמוֹת גְּבִי הָעֵרֶוֶה hazamoth ghau haberua.
- ς 1, 2, 3 Coalitus pubis ossiū, uerū priuatim cartilago hic insignitur, eorū ossiū unionē interueniens.
- Λ 1, 2, 3 Femur, seu femoris os, femen. μηρόν. פַּחַד הַחֵיר pachad, haiarech. Os coxæ, coxa, agis, anchæ os.
- τ 1, 2, 3 Exterior femoris processus, qui rotator, & natis ferē nūcupatur, προχωρητής μέγας, γλῶττός. Malū
v. granatū testiculorū, tharuca, trachametra maior. Minor uerō interiorq; p̄cessus, v insignitur.
- Ξ 1, 2, 3 Patella. μύλη, ἐπιμύλης, μυλακρός, ὠγγίχ, ὠγγίχ, ἐπιγονάτις. Mola, scutiforme os, genu rotula. הָאֶרְבֻּבָה
עֵצֵי אֶרְבֻּבָה hayn aut maghen baharcuba. Oculus genu, polus, adaicon, rasga, alrasafe, aresfatu.
- Π, Σ 1, 2, 3 Hæc pars uniuersa Celso Crus nūcupatur, quanq̄ Galeno σκέλος dicitur, quicquid à coxēdicis
osse, ipsiū ue inguinibus, ad extremū usq; digitorū pedis pertinet: femur nimirū, tibia, & pes ipse.
Nominatur itaq; secus pars hæc Π & Σ intersepta, tibia. ὑνῆμ. שֶׁשֶׁךְ scoch. quibus nominib. hu-
i. ius quoq; sedis grandius exteriusq; os obuiū est, quod tibiæ os ferē nūcupamus. πῶλημιον, & in-
terdum ὠπῶλημιον appellatū, קַנֵּה חֲזָרָה chane bagadol. Focile maius, & arundo, & canna ma-
i. ior, seu domestica cruris. Cæterū exterius graciliusq; os insignitū, ac fibula nobis dictū, appel-
latur πῶρον, πῶλημιον. Sura. קַנֵּה חֲזָרָה chane bachatō. Focile minus, cāna, et arūdo minor cruris.
- Φ, Χ 1, 2, 3 Malleoli, σφυγὰ, πῶλη, latinorū aut nōnullis malē tali appellatur, שהי קצוות הכולטים משני הקנים,
fete chez zauroth haboletim miscene bachanim. Clauiculæ, cauillæ, cababin. Ac φ quidē interio-
rem indicat malleolū, χ autē exteriorē. Ω, 1, 2, 3 Talus, ἄσπεργαλος, ἄσπις, Latinis Interpre-
tibus quibusdā parū rectē malleolus appellatur, fortassis huc quorundā nō Anatomicorū sen-
tentia ductis, qui τῶ σφυγῶ malleū, neutro aut genere τὸ σφυγὰ talos potius significare cōtendūt.
Balistæ os, cauilla, chahab, alsochi. קַרְסוּלִי bacharsul, עֵרְסוֹם haarcchom.
- α 2, 3 Calx. πῶνα, λαλῶνα. Calcis os. עֵקֶב baacheu. Alrip, calcar pedis.
- β 1, 2 Os cymbā scapham ue referēs, σκαφοειδής. Naiculare, nauiforme. עֵצִי הַשֵּׁוֹה אֶרְבֻּבָה קַטָּנָה bezē
bascaue, aut sephinachotena. c, c 1, 2, 3 Hæc pedis pars quatuor efformata ossibus, nobis tar-
sus, ut & Græcis, ferē nūcupatur. רַסָּה rasēgh. Raseta pedis, & ossa rasetae pedis. Tria autē
d, e, f. interiora d, e, f insignita, priuatim χαλκοειδῆ quibusdā appellatur. extimū uerō ac g notatū, uoca-
g. mus os cubū tesseraū ue referēs. κυβοειδής, πολυμορφον. Cubiforme, quadratū. חַרְדִּי chardij,
עֵצִי נִפְרָר bezem nipirat. Grandinosum, nerdi. h, h 1, 2, 3 πῶλον. planta, planum, uestigium & solum.
αἰῶν μετὰ τῶ σφυγῶ, σῆθρον. Pectus, & pecten. מִסְרַחַח הָרֵגֶל masrech hareghel. Alselameet.
- i, i 1, 2, 3 Pedis digiti. k 1, 2, 3 Characterē k officula notatur scsamina. σπασμοειδῆ. חֶלְתָּמִּינִיָּאת hel-
thesaminiath. Alsensaminia.

ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS DE HUMANI CORPO- RIS FABRICA LIBER SECVNDVS, LIGAMENTIS OMNIBVS,

& Musculis, uoluntarij atque è nostro arbitratu pendentis motus instrumentis
dedicatus, ac propemodum figuras omnes ipsi proprias, ante Caputum
contextum, uti nunc subiicitur, spectandas offerens.



N P R A E S E N T I S Libri initio pro-
ponenda sedecim tabularum series, omnibus ferè Se-
cundi libri Capitibus communis erit, neq; minus in Li-
bri calce, quam hìc modò in fronte collocari potest.
Primæ enim quatuordecim, integros exprimunt homi-
nes, ac harum ordine prima, anteriorem uiri faciem
delineatam continet, secunda latus ostendit. tertia,
quarta, quinta, sexta, septima, octaua, anteriorem fa-
ciem quoq; proponunt, in hoc illud ue latus, pro muscu-
lorum, qui indicantur, natura & situ magis repositam.
Sex uerò octauam consequentes, posteriorem corpo-
ris faciem referunt, omnes propemodum ita effigiatæ,

ut quod in priori conspicuum est, in subsequenti resectum, ab insertione pendeat. Deinde omnes
tabulæ ita inuicem congruunt, ut uni quæ anteriorem faciem exprimit, alia succedere possit, po-
steriorem exhibens. Integrum namq; erat tertiæ subiungi nonam, mox quartam, dein decimam,
insuper quintam, illi uerò undecimam, postmodum sextam, ab hac duodecimam, deinceps septi-
mam, quæ sequeretur decimatertia, cui rursus succederet octaua, & huic decimaquarta. Vnde
etiam non inopportune feceris, si utraq; serie has musculorum tabulas intuearis, atq; quid singu-
læ potissimum exprimant, ex ipsarum earundemq; characterum indicibus illis, quam per typorū
rationem licuit, proximè appositis requiras, quo à Caputum contextu non ad quatuordecim pri-
mas solū, uerum & ad decimamquintā & decimamsextam, si quando uisum erit, recurras, mu-
sculorumq; quorum tum mentio incidit, delineationem ex sententia spectes. Per paucis enim Se-
cundi libri Capitibus peculiare figuras sum præpositurus, ijs nimirū duntaxat, quorum musculi
priuatis figuris cōgruè exprimi nequiuērunt. Dein primi Capitis fronti tabella adhibetur, liga-
mentorū differentijs ostendendis præcipuè apta, & secundi Capitis initio eæ præponentur figu-
ræ, quas musculorum cōpositioni intelligendæ idoneas duxi. Porro non suffecerit in una tabula
musculū aliquem intueri, etiam si illum caractere insigniuerim, sed ut uideas, ubinam quisq; emi-
neat, alteri ue succumbat, passim tibi is uenit inquirendus, & potissimum spectandus, ubi totū se
uidendū offert, quod ferè fit, ubi peculiariter uni musculo plures characteres adhibentur, præci-
puè quum extra aliorū ordinē maiusculo caractere, Græcis peculiari inscribitur. Quare etiā
quum illū in ea tabula inspexeris, non prætereas, quin unā præcedentem tabulam et sequentē in-
tuearis, ut discernas, cui is quæ spectas, musculus incumbat, cuiq; substernatur. At non est, quòd
prolixius in tabulis exercendi rationem præscribam, quum quiuis pro suo pte ingenio et Anato-
mes peritia, scopos, utendiq; modum sibi præfigere queat. Quòd uerò in integras tabulas muscu-
lorū effigies ita digesserim, neq; singulis Capitibus singuli articuli cū suis musculis appicti sint,
ea potissimū occasione factū puta, quòd illi si priuatim articuli pingerentur, à nemine nisi Ana-
tomes peritissimo possent distingui. Nunc autē quum omnia cohærent, cuius obuiū est, qua sede
quisq; musculus reperiatur, adeo sanè, ut prorsus operæ precium fuisset integras ad hunc modum
tabulas delineari, quantumuis etiam seorsim articuli fuissent expressi. Insuper si singulis Capitibus
suos musculos adhibere, uel aliqua ratione utile fore sperassem, non hoc usu studiosi caruis-
sent, quando præter sumptum nullus labor mihi impendendus erat. Ex his namq; integris tabu-
lis necessario sculptis, particulas singulas articulos ue seorsim transcendendos dare, non maio-
ris mihi esset operæ, quam ex iam proponendis tabulis, nunc caput, nunc brachium, nunc crus aut
thoracē, ut ut uisum esset, abscindere, et sculptori offerre. Ad hæc, idem semper labor lectori
in uertendis folijs impendisset, quum eadem pagina & musculorum effigiem, & characterum de-
clarationem seu indicem, ac deinde musculorum descriptionem continere nequeat.

PRIMA
MUSCULO.
RVM TA-
BVLA.



PRIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

- P R A E S E N S** tabula anteriorem corporis faciem magna ex parte notans, corpus exprimit, à quo cutis cum adipe carneaq; membrana, & omnibus in superficie extantibus nervis, uenis & arterijs, si quæ sunt, resecui. Hanc tabulam unà cum sequenti, characteribus liberam relinquere propositum erat, quo minus illis commaculata spectaretur. Quandoquidē tertia ferè prima est, quam ad disciplinam parauimus, præsens namq; (uti nec consequens) aliquid oculis subiicit, quod non in musculosis & quadratis, ut sic dicam, hominibus, eruditos pictores, sculptoresq; indies etiam præcipuè exprimere obseruamus. Quæ enim membranea in tertiæ tabulæ facie & ceruice uisuntur, & fibræ etiam in musculis ductæ, potiùs pictorem, ac sculptorē & plastem (quorum studijs quoq; opitulari uisum est) perturbant. Quanquam his sanè non sat sit, musculos in superficie repositos ad amussim tenere, imò præter ossium accuratissimam cognitionem, summa diligentia cuiusq; musculi munus perspectum ipsis esse debet, quo sciant, quando musculū aliquē aut breuiorē, aut longiorem, aut protuberantē magis, aut cōpressum depingere debeāt, hoc axioma perpetuò ob oculos habentes, musculū, dum os mouet, idq; (ut sic dicā) ad suū uentrem retrahit, breuiorem, multoq; prominentiorem fieri, & ad ipsius uentris mediū colligi, quum autem è conuerso musculus os dimittit, ipsumq; os aliò agitur, quàm ab eo musculo ducetur, musculi uentrem (cui duntaxat illi artifices animum accommodant) produci ac subsidere, minimumq; protuberare. Cæterum quandoquidem hæc affatim in musculorum descriptionibus perstringam, characterum præsentis figuræ indicem aggrediar, in quo uix ullum musculum priuatim expressurus sum, sed unicum duntaxat characterē singulis in altero latere adhibens, quos hic obiter spectare licet, ascribam. In facie itaque nullus hic in conspicuo est musculus, quòd illi tenues exactè & membranei sint, neque etiam obiter adempta cute secus, quàm in præsentia modò occurrant.
- A** Glandulæ quàm plurimæ notantur, quæ sub aurium radice, ad posteriorem inferioris maxillæ sedem repositæ, cavitatem hîc opplent, tutæq; uasorum distributioni præficiuntur. Sunt autem hæ quas in pueris humorū influxus crebrò molestant, ac quæ strumis (quas χοιρὸς Græci appellant) subinde infestantur. Hac sede, qua glandulæ reponuntur, etiam citra characteris adminiculum, præscissæ hîc auris foramen obseruatu est facillimum.
- B** Sinistri lateris musculus, ab inferiori maxilla, in os **v** imaginem referens insertus.
- C** Musculus à pectoris osse pronatus, ac in os **v** literæ simile cum suo coniuge insertionem tentans.
- D** Musculus gracillimus, à superiori scapulæ costa, in os **v** referens insertus, ac in quarta musculorum figura, **V** & **V**, in quinta autem, **R** & **S** notatus. Sedes quæ utrinq; ad literæ **D** latera uisitur, cauaq; est, neruos continet sexti paris neruorum cerebri, interioribus uenis iugularibus, & arterijs soporalibus concomitatos.
- F** Musculus à pectoris osse & clauicula, in mamillarem occipitij ossis processum, carnea insertionem implantatus.
- G** Portio est musculi, scapulam mouentium secundi, cuius effigiem monachi in suis cucullis imitati sunt. Præsentis musculi aliud nihil hîc est conspicuum, quàm quod clauiculam, & summi humeri sedem clauiculæ connexam inseritur, uerum in nona figura totus apparet musculus, **Γ** & **Δ** insignitus.
- H** Sedes hæc iugulares uenas exteriores transmittit, quare etiam citra omnem musculi distinctionem, in uiuis duntaxat caua apparet. **V** ena autem resecta, & mucosis quibusdam membranulis ademptis, ille occurrit musculus, quem **D** insigniui, & etiam unus qui à prima thoracis costa, in anteriorem transversorum processuum ceruicis uertebrae sedem insertus, **C** in octaua musculorum tabula notatur.
- I** Clauiculæ anterior sedes, quæ excarnis occurrit.
- K** Musculus brachium attollens, cuius principium à clauicula, summo humero, et scapulæ spina enascitur, atq; hîc ipsius pars spectatur, à clauicula & summo humero pronata.
- L** Musculus brachium pectori adducens.
- M** Pectoris os excarne apparens, nam musculis pectori brachium adducens ad ossis latus, primum

carneus esse incipit, & quamvis dexter sinistrum neruoso, & membranæ modo tenui exortu contingat, ob hoc tamen in uiuis adhuc hominibus pectoris os non prorsus occultatur.

N **N** sub axilla latitat, partem notans musculi brachium deorsum uersus dorsum detrahentis, ac sequenti tabula **Γ** indicandi.

O, **O** Hæc digitorum imago, musculi aliquot insertiones indicat, qui in octo superiores thoracis costas insertus inspirationi famulatur, atq; in octaua musculorum tabula **F** & **F** insignitur.

P, **P** Præsens uero digitorum effigies, exortus est musculi abdominis oblique descendentis, quem pluribus characteribus hic notare non libuit: quemadmodum neq; recto etiam abdominis musculo notam adhibui, quod prorsus adhuc sub obliquorum neruosis tenuitatibus, & musculo brachium pectori adducente reconditus sit, utcunq; etiam tubera quæ secundum abdominis longitudinem porrecta conspicias, recti abdominis musculi sint: quæ quo minus extuberent, obliquorum tendinum tenuitatibus non inhihentur: quemadmodum neq; cutis crassities in non admodum obesis obstat, quo minus eadem spectentur.

Q Anterior cubitum flectentium musculus.

R **R** sub axilla reconditur, notans dicti iam musculi, interioris capitis carnosam partem, peculiaris musculi ritu extuberantem.

S, **S** Musculus posterior cubitum flectentium, quem duobus insigniui characteribus, ne sedes illis characteribus notatas, diuersos esse musculos quis arbitraretur.

T Musculus ab inferiori scapulæ costa enatus, cubitiq; extensioni subseruiens.

V Superior musculus eorum qui radium in pronum agunt. Cæterum quum præsentis figuræ cubitorum & manuum extremarum non eadem sit facies, haud inopportune dextro et sinistro lateri **V** ac subsequentes aliquot characteres pariter adhibui.

X Musculus ante indicem postbrachiali insertus, idq; flectens.

Y Musculus latum tendinem in summam manum producens. Sedes autem quæ utrinq; ad huius tendinis latus in cubiti longitudine protenditur, nulloq; characterè insignitur, flexionis secundi quatuor digitorum articuli autor est, quem quintæ figuræ **Θ** indicat.

Z In dextro cubito indicatur musculus ab interno humeri tuberculo principium ducens, qui recto brachialis ossi insertus, brachiale flectit.

a In utroq; cubito musculus notatur, radium in supinum ducens: qui ab humeri osse natus, inferiori radij appendici implantatur.

b In utroq; cubito musculus insinuat, bicorni tendine brachiale extendens.

c In utroq; cubito indicantur duo musculi, ex ulna originem ducentes, quorum unus tendinem brachialis ossi offert pollicem sustinenti: alter in binos dissectus tendines, unum primo pollicis ossi, alterum secundo & tertio inserit.

d In sinistra manu hic occurrit tendo musculi, pollicem uersus indicem evertentis.

e In sinistra manu spectantur tendines, in exteriorem indicis sedem exporrecti.

3, 4, 5, 6 In sinistra manu notatur transuersum ligamentum, in cubiti externa sede conspicuum. uerum numeri characteres seorsim indicant, quot in hac manus superficie sinus anuliq; dissecantibus apparere possunt. Sunt autem omnes quatuor radio proprii, illisq; tendinibus adaptati, in quorum regione numerum conspicias. In dextro cubito etiam **6** spectatur, idem quod in sinistro indicans.

h In sinistra manu, sedes musculi indicatur pollicem indici proximè adducentis. Modò post sculpturam **f** & **g** incuria elapsa, nihilq; illis insignitum obseruo, quod & in alijs tabulis interdum (citra incommodum tamen) usuuenit.

i In dextra manu musculus pollicem ab indice plurimum abducens: atq; ad huius latus portio eius musculi uisitur, qui primum pollicis os flectentium est prior.

q Musculus paruum digitum à cæteris abducens, ad cuius dextrum latus is se offert, qui sub illo magna ex parte occultatus primū parui digiti flectit internodium, id in externum latus ducens.

k Tunica testem ac ipsius uasa seminaria inuoluens, quæ hæc in uiris prorepunt. Mulieribus enim hæc uasa cum reliquis generationi famulantibus organis in corporis alto reconduntur.

l Ad sinistri testis latus **l** occultatur, notans glandulas cavitatem hic in inguinibus replentes, qua insignis uena cum arteria crus adit. Glandulis enim resectis hic magnus exurgeret sinus, cuiusmodi in inguinum abscessibus fieri cernimus.

m Muscu-

- m* Musculus à pubis osse in femur procedens, in octaua figura Σ notatus.
- n* Hæc prorepunt duo muscoli, quorum alter femoris motorum sextus habebitur, atq; in octaua tabula Θ notabitur: alter uero septimus, in eadem tabula Λ indicandus.
- o* Ab ilium osse pronatus musculus, qui tibiæ insertus, illius motorum primus est.
- p* A pubis ossium commissura enatus musculus, ac tibiæ mouentium secundus.
- q* Sextus inter tibiæ mouentes musculus, cuius carnosæ substantia hic conspicitur: tendo autem ipsius adeo tenuis est, ut subiectorum illi musculorum circumscriptionem non obliteret. Quapropter etiam priuatim hic se non ostendit, quemadmodum neq; in secunda musculorum figura. in tertia tamen Θ quarta, quadatenus oculis subiicitur, in hac quidem caractere Σ , in illa uero Φ notatus.
- r* Præsens musculus etsi cum alijs inibi ad superficiem repositis nuper dicto membraneo tendine sexti tibiæ mouentium muscoli obducatur, attamen sese ostendit, quemadmodum neq; in musculo sis integra adhuc cute conspectum fugit. Notat autem *r* priuatim septimum tibiæ mouentium musculum.
- s* Musculus supra coxendicis ossis articulum principium ducens, Θ inter tibiæ motores nonus. Verum Θ hic membraneo obtegatur tendine muscoli tibiæ mouentium sexti.
- t* Musculus, femoris os uniuersum quodammodo amplectens, tibiæq; ducum octauus.
- u* Sedes hæc *u* notata, ad sinistrum spectatur genu, estq; quarti tibiæ mouentis muscoli pars.
- x, y* Totæ hæc tibiæ ossis regio excarnis est, nulloq; obtegatur musculo.
- z* Musculus pedis motorum ordine sextus, ac per transuersum ligamentum in anteriori tibiæ sede positum, Θ Λ indicandum, descendens, pedisq; ossi pollicem sustinenti insertus.
- a* Musculus quatuor pedis digitos extendens, qui sub musculo *z* insignito, maxima sui portione occultatur.
- b* Quatuor digitos extendentis muscoli portio, quæ pedi in anteriora attollendo suppetias ferens, pedem mouentium nonus censetur.
- y* Pollicem extendens tendo. Carnosa enim muscoli pars in alto alijs subiicitur musculis.
- d* Transuersum ligamen in anteriori tibiæ sede locatum, Θ quatuor ultimò notatis musculis uiam porrigens.
- e* Exterior malleolus, seu fibulæ excarnis pars.
- g* Musculus fibulæ exporrectus, qui sub pedis inferiora reflexus in pedis os pollicem sustinens insertionem molitur, ac pedem mouentium septimus numerabitur.
- u* Musculus, ab externo femoris capite pronatus, Θ pedem mouentium secundus.
- h* Hunc characterem Θ aliquot subsequentes in dextro crure reposui, quod illis indicandi musculi in eo sint conspectiores. Verum θ notatur musculus ab interno femoris capite pronatus, pedemq; mouentium primus.
- i* Tendo totius corporis gracillimus, ab illo enatus musculo, qui ab externo femoris capite principium ducens, pedem mouentium tertius habetur.
- n* Maximus suræ musculus, à commissura fibulæ ad tibiæ enatus, pedisq; motorum facile robustissimus, Θ quartus.
- l* Musculus quatuor pedis digitorum tertium os flectens.
- u* Portiuncula quoq; hic uisitur, pedem mouentium quinti. uerum hæc, ut Θ musculi paulò antea in dextro potissimum crure commemorati, dilucidius multo in dextra sequentis tabulæ tibiæ conspiciuntur.
- v* Transuersum ligamentum à tibiæ in calcem pertinens.
- z* Musculus pollicem in internum latus agens.
- w* In dextro pede musculus notatur, pollicem alijs digitis adducens, seu illum in latus externum mouens. Apparent ad hæc, sub tendinibus muscoli quatuor digitos extendentis, ac *a* notati, tendines indicem, medium Θ anularem in externum latus abducentes.

SECUNDA
MUSCULO.RUM TA.
BVLA.

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER II.
 SECUNDAE MUSCULORVM TABULAE
 CHARACTERVM INDEX.

175

SECUNDA tabula primæ, quòd ad sectionem spectat, omnino correspondet, et in latus uersa eosdem cum illa commonstrat musculos, unà cum ossium sedibus in superficie prominentibus, ac ut sic dicam, excarnibus. Quum itaq; hæc spectatu sit dignissima, pari cum præcedente modo singulos musculos uno caractere annotabo. Facies itaq; propemodum uniuersa, & caput quoq;, quum paulo minus toto osseum sit, literis nisi paucissimis in hunc modum insignientur.

- A* Temporalis musculus. Quicquid supra semicirculum hunc quo temporalis musculi primus exortus circumscribitur, consistit, prorsus excarne est: nisi hic fortassis accuratè nimium singula animaduertens, frontis os secundum naturam non excarne esse, uerùm tenui musculosa compage obduci, additum uelis, quam simul cum frontis cute totaq; adeò carnosam membranam rescuimus.
- B* Os iugale. Foramen illud ad ossis huius terminum sese offerens, auditorius est meatus.
- C* Musculus à mandendo uocatus, & mansorius nuncupatus.
- D* Musculus buccarum motibus subseruiens, ac ex una maxilla in alteram pronatus.
- E* Musculus sinister ab inferiori maxilla in os u imaginem referens productus.
- F* Musculus à pectoris osse in os u referens insertus.
- G* Musculus sinister, à superiori pectoris ossis sede principium ducens, & in humiliorem cartilaginis scuti imaginem representantis regionem insertus. Is enim quum sub musculo *F* insignito latet, non prorsus in latere conspectum fugit.
- H, H* Musculus à superiori scapulæ costa ad os u imagini simile properans, qui ablato adipe & iugulari externa hinc diligenter exacta, iuxta humilius *H* est conspicuus. Deinde superius *H* indicat etiam glandulas ad auris radicem repositas.
- I* A pectoris osse & clauicula principium sumens musculus, et in mamillarem temporis ossis processum insertus.
- K, L* Musculus scapulam mouentium secundus. ac *K* quidem notat superiorem ipsius partem, quæ scapulam sursum trahit. *L* uerò inferiorem, cuius beneficio scapula deorsum agitur. Ad dextrum latus *L* hic quoq; dextri musculi portio sese offert, uerùm in nona musculorum tabula utriusq; lateris musculus literis Γ & Δ est spectatissimus.
- M* Musculus brachium attollens. præsens musculus longè accuratius in quarta figura Ξ , & in decima Δ indicabitur. quod ideo additum uolui, ne quis hunc musculum multis donatum impressionibus, plures esse ex uera hac integraq; delineatione sibi persuadeat. Quamuis interim hæc impressiones (si quis alius modò musculus) peritos sculptores pictoresq; ludant, quos nò hic solum, sed & in toto externo brachij latere uelim esse attentissimos, quòd male musculum quem iam notabimus, ueluti in cubiti exteriora protrahant.
- N* Quanquam ex subsequenter characteribus nonnullos in utroq; brachio repositos cernis, tantisper tamen sinistro duntaxat animum adhibebis, donec & dextri meminero. *N* itaq; notatur posterior cubitum flectentium, qui in uiuis altius supra brachium attollentis musculi insertionem enasci uisitur, quàm reuera principium ducit. licet hic non nimis inferius incipiat, sed quod pictoribus animaduertendum est, fortassis etiam elatius quàm deceat.
- O* Musculus cubitum extendens, qui ab humeri capitis ceruice principium adipiscitur.
- P* Musculus cubitum quoq; extendens, cuius origo ab inferiori scapulæ costa pendet.
- Q* Hac sede duo dicti nuper musculi cubitum extendentes in unum coeunt, non amplius duplicis musculi imaginem repræsentantes. Quòd autem hic insignius quàm reliquo progressu extuberant, præter ipsorum partem summè carnosam tertius cubitum extendentium in causa est, qui hic sub illis occultatus ab humero seu brachij osse pronascitur, atq; in duodecima figura *X*, in decima tertia autem *d* indicabitur.
- R* Hac parte cubiti extensionis autores in posteriorem ulnæ processum, & articuli ligamenta implantantur, nerueam suæ insertionis partem in triangularem hanc sedem porrigentes, quæ ex carnis ulnæ est portio.
- S* Musculus ab humero enatus, qui in inferiorem radij appendicem insertus, radium in supinū ducit.
- T* Musculus bicorni tendine brachiale extendens.

- V* Musculus indicem medium, & anularem præcipue extendens.
- X* Musculus parui digiti extensionis primarius autor.
- Y* Musculus postbrachiale extendentiū inferior. *a* Musculus flectentiū brachiale inferior.
- b, c* Duo hic indicantur musculi, quorum superior *b* insignitus brachiali inseritur: inferior autē cui *c* inscriptum est, in duos diducitur tendines, unum primo pollicis internodio inserēs, alterū duobus superioribus eiusdem internodijs implantans.
- 1, 2, 3, 4, 5* & *6*. His numeris notatur transuersum ligamentum in exteriori sede cubiti repositum, quod in tot rursus anulos diuiditur, quot numeros scripsimus. *1* enim indicat ligamentū radio ulnæq; commune. *2* ligamentum ulnæ propriū. *3, 4, 5* & *6* uerò insinuant quatuor ligamēta radio peculiaria.
- d* Sedes musculi, aut ipse etiam musculus indici pollicem proximè adducens.
- e* Tendo musculi pollicem ad indicem euertentis. Verū modò tempestiuū est & dextro brachio animum accommodare, ac partim easdem notas quas in sinistro spectasti, partim uerò nouas intueri. Idem igitur significant *N* ac *N, P, S, T, a*. sed uix hic musculi *a* insigniti linea conspiciuntur. dein *b, c* & *4, 5, 6*, & *d* ac *e* idem in dextra, quod in sinistra manu referunt. At priuatæ dextræ manus notæ sunt huiusmodi.
- Z* Anterior cubitū flectentiū musculus. *f* Musculus superior radium in prouum mouentiū.
- g* Musculus superior brachiale flectentium. *h* Latum producens tendinem musculus.
- i* Musculus gibbam scapulæ sedem occupans, qui extrorsum brachium circumuertit.
- k* Musculus quo brachium retrorsum ad dorsum elatiū quam iam signando musculo ducitur.
- Γ* Præsentem musculum nona tabula *O*, & detectum adhuc magis decima *Θ* ostendent. At quū externum secundū ue ipsius latus nullibi atq; in hac tabula opportuniū ostendetur, hic aliquot characteres adijcere erit operæ precium. Est itaq; musculus hic cuius beneficio brachium agitur deorsum, triangularis quodammodo figuræ, cuius internum latus spinarum apicibus exporrigitur (qui præsentī musculo principium offerunt) ab *l* ad *m* pertinens. Exterius uerò latus, *l, m*, quod à sacro osse sursum oblique in priora ad insertionem properat ab *m* ad *n* usq; pertinet. *n* enim insinuat huius musculi partem suæ insertioni proximā, quæ citra alterius musculi dissectionem conspici nequit. Atq; hoc latus est, quod in prima tabula *N* notat, in sequenti uerò *V*, & rursus longè accuratiū dextrum septimæ tabulæ brachium *O* litera hanc insertionem commonstrat. Tertium latus ab *l* ad *n* porrigitur, quod transuersim ductum humiliori basis scapulæ angulo insternitur. Atq; *l* etiā indicat huius musculi partē musculo cui *L* inscripsimus subiectā.
- Δ* Ne paruum *o* in umbra ad pectoris sedes plus satis lateret, *Δ* inibi positum habes, musculum indicans, quo brachium pectori adducitur.
- o, o, o* Huiusmodi triangulorum quasi ritu procedentes formæ, insertiones musculi sunt eius qui in *o* & *o* superiores thoracis costas manus modo insertatur.
- p, p, p* Exortus abdominis musculi oblique descendētis, qui mutuò cum dicti iam musculi & aliquot *o* insigniti insertionibus ingrediuntur. Quod autem in uniuersa abdominis sede conspicitur, obliquus ille est musculus: quanquam rectus abdominis musculus nonnihil propter obliquorum tendinum tenuitatem (quemadmodum & ante sectionem) extuberet.
- q* Principium notatur primi tibiæ mouentium musculi, quem sequenti figura *Σ* notatum cernes. Hic autem in dextro femore *q* etiam indicatur.
- r* Musculus latum producēs tendinem, quo omnes femur amplexantes musculi circundantur, quiq; tibiæ mouentium sextus habetur. Huius tendo quum non insignem exigat spissitudinem, aliorū musculorum inspexionem minus adhuc ipsa cute occupat: unde etiam hic occurrit musculus, mox *t* notandus.
- f* Portio musculi tibiæ mouentium noni, quem in quarta tabula *Φ* exprimam.
- t* Musculus tibiæ mouentiū septimus, membraneo tendine sexti tibiæ mouētis musculi obtectus.
- u* Musculus sinistrum femur mouentium primus. Qui uerò dextrum femur agit, etiam magna ex parte hic se offert.
- x* Regio maioris exterioris ue processus femoris.
- y* Conspicua secundi femur mouentis musculi pars. Reliqua autem primo femur mouenti musculo *u* superius indicato, & illo quē latū producere diximus tendinē, quemq; hic *r* notauī occultatur.

- α Quartus tibiā mouentium musculus, qui hic externo ipsius latere est spectatissimus, ac nullibi in dextro crure apparet.
- β In utroq; femore tertius notatur tibiā mouens musculus.
- γ In dextro tantum femore indicatur secundus tibiā mouentium musculus.
- δ In dextro crure bis δ posui, musculum indicaturus, quem ego quintum femoris motorem enumeraturus sum. In sinistro autem crure δ iuxta poplitem ponitur, quintum quoq; notans musculum.
- ε ζ In dextro femore indicatur quintus tibiā mouentium Galeni musculus, noster autem femur mouentium quintus. ac ε quidem huius musculi posteriorem partem indicat, ζ uero posteriorem anterioris partis portionem. Hæc non ambigo abstrusa obscuraq; uideri, attamen si Caput tibiā mouentibus musculis, & Caput femur agentibus dedicanda perlegeris, erunt longe facillima: præcipue quum hos musculos in alijs musculorum tabulis propemodum denudatos uisurus es, uidelicet in septima ad characterem β, in octaua ad Φ & c, in duodecima ad Ξ & Σ. Omnia enim singulis locis haud ueniunt repetenda: imò uereor morosiores quempiam & rodendi studio natum, mihi detractaturū, quòd ea in harum tabularum indicibus præmoneam, quæ in sermonis seu Capitum contextu diffusè ac explicatè persequar. Quanquam etiam hæc & cōtextus ipse studioso homini uix sufficient: ut eos modò mittam, qui omnia oscitanter aggredientes, cōpendia summo ipsorum dispendio quærunt, et Galeni anatomicos libros tanquam ad ipsos non pertinentes relinquunt.
- η Musculus hic extuberans, tibiā mouentium octauus censebitur.
- θ Excarnis tibiæ pars, uerū interior malleolus priuatim η notatur.
- λ In utroq; crure suram constituens musculus, qui mouentium primus numerabitur.
- μ Musculus in utroq; notatur crure, pedem mouentium secundus.
- ν Gracillimus totius corporis tendo, à musculo enatus qui pedem mouentium tertius habetur.
- ξ Maximus suram constituentium musculus, ac pedem mouentium quartus. Quamuis ο & ι, & eiusmodi aliquando characteres nō inuenis, ob hoc quicquam nō notatum fuisse minime arbitrandum est, quum illi characteres (quantum ad sculpturam spectat) nostro ο & ι non absimilia sint.
- ω Musculus tertios quatuor digitorum flectens articulos.
- ρ Portiuncula eius musculi, qui pedem mouentium quintus erit.
- ς Transuersum ligamen ab interno malleolo in calcem pronatum.
- τ Musculus pollicem in internum latus ab alijs abducens digitis, qui sanè hic est manifestissimus.
- υ Ligamentum musculo secunda quatuor digitorum internodia flectenti obnatum, & lati tendinis uicem in planta gerens.
- φ In utroq; crure musculus notatur in anteriori tibiæ sede locatus ac pedem mouentium sextus.
- χ Musculus fibulæ exporrectus, qui pedis motorum septimus numeratur.
- ψ Musculus nuper dicto substratus, pedemq; mouentium octauus. huius tendo, ut & septimi, sub Σ est conspicuus.
- ω Musculus quatuor digitos extendēs, ad latus autem sinistrum Ω occurrit huius musculi portio, bicorni tendine in pedij os ante paruum digitum inserta, quam pedem mouentium musculorum nō num appellabimus, quiq; aptius in quarta musculorum tabula Ω indicabitur.
- Θ Tendo musculi pedis pollicem extendentis.
- Λ, Δ Transuersum ligamentum tibiæ ossi & fibulæ commune, in sinistro crure Λ indicatur, in dextro autem Δ.
- Ξ Exterior malleolus, seu fibulæ ossis excarnis sedes.
- Σ Transuersum ligamentum à fibula in calcem pertinens.
- Π Musculus abductionis parui digiti à reliquis autor.

TERTIA
MUSCULO-
RUM TA-
BULA.



TERTIAE MUSCULORVM TA-

BVLAE CHARACTERVM INDEX.

P R A E S E N S tabula anteriorem corporis faciem exprimens, in hoc à prima musculorum tabula differt, quòd musculos ex carnosâ membrana constitutos, & aliquot etiam faciei musculos ab adipe liberatos commonstret, quodq; magis ad musculorum disciplinam, quàm priores duæ, sit comparata.

- A** Rectæ secundum frontem ductæ lineæ, frontis & narium cutis musculum notant.
- B** Temporalis musculus, ubi interdum, sed perquam rarò, carnea membrana fibris etiam carneis enutritur.
- C** Musculus palpebram attollens.
- D** Musculus palpebram deorsum trahens.
- E** Mutuus palpebræ musculorum secundum palpebræ longitudinem connexus.
- F** Musculus media sui parte nasi alam, altero uerò superius labrum petens. Quemadmodum sanè uarium musculorum fibrarum in labijs implexum indicare non licuit, ita quoq; characterũ copia faciem alioquin satis obscuram non sum occupaturus.
- G** Malum, ac iugalis ossis anterior sedes, quæ prorsus excarnia sunt.
- H** Musculus à malis pronatus, & superiori labro proprius.
- I** Masseteris musculi principium, lato quem iam describam, musculo non obtectum.
- I** Musculus carnosâ constans membrana, & præcipuus buccarum labiorumq; & anterioris colli cutis motuum dux, qui hic corpori in utroq; latere hæret, reliqua carnosæ membranæ parte, quæ carnea non efficitur, à corpore resecta. Quod autem ad præsentis musculi fibrarum progressum **K, L.** attinet, **K** ad **L** usq; musculi principium notat, è regione ossis pectoris, ac mediæ clauiculæ sedis ossi pectoris proximæ incipiens, cuius fibræ recto tramite sursum ad **M** exporriguntur. Ab **N.** L uerò ad **N**, principij pars notatur, è regione reliquæ sedis, clauiculæ & summi humeri sede incipiens, cuius fibræ oblique sursum in anteriora porriguntur. Deinde et si ea musculi pars non **O.** sese spectandum offerat, quæ in posteriori ceruicis sede consistit, nihilominus **O** ad auris radicem positum, transuersas fibras illinc prorepentes utcunq; ostendit. Quare etiam in musculi lateribus describendis, primũ latus tibi fingendum est ab **N** ad **O**, secundum ab **O** ad **H.** **K** uerò per **L** ad **N**, tertium indicabit latus. **A** **K** autem ad **M** quartum habes latus. Intensius enim nigricans lineæ, à **K** ad **M** ducta, dextri musculi cum sinistro interstitij loco habenda est.
- P** Brachium attollens musculus, quem hic in anteriore corporis facie **L**, **N** et **Q** propemodum **Q.** circumscribunt, is enim inferius, quàm **Q** consistat, sua insertione prorepat.
- Δ** Musculus brachium pectori adducens, qui in sequenti tabula simul hic uenit inspiciendus, ibidem namq; ab initijs liberatus, **Δ** perinde notatur, iisdemq; ferè characteribus inibi atq; hic ita circumscribitur. **K** ad **L** usq; principij ipsius pars, à clauicula principium ducens. **K** uerò ad **R.** principij pars est, ex media latitudine ossis pectoris pronata. Quinetiam **R** notat musculi membraneam partem, quæ ad mucronatæ cartilaginis latus, oblique descendens musculi abdominis **S.** neruosæ tenuitati exporrigitur. **S** autem significat carneam musculi partem, à sextæ & septimæ costarum cartilaginibus, propter oblique descendentem abdominis musculum peculiariter pronatam. **Q** præsentis musculi insertionis index est, qua inter brachium attollentem (qui **P** notatur) & priorem cubitum flectentium **Z** indicandum, in humerum inseritur. Porro si latera ipsius, & fibrarum insertionem intueri animus sit, sequentem etiam inspicio tabulam, quæ præsentis musculi insertionem, **Q** & **T** notatam exhibet, quo ad hunc modum huius illiusq; tabularum characteribus simul iunctis, quinque musculi latera metiaris. Primum à **K** ad **L.** Secundum à **K** ad **R.** Tertium ab **L** ad **Q.** Quartum ab **R** ad **T**, quod subsequens ostendit tabula, in præsentis interim lata musculi insertionem occultata. Atq; hinc etiam quintũ quoq; latus, à **Q** ad **T** pertinens, in quarta tabula duntaxat est conspicuum.
- V** Musculus brachium deorsum trahens.
- 5, 6, 7, 8** His numeris, insertiones musculi thoracem mouentium secundi notantur, quæ costis inseruntur, quarum regio cum his numeris exprimitur, elatissimam insertionem in quintam fieri costam promptè colligis.
- Θ** Abdominis musculus oblique descendens, qui cum suo coniuge uniuersam abdominis sedem cooperit

operit, magnam quoque thoracis sedem integens. Exortus præsentis musculi numeris indicatur, quibus secundi thoracem mouentis musculi insertiones significantur. Cæterum R ad X albam ostendit lineam, quam aliter simplici colore exprimere non datur, & omnium exemplarium tabulas suis coloribus distinguere esset quidem operæ præcium, ut membranea pars à carnea promptissime distingueretur, uerum sumptus quibusdam esset non admodum mediocris.

X Penis sua cute, quæ præputium uulgo uocant, liberatus, in quo ducitur recta linea, duorum ipsum constituentium corporum coitum indicans, quæ subsequens tabula sub q ostendit dissecta, uerum horum naturam omnium lucidissime tabula docet quadragesimonono Capiti præsentis Libri prælocanda.

Y Vasa seminaria sua adhuc tunica, quam peritonæum educit, intacta.

Z Musculus anterior cubitum flectentium. a & a Posterior cubitum flectentium.

b In interno brachij latere b occultatur, notans musculum cubitum extendentem, qui ab humiliore scapulæ costa principium sumit. c Musculus bicorni tendine brachiale extendens.

d Musculus radium in supinum ducens, ac inferiori radij appendici implantatus.

e Superior radium in prorum mouentium musculus.

Λ Musculus brachiale flectentium alter, postbrachiali ante indicem insertus. Ac si ipsius notat principium, g tendinis ex musculi uentre exortum, h sedem, qua tendo negligenter secati desinere putaretur.

Π Musculus latum summæ manus producens tendinem, cuius caput i indicatur, tendinis autem i, k, l. ipsius principium k. At l locum insinuat, ubi tendo primum dilatescere incipit.

m Musculus alter inferiorque brachiale flectentium.

n Hic obscure uidetur portio musculorum, quorum alterum brachiali, alterum uero pollicis tendines offerre dicam, ac inter digitos mouentes, uigesimisecondi et uigesimitertij loco habiturus sum.

o Excarnis primi pollicis internodij sedes. p Musculus ab indice pollicem remotissime abducens.

q Insignitor duorum primum pollicis os flectentium.

r Musculus minimum digitum maxime à reliquis amouens, ac in sequenti tabula n insignitus.

Σ. In dextro crure primus notatur tibiæ motus opifex, cuius initium s insignitur, t tendinis illius principium, u eiusdem insertio. Cæterum character 2, insertionem secundi notat tibiam mouen-

2, 3. tis musculi, 3 uero, insertionem tertij.

Φ Sextus tibiam mouentium musculus, cuius principium notat, x, y uero sedem, ubi carnosus esse desinit, membranæque modo toti femoris amplitudine obducitur. Haud licuit aliter ipsius tendinem membranamue exprimere, quam hic modo in utroque femore obseruatur, in quo tenuissimam ipsius partem, interiori femoris sedi obductam, ueluti laceram membranam diffecimus, ut sectio aliquantis per membranæ naturam monstraret. Quicquid enim ad externum inæqualis illius lineæ sectionisue latus habetur, ipsa adhuc est sexti musculi membrana seu tendo.

α Musculus tibiam mouentium nonus.

β Octauus tibiam mouentium, magis in sinistro crure, quam in dextro, à sexto tibiæ motuum autore detectus musculo. Septimo uero tibiam mouenti, characterem non adhibui, quod uniuersus sexto adhuc obtegatur. Quanquam Φ illum quoque insinuare possit, quum sexti musculi membrana non eam attingat crassitiem, qua subditorum musculorum effigiem obliterare queat.

γ In inguinum regione indicantur musculi, quos femur mouentium sextum & septimum recensebimus. Cæterum γ glandulas quoque insinuat inguinum unam cum sinu, ex quo uasa crus potentia rescui.

Δ Musculus femoris motorum octauus.

ε Musculus tibiæ motus opificum secundus, cuius tendinem character 2 monstrat.

ζ Excarnis tibiæ ossis pars, uerum n priuatim internum notat malleolum.

Υ Sextus pedem mouentium musculus, cuius exortum θ indicat, κ autem principium sui tendinis, cuius ductus citra characterum appositionem manifestus est, quanquam ζ insertionis quasi ipsius sedem ostendat.

λ Musculus septimus pedem mouentium.

μ Musculi pollicem extendentis tendo.

ν Musculus quatuor digitos extendens.

ξ Musculus pollicem à cæteris digitis in internum latus abducens.

ο Transuersum ligamen in anteriori tibiæ sede positum, ac facta sectione in latera reflexum.

ω Tendo bicornis musculi pedem mouentium noni.

ρ Primus pedem mouentium.

ς Pedis motorum quartus.

τ Longissimus gracillimusque tendo, à tertio pedis motus autore productus musculo.

υ. Musculus tertium quatuor digitorum os flectens.

φ Pedem mouentium quintus.

PRIMA MVSCV-
LORVM TABVLA.



CHARACTERVM QVARTAE MVSCV-
LORVM TABVLAE INDEX.

PRÆSENS tabula quamplurimos præcedentis tabulae musculos sectionis serie ademptos commonstrat, & deinde plerosq; qui prioribus figuris nondum in conspectum uenere, uidentos offert. quod omnes ad octauam usq; musculorum tabulam subsequentes tantisper præstabunt, dum ossa anteriori facie nuda conspiciantur.

- I** Musculus temporalis, cuius principium semicirculo non absimile *A, B & C* circumscribitur.
- D** Ossis iugalis externa sedes, quæ excarnis est.
- Δ** Masseter. *E* huius musculi principium à malo exortum. *F* principij ipsius portio auri proxima. *E, F.* ma. Cæterum ab *E* ad *F* totus ipsius principij ductus secundum iugalis ossis longitudinem metitur.
- G.** *G* infima musculi insertionis sedes notatur. Porro si triangulo hunc assimilare lubet, *E, F & G* tres angulos tibi proponere finges.
- H** Nervi minoris radicis tertij paris nervorum cerebri, hanc frontis musculosam compagem petes.
- I** Nervi dictæ modo radicis ad superius labrum, & externam alæ nasi sedem propagatus.
- K** Cartilago in quam sinistram nasi os desinit.
- L** Ala nasi sinistra dictæ modo cartilaginis extremo alligata incumbensq;. Inter *K & L* narium cute iam ablata cum quibusdam membranis ligamentis, in conspectum uenit interior alæ nasi musculus nimisquam tenuis.
- M** Musculus à superiori maxilla in inferiorem insertus, ac buccas mouentium unus.
- N** Musculus sinister inferiori labro peculiaris, cuius sanè corpus minori negotio, quam multiplex ipsius fibrarum intersectio delineari potest, quod etià in musculo *M* notato usu uenit. Auris autem foramen citra *O* appositionem sese ostendit, uti etiam auris radici subditæ glandulae hunc characterem quodammodo exprimentes.
- O** Vix conspicua est eius musculi portio, qui inferiorem maxillam deorsum uellit.
- P** Hac sede os reponitur v imaginem referens.
- Q** Musculus à temporum ossis processu styli formam imitante enatus, ac ossi v simili insertus.
- R** Musculus sinister ab inferiori maxilla in os v referens, insertionem tentans, cuius coniunx nonnihil quoq; hic se spectandum præbet.
- S, T** Dexter & sinister ossis v imaginem exprimentis musculi, à pectoris ossis summo pronati.
- V, V** Musculus gracilis & longus, qui à superiori scapulae costa ossi v referenti implantatur.
- Θ** Musculus capitis motibus subseruiens, qui ab osse pectoris principium *X* notatum sumit, dein-
- X, Y.** de aliam partem *Y* indicatā, à clauiculae sede pectoris ossi proxima. Cæterum *Z* insertionem
- Z.** ipsius insinuat, qua uniuersum mamillarem capitis processum amplexatur.
- a** Clauicula magna ex parte anteriori ipsius sede excarnis.
- b** Musculi scapulam mouentium secundi insertio.
- c** Musculorum hic magnā obscuritatē pariūt uasa caput adeūtia, & nerui in brachium excurrentes.
- d** Musculus à clauicula in primam thoracis costam insertus, ac thoracem mouentium primus.
- Ξ** Musculi brachium attollentis anterior pars, posteriorem decima ostendit tabula adhuc in sua sede repositam, ac **Δ** præcipue insignitam. Proximè autem sequens tabula anteriorem hanc partem ab exortu liberam reflexamq;, ac **γ** notatam commonstrat. Porro in præsentī figura **e, f,** et **g.** **g** conspicuam hic musculi brachium attollentis partem, trianguli ritu describunt.
- h** Musculi brachium pectori adducentis insertio, quam in dextro brachio **Q & T** notauī, &
- Q, T, Δ.** ipsi musculo **Δ** quoque imposui, quo hi characteres ad præcedentis tabulae notas referantur, ad **KL, R.** quam quoq; **K, L & R** spectant.
- i** Pectoris os liberum ab inijs musculorum brachia pectori adducentium.
- 2, 3, 4** Secunda, tertia & quarta thoracis costæ, ad quas reliquæ seriatim subsequuntur, atq; in harum interuallis exteriores musculi intercostales sunt obuij. Lineæ autē in costis ductæ, atq; ad characterum sinistram consistentes, ossa costarum ab earundem cartilaginibus determinant, sunt enim illæ notæ cartilaginibus inscriptæ.
- k** Musculus scapulam mouentium primus. **l** Musculus thoracem mouentium secundus.
- m** In dextra axilla **m** latitat, musculus notans, quo brachium deorsum trahitur.
- n** Dexter lateris rectus abdominis musculus, hic altius quam oblique ascendentis musculi nervosa tenuitas conscendens.

- o Abdominis musculus oblique descendens, quem hic in posteriora ab abdomine reflexū finximus.
- Π Abdominis musculus oblique ascendens, ac totam, uti conspicias, sui lateris abdominis sedem amplectens, quem quodammodo circumscribunt o, n, p, q, & linea secundum inferiorem abdominis sedem ad ilium os, & coxendicis, & pubis ducta.
- p, q Portio obliquorum abdominis musculorum descendantium, quæ ad albam in abdomine apparentem lineam est relictæ. Cæterum q priuatim significat penis constructionem, qui ad pubis os, quæ primum flaccidus, deorsum denuo propēdet, dissectus est. Duo itaq; uelut insigniores circuli, duo ipsius sunt corpora, circulus autem sub illis consistens, meatus est urinæ seminiq; communis.
- r Vasa seminaria, quæ hic priuatim enarrare non proposui, quemadmodum etiam neq; testis musculus, cui ut à uasis distingueretur, s asscripsi. Verum hūc 22 figura Libri quinti & edocebit.
- t Musculus cubitum flectentiū anterior, cuius interioris principij carnosæ parti nullum adhibui characterem, quum is hic, uti neq; in sequēti tabula, adhuc auferri possit. Interuallum autē inter duo ipsius apparens principia, humeri seu brachij os existit.
- u Musculus cubitum extendens, cui ab humiliori scapulæ costâ principium præbetur.
- x, x Posterior cubitū flectentiū musculus. y Musculus superior radium in pronum ducentium.
- α Radiū in supinū agentium longior. β Musculus quatuor digitorū secūdos flectēs articulos.
- Σ Musculus ulnæ exporrectus, & brachiale flectens. γ ipsius caput. δ ipsius insertio.
- c Musculus alter brachiale flectens, hicq; deorsum dependens.
- ζ Musculus primum parui digiti internodium uersus exteriora flectens.
- η Hic musculus propendet, paruum digitum à reliquis in externum latus abducens.
- θ Transuersum ligamē in interna brachialis sede obuuium, tendinibusq; hāc repentibus obductum.
- i Musculus maior, primum pollicis os flectentium.
- κ Propendet hic musculus, cuius beneficio pollicem ab indice maximè remouemus.
- λ Latus summæ manus tendo unā cum ipsius tendine, à summis quatuor digitorū aciebus in dextra manu dependens. Præterea hic in utriusq; manus uola tendines occurrunt mucosis membranis induti, atq; ad digitos protensi.
- μ Secundus femur mouentium musculus. ν Primus femur mouentium musculus.
- ξ Ossis sacri ossis dextro lateri cōmissi sedes, à qua primum & sextum tibiā mouētes rescuimus.
- Ϟ Characterē & sedes insignitur maioris exteriorisq; femoris processus.
- ϙ Nonus tibiā mouentium musculus, cuius initium supra coxendicis articulum incipiens o notatur, & uerò tendinis ipsius principium, p sedes indicatur, qua præsentis musculi tendo subditis connascitur tendinibus.
- 1 Musculus femur mouentium septimus. τ Musculus femur mouentium sextus.
- υ In sinistro femore musculus υ insignitur, femur mouentium octauus.
- ϕ Quinti femoris motui seruientium. χ Secundus tibiā mouentium.
- ψ Octauus tibiā mouentium. ω Septimus tibiā mouentium musculus, in dextro femore insignitus, quod ibidem is sit conspectior.
- 2 Primus tibiā mouentium musculus. 3 Sextus tibiā mouentium. 4 Sextus pedem mouentium musculus, unā ut duo præcedentes, ab insertionē pendens. Cæterum in sinistro crure etiam obseruatur primi tibiā mouentium, & huius sexti pedem mouentium insertionis portio, huius quidem insertioni characterē 6, illius uerò 5 insignito.
- 5 Septimus pedem mouentium musculus.
- 8, 9 Excarnis tibiæ ossis pars, à cuius externo latere sextus pedem mouentium musculus ablatus est. Verum 9 priuatim interiorem notat malleolum.
- Υ Musculus quatuor pedis extendens digitos. 10 ipsius exortus insignitur. 11 uerò ipsius sedes, qua portionem suam emittit, quam noni pedem mouentis musculi loco numerabimus, & hic Ω notauimus. 12 Musculi Υ insigniti sedes, quatuor tendines, quibus quatuor digiti extenduntur, pullulans. Ω uti & iam paulò antè scripsi, musculus notatur inter pedis motores nonus, qui bicorni tendine insertionem 13 notatam tentat.
- 14 Musculus pollicem extendens. 15 Musculus pedem mouentium octauus.
- 16 Musculus pedem mouentium secundus. Reliquos autem in posteriori tibiæ sede non notabimus, quod eadem hic cum tribus tabulis præcedentibus sit ratio.

QVINTA
MVSCVLO-
RVM TABV-
LA.



- A** FORAMEN quo neruulus tertij paris neruorum cerebri, frontis musculus petit.
B Temporalis musculus. **C** Hic magna ossis iugalis portio execta est, ut temporalis cum
D. massetere, quem **D** insigniuimus, coitus in conspectum ueniret.
E Foramen quo surculus tertij paris neruorum cerebri, ad superius labrū, & alas nasi deducitur.
F Amplius musculus à superiori maxilla in inferiorem productus, ac buccarum motibus seruiens.
G Nerui utrinq; ad hunc characterem occurrentes, labro inferiori exporriguntur. Cæterum su-
 perior characteris sedes, fungosam labrorum substantiā insinuat ad utrunq; labrum conspicuā.
H, I Musculus inferiorem maxillam deorsum trahens. Singuli characteres singulos eius musculi uen-
 tres notant, in quorum medio excarnis musculi pars consistit.
K Portio musculi caput mouentis, ac à pectoris osse & clauicula, mamillari processui insertus.
L Os, imaginem referens. **M** Primus & secundus linguae musculi, ab osse hyoide pronati.
N Laryngis cartilago scutum referens, & iam narrandis musculis adhuc obiecta.
O Dexter duorum musculorum ab osse u referente, in cartilaginem scuto similem insertorum.
P Dexter musculorum, qui à pectoris osse scutum imitanti laryngis cartilagini inseruntur. Ad hu-
 ius musculi exterius latus, cōgeries uisitur soporariae arteriae, interioris uenae iugularis, & sex-
 ti cerebri neruorum paris.
Q Asperae arteriae anterior sedes.
R, S Musculus ossi u imaginem exprimenti proprius, & à scapulae superiori costa enatus. singuli
 characteres singulos ipsius indicant uentres. Pars autem in horum medio consistens, eius muscu-
 li pars est, tendinis substantiae non absimilis.
T Portio musculorū secundi paris caput mouentiū. **V** Tertius scapulā mouentiū musculus.
X Quoniā hic locus nihil aliud peculiariter, quā septima tabula in homine ostendisset, & quia Ga-
 leni sententiae, quū haec pingeremus, plus æquo fauimus, musculus hic ex cane delineatum cernis,
 quo homines prorsus destituuntur, & Galeno tertius thoracem mouentium habetur, sequenti ta-
 bula integer & notandus.
Y Dextri lateris clauiculam hic à pectoris osse auulsimus, adhuc summo humero connexam, & sibi
Z. adhuc musculus seruantem, qui thoracis motorum primus numerabitur, hicq; **Z** insignitur.
a Summus humerus, seu scapulae elatior processus. **b** Interior demissior ue scapulae processus.
c Ligamentū huius articuli peculiariū quartū ab interiori scapulae processu summū humerū petēs.
d Ligamentū teres ab apice interioris scapulae processus, in anteriore sedē externi capitis hume-
 ri insertū, ac huius articuli primum. **e** Aliud teres ligamentū, ex eminentissimo scapulae ace-
 tabuli sede, ad externum quoq; humeri caput procedēs, atq; huius articuli ligamentorū secundū.
f Hac sede duo ligamenta d & e insignita, suis lateribus uniūtur, & uelut transuersum efformāt
 ligamentū, transmittens caput externum musculi cubitum flectentiū anterioris, ac mox & notādi.
g Pectoris os, cui septem superiorum costarum cartilagine utrinq; connectuntur.
h Prima thoracis costa, reliquae dein etiā unā cū interuallis citra characterū opē sunt conspicuae.
Γ Musculus scapulam mouentium primus. **i** & **k** huius musculi principiū notant, quandā manus spē
i, k, l. ciem perinde, ac musculus ipsi succumbens, & **m** insignitus repræsentans. **l** tendinē præsents mu-
 sculi indicat. Porro **i, k** & **l** simul huius musculi trianguli speciem quodammodo ostendunt.
m Musculus qui à scapulae basi pronatus, octo superioribus thoracis costis inseritur.
Δ Dexter rectorū abdominis musculorū. **n** carneū recti abdominis musculi principiū triangulo nō
n, o. absimile. **o** principium eiusdē musculi nerueum, penē uniuersum efformans musculus. Toto in-
p, q. teruallo à **p** ad **q** pertinente, recti musculi internis suis lateribus inuicē contigunt. Tota autem
 sede supra **q**, aut supra umbilicū consistente, tanto magis musculi mutuò seiungūtur, quāto altius
 conscendūt. Cæterum **q** notabit etiā obliquorū abdominis musculorum neruosa tenuitatis, ad
r. transuersum abdominis musculū hac in parte cōnexū. **r** Haec linea carneā recti musculi partem
 finit, quae ultima ipsius insertionis in homine est portio, uti in **4** tab. ad characterē **n** est cernere.
s. Intercapedine igitur ab **r** ad **s**, hic notatur recti simiae abdominis musculi tendo seu membrana,
t. excarnis ue musculi pars. **t** autē indicat carneā musculi sedē primae costae & secundae thoracis
u, u, u. insertam. **u, u, u** Inscriptiones, seu neruea delineamenta, transuersim recto musculo impressa,
 quibus oblique ascendentis musculi neruosa exilitas pertinacissimè connascitur.

- x *Linea hæc portiunculam notat oblique ascendentis muscoli, qua is transuerso abdominis musculo inibi adeo ualide committitur, ut inter dissecandum, nisi relicto eiusmodi signo, à transuerso liberari nequeat.* y *Transuersus abdominis musculus.*
- α *Oblique ascendens abdominis musculus ab abdomine reflexus.*
- β *Vasorum seminalium portio. Cæterum tres illi quodammodo circuli ad rectorum musculorum radicem seu iuxta n, & o ac p conspici idem notat, quod in mox præcedente tabula, abscissi nimirum penis constructionem ac naturam.*
- γ *Reuersa est musculi brachium attollentis anterior pars.*
- δ *In sinistro brachio insertionis pars adhuc reliqua est, musculi brachium attollentis.*
- ε *Excarnis humeri pars, inter duo capita apparens musculi cubitum flectentium anterioris.*
- ζ *Cubitum flectentium musculus anterior.*
- η *Musculus cubiti extensionis autor, cuius principium ab inferiori scapulæ costa pronascitur.*
- θ, θ *Posterior musculus cubitum flectentium.*
- ι *Superior musculus eorum, qui radium in pronum agunt.*
- κ *Radium mouentium longissimus, cuius auxilio radius in supinum ducitur.*
- ο *Quatuor digitorum secundum os flectens musculus. λ ipsius principium sub musculo radio peculiariter, & notato, reconditum. μ musculi huius in quatuor carneas partes distributio, quæ postmodum in singulos tendines degenerant.*
- ν, ζ *Transuersum interioris brachialis sedis ligamentum, longa sectione diuisum, & utrinque in latus reflexum. Verum præterea ν musculum priorem primum pollicis os flectentium monstrat, ζ autem musculum, cuius ope primum parui digiti internodium extrorsum flectitur. Porro quod ad quatuor tendinum, secundum quatuor digitorum os flectentium seriem attinet, omnia sunt conspicua, quamuis interim indici, & paruo, huius indicationis gratia ο inscripserim.*
- ω *Nonnihil hic sese offert musculus, quatuor digitorum tertium flectens os.*
- φ *Portio musculi tertium pollicis internodium flectentis, qui in sinistro cubito est conspectior.*
- * *Musculus ulnæ exporrectus, quo brachiale flectitur.* s *Secundus femur mouentium musculus.*
- τ *Apparet hic obscure femoris caput coxendicis ossis sinum subiens, & ligamento obductum, sed τ in hoc præcipue adhibetur, ut ceruix, seu collum femoris hic indicaretur.*
- υ *Femoris magnus exterior ue processus.*
- φ *Femur mouentium septimus.* x *Femur mouentium sextus.*
- ψ *Femur mouentium octauus.* ω *Quintus femur mouentium musculus.*
- Λ *Septimus tibiam mouentium musculus. 2 ipsius amplum principium à radice magni femoris processus enatum. 3 hic in tendinem latum desinit cum octauo & noni musculorum tibiam mouentium*
- 2, 3. *tendinibus commixtum unitumque. 4 hæc linea illum in anteriori femoris sede terminat, ubi octauus musculus ipsi primum subijci incipit.* Ξ *Octauus tibiam mouentium musculus.*
- Π *Π octauum quoque tibiam mouentium musculum indicat, sed priuatim sinum ostendit, cui nonus tibiam mouentium musculus insidebat, qui hic propendens s insignitur. Maximam itaque sinus sedem octauus musculus constituit, uerum septimus eius tantam portionem efformat, quanta à linea 4 insignita ad umbram septimi musculi usque protenditur, ita sane, ut ab utrisque musculis sinus iste consurgat.*
- b *Hic propendet musculus tibiam mouentium secundus.*
- Σ *In hac tibia, tibiæ os anteriori sede prorsus excarne cernitur. Superest enim hic duntaxat ex*
- Φ. *omnibus musculis illi adnatis, musculus pedis pollicem extendens, & modo Φ insignitus, cuius tendini 7 inscriptum conspicias.* s *Septimus pedem mouentium musculus.*
7. *Octauus pedem mouentium.*
- Υ *Carnea moles in superiori pedis sede reposita, quæ in quatuor carneas partes digesta, quatuor educit tendines, & pollicem, & tres ipsi proximos digitos in latus externum mouet.*
- Ω *Hic prosternitur musculus quatuor extendens digitos, una cum ipsius portione, quam noni pedem mouentium musculi uice recensuimus, ac cui iam & inscriptum cernis. Musculis posteriore tibiæ sedem occupantibus nullos adhibui characteres, quod ipsorum eadem cum præcedentibus tabulis adhuc sit series & copia. Atque hac etiam occasione excarnes tibiæ ossis & fibulæ sedes, innotatas conspicias, quod scilicet ex prioribus tabulis iam pridem has didiceris.*

S E X T A
M Y S C U L O -
R V M T A -
B V L A .



SEXTAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

SEXTAE tabulae caput in posteriora reflexum est, & maxillam inferiorem in summo mento diuisam, & utrinque in latera deductam refert.

A Hic iugalis ossis portionem exsecui. Verum *A* praeterea insinuat, temporalis musculi in acutum inferioris maxillae processum insertionem.

B Acutus maxillae inferioris processus.

C Sinistra maxillae inferioris pars.

D Musculus in ore delitescens, qui internae inferioris maxillae sedi, ubi latissima est, inseritur.

E Gurgulio à palati fine propendens.

F Glandula sinistra amygdalae non absimilis, ac eminentissime laryngis sedi apposita.

G Lingua, verum superior characteris pars, laryngis operculo est contermina.

H Hac sede plures capitis & ceruicis motibus famulantes musculi confunduntur.

I Musculus inferiorem maxillam deorsum trahens, hic ab exortu pendet.

K Tertius hominis scapulam mouentium.

L Glandula sinistro laryngis radices lateri adnata.

M Aspera arteria.

N Haec congeries, est uasorum & neruorum lateribus asperae arteriae exporrectorum. quanquam & musculi dorsum mouentium primi aliqua ex parte se ostendant.

O Quoniam hanc pectoris colliq; sedem, illi similem delineare oportuisset, quam sequens ostendit tabula, non abs re fore duxi, ex cane hunc Galeni musculum exprimere, qui à transuersis uertebra-

O. rum ceruicis processibus originem *O* notatam ducens, ad quartam usque costam carnosus fertur,

P, Q. ubi *P* notatus, in membraneum cessat tendinem *Q* insignitum, & deorsum ad aliquot costas adhuc pertinentem.

R Musculus à scapulae basi principium ducens, thoracemq; mouentium secundus. Pectoris os citra characterum impositionem conspicuum est, quemadmodum & costae, & earundem interualla una cum exte-

S. rioribus musculis intercostalibus. Quo tamen melius singula expendas, significet *S* tertiae costae

T. os. *T* tertiae costae cartilaginem. *V* musculum exteriorem intercostalium, in tertiae & secundae

X. costarum interuallo repositum, cuius fibrae deorsum in priora feruntur. *X* uero denotabit exteriorem intercostalium musculum, inter secundae & tertiae costarum cartilagine conspicuum, cuius fibrae sursum in anteriora prorepunt.

a Arteria & uena, sub pectoris osse deorsum ad abdominis superiora propagatae.

Δ Transuersus abdominis musculus, quem costarum ductus seu fines, & ossis sacri ossis sinistro lateri commissi regio, abunde hic circumscribunt. Caeterum *b* sedem notat, qua oblique ascendentis musculi tendo, abdominis transuerso pertinacissime adnascitur, priusquam rectum conscendat.

c. *c* autem indicat asperitatem, quam musculorum oblique ductorum cum transuersis musculis connexus inibi molitur, uti recti musculi supra umbilici sedem, uersus pectoris os mutuò debiscunt.

d Foramen uasis seminarijs uirorum uiam praebens.

e Vena & arteria, in rectos abdominis musculos, conterminasq; sedes excurrentes.

f Hic sinistri lateris rectus abdominis musculus, à pubis osse dependet.

g Spina ossis ilium, carnosae partibus duorum obliquorum abdominis musculorum liberata.

h Scapulis & sinistro brachio mentem accommoda, ibidem namq; *h* superiorem notat scapulae angulum, cui musculus *K* insignitus inseritur, deinde & superiorem quoq; scapulae costam *h* eadem opera tibi indicare poterit.

k Summus humerus, seu scapulae elatior processus. *k* Musculus brachium mouentium quintus.

l Interior scapulae processus, anchorae imaginem referens.

o Musculus anterior cubitum flectentium, cuius exterius caput, quod à scapulae acetabuli supercilio nascitur, *m* notat, *n* uero indicat internum caput ab interiori scapulae processu enatum. Quo

tamen huius capitis nerueam partem à carnea exquisitiùs discernas, huius tabulae dextrum brachium spectabis, in quo *n* nerueam partem denotat, *o* autem carneam. At non haec duntaxat

p. tabula eas commonstrat partes, imò priores ad unum omnes. Caeterum *p* duorum capitum coitum

q. indicat, *q* uero tendinis, quem musculus hic educit, principium.

r, r Musculus posterior cubitum flectentium.

s Musculus cubiti extensionis autor, cuius principium ab humiliori scapulae costa enascitur.

Δ Musculus


- Λ** Musculus radium mouentium longissimus, cuius altissimam partē, quæ hic oculis subijci potest, **t, u.** **t** indicat. **u** autem præsentis musculi insertionē notat, quā in inferiorē radij appendicē molitur.
- x** Musculus superior duorum, qui radium in prouum ducunt.
- Ξ** Musculus tertium quatuor digitorum os flectens, & **α** quidem huius musculi caput insinuat. **β** autem sedem indicat, qua musculus in quatuor partes carneas discinditur, qui singulos postmodum porrigunt tendines. Porro qua ratione ad tertium usq; digitorum internodiū tendines huius musculi porrigantur, & incumbentis musculi tendines transeant, hic in utraq; manu est conspicuum.
- γ, δ.** Sit tamen doctrinæ gratia **γ** tendo tertium medij digiti os accedens, **δ** autem tendo, qui secundum os flectit. **ε** Musculus secundum quatuor digitorum flectens articulum.
- ζ, ζ** Hos characteres referre oportet ad quatuor musculos, quorum beneficio quatuor digiti adducuntur pollicis, atq; hi interno lateri tendinum tertium os flectentium exporriguntur.
- η, θ** Musculus tertium pollicis os flectens **η** notatur. **θ** autem ipsius tendinem proponit, inter musculos primum pollicis os flectentes, & eos qui secundum pollicis os flectunt, prorepentem.
- κ** Musculus maior primum pollicis os flectentium, hic ab insertionē dependet.
- λ** Musculus minor primū pollicis os flectens, qui sub maiori **κ** indicato recondebatur. Inter **λ** uerò & **κ**, primum pollicis os nudum ex carneq; apparet.
- μ** Musculus primum parui digiti os uersus exteriora flectens. Tuberculum uerò ante huius musculi initium apparens, ulnæ est sedes, qua ualidiorem ligamenti exporrigit portionem brachiale cubito colligantis.
- ν** Tertius femur mouentium musculus.
- ξ** Magnus femoris ossis processus.
- ο** Musculus femur mouentium septimus.
- ω** Musculus femur mouentium sextus.
- ς** Musculus femur mouentium octauus.
- ς** Quintus femur mouentium musculus.
- π** Octauus tibiā mouentium musculus, uniuersum femoris os quodammodo amplectens. **τ** insinuat amplum huius musculi principium, à radice magni femoris processus, & ipsius collo enatum. Deinde **π** priuatim indicat sinus illius portionem, quo nonus tibiā mouens musculus cōtinetur, atq; hic sinus in dextro crure est conspicuus, quemadmodū & carnosæ musculi partis terminus, **υ** qui instar semiglobi extuberans hic **υ** insignitur.
- φ** Dependet hic musculus tibiā mouentium septimus, cuius cavitās argumento est, qui octauum tibiā mouentium amplexetur musculum, & qui horum tendines unā coeant. Quod ut commodius expendere, in dextro genu septimus musculus adeò ab octauī musculi tendine dissectus est, ut & ***** molæ pars ibidem in conspectum ueniat ***** notata.
- χ, ψ** Hæc sedes ad undecimam musculorum tabulam potissimū refertur, quæ ostendit portionem quarti tibiā mouentis musculi ex femoris osse pronatam. atq; hic **χ** notat quarti musculi sedem ipsius insertioni proximam. **ψ** autem eam partem abscctam ostendit, cui coxendicis ossis appendix principium præbet.
- Σ** In sinistra tibiā totum externum tibiæ ossis latus conspicuum est. Id dico latus, quod ad externā sedem excarnis etiam ante sectionem partis habetur, quam & dextera tibiā totam oculis subijcit. Cæterum **Σ** priuatim notat ligamentū tibiæ, os & fibulam, quæ hæc inuicem dehiscunt, in **ω** tercedens. **ω** autem externum notat malleolum, & partem fibulæ excarnem.
- Φ** Musculus pedem mouentium septimus. **2** ipsius exortum indicat. **5** tendinis principium, quod ante **2, 5.** riori & posteriori parte, ac dein interiūs, quā fibulam spectat, carne adnutritur. **4** itaq; partē **4, 3.** notat anteriorem carneam, **3** uerò posteriorem.
- ψ** Octauus musculus pedem mouentium, magna sui portione sub septimo occultatus. **6** huius musculi tendo, ad posteriorem exterioris malleoli sedem reflexus.
- Ω** Musculosa moles, cuius beneficio pollex & tres ipsi proximi digiti in externū latus ducuntur.
- 7** Hic procumbit musculus pollicem extendens.
- 8** Musculus paruum digitum in exteriora abducens, hac sede obuius est.
- 9** Secundus musculus pedem mouentium
- In dextræ tibiæ posteriori sede nullas adhibui notas, quòd musculos hac sede delineatos, omnes quæ hæcenus præcesserunt, tabulæ ostenderint. Vnde si & hic pariter notas requires, opportune has à prima, secunda & tertia tabulis petes. Verū quia in sequenti tabula dependet, cuius **κ** pollex introrsum mouetur, huic in præsentī tabula **κ** inscripsi.

SEPTIMA
MUSCULO-
RVM TABV-
LA.



SEPTIMA musculorum tabula laxato fine, à quo inter pingendum pendeat, in posteriora tantum procidit, quantum uidendo septo transuerso sufficit. quod etiam in praesenti tabula ad sinistram ea forma appictum cernis, qua exectum, parietiq; suo lentore haerens nobis apparuit. Quo minus autem dextra scapula effractae alae ritu in deorsum decumberet, illam funiculo ita suspendimus, ut ipsius cauum in conspectu sit.

- A* Gurgulio indicatur à palati termino propendens, inferiori interim maxilla prorsus amota.
B Aliquot ceruicis uertebrae corpora. *C, D* Primum par dorsum mouentium.
E Stomachi seu gulae pars sub aspera latitans arteria, quam *F* notauimus. Caeterum uasa, quae
F. utrinq; ad huius latera habentur congeries est, quam soporales efficiunt arteriae cum internis iugularibus uenis, & sexto neruorum cerebri coniugio.
G Musculus alter secundi paris dorsum mouentium. *H* Scapulam mouentium tertius.
I Musculus brachium mouentium quintus.
I Musculus brachium mouentium sextus, cuius insertio *K* insignitur, reliquaq; ipsius forma ex scapulae imagine deprehenditur. quanquam si praesentis musculi triangularem figuram uolueris constitutuere, licebit *K, L* & *L* simul conferre.
L, L Musculus thoracem mouentium secundus. *M* Brachium agentium tertius.
N, N Musculus cubitum extendentium, cuius initium superiori *N* insignitum à scapula educitur.
O Portio tendinis musculi, brachium mouentium quarti. *P* Cubitum flectentium posterior.
Q Radium in prouum constituentium superior. *R, R* Anterior cubitum flectentium.
S Radius. *T* Vlna. *V* Ligamentum inter radii & vlna, quae inuicem dehiscunt intercedens.
X Radium in prouum mouentium inferior musculus.
Y, Y A dextro radio (qui cum uniuersa extrema manu magis quam sinistra attollitur) dependet, longior radium in supinum ducentium. *a* Minor primum pollicis os flectentium.
1, 2, 3 Tribus his characteribus musculi notantur secundum pollicis os flectentes.
b Dependet musculus tertium pollicis internodium flectens. *c* Musculus tertij quatuor digitorum ossis flexus autor, quem sedulo intuebere, quod illius tendinibus musculi attendantur,
d. quatuor digitos pollicis adducentes, quorum is qui indicem mouet, d insignitur, perinde ac reliqui tres ab insertione haerens. Quinetiam tendinum secundum quatuor digitorum os flectentis musculi
e. portiones adhuc seruantur. ac portioni quidem indici propriae e inscripsi, tendini autem tertium
f. indicis os flectenti f. Caeterum in dextra manu dictorum musculorum conspiciuntur insertiones.
g. h. ac g in indice insertionem indicat musculi indicis pollicis adducetis. h insertionem musculi secundum
i. os flectentis. i insertionem eius, qui tertij ossis flexioni praeficitur. Praesentis tabulae thorax, quod ad intercostales spectat musculos, praecedentis tabulae thoraci respondet, unde etiam alijs characteribus non uenit oblitterandus.
Δ Septum transuersum, cuius membraneus circulus in septo extra corpus expanso circumscribitur
kl, m, n. k, l, m, n quod uero exterius hos characteres ambit, atq; foris (ut ita dicam) existit, fibrisque in
o, p. terstinguitur, carneam septi partem esse putato. *o, p* Duo ligamenta, seu tendines septi, uertebrae
q. brarum in lumbis consistentium corporibus inserti. *q* Septi scissura, qua septum uertebrae
 incumbit corporibus, ac magnam arteriam, uenamq; coniugis experte transmittit, aut illis cedit,
 quarum orificia q in corpore huius tabulae positum indicat, quemadmodum & arteriae ramos in
r. septum excurrentes. *r* Foramen stomacho uiam praebens, qui etiam r in corpore insignitur.
s. s Foramen uenae cauae caudici paratum, qui in corpore s notatus conspicitur.
t Musculus femur mouentium sextus. *u* Musculus dorsum mouentium nonus.
x Femur mouentium septimus. *y* Sacrum os hic insignitur, neruiq; aliquot ab ipsius medulla
 educti, obuij sunt. *α* Femur mouentium octauus. *β* Quintus femur mouentium.
γ Tibiam mouentium octauus. *e* Musculus pollicem à caeteris digitis amouens.
A Dependet & hic quoq; ab insertionem musculosa moles, pollicem & tres ipsi proximos digitos in
 externum latus ducens. Quae uero in praesentis tabulae tibijs occurrunt, illis respondent, quae
 prioribus tabulis fuere obuia.

OCTAVA
MUSCULO-
RVM TABVLA.

CHARACTERVM OCTAVAE MVSCV-

LORVM TABVLAE INDEX.

HÆC tabularum anteriorem corporis faciem exprimentium postrema est, musculos adhuc in anteriori hac sede obuios, ex sectionisq; serie reliquos proponens. *V*t uero interiores intercostalium ostenderet musculos, & eos qui in interna thoracis sede pectoris ossis attenduntur lateribus, os illud unà cum costarum cartilaginibus exectum, ad dextri cruris latus euersum, atq; sub dextræ manus indice propositum cernis.

- A, B* Musculi collum, superiorem uel dorsi partem flectentes, dorsumq; mouentium primū coniugium.
C Musculus à prima enatus costā, ac secundi dorsum mouentium paris alter.
D, D Exteriores musculi intercostales, in ossium interuallis conspicui.
E, E Interiores musculi intercostales, in ossium interuallis obuij.
F, F Musculus octo thoracis costis insertus, ipsiusq; motorum secundus.
G *V*trinq; scapula modò sectionis serie, nuda excarnisq; est, ac sua sede dimota.
H Musculus dependet, brachium antrorsum circumuertens, scapulæq; cauum occupans.
I Musculus superiori scapulæ basis angulo insertus, ipsamq; agentium tertius.
I Posterior cubitum flectentium, cuius principij elatior exteriorq; pars *L* insignitur, demissior
L, M. uero interiorq; pars *M.* Insertio autem præsentis musculi *N* indicatur.
O Radius. *P* *V*lna. *Q* Tendinis musculi pars cubitum flectentium anterioris.
R Musculus ab insertione dependet, radium in pronum mouentium superior.
S Musculus ab ulna dependet, radium in pronum ducentium inferior.
T, V Sede *T* insignita ligamētū, brachiale ad cubitū nectēs, crassius apparet, ut etiā sede *V* notata.
X Musculi ab insertione propendent, secundum pollicis internodium flectentes.
Δ In postbrachiali dilucidius exprimi nequierunt octo muscoli, quatuor digitorum primos articu-
Y. los flectentes. Cæterum dextra manus in latus picta est, ut musculum *Y* insignitum offerret, qui primum indicis os introrsum flectit.
Θ Sextus femur mouentium musculus, cuius initium è uertebra procedens corporibus *a* insigni-
a, b. tur. *b* uero ipsius sedes, ubi tendinem educere incipit.
Λ Septimus femur mouentium musculus. *Ξ* Musculus dorsum mouentium nonus.
Π Sacrum os, ex cuius anterioribus foraminibus nerui prosilire hic uidentur.
Φ Quintus femur mouentium musculus. *V*erum *Φ* priuatim huius musculi partem notat postero-
c. rem, *c* autem anteriorem.
e Pubis ossis anterior sedes, hoc latere ex sectionis serie, carne denudata.
Υ Musculus femur mouentium nonus, anteriorem pubis ossis foraminis sedem occupans.
Ω In sinistro genu tendines, septimi tibiam mouentium musculi *g* insigniti, & octauū *h* indicati, &
g, h, i. noni *i* notati, à genu reflexi sunt, ac patellam ipsis innatam, ac *k* insignitam oculis subiiciunt.
k, l. In dextro autem crure octauus tibiam mouentium musculus, solus ab insertione ac integer depen-
det, *l* notatus, & patellam sibi innatam seruans, cui *k* inscripsimus.
m Tibiæ ossis anterior sedes, omni prorsus musculo libera.
n Fibulæ etiam anterior sedes, ex dissectionis serie musculis omnibus denudata.
o Ligamentum notatur inter tibiæ os & fibulam inibi repositum, ubi hæc ossa inuicem dehiscunt.
*** Qui hic spectantur muscoli, illi sunt, quos sexta musculorum tabula expressit literis *Φ* & *Υ*. se-
ptimus nimirū & octauus pedē mouentiū. In superiori pedis sede modò nulli adhuc reliqui
sunt muscoli, ossaq; duntaxat ligamētis obducta, in conspectū ueniunt. Cæterum muscoli, qui ha-
p, q. ctenus in tibiæ posteriori sede fuere obuij, sectionis serie auferri incipiunt. ac *p, q* notant primū
s, t. ac secundum pedem mouentiū, à quarto etusdem motus autore musculo, *t* insignito, ad caracte-
rem *s* propendentes, quo priuatim notatur tendo tertij pedem mouentis musculi.
u Musculi pars hic occurrit, quatuor digitorum tertium articulum flectentis.
x Hic obscure se offert pedem mouentium quintus.
α Pectoris ossis posterior, seu cor spectans sedes.
1, 2, 3, 4. *5, 6, 7* His characteribus septem uerarū costarū indicantur cartilagines. Reliquæ autem qua-
tuor cartilagines, octauæ, nonæ, decimæ & undecimæ costarum cartilagines sunt.
β Musculus humanum thoracem mouentium sextus. *7* *R* NONA

NONA
MUSCV.
LORVM TA-
BVLA.



NONAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

P R A E S E N S tabula omnium posteriorem corporis faciem exprimentiu, prima habebitur, hic ordine nona. Si tamen anterioribus seriatim ac uicissim posteriores subsequi uelles, posset haec omnium esse aut tertia, aut quarta. nullum enim abscctum habet musculum, praeter eos, quos carnea membrana constituit, tertiaq; tabula obuij sunt. Praeterea transuersa in cubiti externa sede, iuxta brachiale reposita ligamenta hic dissectuimus, quod prima & secunda tabulis abunde conspicua fuerint, hancq; tabulam ad disciplinam prorsus parauerimus.

A Temporalis musculus.

B Os iugale.

C Masseter. Auris uero foramen cum ipsi subiectis glandulis, citra characterum subsidium est obuium.

D Musculus caput mouentium, a pectoris osse, & clauicula enatus, in mamillarem capitis processum inseritur.

I, Δ Musculus secundo loco inter scapulam mouentes recensendus. Atq; huius principium ab occi-

E, F. pitij osse pronatum, **E** ac **F** insignitur. **E** uero usq; ad **G** musculi principium ab occipite, ad

G. octauae usq; thoracis uertebrae spinam, a mediarum uertebrae apicibus quodammodo enatu.

H, I. **H, I** insertio, quam musculus in scapulae spinam, & summum humerum, latiusculamq; clauicula sedem molitur. * hac sede praesens musculus, quasi membraneum semicirculum obtinet, seu car-

K. nosae ipsius fibrae, in semicirculi cessant circumferentiam. **K** hac parte ceruix collumue, thoracis elatissimae parti committitur. Lineae autem laterae ue musculum circumscribentia in hunc modum colliguntur. Ab **E** ad **F** prima protenditur, ad occiput transuersim ducta. Quod autem huius extremum **F** notatum, non tantum ab auris radice distare hic uideatur, quantum **F** remouetur ab **E** pictura, in causa est oculum fugiens, quod & sinistrum brachium in anteriora porrectum liquido demonstrat, quod forte uisus ignarus, plus aequo breuius esse arbitrabitur. Porro secunda linea praesentis musculi ab **E** per **K** ad **G** metitur. Tertia autem ab **F** ad **H**. Quarta ab **H** ad **G**. Atq; his lineis musculus terminatur. Insertionis autem linea ab **I** ad **K** pertinens, nulla prorsus separationis nota existit.

L Musculus brachium attollens, eiusq; motorum secundus.

M Musculus gibbam scapulae sedem occupans, brachiumq; mouentium quintus.

N Musculus ab humiliori scapulae costa pronatus, & brachij motus opificum tertius.

O Musculus brachium agentium quartus, sequenti tabula Θ insigniendus.

P In praesentis tabulae dextro latere **P**, indicat portionem abdominis musculi, quem oblique descendentem uocamus.

Q Nonnihil in dextro brachio occurrit, brachium flectentium musculus.

R Posterior cubitum flectentium musculus.

S Musculus cubiti extensionis autorum, cuius principium ab humeri pendet ceruice.

T Musculus cubitum extendentium, cuius principium ab humiliori scapulae costa pronascitur.

V Vlnae sedes triangula, nullis obiecta musculis, excarnisue, ac praecipue insertionem excipiens neruosa cubitum extendentium musculorum insertionis.

X Musculus radium in supinum agentium, qui in inferiorem radij appendicem inseritur.

Y Musculus bicorni tendine brachiale extendens.

Z Musculum **Z** insignitum, autorem extensionis indicis, medij ac anularis recensebimus, cuius initium **a** indicatur. Sedes uero, qua carneus esse desinit, **b** insignitur.

Musculus qui nobis extensionis autor parui digiti recensebitur. Commixtionem tendinum musculi **Z** insigniti, ac musculi Θ indicati, quae ad digitorum fit radicem, ita hic delineauimus, quemadmodum crebrius nobis occurrit.

Λ Musculus brachiale extendentium, cui principium offertur ab humero **c** insignitum. Insertionem uero **d** indicat am, in postbrachialis os, paruum sustinens digitum molitur.

Ξ In utroq; cubito **Ξ** insignitur musculus, brachiale flectens, octauoq; brachialis ossi insertus, ac in nulla musculorum tabula aequè atq; hic conspicuus. Quemadmodum & musculi latum manus

R 2 tendinem

- q. tendinem producentis initium, hic ad characterem q; est obuium, unà cum exortu musculi brachiale flectentis, qui postbrachiali insertus, Δ in tertia musculorum tabula ornatur.
- e Musculi hac oblique prorepentes, illi sunt, quorum alter unum tendinem brachialis ossi, pollicem suffulcienti inserit, alter uero unum tendinem primo pollicis ossi offert, alium secundo & tertio pollicis ossi inferens.
- f Musculus tribus pollicis ossibus externa sede insertus, & pollicem uersus indicem euertens.
- g Musculus pollicem indici proximè adducens.
- h Musculus parui digiti à reliquis abductionis autor.
- .II Primus femur mouentium musculus, i, k, l, m & n circumscribitur. Quandoquidem i usq; ad k, i, k, l, m, n. sui principij partem notat, quæ ex ossis ilium spina enascitur. k autem ad l, principij partem indicat, ab ossis coccyge, infimaq; sacri ossis sede pendentem, ubi etià sinister musculus dextro contiguus est. m indicat elatiorem ipsius insertionis partem, n autem insertionis infimā notat partem, quæ quia inter musculos tibiam mouentes hic penitiùs se insinuat, reconditq; omni ex parte non est conspicua.
- o Secundus femur mouentium musculus, magna ex parte primo obiectus.
- p Sextus tibiam mouentium musculus, in latum illum degenerans tendinem, qui femur amplexantibus musculis obuoluitur, attamen non ad eam pertingit crassitiem, ut subditos ipsi musculos obscurare possit.
- q Musculi, quem p notauit, carnosæ partis terminus.
- r Septimus tibiam mouentium musculus, membraneo tendine sexti tibiam mouentium musculi obiectus.
- s Quartus tibiam mouentium musculus, septimi posteriori attensus sedi.
- t Tertius tibiam mouentium musculus, in utroq; crure (quemadmodum & subsequentes aliquot) notatus.
- u Musculus, quem quinti tibiam mouentium loco habemus.
- x Apparet & hic quoq; portio musculi, femur mouentium quinti.
- y Musculus secundus tibiam mouentium.
- æ Musculus tibiam mouentium primus.
- β Octauus tibiam mouentium musculus.
- γ Nonus tibiam mouentium musculus.
- δ In hoc sinu tibiam accedens arteria, unà cum maxima cruris uena, & neruo quoq; totius corporis crassissimo uehantur.
- ε Musculus primus pedem mouentium.
- ζ Secundus pedem mouentium musculus.
- η Septimus pedem mouentium musculus.
- θ Octauus pedem mouentium musculus.
- ι Excarnis fibulae pars, ipseque adeo exterior malleolus.
- κ Aliqua ex parte portiuncula hic occurrit, musculi pedem mouentium noni.
- λ Musculus paruum digitum à cæteris abducens.
- μ In sinistra sura tendo, tertij partem mouentium musculi notatur.
- ν Interior malleolus.

DECIMA
MVSCV,
LORVM TA-
BVLA.



DECIMAE MUSCULORVM TABV-

LAE CHARACTERVM INDEX.

H *A* *E* *C* omnium tabularum decima, posteriorem uero faciem exprimentium secunda, sectionis serie quartam tabulam subsequi posset. In hac itaq; iam praecedentis tabulae muscoli aliquot adempti dependent, multiq; in illa non obuij, hic sese comonstrant. Atq; inter reliquos prorsus ablati est, quem nona tabula Γ & Δ insigniuimus, quod uidelicet nusquam apte formam ipsius, dependens ostendere potuisset.

- A* Dexter primi paris caput mouentium musculus.
B, B Secundi paris caput mouentium dexter.
C Scapulam mouentium tertius musculus.
D Clauicula.
E Musculus humani thoracis motorum tertius, sequenti tabula *F* notandus.
\Gamma Musculus scapulam mouentium quartus, cuius quatuor latera circumscribuntur *G, H, I, K, G, I, H, K*.
L Musculus brachium mouentium quintus.
M Scapulae spina, ac summus humerus.
 Δ Musculus brachium mouentium secundus, quem in posteriori corporis sede prompte circumscribere poteris, si *P* musculi insertionem esse cognoueris. *P* namq; ac *N* & *O*, trianguli modo, dictam *N, O*. musculi partem terminant, anteriori interim parte Ξ , in quarta tabula musculorum insignita.
Q Brachium mouentium sextus musculus.
R Musculus brachium mouentium tertius.
 Θ Hac sede aliquot dorsum mouentes muscoli exporriguntur, una cum humanum thoracem mouentium quarto.
 \odot Hunc musculum, secunda tabula Γ insignitum proponebat: est autem is, cuius beneficio brachium deorsum, uersus dorsum uellitur, idq; mouentium quartus. *S* & *T*, musculi huius principij indicant longitudinem, *V* partem ipsius insertioni proximam, quae hic ostendi nequit, uerum in sequenti tabula *O* insignita, utcunq; fuit obuia. *X* autem musculi latus ea sede indicat, ubi ab illius osse non amplius enascitur. Circumscribes uero praesentis musculi latera ab *S* ad *T*, dein a *T* per *X* ad *V*, insuper ab *S* ad *V*. Ceterum *Y* notabit inferiorem scapulae basis angulum hic extuberantem, & tertio musculi latere interiectum.
 Σ Oblique descendens abdominis musculi portio.
a Musculus ab humiliori scapulae costa principium ducens, & cubiti extensionis opifex.
b Musculus a ceruice capitis humeri iuxta scapulam originem ducens, ac cubiti extensionis autor.
c Portio anterioris cubitum flectentium musculi.
d Portio posterioris cubitum flectentium musculi.
e Musculus radium in supinum agentium longissimus.
f Musculus bicorni tendine brachiale extendens.
g Hac sede ligamentum conspicitur membraneum, superiorem radij partem humero colligans.
h, h Hac sede ulna, carne omni, musculis ue libera cernitur.
i Musculus brachiale flectentium, qui octauo brachialis ossi inseritur.
 Λ, Ξ, Π Tres isti characteres, tria notant musculorum principia ab ulna pronata. Primum Λ insignitum, illud est, quod radio ante medium illius longitudinis insertum, musculus habetur, radium in supinum agentium breuior. Secundum Ξ indicatum, illud est, quod in duas portiones, *k* & *l* notatas dirimitur. *k* enim eam significat portionem, quae tendinem brachialis ossi, pollicem proxime sustinenti offert. *l* uero inferiorem insinuat portionem, quae dein bipartita, unam, quae *m* inscribitur, primo pollicis ossi inserit: alteram *n* indicatam, in secundum & tertium pollicis internodium implantat. Porro tertium principium, Π insignitum, illud demum est, quod in duas quoq; *o, p*. partes, *o* & *p* indicatas discinditur, quarum superior, *o* notata, tribus pollicis ossibus inseritur. Inferior uero *p* indicata, indicem, ac medium a pollice abducere creditur.
q Propeudet ab insertione musculus, brachiale unico tendine extendens. Dein praecipuus extensionis parui digiti autor, *r* insignitus, quemadmodum & musculus indicem medium, ac anularem potissimum

- f.* potissimum extendens, ac *f* indicatus.
t Musculus pollicem indici proximè adducens.
Σ Secundus femur mouentium musculus, cuius exortū, semicirculi formæ quodammodo responden-
u, x. tem, *u* et *x* notant, quanquā *u* in anteriora magis adhuc deberet exporrigi, si præsens tabula in
y. latus magis uerteretur. Cæterum *y* huius musculi indicat insertionem, ut etiam *u*, *x*, & *y*
 uniuersum musculus circumscribunt.
α Magnus exteriorq; femoris processus.
β Quartus femur mouentium musculus.
γ Ligamentum à transuerso quinti ossis sacri ossis processu, in acutum coxendicis ossis processum
 pertinens.
δ Ligamentum à dicta nuper sacri ossis sede, in posteriorem elatioremq; appendicis ossis coxen-
 dicis sedem insertum.
ε Musculus femur mouentium decimus, qui hæc à posteriori pubis ossis sede reflexus, alium uelut
 musculus supra infraq; ipsi attensum commonstrat.
ζ Quoniam hæc sedes sequenti tabula perinde, atq; hic erit conspicua, neruum cæteris omnibus
 corporis neruis summè animaduertendum, ab hac tabula nō resecuimus. est aut is, quem quartum
 femur petentiū numerabimus, eū secunda tertiaq; figuris, Capiti undecimo Libri quarti præ-
 ponendis, caractere 71 indicaturi. Præsens etenim neruus, cuius ductum seriemq; tantope-
 re expendendā putauerim, is profectò est, secundum quem ex caluariæ amplitudine, in dorsi uer-
 tebrarum foramen, quod dorsali medullæ transmittendæ paratur, humor in pedes confluit, quem
 nonnulli haud infrequenter instar tepentis, alij instar frigide aquæ demanare, ac in crus profluere
 sentiunt. Arbitror autem huius nerui distributionē eo animaduertendā accuratiùs, quo sæpius
 hac mea ætate affectus innumeri, sese mihi ex humorū ad neruū hunc defluxu obtulerint. Quine-
u. tiam eundē in poplite *u* notatū cernis, quanq; *u* priuatim huius nerui grandiorē indicet portionē,
 quæ & si in alias quamplurimas soboles disseminetur, præcipua tamen ipsius parte pedis, inferio-
θ. ra inter calcem, & interiorem malleolum petit. *θ* uerò præsentis nerui in poplite bipartiti, mi-
 norem insinuat rram, maxima sui parte in musculos digestum, tibiæ latus, & anteriorem eius-
 dem sedē occupantes, qui me Hercule nō minus quoq; accuratè, quàm quiuis corporis neruus est
 obseruandus, si non ob aliud, saltem propter urentia medicamina, quæ subinde hic ægris adhiben-
 tur. Præter hoc enim, quòd appositionis sedem adamussim Medici hinc cognoscent, etiā expen-
 dere erit iucundissimum, qui ulcus eorum medicamentorum ui inustum, humorem secundum hunc
 neruum decurrentem expurget. Nam quod inuritur ulcus, huic nerui ramo, *θ* indicato uicinum
 est, & quum paulò inferiùs sit, quàm superior fibulæ consistat appendix, neruus contingi nequit.
 Atq; eiusmodi sanè pleraq; crebro sermoni adijcerem, nisi ridiculum arbitrarer, reliquas medi-
 cinæ partes huic Anatomicæ misceri, aut ego etiā eiusmodi aliqua non essem priuatim suo tem-
 pore, uti iam cœpi, exaraturus. Quòd autē hic quædam interiecerim, nerui illius occasione factū
 est, idq; potissimum, quum locus uacuius ante undecimam tabulam seruandus esset.
κ, κ In utroque femore *κ* occurrit, musculus notans femur mouentium primum, qui in sinistro crure
 integer à sua sede reflexus est, insertionē duntaxat corpori commissus, quæ in dextro crure, so-
 lum inibi reliqua est, ubi ualidissima spectatur, ubi autem leniter, membranæq; tantum ritu inse-
λ rebatur, *λ* ascriptum cernis.
μ Septimus tibiæ mouentium musculus, non amplius membraneo sexti musculi tendine obiectus.
Φ Tertius tibiæ mouentium musculus, cuius caput *y* insignitur, sedes uerò tendinem primum edu-
v, z. cens *z*. Insertionem autem tertia musculorum tabula proponebat, caractere 3 insignitam.
Υ Quartus tibiæ mouentium musculus.
ω, ω Quintus tibiæ mouentium.
ρ Quinti femur mouentis musculi portio.
ς Secundus tibiæ mouentium.
τ Portio octauæ tibiæ mouentis musculi, resecto iam interim primo tibiæ mouenti, qui aliàs hic
 in orbe occurreret. Quod uerò ad musculos in tibia pedeq; repositos attinet, omnia præcedenti
 conueniunt tabulæ, ut & duodecimæ, quam inibi caracteribus primum occupabimus.

VNDECIMA
MUSCULO.
RVM TA.
BVLA.



VNDECIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

- A, A* SINISTER primi caput mouentium paris musculus.
- B, B* Secundum par musculorū caput mouentium, in sinistro tantum latere characteribus insignitum.
- * Musculus hic obscure occurrit, cuius beneficio inferiorem maxillam deorsum agimus.
- C* Musculus scapulam mouentium tertius.
- D* Clauicula.
- E* Pendet hic musculus, à scapula ossi *v* referenti insertus.
- F* Humanum thoracem mouentium tertius.
- G* Brachium mouentium quintus.
- I* Musculus scapulae gibbum sub illius spina occupans, ac brachium mouentium sextus, cuius initium
- H, I.* ab *H* ad *I* metitur, insertionis uero sedes *K* indicatur, atq; ita totus trianguli modo *H, I,*
- K.* *K* circumscribitur.
- L* Musculus ab humiliori scapulae costa initium ducens, brachiumq; mouentium tertius.
- M* Hic musculus brachium mouentium secundus, ab exortu liberatus, antrorsum tota parte reflectitur, quam proximè præcedens tabula, *O, N* & *P* circumscribebant. Atq; ita interna musculi sedes, qua humeri articulo incumbit, in conspectum uenit, & trianguli uertex etiam quodammodo proponitur, ad cuius similitudinem huius musculi initium describebant. *N* enim ea musculi pars est, quæ basi scapulae fuit proxima, *O* autem illa, cuius initium à summi humeri cum clauicula articulo pedit. Dein si *D* eam musculi partem esse finxeris, cui clauicula initium largitur, promptè assequeris musculi suo exortu liberi principium insigniter obtusum angulū referre, uti figura modò inserta comprobatur, qua interna musculi sedes exprimitur, articulo maximè contermina. Atq; hic *A, B, C* musculi indicant principium, ab *A* quidem & *B* principij portionem à summo humero, & scapulae spina pronatam, à *B* uero ad *C* reliquā principij partem, quæ clauiculae debetur. Postremò *D* musculi insertionis sedes insignitur. Quod autem ad trianguli obtusum attinet uerticem, nulli non obuium est *B* humilius poni, quàm *A* & *C*, quibus characteribus triangulum terminari promptè animaduertis.
- P* Dictus nuper musculus ab omnibus, unde principium ducit, sedibus liberatus, ac ab insertionem duntaxat in dextro brachio pendens, pulchrè ostendit hanc transuersim in humerum fieri.
- Q* Humanum thoracem mouentium quartus.
- R* Musculus dorsum mouentium undecimus.
- S* Dorsum mouentium decimusquintus, seu octauum dorsum mouentium paris alter.
- T, T,* *V* Characteribus *T, T* duas costas earum, quæ iam sectionis serie deteguntur, insigniuimus, *V* uero earundem costarū interuallū, ut intercostalium hic musculorū exterior obseruaretur.
- X* Musculus thoracem mouentium secundus.
- Δ* Humanum thoracem mouentium quintus.
- a, b* Obscurum impenseq; membraneum musculi obliquè ascendentis abdominis initium, à spinarum apicibus inter *a* ac *b* pronatum.
- c* Musculus ab insertionem hic dependet, brachium mouentium quartus.
- Θ* Musculus cubitum extendens, cuius initium *d* insignitū, à ceruice capitis humeri educitur, quod
- d, e.* scapulae articulatur. *e* autem sedem indicat, qua præsens musculus ab altero cubitum extendentium, mox *f* indicando, non amplius distinguere nequit.
- f* Cubitum extendentium musculus, ab humiliori scapulae costa pronatus, ac cum musculo *Θ* insignito coiens.
- g* Musculus cubitum flectentium posterior.
- h, h* Longior musculus radium in supinum ducentium.
- Λ* Musculus bicorni tendine brachiale extendens, cuius initium *i* insignitur. sedes uero, qua tendinem educit, *k*, tendinum autem ipsius insertio, *l*.
- m* Musculus radium in supinum ducentium breuior.
- n* Radius.
- o* *V*lna.



- o Ulna. Atq; in horum ossium medio ligamentum occurrit, tota sede illa ossa intercedens committensq; qua inuicem debiscunt.
- Ξ Secundum principium trium principiorum, quæ ab ulna originem seriatim sumunt. Ac p qui p, q. dem eius principij pars est, quæ tendinem brachiali offert. q autem tendo, primo pollicis ossi insertus. r uero is tendo, qui secundo & tertio pollicis inseritur ossibus.
- ƒ Musculus pollicem indici proxime admouens.
- Π Tertium principium eorū, quæ ab ulna pronascuntur, hic quoq; ab insertione pendens. Ac t qui t, u. dem notat eius portionem, quæ indici ac medio tribuitur, u uero eam, quæ pollicis est peculiaris.
- Σ Tertius femur mouentium musculus, cuius initium x, y, x circumscribitur. Quod uero ad horū x, y, z. characterum latera, superiusq; spectatur, ilium ossis dorsum est, primo secundoq; femur mouentibus musculis liberum. Cæterum æ tertij illius musculi insertionem proponit.
- Φ Quartus femur mouentium musculus, à tribus humilioribus sacri ossis ossibus initium ducens, & β. illic primum tendinem educens, ubi β conspicitur.
- γ Magnus femoris processus.
- δ Secundus femur mouens musculus.
- ε Septimus tibiam mouentium musculus. Quid uero ζ indicetur, ad characterem Ω paulò post ζ commemoraturus sum.
- η Ligamentum ab osse sacro, in coxendicis ossis acutum pertinens processum.
- θ Musculus decimus femur mouentium, hæc ab interiori pubis ossis sede reflexus, ac ueluti inter i, κ. duos musculos, & κ insignitos prorepens.
- λ Caput tertij tibiam mouentium musculi, quod primum eorum censetur, quæ à coxendicis ossis appendice pronascuntur.
- μ Caput quarti tibiam mouentium, quod quatuor ut minimum capitum à coxendicis ossis appendice pronatorum secundum numeramus.
- ν Musculus, quem quinti tibiam mouentium loco habemus, cuius initium ν insignitur, quod tertium eorum capitum habetur, hinc à coxendicis osse eductorum. ζ uero præsentis musculi ostendit finem, cui tertius tibiam mouentium alioquin insidet. o hic quintus musculus, in tendinem desinit, anteriori tibiæ ossis sedi implantandum.
- Ω Subsequentibus tabula musculum explicabo, quem femur mouentium quintum recensemus, characteribus Ξ, Σ & Π inibi indicandum. In præsentī autem idem musculus, characteribus & ac &, tum ζ ac Ω insignitur, singulisq; peculiaris musculi pars indicatur. Vtrumque enim &, posteriorem notat musculi partem, ζ uero & Ω anteriorem. Cæterum ζ priuatim indicat eius anterioris partis anteriorem portionem. Ω autem posteriorem significat portionem anterioris partis.
- ⦶ Quartus tibiam mouentium musculus hic ab ipsius parte, quam femoris os educit, ac ρ insignitur, pendet.
- ς Musculus tibiam mouentium tertius, ab insertione pendens.
- τ Musculi tibiam mouentium octauī portio. Tibiæ autem nullum adhibui characterem, quod sequenti tabula ijdem, qui hic modò proponantur musculi, illic characteribus ex sectionis serie occupandi.

DVODECI-
MA MVSCV.
LORVM TA.
BVLA.



DVODECIMAE MUSCULORVM TABVLAE

CHARACTERVM INDEX.

- Γ** SINISTER primi caput mouentiū musculorū paris musculus, cuius principiū *A* notat, *AB, C.* Buerō & *C* insertionem, quam in occipitis os molitur. *D* autem sedem indicat, qua dexter musculus à sinistro primum abscedit. Postremò *E* insinuat internū insertionis dextri musculi lateris. Quare si illum musculus in trianguli formā agere uisum fuerit, illum circumscribes lineis, *AB, AC, BC.* Quinetiam si interuallum inter dextrum musculus & sinistrum consistens, quoque trianguli modo spectare uolueris, circumscribes id, à *B* ad *E*, dein à *B* ad *D*, & ab *E* ad *D*.
- F, F** Sinistri lateris musculus secundi paris caput mouentium.
- G** Scapulam mouentium tertius. **H, H** Brachium mouentium quintus.
- I** Summus humerus à connatis ipsi musculis liber. Caterum neque costas, neque earundem interualla characteribus insigniimus, quòd hic eadem, ut in præcedenti tabula, ad *T, T, V* sit ratio.
- Δ** Humani thoracis motorum quartus, cuius initium *K* insignitur, *L* uerò sedes, qua primum à longissimo dorsi mouentiū musculorū *N* mox notādo, nō ampliùs pertinaciter (quemadmodū in *Femur* à *K* ad *L* usque) adnascitur. Tendines autem præsentis musculi aliquot, *M, M* indicantur.
- N** Dorsum mouentium undecimus. **O** Dorsum mouentium decimus quintus.
- P** Scapulæ gibbum musculo liberatum cernitur, qui brachium mouentium sextus habetur, hicque ab *Q* insertionem propendens *Q* insignitur.
- R** Musculus brachium mouentium tertius. **S** Secundus thoracem mouentium.
- T** Musculus cubitum extendentium, qui ab humiliori scapulæ costā initium ducit.
- V** In sinistro brachio musculus, cubitum extendentium exterior ab ea sede propendet, qua cum interiori *T* notato impense cōmiscetur. In dextro autem brachio propendens ea pars resecta cernitur.
- X** Hac sede ab humero carnea exoritur portio, quam tertij musculorum cubitum extendentium loco habemus, sequentiq; tabula d notabimus.
- Y** Musculus cubitum flectentium posterior.
- Θ** Musculus radius in supinum ducens, qui ab humero multo superius, quàm externum illius consistit tuberculum, inibi exoritur, ubi *a* ascripsimus, ipsius insertionem *b* indicantes.
- Δ** Musculus alter, cuius ope radius in supinum agitur, atque huius initium *c* indicatur, insertio autem *d* insignitur.
- e** Neruea portio, seu insertionis terminus musculi superioris radius in prouum agentium.
- f** Radius. **g** Ulna. **h** Ligamentum radius ulnamque, quā inuicem debiscunt committēs.
- i, k** Hanc sedem sinuum uehendis musculis paratorum, & cartilaginis ulnam à brachiali dirimentis nomine, pluribus ornassē characteribus, nisi illa superiori Libro pulchrè fuissent obuia.
- l** Hac sede musculis tendinibusque libera, aliter ligamēta, quibus ossa cōpingūtur, proponi nequeūt.
- m** Postbrachialis os anulare suffulciens digitum, quod ideo priuatim notauimus, ut ossa postbrachialis, ab ipsorum interuallis, musculisque illa occupantibus interstingeres.
- n** Hic musculus reponitur, pollicem indici proximè adducens.
- o** Musculus bicorni tendine brachiale extendens, ab insertionem propendet.
- p** Hic bona transuersi abdominis musculi pars occurrit.
- q** Illius ossis dorsi nunc prorsus ex carne spectatur.
- r** Femoris caput, coxendicis ossis acetabulū subiens ipsum ue ligamentū, præsentē ambiēs articulū.
- f** Ligamentum à sacro osse in acutum coxendicis ossis processum desinens.
- t, u** Dependet hic tertius femur mouentium musculus, *t* notatus, unā cum quarto, qui *u* insignitur.
- x** Magnus exterior ue femoris processus.
- α** Decimus femur mouentium musculus, cuius præcipuam partem *F* notandam, ex decimasexta tabula opportunè petes, ad characteres *F, G, H.* Præsens autem tabula eam musculi partem cōmonstrat, quæ ad peculiarem ipsi in coxendicis osse cælato sinum reflexa, ad magnum femoris ducitur processum.
- β** Musculus gracilis, ab acuto coxendicis ossis enatus processu, elatiori que musculi *α* insigniti sedē exporrectus.
- γ** Musculus similiter gracilis, inferiori exporrectus parti eius musculi, quem *α* notauimus.

≡ Musculus

- Ξ Musculus femur mouentium quintus. Verum Ξ priuatim notat posteriorem huius musculi partem, cuius caput partim nerueum, ac Δ insignitum, & partim carneum, & notatum, à coxendicis ossis appendice enascitur, hincq; prodeuntium capitum, numero quartum censetur. Hac sede posterior hæc quinti femur mouentis musculi pars, admodum carnea est, ueri muris, ut ita dicam, effigiem præ se ferens. Hic posterior quinti musculi pars, in tendinem degenerat, interiori caputem femoris insertum.
- Σ, Π Π & Σ, anteriorem quinti femur mouentium musculi indicant partem, ac Π quidem eius partis posteriorem portionem, Σ uero anteriorem. Quo autem hæc non admodum sanè obuiâ promptius percipias, eosdem illos Græcorum maiusculos characteres in sequenti tabula repositurus sum, illic dependentes musculi partes notans.
- Musculus tibia mouentium septimus.
- μ, η Musculus tibia mouentium octauus.
- λ Ampla depressaq; femoris ossis sedes, supra radicem inferiorum ipsius capitum, posteriori in se de consistens.
- μ, ν Quartus tibia mouentium musculus, hic ab insertione pendens, ac μ quidem partem illius indicat, à coxendicis ossis enatam, ν uero partem, cui femur principium præbet.
- ζ Tibiam mouentium quintus musculus.
- Φ Primus pedem mouentium musculus.
- Υ Secundus pedem mouentium musculus. Cæterum huius musculi (ut & primi) principium partim carneum, ac ω insignitum uisitur, partim nerueum, ac ρ indicatū. τ autem sedes significatur, ubi primum duo isti primi pedem mouentium musculi contigui fiunt. s Hactenus musculi illi in sura extuberant, hicq; carnei esse desinunt, uerum hæc tubera nona tabula etiam accuratè exprimuntur. υ Tendinis, qui è duobus præsentibus musculis educitur, principium.
- ω Initium musculi pedem mouentium tertij, cuius tendinem proponit character &, in sinistra positus tibia.

DECIMAE TERTIAE MUSCULORVM

TABVLAE, QVAM SEQVENS
pagina proponet, characterum Index.

- A, B, C, D, E, F, G Dextra portio secundi caput mouentium paris, in quo singuli characteres aliquid priuatim insinuant. A enim indicatur musculus secundi paris, acuto principio extrasuersis quintæ & quartæ thoracis uertebrae processibus enatus. B musculi huius sedes, qua carneus esse desinit, ac uelut in tendinem degenerat. Porro B quoq; musculum significare debet, qui à septimæ ceruicis uertebrae spina enascitur, & cum musculo A insignito commiscetur, congressus autem sedi, C inscriptum est, quod non modò congressum utriusq; musculi notabit uerum etiam ubi uterq; exactè carneus efficitur. D utriusq; musculi insertionem notat. E secundi paris tertius in altero latere musculus indicatur, cuius etiam principium in alto latitat, insertionem interim ipsius ad F conspicua. Postremo G ac G, secundi paris carnea moles insignitur.
- H Musculus dorsum mouentium quintus.
- I Portio musculi dorsum mouentium sexti.
- K Decimus quintus dorsum mouentium, seu eorum musculorum octauus paris alter.
- Γ Vndecimus dorsum agentium musculus, cuius principium à sacro ossis pendens L insignitur, L, M, ipsius uero ansulae tendines uel M, M. Atq; ita elatissimum M, præsentis musculi superio-
M. rem significat terminum.
- ⌘ Character ⌘ loco N positus, musculum dorsum mouentium nonum indicat, seu quinti paris alterum.
- O, O Musculus hic ab exortu propendet, thoracem hominis mouentium quartus, simiarum uero carnisq; septimus.

DECIMA
TERTIA
TABVLA.



P, P Hæ costarum asperitates, earum tubercula referunt, in quæ quartus thoracem mouentium musculus inferebatur. Quod autem ad costas, earundemq; interualla attinet, eadem hic atq; in alijs quot præcedentibus tabulis est ratio.

R Scapula posteriori parte prorsus excarnis.

Q Scapulam mouentium tertius.

S Thoracem mouentium secundus.

V Tertium ligamentum peculiare articuli humeri.

X Dependet musculus brachium mouentium quintus.

Y In utroq; brachio posterior humeri pars, excarnis prorsus, musculis que libera cernitur.

a Posterior cubitum flectentium musculus.

b, c, d Musculi cubitum extendentes. Ac b is insignitur, qui ab humiliori scapulæ costa initium ducit, c ille, qui ab humeri capitis ceruice exoritur, d autem carnosæ pars, quæ ab humero, ad medium ferè longitudinis eius originem sumit.

e Radius.

f, g Musculus radium in prouum ducentium superior, cuius insertionem priuatim g insigniuit.

h Dependet hic musculus, radium in supinum mouentium breuior.

i Vlna, radium autem e superius notauimus. k autem, ligamentum in utroq; cubito indicat, radii ulnæ

k. tota ea sede colligans, qua hæc ossa inuicem debiscunt. Quod uero ad brachialis postbrachialisq; ac demum digitorum ossa spectat, omnia hic præcedentibus correspondent tabulis. Verum musculum hic resecuimus, pollicem indici proximè adducentem. Ac in sinistra manu tres cõspici

1, 2, 3. untur musculi, secundum pollicis internodium flectentes, characteribusq; 1, 2, 3 insigniti. Insu-

l. per musculus primum indicis os introrsum flectens, hic priuatim l indicatur.

m Ilium ossis dorsum, quemadmodum et coxendicis ossis exterior sedes, prorsus excarne occurrit.

n Coccyx quoq; os excarne, seu musculis ipsi adnatis liberum cernitur.

o Ligamentum à sacro osse, coxendicis acuto processui insertum.

p Femoris caput.

q Magnus exteriorq; femoris processus.

r Hic ab insertione propèdet decimus femur mouentiũ, internā ipsius sedē, quæ ossibus undiq; attēditur, cõmonstrans. Atq; ita s, t, u huius musculi tēdines notāt, qui ad coxendicis os reflectūtur.

x, y, z Tribus his characteribus, carnosæ indicatur pars, uaginæ quasi modo decimum femur mouentiũ musculum inibi deducens, quæ ad coxendicis os reflectitur. Atq; ita x huius carnosæ partis supremam indicat sedem, y mediam, z autem infimam.

α Portio femur mouentium noni.

β, γ In dextro femore duæ musculorum notantur insertiones, in paruũ femoris factæ processum. Ac β quidem insertionē indicat musculi femur mouentiũ sexti, γ autē musculi femur agentĩũ septimi.

δ, δ Musculus tibiam mouentium octauus, uniuersum femur propemodum ambiens.

ε, ε Aspera femoris indicatur linea, cui quintus femur mouentium musculus inseritur.

Ξ, Π, Σ Quintus femur mouens musculus, ab interno femoris capite propendit, in quo Ξ posteriorem ipsius notat partem, Π uero Σ anteriorem. atq; hic rursus priuatim Π posteriorem indicat portionem partis anterioris, Σ uero anteriorem portionem.

Φ Musculus in pedem mouentium classe tertius enumeratus, ac principium Φ indicatum à femoris externo ducens capite, tendinem autem illic educens, ubi ζ insignitur.

υ, υ Musculus, quem in poplite latitantem uocamus.

Υ Quartus pedem mouentiũ musculus, cuius initium θ indicatur, ipsius autem sedem, qua tendo duorum primorum pedem mouentiũ musculorũ, illi primũ pertinacissimè adnascitur, κ notauimus.

λ. λ uero tendinis insignitur insertio, qui è duobus illis primis pedem mouētibz & tertio cõsurgit.

μ Hac sede tibie os excarne conspicitur, quemadmodum & magna portio exterioris capitis duorum humiliorum femoris capitum.

ν Tendo musculi pedem mouentium octauĩ.

ζ Tendo septimi pedem mouentium.

Ω Præsenti caractere indicatã uolui figuram, ad dextrũ integri hominis hac decimatertia tabula expressi crur repositã, lapidiq; innitētem, quo tandē inferior pedis sedes oculis subiiciatur, et sectionis serie musculi in hac apparentes, sensim in sequentibus tabulis proponantur. Significetur itaq; primũ ω ligamentum, seu membrana substantia, primo digitos mouentiũ musculo obnatam, lati q; tendinis uicem in planta subeuntem.

ϑ Musculus pollicem à cæteris digitis introrsum abducens.

ς Musculus abductionis parui digiti à cæteris opifex.

τ, τ Primus secundusq; pedem mouentium musculi, in integro quidem homine à quarto pedem mouen-

DECIMA
 QVARTA
 MVSCVLO-
 RVN TA-
 BVLA.



tium propendentes, in illa autem figura, quam Ω proponit, sua sede repositi.

υ Tendo tertij pedem mouentium musculi.

ϕ Portio quarti pedem mouentium musculi, quem in integro homine Ψ insignitum cernis.

χ Tendo ex primo, secundo & quarto, pedem mouentium musculis conflatus, calciq; insertus, quā ϕ χ hic priuatim cauitatem proponat, inter anteriorem præsentis tendinis partem, & posteriorem sedem aliorum musculorum conspicuam, qui hanc tibiæ sedem occupant.

ψ, ω Excarnis nullisq; musculis, uel ante sectionem obiecta tibiæ ossis pars.

* Hic portiones occurrunt musculorum, qui posteriorem tibiæ sedem sibi uendicant, præter tres primos pedem mouentium musculos.

DECIMAE QVARTAE MUSCULORVM TABVLAE CHARACTERVM INDEX.

H A E C tabularum posteriorem corporis faciem exprimentium ultima est, scapulis & brachijs carens, et genua flectens, ut plantam altero crure spectandam proponeret. Ad genua uerò ne alia quæpiam integra delineanda esset tabula, caput unā cum duabus primis ceruicis uertebis reponitur, quartum musculorum caput mouentium par ostensurum.

A, B Tertium musculorum caput mouentium coniugium, à secundæ ceruicis uertebrae spina occipiti insertum.

C Mamillaris temporum ossis processus, tam in integra figura, quā illa quæ ad genua spectatur, conspicuus.

D Hic character cum aliquot subsequentibus, figuræ ad genua locatæ proprius est, transuersum primæ uertebrae ceruicis indicans processum.

E Spina secundæ ceruicis uertebrae, atq; ita etiam *E* secundam ceruicis denotat uertebam.

F, G Quartum caput mouentium musculorum par, à prima ceruicis uertebra, occipiti insertum.

H, I In ceruice integrioris figura insinuatur, quintum par musculorum caput mouentium, quod ab occipitio in transuersos primæ ceruicis uertebrae processus implantatur.

K, L Sextum musculorum caput mouentium par, à spina secundæ uertebrae, transuersis primæ processibus insertum.

M Musculi scapulam mouentium tertij pars, illic conspicua, ubi à transuersis aliquot ceruicis uertebularum processibus prodit.

N Dorsum mouentium musculorum tertius.

O Dorsum mouentium septimus musculus.

P Character *P* in lumbis reponitur, notans nonum dorsum mouentium musculum.

Q Undecimus dorsum mouentium musculus, hic ab ultima ipsius insertione pendens, ac sinum *R* in-

R, S. signitum ostendens, quo decimotertio dorsum mouentium musculo cedit, ipsius autem principium *S* indicatur.


T Decimustertius dorsum mouentium musculus, cuius principium *V* notatur, finis uerò *X*, quod

V, X. etiam principium decimi quinti dorsum mouentium musculi indicat.

Y Decimus quintus dorsum mouentium, cuius superius extremum *a* insignitum, sub septimo dorsum *a.* agentium reconditur.

Hanc decimam quartam musculorum tabulam, propter thoracis formam, costarumq; ductum sedulo intueri operæ precium erit, quum costarum ductum, ut & reliquæ musculorum tabulæ, appositissime ostendat. In ossium autem compage hactenus nunquā costas adeo concinnè inuicem adnexui, ut illæ naturalem situm, quod ad obliquum ipsarum ductum spectat, nanciscerentur. Nimis enim ingens interuallum, inter elatissimam ossis iliū sedem, & duodecimæ thoracis costæ mucronem, in ossium cōpactione mihi semper relinquitur. In musculorum autem tabulis, costarum ductū inter pingendum obseruare fuit promptissimum, quum in suo naturali situ tota sectionis serie semper consistent. quinetiam exteriores intercostalium musculos hic quoq; se spectandos offerre, etiam me tacente, neminem latere arbitror. Atq; ita etiam ilium ossa, & coxendicis & pubis & femoris ossa adeo sunt conspicua, ut si hic notas desideres, illæ à tribus integris Primi libri figuris petendæ ueniant. Quanquam in pubis osse *b* occurrit, membranam indicans in pubis ossis foramine obuiam.

- c Musculus sextus femur mouentium, ab insertione propendens.
d Musculus septimus femur mouentium.
e Hic musculus propendet femur mouentium nonus.
f, g Carnea pars, seu si uoles, priuati musculi, decimum femur mouentem musculum deducentes, atq; hic ab insertione pendentes.
Γ Musculus quem in poplite latitare dicimus, cuiq; Galenus ferè totū poplitis flectendi munus per h, i. peram concredidit. h ipsius ab externo femoris capite exortus, i insertio eiusdem in tibiæ os insignitur.
k, k Septimus pedem mouentium musculus.
l Tendo octauī pedem mouentis musculi, cuius insertio in pedij os paruum sustinens facta, m. m. signitur.
n, o, p, q A sinistri pedis calce quatuor humi prostrati pendent musculi, pedis motorum opifices. n enim et r. o, duos primos pedem mouentes insinuant, p autem tertium, q uerò quartum. Cæterum r ad dextri calcis internum latus repositum, tendinis illius insertionem indicat.
Δ Δ Figuram notat, externo lateri integrioris figuræ dextri pedis hic appositam, quæ sectionis serie dextrum integrioris figuræ pedem subsequitur, qui succedit figuræ, quam in præcedenti musculorum tabula Ω indicabamus.
f Ligamentum pedis, à digitorum terminis pendet, quod musculo secundos quatuor digitorum articulos flectenti, Θ hic notato obnatum fuerat, latiꝫ in extremæ manus uola tendinis uicem gerebat.
t Dependet musculus, pollicem à cæteris digitis abducens.
u Musculus hic à sua insertione dependet, qui minimum digitum à reliquis in externum latus abducit.
⊙ Musculus secundum quatuor digitorum os flectens, x ipsius principum à calce enatum, α illius x, α. in quatuor tendines partitio. Cæterum qua ratione huius musculi tendines diuidantur, subditosq; transmittant tendines, in hoc dextro maioris figuræ pede expressum habes, ut tamen sese hæc offerant, attentissimis oculis internam quatuor digitorum sedem intuebere, quanquam ⊙ figura Δ notata, hæc etiam commonstret, in qua musculus ille ab insertione propendens, ⊙ quoque insignitur.
β Carnea hæc moles illa est, cuius beneficio primum pollicis internodium flectitur, atq; hæc eodem β indicata, in figura illa dependet, quam Δ insigniui.
Λ, Λ, Λ Musculus secundum pollicis os flectens. γ in dextra tibia huius musculi notatur principium.
γ, δ. δ hac sede præsens musculus, ab interno ipsius latere tendinē educit, qui in carnea ipsius substantia aliquousq; incooperat, iuxta characterem ε. Deinde utraq; figura plantam referens, tendinem hunc quoq; δ notatū habet, quā pollicis iam est proximus.
Ξ, Ξ, Ξ Musculus quatuor digitorum tertium os flectens, ζ ipsius principium aliquantisper altius adhuc, sub musculo in poplite latitante, ac Γ notato. η tendo illius, ab interno etiam latere carnosæ suæ substantiæ enatus, atq; in pedis planta in quatuor alios tendines inibi, ubi θ occurrit, diuisus, qui quatuor digitis postmodum offeruntur.
κ, κ Hic sese ostendit portio musculi, quem inter pedis motores quintum numeramus.
λ Musculosa caro, quæ in quatuor portiones deducta, tendinibus exporrigitur, qui tertium quatuor digitorum os flectunt. Est autem musculosa hæc caro, cuius opera quatuor pedis digiti ad pollicem ducuntur. Vt uerò ⊙ tendines illos, et portiones has musculosæ substantiæ accuratiùs cognoscas, tendinem tertium indicis os flectentem, υ notatum conspicias, musculum autem indicem μ. pollicis adducentem, μ.

DECIMAQVINTA MVSCVLO-
RVM TABVLA.DVARVM DECIMAEQVINTAE MVSCVLO-
RVM TABVLAE FIGVRARVM, EARVN-
demque characterum Index.

DV AE praesentis tabulae figurae in ea effigie seruantur, in qua dextra tibia simul cū pede decimaequartae tabulae, sese exhibuerunt. Atq; prior figura in sectionis serie figuram sub sequitur, quam praecedens tabula Δ notatam ostenderat. Posterior autem huius tabulae figura, succedit priori. Notae autem harum figurarum ita se habent.

*A*₁ Tibiae os.

*B*₁ Fibula.

*C*₁ Musculus dependet, qui in poplite latitat.

*D, E*₁ Musculus quintus pedem mouentium, ac *D* quidem ipsius notat principium, *E* uero tendinem, ab interno musculi latere pronatum.

*F*₁ Sinus cui tendo insidet, secundi pollicis internodij flexionis opifex.

*G*₁ Sinus quo tendo uehitur musculi, tertium quatuor digitorum os flectentis.

*H*₁ Musculus pedem mouentium septimus.

*I*₁ Musculus pedem mouentium octauus.

*K*₁ Insertio sexti pedem mouentis musculi.

*L*₁ Musculosa congeries, primum quatuor digitorum os flectens.

*M*₁ Ossicula ad primum pollicis internodium reposita, quae à sesami seminis imagine nomen inueniunt, quaeq; ab Arabibus dimidiati ciceris formae assimilantur.

*N*₁ Pendet hic musculosa substantia, quae singulis quatuor digitorum internis lateribus portionem exporrigit, digitos pollicis adducentem.

*O*₁ Musculus pollicis secundum os flectens.


*P*₁ Musculus tertium quatuor digitorum os flectens.

*Q*₁ Portio tendinis, secundum pollicis internodium flectentis, illi tendini commixta, qui indicis tertium internodium flectit. Sequentes modò characteres, sinistrae figurae hac ratione peculiare sunt.

*R*₂ Tibiae os.

*S*₂ Fibula.

- T* 2 Ligamentum membraneum, fibulam tibiæ ossi illic committens, ubi hæc ossa inuicem dehiscent.
- V* 2 Musculus pedem mouentium septimus. *X* hæc septimi musculi tendo, sub osse cubi tesseram uel *X*, *Y*. imitante reflectitur, & lateſcit quoq; *Y* tendinis huius in os pedij pollicem ſuſtinens inſertio.
- a* 2 Musculus ſub ſeptimo occultatus, & pedem mouentium octauus, cuius inſertionem *b* notat, quæ *b*. in pedij os paruum ſuffulciens digitum perficitur.
- 1, 2, 3* Tribus his characteribus in poſteriori ſiniſtræ uel figura, tres ſinus indicantur, musculis à poſteriori tibiæ ſede inferiora pedis ſubeuntibus exſculpti. Atq; *1* ſinū notat, quo quinti pedem mouentis musculi tendo uehitur, *2* ſinum tendini tertium, quatuor digitorum os ſelectenti inſinuatū. *3* uero ſinum indicat nomine tendinis cælatum, cuius beneficio ſecundus pollicis articulus ſelectitur.
- c* 2 Musculus dependet humi quintus pedem mouentiū, in priori figura *D* & *E* notatus, ac in ſecunda figura ad inſertionem *d* inſignitus.
- e* 2 Musculoſa moles, primum quatuor digitorum os ſelectens, hic pendet à pedij oſſibus, quæ iam nuda ex carneq; ſpectantur.



DECIMASEXTA
MUSCULORVM
TABVLA.

PRÆSENTEM tabulam licuiſſet ſtatim tertiæ musculorum tabulæ ſubijcere, ſed quoniam corporis duntaxat pars exiſtit, huc eam reponere magis uiſum eſt, qua ſiniſtri femoris, tibiæ, pedisq; interna faciès nullo liberata musculo exprimitur, unà cum osſe ſacro, & osſe ſiniſtro ipſius lateri commiſſo, ut decimus femur mouentium musculus alicubi in conſpectum ueniret, qui in integris tabulis ea parte conſpici nequirit, quæ internam pubis oſſis & coxendicis quoq; ſedem occupat. Huius autem tabulæ characteres, ut ſequens pagina proponit, ſe habent.

A Os

A Os sacrum.

B Ossis sacri latus, cui sinistrum ilium os committebatur.

C Ligamentum à sacro osse, in coxendicis ossis appendicem pertinens.

D Sinistri pubis ossis pars, quæ dextro pubis ossi committebatur.

E Notatur quartus femur subiens neruus.

E, F, G Decimus femur mouentium musculus, cuius tres ueluti partes, *E, F, G* insignitæ, in inscriptioni-

G, H. bus quodammodo distinguuntur, quibus ab interna pubis ossis sede, & interna quoque coxendicis ossis regione, musculus iste carneus pronascitur. Ad sedem uero *H* indicatam, musculus arctior redditur, & ad sinum sibi in coxendicis osse insculptū reflexus, ad magnum femoris perfertur processum.

I Conspicua est portio, sexti femur mouentis musculi.

K Portio septimi femur mouentis musculi.

L Primus tibiæ mouentium musculus, cuius sedes, qua iuxta internum femoris caput, in tendinem

M. cessat, *M* indicatur.

Δ Secundus tibiæ mouentium musculus. *N* & *O* musculi huius principium ab ossis pubis com-

N, O. missura pronatum. *M* quoq; & si in primo ponatur musculo, huius secundi musculi etiam sedem notat, qua in tendinem desinit.

P Nonus musculus tibiæ mouentium, parua ipsius portione hic conspicuus.

Q Octauus tibiæ mouentium musculus.

R Tertius tibiæ mouentium musculus, cuius tendo, quemadmodum & primi & secundi, tibiæ mouentium musculorum quoq; *M* indicari potest, & promptissimum etiam est intueri, ubinam musculorum tendines, in anteriorem tibiæ ossis sedem inserantur.

S, T Quintus femur mouentium musculus, uerum *S* posteriorem eius musculi partem notat. *T* autem quinti femoris musculi anterioris partis posteriorem indicat portionem.

V, V Quintus tibiæ mouentium musculus.

X, Y Excarnis tibiæ ossis pars, uerum *Y* interiorem notat malleolum.

a Primus pedem mouentium musculus.

b Secundus pedem mouentium musculus.

c Tendo tenuissimus, idemq; summè gracilis, qui à tertio inter pedis motorum musculo educitur.

d Musculus suram constituentium maximus, pedemq; mouentium quartus.

e Musculus quatuor pedis digitorum tertium os flectens.

f Portio musculi inter pedem mouentium quinti.

g Tendo sexti pedem mouentium musculi.

h Tendines digitos extendentes.

i Musculus pollicem à cæteris digitis introrsum abducens.

Absolutis itaq; sedecim musculorum tabularum (quas in præsentis Libri initio collocandas dixi) indicibus, proximum modò erit Caput contextum aggredi, ac à ligamentorum natura initium sermoni statuere.

QV ID L I G A M E N T V M, A C QV IS

ligamenti usus & differentia. Caput I.

FIGVRA sequentem paginam occupans, & omnem propemodum ligamenti differentiam semel commonstrans, uniuersum femoris os exprimit, unà cum tibiæ osse & fibula, quibus ea ligamenta adhuc connata hærent, quæ primi Capitis contextu intelligendo subseruiunt.

A, B, C, D Femoris os.

B Femoris ossis caput sinum coxendicis ossis subiens.

C, D Femoris ossis humilia capita, quæ tibiæ articulantur.

E, F, G, H Tibiæ os.

F Eminens superioris appendicis tibiæ ossis processus, qui sinum subingreditur, quem duo humilia femoris ossis capita efficiunt, & qui ligamentum mox *X* insinuandum educit.

G Sinus

- G** Sinus inferioris appendicis tibiae ossis, quo complures ueruntur tendines eorum musculorum, qui anteriorem tibiae sedem occupant.
- H** Interior malleolus.
- I, K** Fibula, uerum **K** exterior malleolus priuatim insignitur.
- L, M** Musculus notatur in sura maximus, pedemque mouentium quartus, atque inter reliquos corporis musculos intensissime liuens. Verum **M** huius musculi tendinem, calcis ossi insertum, particulatim indicat. **N** autem portiunculam tendinis primi & secundi pedem mouentium musculorum ostendit, quae quarto pedem mouenti musculo connascitur, ac simul cum illo unita, calci inseritur.
- O** Teres ligamentum, femoris os coxendicis ossi iungens.
- P, P** Ligamentum orbiculatim femoris cum coxendicis osse articulum amplectens.
- Q** Ligamentorum portiones, ex magno externoque femoris processu in musculorum substantiam absumptae, ac potissimum in tibiae mouentium septimi.
- R** Portiunculae ligamentorum quoque, à radice interioris minorisque processus femoris pronatae, & in octauum tibiae mouentem musculus praecipue degenerantes.
- S, S** Membraneum ligamentum, reliquis etiam omnibus articulis commune, quod uniuersum genu articulum ambit, ea tantum parte excepta, cui mola praepositur.
- T** Ligamentum genu articulo proprium, quod externo ipsius lateri attenditur.
- V** Ligamentum hoc, etiam genu articulo peculiare censetur, atque externo ipsius lateri attensum uisitur.
- X** Ligamentum ex tibiae ossis processu **F** notato, in femoris os insertum.
- Y** Ligamentum superiorem fibulae partem, tibiae ossi connectens.
- Z** Ligamentum inferiorem fibulae partem, tibiae alligans.
- a** Membraneum ligamentum, fibulam tibiae ossi toto ductu, quo inuicem haec ossa dehiscunt, committens.
- b, c** Hic ligamentum notatur, tendines anuli ritu amplectens, qui à tibiae anteriori sede, in pedis superiora porriguntur. Ut uero ipsius natura exactius oculis subijceretur, id sectione secundum longitudinem ducta, diuisum, atque una parte in latus reflexum finximus.
- d** Ligamentum à tibiae ossi ad calcem insertum, & tendines hac ad pedis inferiora descendentes continens.
- e** Ligamentum à fibula ad calcem porrectum, & tendinibus hac pedis inferiora petentibus obductum.
- f** Ligamentum cartilagineum, ab interno malleolo, in tali internum latus insertum.
- g** Ligamentum quoque cartilagineum, fibulam talo colligans.
- Huc sane & tabulam retulissem praesentis Libri trigesimo Capiti proponendam, quae primae ceruicis uertebrae ad secundam, & primae secundaeque ad caput connexum exprimit, nisi quam modo proposui, ut cunctae omnem ligamenti differentiam & usum commonstraret.



CAPITULI
T I S
PRIMI
figura.



RIMVS Liber omnia, quæ ad humani corporis ossium cartilaginumq̃ enarrationem spectare duximus, enarrauit, præsens uerò ossium cartilaginumq̃ ligamenta, & ea mouentes musculos prosequetur. Ossium enim & cartilaginum natura primùm fuit perdiscenda, & post illa mox ad ligamentorum musculorumq̃ concisionem properandum, quando quidem hæ corporis partes, cæteris omnibus ueluti fundamenta ac bases subiiciuntur. ^a Ligamentum itaque, quod nerui generatim dicti no-

Quid ligamentum.

Ligamentorum usus in colligando.

Ligamenti substantia.

Ligamenti in tendinibus continendis usus.

a undiq; in figura Capitis huius initio præposita ligamenta occurrunt.

b O.P.S.T.

c b, c.

d i tab charact. 3, 4, 5, 6. tab. autē 2 char. 1, 2, 3, 4, 5, 6. e 4 ta. d. f i tab. a. 2 ta. a. g 2 ta. d. e. in 2. uerum suffecerit semper unū atq; alterū in singulis exemplis adnotasse.

mine compræhendimus, Græcisq̃ σινδερσμιον nuncupatur, proprio, non autem communi significato, corpus est simile ex osse aut cartilagine, aut quauis duriori membrana principiū ducens, omnis propemodum sensus expers, durum, sed tamen cartilagine mollius, album, uariosq̃ in colligando, continendo, obtegendero, & musculis constituendis homini usus præstans. ^b Nisi enim ossium & cartilaginum articuli, ligamenti tenerentur, nihil sanè prohiberet ossa, aut cartilagine in quolibet motu luxari, & à sua naturali sede alia aliò permutata egredi. Quod ne contingat, summus rerum opifex Deus omnes ossium cartilaginumq̃ articulos ligamenti circundedit, ualidis quidem, at remissionis interim, tensionisq̃ non paruæ capacibus. Miranda profectò est Creatoris industria, qui ex coarticulatis inuicem ossibus, corporis substantiā enasci uoluerit, cuius beneficio ossa simul ad amissim tutoq̃ colligentur, & articulata contineantur, neque promptè per uiolentos motus à se inuicem rumpantur, quodq̃ demum hæc substantia ex continuis indefessisq̃ motibus, noxæ suscipiendæ contumax, ob duritiem euaserit. Porro ut ossa cartilagineq̃ à musculis tracta ocyus sequantur, mollè rursus ligamenti substantiam confingi oportuit, atq; hac ratione inualidam. Atqui contrarium est ualido & duro, infirmum, debile ac molle. Quæ fuerit igitur rerum Opificis solertia, qui corpus quoddam fabricfecit, usus & naturæ utriusq̃ abunde compos, & ab iniurijs remotum, ex humanæ fabricæ refectione discas, integrum est. Comperies enim omne ligamentum adeò durum, ut tutò simul colliget, & quantum suo articulo ex usu est, illum moueri non prohibeat, neq; facile abrumpatur. atq; hic præcipuus primariusq̃ ligamenti usus est, à quo etiam nomen mutuatur. Nam ligamentum ex osse in os (ut humeri & genu articulorum ligamenta) aut ex cartilagine in cartilaginem (ut laryngis cartilagine mutuo neccentia) aut ab osse in cartilaginem (ut quæ costarū cartilagine pectoris ossi committunt) insertum, commissorum ossium ac cartilaginum commune uinculum efficitur, hoc solo nomine, ut illa inuicem colliget, siue hæc manifesto siue obscuro, & qui uix perpendi possit, motu agantur. ^c Secundo usu ligamentum, tendines suis, quibus uehantur, sinibus continet, ne ex ipsis declinent, aut ab illis eleuentur. huius autem generis ligamenta in homine esse quàm plurima, in manus pedisq̃ musculorum enarratione docuimus. In externa nanq; cubiti sede, quâ brachiale illi articulat, eius classis ligamenta ^d sex uidentur, in interna autem brachialis regione ^e unicum & perquam ualidum, deinde etiam in interna digitorum manus ac pedis sede, unicum in tota ferè ipsorum longitudine consistit. In anteriori uerò tibiæ sede, quâ pedi articulat, ^f unum quoque est amplum & ualidum, & ^g alia deniq; inter tibiā & calcem, ac inter fibulam & calcem obseruantur, quæ omnia in hoc præcipue creata sunt, ne tendo in musculi contractione ^h proprio sinu assurgat. Nisi enim huiusmodi ligamentū anteriori tibiæ sedi iuxta pedem præpositū, inter reliquos, quibus uia præbet, tendines, illos qui digitorum extensionis authores sunt, transmitteret, & cōtineret, quoties digitos tenderemus, tendines illi antrorsum à tibiæ & pedis articulo prominerēt nihilo minus sanè, q̃ si funiculū uni digito alligatū ad genu usq; protēderes, illoq̃ digitum eleuare, conareris, funiculus nanq; ille uersus genu attractus, plurimū à pedis cū tibiā articulo abscederet. At si aliū funiculū transuersim infimæ tibiæ sedi obligaueris, atq; sub illo, eū quo digitū extendi uolebā, traduxeris, funiculus ille rectus, etiā si pertrahatur, nō amplius à tibiā abscedet, & tibiæ pedi, transuersi uinculi occasione toto ductu exporrectus, digitū eleuabit. Atq; hæc Naturæ solertiā aurigas imitari intuemur anulis illis, quos equorū iugis cōnectunt, ut habena oblōgiori p̃ anulū traiecta, equos, quibus nō insident, opportuniū reflectāt. Quia uerò ligamēta hæc perinde, ac ille anulus habeng, transuersim tēdinibus obducuntur, aut potius orbiculatim amplexantur, Græcis ἐγκύρσια fuere nūcupata, nos autē illa nūc Transuersa, nūc Anularia appellamus. Interior eiusmodi ligamentorū superficies anulis, p̃ quos funes tranſciuntur,



tur, penitus respondent, est enim ut plurimum, ut et ipse tendo, secundum cauum orbicularis, laevis, & uelut uiscido humore ceu smegmate quopiam perfusa. Quippe haec ligamenta non solum tendinibus extrinsecus obducuntur, uerum etiam uelut stratum ipsis fiunt. ipsa namque ossis duritiem correctura, inter os & tendines sese insinuant, undiquaque in orbem tendines, citra omnem prorsus connexum amplexantia, & ut anulus habenam, transmittentia. Horum ligamentorum ordini ascribende sunt membranae, transuersim alicui integræ musculorum congerie obductæ, ne illi inter se implicentur, suam uel sedem aberrant. huiusmodi enim membranas in tota cubiti, femoris, & tibiae longitudine musculis praesse recensebimus. Insuper & transuersum primæ ceruicis uertebraeⁿ ligamentum, dentem in suo sinu continens, ac ne ille aliquando dorsalem medullam comprimatur, instar ualli prohibens, in horum quoque numero recenseri potest. Rursus nisi ridiculos et fictos penitus arbitrarer cerebelliⁱ processum, qui uermibus comparatur, motus, inter hæc ligamenta quoque connumerarem, tenuis cerebri membranae partes, quæ anteriorem cerebelli sedem cerebri^k natibus, & posterioremⁱ dorsali medullæ connectunt. Quandoquidem illas membranae partes Tendinum nomine Galenus dignatus est, arbitratus illas in hoc formatas esse, ne processus uermium modo conficti à sua sede reclinantur. Verum quia his processibus nullum peculiarem motum tribuo, neutiquam tenuis membranae partes illorum motibus praesse concedam, sed huc quoque referam membranas, seu ligamenta potius ex ossibus pronata, & quosdam ossium sinu ideo succingentia, ut, & si musculum tendinemue sinui incubentem, anuli modo orbiculatim non amplexentur, nihilominus tamen sinum ita subungat, & uiscido quoque humore sic oblinetur, & laeui sint, ut pinguis rotulae modo, musculum & tendinem sibi superuehi sinant, & quomodo nus is atteratur, praestent.^m Reperies autem non sine summa uoluptate huiusmodi ligamentum, in posteriori coxendicis ossis sede sinui obnatum, ad quem musculus reflectitur, qui internam pubis ossis sedem occupans, femur extrorsum circumagitur, deinde etiam in superiori coxendicis ossisⁿ regione, quæ^o duo musculi descendunt, primarij femoris flexus opifices. Huc quoque spectant ligamenta, cartilaginea ligamentorum naturam seruantia, quæ acetabulorum & ossis sinuum cavitatem augent, cuiusmodi ad coxendicis sinus superciliū obnascitur. Et fortassis huc reponendæ essent ligamentosa^p cartilagineae, quas in genu articulo, & in humeri ad scapulas articulo haberi in Primo libro retulimus. Videtur namque et genu cartilaginibus Galenus Ligamentorum nomen indidisse, licet ad colligationem nimis quam parum conducant. Porro tertius ligamentorum usus censebitur, quo illa instar indumenti & propugnaculi, corporibus quibusdam obducuntur, in quorum albo in primis omnia secundum usum ligamenta comprehendimus, & priuatim mucosas quasdam membranas, tendinibus tunicae ritu circumdatas, cuiusmodi in manu praecipue obseruatur. Tendines enim musculorum, qui ex cubito ad digitos procedunt, membranis proprijs obteguntur, & potissimum ea tendinum portio, quæ in brachialis sinu, & manus uola, ad digitorum usque radices habetur. Caeterum hæc membrana à tendinibus, ipsisque musculorum peculiaribus membranis potius, quam ab osse principium ducunt, unde etiam membranarum ordini non inepte ascribuntur. Quandoquidem si huius generis membranas inter Ligamenta cum Galeno enumerauerimus, reliquæ propemodum corporis membranae huc quoque referentur, quoniam quibusdam obducuntur corporibus, & uelut uincula eorum existunt. Essent autem ex harum numero, peritonæum praecipue, membrana costarum succingens, intersepientes thoracis cavitatem membrana, dura cerebri membrana, una cum omnibus, quos educunt, processibus. Non enim minus hæc membranae ab ossibus, quam caetera ligamenta, enasci conspiciuntur, & interim in se aliquid colligant, continent, et amplexantur, proximisque ossibus astabiliunt. Quartus etiam ligamentorum usus haberi poterit, quo septem alicuius ac interstitij uice illa musculi intercedunt, & musculis durum ossis modo renixum praebent, cuius notæ ligamentum illud profecto est, quod inter ulnam radiūque secundum cubiti longitudinem porrectum musculi internam cubiti sedem occupantes ab exterioribus interdiuidit. Deinde quum musculi huic ligamento attensi, ut os ipsis conceditur moueant, in se contrahuntur, tunc ligamentum id ipsis firmamentum offert, absque quo non æquæ ualida eorundem fieret functio. Huius etiam generis^s illud est, quod tibiae fibulam membranae cuiusdam ualidioris ritu, ubi in uicem ossa hæc dehiscunt, connectit, postmodum præter ligamentum spinarum interuallum occupans, & dextros musculi a sinistris dirimens. his quoque adnumerari possent membranae, quæ pubis ossium foramina occupant, musculosque anteriori foraminum sedi attensos ab illis, qui posteriori committuntur, quasi ossis modo discernunt. At quintus ligamentorum usus neutiquam infimus est, in huius enim ordinem ea ligamentorum portio reponenda uenit, quæ musculi constitutionem ingreditur, musculoque non infimam substantiam suppetit. Quæ autem ratione serieque id fiat, sequenti Capite, quod musculorum constructionem enarrabit, opportuniùs prosequemur. Hic uero suffecerit addidisse, musculum etiam ad ossium cartilaginūque colligationem plurimum auxiliari, quia capite suo ex uno osse, aut cartilagine principium ducit, & ipsius fine in aliud

Lib. 8 de Usu
par.

Ligamenta
aut membranae
sinibus obducuntur,
ad quos
musculi reflectuntur.

Ligamenta,
ossium acetabula
augentia.

Li. 2 de Admi.
sectio.
Vsus ligamentorum,
quæ instar propugnaculi sunt.

Lib. 1 de Admi.
dissect.

Ligamentorum
usus, quæ
instar interstitij sunt.

Ligamentorum
usus, quo
musculi constructionem
subeunt.
Quæ ligamenta
unicum tantum
praestant
usum, quæ plures.

h. fi. cap. 30
K.
i. 12 fig. li. 7
B. D. C. d. H.
I.
h. 10 fi. li. 7
E. F. G. H.
l. 9 fi. lib. 7
H. aut E ad
H.

m. spectat
tabulae a. b.
7. dein 13 ta.
f. t. u. x. y.
z.
n. 1 fig. ca.
29 lib. 1 T.
o. 8 ta. d. A.
p. 8 fi. cap.
31 lib. 1

q. 4 tabule
manus uola.

Has ostendunt
priorum
res figurae
5, 6, 7 libro
rum.

r. 7 tab. V.
dein S. T.

s. huius ca.
fi. a.
t. 14 ta. b. b.

u. Q. R. et
fi. ca. 2. C.

in aliud os, uel cartilaginem implantatur. Atque hac ratione ligamentorum usus commiscere promptū erit. Sunt enim primi duntaxat usus omnia, quæ femoris os coxendicis ossi, & tibiā femori colligant, nullum enim aliud homini quàm colligandi officium præstant, nisi etiam forsitan aliquis tertio ligamentorum usu, ipsa ossibus obduciafferet. Secundi duntaxat usus nullum reperiēs, quū omnia tertio usu instar propugnaculi, aut ab ossis iniuria uindictis instar, tendinibus sint. Verū ex his reperiēs nonnulla, quæ aliud nullum beneficium, quàm secundi & tertij usus conferunt, neque ossa aut cartilagine inuicem nectunt, qualia omnia sunt, quæ unī solummodo ossi propria continuā ue censentur. ut^x quatuor illa, quæ in externa cubiti sede, radij appendici ascribuntur, &^y unum ulnæ proprium, deinde præter cætera huius generis quædam ad calcis os spectant, quemadmodum suo loco diffuſe explicabitur. Alia ex secundi usus ligamenti, etiā primi ligamentorū usus uicem supplent, tendinē nanq̃, quem transmittunt, tuentur, & etiam ossa inuicem ligant, suntq̃ illa, quæ duobus ossibus communia conspiciuntur, ex uno osse in aliud pronata, ut^a illud sex transuersorum cubiti ligamentorū, quod radio & ulnæ commune dicemus, deinde transuersum quoq̃^b ligamentum, anteriore tibiæ sedem iuxta pedem occupans, & ad fibulam tibiāq̃ relatum, quod duo illa ossa colligās, plurimos etiam tendines unā transmittit. Præterea & transuersum internæ^c brachialis sedis ligamentum, pluribus quoq̃ ossibus commune existit. Tertij duntaxat usus illa sunt, quæ tendinibus secundū ipſorum longitudinem obuoluuntur, nisi etiam primi usus sint, quod tendines uicinis sedibus commissos seruent, aut ligent. Quanquam rursus ex his quædam & quinti usus uicē gerant,^d quandoquidem mucosæ membranę tendinibus tertium quatuor digitorū os flectentibus, in brachiali & uola obductę, etiam musculis gracilibus quatuor digitos pollicis adducen-
tib. principiū præbent. In quinti solūmodo usus numero propemodū habēdæ sunt^e mēbranę, in pubis ossium foraminibus obuīæ. Id autem quod in^f cubito &^g tibia habetur, etiam primi usus ligamentum existit, quum & ad ossium connexum egregiē auxilietur. Quamuis etiam hæc omnia & ad quinti usus ligamentorum classē reijci possent, quod non obscure etiam musculis principiū porrigant. Qui enim internam & externam pubis ossis foraminis sedem obtinent musculi, ab illius quoq̃ foraminis membrana partim enasci dicuntur, uti etiam ab eiusmo-
di ligamento in tibia nōnulli musculi originis portionem assumunt. Porro uti neq̃ ligamentorum usus idem est, & plures inter ligamenta eius gratia consurgunt differentiæ, ita quoq̃ in ortu illa uariant, quum alia ē solis cartilaginibus principium ducant, ut laryngis ligamenta, alia a solis ossibus, ut genu, cubiti, humeri, & reliqua ferē corporis ligamenta. Alia autem & cartilagini & ossi communia sunt, ut quæ pectoris os illi insinuatis cartilaginibus adnectunt. Pariratione quædam ligamenta solas nectunt cartilagine, ut laryngis, nasiq̃ cartilaginum ligamenta, quædam ossa duntaxat, ut humeri, coxendicis, genu, & reliquorū ferē articulorum ligamenta. Quædam cartilaginem ossi committunt, in quorum numero sunt ligamenta, costarum cartilagine pectoris ossi nectentia. Alia aliam partem quampiam ossi aut cartilagini committunt, ut corporis membranę ad unam ferē omnes, atq̃ hæc semper duabus partibus sunt communia. Alia uerō unī duntaxat ossi priuata censentur, ut sex cubiti exteriorum ligamentorum, quæ
transuersim ducuntur quinq̃. nam primum quod ulnæ radioq̃ commune est, non ad unicum tantum os referetur. Insuper & quæ pubis ossium foramina opplent membranę, huc quoque spectant, si modō illæ (quum non ligent) in ligamentorum numero habeantur. Substantia demū alia constant molliori, magisq̃ membranæ, ut omnia ferē quę in orbem articulos ambiunt, quanquam in illis rursus quædam sit differentia. Digitorum enim internodia mollius ambit ligamentum, quàm humeri articulum, et huius denuo duritiem, coxendicis articuli ligamentum longē superat. Alia autem dura sunt, mediamq̃ inter ligamenta, quæ articulos ambire dixi, & cartilagine, naturam sortiuntur, unde etiam Græci hæc *ὀστέων καὶ χόνδρων συνδέσµατα*, quasi ligamenta cartilaginea dicas, appellant. Huius generis omnia propemodum sunt, quæ extrinsecus articulis non obtenduntur, sed inter ossa ipsa latitant, quale illud est^h quod ex medio capitis femoris in coxendicis acetabulum fertur, &ⁱ ea quæ uerteburarum corpora intercedunt, &^k id quod ex media tibiæ sede, quā hæc femur respicit, inter femoris capita ducitur, &^l quædam malleolos talo nectentia, & quod sacrum os iliumq̃ ossa interuenit, & generatim omnia, quæ inter ossa sedem habent. Vnde etiam & situ ligamenta inter se pugnant, quū alia extrinsecus ossibus obducantur, ut molliora illa. Alia autem inter ipsa ossa, ubi se inuicem respiciūt, continguntq̃, si-
tuentur, quemadmodum cartilaginea propemodum uniuersa. A^m forma quoq̃ ligamenta differentiam mutantur, sunt enim quædam prorsus lata, membranæ & tenuia, uti illud, quod secundū cubiti longitudinem inter ulnam radiūque conspiciamus, & illud quod pari modo inter fibulam & tibiā, ubi hæc mutuō dehiscunt, obseruatur, & etiam pleraq̃ in orbem articu-

Ligamentorum differentiæ.

Ab usu.

Ab ortu.

A partibus quas connectunt.

A partibus, quib. committuntur.

A substantia.

A situ.

A forma.

x 2 ta. cha. 3, 4, 5, 6.

y 2 ta. cha. ract. 2.

a 2 tabu. 1.

b 2 tab. Δ.

c 4 tab. 8.

d uide 6 ta

bula 7. 8.

7 tabu. d. f.

e 14 tabu-

le b, b.

f 7 tab. V.

g 4.

h O.

i fi. cap. 14

li. 1 R.

k X.

l f. 8.

los circundantia, eaq̃ tandem omnia, quæ tendinibus musculis que obuoluuntur. Alia autem crassa sunt, & ex his quædã teretia, ut^m ligamentũ ex dente secũdæ ceruicis uertebre, in occipitis os procedens, & id quoq̃ quod transuersim denti obducitur, ac primæ uertebre est peculiare, deinde & ligamentum femoris caput coxendicis ossi committens, quod in articuli medio locatum teres etiam uisitur. Alia ampla lataq̃ sunt, ut tertium peculiariũ humeri articuli ligamentorum, præter membrancum quoddam, in orbem articulum ambiens. Insuper genu articuli peculiaria omnia, crassa quidem sunt, non tamen prorsus teretia, ut & cartilaginea illa talum tibiæ & fibulæ colligantia. Rursus quædam continua, & nullo foramine peruiã cernuntur, ut ligamentorum maxima multitudo, quædam uerò aliquid transmissura perforantur, ut ligamenta anuli modo tendines transmittentia, & membrana pubis ossis foraminum, neruo cum uena & arteria uiam præbens, ut & membrancum ligamentum inter tibiæ os & fibulam consistens. Quàm iustè uerò hæc singula rerum Conditor distribuerit, seorsum semper in proprijs Capitibus recensere conabor, ubi perpetuò, si quid peculiariter alicui ligamento in colore, substantia, forma, eiusq̃ generis differentijs obtigerit, subiungam. Commune autem omnibus est, quòd obtuso admodum sensu (nollem enim dicere nullo) participant, ne propter crebrum frequentemq̃ motum, & continuũ affrictum dolore uexentur. Qua etiam ferè ratione (quum scilicet natura sicca sunt) ne ocyus exsiccantur, ligamenta quæ articulis sunt peculiaria, mucoso quodam lentoq̃ humore, ut & articularum cartilagine, oblinuntur. Cuius sanè naturam accuratissimè, si non ob aliud, saltem ad luxatorum restitutionem perdiscere debemus. Quod quum aliàs non semel, tum etiam in Libro de Articulis Diuus Hippocrates nobis insinuauit, quum macilentos non natura, neq̃ debita arte redditos, eiusmodi humore ob excrementicios, qui ipsis colliguntur, succos abundare docuit. Preter hoc, quòd rerũ Opifex unctuosum hunc humorem instar olei ossium, quæ inuicem coarctantur, cartilaginibus oblinat, ut huius beneficio, promptè mobilis simul & attritu contumax articulus redderetur.

Ligamentis
communia.

Viscidus liga-
mentorum hu-
mor.

m fig. 30
cap. I.
n eiusdem
fi H.
o 2 fi. cap.
49 P.
p 13 14. V.

QV ID M V S C V L V S. C A P V T I I.

P R A E S E N T I figura musculi structuræ ratio, qua omnes ferè dissectionis proceres musculum formari tradunt, ut cunque exprimitur. Quod enim inter Φ & Ω continetur, nerui cuiusdam est portio supra infraq̃ abtruncata: uerum hæc characterum indice opportuniùs explicabuntur.

- A** Nerui in plures surculos distribuendi portio.
- B** Nerui **A** notati soboles musculi constitutionem subiens.
- C** Ligamentum quod ab ossè ad musculum constituendum pronascitur.
- D** Ligamenti & nerui ad musculum efformandum congressus, ac prima in fibras distributio, musculiq̃ caput.
- E** Sedes qua fibrarum maxima est diuisio, & qua musculi uenter consistit.
- F** Diuisionis fibrarum concursus commixtioq̃, & tendinis musculi initium.
- G** Tendinis pars, quæ mouendo ossi inseritur.




PRIMA SE-
CVNDI CAPITIS
FIGVRA.

- SEQUENTEM** paginã occupans figura musculorũ humeri os, & cubiti ossa, & extremã summæ manus sedẽ ambientũ fibras à carne liberas cõmonstrat, unã cũ quarto brachiũ aduentũ neruo, ut hĩc quàm fieri posset, cõmodissimè musculi fabricæ natura oculis subijceretur.
- H** Humeri ossis caput, quod scapulæ articulatur.
 - I** Quartus brachium petens neruus.
 - K** Principium musculi cubitum extendentis, qui ab humeri capitis radice exoritur.
 - L** Principium alterius cubitũ extendentis musculi, qui ab humiliori scapulæ costa pronascitur.
 - M** Sedes qua quartus brachium accedens neruus, duobus cubitum extendentibus musculis propa-
gines offert.
 - N** Cubitum extendentiũ musculorum finis, seu eorundem in posteriore ulnæ processum insertio.

O Poste-

- O** Posterioris ulnæ processus pars, quæ ex-
carnis perpetuo cernitur.
- P** Quartus brachium petens neruus inibi cõ-
spiciuus, quâ posteriore sedi exterioris tu-
berculi humeri innititur, ac musculis hinc
ab humero principium ducētibus ramos of-
fert.
- Q** Initium est cubitum flectentium musculo-
rum posterioris.
- R** Caput oblongi musculi, qui radij appendi-
ci iuxta brachiale insertus, radium in pro-
num ducit.
- S** Musculus bicorni tendine brachiale ex-
tendens.
- T** Musculus brachiale extēdentium alter, qui
ē regione minimi digiti postbrachiali im-
plantatur.
- V** Musculus ulnæ exporrectus, & brachiale
flectens.
- X** Musculus indicem, medium & anularem
extendens.
- Y** Musculus quo minimum digitum præcipue
extendi docebo.
- Z** Carnea pars eius musculi, qui in tres dedu-
ctus tēdines, unum brachialis ossi pollicem
sustinenti inserit, secundum primo pollicis
ossi, tertium secundo pollicis ossi & tertio.
- a** Musculus cuius beneficio pollex indici ad-
ducitur.



SECUNDA
FIGURA.



M VSCVLVM motus uoluntarij, ex nostroq; arbitrato pēdentis proprium
esse instrumentum, omnibus concessum uidetur dissectionis proceribus,
atq; ab omnibus idem musculi cõstructionis modus enarratur. Qui equi-
dem probabilis apparet, ac magnum Conditoris nostri artificium com-
monstrat, attamen quum in paucissimis musculis, aut potius in nullis il-
lum obseruem, secus propemodum atq; illi, de musculorum constructio-
ne sentire cogor. Quæ autem omnium ferè sit sententia, nunc quàm pote-
ro breuissimè, & simul explicatissimè subiiciam, eorum placita in continuam orationis seriem,
quæ ueritati proximè sit consona, & quæ eorum sententiam clarius edoceat, congesturus. Dif-
finiunt itaque musculum, partem esse instrumentalem ex neruo, ligamento, carne, uenis, & ar-
terijs confabricatam, motusq; uoluntarij peculiare organum, in cuius fabrica ad hunc ferè mo-
dum Naturæ opus recensent. Musculum sanè huiusmodi instrumentum efformari operæpre-
tium erat, si demum ipsius ope membra, & grauiora ossa motu arbitrario moueri oportebat.
Quum bina enim corpora sint similia, quibus in præsentī sermone (qui de musculi constitu-
tione est) indigemus, ligamentum scilicet, & neruus sua propria uoce dictus, ligamentum uerò
sit durum, neruus autem mollis, miranda Creatoris est industria, qui in singulis motui uolun-
tario præfectis partibus, utroq; utitur, neq; in ligamenti locum neruum aliquando transponēs,
neq; in nerui regionem ligamentum. Concessum enim est omnibus, neque durum ad sensum
(utpote quod non facile afficiatur) neq; molle ad motum (quum imbecillius sit) esse idoneum.
Ergo neque per neruos solos mouetur aliqua particula, neque per ligamenta. Neruus enim sen-
situius quidem est, quatenus mollis: inualidior autem, quàm ut moueret, & transferret totum
membrum. Ligamentū uerò tutò quidem colligare, & interim membrorum motibus nō ob-

Quid muscu-
lus, ipsiusq; cõ-
positionis ra-
tio secundū ali-
orum anato-
mes Procerū
sententiam.
Ligamenti et
nerui in mu-
sculo necessi-
tas.

Hec ex pri-
ma figura
seriatim pe-
tes.

Musculi natura inter ligamentum & neruū esse medium.

Ligamenti & nerui permixtio.

Musculi caput. Finis seu cauda & tendo. Venter.

Carnis in musculo usus.

Vene ac arteriae in musculo necessitas. Musculi membrana.

Musculum non a quo nerui, ac ligamenti natura participare. Li. de Motu musculorū.

stare poterat, ipsum tamen motus uoluntarij organum per se nequiuit produci, quum originē ex ossē aut cartilagine, nō autem nerui modo, ex uoluntarij motus fonte obtineat. Nemo enim ambigit huiusmodi fontis seu principij corpus molle oportuisse fieri, quandoquidem neq; ex molli perfectē durum, neq; ex duro molle quicquam enasci possibile est. Propter has igitur necessitates Natura neq; solis ligamenti uti ad motus uoluntarios potuit, quoniam neque sensu, neq; motu prædita sunt, ut quæ animæ principatus sedi non continuentur. neq; neruis etiā solis utendum fuerat, cū hi propter mollitiem tenuitatemq; transferre tam magna pondera minime ualerent. Permixture igitur ex ambobus oportebat aliquod creati motus organū, quod omnino neruo esset durius, & ligamento mollius, & ideo quoq; participare sensu, minus quidē quā neruus, magis autem quā ligamentum. Insuper decuit & id quoq; in medio roboris et imbecillitatis, aliorumq; contrariorum, quæ ligamenti & neruis insunt, existere. Atq; hac occasione motus instrumentum, utrisq; ipsum componentibus substantijs cōmunicat, non tamen exactē alteram, neq; solam, neq; eam impermixtā obtinet, sed ex ambabus cōmiscetur. Verū quum nihil alicui per totum confundi potest, non confractum prius in minimas particulas, necessarium fuit utrunq; neruum uidelicet & ligamentū, in fibras tenues discindi, deinde sibi inuicem eas copulari ad uoluntarij motus organi generationem. Perficitur enim nerui ac ligamenti in fibras distributio in hūc modum. Neruus accedit ligamentum, ac simul cōmixta in fibras duas quodam modo digeruntur, illæ rursus singulæ in alias, & hæ iterum in plures tantisper diuiduntur, donec in tenuissimas membrancasq; fibras procedant, postquam hæ ad extremum diffusionis peruenere, rursus ut diuisæ fuerunt, mutuo concursu coalescentes, & commixtæ in unum colliguntur. Et quemadmodum^a prima diuisio musculi caput constituebat, ita hæc^b postrema collectio finem musculi efformat, quem Græci ἀρρῶσις, quasi eneruationem dixeris, et ut nos quoq; tendinē musculorum, appellant. Medium uerò, in quo diuisionis series cōsistit, musculi uentrem nuncupamus, similitudinem à mure, & lacerta, & piscis musculi, aut alioquin communi pisciū forma mutuantes. Musculi namq; seu lacerti caput, muris lacertæq; capiti conferimus, tendinem autem caudæ, & uentrē uentri. Ceterū si Natura solummodo ita neruum & ligamentū diuisisset, nec medias regiones, fibrarumq; interstitia molli infarsisset substantia, quæ fibris, thori ac texturæ alicuius, & firmæ sedis loco esset, haudquaquā musculi uel tantillo temporis spacio fibras illas infractas incorruptasq; seruarent. Est autem sedes ea ac thorax, simplex caro fibris obducta, quæ nō aliter fibris cōmittitur, quā in calathis alijsq; fiscellis, in quibus lac harum rerum periti coagulant. Finge igitur fibras ex neruo & ligamento diffusas, iuncis respondere, lacti uerò ipsi sanguinem, et caseo carnem proportionari, nam ut ille ex lacte, ita hæc ex sanguine paratur. Quamquam tanto ueriores tibi confinges imaginem, quo per caseum plures crebrioresq; iuncos funiculos ue porrectos, & nō solum ad casei latera attensos imaginatus fueris. Ne autem caro hæc, reliquaq; musculi substantia, sanguine nutrimentoq; indiga relinqueretur, & suus innatus calor non refocillaretur, uenas ac arterias, tanquam riuulos quosdam musculis immisceri fuit necessarium. Deinde quoq; membranam uniuersum musculi corpus integentem à ligamenti, quæ musculi caput & finem ossibus committunt, produci oportebat. Commemorata iam musculi constructio, ad amissim nulli prorsus conuenit musculo, quū nullum in uniuerso corpore adinuenias, qui parem ligamenti, seu ex ossē aut cartilagine exortus sui, & nerui portionem sibi assumat. Quod sanē innuebat Galenus, quū Musculum inter ligamentū & neruum natura medium esse assereret, alibi tamen animaduertens non parem nerui portionē, ligamenti portioni in quibusdam musculis misceri. Nam ut cæteros ta ceam, tendo posteriorem in calcis sedem insertus, solus crassior est^c quatuor femur petentium neruorū radicibus, utcunq; eas simul collegeris. Deinde si nunc omnes tibiæ insertos tendines ac reliquos pedis ossa accedentes perpenderis, quæ nunc cum tendine illo, in calcem inserto erit proportio, ut illa scilicet mediam tendinū portionē neruo, & mediam ligamento formari ostendat. Profecto si tendines neruis hūc comparabuntur, neutiquā nonagesimam tendinū portionem neruis constare fatebimur. Deinde si fortassis aliquis musculus parē ligamenti & nerui portionē sibi uendicare reperiretur, esset profectō temporalis, & septum transuersum, quippe in hoc^d duo satis insignes nerui implantantur, illum uerò etiā^e quinque neruorū propaggines adire docebo, quamuis interim in neutro ne trigecupla nerui cum ligamēto uideatur proportio. Sed quid tantopere Galeni præcepta tanquam oracula subuerentes, & ipsius libros de Musculorū motu exosculantes, de illis dicemus musculis, qui latissimo oriuntur principio, ac sensim in angustū uersus ipsorū insertionē desinunt: cuiusmodi inter reliquos brachiū^f attollens est, deinde is qui brachiū pectori admouet, & femoris motibus famulantes propemodū omnes, in quorum exortibus neruū, qui ut Galenus censet, cum ligamento diffundi possit, confingere nequimus.

^a 1 fi. D.
^b 1 fi. F.

^c 1 fi. E.

^d 14 ta. tendo musculo
rum n. o. q.
^e 2 fig. cap.
11 li. 4 cha.
57, 60, 66,
71, licet uer-
ra propor-
tio ex ner-
uorum tabu-
lis, ut neq;
uenarū, pe-
ti nequeat.
^f 4 ta. r
8 7 ta. Δ.
^h 2, 3 fi. ca.
11 li. 4 n.
ⁱ 2 fi. ca. 2.
li. 4 Q. R,
b, c, d.
^k 4 ta. 2. 10
ta. Δ.
^l 3 ta. Δ.

mus. Nam statim in eiusmodi musculorū origine multò maior fibrarū est copia, quàm in musculi reliqua parte, siquidem in illis musculis, & præcipuè qui femoris motibus præfunt, fibræ ab ipso ortu nō amplius in plures diuiduntur, imò sensim ad insertionē properantes inuicē colliguntur, musculos triangularis figuræ efformantes. Vnde etiā conspicuū euadit, si modò illa, quam Anatomici proponunt, nerui ac ligamēti diuisio cōmixtioq̃ in musculis fieri oporteret, singulis fibris in ortu neruulū debere misceri, quod neutiq̃ accidere ipsa neruorū series cōmonstrat. Quandoquidē in plerisq̃ musculis duntaxat neruulum admodum gracilem, neq̃ magis quàm uenā diuisum, ad superficiem musculi nunc interiorē nunc exteriorē, uenę ac arteriæ modo exporrigi, membranæq̃ musculi adhærere conspicias, neutiq̃ autem in fibras per musculi substantiam diffundi. Quod inter plerosq̃ corporis musculos in illis liquidò condiscas, qui ab ilium ossē femoris os accedunt, ex quibus etiā quosdam reperiās, quorū ne superficiē quidem neruus, uti neq̃ uena & arteria, uix ut contiguus omnino sit, attendatur. Neq̃ id hīc solum obseruabis, imò etiā in quadrato musculo radiū in prouum mouente, cui nuncq̃ neruum, uenam & arteriam exporrigi intuitus sum: præter illos neruos, uenas ac arterias, quæ cum tendinibus digitos flectentib. ad extremā manum prorepunt, quæ etsi à musculo illo nō multum distent, ipsum tamen nō contingunt. Adde neq̃ neruulū obseruari insertum in graciles musculos, qui quatuor digitos obliquè pollicis adducunt, ut neq̃ in illos, qui primi quatuor digitorū ossis flexionibus præfunt. Adiunge præter hos, abdominis etiā musculos (quos prius, quia omnibus notiores sunt, recensere decuerat) nullam nerui cum ligamento proportionē ostendere, quum nequaquā in singulis musculorū, qui obliquè & transuersim fibras porrigūt, principiorū sedib. neruus implantetur, et quoniā ipsorū eneruatio seu tendo multò latior sit, q̃ musculorū origo. Non est itaq̃ musculus inter ligamentum & neruū natura medius, neq̃ etiā illa, quā imaginantur, ligamēti & nerui sit cōmixtio. Nam etsi fortē neruū in musculi alicuius caput inferi animaduersurus sis, nuncq̃ sanē nerui soboles ligamēti fibrarū modo, ad tendinis usq̃ principiū diffundi, aut aliquo pacto ligamenti fibris uniri, uereq̃ permisceri reperiēs. Neque id profectò in ullo musculo perpendes facilius, q̃ in illis qui ab interno humeri tuberculo principiū capiunt. illo rum etenim capita sunt acuta, & neruorū insertiones in ipsorum substantia, nō solum autem in superficie adipiscuntur. Atq̃ id etiā in illo animaduertes, qui à fibulę superiori appendice principiū sumens, ad pedem prorepit, sic & in illis, qui ab inferioribus femoris capitū radicibus ad calcem feruntur. Non enim omnes musculi, nerui implantationē (etiā si quando in ipsorū substantiā neruus porrigitur) in capitis exortu adipiscunt, sed subinde multò inferiūs, q̃ caput habetur, & in medio sui quodāmodo ductus & longitudinis, quod anterior flectentiū cubitum musculorū ostendit, nerui primū propaginē assumens, ubi duo ipsius capita in unū cōeunt. Idem in nōnullis femoris os amplexantibus obseruatur, & in abdominis musculis, & plerisq̃ qui in collo habentur, & in omnibus ferē qui costis insertuntur. Verū utcunque nerui, uel in musculi substantiā sese insinuent, siue ipsius tantū superficiē attēdantur, ferē semper sua serie & propaginibus, secundū musculi ductū porriguntur. Rursus tendo elixus neq̃ sapore, neq̃ colore, neq̃ substantiā à ligamento uariat, nisi fortassis illum molliorē, nō quidem omnibus ligamenti, sed tantū quibusdam esse quis contenderet, ut ut tamen sit, tendo musculi capitis molliciei nequaquā cedit, quāuis id statim in ortu purū esse ligamentū, nemo inficias ire possit. Neque etiā mirandū esset, tendinē ligamento ossa colligāt ut plurimū molliorem, minusq̃ cartilagineū esse, cū ligamentorū, quæ ossa mutuò colligant, in duritie eadē nō sit ratio. Adde etiā, tendinē elixū cum neruo nō proportionari, hic enim elixus aut crudus, si per transuersum diuidatur, ex multis quasi funiculis constructus apparebit nō aliter, q̃ si chordam aliquā crassiorē diuissēs. tendo autē solidior, & ut ligamentū similis magis, cōtinuusq̃ uisetur, præcipuè si crassum aliquē tendinē ex illis, qui pedē aut tibiā, aut extremā manum adeunt, examini adhibueris. In latis enim & quodāmodo membranis tendinibus series fibrarū est manifestior, quo etiā nomine à ueris membranis inter dissevandū distinguūtur, quemadmodū in peritonæi cum obli quorū & transuersorū abdominis musculorū neruosis tenuitatibus collatione est cernere. Et quamuis id in quouis animāte inter edendū intueri integrū sit, in bubula tamē carne id feceris aptissime, cū pars aliqua mensæ apponetur, quā insignis perreptat neruus, qui plerunq̃ cum uena & arteria inter glandulas conspici consueuit. Inueto neruo nuncq̃ tendo deesse poterit, qui modò proposita nō edoceat. Deinde id, quo alij tendinē neruo misceri, atq̃ ex ligamēto & neruo equaliter, aut plus minus confusis fieri, maximè probare contendūt, prius num ita, ut illi proponūt, res se haberet, perpēdendū erat, priusq̃ aliquid inferrēt. Dicunt namq̃ tendinē capite musculi ob id crassiorē esse, quod is non capitis solū musculi substantiā, sed & neruo quoq̃ cōstet.

Quasi uerò quis rectē dicere possit, exortus musculorū surg simul collectos, quod ad nerueam

T 3 attinet

Neruum sit
gulis muscu-
lis, ut alijs dis-
sectionum pro-
fessoribus ui-
sum fuit non
misceri.

Omnium mu-
sculorum capi-
tib. neruos nō
inferi, aut alio
quin attendi,
etiā si alijs
ipsorū substan-
tiā neruus in-
seratur.

Tendinem li-
gamento, non
autē neruo re-
spondere.

Ex carne mu-
sculi caput,
tendine nō sem-
per esse tenui-
us.

m 9 tab. n.
10 tab. s. 11
ta. s.

n 7 tab. x.

o 6 tab. s. 7
ta. d.

p 8 ta. d.

q seriatim

abdominis

regio 3, 4,

s, 6 tabula-

rum.

r 3 ta. n. a.

m. 9 ta.

q.

s 6 ta. d.

t 12 ta. d. r.

u.

u 6 ta. d.

x 2 fig. cap.

11 li. 4, 5, 5.

y cōfer ab-

domen 6 ta

bule cum

abdomine

figuræ li. 5.

a collige id

ex 14 ta. n.

o, q.

*Musculorū
capita maxi-
mè carnis ex-
pertia, non mi-
nus, quàm ten-
dinem sentire.
Quid nervi
musculis uerè
præstent.*

*Qualiter mu-
sculi suum mu-
nus obeant.*

*Quid uerè mu-
sculus sit.*

*Caro præci-
pua musculi
substantia.*

*Adipem etiā
carni passim
attendit.*

*Tendines
quando muscu-
lis dentur.
Musculi ten-
dinib. destituti.
L. i. de Mo-
tu musculorū*

attinet substantiam, minores esse illorum musculorū tendine, qui calci inseritur. aut quasi^b bra-
chium attollens musculus, pauciores fibras in ortu haberet, quàm ipsarum collectio ad insertio-
nem ostendit. Erat itaque id prius probandum, quàm falsa conclusio inducenda. Quemadmo-
dum & hæc quoque inefficax assumptio est, tendo sensu exactissimo participat, nervo igitur &
ligamento constat. Quasi uerò musculorum capita, & præcipuè ligamentosa, & prorsus excar-
nea, minus ipsis tendinibus sentiendi ui pollerēt, & læsa conuulsionis periculum minus, quàm
tendines inducerent, etiam si capitibus mox in exortu nervus non inferatur, sed tantum atten-
sus occurrat, isq; etiam subinde notabili intervallo à capite remotus. Hac occasione & huiusmo-
di pluribus, quas recensere prolixū foret, efficitur, ut asserere cogar nullam prorsus aliam nervi
in musculos, quàm uenæ & arteriæ distributionem esse, & pari etiam ratione nervum, qua ue-
nam arteriamq; musculus accedere. Neque ullam aliam in uena arteriaq; cum nervo differen-
tiam statuo, quàm quòd ad finem seu insertionem musculi nervus nunquam, ut aliquando illa
uasa, implantetur, quanquā etiam paucissimos prorsus musculos eius generis enumerare possi-
mus. Sunt autem inter alios^c recti abdominis, qui & à uenis & arterijs sub pectoris osse deor-
sum deductis, ramulos assumunt, & temporalis etiam ab inferioribus suis sedibus^d uasa ad-
mittit, quum is tamen interim ex elatioribus principium deducat. Præterea ut uena nutriendo
musculo subseruit, & arteria ipsius innatum calorem recreat, ita quoq; nervum animale spiritum
continué ipsi deferre, nervumq; illo spiritu musculus nunquam indigum relinquere ar-
bitror, ut neq; uena alimento musculus destituit. Deinde spiritus animalis ui, & debitæ pecu-
liarisq; musculi constructionis gratia, musculus contrahi laxariq; sentio, neq; aliter suo mune-
re fungi, quàm oculum, reliquaq; sensuum organa. quæ singula propriam singularemq; fabri-
cam obtinent, & animali spiritu (quē per nervos cerebrū ipsis porrigit) imbuta, suis funguntur
munijis. Nō enim alius animalis spiritus oculo, aut linguae aut auditus organo, quàm musculis
diffunditur. Verū suæ constructionis ratione, & accedente spiritu, oculus uidet, lingua gu-
stat, auditus organum sonos percipit, & sanè musculus ipse uoluntarijs motibus præest. Atq;
hac etiam ratione omnia, quibus nervus attenditur, sentiendi ui pollent, nisi propria eorū sub-
stantia id prohibeat. Ceterum ut quamplurimos musculos arteria non contingit, quorundam
autem superficiei tantū attenditur, & aliquando adnascitur, interdum uerò etiam in musculorū
substantiā penitus ramos exporrigit, & interim omnium calorem temperat, tam eorū scilicet quos
nō proximè contingit, q̃ illorū quorū superficiei adnascitur, ac penitus in ipsorū substantiam
diffunditur, ita profectò & nervis usu uenit, qui suam facultatē tam illis musculis exporrigunt,
quibus uix attenduntur, q̃ quorū superficiei adnascuntur, & in quorū substantiā aliqua ramo-
rū serie digeruntur. Quanquā nervos propinquius uenis q̃ arterijs assimilare queas. Pauciores
enim musculi uenæ, q̃ arteriarū attactu insertioneq; destituuntur, licet etiā quosdā prius recensue-
rim, quos neq; nervo, neq; uena contingi obseruabis, qui nihilominus interim, ut neq; alimēto
& uitali facultate, ita quoq; spiritu animali nō priuātur. Est itaq; musculus, uoluntarij motus in-
strumentū, uti oculus uisus, & lingua gustus, ex ligamētī natura in fibras cōplures diuisa, & car-
ne has cōtinentē firmantēq; fabricatū, uenarū, arteriarū & neruorū surculos in se interdū assu-
mēs, ac neruorū beneficio animali spiritu nunq̃, dū sanū est animal, destitūtū. Atq; hanc carnē,
præcipuū motus organū esse existimo, & nequaquā duntaxat fibrarū thorū & fulcimentū. perin-
de sanè, ac cerebri, cordis, iecoris, pulmonū, lienis, renū & uentriculi propriā substantiā, prima-
riū suarū functionū autorē esse suo loco dicemus. Quòd uerò musculorū carni, aut carni simpli-
citer, nullum adipem intexi, omnes hæcenus falsò prodiderint, obesi boues, quos Brabantī sa-
le cōdiunt, attestātur, in quorū musculorū fibris per carnē adeps attenditur. Adde etiā obesarū
mulierū musculos, qui femur extendunt pinguitudine, adeò oppletos uideri, ut ambigas, num
caro adipi, an adeps carni cōmisceatur. Neq; hīc de musculorum superficiei solum loquor, ue-
rū de intima ipsorū substantia, et maximè carnea, quā præcipuā musculi partē esse asserui. Ten-
dines aut & enervationes illæ, quas caro destituit, in illis tantū musculis habētur, qui longo du-
ctu feruntur. Breues enim tēdine carent, & undiq; carnosi sunt, ut laryngis omnes, si^f duos re-
ctos exceperis, quatuor tertiam cartilaginem primæ iungentium, illi enim in insertionē ner-
ueam naturā obscurè exprimūt. Deinde inter eos, qui ossa mouēt (etiā si Galenus sæpius aliter
inculcet)^g qui primū pollicis flectūt articulū, & ^h qui pollicē indici maximè admouet. Inter ma-
gnos aut huius generis est quadratusⁱ musculus, scapulā dorso ad mouens, & ^k musculus, qui à
scapulæ basi enatus, octo elatioribus costis implantatur. Verū de musculis tendine carentib.
tendinumq; generib. iā agemus, musculorū differētiās aggrediētes, quibus ne præsens Caput
nimium excrescat, iam peculiare tribuimus, post differētiās de musculorum functionib. ac nu-
mero aliquid subnexuri, priusq; priuatam singulorū musculorum enarrationē auspicabimur.

*b confer A,
B, C, cum D
in figura in
dici u tabu-
la inserta.*

*c obserua 6
ta. f. a.
d 3 ta. r.
e fi. ca. 6 li.
3 e. & fig.
ca. 12 g.*

*f 6, 7 fi. ca.
21 P. Obli-
qui autē 7,
8 fi. R.
g 6 ta. n. l.
h 11 ta. f.
i 10 ta. r.
k 7 ta. L.*

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER II.
DE MUSCULORVM DIFFERENTIIS.
Caput III.

223



DIFFERENTIAS musculorum nō paucas recensere promptissimum est, ab illorū uidelicet substantia, ortu, insertione, quam mouent particula, forma, foraminibus, colore, situ, fibrarum specie, & musculi capite, uentre, tendine, ac denique ex mutuo musculorū cō cursu, aut unius musculi uelut in plures separatione. Quæ à substantia petuntur differentiae, ex uenis, arterijs, neruisq; imprimis pendent. Nullum enim corporis musculum reperiās, qui non aliqua ligamenti portione in fibras defecta, & carne illas continente firmantēq; constituatur. Verūm præter hæc alij neruum, arteriam & uenam in suum corpus quoque diffundi sinunt, ut^a septum transuersum, & maximus totius corporis^b musculus, qui femur mouentium quintus erit, præterea abdominis omnes ac præcipue^c recti. In alios neruus nullus, neque uena, neque arteria inseritur, ex quorum classe^d musculus est, qui latum in manu educit tendinem. deinde præter alios quāplurimos, quadratus^e musculus radium in prouum uertens, &^f graciles illi, qui digitos ad pollicem in latera agunt. Solus neruus quibusdam propaginibus in illorum^g musculorum capita distribuitur, qui à radicibus capitum femoris principium sumunt, atque ad calcem ducuntur. horum nanq; substantiæ neque uena, neque arteria penitus inseritur. Latus in collo^h musculus, qui genas mouet, uenis abundat & neruis, tamen arteria interim destituitur. Qui uerò solam nanciscitur arteriam, nullus occurrit. Cæterū adeps, quem interdum musculorum fibris per carnem digestis attendi diximus, in macilentis non reperitur. In obesis autem illi musculi adipe potissimum abundant, qui ilium ossibus obducuntur, ac clunes, & ueluti sedentibus puluinaria constituunt. In ortu magis adhuc musculi uariant, nam omnes, & si Galenus non semel aliter affirmet, ab ossibus suum principium nequaquam mutuuntur, uerūm alij ab osse ipsorum ligamenti originem sumunt, ut^k qui à femoris osse & coxendicis osse ad tibiam procedunt, & plurima musculorum multitudo. Alij à cartilagine ipsorum ortum obtinent, ut omnes laryngis musculi, quos laryngis proprios nuncupabimus, deinde intercostales musculi, qui inter costarū cartilaginum habentur interualla. Alij à membrana quapiam enascuntur, cuiusmodi sunt oculi omnes^m musculi, à dura membrana uisorium neruum inuolunte nati, deinde duoⁿ musculi stomachum retro amplexantes, & in scutiformis cartilaginis latera inserti, his nanque ab externa stomachi tunica principium pendet. Idem. & de^o circulari ani, & uesicæ ceruicis musculo censendū uenit. Alij à membrana tendines obuolunte enascuntur, ut quatuor graciles^p musculi, quatuor manus digitos ad pollicem in latera ducentes. Alij ab alio quouis ligamento originem exigunt, cuiusmodi sunt^q duo pollicis primum internodium flectentes, qui à transuerso^r ligamento tendines in brachialis interna sede transmittente enascuntur. Tales etiam sunt, qui in superiori pedis regione locati, pedis digitos extrorsum ad latera mouent, qui à ligamentis tibiam talo, & talum calci, & nauiformi ossi, calcemq; cubiformi ossi colligantibus enascuntur. Alij ueluti ex altero musculo prodeunt, ut^s qui à circulari ani musculo, ueluti digiti duo, meatum urinarium, quā sub penis corporibus ferri incipit, amplexantur. Alij rursus ex nullo principium ducūt, uerūm membranæ partes aliqua sui sede carneæ, ac musculosæ seu musculi fiunt. Huius ordinis sunt omnes^t musculi ex carnea membrana constituti, qui in collo & facie in hominibus habentur, deinde & testis^u musculus in rubicundo testium uasorum seminalium inuolucro, instar carnosioris lineæ innatus. Quinetiam septi transuersi ortum, ex peritonæi, & tunicæ costas succingentis partibus, ipsius centro adnatis pendere fateamur, necesse est, nisi illius ortum cōtra aliorum musculorum rationem, ubi costas inseritur, esse dicamus. Cæterū non omnes musculi ab una duntaxat parte originem sumunt, permulti enim ex pluribus ossibus enascuntur, nam dorsum mouentibus musculis plures ferè uertebrae principium præbent. Sic & abdominis^v musculus oblique descendens, à pluribus costis exorditur. Qui brachium pectori admouet, ex pectoris osse, & quarundam costarum cartilaginibus, & ipsa demum clauicula enascitur, quemadmodum & is^h cuius auxilio brachium attollitur, ex scapula quoque & clauicula procedit. Pariter etiam^c recti abdominis musculi, à^d cartilagine pubis ossa interueniente, & ab ipsis ossibus enascuntur, adeo, ut quidam musculi ex pluribus ossibus, alij ex osse cartilagineq; non inepte principium habere dicuntur. Alij ex eiusdem ossis pluribus processibus enascuntur, ut^e prior flectentiū cubitum, qui ab eminentiori sede ceruicis scapulæ & processu ipsius interno, quem anchoræ assimilauimus, educitur. Ab insertione uerò integrum est dicere, alios in os, ut qui femur, & tibiam caputq; mouent, inseri. alios uerò in cartilaginem, ut

Vnde musculorum differentia petantur.

A substantia

Ab ortu.

Ab insertione

T 4 laryn

a 7 ta. Δ.
b 12 tab. Σ.
c 6 ta. f.
d 3 ta. π.
e 7 ta. X.
f 6 tab. f. 7
ta. d.
g 12 tab. φ.
h 3 ta. r.

i 9 ta. π. 10
Σ. 11 Σ.
k isti in sedi
bus, quas oc
cupāt, in ta
bulis sunt ci
tra notarū
opem cōspi
ciendi.
l 6 ta. X.
m 1, 2 figu.
ca. 11.
n 2, 3, 5 fig.
ca. 21 l.
o 1, 2 fi. ca.
49 M. dein
4 fi. N.
p 6 tab. f. 7
ta. d.
q 6 ta. κ. λ.
r 4 ta. θ.
s 6 ta. Ω.
t 1, 2 fi. ca.
49 H. I.

u 3 tabu. A.
dein r.
x 22 fi. lib.
5 r.

y 3 ta. Θ.
z 3 ta. Δ.
b 4. tab. Σ.
10 ta. Δ.
c 5 ta. Δ.
d integrarū
fi. li. 1. r.
e 6 ta. Θ.

ryngis omnes, & qui palpebrarum motuum autores sunt, & qui narium alas mouent. Alios in cutem, ut labrorum musculos, alios in aliud quidvis, ut oculorum musculos in duram oculi tunicam, & penis quatuor musculos, in penis corpora, & urinæ meatum, dein testis musculū, in uas semen à testibus sursum deferēs. Ad hæc musculos recto intestino proprios, in eius intestini exteriorem tunicam, & circularem uesicæ colli musculum, ad meatus urinæ corpus applantari inferiq; cernimus. Cæterum & ab insertione musculi isto quoq; modo differunt. Quidam à pluribus partibus enati in unicam inferuntur, ut musculus brachium pectori admouēs, & is qui brachiū attollit, ex pluribus orti sedibus, duntaxat in humeri os inferuntur. Ita etiam qui brachium deorsum trahit, ex plurium uertebraū spinis oritur, attamen in unicum humeri os tantummodo desinit. Pari etiā ratione & scapulæ motuū autores musculi ad unum omnes, ex pluribus ossibus initium sumunt, & uni tantum scapulæ implantantur. Quidam uerò ex uno osse exorti in plura inferuntur.⁸ Musculus enim qui à scapulæ basi prodit, respirationi q; subministrat, in octo superiores thoracis costas inseritur. Eius quoq; generis sunt, qui quatuor pedis & manus digitos extendunt, deinde¹ qui nasi alas simul superius labrum mouent, in cutem cartilaginēq; implantantur, quemadmodum & septum transversum, quod alicubi ossi, alicubi cartilagini innascitur. Quidā etiam à pluribus enati ossibus in plura quoq; inferuntur, ut^k musculus à ceruicis uertebraū spinis enatus, qui in aliquot superiores thoracis costas implantatur, thoracemq; mouentium in homine tertius habebitur. Præterea dorsum mouentes musculi ad unū omnes, in hunc ordinē ferè referuntur. Item his differentiis illæ cōsentiunt, quæ ab ea quam musculus mouet, particula desumi possent, quum omnes musculi eius, cui inferuntur, partis uoluntario motui præsent. Porro ab insertione & ortu simul alia sumitur differentia, quū alij musculi ab illo osse oriantur, quod mouendo ab illis ossi, cui etiā inferuntur, alligatū est, proximumq; uisitur, ut^l tres musculi ex ilium osse in femoris os inserti,^m septimus & ⁿ octauus tibiā mouentium, qui à femoris osse enati tibiā implantantur. Alij uerò à superiori aliquo osse, & nō illi, cui inferuntur, proximo originem ducūt, ut musculi tibiā motibus famulantes, qui à magnis ossibus sacro ossi connexis principiū obtinent, ex quorum numero sunt uniuersi tibiā mouentes, septimo & octauo tantū exceptis. Istis respondent, qui secundū cubiti aut tibiā longitudinem extensi digitos adeunt. Forma etiā omnium musculorum haud eadem est. Quidā enim sunt, quos muri aut lacertæ (si ipsis pedes tantū absectos finxeris) ac pisci musculo, & alijs multis piscibus appositè cōferas, ut scilicet musculi caput, lacertæ, aut piscis, aut muris capiti, uentrem autem corporis trunco, tendinem uerò caudæ assimilare queas. Est autem huius ordinis musculus,^o qui ab interno humeri tuberculo enatus, ac radici postbrachialis ossis, quo index sustinetur, insertus, brachialis flexioni subseruit. Talis etiam est,^p qui primus in tibiā anteriori sede occurrit, & in pedis os, cui magnus digitus articulatur, insertus ad pedis eleuationē famulatur. Sunt & alij eius generis nō pauci, uerū nullus æquè ac duo nuper dicti muris effigiem expriment. Qui autor est maximæ pollicis abductionis à cæteris digitis, & alius qui paruū digitum à cæteris maximè in latus amouet, tam in pede, quàm in manu, ad nuper dictā quoq; figurā eleganter accedūt. Vnde etiam arbitror, inter reliquos corporis musculos (quasi nulli essent alij) illos,^q qui ad pollicis primum articulū habentur, Bruxellensibus, & alijs quibusdā nationibus mures nuncupari, alijs uerò ita appellari cubitū flectentium^r anteriorem. Italarū autem uulgus in quibusdā corporis partibus, nescio quem, pisciculum esse fingit, eo nomine indicans musculos piscis imaginē non absimiles. Vt cunq; sit, ab eiusmodi murium, aut musculi piscis, aut lacertarum similitudine, omnes musculi à Græcis & Latinis suum nomen fortiuntur, etiā si quamplurimi musculi illorum animalium effigiem nulla ex parte referāt. Quandoquidem alij figura triangulari constet, ut brachium^s attollens musculus, & is qui scapulam pectori adducit, & qui brachium declinē ad dorsum uellit. Alij quatuor constent angulis, ut scapulam dorso admouens^t musculus, & ^u qui ad brachiale positus, radij motus in pronum autor est, qui ambo etiā quadammodo quadrati sunt, ut & latus sub colli & genarum cute occurrens^x musculus, qui ex carnea membrana cōstituitur. Alij etiam quinque angulos exprimunt, ut is^y qui brachium pectori adducit, quamuis illum alij non ita exactè illius latera perpendentes, triangularem esse asseruerint.^z Qui ex scapulæ basi natus, octo superioribus costis inseritur, si obiter spectetur, quadrangularis apparebit, at si ipsius in costas insertiones quis perpenderit, tot angulos illius insertionis lateri tribuet, quot digitis implantari uidet. Atq; huius etiam figuræ est, abdominis^b musculi obliquè descendens exortus, & quorundam thoracem mouentium insertio. Sed plures anguli etiam tribuuntur musculo, latum tendinem sub manus cute producenti, & alijs omnibus in plures tendines cessantibus. Verū angulis his postpositis, mirabilis formæ est^c musculus, singulis costarum radicibus tendines exporrigens, quem aloēs radici, aut palmiti nō ineptè assimilaueris,

Ab ea quæ mouetur particula.

A forma

Musculi nomen unde desumptum.

f 10 ta. 6.

g 7 ta. L.

h 5 tab. 6.

ta. 3. 14 ta.

o, de in 3.

i 3 ta. F.

ku ta. F.

l 9 ta. n. 10

tabule 3. 11

tab. 3.

m 5 tab. A.

n 5 ta. n.

o 3 ta. A.

p 1 ta. 2.

q 1 ta. i.

r 1 ta. Q.

s fig. indici

11 tabule in

ferta.

t 10 ta. r.

u 7 ta. X.

x 3 ta. r.

z 3 4 ta

bule Δ.

a 7 ta. L.

b 3 ta. 6. 7.

charact. 6,

7, 8.

c 12 ta. Δ.

ueris, ut radicis quidem truncus, musculi carnosā esset pars, tendines autē surculi, quos genicu-
latim ab humiliore tantū parte radix pullulat. In palmite uerò lignosa pars, musculo conferetur,
folia autē ab altero duntaxat latere educta, tendinibus. Quinetiam huius quoque ordinis est, lon-
gissimus dorsum mouentiū^d musculus, qui in apices transuersorū processuum thoracis uerte-
brarum potissimū inseritur.^c Septi quoque trāuersi figura admodū rara est, accedit autē raiaē
(quem *Βελτρον* Græci appellāt) piscis effigiei, si modò illi prius caudam secundū longitudinē
diuisam finxeris. Anulis uerò respondent, qui fæcium excretionibus præficiuntur, tam is scili-
cetⁱ qui ad anum spectat, quā^m qui orbiculatim uesicæ ceruicem ambit. Piramidem uerò &
turbinem^h musculus refert, inter oculi musculos ordine septimus, oculique radici insertus.ⁱ Mu-
sculus quem palpebram deorsum agere credimus, nostro C similis uisitur. In tibiæ etiam po-
steriori sede iuxta calcem,^k musculorum imagines occurrunt, laniorum securi non admodum
ab similes, ut musculus secundum pollicis os flectens, & qui tertium quatuor digitorum os fle-
ctit, & unus qui sub planta tendinē porrigens, ad pedis in posteriōra reflexionē iuuat. Ho-
rum nanque musculorum uenter, securis ferro, tendo autem, capulo obscurè respondet. Iam si
utriusque lateris^l musculum, qui secundus inter scapulæ motores habebitur, cōsideraueris, non
à satanæ qui Iesum in deserto tentauit, sed ab horum musculorum forma Franciscanos, Iaco-
bitas, & præcipuè Benedictinos suæ cucullæ imaginem mutuassee contendes, quantum scilicet
eius dorsum scapulasque integit. Verū ne in musculorum figuris recensendis, & potissimū
eorum, qui ad femur tibiāque pertinent, in monachos alicubi præter sententiam religionemque
impingam, duntaxat cōmemoratis à figura differentijs adiiciam, quosdam musculos amplio-
rem multo habere insertionem, quā^m ortum, qualis^m ille est, qui à scapula pronatus octo tho-
racis costis inseritur, deinⁿ transuersus abdominis musculus, quemadmodū & oblique descen-
dens. Alij latum obtinent principiū, & sensim coarctati in acutum feruntur, ut^p musculus bra-
chium sursum agens, &^q alius qui id deorsum ad dorsum trahit, præterea omnes ab ilium
osse in femur inserti. Alij ortum^r insertioni æqualem nanciscuntur, ut^r qui scapulæ basi inser-
tus eam dorso attrahit, dein &^s intercostales omnes, præterea quadratus^t musculus in cubito,
iuxta brachiale reconditus, radiumque in pronum circumuertens. Ex enarratis musculorum
differentijs liquidò constat, alios esse longos & graciles, ut eum^u qui ab ilium ossis appendi-
cis anteriori parte in tibiā fertur, totiusque corporis longissimus est, & etiam gracilis.^x Mu-
sculus à scapula ad hyoides os productus, pro sua proportionē similiter longus & gracilis est,
quemadmodum & testium^y musculi. Alij autem ampli & longi quoque sunt, ut abdominis
oblique descendentes musculi, & septum transuersum. Alij breues & ampli, ut intercostales,^e
quorum amplitudo secundū duarum costarum interualli à dorso ad pectoris os ductum
procedit. Tanto autē longiores uisuntur, distātia à superiori costa ad inferiorē spectante, quan-
to ipsorum ductus à costa ad costam recto obliquior est, ac in latus magis declinat. Huc quoque
referri possent insertionis principijque formæ, nam aliud principium uelut puncto tantum fit, ut
musculi latum tendinē in manu producentis principiū, & principia eorum^c musculorū, qui
à coxendicis ossis appendice pronati, in tibiæ ossa inseruntur. Quidā uerò instar simplicis lineæ
principium obtinent, ut^d is quo brachium deorsum, uersus dorsum trahitur, &^e is quoque qui
scapulæ basi insertus, eam dorso attrahit. deinde cum alijs cōpluribus,^f qui inter trahentes sur-
sum scapulam prior maiorque recensetur. Alij rursus musculi nō lineæ simplicis modo, uerū
latæ superficie ritu enascuntur, ut^g tres qui ab ilium osse femur adeunt, &^h musculi cauum gib-
bamque scapulæ sedem occupātes, quorū ope brachiū circumagitur. Quinetiā hæ lineæ superfi-
ciesque, in rectas circulares & angulares rursus subdiuidi possent. At ne hæc curiosius, quā de-
cet, aliquis me persequi arbitretur, ad alias differentias orationem reflectam, si prius addidero,
insertiones similiter alias rectæ lineæ instar, & secundū ossis longitudinē fieri, cuiusmodi est
musculi brachium pectori admouētisⁱ insertio, aliās per transuersum & lata apprehensione, ut
musculi brachium attollentis insertio. Velut punctum autem inseritur,^j tendo prioris musculi
flectentiū cubitum. Cæterum & ad formā quoque foramina fortassis spectāt, quæ quibusdā mu-
sculis insunt, ut^m septo transuerso bina obtigerūt foramina, quibus uenam cauā stomachumque
transmittit, quā autē magnæ cedit arteriæ, & uertebri uia præbet, uix foramine peruiū est, sed
seccione quadā inibi diuisum dici debet. Verū hæc septi foramina cum Hippocrate Galenus
malè animaduertit, qui etiam alibiⁿ orbicularem recti intestini musculum, &^o illum qui uesicæ
ceruicē ambit (quia anulum referūt) perforatos esse recensuit. Est & unus quoque perforatorū is
musculus, qui à prima thoracis costa pronatus, anteriori transuersorum ceruicis uertebRARUM
processuum sedi inseritur, ac uenam in brachium cum arteria tendentē transmittit. Alij forami-
ne nullo sunt peruij, ut corporis reliqui omnes, nisi fortassis quis intercostales ideo perforatos
esse

A forami-
bus.

Li. 5 de Admi-
nistrandis se-
ctionibus.

esse dixerit, quòd uenas, neruos & arterias, ad musculos costis instratos transmittant. Quan-
 quam etiam perforati dici possint^q musculi, qui secundo digitorum quatuor manus & pedis
 ossi tendines, qui id flectant, largiuntur, quò illi tendines longa sectione diuisi, subditum ipsis
 tendinem ad tertium digitorum os per ipsos còscendere sinant. In magnitudine autem muscu-
 li uariant, quòd alijs maxima constent mole, ut maximus corporis^r musculus, qui toti prope-
 modum femoris longitudini implantatus, femoris motorum quintus numerabitur. Deinde
 magnus quoque est femur mouētium^s primus, insuper & tibiæ motorum nonnulli, præci-
 puè autē^t septimus et^u octauus, sic & pedis motus autorum^x quartus, à fibula principium ob-
 tinens. Minimi uerò sunt,^y qui in tertiæ cartilaginis laryngis basi reponuntur, & qui primam
 cartilaginem secundæ copulant, dein proprii laryngis ferè omnes, ut & penis musculi. Reli-
 qui in horum medio consistunt, nunc maioribus, nunc minoribus accedentes. Omnibus mu-
 sculis ferè communis obtigit color, ubi enim carne uacant, neruorum corporum modo al-
 bent, quod in principijs & enervationibus præcipuè accidit, ubi autē carne abundant, carnis
 quoque modo rubent, cui fibræ nerueæ permiscetur. Porro ea parte qua rubent, interdum
 candorem unà obtinent, quod illis musculis usu uenit, qui tendinem, priusquàm caro desinat,
 in sui etiam uentris medio educere uidentur. Est autem talis,^a qui à fibula enatus inter calcem
 & fibulam, suo tendine inferiora pedis subit, atq; in os pedis pollicis præpositum inseritur, pe-
 disq; motorum septimus erit. Sunt etiam & eius generis in tibia nonnulli, quemadmo-
 dum & in cubito. alijs tale quid in ipsa insertionem ostendunt.^b Musculus enim brachium sur-
 sum trahens, propter ipsam insertionem, interna quidem sede, qua os respicit, candicat, exter-
 na autem magis rubet. Alijs musculi aliqua sui parte prorsus liuidi plumbeiue conspiciuntur,
 ut surc^c musculorum facile maximus, qui pedem mouentium quartus recensetur, deinde &
 nonnulli ab ilium osse enati, & præcipuè^d qui ex illis articulum proximè integit, femurq; mo-
 uentiū tertius erit, præterea & ex tibiæ motoribus aliquot, præcipuè autem septimus & octa-
 uus, ubi nonus illis incumbit. Liuior iste musculis accidit, peculiaris ipsorum membranæ gra-
 tia, quæ interdum adeò crassa est, ut prorsus non uideatur pellucida, unde quum crassa ner-
 uea sit, & caro subtus rubeat, aut nigricet potius, facile color ex nigro & albo permixtus cò-
 surgit. Quamuis nō idem carnis rubor in omnibus hominibus occurrat, uti sanè neq; sangui-
 nis, quo caro enutritur, natura eadem est. Porro albam hanc musculi substantiam, quæ adhuc
 excarnis est, in sermonis contextu nerueam, quasi diceremus ligamētosam, appellabimus, hac
 uoce illam à carnea distinguētes, uerūm quæ in harū partium media est, non inopportune liui-
 da nobis uocabitur. Par etiā situs omnibus musculis non contigit, quoniā alijs ad corporis ha-
 bētur superficiē, cutiq; accūbunt, ut omnes ex carnea mēbrana cōstituti, et alijs innumeri, quos
 ferè semper inter articulorum motores primos recensebo. Alijs penitus reconditi delitescent,
 ut in poplite latitans^f musculus, pubis ossium foraminibus proximè^g attensi, sub stomacho
 latitantes. Alijs rursus secundum membri longitudinem locantur, ut omnes in tibia repositi,
 illo tantū excepto, qui in poplite occultatur, obliquum^h que situm sibi peculiariter uendicat,
 ut & illi qui radij medię propemodum longitudini inseruntur, proprijsq; radij motibus sub-
 seruiunt. Transuersim autem fertur,ⁱ qui iuxta brachiale locatus, radium in prouum mouet.
 Quin etiam diuersum musculorum situm, seu potius fibrarum ductum, abdominis musculi
 eleganter ostendunt, quū^j alijs oblique deorsum in priora ferātur,^k alijs sursum oblique in prio-
 ra,^l alijs recta sursum,^m alijs prorsus orbiculatim transuersimq; . Fibrarum genus omnibus ferè
 musculis unum duntaxat simplexq; est. Nisi enimⁿ musculo brachium pectori adducenti, &
 etiam illi qui^o secundus inter scapulam mouentes est, duplex, & genarum labrorumq;^p muscu-
 lis multiplicius adhuc fibrarum genus tribuerimus, singulis prorsus musculis, unicum tantū
 fibrarum genus, musculorum ductui & formæ magna ex parte respondens ascribetur. Mu-
 sculi autem, quos ab aliorum numero uidebamur secludere, ita se habent. Musculus brachiū
 pectori admouens, fibras quasdam ex superioribus deorsum, uersus exteriora ductas exigit,
 quasdam uerò ab inferioribus sursum, etiam uersus exteriora. Qui scapulam mouentium se-
 cundus est, quasdam à superioribus deorsum in priora, seu extrosum protensas quoq; obtinet,
 alias autē ab inferioribus sursum similiter in priora, aut extrorsum. Vnde illis duobus duplex
 fibrarum genus accidit, quæ in illo cuius ope brachium pectori admouemus, in aliqua sui se-
 de, idq; potissimum iuxta insertionem, instar x se intersecant, seu decussatim feruntur. Illi au-
 tem, qui inter scapulam mouentes secūsus censetur, nulla obtigit fibrarum intersectio. Rur-
 sus si labra mouentium musculorum, qui ab inferiori maxilla, & malis ortum ducunt, inspe-
 xerimus, uariam profectò fibrarum iuxta insertionem differentiam intuebimur. Quemadmo-
 dum & latum musculus, qui carnea constat membrana, fibras rectas, obliquas & transuersas

q 5 ta. 14
ta. 10.r 13 tab. 2,
n. 2.s 9 tab. n.
t 5 tabu. 1.
u 6 tabu. n.
x 13 tab. r.
y 6, 7, 8 fi.
cap. 21 v.

a 6 tab. 9.

b 4 ta. 2.

c 13 tab. r.
d 11 tab. 2.e seriatim
specta 5 ta-
bulæ 1, n,
4. 5.

f 14 tab. r.

g 16 ta. F.

h 8 ta. r.

i 6 ta. A, B.

j 7 tab. Q.

k 1 ta. m.

l 7 ta. X.

m 3 ta. 10.

n 4 ta. n.

o 5 ta. 1.

p 6 ta. 1.

q 3. 4 ta. 1.

r 9 ta. r, 1.

s 3 ta. r, H.

F. 4 ta. M.

N.

exigere conspiciamus, & prout etiam diuersæ fibræ his musculis obtingunt, ita quoque diuersis famulantur motibus, pro harum illarumue fibrarum tensionis remissionisque ratione. Ad hæc, quid de lingua dicemus, omni fibrarum genere intertexta; aliud sanè nihil, quàm & musculis diuersas adesse fibras, & has seorsum suis subseruire motibus. Nequaquam enim hanc fibrarum in eodem musculo contrariam seriem inficiari possumus, & præcipuè in illis musculis, ubi mutua perficitur fibrarum interfectio, seu ubi fibræ decussatim feruntur. Nollem enim adeò aliorum Anatomicorum (qui omnibus musculis simplex & unicum prorsus fibrarum genus ascribunt) placita turbare, ut musculo brachium eleuanti, & multis femur mouentibus, diuersas fibras cum nuper dictis musculis assignarem, ita uidelicet ac si aliud fibrarum genus in musculo brachium eleuante constituam, quod à clauiculis pronatum, deorsum ad infimum musculi angulum, quo humero implantatur, obliquè retrorsum tēdit, et aliud quod à scapulæ spina, deorsum etiam obliquè antrorsum fertur, & aliud rursus quod à coniunctio-
ne summi humeri ad clauiculam rectotramite descendit. Atque idem ferè de omnibus musculis ex lato in acutum coarctatis, aut triangularibus affirmari possit. Verùm licebit per me ipsis unum fibrarum genus assignare, si modò interim has differentias, à fibrarum ductu petitas, uti nunc ferè proposui, subintellexeris, ac etiam fibras nō æquè in omnibus musculi partibus collectas, & tenues esse didiceris. In musculis enim acuto capite enatis, & in crassum tendinem finientibus, in uentris musculi medio, ubi is crassissimus est, fibræ tenuissimæ, inuicem propter carnis interuentum magis distant, quàm in capitis & tendinis initio. Alijs autem musculis in principio & origine, plures & magis dissitæ, laxioresque obtingunt fibræ, quàm in fine, ut omnibus ferè, qui ex lato principio instar trianguli in acutum feruntur, & ampla superficie principium ducunt. Alijs musculis in ortu fibræ magis constringuntur, quàm in ipsa insertionē, quod illi accidit musculo, qui à scapulæ basi enatus octo thoracis costis inseritur. Quin etiam id in septo transuerso usu uenit, cuius fibræ plures, magisque inuicem remotæ sunt in ipsa insertionē, quàm in capite, uel reliquo ipsius corpore. Alijs propemodum æqualis undecunque fibrarum est ratio, ut illi qui ad brachiale locatus, radium in pronum ducit, intercostales & laryngis primam cartilaginem secundæ nectentes, & musculi orbiculares, qui recto intestino, & uesicæ ceruici obducuntur. Alij rursus musculi toto ipsorum corpore recta ferri uidentur, obliquas tamen habent fibras, ut dorsum mouētium sextum par, cuius musculi tendines in apices transuersorū processuū præcipuè inseruntur. Verùm illis etiā musculis aliquid priuatim euenit, qui duobus donantur uentribus, ex quorum albo illi sunt, qui inferiorem maxillam deorsum trahunt, atque illi qui à scapulis ad hyoides os porriguntur. His enim in fibris accidit, ac si duo, unus post aliū scilicet, positi essent musculi, qui acutum caput, & tere-
tem tendinem ostenderent. In musculorum capitibus exortibusque quamplures consurgunt differentie, quarum prima à forma crassitieque musculorum desumi posset, quam superius commemorauimus. Secunda uerò à substantia ad hunc modum accipi poterit, quod alij penitus carnei in exortu appareāt, fibris duntaxat raris & incompactis interstincti, ut qui ab ilium os se femur accedunt. Alij neruei in ortu apparent, et rursus quidam ex his illico in ipsius ossis contactu carnei euadunt, ut maximi in sura musculi origo, & in externa internaque cubiti sede pluriū musculorum principia. Quidam uerò longo ductu neruei permanent, priusquam carnē adipiscantur, ut inter reliquos tibiā mouentes, qui tertium caput à coxendicis ossis appendice assumit, & tibiæ motorum quintus censebitur, dein musculus brachium deorsum ad dorsum trahens. Alij unico quidem capite oriuntur, atque id haud secus, quàm si duo obtinerent. Alia namque principij pars aliquousque neruea apparet, alia prorsus carnea, quod rectis abdominis euenit musculis, quæ ex pubis ossibus enascuntur, dein duobus ex radice capitum femoris principium ducentibus, & calci inseritis. Alij duo exigunt capita, & unum nerueum prorsus est, longoque ductu tale permanet, alterum uerò, ut rectorum abdominis musculorum principia, carneum nerueumque simul uisitur. Atque id in arteriori cubitum flectentium musculo cernere est, cuius caput à scapulæ ceruice enatum, prorsus nerueū cernitur, quod uerò ab anchoram imitante processu enascitur, nerueum carneūque existit. Atque hic musculus illico com-
monstrat, quosdam musculos plura habere capita, in ipso exortu inuicem neque continua, neque contigua, hoc namque ultimo commemorato euenit musculo. Alijs unicum est caput, ut uniuer-
sis qui tibiā cubitūque amplexantur, quibus omnibus aut in inferiori, aut superiori parte capi-
ta sunt, septo tamen transuerso caput in medio consistit, non autē in altero extremorū. In uentri-
bus musculorū differentie, præcedentibus differentijs ferè omnes explicatæ sunt, quū muscu-
lorū formas, & fibras recenserem. Neque hinc aliud addendum est, quàm uentrem musculi illic
propriè reponendū esse, ubi fibræ musculi inuicē minus compinguntur, ac copiosiore carne
continentur

*Galenus cum
alibi sapiens,
tum maxime
ubi cor, nō esse
musculum pro-
bare nititur.*

*A fibrarum
compactione.*

*A musculo
rum capitibus*

*A uentri-
bus.*

*s figu. indi-
ci tabulæ u.
insertæ ab
A ad D. de-
in à C ad D.
in super à
B ad D.*

*t 7 ta. L.
u 7 ta. Δ.*

*x 7 tab. X.
y 6 tabulæ
V, X.
a 4, 5 fig.
ca. 21. N. O.
b 13 ta. Γ.*

*c 5 ta. H, I.
d 5 ta. R, S.*

*e 9 tabu. Π.
10 ta. Σ. II.
z. 8 ta. Λ.
f 13 ta. Υ.*

*g u ta. Υ.
h 2 fi. cap.
29. li. 1. b. q.
i 10 ta. Θ.
k 5 ta. Δ. Γ.
n. o.
l 12 ta. Φ, Ψ.
ω. ρ.*

*m 6 tab. Θ.
ω m, n, o.*

continentur. Vnde quibusdam musculis, in ipso exortu uentres potissimum habentur, ut qui ab ilium osse in femoris os inferuntur, alij ad finem, ac ad insertionem magis, quam ad caput, ut septum quod carnosius in extremis, atq; ipsis adeo insertionibus, quam alibi conspicitur. Alijs musculis uentres statim ab ortu incipiunt, ut suramⁿ constituentibus. Alijs musculis uenter longius ab ortu cōspicitur, ex quorum numero is est,° qui brachium deorsum ad dorsum trahit, & ^p unus inter tibiæ motores, qui à coxendicis ossis appendice enatus, suum caput diu neruosum nanciscitur, tibiāq; mouentium quintus mihi habebitur. Alijs uenter per uniuersum musculi corpus permanet, ut intercostalibus, & illi qui ad brachiale repositus, radium in pronum agit, & laryngis non pauci. Atque ita aliqui musculi uentrem ad ipsam usque insertionem seruant, ut nunc postremo commemorati. Aliorum uentres longè admodum ab insertionem distant, ut ^q musculi illius, qui à femoris externo capite natus, in calcem tenuissimo longoq; tendine fertur, & illi omnes qui ex cubito tibiæue procedentes, digitorum motibus famulantur, & ^r is qui membraneum tendinem, musculis secundum femoris longitudinem protensis obductum educit. Alij rursus geminum uentrem ostendunt, cuius generis musculi sunt, quos paulo ante inferiorem maxillam deorsum trahere, & quos à scapulis in hyoidis os pertinere dicebam. Deinde ^s recto abdominis musculo ex abundanti quædam transuersim ductæ impressiones insunt, quæ illos musculos ita exornant, ac si pluribus uentribus efformarentur. Huiusmodi uerò impressiones seu lineamenta, & circūscriptiones, quas Græci *ποδὺς αὐτῶν* uocauere, sunt ueluti albæ quædam lineæ, in musculi alicuius substantia impressæ, quarum quum frequens nobis mentio incidet, non abs re feceris, si has in rectis musculis atq; ijs etiam, ^t qui sub stomacho latitant, in musculorum tabulis intueri non grauaberis. Quæ à tendinibus sumi possent differentia, iam ferè ex commemoratis etiam pendet. Quidam enim in tendinem enervationemue prorsus nō desinunt, ut labrorum ^u musculi, & ^x rectum intestinum, & ^f uesicæ ceruicem ambiens, & laryngis omnes, illis tantum exceptis, ^u qui recto donantur situ, ac secundæ cartilagini tertiæ committunt, hi siquidem in insertionem nerueum quid cōmonstrant. At non solum illi qui aliud præter os mouent, tendinibus destituuntur, uerum (etiā si secus in Primo de Musculorū motu Galenus sentiat) eorū quibus ossa mouentur, quàm plurimi tendinibus carent, neque in insertionem magis nerueum quid, quàm omnes musculi in suis uentribus commonstrant. Est autem eius classis in manu, ^{49 M.} qui pollicem indicis proximè ad ducit, dein duo ^{49 N.} qui primum pollicis os inflectunt, ac ^{cap. 21 P.} qui ad brachiale positus, radij motus in pronum autor est. Intercostales etiam musculi tendine priuantur, ut & ille grandis ^{a u ta. f.} musculus, qui à scapula ortus octo superioribus thoracis costis inseritur, deinde ^{b 6 ta. n. 2.} is qui à clauicula in primam fertur costam. Atq; ita etiam insignis ^{c 7 ta. X.} musculus inter mouentes dorsum nō infimus, qui ab ilium osse in uertebrae lumborum, & infimam costam ducitur, flexionisq; dorsi autor est, nullibi nerueum quid ostendit. His accedit septum transuersum, in insertionem nullibi nerueam substantiam exprimens, ^{d 7 ta. L.} præterquam ubi lumborum uertebreis exporrigitur. Neque etiam in homine recti abdominis musculi, ^{e 4 ta. d.} ubi costarum cartilaginibus implantantur, tendinem commonstrant, ut ^{f 8 ta. 3.} neq; in simijs & canibus, quibus ad primam usq; costam conscendūt. At in illis quæ pectoris ossi exporriguntur, in medio ductu nerueam naturam habent, ac si inter illos prorsus reponendi essent, qui duos uentres exigunt. Neq; etiam complures musculi, in occipiti os capitis motuum gratia inserti, tendinem magis in insertionem, quàm in ipsorum uentre ostendūt. Porro alij musculi tendines habent, ut eorū qui aliud, quàm os mouent, ^{g 7 ta. o. p.} sex oculi musculi, septimus enim in nerueam substantiam non desinit. Ex musculis ossa mouentibus omnes, qui ex cubito extremam adeunt manum, tendinibus ornantur. Tendinum autē quidam, lati membraneiq; sunt, ut sex oculi musculorum tendines, & ^{h 4 ta. n.} obliquorum, & ^{i 5 tab. abr} transuersorum abdominis. Alij omnino teretes, ut ^{add.} qui ex cubito procedentes, digitos flectunt. Alij paulo minus teretes, & latiores nō nihil, quàm profundiores, ut ^{k fi. ca. 11.} tendo in calcem insertus, & ^{l 3 ta. o. 4.} tendo in latum cessans tendinem, priusquam brachiale attingit. Et alij tendines breues sunt, ^{ta. n.} ut ^{m 6 ta. Δ.} circumuertentium brachium musculorum tendines, & radium mouētium, ^{n 6 ta. γ. Δ.} qui circa mediam radij longitudinem insertionem habent. Alij autem longissimos edunt tendines, ut ^{o 13 ta. λ.} musculus ab externo femoris capite natus, & gracilem tendinem, priusquam genu articulū prorsus superauit, educens. quā etiam is qui latum in manu educit tendinem, & omnes qui ex cubito & tibiā procedentes, digitorum motibus subseruiūt, & præter nonnullos tibiæ insertos, ^{p 3 ta. h. l.} is etiam, ^{q 7 ta. r. 12} qui ex ilium osse natus, in maximam membranam omnibus femoris amplexantibus musculis obductam desinit, ac tibiæ ossi, fibulæq; inseritur. Musculi qui tendines educūt, ^{ta. r. G.} illos alicubi ab extremo porrigunt. Temporalis tamen, ex sui corporis medio tendinem emit- ^{r 7 tab. Q.} tere, Galeno in Libris de Vsu partium dicitur. Quid autem hac de re sentiam, Capite de Mus- ^{dein 12 tab.} ^{Δ.} ^{s 13 ta. o. 3.} ^{t 3 ta. 9.}
sculorum

Musculorū
impressiones

Tendini-
bus.

n 14 tab. n.
o, p, q.
o 10 tab. o.
p 11 tab. r.

q 13 ta. 3. f.

r 3 ta. 9.

s 5 ta. Δ. 7.
u, u, u.

t 8 ta. A, B.

u 3 ta. r, H.
F.

x 1 fi. cap.

49 M.

49 N.

z 6, 7 fig.

cap. 21 P.

a u ta. f.

b 6 ta. n. 2.

c 7 ta. X.

d 7 ta. L.

e 4 ta. d.

f 8 ta. 3.

g 7 ta. o. p.

h 4 ta. n.

i 5 tab. abr

add.

k fi. ca. 11.

l 3 ta. o. 4.

ta. n.

m 6 ta. Δ.

n 6 ta. γ. Δ.

o 13 ta. λ.

p 3 ta. h. l.

q 7 ta. r. 12

ta. r. G.

r 7 tab. Q.

dein 12 tab.

Δ.

s 13 ta. o. 3.

t 3 ta. 9.

sculorum maxillam mouentium inferiorem scribam.^u Priuatim etiam robustissimo tēdini, ad
 tibiae extensionem auxilianti, os ipsa nimirum patella innascitur. Sic & ^x tendo ex tibia inter fi-
 bulam calcemq; ductus, & sub cubiformi osse, priusquam in pedis os, quod pollicem sustinet,
 inferatur, protensus, quā sub illo osse reflectitur, instar ossis, duriorisue cartilaginis indure-
 scit, modicē ibidem dilatatus. Rursus unus musculus plures educit tendines, singulos quasi
 ex priuatis sui uentris carnosissimis propaginibus educens, ut^y qui in cubito locati ad quatuor di-
 gitorum manus flexionem auxiliantur. Alij unum quidem educunt tendinem, at is postmo-
 dum in plures discinditur, ut^a musculi ex tibia enati tendo, qui in pedis planta, tertijs quatuor
 digitorum ossibus tendines exporrigit. deinde^b qui bicorni tendine in postbrachialis ossa in-
 feritur, atq; ad brachialis extensionem iuuat.^c Qui autem indicem mediū, & anularem manus
 extendere creditur, in harum differentiarum medio consistit. Hic namque neque plures edu-
 cit tendines, neque etiam ipsius tendo in plures diuiditur, sed medium quid inter iam dictos
 existit. Rursus plures musculi unum efficiunt tendinem,^d tres enim surae maximi, tendinem u-
 num in calcem inferunt. Insuper & cubitum extendentes^e musculi, in unum coeunt, unamq; si-
 mul insertionem efformant. Præterea & tres tibiam extendentium maximi, in unum quoq;
 tendinem, cui patellam innasci diximus, colliguntur. At de musculorum numero & concursu
 aliquid nunc subiiciendum uenit, & si quid ex musculorum differentijs omissum sit, quum se-
 orum singulos percurrā, in Libri huius progressu explicabitur. Quemadmodum & hæc esse
 possit, musculos quosdam habere, qui suo motui opponuntur, alios, ut flectentibus digitos
 opponuntur, qui eosdem extendunt. Sic qui caput inclinant, contrarios exigunt, qui idem rur-
 sus in posteriore releuent. At quidam motus sui nullū habent cōtrarium, testium nanque^f mu-
 sculis nulli, qui testes deorsum trahant, opponuntur. Neque etiam anum sursum^h uellentes,
 qui eundē priuatim deorsum trahāt, oppositos adipiscuntur. Vt neq; etiam circulares illi, qui
 recti intestini finem, & uesicæ ceruicem amplexantur, & postmodum musculi à nobis inuen-
 ti, laryngis operculū, quod ἐπιγλωττις Græcis dicitur, sursum atq; in anteriora mouent,^g nul-
 los quoq; oppositi motus socios obtinēt. Sic etiam à musculorū munere differētia pendet, quū
 alij rectis præsent motibus, ut qui quatuor & manus & pedis digitos extendūt. Alij duntaxat
 obliquis subministrant motibus, ut radij motores omnes. Alij utrinque motum præstant, si
 enim à pectoris osse, & clauicula enatus^k musculus, ac in mamillarum occipitijs ossis proces-
 sum insertus, qui in dextro est latere, unā cum sinistro contrahitur, caput flexionem rectissimā
 experitur, si uerò is solus, quiescēte sinistro agit caput sinistrorsum, in anteriora circūuertitur.

A mutua mu-
sculorū in offi-
cio oppositio-
ne.

A munere.

DE MUSCULORVM NUMERO, Caput IIII.



RDVVM difficileq; esse, musculorum numerum persequi, ac semel, quot
 uniuersi corporis sint recensere, præcedens de Musculorum differen-
 tijs Caput liquidē satis commonstrasse reor, non sanē quod illum descri-
 bere prorsus impossibile sit, sed quod uaria eadēque non admodum
 absurda, de musculorum numero unicuique sententia esse possit. Ali-
 quis nanq; unum dicet esse musculum,^a qui brachiū pectori adducit eo,
 quod nulla sui parte sibi non continuus contiguusque sit. Alijs uerò du-
 crum musculorum loco illum fortassis censendum contendet, quod omnes fibræ ipsius non
 parem ductum obseruent, ipseq; musculus utcunq; contrarios motus obeat. Eius enim pars,
 cui clauicula, & media pectoris ossis pars clauiculæ proxima, principium præbent, deorsum
 oblique, uersus musculi in brachium insertionem suas fibras porrigit, & brachium pectori ela-
 tius, quasi ad guttur clauiculamq; trahit. Inferior autem pars, quæ à reliqua pectoris ossis sede,
 & quibusdam costarum cartilaginibus enascitur, sursum oblique ad brachium fibras dirigit,
 brachiumque humiliori pectoris sedi adducit. Vtrisque autem musculi partibus in se colle-
 ctis, brachium pectoris medio adinuetur. Præterea ad hanc musculorum continuitatem, &
 unius instar partis circumscriptionem, & nullam, ut inter duos digitos manus, sectionem, sed
 diuersum fibrarum ductum, ac latum musculi principium, diuersumq; eiusdem munus non
 solum, quem nunc recensuimus, musculum quis referre potest, uerū & illum,^b quem inter
 scapulam mouentium secundum recensebo, qui continuus quidem est, attamen superiori
 sua parte sursum, uersus occipitium scapulam attrahit, inferiori uerò deorsum uersus dor-
 sum. media autem sede, aut utraque ipsius parte, rectā retrorsum scapulam mouet. Dein
 huius musculi fibræ supra scapulæ spinam conspicuæ, deorsum in exteriora feruntur. quæ

Alijs aliū nu-
merū propter
fibras statui

V autem

autem sub scapulæ spina uidentur, fursum in exteriora contendunt, uerum nullæ interim decussatim se mutuò interfecant. Item^e qui humerum attollit, unus quidem continuitate est, uerum apud Anatomicorum præcipuos non defuisse uidentur, qui duos hunc esse dicerent, unum à clauicula, alterum à scapula oriri contendentes, ac motibus, non autem continuitati animū adhibentes. Quinetiam præter alios plerosque his adnumerari possint, femoris motibus famulantes omnes,^d qui triangulæ figuræ proximi sunt, & interim nullam disunctionis aut incontinuitatis notam referunt, uerum fibras ueluti ex basi ad conum tendentes, & ideo non parī prorsus ductu delatas sibi uendicant. Fibrarum etiam ductus diuersitas, alijs^e quatuor intercostales musculos in uerarum costarū interuallis constituit, propter diuersam illarū inter costarum ossa & cartilagine seriem, nihilominus tamen continuitas seruat, unde etiā alijs duo tantummodo in toto interuallo recensentur. Sed & musculorum dorsum mouentium^f quamplurimi, uarium musculis ascribi numerum indicant, quum alius continuitatem perpendens, unum utrinque stomacho subiectum esse dicet, alius fibris & explantationibus implantationibusq; attēdens, tot musculos recensēbit, ex quot ossibus is enascitur, & in quot inferitur. Alius non ossibus, sed quibusdam leuibus impressionibus, inscriptionibusq; attendens tot musculos enumerabit, quot inscriptiones uiderit. Idem maximè in^g secundo caput mouentium pari usu uenit, quod ex pluribus enascitur ossibus, & multas ostendit fibras, & præterea in hominibus uarias priuatorum musculorum descriptiones adeò, ut id par quibusdam neutiquam duorum musculorum loco haberi possit, sed plurium, neque id quidem adhuc eodem numero omnibus. Cæterum & musculorum capita numerum turbant. Non enim dubito,^h musculus à pectoris osse & clauicula enatum, ac postmodum in mamillarem capitis processum insertum, duorum musculorum numero nonnullis Anatomicorum proceribus cōpræhensum fuisse, quod eā principij partē, quam à pectoris osse educit, ab illa quæ à clauiculis prodit, nonnihil diremptam putarint, quodq; una aliquantulum neruosiore altera sit, etiam si reliquo ductu musculus non separetur, neque diuersam fibrarum naturam habeat. Pari etiam ratione certissimum est non defuisse, quiⁱ primum & secundum pedem mouentes musculos, à radicibus femoris capitum originem ducentes, seorsum singulos posuerint esse duplices, quod unam originis partem nerueam, alteram carneam, ut &^k recti abdominis, exigant. Alij tamē eam originis diuersitatem non tanti, ut eius gratia musculorum numerus ipsis excreseceret, fecerunt, et singulos unius loco habuerunt. At hoc postremum magis adhuc usu uenit, in anteriori flectentium cubitum^l musculo, qui nullis, quod sciam, duorum numero habitus fuit, etiam si duo distincta capita habuerit, & magis quàm nuper dicti dirempta. Quamuis in communem conueniant musculi uentrem, qui unicum tantum educit tendinem, adeò ut ad capita respicientibus, non idem omnibus placitum fuerit. Quanquam id illis constitutum fuisse uidebatur, ut unum dicerent musculus, cuius capita in eundem musculi uentrem porriguntur, quod iam dictis sit musculis, atq; plurium musculorū uice eos haberent, qui etsi in unum coeunt tendinem, uentribus tamen non continuantur. Quod exactissimè in fure^m musculis obseruatum est, quum musculos ualidum illum calcis tendinem constituentes, tot numero esse uolunt, quot uentres, qui tres uisuntur, duo nimirum à femore producti, quos etiam quatuor alijs enumeratos dixi, & tertius qui liuidus est, & pedem mouentium quartus. Idem quoq; maximis tibiā extendentibusⁿ musculis, septimo uidelicet, octauo & nono tibiā mouentibus contingit, qui etsi unum tendinem tibiæ insertum unā producant, tamen quoniam uentribus non continuantur, plurium musculorum loco censentur.

A tendinibus. Ceterum tendinum ratio talis est, ut omnes unum numerent musculus, qui uno enatus capite, unicum educit tendinem, etiam si ille postmodum in plures diuidatur, quemadmodum^o musculo accidit, qui tertios quatuor digitorum pedis flectit articulos. Ita etiam musculus unum caput habens, et adhuc carneus in plures tendines dissectus, qui eiusdem motus autores existunt, unius musculi loco compræhendebatur, quemadmodum^p musculus quatuor manus digitorū, secundos flectens articulos, & is etiam^q qui tertios inflectit, à quo nos illum suo distinguemus loco, ^r qui pollicis tertium internodium flectit, quod is ab illo prorsus sit distinctus, & si alibi fortè illi continuus cernatur, id obscure admodum in primo tantum est exortu. In dictorū modò classe etiam ferè, præter aliquot alios musculos habetur, ^s qui indicem & medium atq; anularem manifestè extendit. Verum si tendines in diuersa specie ossa inserantur, dissectionum periti musculū, qui tendines educit, plurium musculorum numero recensent. Quē admodū nonnulli musculū, qui pollicis duos tendines, et unum brachialis ossi pollicē sustinenti exporrigit, duorū loco enumerarunt, etiā si omnes isti tendines ad euerfionē faciant, pollicis quidem tendines ad pollicis motum, brachialis autē, ad brachialis. Verum tale quid in anteriori

c 4 ta. Δ. 10
ta. Δ. & pri
uatim figu
ra indici 12
tabula inser
ta.

d 9 ta. Π. 10
ta. E. 11 tab.

Σ. 8 ta. A.

e 6 tab. V.

X. de m 8 ta

bule E, E,

& interior

pectoris se

des humi

posita.

f 8 ta. A, B.

14 ta. O.

g 13 ta. A, B,

C, D, E, F.

h 4 ta. O.

i 12 tab. A.

dein 1. insu

per w, p.

k 5 tab. Δ.

dein n, o.

l 6 tabu. O.

dein m, n ac

o.

m 14 ta. n,

o. q.

n 5 ta. A. n.

charact. 5.

o 14 tab. E.

p 5 ta. O.

q 6 ta. E.

r 6 ta. E.

s 9 ta. Z.

t 10, 11 tab.

Σ.

u 4 ta. 1, 2

rriori

riori tibiæ sede magis adhuc est conspicuum, ad medium enim longitudinis tibiæ, à musculo quatuor pedis digitos extendente, carnosus educitur musculus, qui in pedis os minimo digito præpositum inseritur, atque ad pedis eleuationem in anteriora iuuat, quum digitorum interim tendines, digitos extendant. Adeò ut alicui uidebitur, duos hîc enumerandos esse musculos, alteri uerò unicum, prout hic exortus continuitati, ille uerò diuersis tendinibus, & in uaria ossa insertionibus differentibusq; functionibus animum adhibuerit. Neq; minorem in numero obscuritatem parit, mutuus musculorum connexus.^x Qui enim à pectoris ossis summo enati, in os v referens inseruntur, internis suis lateribus adeò inuicem adnectuntur, ut quis hos duos esse, alius autem unicum non ineptè dixerit. Quod etiam illi commonstrant,^y qui à circulari ani musculo enati, uesicæ meatum, ubi primùm sub penis corporibus exporrigi incipit, tanquam duo digiti, amplexantur. Numeri etiam musculorum obscuritatem auget eorundem concursus, ex quorum albo si quis alius, ille profectò est, qui à coxendicis ossis appendice enatus, ualidus deorsum fertur, & ad mediā femoris lōgitudinem nerueus factus, alteri carnosæ parti connascitur, cui femoris os initium præbet. Atq; ambæ partes, ea scilicet quæ à coxendice ducitur, & ea quam femori ascribimus, unum tendinem simul efformant, elatissimæ fibulæ parti robustissimè insertum adeo, ut & unum & duos musculos ab aliquo hunc recenseri nihil prohibeat, dummodo à uera descriptione non declinetur. Erit autem is tibiā mouētium quartus, in hominibus & simijs conformatione plurimum differens. Simiæ enim musculo à femore nihil adnascitur, sed is unicus, ualidus & latus est musculus, qui ob hoc etiā Galeno semper Latus nūcupatur. Atq; hinc fit, ut toto sermonis progressu accuratè mihi de musculorū numero cōstituendum sit, ad quos iam tempestiuum est accedere, ne prolixius in generali musculorum explicatione hæsisse uidear. Cæterum ne quid obscuritatis sequens pariat oratio, & præcipuè quum cutis motores pertractaturus sim, aut quoties crebra Carnosæ mēbranæ mentio incidet, nunc cutis & membranæ eius naturam prosequar.

A mutuo con
nexu.

A concursu.

Secundo Li.
de Admini.
strandis dissec
tionibus.

DE CVTE, CVTICVLA, ET MEMBRANA

per uniuersum corpus cuti subiecta, præterea & adipe inter cutem
membranamq; carnosam reposito. Caput V.

PARTES hoc Capite describendæ aliter delineari nequeūt, quàm uigesima Quinti libri figura utcunq; exprimentur, iuxta r, s, t, dein & in uigesima quinta figura eiusdem Libri, iuxta dextram mamillam. Verùm istæ partes tales omnino sunt, quas citra omnem figuram nemo non nouit, si modò aut ipse sectionem aliquando aggressus fuerit, aut secanti astiterit.



CVTIS, omnium corporis partium est indumentum, corpori instar natiui tegumenti obductum, non duntaxat omnium hominis partium, sed uniuersæ substantiæ, quam generationi & corruptioni subiectam scimus, duritiæ mollitiæq; media. Est enim cutis, ueluti sanguine præditus neruus, ac inter neruum carnemq; quiddam planè mediū perinde, ac si ex mixtis utrisq; constitueretur. Cæterum neruus omnis, exanguis est & frigidus. caro, multo sanguine prædita calidaq;. Media inter utrunq; est cutis, nec planè exanguis, ut neruus, nec sanguine abundans, ut caro. Cutis hæc in homine, Herophilo dicta, bouum & equorum tergoribus, ex quibus coria adaptantur, respondet, & non parī ratione omnibus subiectis ipsi partibus adhæret, cōnectiturq;. Secus enim in manus uola & pedis plāta subditis partibus adnascitur, aliter rursus in frōte sibi subditæ musculosæ substantiæ, & aliter in labris, palpebris, auribus, naso, ano ac pudēdo, & aliter per uniuersum corpus, substratis partibus cutis committitur, ac inter secandum, diuersa ratione à subditis auferitur. Deinde in omnes cutis regiones non æqualis est neruorum distributio, nec cutis etiā undecunq; eadem crassities. Internæ enim manuum cuti, plurimæ neruorum fibræ porriguntur, uerticis uerò cuti paucissimæ. Quinetiam faciei cutis mollior & tenuior, uerticis autem, & plāta pedum durior uisitur. Quæ internam summæ manus sedem inuestit (nisi labore callosior euaserit) exquisitissimè in duritiæ mollitiæq; inter reliquam cutem, & omnia prorsus corpora, media est, quàm proximè æquali ad pondus temperamento accedens. Vtcunq; uerò sit, cutis homini pro magnitudine corporis tenuior, quàm animantibus quadrupedibus obtigit, quàm etiam homini profectò in uertice, dorso, cruribus & pedis planta crassa sit admodū, sed non omnibus æqualiter. Quinetiam aliæ cutis partes prorsus immobiles sunt, & circumactu

CVTIS quid

Cutis substan
tia.

Cutis differē
tiæ
A connexu.

A neruorum
copia.
A mollitiē.

A motu.

rio, ut tota corporis cutis, ea excepta quæ mouetur, est autem hæc frōtis & faciei uniuersa, & quæ anteriorem colli sedem, latera quæ complectitur. Atque hæc motu participat, aut proprijs in hoc famulantibus musculis, ut frontis, colli, genarum & labrorum, aut uicinæ ipsius cutis gratia, ut malarum cutis, quæ musculis destituta, simul cum proxima ipsi cute mouetur. Quod quidem alia cutis sedes pilosa sit, ut uerticis, axillarum, pudendorum, in uiris menti, alia autem penitus pilis orbata, ut interna manus, & plantæ cutis, omnibus conspicuum esse arbitror.

A pilis. Quemadmodum neminem latere scio, cutē maximam totius corporis partem esse, perpetuo contextu efformatam, nisi quod tenuibus foraminulis, ad fuliginosorum excrementorum propulsionem, & pilorum generationem paratis, peruia sit, atque etiam in palpebris, naso, auribus, ore, ano, pudendo, & ubi unguibus uiam præbet, interpelletur, perforataque cōspiciatur.

A foraminibus. Ad hæc, ex cetera cutis regione, interna summæ manus cutis (ut & pedis plantam inuestiens) maximè continua, minimeque perforata uisitur, quod & nuper natorum cuti aliquibus ascribere reliquit. Verum hæc singula haudquaquam ociosè, neque frustra facta esse, suis locis, quum de his partibus, quæ cute obteguntur, priuatim agendum erit, demonstrabo.

CUTICULA quid. Cuti, quam *Allegue* Græci uocāt, alia cuticula tenuis admodum, & prorsus exanguis obducitur, supernasciturque, propemodum ceparum tenuioribus ac pellucidis respondens inuolucris, nisi quod alicubi & præsertim in uola, & pedis planta, crassior duriorque uisitur. Hanc quum cutis uelut quædā efflorescentia sit, *ωδσλσλσλσλ* Græci appellant. Si uerò aliquando attritu in scabie, aut in uulneribus ex unguentorum applicatione, aut ignis admotione, aut feruentis aquæ infusione, aut ex longo itinere auferatur, & interdum uesiculæ ac papulæ instar à cute abscedat, promptissime aliterque ac uera cutis renascitur, quæ sola sanguinis & uitalis spiritus compos est, ob quod uenarum arteriarumque alicubi, & neruorum tenuissimæ partes, finesque ad eam confluunt, ipsamque simul concretæ quibusdam efformare creduntur. Neque sanè audiendus est Aristoteles, cutem sensu destituens, non secus, quàm si carnis cuti subditæ duntaxat beneficio tactus sensus perficeretur, quum cuti proprios, certaque serie neruos exporrigi ex Anatome condiscamus, illi precipuè, quæ in facie est ac brachio, cubito extremaque manu, deinde & cruribus & pedibus. Per reliquum autem corpus, etiam si non ordinata serie nerui ad cutem deducantur, attamen complures in illam desinunt, sub ipsaque & potissimum ad thoracis latera exporriguntur, membrana cuti subdita (ut & uenæ ipsæ) suffulti, quemadmodum etiam in Quarto libro, qui Neruis de dicabitur, enarraturus sum explicatius. Atque ita musculorum (quos Carnem Aristoteles appellabat) gratia cutis nequaquam sentit, uerum uti diximus priorum neruorum occasione. Et quanuis uerticis cutis obscuriori sensu sit prædita, attamen sentit, utcumque etiam incommo- dissimum. Naturæ fuerit, sursum ad uerticem neruos distribuere, ipsaque etiam cutis hinc non admodum sensu indiguerit. Deinde quis non quotidiana experientia edoctus, cutem à subditis musculis aut ossibus quoque auulsam, & postmodum scalpello ictam, unguibusque compressam sentire non didicit. Neque est, quod Aristotelis sectatorum quispiam hinc, nescio quam, Terresteri tatem mihi astruat, quum nerui à dorsali medulla enati ipsa cute duriores sint, & his adhuc ipsi tendines, quos potissimum facile affici, nemo inficiatur. Imò si non minus ratione, quàm experientiae simul fides habenda erit, ausim asserere, musculorum uentres quamplurimos (ut quorundam femur amplexantium) obtusius quàm ipsam faciei manusque cutem affici. Atque etiam mihi ridendi uidetur, qui cutē ob hoc sentire posse auersantur, quod nullum hinc sit medium, quasi uerò etiam neruū proprijs membranis prorsus denudatum, aut etiam in medio diuisum grauissimè affici non uideremus, quoties ipsius denudatæ substantiæ acriores pulueres insperguntur. Et si medium etiam præter rationem in tactus sensu desideraremus, nonne in promptu est ipsa cuticula cuti obnata, & interim (ut putamus) sensu priuata? At nunc membranā quoque aggrediamur, cuti per uniuersum corpus subditam, quæ cuticula longè robustior crassiorque est, & fibris quibusdam raris, his, qui substernuntur illi, musculis adheret, connasciturque, cuti uerò pertinacius committitur. Siquidem quamplurimæ uenæ, & paucissimæ tenuissimæque arteriæ, cutem nutrientes, & neruorum propagines cuti sensum communicantes, hanc membranam transeunt, ipsaque inter cutem, et illam prorepentia hac suffulciuntur, membranamque cuti copulant, præter continuā quandam, sibique proximam fibrarum membranarum seriem, cuius etiā beneficio membrana ualidissimè cuti connascitur. Hæc non eandem in uniuerso corpore crassitiem obtinet, uerum quibusdam corporis sedibus, carnosissimis fibris adaugetur, & crassior reddita, adeo carnosissima efficitur, ut musculi nomine donetur. Huiusmodi regio, in tota colli amplitudine habetur, & in fronte, et in reliqua propemodum facie, quibusdam autem animalibus undecumque ferè carnosissimis oppletur fibris, et præsertim illis, quæ totius corporis cutē (ut nos frontis) mouent. Audio & homines fuisse, qui in thoracis regione, & alibi etiā in corpore cutē mouere

Cuti uenas, & arterias ac neruos porrigi, ipsamque sensus esse competentem.

CARNOSA membrana.

Præsens membrana cur carnosissima dicatur.

a 3ta. r. b 3ta. A. ac in eius tabula facie.

uere ualuerint, quibus procul dubio membrana hæc, similis equorum asinorumq; carnosissimas membranas contigit. Porro huic membranæ, quam aliarum membranarum nomine *ὑμὴα* Græci appellant, non perperam Carnosæ adiectum arbitror, quum inter reliquas corporis membranas, hæc sola carnosæ appareat, uerèque talis censenda sit. Quod Arabes paulo exactius perpendentes, primi omnium, quod sciam, hanc membranam Carnosam appellauisse uidentur. Atque id sanè penitus huius nostræ ætatis Medicorum præcipuis indagandum fuerat, qui panniculum carnosum à Barbaris quibusdam non malè me Hercules eo nomine appellatum, octo abdominis musculos esse cõtendunt, & contra Galeni sententiam, ac rei ueritatem, cuti membranam in uniuerso corpore, & in ipso demum abdomine (de quo duntaxat sapere uidentur) subtendi inficiantur. Alij et si per uniuersum corpus à me hanc membranam demonstrari conspexerint, adeò ineptiunt, ut hanc non fateantur eam esse, cuius Galenus tum alibi sæpius, tum in Tertio de Administrandis sectionibus meminit, eo quod ego adipem (de quo mox sermonem instituiam) inter cutem & hanc membranam ostendo, sæpe trium etiam digitorum crassitudine, quodq; hominis membrana tantum à cutē semper abscedat, quāta adipis est crassities. Debebant profectò eiusmodi homines, ad cathedræ ostentationem solum nati, accurate perpendere, Galenum de suis simijs, nō autem hominibus locutum esse, quibus nullus adeps inter membranam & cutem interuenit, ipsaq; membrana non fibris duntaxat cuti continuatur, sed prorsus undique citra alterius corporis interuentū ipsi contigua est. Atq; ob hoc non adeò arduum est, hominis cutem solam, illæsa membrana diuidere, quā in simijs, canibus, & illis animalibus, ex quibus Galenus Anatomen descripsit. Huic membranæ ea parte, qua muscutorum proprias respicit membranas, lentior ille mucosus, quem cuti Aristoteles tribuit, obducitur, ob hoc fortassis, ne ipsa subiectorum muscutorum motum præpediat. Id enim membranarum omnibus commune est, quæ corpus, quod situm locumq; aliquando mutat, continent, ambiunt uē, ut mucoso quodam lentoq; humore oblinantur. E quarum numero peritonæum, succingēs costas membrana, cordis inuolucrum, & ipsa demum ligamēta sunt, quæ anuli modo tendinibus obducuntur. Sunt itaq; tria uniuersum hominis corpus perpetuò cingentia, nimirū cuticula illa, cutis, & mēbrana hæc carnosæ. Quibus & quartum hominem ambiens accedit, ipsa uidelicet pinguedo, seu adeps *πικρὴ* Græcis nuncupatus, qui nisi extreme homo emacietur, undique propemodum inter cutem, & quam nuper diximus, membranam copiosissimè continetur. Ex uenis enim compluribus & arterijs (si quæ reperiuntur) mēbranam perreptantibus, atque inter illam cutemq; propagatis, plurimus sanguis resudat, mēbrana frigidityte, calorisq; (ut credimus) inopia, in adipem seu pinguedinem, aut ut alij etiam in cornutis animalibus uocant, axungiam degenerans. Est namq; hæc adipis ad uniuersi corporis membranas, ligamenta, & (ut semel dicam) ad omnia sanguine indiga, frigidaq; corpora, generationis ratio, uidelicet quod ex uenis emanans sanguis, frigoris uī congeletur, illisque adhæreat corporibus. Sed id interim à Natura cautum est accuratissimè, ne adeps nascatur, ubi noxia inutilis uē esse possit. Non enim Natura adipem cerebri membranarum obduxit, non testium inuolucris, non internæ sedi cordis inuolucris, quamuis tamen cor hac non destituerit, non internæ ligamentorum sedi, quæ tendinibus transuersim obuoluuntur, neque etiam palpebrarum, aut frontis, aut penis cuti adipem subiecit, neque etiam adeò multum, summæ manus pedisq; externæ sedi. Quemadmodum profectò copiosissimum clunibus obduxit, ut illi adipe, puluinaris uice uterentur. Atq; adeps humidis frigidisq; animalibus (ex quorū numero homo & porcus sunt) plurimus colligitur, siccis uerò & calidis, nullus aut perquam exiguus, ut leonibus, & canibus uenaticis, ipsiq; etiam simiæ. Quanquam præter hominē, & porcum et ericiū, nunquam aliud terrestre occurrerit quadrupes, quod inter cutem & carneam membranam, adipem nanciscatur, ut cunque etiam oues, et glires illi subinde reperiuntur præpingues. Albet autem adeps, quod membranæ cutisq; & alia, quibus adhæret, corpora alba, neq; carnis modo rubra sint. Omnia enim, quæ in nostro corpore ab aliquo emutantur, mutantis alterantisq; colorem etiam sortiuntur. Et ridiculum prorsus est, ob hoc adipem album arbitrari, quod aëreæ substantiæ compos sit, quum osse, & cartilagine, & ligamento, & tendinibus uix aliquid cādidius occurrat, quibus nihil æquē terreum, in corpore reperias. Adipi inter cutem membranamq; collecto, eum usum ascribere possumus, quem uesti carniq; simplici tribuimus, ut corpus scilicet calefaciat frigoris tempore, & si Soli homo exponatur, uestis quoque modo refrigeret, calorem quo minus penetret, inhibens.

Ex Auicenna Hebræo.
קרום
הקרום
הגולגולת
או הקרום
cherum bame-
chase hagulg-
holeth, aut ha-
chedera.
Panniculus
carnosus.

ADeps seu
pinguedo.

Vbi adeps co-
piosior sit.


Quibus copio-
sior adeps.



TI præcedente Libro, postquam ossium cartilaginumq̃ historiam absol-
 ui, rationem modumq̃ tradidi, quo quis hæc ad disciplinam opportunè
 sibi parare queat, ita quoque hoc Libro omnium, quæ seriàtim traden-
 tur, secandi artificium post cuiusque enarrationem subiungam, ut quis in
 uno corpore omnem musculorum ac ligamentorum Anatomen rectè ag-
 gressurus, & ordine absoluturus sit. Partium uerò quæ in sequentibus Li-
 bris describentur Anatomen, prout illic commodius fore putauero, suis
 locis subiiciam. Nunc autē cuticulæ, cutis, adipis, & membranæ naturā hunc in modum aggre-
 di possis. Nouacula acutiori, in abdomine, aut quacunque uisum fuerit corporis parte, cutem
 ad adipem usque recta sectione, & deinde transuersa (ut saltem unum, aut plures angulos mo-
 liaris) incidēs, tam leuiter ac moderatè cuti nouaculam admouens, ut solam ipsam, illæsa inter-
 rim carnea membrana, diuidas. Quod sine negotio in homine facies, & præcipuè pinguiori,
 quum subinde, & potissimū in mulieribus adipis crassities, duorum digitorum latitudinem
 in thorace & abdomine superet, in coxis autem ac clunibus etiam palmæ latitudinem, in mu-
 lieribus non nimium obesis uincere, in publicis sectionibus uidimus. Ac proinde sectiones
 ducendæ sunt eo accuratiùs, quo macilentius obtigerit corpus. Deinde etiā conandum est, ut
 hanc sectionem citra negotium obire assuescas, cum propter musculos ex carnea membrana
 conformatos, tum ad discēdam neruorum seriem, quam inter cutem membranāq̃ hanc fer-
 ri dicemus, & propter innumeras quoque uenas, quæ in hoc diligentius erunt discēdæ, quòd
 nullas in morbis incidamus, nisi carnea membrana suffultas. Postquam igitur cutem ad adi-
 pem usque (nō tacta interim carnea membrana) disseueris, hamulo aut unguibus, in aliquo
 ex sectionibus angulo cutem attolles, & diligenter transuersis acutiori nouacula, ad cutem du-
 ctis sectionibus, cutem ab adipe, quo usque libuerit, separabis. Cuti deinde reflexæ ardentem
 candelam admouebis, ut cuticula ignis uiriesculæ instar abscedat, seorsimq̃ cutem, & cuticu-
 lam intuearis. Dum uerò cutem ab adipe liberās (quod nisi laborum patiens, discendiq̃ cupi-
 dus fueris, non diu indefessè facturus es) neruulos indagare conuenit, & uenas, quæ super mē-
 branam in adipe prorepentes cutem adeunt, deinde ipsa quoque membrana fibris illis frequē-
 tibus cuti commissa, sedulò inspicienda est. Iam si obesum ad manum sit cadauer, adipem à mē-
 brana liberare contendito, quod eadem prorsus ratione, qua cutem ab adipe seiungebas, præ-
 standum est. Cauendum quē, ne membrana oscitanter cum adipe auferatur, in quo nostræ
 ætatis Anatomici aberrarunt, eam membranā in homine reperiri inficientes, atque ita hac
 potissimū occasione necessariò, ut reliquos corporis musculos, & uenas & neruos, ita etiam
 ignorantes musculos, ex carnea mēbrana constitutos, & per illā exporrectas uenas & neruos.
 Ablato adipe, leuē sectionē per carnosā membranā ad subiectos ipsi musculos usq̃ induces,
 & parua opera, solis ferè digitis per transuersum hinc inde actis, aut buxæo cultello, aut, si uo-
 les, nouacula, illam à subditis partibus separabis, atque aliam membranā à cute separationem
 esse discēs, quā membranæ ab illis, quibus incumbit corporibus, auulsionem, quam Hero-
 philus *Ἀεργίῳ* nuncupauit. Hæc enim factu facilis est, ocyusq̃ perficitur, illi operationi penitus
 respondens, quæ bobus, uitulīs, ouibus, leporibus cutem citra negotium auferri uidemus,
 imò auulsio hæc adeò prompta est, ut solo flatu hædis, agnis, & etiā iunioribus uitulīs, mem-
 branam hanc cum cute, à subditis corporibus separari indies cernamus. Verū cutis ab adi-
 pe aut à membrana separatio, nisi frequentissimis sectionibus, acutissimisq̃ nouaculis com-
 pletur. Quod etiam & lanij nos docent, quoties sub axillis cutem auferre conantur, carno-
 sam membranā corporis bouis adnexā (ne nimium carnis auferant) relinquentes. Neq̃
 ista tantum uel apud lanios discuntur, uerū etiam cuticulæ natura, quum lanij
 obustos prius porcos deradunt, aut potius, quum calidæ aquæ ipsos im-
 mergentes, pilos unā cum cuticula descalpunt.

non
^

ANATOMICORVM INSTRUMENTORVM
 DELINEATIO.



CHARACTERVM SEPTIMI CAPITIS FIGURAE INDEX.

PRÆSENTI figura mensæ cuidam incumbentem sinximus asserem, quo in uirorum sectionibus opportunè utimur, dein huic asseri omnia propemodum accommodauimus, quibus in dissectionum administrationibus, adeoq; tota Anatomie quis posset uti. Quo autem singula leuiori opera assequaris, huic etiam figuræ characteres, ac demum eorum indicem adhibere non grauatus sum. Indicetur itaq;

- A, A* Mensa, cui reliqua omnia modo seriatim indicanda supersternuntur.
B, B Asser uiuis sectionibus administrandis idoneus.
C, C Varia foramina, quibus laqueos pro animalis mole adhibemus, quæ femora et brachia uincimus.
D, D Eiusmodi anuli, summis manibus pedibusq; ligandis adaptantur.
E Huic anulo maxilla superior, libera inferiori, catenula alligatur, ut caput immotum seruetur, ac interim neq; uox, neq; respiratio uinculorum occasione præpediantur.
F, F Diuersa nouacularum genera, quibus spongia accumbit.
G Cultelli ad earum speciem formati, quibus calami adaptantur.
H Vulgaris qui mensæ adhibetur culter. *I.* Grandis ac ualidus culter.
K Cultri è buxo parati. *L* Hamuli. *M* Varij styli unà cum siphonè.
N, N Obliquatæ acus cum filo crassiore, quibus literarum fasciculos colligamus.
n Minores acus, quas uulneribus suendis accommodamus.
O Serra *P* Forficula. *Q* Malleus ligneus.
R Arundines inflandis pulmonibus, & alijs quibusdam partibus idoneæ.
S Filum æneum, ossibus neclendis aptum. *T* Subula forandis ossibus parata.
V Varia subularum ferra. *X* Forpex intorquendis filorum extremis comparatus.
Y Forpex, quo intorti, & ossa iam committentis fili reliquias præscindimus.



Nouacula.

VANDO QUIDEM in nouaculæ hamuliq; mentionem incidimus, atque in sequentibus, horum ac similium, quæ ad sectionem pertinet, instrumentorum non infrequens sermo occurret, non abs re erit, obiter hinc instrumenta, quibus in administratione uti possis, subiungere, etiam si id in Primi libri calce fieri quoque potuisset. Sunt uerò hæc paucissima, paratq; facillima, quanquam tamen adhuc operosiora, pluraque, quàm ipse nunc publicæ etiam sectioni adhibeo, enumeraturus sim. ^{a F.} Primùm ita-

que plures comparandi sunt cultri, quibus tonsores in radendis pilis utuntur, & quos uulgò nouaculas uocamus. atque ex his quasdam acutas esse conuenit, quasdam autem retusiores, uerùm harum maior semper, quàm ipse uelis, futura tibi est copia. Eligendæ sunt minores & leuiore, quamuis etiam grandes aliquot adesse nihil prohibeat, plures autem coemendæ sunt, aut à tonforibus petendæ, quòd leui quâq; occasione in membranis, aut tendinibus, ligamentisq; ⁱ fundendis corrumpantur, atq; quum fragili admodum constent ferro, promptè exiliant, præcipuè si nouas, & acuendo non detritas, operi adhibueris. Quibusdam ex his, & potissimùm minoribus, illud ferri tuberculum non inutiliter aufertur, quod cultrum extra manubrii rectitudinem extendi prohibet, atque id tunc in primis tentandum est, quum nullæ reperiuntur nouaculæ obliquo constructæ manubrio, quales illi sunt, quibus nostrates & Galli tonsores utuntur. Italis enim rudes, & magnis erectisq; capulis seu manubrijs cultri in usu sunt, quorum capuli subinde in obliquis sectionibus incommodo esse solent, unde etiam quo minus manū

Parui cultri quibus calami aptantur.

ex sententia inflectas, obstaculo sunt. ^{b G.} His paruos cultellos, quibus calami aptantur, acutiores simul retusioresq; addendi sunt, & ex his nonnullos orbiculato cuspide, nonnullos uerò oblongo acutoq; esse cōuenit. Inter reliquos potiores sunt, prorsus ferrei, alijs enim quū trāsuerfa ligamenta scindere conamur, capulus facile frangitur, ipsumq; ferrum imbecillius, emollita ex calidæ aquæ lotionē resina in capulis firmatur. Prorsus respuēdi sunt incuruati, ac falcibus similes, quoniam solo propemodum mucrone inter dissecandū utimur, qui introrsum in curuis illis cultellis reflexus, difficulter transuersis ^c ligamentis subiicitur. ^{c itab. cha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Δ, ε, ζ.} Præterea non inutiliter adhibentur duo cultri ex illis, quos mensæ apponimus, quorum alter altero longè sit maior, sed retusior, & ferreus potius, quàm chalybeus, aut saltem non impense fragilis. ^{d H, I.} Si uisum fue-

Vulgares cultri.

Buxei.

erit, poteris his quoq; adijcere duos è buxo, aut ligno Indico, quo in morbis curandis utimur, confictos, atque ex his alterum tenuem, & oblonga cuspide scindes, alterum uerò latum, & orbiculari cuspide esse fines, uerùm rarò admodum illis utor, quum retusiores nouaculæ semper

Hamuli.

ad manum sint. ^{f L.} Licebit etiam hamulos duos effingere, illos referentes, quos Capitis initio appinximus, consueui autem illos parare ex furculis, quæ mensæ in dies apponi solent. Si enim furculam acceperis, atque utraque furculæ crura, lima magis extenuaueris, & deinde eorum apices oblique nonnihil instar semicirculi inflexeris, hamulum tibi elegantem paraueris, cuius mucrones lima ex sententia acueres est integrum, atque ita unum hamulum retusorem, alterum uerò acutiorem adaptare nihil impedit. Quanquam tamen hamulis relictis, ungues subinde operi in eleuandis quibusdam corporibus utiliùs adhiberes, nisi sinistra manus umbra

Styli.

sectionē obtenebraret. ^{g M.} Insuper stylos oblōgos, breues & crassiores, ex argento aut æneo filo tibi disseccari curabis, & quosdā ex mollissimo maximeq; sequaci plūbo ab Aurifabro quopiā educi trahi q; instar filorū fines, hi enim ad uarios usus, & præsertim ad obliquorum ductuū

Siphon.

naturam inueniendam mirè conferunt. Conduxerit etiam siphonem adesse, si fortassis illum per penem uesticæ indere liberet, ut in eo manuali artificio redderis expertior. Et quemadmodum nucleum siphoni affingimus, ita quoque quibusdam stylis illum adhiberi, & quosdam etiam siphonis modo incuruari conduxerit. Neque profectò mediocriter utiles fuerint styli aliquot, instar mediæ canalīs extructi, ita nimirum, ut siphones parantur, in quorum cavitatem sectio molitur, ex qua è uestica calculus euellitur, aut ad eam stylorum formam, in quibus pilosi serici textores seriatim sericum in pilos secant. Conferunt enim eiusmodi styli in illis sectionibus, in quibus membranam longa sectione diuidimus cauentes,

Acus.

ne quid subditorum aut membrana amplexorum lædatur. ^{h N deinn.} Acus habere conuenit, sed obliquatas potius, quàm rectas, quod ilico præstabitur, si communes acus prius ignitæ, instar C literæ aut (obliquentur. Conduxerit autem & magnas & paruas adesse, quæ scilicet filū funiculosq; graciles transmittant, & præter obliquatas illas, eiusmodi tibi quoque ad manum sint, quibus in consuendis uulneribus utimur, ut cutem aliquando simul suere ualeas, quum metuis te absente, aliquid à spectatoribus discendi cupidis uiciandum. His acubus filum adaptandum est sericum, quo uulnera cōsuuntur, aut peculiare aliquod, si fortassis quæpiam consuta dissolui turbarique ab alijs, quum abes, uereris. Cæterum ad uasa religan-

Filum.

da

da uteris communi illo, quo literarum fasciculos colligamus, quod præstantissimum ex Germania in Italiam adfertur, apud alias autem nationes imbecillius & crassius fit, & minus contortum & læue. ⁱ Serra uerò, quam interdum operi accommodamus, ea conducet, qua gangræna, aut eius generis affectibus uitiata membra præscindimus, non autem orbicularis, ut quidam etiam Mathematici suis Anatomicis libris appinxerunt, nescio, ex quarum linearum ductu arbitrati, orbiculare caput serra instar falcis messoriae incuruata ferrandum esse. Et si fortassis serra ad manum minime sit, ab illis opportunè petetur, qui pectines cōficiunt. ^k Forficula, nisi abscindendis post ligationem funiculis accommoda est, quod etiam quouis cultro obitur. ^l Malleus, si ipsius usus aliquando ad ^m grandiore cultrum impellendum, quum aliorum animalium effringis caluarias, erit, quiuis etiam aptus est. Non inopportunè quoque ex arundinibus oblōgi ⁿ calami aptabuntur, quibus minister aliquis, hoc illudue corpus inflare possit. ^o Asseres, quibus uiuas sectiones cōficimus, paratu quoque faciles sunt, & illos describemus, ubi uiuorum prosequemur Anatomem, quemadmodum quoque ad finem Primi libri ea recensui ^p instrumenta, quibus in compingendis ossibus rectè quiuis uti queat. Sed nunc ad musculos eo ordine, quo in uno corpore omnes dissecari commodè possint, nos accingamus.

DE MUSCULO FRONTIS CUTEM

mouente. Caput VIII.



ARNEAM membranam, quæ uniuersæ cuti subijcitur, quibusdam corporis sedibus carneis fibris augeri, & alicubi in musculi naturam degenerare, prius commemorauimus. Nunc autem pertractabitur, quonam pacto id sub frontis cute accidit, quam *πρωμτωπιδιου* Græci uocant, quæadmodum & ipsi insinuatas lineas, *σολιδας* & *αμαρυγας* appellant. Homini quidem ut plurimum nullæ cutis partes, quiescentibus ossibus mouentur, præterquam frontis, faciei, & anteriorem colli sedem ambiens cutis. Ut

Quæ cutis sedes homini mouentur.

^a Hanc non aliter quam in Tabula fronte delineare licuit, ad A.

enim supercilia attollantur, & interdum demissa oculi sedem angustam reddant, ipsamque cor rugata muniant, frontis cutis uniuersa, quæ depilis est, simul cum nasi cute, motu uoluntario opportunè agitur, quod carnosæ membranæ, totius frontis & nasi cuti subtenstæ sit beneficio, hæc namque carneis fibris augetur quàm plurimis, & musculosa reddita, plures neruorum paginae mutuatur. Deinde frontis nasiq; cuti membrana hæc tenacius, & citra adipis alicuius, aut perquam modici interuentum connascitur, quàm per reliquum corpus cuti adnecti consuevit. Quod etiam alijs imposuit Anatomicis, arbitrantibus frontis cutem, carnosam musculosamque substantiam esse, quum cutis non magis hîc, quàm alibi carniformi substantia donetur, sed duntaxat præsens membrana carnosior reddatur, cuti ipsi (quemadmodum iam diximus) pertinacius, quàm in abdomine, aut dorso, aut cruribus connata haud secus, quàm si membrana, unum corpus cum cute esset efformatura, quâdoquidem sic rectè idem motus amborum, membranæ scilicet, & cutis perficitur. Porro huius musculosæ compaginis fibræ, multo ad latera accumbentes, à nasi summo usque ad mediam frontis sedem (quæ inter primas capillorum radices, & supercilia consistit) & ad huius quoque loci latera, carnosiores uisuntur, omnes sursum recto tramite procurrêtes, si modò interim perquam raras exceperis, obliquo ductu ex porrectas. Atque hæc sanè recta fibrarum series, non perfunctoriè à Medicis uenit perpendenda, ne in fronte transuersas potius, quàm rectas moliantur sectiones. Accidit enim, quum transuersim quandoque sectionem inibi, & maxime iuxta supercilia, ubi carnosiores esse fibras dixi, aliquis tentat ad palpebrarum radices, tum supercilia, tum contiguam ipsis cutem deorsum conuolui, & oculos, quibus incumbunt, aggrauare, ut neque aperiri ex sententia queant, neque liberè suo munere fungi.

Frontis musculosa substantia.

Fibrarum series.

In fronte transuersas sectiones non tentandas.

MUSCULI FRONTIS CUTEM MOVENTIS

administratio. Caput IX.



ICTAE modò musculosæ substantiæ administratio, duplex tibi erit. Vna quidem, qua cutem simul cum carnosâ membrana, à membrana caluariam cingente, obidque à Græcis *πρωμτωπιδιου* nuncupata, auferes. Altera autem, qua cutem à musculosa substantia (quantumuis id difficulter fiat) separabis, carneam membranâ capiti affixam relinquens. Ut uerò utranque in uno cadauere ex sententia perficias, detonsis crinibus à uertice, rectâ per frontem & superciliorum medium ad nasi usque extremum

Duplex administratio.

Prior. extremum sectionem nouacula per cutem duces, deinde aliam in sincipite, secundum coronalis future ductum, ad tempora, & aurium radices usque moliere. Ductis sectionibus, in altero latere, hamulo, aut summis digitis, cutis propter sectionum angulos (qui in elatissima frontis sede, & ipso ferè uertice erunt) eleuanda est, ac simul cum carnea membrana ad supercilia usque auellenda, eodem prorsus modo, quo carneam membranam à subditis musculis separari superius relatum est. At in alio latere, uarias easdemque transuersas sectiones experieris, donec relicta ad caluariam carnea membrana, cutem commodè ab ipsa, ad supercilia usque adimas, iam in palpebrarum^b musculos incidens. Neque id tam factu arduum est, atque alij uidentur innuere dissectionis procures, quum uti antea testatus sum, membrana non eo pacto cuti connascatur, ut unum ex ambobus simul confusis corpus confurgat.

DE MUSCULIS PALPEBRARVM.

Caput X.



QVAMVIS tertia musculorum tabula ad characteres C, D, E, hos musculos ut cunq; exprimit, hic tamen istam peculiarem locauimus figuram, in qua A primum indicat palpebrae musculum, b uero C, musculi illius principium, D secundum musculum, cuius initium e notatur. Mutuus autem duorum musculorum connexus, F insignitur.

*Palpebrarum
constitutio.*



*Duo palpe-
brae musculi.*

*Superiorem
palpebrae cur-
moueri oportet.*

*Vnus muscu-
lus.*

Alter.

PALPEBRAM utranque tam inferiorem, quam superiorem efformat membrana, quae à caluariam succingente membrana principium ducit, & unum continuum cum adhærente albæ uel oculi^a tunica corpus existit, deinde & cutis quoque cum carnea membrana. Atque hæc simul ad palpebrarum fines, & ubi^b cartilago cilia erigens consistit, firmissimè uniuntur adeò sanè, ut quatuor hæc, cutis nimirum, duæ membranæ, & cartilago illa, quam tarsum uocauimus, simul unita, palpebram, corpus quoddam rarum, & nulli alteri in homine parti respondens constituent. Cæterum per reliquā palpebrarum regionem, cutis carnosæ membranæ, ut in ceteris ferè omnibus corporis partibus, quod ad connexum attinet, committitur, at nullus interim adeps, sed unctuosus duntaxat quidam humor, inter cutem membranamque iacet. In superiori quoque palpebra secundum uniuersam ipsius amplitudinem ex abundanti, carnea membrana musculosis adaugetur fibris, ac uelut duos efficit musculos, in medio cutis & eius membranæ, quam adhærenti albæ uel oculi tunicae continuam esse diximus, repositos. Moueri enim oportebat ex nostro arbitratu superiorem palpebram, alioqui in nullum usum nobis accommodaturam. Etenim frustra palpebras Natura largiretur, si aliquando extrinsecus illato, uersus hominis oculos scarabæorum & cancrorum oculis longè molliores, quod percussurum ipsos, & læsurum esset, ex nostro arbitratu eas non clauderemus. Duos itaque tenues, latos, membraneos, ac substantia propemodum omni ex parte sibi similes, Natura miro quodam artificio musculos produxit, unum sanè in maiori oculi ponens angulo, alterum in minori.^c Qui portionem maioris anguli occupat, ex media anguli sede inibi ad nasi latus incipit, suo principio etiam superciliarum partem naso proximam contingens. Huius finis amplius, quemadmodum totus etiam musculus, cartilagini, in quam pili firmanantur, applantatur, mediam ipsius sedem, quæ maiorem respicit angulum, uniuersam occupans.^d Alter uero musculus totum minorem angulum amplectitur, ductum quodammodo circularem obtinens. A medio namque inferioris palpebrae ortus, per minorem angulum circunducitur, & in superiorem palpebram ascendens, in reliquam cartilaginis dimidiam sedem sese inserit, priorique musculo, non ad cartilaginem tantum, sed etiam per reliquam superioris palpebrae longitudinem^e committitur adeò sanè, ut nisi fibris ambos distinxeris, uterque unus esse apparebit. Fibræ enim secundi, nostro C, quum palpebra sursum ducta est, respondent, ea autem conniuente, acutum magis efficiunt angulum. Prioris uero musculi fibræ minus obliquæ conspiciuntur, & uelut ex duplici ducuntur principio, nimirum ex angulo maiori, & superciliij parte naso contermina. Horum musculorum beneficio superior palpebra & attollitur, & deprimitur. Prior enim ipsam ad superiora contrahit, posterior, qui minorem perreptat angulum, ipsam deorsum agit. Simul nanque semper attrahitur, tam altera tarsi pars, cui contractus musculus non implantatur, quam reliqua. Huius autem causa est, tarsi durities, si enim esset membranofus, uel carnosus, uel quomodocunque libet mollis, præterquam quod cilia non reseruaret erecta, motam partem, reliqua

a 18 fi. cap.
14 li. 7. n. 1.
b 1 fi. ca. 35
lib. 1.

c A. de in C.
b. 3 tab.
C.

d D. de in C.
3 tab. D.

e F. 3 tab.
E.

reliqua haudquaquam sequeretur. Id quod prouidens Creator, durum cartilagineumque tarsum ipsi palpebrae innexuit, in quem utriusque musculi fines infererentur. Quemadmodum enim si baculum aliquem obliquum & retortum, utra uoles parte apprehensum, attraxeris, sequitur totus, pari modo tarsus quoque utrumque musculum alternatim uniuersus sequitur. Quod uero iam dicti palpebrae motus, eodem ritu cum reliquis totius corporis motibus, qui ex oppositis perficiuntur musculis, celebrentur, omnibus conspicuum esse debet, uno scilicet musculo in se contracto, altero uero à propria functione quiescente, & longiore reddito laxatoque. Si enim uterque musculus conuelleretur, & ad seipsum, sibi continuam tarsi partem alliceret, sursum quidem pars eius, quae magnum respicit angulum, reuelleretur, deorsum autem traheretur ea, quae paruo uicinior est, ac ita non magis aperiretur oculus, quam clauderetur, eaque uideretur palpebra, quam in Praefagiorum Libris Retortam uocauit Hippocrates. Cuius sanè oraculi gratia non oscitanter palpebrarum musculos à studiosis obseruari uelim, est enim, ut omnium propemodum in facie motuum, eorum quoque speculatio ardua. Quod uel Galenus facile attestatur, qui in Libris de Affectuum locorum cognitione, tres palpebrae musculos secus atque alibi recensuit. Duos enim illos, quos iam enumeravi, innuit palpebram deorsum trahere, & tertium à fronte natum, ductus palpebrae ad superiora autorem ponit. Neque adeo adhuc palpebrarum motus admirandus uenit, atque pelliculae illius, quam in auibus, & testudinibus, aliisque plurimis animalibus ex maiore oculi angulo, quoties oculus conuiuet, toti oculo obduci conspiciamus, & quae aperto oculo rursus ad maiorem oculi angulum collecta, quid simile commonstrat, nostrae carunculae in maiori oculi angulo repositae. Quae itaque ad superioris palpebrae motum pertinent, sic se habent, inferiori interim palpebra optimis rationibus & minori & immobili. Porro musculorum palpebram mouentium administratio eiusmodi ferè est, qualem praecedenti Capite descripsimus, optimè tamen cultellis paruis, quibus in aptandis calamis utimur, & hamulis negotium perfeceris. Cutem enim omni industria à carnea membrana ad tarsum usque, in utraque palpebra oportet adimere, ac nequaquam perfunctorie cutis cum carnea membrana connexum intueri, ad ipsaque hinc absentiam, ut pars leuior, musculorum sequacior redderetur, perpendere, id namque utiliter affectuum gratia, quos ὁστέωδες Graeci uocant, & alios qui in palpebras non infrequentes procumbunt, fluxus perdisces.


Difficile esse palpebras mouentium musculorum cognitionem.

Administratio palpebram mouentium musculorum.


DE OCULORVM MUSCVLIS.

Caput XI.

PRIMA
OCVLI MV-
sculorum figura.



SECUNDA
OCVLI MV-
sculorum figura.



PROPOSITARVM IAM FIGVRARVM ET EARVNDem characterum Index.

QUONIAM in integris musculorum tabulis, oculi musculos depingere non datur, ipseque oculus ex caluaria ad musculorum ostensionem euellendus sit, hic ipsorum delineationem reposuimus. Ac in harum prima quidem, oculus simul cum suis musculis in ipsorum sede adhuc repositis, una facie delineatur. Secunda uero, sex primos oculi musculos ab insertionem humi prostratos commonstrat, septimo adhuc ad uisorium neruum asseruato. Ceterum notarum Index sequenti proponetur pagina.

A_{1,2}. Anterior oculi sedes, in qua iris consistit.

B_{1,2}. Visorius neruus inibi resectus, quā primum ex caluaria in oculorum sedem delabitur.

C, D, E. Tres in hac facie muscoli occurrunt, nondum scilicet aliquo musculo sua sede liberato.

F, G. Interuallorum inter sex primos musculos consistentium, & adipe oppletorum duo in hac facie apparent.

H, I, K, L, M, N. Primi sex oculi muscoli, uerū H musculum notat, quo oculus sursum agitur, I quo deorsum, M & N quibus circumagitur, K quo ad maiorem oculi angulum ducitur, L quo ad minorem angulum fertur.

O. Septimus oculi musculus, nulla ex parte a uisorio neruo liberatus, ac ab adipe ipsum alioquin integente omnino detectus.



*Oculos motu
uoluntario mo-
uendos.*

*Oculorū mo-
tus*

*Musculi sex
primi.*

VONIAM neq̃ ex lateribus, neq̃ ex posterioribus, neq̃ superioribus, uel in
ferioribus sedib. neque omnino aliter, quā secundū pupillæ rectitudi-
nem, oculorum uisio perficitur. paucissima utique uideremus, si oculi im-
mobiles penitus essent. Qua de causa ipsos ita corporis nostri Conditor
creauit, ut plurimum circumduci possint, & præter hoc, collum ad motus
promptum reddidit, ideoque potissimum duo facti sunt oculi, etiam no-
tabili spacio distiti. Ceterum si eos moueri motu uoluntario oportebat, ipsis

quoq̃ musculos largiri necessum fuit. Sed quum oculorum motus sint tres, unus, quo hi in-
trō, uersus nasum adducuntur, & quo extrorsum ad paruū angulū aguntur. secundus, quan-
do sursum tenduntur, uersus supercilia, & deorsum trahuntur uersus malas. tertius, quo ob-
scuro admodum motu circumuertuntur, merito totidem numero duces motuum, musculos
fabrefieri oportuit, atq̃ singulis motibus, qui in geminos diuidi possent, binos musculos apta-
ri necessum fuit. At ex his^a duos quidem in lateribus, singulos scilicet ad utrunque angulum,
^b alios autem duos, unum quidem infrā, alterum uerō suprā, ^c quintum uerō ac ^d sextum, ut cir-
cumuersionis motui præessent, uariè locari oportuit. Cæterum ex his sex numero musculis
primi quatuor, quemadmodum rectis oculi motibus præsumt, ita quoq̃ rectum situm obti-
nent, & omnes omni ex parte sibi similes sunt. Capita enim ipsorum, uelut ex^d dura cerebri
membrana neruum uisorium obtegente, & è neruo^e secūdi paris neruorum cerebri, statim in
nerui uisorij a caluaria elapsu, originem ducunt. Deinde ipsorum uenter amplior, quā pro-
fundior, attamen teres propemodum uisitur, & posteriori oculi regioni, neruoq̃ uisorio, se-
cundū ipsius a caluaria in oculi usq̃ radicem ductus longitudinem, incumbit, & quum pro-
pter mediam oculi sedem (ubi is latissimus est) uenter pertigerit, in latam membranamq̃ ener-
uationem finit. Quæ ultra mediam oculi sedem terminatur, & duræ oculi tunicæ, tanquam
in mouendo ossē, recta (sed secundū corporis latitudinem ducta) linea inferitur, iuxta^f iri-
dem; maioremue oculi circulum, in anteriori oculi parte conspicuum, & nigrum ab albo (ut
ita loquar) dirimentem. Porro musculi, circunductionis oculi opifices, forma quidem ac ortu
prioribus illis respondent, at minores sunt, & ductu insertioneq̃ ab illis uariant. Prior nanq̃
à dura cerebri membrana, uisorium neruum ambiente, è regione minoris anguli originem du-
cit, & in humiliorem oculi sedem, neruosa sua tenuitate inferitur, obliqua linea iuxta iridem,
reliquorum quatuor modo. Alter uerō à uisorij nerui membrana, è regione maioris angu-
li nascitur, & duræ oculi tunicæ, neruosam ipsius tenuitatem, obliquiori linea, ad superio-
rem oculi sedem inferit. Atque hinc fit sex istos oculi musculos solo situ, & in duram oculi tu-
nicam insertionē, idq̃ adhuc modicè, uariare. Primi enim quatuor, uti modò dicebam, pror-
sus recti sunt, rectaq̃ linea inferuntur, alij duo obliquiores uisuntur, obliqua linea insertio-
nem molientes, qui etiam si circumuersioni conducant, attamen & sursum deorsumq̃ ocu-
lum agunt. Atque omnium neruosarum tenuitatum ductus, inter duram oculi tunicam, &
^h adhærentem medius consistit. ⁱ Efformant itaque simul omnes musculi, dum proprium
adhuc situm seruant, turbinatam figuram, cuius conus ipsorum est exortus, basis uerò, eo-
rundem insertio. Breuissimo enim ductu neruo connectuntur uisorio, quum in illorum,
quam unā conformant capacitate, multus cōtineatur^k adeps duriusculus, & albus admodū,
atque is rursus alteri cuidam obuoluitur musculo. Est enim præter commemoratos sex oculi
musculos, ^l alius musculus grandis, undecunq̃ ab illis & eo, quem diximus, adipe circunda-
tus, ac solus similem figuram, quam priores sex simul efformabant, constituens. Nam muscu-
lus iste principium quoq̃ à dura membrana, neruum uisorij inuolvente assumit, at paulò an-
terius, quā sex priores, illorum enim origo ab oculi corpore remotior est, quā eius,
quem

*a 2 fi. unus
K. alter L.
b 2 fi. unus
L. alter H.
c 2 fi. M &
N.
d specta a
e 7 fig. 17
ca. 14. li. 7.
f 1, 2 fi. cap.
2 lib. 4. K.
* 1, 2 fi. ca.
2 li. 4. K.
f figura 16
e 17 cap.
14. lib. 7.
gearundem
fi. x.*

*Adeps muscu-
lis oculorum
interpositus.*

*Septimus ocu-
li musculus.*

*h 18 fi. cap.
14 li. 7. n. n.
aut specta
illic 1 figu-
ra G, M, Q
i tota, fi.
k 1 fi. F, G.
l 2 fi. O.*

quem nunc enarramus, muscoli. cuius principium similiter carnosum est, ut etiam reliquum totius muscoli corpus, quod orbiculatim uisorium neruum ambiens, ac à principio in priora porrectum, instar turbinis tantisper dilatescit, dum posteriorem oculi sedem contingat, illique circuli modo implantetur. Atque hanc insertionem musculus molitur, non quidem neruo uisorio proximam, sed ferè ubi oculus amplissimus fieri incipit. Quemadmodum uerò inter hunc musculum, & sex priores adipem repositum dixi, ita etiam inter neruum ipsum, & præsentem musculum eo interuallo, quo is à neruo abscedit, adeps colligitur. Musculus hic nullam prorsus inscriptionem obtinet, nisi fortassis unam in inferiori ipsius sede, secundum ipsius longitudinem protensam. Vnde etiam miror, hunc non unius muscoli loco à cæteris Anatomicis enumeratum fuisse, sed ab alijs duorum, ab alijs trium: quum interim musculum hunc uix obiter omnes descripserint. Ac proinde etiam uereor, ipsos non admodum aptè muscoli huius usum expressisse, dum hunc priuatim, retentionis oculi in sua sede autorem esse asserunt, nullum præterea illi usum ascribentes. Quum tamen aptius sex priores muscoli id munus sibi uendicare possint, ut quorum externa superficies, membranæ oculi sedem in caluaria exculptam succingenti, fibris multis connascatur. Quinetiam sex isti priores propinquius ipsi capitis ossi, ubi neruus ex caluaria elabatur, pertingunt, ilico enim atque neruus emergit, ex ipsius dura membrana principium mutuatur, omni ex parte septimum occultantes. Quamquam fortassis non defuturi sint, qui originem horum musculorum non à dura cerebri membrana, uerum ab illa quæ os succingit, pendere cõtendent, quum interim septimus musculus, multis interuallis undique ab os succingente membrana distet, quod profectò factum nõ fuisset, si modò huius beneficio oculum in sua sede retineri, ac quodammodo ad cerebrum trahi oporteret. Et si fortassis ipsius naturam accuratè rimatus fueris, illum instar tegumenti uisorio neruo obduci concedes, & postmodum etiam oculum rectis motibus agere fateberis, prout nimirum has illas uel sui corporis fibras contraxerit, laxauerit uel.

Septimi officium.

OCULI MUSCULORVM ADMINI-

stratio. Caput XII.



RECTIVS musculorum oculum mouentium administrationem, illo ex caluariæ sinu euulso, perficies. Euellitur autem promptè uniuersus, integra adhuc caluaria, si omni ex parte oblongo cultello, ad os semper ductis in circuitu sectionibus, à suo sinu ipsum liberaueris, & tandem neruum uisorium, ubi primum ex caluaria procedit, absecueris. Si uerò caluaria fortè ad cerebri inspectionem prius fuerit dissecta, ipsumque cerebrum auulsum, cõduxerit duabus lineis caluariam ferra diuidere, una quidem linea à regione maioris anguli, uersus uisorii nerui foramen facta, altera autem à minori angulo ad prioris sectionis, iuxta foramen illud, terminum. Si enim ad eum modum ferram in oculorum usque sedem penetrare coegeris, totam superiorem partem sedis oculorum, instar cuiusdam trianguli auferes, ac deinceps undique oculo à pinguedine liberato, illum adimes, aut si uisum erit, oculum ab osse undecunque liberatum solius uisorii nerui interuentu, caluariæ appendere fines. Euulsum ministro tenendum porriges sic, ut summis dextræ manus digitis nerui uisorii finem (quem & eleuabit) sinistra autem manu uelut in pugnum coacta, in indice ac pollice anteriorem oculi partem comprehendat. Mox adipem oculo, ut minori molestia humectatus moueretur, circumpositum, & glandulas, uenarum & arteriarum diuisionem intercedentes adimito. Dein consideratis musculorum ductibus, & quam simul omnes constituunt, forma, sex capita primorum à neruo uisorio acutiori cultello liberato, ac singulos deinde musculos leuiter secando, ad mediam usque oculi regionem deducito, unumquenque supra læuam ministri manum, quasi stellam effigiaturus extendens. hac nanque ratione cuiusque implantationem, formam, & usum leui negotio cõdisces. Porro nihil æquè diligenter præcauendū uenit, ac ne adhærentem albam uel oculi tunicam à cornea prorsus abrasas, nimiumque oculum emungas, priusquam sex musculorum insertionem intuitus fueris. aliàs enim (nisi fortè exercitior sis) eam uiciabis, neruosam alicuius muscoli tenuitatem unà cum adhærente membrana incuriose absecans. Iam ubi adipem in media horum musculorum amplitudine coaceruatam, unguibus, aut cultello à septimo oculi musculo adempseris, illum quoque aggredi integrum est. Primum itaque quum neruum ambiat, circulatimque in oculi radicem implantetur, examina, ipsum à neruo prorsus ad duram usque oculi tunicam radendo. Cæterum si caluariæ adhuc hærentem oculum administrare animus sit, musculorum capita primum liberans, ad eum quem iam

Administratio in oculo à caluaria resercto, & oculum eximendi modus.

Administratio oculi musculorum, quum is adhuc caluaria hæret.

X dixi

Ostendit hæc prima figura.

21. fi. ca. 9. li. 1. T. V. & alij multi characteres.

Hæc quasi ostendunt duæ cap. 11. figurae.

6. 18. fi. cap. 14. li. 7. n. n. c. 17. fi. cap. 14. lib. 7. x.

modum, musculos attrectabis, capita scilicet à neruo adhuc fixo ad insertionem usque (quæ nō procul ab iride consistit) deducens. Commodius tamen, minoriq; molestia priorem sectionem obibis. In utroque tamen administrandi modo, oculi situs semper perpendendus est, quem^d caruncula indicabit, maiorem angulum in homine occupans, & (ut creditur) pituitam in genas defluere præcauens. Hæc nanque (dummodo cognoscas, an dextrum, an sinistrum oculum in manus assumpseris) oculi regionem, quæ magnum spectat angulum perpetuò commonstrabit, à qua ilico reliqua oculi latera opportunè petes. Interest autem, oculi regiones, propter obliquos musculos, potissimum cognoscere. Aut si lubet, neglecta caruncula, poteris cultello carnam membranam, priusquam oculum à caluaria resecabis, punctim in aliqua parte radere, hincq; oculi regiones semper augurari.

d 19 ta. ca.
i 4 lib. 72.

DE BUCCARVM, LABRORVM, ET
nasalium musculis. Caput XIII.



Alterius lateris primus musculus, uel simul omnium primus ac secundus.

Li. 4 de Ad ministrandis sectionibus.

Nōnullis hominibus aures moueri.

IBRO superiori,^a duo narium ossa in^b duas desinere cartilagine, atq; horum extremo secundum latera alias^c duas molles, & latas cartilagine (quas alas uocant) accumbere alligariq; scriptum fuit. Nunc uerò musculos, qui eas mouent, simul cum buccarum genarum ue labrorumq; motoribus exequemur. Cæterum quum buccarum & labrorum motus dicimus, illi intelligentur, quos quiescente etiam inferioris maxillæ osse obimus. Alijs siquidem musculis maxillæ os, alijs uerò buccæ labraq; motu aguntur uoluntario. Duorum itaque primorum, qui buccas & labra mouent musculorum, in utroque latere^d singuli habentur membranei, admodumq; ampli. Hi enim ex omnium uertebra-^erum ceruicis spinarum regionibus, deinde scapularum, & clauicularum, & pectoris ossis sedibus originem ducunt, usque ad faciei medium protensi. Sunt autem hi aliud nihil omnino, præterquam membrana (quæ merito carnosam nobis dicitur) carnosissimis fibris adaucta, hæc enim in tota paulò antè commemorata sede, musculosa penitus reddita, aliquò usq; uerè carnosam efficitur. Cæterum carnosæ hæc fibræ à nullo prorsus osse originem (ut fortassis quispiam ab alijs Anatomicis lusus arbitraretur) ducunt, neque etiam quis musculum hunc ab aliquo osse principium petere, non perperam dicturus est. Is nanque non aliud existit, quàm carneæ fibræ nuper dictæ membranæ intensæ, & multis neruorum furculis concommitatæ, qui quòd à subditis membranæ corporibus in illam excurrant, ipsam firmitus substratis sibi partibus connectunt, quàm in reliquo ferè corpore illis, quibus obducitur, musculis hæc affirmari solet. Prorepunt autem primum eiusmodi neruorum soboles in membranam, secundum totam colli longitudinem, seu à thorace ad occipitium usque ex ea sede, qua spinarum ceruicis uertebra-^frum consistit regio. Item secundum scapularum spinarum ductum, summos humeros, clauiculas, & eminentiorem pectoris ossis regionem, neruuli quoque instar tenuissimorum filorum, à subditis musculis membranæ exporriguntur. Atque hi neruorum furculi omnes, secundum carnearum fibrarum ductum (qui perquam uariis est) reflexæ excurrunt. Fibræ enim^g à pectoris ossis sede, mediâq; clauicularum regione pectoris os spectante sursum, uersus faciem conscendentes, secundum colli longitudinem recto tramite protenduntur.^h Quæ autem ex reliqua clauiculæ sede, & summi humeri, & scapularum sedibus ad ceruicis usq; spinam incipiunt, oblique sursum contendunt, tantoq; obliquiores uisuntur, quanto ceruicis spinæ sunt propinquiores. Omnes enim fibræ à ceruicis uertebra-ⁱrum spinarum sedibus prorepentes, unâ cum eius partis neruorum^j furculis transuersim feruntur, atque idèò magis, quo musculus occipitio uicinior existit. Porro eiusmodi fibrarum ductus, in ceruice admodum conspicuus est, nullaq; fibrarum intersectio, ut neque etiam in summo mento, & in inferioris maxillæ iuxta aurem regione sese offert.^k Verum ubi iam labra cōtingunt, fibræ inter se adeò confunduntur, ut rectas, & obliquas, & transuersas iam amplius distinguere prorsus arduum impossibileq; sit, atque id præcipue secundum totâ inferioris labri regionem accidit. Labri enim superioris lateri ad alas usque narium duntaxat fibræ porriguntur. Posterius itaque huius musculi initium, à spinæ ceruicis sede omnino promitur, deinde secundum occipitij ossis basim fertur,^l mox sub aurem, ut ipsius radicem perreptando contingat. Imò interdum hic adeò ascendit, ut & auris huius beneficio quibusdam hominibus (non etiam stupidis, aut asinis) moueatur, uti inter alios quosdam hinc Patauij uidere est, in lepidi ingenij Iurium Doctore non minus egregie erudito, quàm iucundè faceto, Claudio Symionio Foroiulensi, dein in nō minus audaci, quàm fortis & strenuo, Petro Rauascherio Genuensi. Cæterum præsens musculus ab aure in faciem ductus,

a 1 fi. 9. ca.
li. 1. 3.
b 4 ta. K.
c 4 ta. L.

d 3 tab. musculus r notatur circūscriptus H, I, O, N, L, K, M.

e 3 tab. à K ad L.
f 3 ta. ab L ad O.

g Hanc neruorum seriem, aliquo pacto ostendit colli figuræ 3 cap. 11. lib. 4.
h iuxta H.
i 3 ta. ab O ad H.

4 tab. A. ctus, ^k illum quem à mandendo maffetera uocabimus, musculum contingit, & paulò ualidiùs
 offi in malis, quàm alibi in reliquo ipsius ductu connascitur, hinc ad nasi usque radicem pertin
 gens. Atque hunc ductum musculus adeò seruat exquisitè, ut duo hæc latera musculi diffini
 3 ta. quasi
 ab O ad N. antur, ^l unum quidem, secundum spinæ longitudinem protensum, ^m aliud autem, ab occipiti
 3 ta. ab O medio ad superius labrum prorepens. Reliqua uerò duo ipsius latera (sortitur enim quatuor)
 ad H, M. haud æquè sunt distincta. ⁿ Quod enim à spina ad summū usque pectoris ossis, secundum scā
 3 ta. quasi pulam & clauiculas exporrigitur, inæquale est ac uarium. Quandoquidem non instar rectæ
 ab N per L lineæ carnosarum fibrarum hic apparet principium, sed instar obliquæ, admodumq; inæqua
 ad K. lis, nunc paululum sub scapulæ spina & clauicula incipiens, nunc paulo superius, & nunc è re
 3 ta. ab M gione. ^o Quartum autē latus, quod à summo mento, ad superiorem pectoris ossis sedem pro
 ad K. tenditur, uix ob id distingui potest, quòd hominibus utriusq; lateris musculi hîc adeò coeant,
 ut duo musculi unus esse uideantur, quodq; hac in parte carnosiores longè, quàm in reliqua
 ipsorum sede existant. Cæterum hî musculi buccas, & totum inferius labrum deorsum retra
 hunt, & ad latera simul cum superiori labro abducunt, aut, ut dicam uerius, reliquam faciei cu
 tem, quæ à musculosa frontis & nasi substantia, & palpebræ musculis non mouetur, circum
 4 ta. M. 5 git, ad hoc opitulante ^p lato quoque, & quodammodo orbiculari musculo, à tota ferè superio
 4 ta. E. ris maxillæ longitudine in inferioris longitudinem, ad gingiuarum radicem inserto. Est au
 tem hic musculus similiter membraneus, & uaria fibrarum specie intertextus, totam eam buc
 carum sedem cōplectens, quam inflare possumus. Neq; sanè aliud corpus id uniuersum, quod
 3 ta. r. inflatur, censendum est, quàm cutis, cui immediatè succumbit ^q primus iam commemoratus
 musculus, deinde prout obesoires homines sunt, adipis maior minor ue copia, & postmo
 3 ta. G, H. dum quidam superioris labri ^r musculus, & ^s alius labri quoq; eiusdem, & alæ nasi communis,
 3 ta. F. quos postea describemus. præterea orbicularis & amplius quoque musculus, cuius naturam
 explicare iam contendimus. Huius itaque musculi internam superficiem, oris amplitudinem
 succingens tunica oblinît, ipsiq; adeò connascitur, ut nullo prorsus modo illacera à musculo,
 aut musculus ab illa auferri queat. Imò secundus hic buccarum musculus, uix aliud est, quàm
 carnosarum fibrarum implexus admodum tenuis, ac quodammodo membraneus. Cogno
 sces autem eam, quam diximus, utriusque iam commemorati buccarum musculi, & potissi
 mum primi functionem promptissimè, si inferiore maxilla superiori adducta, immotaq; pluri
 mum ad quamcunque partem sedem ue, labra & buccas duxeris, atque etiam obseruaueris,
 quæ etiam anteriorem colli cutem primi musculi beneficio, unà cum buccis deorsum uellere
 possis. Rursus si immota colli cute, totam buccarum sedem, quam inflare integrum est, nunc
 in oris amplitudinem uolueris, nunc autem extrorsum, nunc sursum, nunc deorsum, nunc
 prorsum, nunc retrorsum duxeris, secundi musculi functionem & motus, quos illius, & aëris
 in ore uiobimus, plurimum admiraberis. Et si demum in corpore illum inspexeris, non nisi
 cum summis rerum Opificis, quas proloqueris, laudibus, uarium illum, & quem neutiquam
 explicare posses, fibrarum implexum, & undecunque in hunc procurrentes neruulorum so
 boles intuebere. Toti itaque faciei cuti, ut mobilis reddatur, præter secundum hunc muscu
 lum, & labrorum & nasi proprios, quos statim enarrabimus, musculos, membranam car
 nosam in musculi naturam degenerantem rerum Opifex subiecit. Si modò malarum cutem
 4 ta. I. 5 duntaxat dempseris, ^t illi enim membrana, quam carnosam uocamus, subnascitur quidem,
 4 ta. G. 2 uerum hîc nullis carneis enutrita fibris. Nihilominus tamen quum cutis, quæ malis obtendi
 4 ta. 2. li. 4 tur, inferior pars buccis continuetur, superior uerò subiectæ frontis musculosæ compagini
 o. V. uniatur, simul cum reliqua faciei cute, malarum quoque cutem mouemus. Quàm uerò ad hoc
 latorum musculorum, qui carnea membrana constant, munus homini necessarium sit, condi
 scimus, quoties labrorum substantiam deflectere, ac à suo situ auertere cogimur, aut os disten
 dere & contrahere, stringere & laxare, quocunque edentium, bibentium, uel differentium,
 uel aliam quandam functionem obeuntium usus uocauerit. Atque harum omnium functio
 num autores, Galenus in Quarto de Sectionibus administrandis libro, hos tantum musculos
 4 ta. I. 5 esse, insinuare uidetur. Sed priuatim ^u neruis huc concurrentibus mouendi officium, nulla
 4 ta. G. 2 (ut tamen decebat) habita musculorum mentione, tribuit. Sunt autem nerui eiusmodi utrin
 4 ta. 2. li. 4 que bini, quorum unum ex foramine inferioris maxillæ, ad inferius labrum elabi suo loco
 o. V. docebimus, alterum ex oculorum sede per peculiare foramen deductum, in malarum regio
 nem decumbere audies. his duobus, in alio latere totidem, ab eisdem sedibus sui lateris pro
 4 ta. I. 5 cidentes respondent. Verum quum eiusmodi nerui musculis indigeant, & omnes labrorum
 4 ta. G. 2 motus, illis latis & tenuibus tantum peragi nequeant, ipsiq; alios exigant auxiliares, meritò
 4 ta. N. Natura alios ^x quatuor musculos mouendis labris construxit. Quorum principia, euidentia
 notatur.

Secundus al
 terius lateris,
 seu omnium 3
 4.

Malarum
 cutem musculo
 destitui.

*Labrorum
constitutio,
dein quatuor
musculi labris
proprijs, seu in
altero latere
certius, et po-
stea quartus,
vel omnium 5,
6, 7, 8.*

quidem & manifesta sunt, anteaquam labrorum extremis permiscerentur, concreta uero illis, omnifariam redduntur obscura, & inseparabilia à reliqua labrorum substantia. Vniuersa enim labrorum cute, & oris amplitudinem succingente tunica, toti musculosa naturae commixtis, ac musculis, ut quispiam dixerit, ibidem corruptis, una cum^y fungosa, quam postea explicabimus, substantia, hominis labra procreantur. Quatuor itaque sunt musculi, quoniam labris quatuor principiamotuum esse oportebat, utrinque uidelicet duo, quorum moles, organis illorum beneficio mouendis congruit. Primorum enim duorum, qui superiori labro communes sunt, utrinque^a unus habetur, qui à maxillae superioris ossis, ubi mala consistit, car-
 noso principio enatus, deorsum oblique in priora fertur, quousque in sui labri latus sese inserat. inferiorum quoque utrinque^b unus obseruatur, superiori musculo latior, sed breuior. Exoritur nanque carneus & hic quoque, ab inferioris maxillae humiliori parte ad menti quasi latera, hinc sursum oblique in priora protensus, latusque permanens, in mediam sui labri sedem implantatur. Sunt itaque omnes quatuor lati, ac quodammodo, quod ad fibras attinet, duplici donati initio, ipsorumque fibrae circa insertionem, x literae modo sese intersecant pertinaciter, uti admonuimus, labrorum cuti immixtae. Quatuor his musculis duodecim motus ut minimum obinuis, quatuor quidem obliquos, in utroque labro duos, & alios octo rectos, in utroque labro quatuor. Duo quidem ad amussim recti fiunt, quando labra plurimum à se inuicem distant, hoc quidem à duobus musculis sursum agentibus ad nares tenso, altero autem deorsum ad mentum ducto, dum duo inferiores musculi laborant. dein quando ad sese labra retrahuntur, & inuicem coeunt, uno ex superiore loco deorsum, altero ex humiliori sursum protenso. Caeterum ab internis horum musculorum fibris, labra introrsum conuertuntur & subimplicantur, ab exterioribus uero foras euelluntur, ut ita & duo alij in singulis labris recti cōsurgant motus, qui paulo minus toto ad obliquos quasi referendi sunt. Quatuor uero obliqui motus, unico duntaxat laborante musculo, reliquo interim laxato, celebrantur. Si enim dexter superioris labri musculus remisso sinistro contrahitur, dextra labri pars obliquo motu, sinistra dependente, attollitur, atque hac ratione reliqui tres obliqui motus labrorum peraguntur. Ut uero ualidius adhuc superius labrum moueretur, atque secundum totam ipsius substantiam musculis participaret, illi alia portio^c musculi elargitur, qui narium^d alas extrorsum sursumque agit. A malis enim iuxta proprium superioris labri^e musculum, carneus quidam, sed tenuis membraneusque enascitur musculus, qui in ipso modice uersus priora descensu, in duas portiones partitur, unam nasi alae radici, alteram superioris labri parti, quam Latini Mustacem, Graeci uero *ωλύνη* uocant, inserens. Portio nasi alae exorrecta eam extrorsum sursumque mouet, quae labro propria est, id quoque sursum uellit, & tantus huius portionis cum alae portione est connexus, ut superius labrum, immota ala, sursum uehementer mouere nequeas. Verum praeter hunc alae musculum, ^f alius in interna narium amplitudine habetur, ad suae cauitatis externum latus, sub tunica narium amplitudine obducta, reconditus. Est autem hic tenuis & membraneus, interiori alae regioni insertus, illumque intro trahens. Musculus hic neruulum habet ab ^g illo, quem per ^h foramen in magno oculi angulo incisum, ad narium amplitudinem, à tertio cerebri neruorum coniugio diffundi commemorabimus. Atque huiusmodi alarum musculos efformari decebat, qui in repentinis aeris inspirationibus & expirationibus, earum motibus opportunè praeficerentur. Sunt itaque hoc Capite nobis enumerati duodecim musculi, si omnes utriusque lateris iunxerimus, duo quidem lati ex carnea constantes membrana, duo admodum uarij ex una maxilla in aliam pronati, & quatuor labris proprijs, & totidem alarum nasi. Nisi fortassis illum, qui labrum superius & alam simul adit, subdividere constitueris, atque ex utriusque lateris musculo duos, propter dissectionem in progressu, & in diuersas partes insertionem, fingere, atque ita quatuordecim musculos statuere uisum sit. Sic etiam nihil obstat, & duos qui carnea membrana efformantur, unum dicere, quum hi adeo in anteriori colli parte continuentur, utⁱ diuisionem nullam notatu dignam ostendant. Rursus si fibris motibusque, cum in hoc, tum in proprijs labrorum musculis animum accommodare uelis, ob idque in plures musculos hos diuidas, maior sanè tibi, quam nobis haecenus, horum musculorum numerus excreset.

*Alarum nasi
musculus, hic
autem in altero
latere 5, aut
omnium 9 &
10.*

*In altero latere
6, aut omnium
11 & 12.*

*Musculorum
epilogus.*

y 5 ta. G.

d 3 ta. G. H.

b 4 ta. N.

c 3 ta. F.

d 4 ta. L.

e 3 ta. G.

f ad regionem K tab. 4.

g 2 fig. ca. 2. li. 4 P.

h 1 fi. 12 ca. lib. 1 C.

i 3 ta. ab M ad K.

a, tab. r.



ORVM musculorum administrationem à^a latis ac ex carnea constan-
 tibus membrana musculis opportunissimè auspicaberis, & primùm
 acutiori nouacula in cute rectam sectionem, à summo mento, mediaq̃
 inferioris labri sede (ubi cutis in ruborem desinit) ad pectus usque, secun-
 dùm colli longitudinem duces ita quidem ad amissim, ut sola cutis ad
 subiectum usque muscolum, carneam ue membranam diuidatur. Dein-
 de alia ducenda est sectio, ad utriusque labri extremum, secundùm rubo-

Primi ac se-
 cūdi duodecim
 præcedentis
 Capitis muscu-
 lorum admini-
 stratio.

ris tinem lic, ut orbiculari linea os uniuersum obducatur. His alia per nasi longitudinem ad-
 detur sectio, & si prius frontis musculorum compagem, & palpebræ musculos aggressus fu-
 eris, nulla præter has (nisi sub aure ad medium usque occipiti) in facie sectio est ducenda.
 Aliàs enim ex summo narium, sub inferiori palpebra & aure, uersus occipitium transfuersam
 moliri deberes sectionem. Cæterum à fine sectionis ad pectoris usque os ductæ, transfuersa
 una sub clauiculis, & summo humero, & scapularum spina ad dorsum usque perficietur. li-
 cebit & his transfuersam ex faucibus, seu ex gutturi regione, usque ad spinam adijcere. His
 tentatis sectionibus, hamulo cutis leuabitur, ac in altero latere acutiori nouacula, cutis à sub-
 iecto membraneo musculo, omni industria liberabitur. Quod nullibi feceris molestius, quàm
 ubi laqueus ceruicem compresserit, hinc enim laquei occasione, cutis membraneo musculo
 pertinacissimè connata reperitur, & etiam cutis instar cornu adeò inibi mox indurescit, ut uix
 nouaculam admittat. Quanquam musculorum sectioni corpus opportunius adhibebitur,
 ex quo uenæ prius sectæ, uniuersum sanguinem in aquam calentem effuderint. quandoqui-
 dem tunc non toties uenæ sanguine inanitæ, dum musculos diuidis, uenient colligandæ, atque
 adeò frequenter spongijs abstergendæ. Ex altero autem cadaueris latere, unà cum cute (quod
 factu facillimum est) muscolum latum tenuemq̃ auferes, atque utrinque musculi naturam, &
 fibras neruosq̃, ac munia (si hinc inde suas, quas prius enarrauimus, partes attraxeris) intue-
 bere. Fibrarum autem huius musculi seriem, nequaquam oscitabundus in tota humiliore infe-
 rioris maxillæ sede præteribis, quin prius eas strumarū, uel ut uulgò dicimus, scrophularum
 gratia diligenter examinaueris, quo in eo abscessus genere, quum usus expetet, scelicius ac ma-
 gis industriè tumentes glandulas exseces. Administratio enim sectionis in hoc affectu extra
 fibrarum ductum tentata, admodum obscenè hinc inde colli cutem aut tendit, aut corrugat.
 Vbi hæc igitur sedulò obseruaueris, eius lateris muscolum, quem subditis corporibus adem-
 pta cute affixum reliquisti, omni ex parte adimes, atque administrationem ad proprios la-

Corpus mu-
 sculorum secti-
 oni opportu-
 num.

Administra-
 tio 5, 6, 7, 8.

b 4 tab. N.

c 5 ta. G.

d ad latera

G 5 ta. 6.

e 3 tab. d G

ad H.

f 3 ta. F.

g 4 ta. I.

h fi. ca. 6. li.

3 T. V.

i 2 fi. cap. 2

h. 4 humi-

lius P.

brorum musculos cōuertes, qui in conspectum ueniunt, quamprimum adipem, qui his præci-
 puè in buccarū regione incumbit, permisceturq̃ unà cum lato, qui ex carnea cōstituitur mem-
 brana, musculo ademeris. Liberabis itaque ab inferiori maxilla primùm^b duorum, qui infe-
 riori labro elargiuntur capita, sensim ea ad insertionem usque, ut fibras examines, deducens.
 Atque hinc labra fungosæ cuiusdam^c substantiæ interuentu, maxillæ ossi connata reperi-
 quæ labris opitulatur, quoties distrahuntur, tenuesq̃ fiunt, & quoties contracta incrassan-
 tur, ac corrugantur. Quippe eiusmodi substantia omnino & inanitur, & repletur promptè:
 inanita quidem submittitur, repleta uerò attollitur. Præter hanc substantiam occurrent &
 nerui duo, maioris tertij paris neruorum cerebri radicis ramuli, ex maxilla inferiori in eos,
 quos iam dissecas, musculos diffusi. Cæterum posteaquam inferiores liberati fuerint, à ma-
 lis^e duos quoque superiores dissecabis, atque illis ad superius usque labrum deductis, qua-
 tuor musculorum functiones, capita huc illuc trahens spectabis. Postremò^f musculo alæ na-
 si, & superiori labro communi à malis derafo, ac ad alam usque & labrum deducto, eius
 quoque usum contemplabere. Hinc uolens prætermittō^g neruum minoris gracilioris ue ter-
 tij paris neruorum cerebri radicis propaginem, ex superiori maxilla excidentem, ac nuper di-
 ctis musculis communicatum. Siquidem neruorum omnium seriem, quàm dabitur, accu-
 ratissimè in Quarto libro prosequar. Atque eadem ratione nullam neque uenarum neque ar-
 teriarum mentionem facio, etiam si lato musculo^h externa iugularis suffulciatur, quoniam
 Tertius liber Venis arterijsq̃ dedicabitur. Integrum itaque est, ut consideres membranosa li-
 gamina, narium alas alijs nasi cartilaginibus colligantia, & deinde mutuum earum cartilagi-
 num connexum. Nam de nariumⁱ tunica in Neruorum distributione similiter pertractabi-
 tur. In præsentia autem suffecerit adhuc sermoni adiecisse, tunicam illam, quæ narium ampli-

Labrorū fun-
 gosæ substan-
 tia.

Administra-
 tio 9 & 10.

Administra-
tio 11 & 12.
Administra-
tio 3 & 4.

tudinem ambit, aliquousque cultello à subditis partibus abradendum esse, ut commodè te-
nuem membraneumq^k musculū, intrò alam mouentem intuearis. His omnibus resectis, secun-
dus alterius lateris præcedente Capite enarratus mihi^l musculus, externa ipsius superficie lon-
gè spectatissimus est, ut tamen ipsius naturam quoque examissim obserues, undecunque un-
guibus, hamulisq^p est diuellendus, ac postmodum à maxillis, & dentium gingiuis derafus, à
tunica oris cavitatem obtinente uenit liberandus. Et quo huius musculi rarior magisq^p admi-
randa est cōstructio, fibrarumq^p mirabilis implexus, eo studiosiùs illum in multas particulas
non mediocri delectatione discerpes, atque ad buccarum motum, non autem maxillæ inferio-
ris, illum auxiliari speculaberis.

DE MUSCULIS INFERIOREM MA-
xillam mouentibus. Caput XV.

Inferiorē ma-
xillam superio-
ri quiescente
moueri.



INFERIOR^a maxilla homini, quiescente interim immotaq^p superiori, a figura ca.
motu agitur uoluntario, quemadmodum & animalibus ad unum om- lib. 1.
nibus, si fluuiatilem crocodilum exceperis, cui unico superior maxilla mo-
bilis uisitur, inferiori interim cum temporum ossibus adeò unita, ut ne tan-
tillum quidem moueri queat, ipsaq^p duos sinus nanciscatur, quibus su-
perior singulis utrinque tuberculis latis, nec^b nostris admodum diffi-
milibus inarticulatur, magna ex parte lacertarum testudinumq^p inferiori

Maxilla in-
ferioris motus

Maxilla mu-
sculorum no-
mina.

Libro 11.

Masseter seu
alterius late-
ris primus.

maxillæ eleganter respondens, quemadmodum etiam totus crocodilus imagine (non autem
magnitudine, & geniculatis caudæ tuberibus) lacertæ similis uisitur. Cæterum inferior homi-
nis maxilla tribus ducitur motibus, ac unus quidem in mandendo perficitur, quo ad latera,
& prorsum & retrorsum maxilla agitur, ac circumfertur, alius in ore claudendo, tertius ue-
rò in ore aperiendo fit. Motus hi omnes proprijs obeuntur musculis, ex quibus^c qui uarijs
motibus maxillam præcipuè circumagunt, & prorsum retrorsumq^p mouent, à mandendo
μασσητήρ Græcis appellantur, quo etiam nomine Græcorum plerique temporum^d muscu-
los nominarunt, quòd illi ad manducandum quoque sint utilissimi, ac maxillam mordenti-
bus, molientibusq^p quippiam adducant. Deinde ita temporalis quoque nominatur, quòd in-
uicem temporalis & masseter adeò connascantur, ut Galeno etiam in Libris de Vsu partium,
ac si temporalis & masseter unus essent, imposuerint, quum temporalis partem, masseterem
arbitratus, temporalem musculum, ex sui medio tendinē, contra aliorum musculorum ra-
tionem, educere protulit, & post modum (ne ab aliorum Anatomicorum in musculis nume-
ro aberrasse uideretur) masseterem etiam quendam enumerauerit secus multò, atque in Quar-
to de Administrandis sectionibus, ubi masseterem cognoscens, nihil de illa tendinis mirifica,
falsaq^p & ficta productione cominiscitur. In eo itaq^p Libro Galenum secuti, atque cum ipso
uocis fugientes æqui uocum, ^e musculos qui potissimū claudunt temporales toto sermonis
progressu, ^f illos autem, qui maxillam præcipuè antrorsum retrorsumq^p agunt, masseteres seu
mandibularios uel manforios appellemus. ^g Qui autem in ore occultari dicuntur, & si eisdem
ferè præsent munijs, in ore delitescentes nominemus, quemadmodum & ^h qui ductus maxil-
læ ad inferiora autores censentur, os aperientes, ita nanque fictis quodammodo nominibus,
rerum foelicior parabitur memoria. ⁱ Masseter itaque ille est musculus, quem ad posteriorem
maxillæ inferioris sedem, sub ^k osse iugali possimus manu amplecti. Dum enim pollicem in-
ter auris radicem, & inferiorem maxillā inseris, medium uerò digitum genæ admoues, illumq^p
in oris amplitudinē protrudere tentas, totam masseteris externam superficiem contines, quam
rursus tactu dignoscēs, si adductas prius maxillas, adhuc ualidiùs comprimere adnissus fue-
ris, quia tunc masseter in se magis collectus, pollicem & indicem feriet, sese dilatans ac contra-
hens. Præterea & hunc quoque musculum in equis uides spectatissimum, is enim cum ^l illo,
quem in ore latitare docebimus, illi sunt musculi, quos crebrò in equis amplecti consueuimus,
obseruaturi, num carneus aut nerueus equus nobis proponatur. Atque id eo dico diligentiùs,
quo minus aliquem mecum aberrare uelim, aliquot enim Galeni in Libris de Vsu partium lo-
cis deceptus, ^m masseterem, quem modò describam, aliquando temporalisⁿ musculi mediam
partem esse arbitratus sum, ac latum in genis^o musculum, quem ab una maxilla in aliam duci
prius retuli, masseterem esse existimaui. Attamen eo usque nunquam à ueritate reclinauī, quin
tunc duos temporales musculos, semper in altero latere demonstrarem, unum su-
periozem, qui uerè est temporalis, alterum inferiorem, qui masseter est, appellans. Masseter
enim nerueo, & amplo ualidissimòq^p principio ab ea malarum^p sede exoritur, qua infima pars
futurae

a figura ca.
lib. 1.

b 1, 2 ff. ca.
10 lib. 1 A.

c 4 ta. A.

d 4 tab. r.

e 4 tab. r.

f 4 tab. A.

g 6 tab. D.

h 5 ta. H, I.

i 3 ta. A, 2.

9 ta. C, 5 ta.

D.

k 3, 5 ff. ca.

6 lib. 1 V, X.

l 6 tab. D.

m 4 ta. r.

7 ta. A.

4 4 tab. M.

n 4 ta. E.

c 1 ff. cap. 9

lib. 1 A.

futuræ illius consistit, quæ maxillæ superioris^d os, totum minorem oculi sedis angulum occu-
 pans, mediamq[ue] ossis iugalis sedem efformans, maximo eiusdem maxillæ^e ossi cōiungit, quod
 dentium præsepeola continere, ac narium amplitudinem magna ex parte constituere, superior
 Liber declarauit. ^f Deinde à malis hoc masseteris principium in posteriora ducitur, è tota
 inferiori interioriq[ue] ossis iugalis sede ad aurem usque pronatum. Ex tota enim longitudine os-
 sis iugalis, quæ à malis ad aurem usque pertinet, masseteris musculi principium enascitur,
 quod impensè nerueum in malis esse dicebam, quemadmodum etiam illic, ubi ab exterioris iu-
 galis ossis superficiei inferiori parte prodit, nerueum liuidumq[ue] conspicitur. ubi autem ab in-
 teriori iugalis ossis sede originem ducit, carneum est, quemadmodum etiam totus musculus,
 non multo post initium, carneum crassumq[ue] se spectandum offert. Masseter hoc enatus princi-
 pio deorsum tendit, totamq[ue] inferioris maxillæ^b amplitudinem, in externa posterioriq[ue] ipsius
 sede conspicuam amplectitur, illi ualidissime partim carneus, partim nerueus latissima inser-
 tione implantatus. Ex tota autem insertionis amplitudine nulla insignior, nullaq[ue] ualidior est
 ea, quam in maxillæ inferioris asperitatem molitur, in infima ipsius sede ueluti processulis ali-
 quot extuberantem. in hac etiam^h sede masseter est angustissimus, & ueluti trianguli alicuius
 obtusorem angulum exprimit. Totus enim masseter quodammodo triangularis est, una
 enim ipsius linea, secundum totam principij amplitudinem, seu iugale os porrigitur, secunda
 à malis, seu anteriori principij parte, ad infimam maxillæ inferioris sedem retrorsum ducitur,
 illam quam nuper diximus, asperitatem contingens. Tertia autem linea ab aure, seu postero-
 ri principij sede, in anteriora deorsum fertur, ad demissiores secundæ lineæ sedem, angulum
 cum illa linea adeò obtusum constituens, ut ferè hîc aliud latus masseteri possit ascribi, atque
 illum quadranguli formam referre, quis non ineptè astrueret. Vtunque uerò sit, obtusus
 hic angulus, seu si ita uelis, quartum masseteris latus, multò strictius est amplo illius princi-
 pio, unde etiam ilico fibrarum ipsius ductum uariare necesse est. ⁱ Fibræ nanque ab anteriori
 principij parte originem ducentes, deorsum in posteriora feruntur, ^k quæ autem à postero-
 ri principij sede prodeunt, oblique deorsum in anteriora repunt, omnes ex amplo principio
 ad obtusum, quem recensui, angulum protensæ, maxillæq[ue] inferioris amplitudini, citra ten-
 dinis productionem insertæ. Galenus in Quarto de Administrandis sectionibus attestatur,
 nonnullos dissectionum Professores amplo huic principio (quod ipse Geminum appellat)
 & diuerso fibrarum ductui attendentes, binos ab utroq[ue] latere masseteres collocasse, ut unum
 anterior principij pars constitueret, alterum uerò posterior. Rursus non defuere, qui trian-
 gularem præsentis musculi circumscriptionem expendentes, tres in uno latere masseteres enu-
 merarunt, unumquemq[ue] angulum singulos masseteres esse arbitrati, tale enim quid Galenus
 nobis innuere uidetur. Quanquam arbitrer illos, qui tres masseteres utrinque collocarunt,
 non tribus illis angulis animum adhibuisse, uerùm ^l hunc, quem describo, masseterem unum
 appellarunt, & ^m secundum temporalem, ⁿ tertium uerò, quem in ore delitescere dico, posue-
 runt. Deinde qui duos recensuerunt, non mihi, ut Galenus asserit, principijs mentem adhi-
 buisse uidentur, sed masseterem hunc nostrum unum posuere, alterum uerò temporalem cum
 illo, qui in ore delitescit, quod uel ex Hippocratis oratione, ubi eos musculos Masseteres
 nominat, colligere promptissimum est. Præterea nisi in ore delitescens musculi munus mas-
 feteri accommodauerimus, neuti-quam opportunè manducantium maxillæ inferioris in late-
 ra motus nobis explicabuntur. Quare etiam satius erit, masseteris musculi functionem tunc pri-
 mum persequi, quum temporalem, & in ore delitescentem plenè descripsero. ^o Temporalis ^{Temporalis}
musculus principium ^p à uerticis, & temporis, & frontis ossibus, & osse cuneum imitante, ^{seu alterius la-}
 & eo osse, quod minorem sedis oculi angulum amplectitur, ac maxillæ superioris ossium mihi ^{teris secundus.}
 primum habetur. ^q Instar semicirculi enim primum, & præcipuè à uerticis ac frontis osse mul-
 tò elatiùs enascitur, quàm commissura squamæformis consistit, temporis os, uerticis ossi com-
 mittens. hinc sensim crassescens, & carnosior redditus arctatusq[ue], in cavitatem ibi in capitis
 ossibus exculptam descendit, à temporis osse, & cuneum imitante, & frontis, & illo quod mi-
 norem oculi sedis angulum constituit, enatus. Quum uerò ad iugale os usq[ue] pertingit, admo-
 dumq[ue] crassus, sed angustus interim euasit, superiori quoq[ue] iugalis ossis sedi adnascitur, ^r masse-
 teri adeò continuus, ut uix immeritò temporale & masseterem, unum esse musculū quis cōten-
 deret. Cæterum uniuersum temporalis musculi corpus, ad iugale usq[ue] os carneū est, exteriori
 sede, propter propriæ membranæ crassitiem, perquam liuidū, idq[ue] potissimū ad exortus sui
 initium, & ipsius ad os iugale connexum. Interna autem sede, qua ex ossibus ampla illa lataq[ue]
 explantatione enascitur, carneus est, & acutum maxillæ inferioris^s processum cōtingens in bre-
 uem,

*Li. II de Vsu
partium.*

*Musculus in
ore delitescens,
seu alterius la-
teris tertius.*

*Masseteris,
temporalis, et
in ore delite-
scens munus.*

uem, sed insigniter ualidum, nerueumq; finit tendinem, sua amplitudine acutum illum maxillæ processum amplectentem, illiq; processui ualidissime insertum. Ad tendinem hunc omnes temporalis musculi fibræ, ex semicirculo uelut ad circuli centrum procurrunt, tendinemq; hunc efformant illorum musculorum ritu, quos gibbum, & cauum scapulæ implere docebimus, & qui ex ilium osse pronati, femoris motibus famulantur, & is cuius beneficio brachium attollitur, adeò profectò, ut satis mirari nequeam, quidnam Peculiare illud sit, tantopere in temporalis musculo à Galeno decantatum. Neque satis assequor, quamobrem is Naturam tot laudibus efferat, quòd ab aliorum musculorum forma hîc declinauerit, tendinem educens non ex musculi extremo, ut aliàs semper, sed ex musculi medio. Ego ex tot Galeni in Naturam laudibus aliud nihil colligo, quàm illum arbitratum fuisse, musculum temporalem à nobis descriptum, unà cum massetere unum esse, atque tendinem, quem temporalis acuto maxillæ processui inserit, à temporali & massetere produci. Quod si fieret, ex media musculi sede tendo is enasceretur, temporalis scilicet musculi fibris deorsum ad tendinis generationem deductis, masseteris uerò musculi fibris sursum proreptantibus, & tendinem illum constituentibus. At quid attinet illis Galeni laudibus prolixius immorari, quas ad Naturæ dedecus potius, quàm honorem, (si quis examussim sua perpendat) contextuit: præcipue quum Natura non solum ab aliorum musculorum tendinis productione hîc non aberrauerit, & si aberrasset, necessariò colligeretur, eundem musculum maxillam, & sursum & deorsum ducere. pars enim musculi sub tendine posita, necessariò deorsum traheret, quemadmodum superior sursum alliceret. Rerum igitur Opifici hymnos canamus, qui musculum ex tantillo spacio, tanto muneri præfectum produxit, ex quo insignem illum procreauit tendinem, acutum inferioris maxillæ processum amplexantem. Quo autem temporalis musculus robore polleat, & quo nam pacto pro ipsius mole ualidissimum omnium musculorum munus illi concreditum sit, condiscimus, quoties ali quid ui mordemus, & aliquid impetu dentibus confringere adnitimur, aut ingens aliquod onus histriones quosdam leuare conspiciamus. Vt enim uarios hominum in mordendo conatus taceam, nuper Patauî histrionem uidimus, qui ferreum uiginti quinque librarum palum dentibus à terra subleuatum, & aliquandiu in ore erectum, retrorsum à tergo punctim parieti iniecit, quem triginta nouem pedum interuallo ab histrione destitisse metitus ipse sum. Quamquam Turcum nuper Venetijs longè maius robur in mordendo ostendisse audio, qui trabem à quinque uiris illi allatam perinde, ac baculum aliquem, uarijs modis omnium admiratione contrectauit. Vtcunque tamen temporalis musculus sit ualidus, multisq; neruorum propaginibus donatus, ac suæ nobilitatis gratia ossuosis uallis interceptus, aptisq; sinibus inclusus, nihilo minus tamen illi alterum quoque musculum, similiter robustum & neruosum, ac in ore delitescens Natura associauit, eiusdem cum musculo temporali functionis autorem. Atque huius principium perquam neruosum, ex tota cavitae sinu ue exoritur, qui in ossis cuneum referentis processibus, quos uespertilionum alarum imagini comparamus, insculpitur. hunc siquidem sinum unà cum ossis processibus, musculi huius principium ambientibus (ut tutò principium id custodiretur) Natura fabrefecit, simul etiam processus hos longius educens, ut commodè ab ipsis principium illud enasceretur. Cæterum ilico atque cavitatem illam ossis cuneum imitantis excedit, carneum, amplum & crassum, ac forma masseteri perquam simile efficitur, interior enim iste musculus posteriori ac interiori parti maxillæ, ubi hæc latissima est, implantatur, ualidam amplamq; insertionem molitus. Vt uerò commodius præsens musculus à maxilla susciperetur, neque is nimium oris amplitudinem occuparet, leuem, sed amplam cavitatem maxillæ insculptam esse diximus, quando ipsius constructio in Primo libro enarrabatur. Porro musculus hic, quum eodem cum temporali fungatur munere, ac simul is temporali commissus unitusq; aliqua ex parte sit, nonnullis Anatomicorum in ore delitescens, temporalis pars habita est. alij uerò, etiam si inuicem committantur, quum tamen diuersis prodeant principijs, & in uarias eiusdem ossis sedes implantentur, duos ipsos statuunt. Nos autem ita illos distinguimus, ut utrinque unum temporalem, & unum masseterem, & unum in ore delitescens enumeremus. Atque his tribus primario usu hoc munus committitur, ut sursum maxillam inferiorem trahant, illamq; superiori iungant. Verum masseteri id priuatim committitur, ut masseterum anterioribus principij partibus contractis, inferior maxilla prorsum ducatur, mentumq; in anteriora promineat. Posterioribus uerò principij sedibus tensis, retrorsum ac uelut ad aures maxilla retrahatur adeò, ut duo hac ratione motus masseterum beneficio peragantur, quibus manducantes indigemus. Atque huic etiam motui suppetias fert temporalis musculus, prout has illas ue sui principij fibras tendit

t. 11. ta. r. 7
ta. r. 9. tab.
n. 10. ta. r. 11
ta. r. 8. tab.
A.

4. 2. fi. ca. 2.
li. 4. Q. 2. R.
b, c, d.
x 6. tab. D.

9. 5. fi. ca. 6
li. 1. P. de in
cha. 2. 3. 4. 5.

4. 2. fi. ca. 10
li. 1. D.

b 4. ta. E.

dit, aut remittit. deinde masseterum, & in ore delitescantium musculorum opera, in latus maxilla ducitur. Dextro enim massetere duntaxat, & sinistro in ore delitescente musculo contractis, maxilla in dextrum latus agitur. At sinistri lateris massetere, & dextri lateris in ore delitescente musculo, unà contractionem molientibus, inferior maxilla in sinistrum latus fertur. Atque his functionibus in ipsa sectione nihil æquè promptum cognitu, iam admonitus repes. Enarrationi adhuc supersunt alij duo, utrinque^e singuli, & graciles & oblongi, originem ducentes ex prominētibus ossium temporum^d processibus, qui scriptorij styli imaginem referunt. Atque hinc membraneo latiusculoq; capite exorti, statim carnosii teretesq; fiunt, ac uersus priora maxillæ, ubi summum mentum habetur, procurrentes,^e interiori eius parti adnascuntur, & dexter musculus sinistro hîc ad insertionem unitur, in ea sanè inferioris maxillæ sede, ubi uel horum musculorum gratia, maxilla exasperatur, & processulos inæqualiter extuberantes gerit. Præsentes musculi, dum in se colliguntur, os aperiunt, quemadmodum hactenus commemorati illud claudunt. Cæterum utrique os aperiēti musculo peculiare aliquid, & nulli uniuersi corporis musculo, præterquam^f uni, quem contra Galeni placitum ossi^v referenti ascribam, commune obtinet.^g His enim in medio itinere, quod ab exortu usque ad insertionem emetiuntur, pars carnosæ aboletur, & exanguis & neruosa efficitur, ceu tendo, uel ligamentum quodpiam carniformibus fibris neutiquam enutritum, ita sanè, ac si quis ex duobus musculorum uentribus, in quorum medio tendinis species cerneretur, utrumque musculum conflari diceret, uerum hîc non perperam, neque ociose à consueto musculorum artificio Natura declinauit, atque ideo encomio tibi celebranda uenit. Propria nanque exortus eorum musculorum regio, non erat post aures ad capitis basim, unde nunc à stylos imitantibus processibus explantantur, sed ad anteriores colli partes. si enim maximè secundum rectitudinem proprii principij, uterque maxillam deorsum traheret. At si ibidem ab ipsis ceruicis uertebis producerentur, angustiam non paruam tum ipsi etiam primi maximè tulissent, tum omnibus alijs partibus inibi repositis præbuisent. in nulla enim propemodum totius corporis regione adeò exigua, tantum organorum aceruum (quorum interim nullum transponi expedit) reperias, atque hîc in faucibus. Neque enim stomachum, neque laryngem, multo autem minus circumadiacentes eis musculos, neque uenas, neque arterias, neque neruos, neque glandes cum uasorum diuisionibus præfectas, tum ad humectandam laryngem homini opitulantes, neque aliud quiduis hîc in inferioris maxillæ amplitudine, citra noxam, uel sola imaginatione, sua sede mutare posses. Iure itaque musculi inferiorem maxillam deorsum tracturi, nequaquam à ceruicis uertebis explantantur, sed à longis illis processibus stylos & gallorum calcaria exprimentibus. Et ubi regio potissimum frequentibus organis erat oppleta, hi musculi merito excarnes facti, ibidem in ipsorum medio, non absimilem tendini partem commonstrant. si enim iuxta has in faucibus angustias crassiores essent, præ loci angustia iter ipsis præcluderetur. Si uerò omni ex parte adeò, ut hîc, fuissent graciles, ad nimiam peruenissent imbecillitatem, quum nullus musculus absque fibris carne amplexis constare possit, quam si haberent, & illius tendinis crassitiem superarent, quid his tanto interuallo, & per tot præcipitia ductis cogitari possit infirmius? Quocirca quoniam eos in his angustijs oportuit fieri, ad patiendum pertinaces & graciles, Natura iure totam eorum, quæ inibi esset carnem, ademit, solos & nudos producens tendines. quando uerò primum extra angustiam constituuntur, tunc iam sensim carnem rursus assumunt, musculorumq; uentrem, ut antea circa exortum sibi uendicant.

Musculus maxillæ deorsum trahens, ac alterius lateris 4. aut omni 7. & 8.

MUSCULORVM INFERIOREM MAXILLAM

mouentium administratio. Caput XVI.



ORVM qui maxillam inferiorem mouent, musculorum administratio nem debite absoluturus, illam à^a temporali opportunè aggredieris. Capite itaque in latus reclinato, grandiori, quem administrandis sectionibus parasti, cultro, & admoto etiam malleo,^b iugale os ad aures & malas excindes, & id acutiori cultello undequaque à musculo temporali, cui ualli ritu hoc proponitur, & massetere, cui principium exporrigit, liberabis, exactè tum temporalis musculi ad illud os connexum, & masseteris exortum contiderans. Ablato iugali offe temporalis musculi principium, quod secundum capitis longitudinem semicirculi instar exoriri dicebatur, undecunque nouacula, aut cultello proximè ab offe abrades, quousque totum musculum à caluariæ, & maxillæ superioris ossibus

Temporalis administratio.

a 4. ta. r.

but in s. tabula ad C. inter B. & D.

bus ademeris. Iam temporali musculo deorsum & extrorsum reflexo, intuebere nervosissimum ipsius tendinem, acutum maxillae inferioris processum, quasi in se occultatum, amplexantem. deinceps quā is musculo in ore delitescenti, & masseteri committatur, spectabis. postremò, si aperto ore, musculi temporalis initia sursum trahere non detrectaueris, ipsius musculus promptè etiam condisces. Nunc integrum est, masseterem à iugali osse & malis liberatum, ab humiliore maxilla similiter cultello deradere, atque illius insertionem non oscitanter perpendere, animum adhibens, à massetere nullam portionem conferri ad musculi temporalis tendinem, maxillae processui insertum. Integrum quoque erit, masseteris officium indagare, posteaquam sectionis serie, maxillam inferiorem carne denudaueris. Omnibus enim membris, quorum motum in mortuis animalibus examinare instituimus, commune est, ut uniuersam carnem ab illis ossibus, quorum motus indagatur, auferamus, ac illi duntaxat musculi, quorum beneficio ipsa mouentur, intacti maneant. Proinde maxilla inferiori his, quae illi inferius adnascuntur, corporibus liberata, si masseteris musculi principia huc atque illuc traxeris, facillimè his maxillam in latera, ac prorsum retrorsumque agi, & demum ad superiora etiam allici spectabis. ^d Musculum in ore delitescentem ad amussim, nisi inferiori maxilla in menti regione per medium dissecta, administrare poteris, ac proinde grandiori cultro operi adhibito, ipsam à summo mento auspicatus, per medios dentes incisórios diuides. diuisam utrinque manibus apprehendes, ut utranque ipsius partem in latera reflectens, ac illam ueluti ex superioris maxillae sinu luxans. Mox oris tunicam circa maxillae extrema, cutis instar separabis, quousque musculus in ore reconditus sese ex omni parte offerat. quem si uisum fuerit, aut ossibus commissum relinques, aut ab ipsis deratum abijcies, ipsius quoque functionem non oscitanter expendens. Verum sectioni non obfueris, si musculi eius administrationi tantisper supersederis, donec linguae & ossis u imitantis musculos unā cum illo aggredieris, ne modò hunc uidere studens, illos imprudenter laceres. ^f Musculum qui os aperit, ad maxillae inferioris longitudinem protensum reperiēs, atque, ut diximus, maxillae in interna summi menti sede insertum. Hic nullam peculiarem administrationem exigit, si prius masseterem, & glandulas cum uenis & arterijs, quae auribus subiiciuntur, resecueris. Huius initium, si uersus stylum imitantem processum protrahetur, maxillam deorsum uel lere uidebitur, atque id nonnihil oblique in unum latus, si unius tantum musculi initium traxeris. Vtroque autem attracto, rectus, neque in alteram partem inclinans, perficietur maxillae ad inferiora ductus. At horum musculorum perinde, ac in ore delitescentium sectio, tunc demum opportuniùs perficitur, quum linguae, & ossis hyoidis, & laryngis musculi unā aggrediuntur. Ligamenta maxillam inferiorem superiori alligantia, ligamentis alios articulos membranae instar ambientibus respondent, nihil sibi quicquam peculiare uendicantia. Tamen si ligamento orbiculatim dissecto, articulum dissolueris, in huius articuli peculiarem incidēs cartilaginem, quae neutro ossi connata, sed solum in illorum medio posita, ligamento articulum ambiente adnascitur, & uim ossium in magno, uehementique maxillae inferioris motu excipit, & moderatur. Lineamenta uerò musculorum, quae in Quarto de Sectionibus administrandis libro Galenus post aures obseruari docuit, neutiquam hactenus in hominibus reperi, quanquam in canibus aures mouentium musculorum naturam, formam, ortum, functionemque optimè assecutus fuerim. dein hos musculos nonnihil, sed minus quam obscure, simiam ostendere obseruauī. Interdum etiam quibusdā raris fibris carneis, membrana, quam carnosam uocamus, supra aures augetur, & modicè auri proximam cutem, & ipsam quoque aurem motu agit arbitrio.

*Masseter.**Musculi in ore delitescen-
tis.**Musculi maxillae deorsum
trahentis.**Musculi eius obliquus
mus.**LIGAMENTA
maxillae arti-
culorum.**Peculiaris
cartilago arti-
culorum inferio-
ris maxillae cum
superiori.**Musculosa
in temporibus
lineamenta.**Musculi
huic ossi com-
missi, aut com-
munes aut pro-
prii.*

s ^aHYOIDES in faucibus superiori laryngis sedi praelocari, & radici linguae fundamenti uice, super quod moueri eam oporteat, & plurimum musculorum uelut anchoram esse, iam antea diximus. Ex musculis uerò qui ossi committuntur, alij quidem ipsi sunt proprii, & solius huius ossis gratia constructi, qui omnes ex alijs ossibus principium fumentes huic ossi u simili inseruntur. alij autem ex osse hoc procedentes, alijs organis famulantur. Qui igitur ossi ipsi peculiare proprii sunt, hoc potissimum praestant, ne os non admodum stabili firmatum basi, hinc inde ad latera, uel sursum aut

c 4 ta. A.

d 6 ta. D.

e 4, 5. fi. ca.
6 lib. 1 h.

f 5 ta. H. 1.

g sub F 4 ta
bule.

mimis

a tota 1, 2
fi. ca. 13 li. 2
et 1 fi. ca.
21 li. 2 A.

aut deorsum, uel prorsum aut retrorsum conuellatur. Sunt porrò hi ad minimum numerum redacti septem, ad maximum autem octo, utrinque nimirum quatuor, ut uniuersi quatuor constituent paria.^a Primus cæteris ualidior & crassior, bifidusq; aut geminus est, scutiformi laryngis cartilagini, & asperæ arteriæ in collo exporrectus. Lato nanque & carneo principio ex eminentiori pectoris ossis sede, ad partem magis internam exoritur, recta que sursum tensus, ac parem semper ipsi origini latitudinem seruans, in^c anteriorem hyoidis ossis partem inferitur, carnosio innexu totam amplitudinem medijs ossiculi, cui hyoidis ossis latera firmantur, apprehendens. Huic musculo secundum ipsius longitudinem in medio linea incisa est, cuius occasione, ex duobus musculis ille constare non ineptè dicitur, ac duorum musculorum, seu unius paris uice enumeratur, qui hyoides os deorsum, si quando uiolentiùs à superioribus musculis sursum uellitur, retrahunt, &^d scutiformi cartilagini, & asperæ arteriæ, propugnaculi loco haberi possunt.^e Tertius igitur & quartus, utrinque unus his duobus opponuntur, & ampli, breues, ac omni ex parte carnei, à maxilla inferiori, sub summo mento interius enascuntur. Hinc procedentes, ac admodum modicè arctiores redditi, & deorsum protensi, hyoidi ossi duobus primis contermini inferuntur, eandem prorsus insertionis latitudinem, in anteriori ossis sede cum illis exigentes. Ac proinde hi os sursum opposito duobus inferioribus, seu primis motu, deinde & modicè in exteriora protrahunt, quemadmodum & humiliores quoq; in exteriora os perquam obscurè promouent.^g Quintus uerò ac sextus, ab utroque latere singuli admodum graciles, teretesq; sunt musculi, qui ab ossis temporis^h processuum radicibus, quos stylum & galli calcaria referre diximus, explantati hyoidis ossi inferuntur, ad latus amplitudinis, quam primi quatuor musculi occuparunt. est autem hæc regio, ubi ossis latera cum medio ossiculo coeunt. Musculi hi toto ductu illisⁱ musculis exterioribus attenduntur, quos maxillam inferiorem deorsum trahere retuli, qui etiam ab eisdem stylum imitantibus processibus, sed paulo humiliùs, quam hi hyoidis ossis musculi exoriuntur. Porrò his duobus ossis u referentis musculis, ne id aut in dextrum, aut in sinistrum reuellatur, munus cōcreditum est, & præterea illud quoque sursum nonnihil introrsumq; contrahunt. At^k septimus & octauus, præsentis ossis musculi, utrinque etiam singuli graciles longiq; uisuntur, nullus enim uniuersi corporis his simul & gracilior & longior occurrit. Deinde uterque eneruationem quandam sibi cum musculis, maxillam deorsum trahentibus priuatim uendicat, in medio nāque ipsius ductu carneus esse desinit, tendinis aliquousq; naturā ostendens, à qua denuo carneus euadit, ac ueluti duos musculi uentres nanciscitur. Principium etenim carneum, ex elatiori scapulæ costâ, iuxta ipsius ceruicem, & processus anchoram imitantis^m radicem obtinet, & subⁿ musculo scapulæ ad occipitium trahenti occultatus, sursum oblique protenditur, sub^o musculo à pectoris ossi & clauicula, in mamillarem capitis processum inserto, qui hunc hyoidis ossis musculum adeò comprimit, ut carnosus sub illo esse desinat, tendinisq; speciem ostendat perinde, ac si digniori illi caput mouenti musculo cederet, aut ipse durior factus, in contractione impetum mouentis musculi faciliùs exolueret. Nam simul atque illum superauit, rursus carneus apparet, quousq; in eam hyoidis ossis regionem implantetur, in^p quam sextum & septimum, insertionem moliri dictum est. Galenus Quarto de Administrandis sectionibus libro ipsos scapularum proprios esse arbitratur, hortum ope illas sursum ad guttur agi asserens, quam uerò id ueritati consonum sit, obseruari peroptarim, mihi enim hyoidis ossis, non scapularum proprii uidentur, nec quicquam his cum scapularum motu commune esse existimo. Quippe minores sunt, minusq; firmi (quum ipsi hyoidi committantur) basi stabiliuntur, quam qui scapulam (cui brachium, cubitus & extrema manus appendent) attollere obliquo motu possint. Deinde substantia formaq; cæteris hyoidis ossis musculis, nequaquam autem scapularum motuum autoribus, respondent. Quod Veteres pulchrè norunt, ex quorum sententia Galenus in Libro undecimo de Partium usu, hos musculos hyoidi ossi ascribit, licet rursus sui oblitus, in Decimotertio de Partium usu eosdem inter scapulæ motores commemoret, facile in illis, ut in alijs plerisque scapulæ musculis aberrans. Quin etiam hyoides os his musculis omnino indiget, si demum id contrario motu agi debuit, quem quintus & sextus musculi perficiunt. Videntur sanè mihi postremo loco enumerati musculi, deorsum ac utrinque ad latera hyoides os detrahere. & nisi his illa cōcrederetur actio, hyoidis ossis situs prorsus fallax esset. Adde musculis his, ubi scapulæ committuntur, ^q neruulum applantari, nequaquam autem ubi hyoidi inferuntur. Erunt itaque mea quidem sententia octo musculi, solius hyoidis ossis occasione efformati, in hoc scilicet, ne hinc inde ex sua sede id turbaretur, fundamentumq; plus satis infirmum linguæ, & ipsi quoque laryngi efficiatur. At musculi quos hyoidi ossi non proprios esse dixi, ex ipso originem mutantur, atque horum quatuor laryngi, & alijs

*Propriorum
primum par,
seu alterius la-
teris.*

*Secundum
par.*

Tertium par.

Quartum par.

*Quartum par,
scapularum mo-
tibus non sub-
seruire.*

*Musculi hy-
oidi ossi non
proprij.*

*b 4 tab. S.
T. 1 tab. C. 2
ta. F.*

*c consule 1
figuram ca.
13. lib. 1 ad *
A, B. & c.*

*d 5 tab. N
dein Q.
e 4 tab. R. 1
ta. B. 2 tab.
E.
f cōfer 1 ta-
bulæ B cum
C.*

*g 4 tab. Q.
h 3, 4, 5 fig.
ca. 6 lib. 1 i.*

*i 4 tab. O. 5
ta. H. 1.*

*k 5 ta. R. S.
4 ta. V. V. 1
ta. D. 2 tab.
H.
l inter R &
S 1. 1. 5.*

*m 1 si ca. 12
li. 1 F.
n 4 tab. b.
aut 9 ta. r.
o 4 ta. o.*

p 4 ta. P.

*q à ramo i
notato fig. 2
cap. 11 li. 4.*

& alij linguae porriguntur. ¹ Primi duo laryngem adeuntes, lati & carnosii sunt, & ab inferiori hyoïdis ossis sede enati, ac postea anticae scutiformis cartilaginis parti, secundum ipsius longitudinem attensi, tandem humiliori eius cartilaginis sedi secundum latitudinem inferuntur. ² Alij duo paulò minus teretes sunt & graciles, deinde toti carnosii, ex ³ mediaq; ossis hyoïdis interna sede enati, implantantur radici laryngis operculi, quod ἐπὶ γλωττίς Græcis dicitur. quod uerò horum sit munus, & quos ex his Galenus prætermiserit, in musculorum laryngis enarratione docebitur. Linguae autem ⁴ musculorū sermo, mox post subsequens Caput instituetur.

r 1 fig. cap.
21 F.
s 2, 3 fig. K.
t 2 fi. ca. 13
lib. 1 D.
u 2, 3 fi. cap.
21 L.
x 1, 2 fi. ca.
19 H.

PROPRIORVM HYOIDIS OSSIS
musculorum administratio. Caput XVIII.



Secundi pa-
ris administra-
tio.

Primi paris.

Tertij paris.

Quarti paris.

COMMUNE horum musculorū sectionem administraturus ceruici (ut in posteriora pendente capite, ea exporrigatur) truncū aut oblongum lapidem subijcies, & uenis, arterijs, glandulisq; in harū distributionibus locatis utcunq; resectis, minoribus cultellis sectionē auspicabere præcauēs, ne angulosus lapis posteriorem ceruicis sedem occupātes musculos comprimendo uiciet. Ac primū quidem ab inferiori maxilla, quæ adhuc integra est (nisi illam ^a muscoli maxillam attollentis, & in ore ^b delitescentis occasione tregeris) obliquos & latos musculos, qui ^c tertij & quarti loco habebantur, derades eos usque ad regionem, qua hyoïdi ossi implantantur, disseccans. Deinde ^d primi & secundi capite à pectoris osse liberato, utrunque uersus os hyoides deducito, illos à ^e musculis separans, qui duobus his hyoïdis ossis musculis substrati, à pectoris osse in scutiformem laryngis cartilaginem pertinent. Quum enim horum ossis hyoïdis musculorū originem aggredieris, studendum est, ne initia ^f musculorum à pectoris osse & clauicula, ad mamillarem capitis processum ascendencia uicies, aut etiam ex eadem sede natos, nuperq; dictos scutiformis cartilaginis musculos unā auferas. ^g Quintum & sextum summis digitis, aut exiguo cultello à conterminis partibus, usque ad stylum referentes capitis processus deduces, illorumq; initia illinc liberabis. ^h Septimum & octauū uix, nisi secundo scapulam mouentium ⁱ musculo, & illo qui à pectoris osse & clauicula mamillarem processum petit, absectis, aggredi promptum est. nihil tamen prohibet ipsos à uicinis partibus exiguo longoq; cultello buxæ, aut solis digitis liberare, ipsorumq; capite apprehenso, id à scapula cultello diuidere. Quanquam hos, donec musculos scapulam mouentes aggredieris, interdum seruandos duco, ut quemadmodum non semel tentauī, tu quoque experiaris, num muscoli illi scapulam omni prorsus carne liberā sursum agere possint, contemplerisq; quā bellè primo quodque tensionis impetu rumpentur. Cæterum proprijs octo hyoïdis ossis musculis hac ratione ab ipsorū principijs pendentibus, integrū erit cuiusq; muscoli munus indagare, quolibet musculo ad suum principium leuiter actō. Musculorum hyoïdi ossi non priorum sectio, in eum locum reseruabitur, qui earundem partium, quibus illi inferuntur, Anatomen pertractabit.

a 5 ta. H. l
b 6 ta. D.
c 4 ta. R.
d 4 ta. S, T.
e 5 ta. P.


f 4 ta. e.

g 5 ta. Q.
h 5 ta. R, S.
i 9 ta. r, Δ.

DE LINGVÆ MUSCULIS.
Caput XIX.

PRIMA DECIMINONI
CAPITIS FIGVRA.

SECVNDVDA.




TER.

TERTIA FIGURA, CVIVS

SICVT ET DVARVM PRAECE-

dentium ac omnium characterum Index modò subiicitur.



PRIMA figura linguam unà cum ipsius musculis à reliquo liberatam corpore, ex dextro latere demonstrat, musculorū dextri lateris naturam ac situm, quàm fieri licet, proximè exprimens.

Secunda figura eadem, quæ prima, oculis subiicit, verum ut primi linguae musculi, ac item noni natura aliquo pacto hic magis, quàm in prima conspiceretur, tertium & septimum, linguae musculos sursum refleximus, quinto interim deorsum ab ipsius insertione propendente.

Tertia figura nouem linguae musculos absectos habet, ac lingua secundum longitudinem diuisa cernitur, linguae ligamento hic ab utrisq; linguae corporibus dirempto, & corporum superficie, quæ ligamento continuatur, hic apprente. Atq; cum in modum hominis (ut semel dicam) linguae constructio est expressa, quo nobis hanc picturis assequi datum fuit.

A, A, A_{1,2,3} Linguae portio ante confectionem in hiante ore conspicua, & tunica adhuc obiecta ipsi, ac toti ori, & stomacho, item & asperæ arteriæ communi.

B, B₁ Hæc linea dictæ nuper tunicae partem notat, secundum inferioris maxillæ latera ab ore dissectam. Linguae enim portio supra lineam consistens, illa adhuc obtegatur tunica, quæ autem sub linea cernitur, hic (ut etiam nunquam) illa tunica non succingitur.

C₁ Iam dictæ prius tunicae portio, quam hic à palati intimo unà cum lingua præscidimus.

D, D_{1,2} Primus linguae musculus.

E_{1,2} Tertius linguae musculus.

F_{1,2} Quintus linguae musculus.

G_{1,2} Septimus linguae musculus.

H_{1,2} Nonus linguae musculus.

I₃ Linguae ligamentū, cui linguae corporū fibræ continuantur.

K, K₃ Dextri linguae corporis fibrarū species. *L, L₃* Sinistri linguae corporis fibrarū species.



LINGVAE moles ori exquisitè congruit, in omnē enim eius sedem commodè pertingit, quod sanè, si minor esset, ipsi negaretur. neque rursus præ oris angustia impeditur, quamuis tamen id facillimè contingit, si aliquando in magnitudinem præter naturam excreuerit. Quoniam uerò promptè ipsam impetu atque ex nostro arbitratu moueri in omnem partem conueniebat, hanc musculosam fieri summus rerum Opifex uoluit.

Linguae magnitudinem in istam esse, illamq; musculis egere.

Insuper quoniam deorsum oportebat eam detrahi, & sursum uersus palatum agi, atque ad latera circunduci, postremò prorsum, retrorsum, atque ipsam hinc inde reflexam, & in se collectam moueri, operæpretium fuit multos illi elargiri musculos, qui uari orum motuum autores existerent. Linguam autem fortem & magnam, ad basim stabilitatis gratia, tenuem uerò, ad terminum mucronem ue, ut celeriter moueretur, meritò factam esse neminem latet. Verum qui, qualesq; & quot numero ipsam agant musculi, cognitu est quàm difficillimum. Adeò enim inuicem connectuntur, ipsorumq; fibræ mutuò tam uariè coeunt, ut iustum numerum, formamq; musculorum, & motuum linguae differentias cognoscere, non iniuria arduum censeatur. Imò linguae constructionem hæcenus à nemine ad amussim perspectam fuisse, neq; etiam ocys fore metuo adeò, ut fateri cogamur eò Conditoris nostri in effingendo ex terra Adamo artem industriamq; processisse, ut tota hæc nō inueniatur, quantumuis longo temporis spacio, idq; à Viris illustribus fuerit indagata. Quotusq; tamen in linguae constructione Galenus eximium Naturæ miraculum artificiumq; perspexerit, minimè constat, ea siquidem Libri de Administrandis sectionibus pars, in qua linguae musculos proculdubio recensuit, nobis unà cum Libris de Musculorum resectione interiit, aut potius apud cōmunis utilitatis inuidiosissimos homines, nullum sui usum præbens suppressitur, à tineisq; ac blattis corrorenda & secanda (quum ipsa sectionem docere deberet) latitat. In Libris autem de Partium usu per transfennam, leuiterq; duntaxat de linguae motu, absq; peculiari alicuius musculi

Difficile esse musculorū linguae cognitionem.

Y enar.

*Quid lingua
in musculis ra-
rum habeat:*

*Linguae pars
ante sectionem
cōspicua, qui-
bus cōstet par-
ticulis.*

*Inter mani-
festos linguae
musculos duo
primi.
Tertius &
quartus.*

*Quintus &
sextus.*

*Septimus &
octauus.*

Nonus.

enarrationem meminit. Ego quantum haecenus affecutus sum, linguam rarum quippiam, ac proprium praeter ceteros musculos sortiri obseruo, ad radicem enim proprios quosdam, ac suis fibris utcunque distinctos exigit musculos. Atque ex his quorundam fines illic terminare uidentur, ubi lingua in longitudinem ferri incipit, cum sua radice quodammodo angulum constituens. est autem is locus, ubi^a corpus laryngem in ciborum uoratu obturans ostenditur. Alij muscu-
li hic neutiquam cessant, sed mixti inuicem, raram corporis partem efformant, nempe duorum ueluti oblongorum musculorum concursus, qui ligamentum quoddam tenuissimum, membraneum, ac ad linguae crassitudinem latum, in ipsorum medio plerumque adipiscuntur. Sic sane, ut uniuersum linguae corpus ante sectionem nobis apparens, ex duobus illis musculosis corporibus, ligamento hoc, accurrentibus uenis, arterijs & neruis, atque haec omnia integente duplici membrana, conformetur, una quidem musculis omnibus communi, quae est interior. Altera autem eius tunicae pars censetur, quae uniuersam oris amplitudinem succingit, & eadem continuaque cum interna asperae arteriae ac stomachi tunica existit, priuatimque tertij paris nervorum cerebri praecipuas^b portiones, sibi insertas uendicat, quarum beneficio lingua gustatorium organum efficitur. Rarum uero id atque peculiare, quod duo haec musculosa corpora obtinere diximus, ad hunc quasi modum sese habet. Quum ceteri corporis musculi unicum ferre fibrarum genus, aut rectum scilicet, aut obliquum, aut transversum duntaxat obtineant, haec interim corpora obliquas, transversas, rectasque fibras simul adepta mihi uidentur, quae inuicem adeo coeunt, commiscunturque, ut in his aliquod fibrarum genus sectione assequi propemodum sit impossibile, imo musculosa haec corpora quippiam non absimile cordis^c substantiae, in ea fibrarum contrariarum comixtione adipiscuntur, quanquam non adeo atque cor, solida constant substantia. Sed carnosae fibrae in pinguioribus, & iam aetate prouectis animalibus, pinguedinem in lingua adnatam obtinent, & fibrae multo quoque rariius in lingua conferuntur, quam in compactissima cordis substantia. Atque haec uel inter edendum cuius euadunt perspicua, quam scilicet a musculorum carnis natura, formaque & gustu, linguae pars, quae in delicijs haberi solet, uariet. Verum ex quibusnam musculis haec linguae pars formetur, ac unde musculi linguae, quos inter dissecandum obseruaui, originem ducant, nunc opportunè subiicietur.

^a Duo quidem sunt recti, & impense crassi, obscureque ab inuicem, ac si plures duobus essent, alii quot locis discreti, qui ex media, superiori^e ossis uⁱ imaginem referentis sede, carnei, sed utcunque fungosi principium ducunt, ac secundum linguae longitudinem protensi, ipsius medio recta inseruntur, quam contracti recta intro, & uelut ad posteriora uellunt. Tertius & quartus, ex duobus superioribus ossis hyoidis ossiculis oriuntur, quae ad ipsius latera haberi, ac ipsorum fine ad stylos usque imitantes capitis processus desinere diximus. Quanquam etiam interdum hi musculi ab^h humilioribus ossis hyoidis lateribus, quae superioribus scutiformis cartilaginis processibus colligantur, principium sumant tunc nimirum, quum superiora hyoidis ossis latera non plane ossa, cum ligamentorum natura aliquid commune adipiscuntur, quod non infrequenter, & potissimum in mulieribus obseruatur. Musculi igitur illinc exortum adepti, & oblique quodammodo procedentes, linguae lateribus implantantur. Si horum alter uno remisso laxatoque tendatur, lingua, & potissimum sua radice, in latus deorsum uellitur, at si simul uterque agat, lingua in neutram partem inclinans deorsum, uersus interiora quoque mouetur. Quintus ac sextus, similiter carnosi & utcunque crassi, duobus nuper dictis opponuntur, ac a temporum ossium^k processibus, qui styli acusque imaginem referunt, explantati, linguae ad nuper dictorum fines innascuntur. Hi quoties ambo conuellantur, uersus interiora linguam sursum agunt, at si alter duntaxat in se colligatur, lingua sursum tracta ad alterum latus inclinatur. Sunt & alij duo linguam ad inferiora contrahentes, ac ad latera inuoluentes, qui ex inferioris maxillae lateribus, intus ad dentium molarium radicem utrinque lato, & utcunque mucoso principio enati, linguae secundum ipsius longitudinem usque ad ligamenti finem, quo faucibus illa colligatur, sese inserunt, non quidem prorsus in linguae medium, sedⁿ duorum, quos primos enumerauimus, musculorum latera. Horum altero tantum suas fibras colligente, conspicua ante sectionem linguae pars, in contracti musculi latus conuiet, at utroque laborante, pertinaciter lingua faucibus recto motu adigitur. Post hos^o carnea quaedam moles ab^p interna quoque inferioris maxillae sede, ex menti regione enascitur, ab illis praecipue processibus, ipsorumque lateribus, qui inaequaliter in interna inferioris maxillae ad summum mentum sede extuberant. Praefens moles sursum retrorsumque ad fauces ducta, in linguae radicem, amplam insertionem molitur, quemadmodum etiam lato principio originem sumit. Haec moles linguam ad mentum contrahere uidetur, nunc exquisitè ad labrorum medium, nunc autem ad latus, prout nimirum has illasue fibras laxat, & intendit, fibrae enim ipsius rectae, secundum totam illius amplitudinem,

*a 2 fi. ca. 11
L.*

*Hec fere
tertia fi. se-
riatum pro-
ponit literis
K, K, L, L,
I, I.*

*b 2 fi. cap. 2
li. 4 X, Y.*

*c 11 fi. lib. 6
I, I.*

*d 1, 2 fi. D,
D.
e figurae ca.
13 lib. 1, sed
praecipue 2
figurae D. et
1 fi. C.
f 1, 2 fi. E.
g 1, 2 fi. ca.
13 lib. 1 I, K.
h earundem
fi. E, F.*

i 1, 2 fi. F.

*k 3, 4, 5 fig.
ca. 6 lib. 1 I.
l 1, 2 fi. E.*

m 1, 2 fi. G.

*n 1, 2 fi. D,
D.*

*o 1, 2 fi. H.
p 2 fi. ca. 10
li. 1 H.*

ab

ab anteriori sede retrorsum ductæ conspiciuntur. deinde præter fibras, uelut quasdam inscriptiones quoque rectâ progredientes exigit, quasi harum occasione, plurimum musculorum numero etiam habenda esset. Enarratos iam musculos, qui undique attensum habent adipem, inter dissecandum ad linguam porrigi in scholis ostendi, & horum plurimos circa ipsorum fines inuicem confundi, ac duo, quæ prius innuimus, musculosa corpora constituere. hæc triplex fibrarum genus obtinere superius dictum est, quæ inuicem adeo permiscantur, ut eas inter noscere sit quamdifficillimum. Inter reliquas tamen obliquas transversasque, in corporum medio plurimæ reperiuntur, quæ mihi utrinque in proprium linguæ ligamentum longè tenuissimum, & membranæ non absimile, tanquam in ipsorum firmamentum desinere uidentur, rectæ uerò pauciores sese offerunt, omnes propemodum in externa eorum corporum superficie excurrentes. Transuersarum fibrarum beneficio linguæ corpus ante sectionem apparens, in se contrahi in crassarique, & rursus egeri tenuarique arbitror. id enim in ligamentum fibrarum insertio, tibi dissecanti utcunque monstrabit. Rectis uerò fibris, lingua in semicirculum, ad palatum faucesque conuolui spectatur, prout nimirum aut superiores, aut inferiores tensæ fuerint. Porro obliquis fibris, in latera linguam agi omnino coniecto sic sanè, ut alij interim musculi linguæ moueant radicem, alij uerò linguæ corpus, ante sectionem in hiantem ore conspicuum. Ligamentum uerò, cui fibræ firmantur linguæ, ossis uice datum est. Haud enim decuisset, linguæ secundum ipsius longitudinem os, aut cartilaginem quantumuis etiam in minutissimas diuisam uertebrae, innasce, quum tam uarijs diuersisque motibus, inter mandendum loquendumque moueri linguam oportuerit, ipsa interim nullum corpus suffulciat, ac quouis etiam serpente agilior fluctuosiorque esse debeat.

Musculosa substantia linguæ partis ante sectionem conspicua.

LINGVÆ MUSCULORVM ADMINISTRATIO. Caput XX.

a 1. fi. c. 1. 19
C.
b 1, 2. fi. ca.
19 F.

c earundem
fi. H.

d earundem
fi. G.

e earundem
fi. E.

f earundem
fi. D, D.

g 3. fi. ca. 19
1. l.

h 2. fi. cap. 2
li. 4. π, de m



MUSCULORVM linguæ sectio communis cum reliquis erit. Deducta igitur, quantum licet, utraq; maxilla, & oris tunica, cutis modo à subditis organis, quàm licet, exquisitissimè cultello undecunque detracta, omnium primi secabuntur obliqui, quorum principium à processibus stylium imitantibus pendet, quod iam ab oblongis illis ossiculis uenit liberandum. Iam hos ad linguæ radicem studiosè secutus, eam carneam molem, quam nono loco recensui, ab inferiori maxilla liberabis, atque quàm poteris, accuratissimè ipsius inscriptiones, & ipsi immixtum adipem, deinde illius etiā exortus, & implantationis latitudinem spectabis. atque hæc per feceris promptissimè, si modò ad dentium incisuræ radicem, & sub mento uicissim sectionem tentaueris. Mox post hos aggredieris, qui ab internæ maxillæ sedis lateribus enascuntur, & linguam ad latera mouent. post hos autem, aliorum duorum obliquorum, ab ossis hyoidis lateribus originem ducentium principia liberabis. Postremò autem illi ab hyoide osse auferentur, quos primos recensuimus, quiq; maximam linguæ radice partem constituere uidebuntur. In huiusmodi administratione exiguum cultellum, liberandis musculorum capitibus operi accommodabis, ad reliquam uerò separationem buxum cultellum, quod mucosi admodum sint muscoli, adhibere nihil prohibet. Cæterum linguæ reliquum corpus ad hunc modum aggredi consulo, ante omnia id ambiens crassior membrana, toti communis ori deradetur, firmitus enim connascitur, quàm ut citra coctionem, cutis modo à lingua auferri possit. Deinde & illa membrana, quæ musculis omnibus est communis, quamq; frustra separare contenderes, relictâ, sectio ad linguæ medium super id, quod diximus, ligamentum, & secundum linguæ longitudinem ducetur, non superficialis tantum, sed quæ ad medium usque linguæ penetret, aut etiam uniuersam diuidat. Mox hamulis & cultellis, fibrarum corporis linguæ naturam sedulo inquires, ac quæ fibræ ligamento committantur, eaque inuicem uariant, & commisceantur, perspicies, num scilicet eo, quo dictum est modo, aut dissimili sese habeant. Ego nanque, ut mihi linguæ constructio apparuit, hæc trado, lubens, si quid notius ueriusque occurreret, impertiturus. Porro nervos à septimo præcipue pari neruorum cerebri, & à sexto, linguæ musculis motus principium præbentes de industria, ut & cæteros nervos, in Quartum librū reijcio, atque ideo etiam hîc, nisi de ligamento linguæ faucibus colligante, paucissima recensenda supersunt. Est autem id ligamentum, quod ad palatum reflexa lingua, apertoque ore sub ipsa conspicitur, magni usus gratia efformatum. Nisi enim id esset ligamentum, lingua nimum aliquando retrorsum in se colligeretur, nec facile exerta intrò retraheretur, præterea neque sedem obtineret stabilem & tutam, ut quæ undique esset soluta. Vtroque enim munere ligamentum fun-

Administratio quinti & sexti.

Noni.

Septimi & octau.
Tertij & 4.

Primi & 2.

Reliqui linguæ corporis administratio.

Ligamentum linguam faucibus colligans.

gitur, nimirū ut & basis linguæ sit firma, & linguæ finis promptè quoquoerlum pertingat. At uerò si ligamentum in modicā linguæ partem procederet, minus quidem, quā si omnino factum non fuisset, sed proximè, & propemodū similiter linguæ incōmodaretur. si rursus idem ad plurimum linguæ spaciū pertingeret, neutiquam ad palatum, neque ad superiores dentes, neque ad alias multas oris sedes lingua extenderetur. Tam igitur exacta est uinculi commensuratio, ut siue adieceris, siue abstuleris aliquid, quantumuis exiguum, uicietur totius linguæ functio. quod indies in artis operibus experimur, quoties id ligamentum præscindimus, aut propter nimiam humiditatem laxum resiccamus.

DE LARYNGIS MUSCULIS. CAP. XXI.

QUONIAM in integris musculorum tabulis in præsentis Libri initio seriatim positis, omnes laryngis musculi oculis subijci nequierunt, nō abs re fore putavi, in huius Capitis fronte priuatim laryngis musculos, hac figurarum copia exhibere.



TREDECIM VIGESIMIPRIMI CAPITIS FIGURARUM, & earundem characterum Index.

PRIMA figura ossis u imaginem referentis, & hic suis musculis omnibus liberati anterior facies exprimitur, unā cum anteriori laryngis, & asperæ arteriæ caudicis (qui in collo consistit) sede, nullo interim laryngis musculo resecto. Qui uerò musculi hic sint conspicui, characterum index dilucidè explicabit.

Secunda figura eadem, quæ prima ex dextro latere commonstrat, quanquā hic non tantam asperæ arteriæ caudicis portionem asseruauerimus, dein etiam hinc superiora ossis u referentis latera reseruauimus.

Tertia secundæ penitus respondet, nisi quod hæc ex posteriori facie eadē, quæ illa ex latere commonstrat, uerū & hic quoq; ex industria superiora ossis hyoidis latera adhuc delineantur.

Quarta anteriorem laryngis sedem, cum portione caudicis asperæ arteriæ proponit, resecto iam hyoide osse, cum musculis ab illo, & à pectoris osse, laryngi oblati. Seruantur itaq; adhuc ex communibus laryngis musculis, quintus & sextus, ac dein musculi laryngis operculo proprii.

Quinta

Quinta figura à quarta sectionis ordine nihil uariat, eadem quæ quarta, ex sinistro latere eleganter spectanda offerens.

Sexta laryngem à reliquo asperæ arteriæ caudicis liberatam, ita posteriori facie exprimit, ut neque Stomachi, neque communis alicuius musculi portionē adhuc reliquerim, interea tamen nullam laryngis cartilaginum sua sede dimouimus.

Septima laryngem ex dextro latere ita expressam continet, ut ipsius operculum iam resectum sit, unā cum musculis primæ cartilagini secundam neclentibus. Dein primæ cartilaginis in hoc latere inferior processus, à secunda liberatus est, ipsaq; prima antrorsum, atque à secunda sic reflexa occurrit, ut media primæ cartilaginis sedes, in posteriori regione nuda cernatur.

Octaua à septima in hoc differt, quod hic rectos musculos illorum quatuor, qui tertiam cartilaginem secundæ neclunt, rescidimus, ipsaq; secunda cartilago magis detecta appareat.

Nona rursus ab octaua in hoc uariat, quod præter musculos nuper dictos, etiam quatuor tertiam secundæ iungentium obliquos, & dein duos in tertie cartilaginis basi positos abstulimus, seruatis duntaxat cum tribus cartilaginibus illis musculis, qui tertiam primæ alligant.

Decima ex anteriori laryngis sede se spectandā præbet, ablata iam prima cartilagine, & duntaxat cum secunda & tertia apparentibus musculis, tertiam primæ committentibus.

Undecima laryngis musculis ostendendis non seruit, uerū hanc, ut & duas sequentes, ostendendæ laryngis linguæ gratia delineauimus. Exprimitur itaq; hic larynx, à reliquo asperæ arteriæ trunco, & suis communibus musculis libera, quæ asseruato adhuc ipsius operculo, posteriori suæ sedi incumbit, superioremq; faciem commonstrat.

Duodecima in hoc ab undecima differt, quod hæc inferiorē laryngis sedem delineatā contineat.

Decimatertia hoc à duodecima habet peculiare, quod laryngis rimam seu lingulam, magis coarctatam occlusamue repræsentet. Cæterum characterum index erit eiusmodi.

A In prima, 2 & 3 figuris hyoidis notatur os, non prorsus suis membranulis liberum.

B In prima, 2 & 3, humilior hyoidis ossis latus, superiori scutiformis cartilaginis alligatum pro-

C. cessui, qui *C* in 2, 3 & 4 indicatur.

D In prima & tertia superius notatur hyoidis ossis latus, à secunda figura inibi resectum, ubi *E*

E. ascriptum cernis.

F Musculus ab hyoidis ossis inferiori sede enatus, ac humiliori primæ cartilaginis sedi insertus.

In prima figura dexter & sinister est conspicuus, in secunda dexter duntaxat.

G Musculus ex posterioris ossis summo, ad humiliorem primæ cartilaginis sedem deductus. Prima dextrum & sinistrum quoq; exprimit, at secunda dextri tantummodo portionem.

H Gula, seu stomachus, in 2, 3 & 5 conspicuus.

I Musculus ex posteriori sede Stomachi, cartilaginis scutum referentis, lateri insertus. Ac tertia dextrum & læuum ferè uniuersum ostendit, & potissimum utriusq; initium, Secunda dextrū & minimam sinistri portionem. Quinta uerò, sinistri insertionem exprimit, ut etiam prima & quarta utriusq; insertionem proponit.

K Duo musculi dissectionum ignorati Professoribus, & ab osse u referente enati, ac in laryngis operculi radicem inserti. hi occurrunt in secunda figura & tertia & quarta.

L *ἐπὶ γλῶττις*, seu (ut nos uocamus) laryngis operculum, in secunda figura, & dein in 3, 4, 5, 6, & 11 conspicuum.

M Glandulæ laryngis radici, ad asperæ arteriæ latera adnexæ, in 2, 3, 4 & 5.

N Musculus à prima cartilagine ad secundam protensus, exterior ue primam cartilaginem secundæ iungentium. Dextri musculi & sinistri pars in prima uidetur, uterq; autem integer in quarta apparet.

O Musculus à secunda cartilagine in primam protensus, alterius ue lateris interior, secundā cartilaginem primæ connectentium. in quinta solus sinister exprimitur.

P Musculus ab infima secundæ cartilaginis sede, posteriori in parte principium ducens, & tertiæ cartilagini insertus. Sexta dextrū & sinistrū ostendit, septima dextrū, & quodāmodo sinistrū.

Q Sedes iam dicti musculi, in octaua & nona.

R Musculus à latere secundæ cartilaginis, in tertiā cartilaginis insertus. Septima & octaua dextrum duntaxat ostendunt.

S Sinus secundæ cartilaginis, in octaua & nona notatur, cui inferior primæ cartilaginis processus, *T* in octaua & nona insignitus connascitur.

V Musculus in basi tertiæ cartilaginis situm obtinens. Sexta utriusq; lateris musculum repræsentat, Septima dextrum, & sinistri portiunculam, Octaua etiam dextrum.

X In nona figura sinus indicatur, cui musculus insidet, tertiæ cartilaginis basim in altero latere occupans, ac *V* caractere iam expressus.

a Musculus ex tota primæ cartilaginis longitudine enatus, ac tertiæ insertus, aut musculus primæ

b cartilagini tertiâ copulans. Decima dextrum *a* insignitum, & sinistrum *b* insignitum indicat, ablata interim prima cartilagine. Septima uero octaua & nona, integrum dextri lateris musculum *a* notatum exprimunt, & elatiorem sinistri sedem, quam ob hoc quoq; *b* litera in illis figuris notauimus.

c Lingulæ seu rimæ, in medio laryngis obuiæ superior sedes, in decima figura conspicitur.

d Inferior facies lingulæ, quam in decimatertia magis, quam duodecima apertam expressimus.

e, e Duo sinus, utrinq; unus, qui clausa lingula seu rima, in humiliori ipsius sede ad latera euadunt conspicui, in duodecima & decimatertia.

f Callus in medio rimæ apparens, ubi ipsa potissimum conuiet in decimatertia.

g Ne fortasse aliquid obscuritatis cartilagine literis non insignitæ adferat, illas quoq; adnotabimus. *g* itaq; prima est cartilago, in anteriori parte se offerens, in 1 figura, dein in 2, 4, 5, 12, 13.

h Prima cartilago, in tertia figura & 6, 7, 8, 9, posteriori facie se offerens.

i Secunda cartilago anteriori facie conspicua, in prima, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

k Secunda cartilago posteriori facie spectatur, in sexta, 7, 8, 9, 11, 12, 13.

l Tertia cartilago occurrit in secunda, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.



RES laryngis^a cartilagine Libro superiori descripsi, tertiam cartilaginem, etiam si^b duplex sit, ne aliorum dissectionis Professorum placita prorsus inturbarentur, unius loco enumerans. Præterea his cartilaginibus^c corpus similiter cartilaginofum, sed adiposæ membranæq; substantiæ etiam compos, incumbere retuli, quod ἀργωτῆς nuncupatur.^d ῥωτῆδα uero, corpus quoddam, aut potius laryngis sedem, in medio ipsius locatam esse recensui, rimulæ seu fissuræ lingularum, quibus tibiæ inflantur, perquam

similem. Nunc autem harum cartilaginū musculos persequar, in Quarto libro ipsorum^e neruos priuatim enarraturus. Quando itaq; ex pluribus cartilaginibus larynx, ut aptè clauderetur, aperireturq; constructa est, & quia spiritus, retentionis uocisq; occasione, motu uoluntario, & ex nostro pendente impetu moueri eam oportet, meritò musculos cartilaginum motores Natura ipsi communicauit, quorum quidam laryngi duntaxat proprii sunt, quidam alijs quoque partibus communes.^f Proprios humana larynx duodecim nanciscitur, atq; horum quatuor primam cartilaginem, quam scutiformem uocamus, secundæ, quæ innominata est, iungunt, quatuor secundam tertiæ cōnectunt, duo tertiam primæ copulant, & duo in basi tertiæ cartilaginis, quæ secundæ coarticulatur, sedem habent. Communes Galenus octo numerauit, tamen sex tantum explicauit, qui soli scutiformi cartilagini, non autem alijs duabus committuntur. Ego præter eos sex, alios duos obseruauimus, non quidem scutiformi cartilagini nexos, sed ipsi laryngis operculo, quapropter etiam hi inter eos, qui Galeno Communes nuncupantur, referendi neutiquàm ueniunt. Cuiusmodi uero ipsi sint, unà cum reliquis iam ordine prosequar, sumpto sermonis initio à proprijs, qui omnes, ut lingulæ laryngis aperiāt, claudant ue, à rerum

Opifice sunt procreati. Quatuor itaq; primam secundæ iungentiū, ad inferiora laryngis utrinq; duo habentur, in priori parte ipsius uersus latera locati. atq; hi breues sunt, sed lati, tenues ac car-

nosi, unus alteri incumbit, ac utriq; se inuicē fibris ad *x* literæ similitudinē intersecāt. Exterior nanq; ab inferiori primæ cartilaginis sede fibrarū originē ducit, quæ deorsum obliquè in priora procedentes, secundæ cartilaginis parti, priora laryngis spectanti inseruntur. Interior huic subiectus, ac in ortu fibrarūq; ductu exteriori omni ex parte similis, à secundæ cartilaginis sede, quæ primæ subiicitur, originē ducit, primæ cartilaginis humiliori sedi implātatus. huius fibræ ex postica parte, obliquè in anticam ascendunt. Quatuor isti muscoli, utrinq; nimirum duo, intercostalibus musculis apprimè respondētes, primā secundamq; cartilaginem inuicem adducunt, laryngis rimulam clausuri. Ad hunc sanè modum quatuor illos musculos interdū, neq; id infrequenter locatos in scholis ostendi, aliquando tamen unicum utrinque duntaxat reperi, ductum fibrarum^g anterioris nobis enarrati musculi seruantem, sed interim paulò crassio-
Rursus

Duodecim
proprijs esse
laryngis mu-
sculos.
Communes sex.
Lib. de Vsu
par.
Duo laryn-
gis operculi.

Propriorum
1, 2, 3, 4.

a Speciem
de sunt fig.
cap. 38 li. 1.
b 9, 10, 11
fi. ca. 38 li. 1.
R. S.
c tota 12, 13
fi. ca. 38 li. 1.
d conspici-
tur in 11, 12,
13 fi.
e 2 fi. cap. 2
li. 4 m. n. 2,
8.

f paulo post
singuli seor-
sim adnota-
buntur.

g 1, 4 fig. n-
nus N. alter
5 fi. O.

h 6 tab. V,
X. sed po-
tius confer
8 tabule D
cum E.
i 3 fi. N.

Rursus autem, quum alterum duntaxat adesse obseruauī, nō semel ac præcipuē in uiris, duos graciles, sed carneos animaduerti musculos, qui ex media longitudine^k spinæ secundæ cartilaginis enati, ac tandem deorsum obliquē ducti, in processus inferiores primæ cartilaginis



Præsens figura, sexta huius Capitis frōti præposita omni ex parte respondet, nisi quod hæc priuatim musculos spectandos exhibet, quos a secundæ cartilaginis spina, ad inferiores primæ cartilaginis processus aliquando deductos uidi. A itaq; & A prima laryngis notatur cartilago, B uerò spina secundæ cartilaginis, C autem & D duo muscoli a secundæ cartilaginis spina principium sumentes, ac in primam cartilaginem inserti.

k 8 fi. ca. 38
li. 1 M.
l 3, 4, 5 fig.
ca. 38 li. 1 C,

m 6, 7 fi. P.

n 6, 7 fi. ca.
38 li. 1 L.
o P, Q 6, 7
fi. ca. 38 li. 1
committuntur
V & X
figure 10 et
11 eiusdem
ca.

p 8, 9 fi. Q.
& 8 fi. cap.
38 li. 1 N aut
O.

q 8 fi. ca. 38
lib. 1 M.
r 7, 8 fi. R.
s 8, 9 fig. T

ad Q.
t 8, 9, 10 fi.
unus a. al-
ter b.

u 4 fi. ca. 38
li. 1 G, H.
x 9 10 fig.
ca. 38 li. 1 Y,

y 4 ta. r.

a 6, 7, 8 fi.
V.

b 2, 3, 5 fig.
H.

c 7, 8, 9, 10
fi. a, b.
d 7 fi. P, R.

e 1, 2 fi. F, G
ta. O.
f 1, 2 fi. A.

g Alter 1, 2
fi. G, 5 ta. P.
h 7 fi. cap.
19 li. 1 aut
o.

D. insertionem moliebantur. atq; hi manifestò primam quoq; cartilaginem secundæ propinquiùs accommodabant, rimulā illam, seu lingulā hac functione arcantes. Ex quatuor uerò musculis secundæ tertiā committētib; duo quoq; utrinq; habentur, ac^m unus quidē exactē in tota posteriore secundæ cartilaginis sede, secundū ipsius longitudinē, qua stomachū spectat, locat, qui carneo principio ab infima secundæ cartilaginisⁿ parte enatus, ac deinde rectā sursum procedēs, tantisper lateſcit, donec tertiæ cartilaginis radici, qua secundæ coarticulat, neruosa utcunq; implantatione inferatur. Huic musculo per secundæ cartilaginis longitudinē, quā fertur, ^p sinus exculpitur tantus quidē, ut musculo utriusq; lateris ablato, secunda cartilago in acutam^q lineā, & uelut dorsi uertebrarū spinam, inibi desinere uideatur. ^r Alter musculus nunc dicto cōtiguus, & omnino carneus, a secundæ cartilaginis sede enascitur, quæ primæ cartilaginis internā regionē respicit, primæq; cartilaginis inferiorē processum^s admittit. Ex hac itaq; sede præsens musculus, carnosum latumq; principiū ducens, ac sursum obliquē protensus, tertiæ cartilagini inferitur, totā sui lateris tertiæ cartilaginis radicis sedem occupās, a priori musculo nō amplexā. Hi quatuor tertiā cartilaginē utrinq; ad exteriora laryngis retrorsum euertunt, lingulā, aut ipsam, si uoles, laryngem aperientes. Atq; duo quidē primi posteriorē cartilaginis secundæ sedem occupantes, recto motu id præstāt, reliqui autē, ut obliquo situ præditi sunt, ita quoq; tertiā cartilaginem in posteriora obliquē reuellunt. Nonus & decimus, qui tertiā primæ copulat, etiā utrinq; sunt^t singuli lati, & ut cæteri laryngis, carnei. enascuntur autē inuicē continui ex^u media primæ cartilaginis sede, secundū totā ipsius internæ sedis lōgitudinē. Dexter (idē de sinistro subaudi) uelut triplex sui principiū ostendit, propter quasdā ipsius inscriptiones, adeò illi impressas, ut harū occasione triplex musculus esse uideat. hic a principio obliquē sursum ascēdit, & dextræ tertiæ cartilaginis partis anteriori sedi implātatur. Duobus his tertiā cartilago primæ adducit, illorumq; beneficio duæ tertiæ cartilaginis^x partes, contractis nimirū musculis cōnient, ipsaq; Y. lingula horum potissimū auxilio cōprimitur. Hi sanē musculi omnium totius corporis cum temporalibus, pro ipsorū mole, ualidissimo fungūtur munere, quū tot musculis expirationem molientibus, in spiritus retentione opponātur, quanq̃ & huc quoq; reliqui laryngem arcantes musculi faciant. ^a Vndecimus ac duodecimus, in basi tertiæ cartilaginis cōsistunt, ea nimirū regione, quā^b stomacho larynx cōmittitur, tertiæq; cartilago secundæ cartilagini coarticulatur. Sunt autē ab utroq; latere singuli, qui ex radice tertiæ cartilaginis, quā hæc primæ proxima est, principiū sumunt, & secundū basim tertiæ cartilaginis modicē sursum protensi, ad tertiæ cartilaginis medium (ubi duæ ipsius partes inuicē colligātur) finiunt, se mutuò inibi cōtingentes. Sunt itaq; præsentē musculi breues, & exterius quodāmodo pyri modo rotundi, intus uerò omni ex parte cartilagini tertiæ cōnati, & ubi se inuicem contingūt, latiores crassioresq; sunt, quā statim in ipsorū exortu. Ambo musculi tertiæ cartilaginis basim cōstringentes, atq; duas eius cartilaginis partes inuicē comprimētes lingulā claudūt, arcantq;. Et hi sanē argumēto sunt, tertiam cartilaginē necessariò esse geminā, quū si simplex esset, ab illis musculis cōstringi haud possit, uti neq; a^c duobus tertiā primæ iungentibus occludi, neq; a^d quatuor secundæ tertiam necitentibus aperiri potuisset. Ex duodecim igitur laryngis peculiaribus musculis, octo laryngem arcant, quatuor scilicet primā secundæ necitentes, & duo tertiam primæ cōmittentes, ac demum duo in basi tertiæ cartilaginis repositi, quatuor uerò ipsam referant illi nimirū, qui tertiam secundæ cōmittunt. Alij autem musculi, quos cōmunes uocamus, utriusq; etiam motus duces sunt, per quem spiritalis meatus lingulā ue amplificatur, & cōprimitur. Horū primi duo utrinq; singuli, ex tota propemodū inferiori^f hyoidis ossis sede principiū ducunt, ac lati & carnei, & internis lateribus inuicē proximi, cōtiguicq; uiſuntur. Hinc deorsum protensi, & mutuò internis lateribus abscedētes, singuli in sui lateris inferiorē primæ cartilaginis sedem implantantur, tanta latitudine atq; ipsorū originū est latitudo. Toto autē descensu, qua anteriori primæ cartilaginis sedi exporrigunt, ipsi fibrosis tantū nexibus in eum modū hærent, quo incubentes inuicē musculi mutuò cōmittuntur. Porro ad præsentium musculorū insertiones, quæ non minus, quam eorū origines carneæ existunt, ^g alij duo musculi æquē propemodū ampli primæ cartilagini implantātur, ab interiori^h regione ossis pectoris in iugulo carneis, sed nō latis prin-

Propriorum
1, 6, 7, 8.

Propriorum
9 & 10.

Propriorum
11 & 12.

Propriorum
epilogus.

Communium
primus & 2.

Communium
3 & 4.

cipijs ortum ducentes, qui sursum secundum anteriorem asperæ arteriæ sedem protensi, ac sensim latiores redditi, illi, quam diximus, primæ cartilaginis sedi inferuntur. ^{i 1, 2, 3, 4, 5} Quintus ac sextus ^{fi. I.} communium laryngis musculorū, transuersi sunt, & ipsorum utrinque habentur singuli ^{k 2, 3, 5 fig. H.} stomachum amplexantes, hi enim ex stomachi postica parte, uertebras ceruicis respiciente, secundum stomachi longitudinem principium sumunt, adeo inuicem continui, ut utrorumque musculorum idem unitumque principium esse propemodum dixeris. Hinc ampli & carnosissimi, uersus priora transuersim protensi, lateribus primæ cartilaginis, secundum ipsorum laterum longitudinem implantantur, tota amplitudine, qua stomachum contingunt, impenso ipsi connati continuique. Hi quos postremo recensuimus, musculi ad posteriora contrahunt primæ cartilaginis latera, secundæ cartilagini eam ita applicantes, ut laryngem quoque, seu lingulam illam coarctent. Qui uero ab osse hyoide procedunt, primam cartilaginem à posterioribus sursum quodammodo abducentes, laryngem dilatant. Verum his contrariam functionem adipiscuntur musculi, à pectoris osse, primæ cartilagini inserti, illi nanque humiliores, primæ cartilaginis sedes contrahunt, easdemque deorsum uellunt, nonnihil unà contrahentes stringentesque ^{l 5 ta. Q.} asperam arteriam, ne quicquam, quum uocem edit homo, reduplicetur, neque plurimum dilatetur.

Duo musculi laryngis operculi.

Præter hos sex, alios ^{m 2, 3, 4 fi. K.} duos animaduerti propemodum teretes, ac ex media interiori ossis hyoidis sede explantatos, & utrinque singulos radici eius ^{n 2, 3, 4, 5 fi. L.} corporis, quod laryngis censetur operculum, insertos. Hi liquidò admodum (si modò quis ipsorum nouerit administrationē) uisui sese offerunt, Galeno tamen, quum in nullis, quæ hodie extant, Operibus ipsorum meminerit, incognitos fuisse opinor, non enim (quod fortè quis arbitraretur) in communium laryngis musculorum numerum sunt reiiciendi. Quamuis enim hos octo Galenus esse dixerit, & interim sex tantum descripserit, omnes tamen octo, primæ cartilagini committi postmodum sermoni subnexuit. Porro his duobus id munus concreditum est, ut laryngis operculum, cibis potuque depressum denuo eleuent, ipsorum nanque principijs uersus hyoides ^{o 2, 3 fig. A.} os tractis, operculum illud erigi conspicitur. Veruntamen musculos, qui his duobus opposito munere fungerentur, nullos obseruauimus, neque id mirum est, quum cibus & potus, suo pōdere euersum eleuatumque laryngis operculum facile comprimant, & ipsum mole sua etiam grauatum, laryngi promptè applicetur. Quamuis non hi solum musculi oppositis destituantur, sed & illi quorum beneficio rectum intestinum, & testes sursum allici dicuntur. Corpora enim, quæ ex sua natura plus satis deorsum tendunt, nec peculiarem motum in ductu, qui deorsum fit, exigunt, ad eam actionem minimè proprijs indigent musculis. Larynx rarum aut peculiare ligamentum ^{p fi. cap. 52 B, C intestini musculi notantur, si gura autem 22 li. 5 & testis. q spectatur 11, 12, 13 figuris.} prorsus nullum obtinuit, præter membranea articulos orbiculatim cingentia, deinde in ipsius medio ^q lingula consistit, cuius etiam superiori Libro mentio incidit, quæ conformatur ex cartilaginum articulatione, & præcipuè cartilaginis tertiæ partibus, quæ primam cartilaginem acutis processibus spectant, mox & eas colligante ligamento, & pingui totam laryngem succingente tunica, cuius sanè naturam, ac constructionis artificium ut proprijs manibus ex dissectione, uti modò subiiciam, discas, optarim.

Laryngis ligamenta.

LARYNGIS MUSCULORVM ADMINISTRATIO. Caput XXII.



Administratio primi & 2 communium.

Communium tertij & 4.

ABRICAM laryngis hunc in modum in boue primum, aut in uitulo, deinde in homine auspicaberis. Ex alia quapiam larynge emundatas cartilagine operi adhibebis, ut hæc uelut ossium (quæ musculorum sectioni perpetuo adesse oportet) uicem gerant, deinde dissectis hyoidi ossi proprijs ^a musculis, statim tibi occurrent ^b duo ab osse hyoide, ad primam cartilaginem procedentes musculi, quorum principia paruo cultello ab osse liberans, paulatim musculos à cartilagine radendo, ad ipsorum usque ^{c 5 ta. P.} insertionem sequeris. Cæterum pari ratione à pectoris osse ad primam cartilaginem ^c ductos, primum ab osse separabis, ac postea ipsos ab aspera arteria leuiter diuellens, ad primam usque cartilaginem, cui inferuntur, illos deduces. Vbi quatuor hos diligenter intuitus fueris, sectionem per palati tunicam, fauciumque intima duces, ac laryngem cum stomacho è faucibus eximes, ad eum prorsus modum, quo lanij bouum laryngas execare consueuerunt. Liberatam postmodum laryngem cum asperæ arteriæ & stomachi portione, omnino ab animante auferes, ac abiecta lingua, uniuersam laryngem Sodali, ac tecum Anatomes studioso tenendam porriges. Qualis mihi in laryngis constructione discenda sedulo fuit, præstatis ingenij luuenis, ANTONIVS SVCCHA, nostræ communis Bruxellæ, adeoque totius Belgicæ, ob singularem medicinæ ac mathematicæ ^{d 2, 3, 5 fig. ca. 21 l.} cognitionem, magna & rara spes. Hac itaque ratione accommodata larynge, mox ^d musculos ex stomachi

Stomachi posteriori parte ad primæ cartilaginis latera productos inspicito. quod ut fiat promptius, ipsos longa sectione, ubi capita sese contingunt, diuidito, & hamulo, aut summis digitis alterius capite apprehenso, totum à stomacho ad primæ usque cartilaginis latera accuratè separato. Licebit modò sex horum musculorum, laryngi cõmunium actionem discere, dummodo ipsorum capita huc illuc, uersus sua principia attraxeris. quo factò, omnes ilico à prima cartilagine liberabis, atque ad duos, quos operculi laryngis radici implantari dictum est, sectionem conferes. Linguae tunicam, quæ cum palati tunica & laryngis & stomachi interiori ipsiusq; demum operculi cõmunis est, ad operculi radicem orbiculari linea incidēs, ac hamo exceptam cutis modo exoriabis. Mox enim illorum musculorū fines in promptu erunt, quos posteaquam ad hyoides os, leniter ipsos ab adipe illis proximè accumbente separando deduxeris, ab osse ipsos dissecabis. Vt autem illorum functionem discas, laryngis operculum digito deprimes, ipsorumq; capitibus uersus hyoides os attractis, operculum euerti, atque antrorsum tendi eleuariq; conspicias. Modò & hos quoque musculos & stomachum, ipsumq; si libuerit, operculum à larynge in totum adimes, ut tres laryngis cartilagine, cum duodecim ipsi proprijs musculis solæ relinquantur. Quum tamen reliquam asperæ arteriæ partem à secunda cartilagine absecas, inspicito glandulas hominis laryngi appositās, & ut in Sexto libro exequar, utcunque carneas. In boue autem, harum loco carneam prorsus reperies substantiā, ad secundæ cartilaginis latera repositam, & musculo cuiusdam similem, qui septimus & octauus cõmunium laryngis musculorum in boue censerī possit, quum interim homo eius substantiæ, seu musculorum uice, quemadmodum nuper dixi, grandes insignesq; obtineat glandulas. Cæterum nunc tempus est, ut ad amussimⁿ lingulæ seu rimæ formam intuearis. cernes enim laryngem superiori parte & inferiori amplam esse, in medio autem rimam oblongam habere ex ea, quam diximus, substantia conformatā. Vt uerò hanc proprijs manibus subinde distendas, aperiasq; priusquam musculorum sectionem auspiceris, dextrę manus pollice, medioq; digito, laryngis latera comprehendēs, indice interim interiori tertiæ cartilaginis amplitudini inserto, sinistræ autem manus pollicem ac indicem, inferiori laryngis orificio immittēs, ac duobus illis sinistræ manus digitis, secundam cartilaginem à prima abducere conaberis, dextræq; manus indice, tertiam cartilaginem extrorsum euertes. Liquidissimè enim hac ratione inspicies, quā lingula aperiatur. Si uerò sinistra manu secundā primæ adduxeris, & dextræ manus pollice ac indice, tertiam cartilaginem uersus interiora protruseris, ac inuicem duas ipsius partes conuiuere feceris, lingulam ad amussim claudi intuebere. Scribo autem hæc paulo fusiùs, ut Galenus aliquando intelligatur, nec posthac laryngis operculum, uocis principalissimum organum, qui hodie sese Galenicis profitentur, contendunt, & idem corpus, γλωττιδα uel lingulam, & ἀνγλωττιδα, seu laryngis nobis uocatum operculum esse opinentur, ignorātes profectò lingulam in medio esse laryngis, ac tibiæ linguas, quibus illæ instantur, quā simillimam existere. Quum itaq; lingulam tuis manibus, utcunque uisum fuerit, & claueris, & aperueris, proprios laryngis musculos dissecabis, à quatuor primæ cartilagini secundam necsentibus auspicatus. Leui itaq; ac transuersa sectione, exteriorem musculum à scutiformi cartilagine liberabis præcauens, ne interiorem simul conuulneres, hoc ablato, interiorē similiter à secunda cartilagine abrades, mentem adhibens illi, quam dixi, fibrarum interfectioni. Neq; hoc duntaxat ad amussim, num scilicet unus duo ue sint, rimaberis, sed etiam, dum stomachum à larynge liberas, diligenter expendēs, num^k eos, quos interdum obseruari dicebam, musculos reperturus sis, qui à secundæ cartilaginis spina, in primæ cartilaginis humiliores processus inseruntur. Quatuor itaq; secundam cartilaginem primæ iungentibus à larynge resectis, in altero laryngis latere^l processum inferiorem primæ cartilaginis, à secunda liberabis, ac primam hac ratione à secunda antrorsum reflectēs, duos inspecturus musculos, tertiam primæ colligantes. Vbi hos utcunque examinaueris, integrum erit exiguo, sed acutiori cultello primam cartilaginem, à reliquis duabus adimere, aut si uoles, ad duos musculos illi tertiam necsentēs appensam seruare, ac postmodum te ad quatuor tertiam secundæ necsentēs conferre. quos licebit à suis principijs, quæ ex secunda cartilagine sumunt, liberare, atque ad tertiam, cui inseruntur, deducere. Postremò qui in tertiæ cartilaginis sunt basi, auferēs similiter quoque eorum principia primū liberans, ac ad finem usque, quo se mutuò contingunt, deradens, huiusmodi enim administratione perpetuò integrum erit, musculorum functionem discere, dum scilicet ipsorum principia ad locum, unde originem sumunt, attrahuntur. Ablatis musculis cartilagine inuicem separabis, nec fieri poterit, quin tunc accuratè lingulæ substantiā perspectissimam habeas, quemadmodum & naturam illius quoque, & usum, & formam, ex administrationibus nimirum, quas proprijs manibus iam es aggressus.

Duo in laryngis operculis

Laryngis rimula seu lingula quo modo spectanda.

Administratio propriorum
1, 2, 3 & 4.

Proprium
9 & 10.

Proprium
5, 6, 7 & 8.
Proprium
11 & 12.

Alius uicini-
 quam sectio-
 nis ordo.



Brachij mo-
 tus quot.

Primus bra-
 chium mouen-
 tium.

VICINITATIS quidem ordo, ante musculos brachium mouentes, capi-
 tis & dorsi, & scapulæ motuum duces oportuisse describi indicabit, si de-
 mum partes iam dissectis uiciniores prosequi institutū esset. Verū quum
 integris adhuc brachium mouentibus musculis, scapulam mouentes admi-
 nistrari nequeant, multoq̃ minus illis nondum ablati, aut capitis aut dor-
 si administrare datū sit, operæpretium me facturum duxi, si brachij & dein
 scapulæ motores, ante caput mouentes musculos, sectionis nomine aggre-
 diar. Quanquam si secus cuipiā uisum fuerit, Capita facile ita transponētur, ceu ego, in horum
 Librorum epitome sectionem non moratus, sed uiciniam potius secutus, præstiti adeò, ut
 cuius integrum fuerit, modò hoc, modò illud Caput aggredi, prout sibi musculorū tradendo
 rum seriem proponet, Brachium itaq̃ antrorsum ad pectus, & retrorsum uersus dorsum, & sur-
 sum ad ceruicē caputq̃, & deorsum ad thoracis latera mouetur: & præter hos motus quodam-
 modo in gyrum quoque agitur, aut ita circumuertitur, ac si baculum aliquem, in utrasque ma-
 nus non flexas, sed secundum longitudinem tantum mutuo appositas acciperes, ac deinde al-
 ternatim, prorsum retrorsumq̃ actis manibus, baculum uolueres. Quemadmodū enim bacu-
 lum siue deorsum porrectum, siue sursum siue antrorsum prominentē, illo modo mouere pos-
 sis, ita quoque brachium, siue id pectori admotum, siue sursum actum, aut deorsum propen-
 dens seruaueris, semper circumuerti poterit adeò, ut brachium triplici motuū genere agatur.

Brachium itaque pectori^a unicus adducit musculus, originem sumens^b ex media pectoris
 ossis latitudine, & ipsi insertis cartilaginibus, deinde quoque priuatim^c ex septimæ & octauæ
 costæ cartilaginibus, &^d ex media clauiculæ sede, qua hæc pectoris os spectat. Principij pars à
 clauicula procedens, omnino carnosā apparet, quæ uerò ex pectoris ossis secundum dextrum
 sinistrumq̃ medio enascitur, alteriusq̃ lateris musculi initio contigua est, neruosiōr membrano-
 siorq̃, & minis crassa uisitur. Attamen, quæ ex ossis pectoris latere, ipsiq̃ inarticulatis cartilagi-
 nibus pronascitur, penitus iam carnosā existit, quæ uerò priuatim ex septimæ octauæq̃ costa-
 rum cartilaginibus, iuxta mucronatam cartilaginem exoritur, membranea, & tenuis aliquo-
 usque conspicitur. Musculus ex his principijs prodiens, & paulatim crassior carnosiorq̃ red-
 ditus, sensim arctatur, atque in acutum tantisper procedit, quousque amplo & neruco, admo-
 dumq̃ robusto, sed breui^e tendine, humero secundum ipsius longitudinem implantetur. Fit
 uerò tendinis huius insertio, ^f subter humeri capitis ceruicem, in interiore ipsius regione, non
 nihil interim in priora uergens. ^g Huius musculi fibræ inuicem uariant, & paulò ante tendi-
 nis productionem, adhuc in carnea musculi parte, deinde & secundum totam tendinis ampli-
 tudinem, ad x literæ similitudinem sese decussatim intersecant. Quæ enim ex clauicula, & me-
 dia pectoris ossis longitudine clauiculæ proxima enascuntur, ex superioribus deorsum obli-
 què in exteriora procedentes, superiorem tendinis partem, secundum totam ipsius amplitudi-
 nem efficiunt, carnosæq̃ toto ductu, præterquam in musculi in humerum insertionem, perma-
 nent. Sed quæ ex reliqua ossis pectoris sede, ac ex septimæ & octauæ costarū cartilaginibus pri-
 uatim originem mutantur, obliquè sursum protensæ, inferiorem tendinis partem, secundum
 ipsius latitudinem constituunt, & citius carnem ipsarū, qua implentur, suffulciunturq̃, quàm
 superiores amittunt. Superius enim ad insertionem usque, musculus carneam naturam refer-
 uat, inferius autem multò ante insertionem, liuidus nerueusq̃ conspicitur, quod superiores fi-
 bræ procul dubio, propter breuiorem ductum adeptæ sunt. Id nanq̃ omnibus commune esse
 diximus musculis, ut tanto breuiori donentur tendine, quo succinctiori ductu, pro motus ipso-
 rum ratione feruntur. Cæterum superiora inferioraq̃ in tendine uoco, non quæ humeri caput
 propinquius accedunt, aut remotius ab illo reclināt, sed ad tendinis, quæ secundū latitudinem
 perficitur, insertionem, has positionis differentias in præsentī refero non secus, ac si hanc char-
 tam, subdita altiore superiore uē dicerem. Est itaq̃ musculus hic quodammodo quinquila-
 tris, sed inæqualibus costis cōstitutus. ^h Vna nanque, secundum mediam clauiculæ longitudi-
 nem ducitur, secunda ad ossis pectoris longitudinē procedit, tertia secundum insertionis lon-
 gitudinē fertur, quarta à media clauiculæ sede, ad insertionis partem, humeri capiti propinquo
 rem proficiscitur, quinta uerò à remotiori ab humeri capite insertionis parte, ad pectoris ossis
 mucronatam cartilaginē protenditur. Atq̃ hæc costa, illa demum est, quæ anteriore cavitatis
 axillæ sedem efformat, posteriorem uerò ille constituit ⁱ musculus, quem brachiū deorsum dor-
 so ad mouere audies. Cæterum ut brachiū pectori adducens musculus, differentes fibras, ac la-
 tum

a 2, 3, 4. ta.
 Δ. 1. ta. L.
 b 3. tab. à K
 ad R.
 c 3. ta. ab R.
 uersus S.
 d 3. tab. à K
 ad L.

e 3. ta. Q. 4.
 tab. Q. T. in
 brachio.
 f iuxta f, e
 fig. 1. cap. 23
 lib. 1.
 g Hic conse-
 res 3. tabulæ
 musculum
 Δ cum mu-
 sculo Δ 4. ta
 bulæ.

h prima co-
 sta 3, 4. tab.
 K, L. secun-
 da à K ad R.
 tertia 4. ta.
 Q, T. quar-
 ta à L ad Q.
 quin. ab R.
 ad T.
 i 3. ta. V. 10
 ta. e.

tum & amplum, uariumq; principium fortitur, sic quoque alijs atque alijs pectoris regionibus brachium admouet. Si enim superiores ipsius fibræ, à clauicula, & superiori pectoris ossis sedeeductæ contrahantur, uersus pectoris superiora, & ad clauiculam brachium adducitur, sin inferiores fibræ tendantur, præsens musculus humilioris brachij ad pectus adductionis opifex fit, siquidem ad^k mucronatam cartilaginem, & spurias costas, quæ ueris uiciniores sunt, brachium allicietur. At si utræque laborauerint fibræ, in neutram partem brachium inclinans pectori adigent. Quia igitur hic musculus amplum, atque ex uarijs natum ossibus principium obtinet, & fibras sese interfecantes, cōtrariæq; serie ductas, & ad hæc motus etiam differentes adipiscitur, nihil obstiterit fortassis, ipsum geminum pronunciare, ac duorum musculorum loco cum aliquot etiam dissectionis Proceribus enumerare, quanquam unius duntaxat uice mihi toto orationis contextu habebitur. Verum quum inferior musculi pars, quæ humiliores fibras producit, uersus inferiora brachium pectori adducit, meritò quoque minor, & secundum profundum tenuior superiori euasit, quæ sursum magis membrum agit, & cui uehementior ualidiorq; functio concredita est. Præter hunc musculum (pæce interim Galeni dixerim) nullus alius brachium pectori admouet. Nam quem inter brachij musculos primum enumerat, quemq; iuxta mamillas exiguum, ad humeri articulum ascendere, ac ad spurias costas brachium adigere scribit, in homine neutiquam reperies. Non enim nos fugere posset, quum hunc obliquè sub cute, in aliorum superficie extantem, sursum ad articulum humeri prorepere Galenus recenseat, & illum in membraneam desinentem exilitatem, articulo inferi affirmet, propter humeri ossis^l sinum, ^m exterius caput musculi flectentium cubitum anterioris amplexantem. Nec quispiam me illum oscitanter cum cute auferre arbitrabitur, qui aut humeri articuli musculorum sectionem aggressus fuerit, aut administranti adstiterit. Et quomodo, quæso, musculus aliquis ex mammarum regione incipiens, & aliorum superficie incumbens, etiam si uel fibræ cuiusdam crassitiem duntaxat æquaret, à quopiam in homine ignorari posset; si demumⁿ inter illum, quem modò recensui, musculum, & illum, quem brachium attollere audies, ad articulum conscenderet. Nam etsi eius musculi pars, cuti subiecta adimeretur, illa pars necessariò (ut cunq; quis uel ultro illum refecare proposuisset) semper sese offerret, quæ inter duos illos musculos sese insinuans, articulo proxima esset. At quorsum attinet, mihi hîc oscitantæ exultationem prætexere, quum uerbulo Galenum simiarum, me autem pro uiribus, hominum constructionem describere, uel hic brachij musculus, cum cæteris innumeris attestetur; homines enim hoc priuantur, uerum in simijs & potissimum caudatis (quorum mihi maior copia, quàm non caudatarū accidit) ad hunc modum obseruatur. Cute detracta, ^o is quem nos in homine primum occurrere diximus, parî modo in simijs cōspicitur, nullo prorsus alio tectus musculo. Verum sub huius humillima^p costa seu latere, super obliqui abdominis musculi (quem descendente uulgò dicimus) principium, gracile membraneumq; musculi initium reperitur, longè sub papillæ regione consistens. Initiū hoc carnosum euadens, sed gracile interim permanens, sub magno illo brachium pectori adducente musculo, sursum obliquè ad articulum porrigitur, eam prorsus, quam Galenus tradidit, insertionem tentans. Neque huius musculi insertio, ut neque ipsius ductus, nisi magno illo musculo penitus eleuato, in conspectum ueniunt, atque id non perfunctoriè, ut Galenum intelligas, etiam si hominum duntaxat medicinam nonnulli sese profiteri iactitent, uenit obseruandum. Nisi enim hunc Galeni musculum, suo progressu ita occultatum, & tantum membraneo principio modicè admodum extare cognoueris, erroneus omnino, atque admodum difficilis Quintus de Administrandis sectionibus liber statim in ipsa fronte uidebitur, quum Galenus passim illum in aliorum, ac proinde etiam in eius, quem nos brachium pectori attrahere diximus, superficie, sub cute exporrectum minùs rectè tradiderit. Quamuis interim sedulò studiosos hortor, ut meæ sententiæ non ita promptè, propter Galeni obseruantiam, ascribentes intueantur, num & homo quoque cum simijs illum musculum communem sibi uendicet, & rursus num caudatis simijs in aliorum superficie (ut Galenus testatur) extet. Præter hunc, Galenus alium describit^q musculum, quem altioris brachij ad pectus ductionis autorem esse existimat. Iste profecto in homine nequaquam me fugit, at minime tamen, ut Galenus autumat, brachium pectori uersus elatiora admouet, imò scapulæ gratia, ut scilicet eam ad pectus ducat, creatus est, quod & ipsius origo, & ductus, illiusq; tendinis insertio, luce clariùs, & præcipuè in homine demonstrant. Principium enim sumit sub^r musculo, quem ego brachium pectori accommodare retuli, & ille huic omnino substernitur. Enascitur autem carnosio principio à secunda, tertia, quarta & quinta, nonnunquam (sed perquam rarò) & sexta, superioribus thoracis costis, non quidem (etsi Galenus non semel aliter affirmet) ubi pectoris ossi coarctantur, & ex ipso pectoris

*Musculus
brachium pectori adducens, quo simia abundat.
Li. 5 de Administrandis sectionibus, & 13 de Partium usu.*

*Musculi qui
scapulam antroorsum agit,
à Galeno male pro brachij motore haberi.*

Li. 5 de Administrandis sectionibus.

*h. 1. ca. 19
lib. 1. k.*

*l. 1. fi. ca. 23
li. 1. H. I.
m. 6 tab. m.
musculi o.*

*n. 3 ta. inter
Δ & P, in li.
nea ab L ad*

*o. 3 ta. Δ.
p. Inter R.
& Stab. l. 5.*

*q. 5 ta. r. 4
ta. k.*

*r. 5 tab. ab i
ad k.*

s. 3 ta. Δ.

t. Hæc petes

ex 4 tab. I.

dein chara.

2, 3, 4 & li.

Etoris osse, sed antea quam costarum ossa in cartilaginem pectoris ossi inarticulandam desinere incipiunt, nec prorsus recto tramite, rectaue linea enascitur, sed quasi digitis quibusdam, ex costarum ossibus longius exortis procedit. Hinc ad exteriora porrectus angustior, sed crassior efficitur, quousque ad humeri cum scapula articulum, in latum nerueumque tendinem carne mixtum finiat, quo ^x processus anchoræ imaginem referentis interno lateri implantatur, illic nervosior euadens, ubi is processus ex suo appendice ^y nervosior internæ capitis partem emittit, eius musculi, quem inter cubitum flectentes anteriorem recensebimus. Nequaquam autem tendo iste, articuli ligamentum in homine contingit, ut sanè, sed admodum adhuc obscurè, in caudatis simijs, quibus anchoram imitans processus modicè extuberat, deinde nullam scapulæ regionem uacare, præter hunc processum reperias, cui tendo ille commode implantari possit. Ad hæc, si musculi huius naturam ad amussim perpenderis, procul dubio cum alterius alicuius usus gratia, tum etiam præcipuè huius musculi insertionis occasione, illum scapulæ processum à Natura productum astrues, quandoquidem processus is, musculo illi non mediocriter aptam insertionis sedem exporrigat. Huius musculi fibræ sese non decussatim interfecant, quemadmodum ^z musculi, qui nobis brachium adducere dictus est. Quum itaque hoc situ ac figura musculus iste à Natura creatus sit, quæ obsecro, ad altiora, quam primi musculi ^a superior pars, brachium pectori admouebit? Eius enim principium, longè à prioris musculi superiori principio superatur, quum hoc à clauicula, & superiori pectoris ossis sede, insigniter etiam deorsum obliquè feratur, illud uerò ex secunda costa & tertia, primum, ut uel elatissimè procedat, longèque inferius habeatur, ac minus obliquum ductum (qui etiam ad ^b superiora ferè pertinet) molliatur. Quamobrem si hæc omnia haud segniter perpenderis, & Galeno concesseris musculi ^c insertionē, quæ è regione humeri capitis perficitur, non nihil articuli ligamentum apprehendere necessariò fateberis eam, quam musculus iste moliretur brachij adductionem, neque humiliorem, neque altiore fieri ea, quam à primo musculo effici dudum dixi. Quum itaque solius scapulæ gratia, non autem brachij, musculum hunc procreatum in hominibus certissimè noui, ipsius denuò in scapulam mouentiū musculorum enarratione sermo instituetur, ac proinde etiam in præsentia reliquos brachij motores aggrediar. Vnum igitur ^d musculum, omnium adductionum brachij ad pectus autorem esse censeo, & ^e qui brachium ad superiora attollit, pariter quoque unum statuo. Est porro hic musculus carnosus, uaria quoque, sed continua principia sortitus, ac uelut ex diuersis musculis (si lato ipsius principio, & uarijs inscriptionibus attenderis) conformatus. ^f ex media enim clauiculæ parte, secundum ipsius longitudinem, quæ scapulam spectat, principium ducit, musculo brachium pectori adducenti ^g contiguus. Deinde ex summo humero, ^h ubi is clauiculæ committitur, ⁱ & tota quoque scapulæ spina musculus hic ^k exoritur. Ex tota hac clauiculæ, summi humeri, & scapulæ spinæ regione, principium nerueum continua linea enascitur, quod uix bene pronatum, ilico carnosum, crassumque admodum & extuberans efficitur. Mox à principio musculus carnosus permanens, ^l in angustum sensim, tanquam in trianguli uerticem tantisper porrigitur, donec humero tendine amplo, & ex carne nervosaque substantia mixto, robustoque, ad humeri ossis latitudinem, non modicè sub ipsius ceruice ^m inferatur. Ipsius insertio, quæ intus, quàm extra nervosior est, non ad amussim secundum transuersum perficitur, sed modicè obliqua ab anterioribus, deorsum in posteriora non nihil uergit, nihilque minus quàm decliuis rectaue (etsi Galenus secus attestetur) est, qui ipsi eandem insertionis formam tribuit, cum ⁿ musculo brachium pectori adducente, quam secundum rectum, ac humeri longitudinem perfici diximus. Totus itaque musculus, si quis illum obiter intueatur, trianguli imaginem præ se fert, ac proinde à Δ similitudine, illum Græci $\Delta\epsilon\lambda\tau\omicron\varsigma\delta\eta$ appellarunt. Quemadmodum etiā ob id, quod humeri ad scapulam articulo, quem $\omicron\mu\omicron\upsilon$ Græci uocarunt, insertitur, illumque quodāmodo cōtegit, $\epsilon\pi\omega\mu\epsilon\delta\alpha$ eundem musculum nominarūt, ego autem toto sermonis cōtextu, musculum appellabo brachium attollentē. Cæterum costæ, musculum hunc describentes ita se se habent. ^o Prima à media clauiculæ longitudinis sede, ad summum humerum cōtendit, & hinc per scapulæ spinam, ad eiusdem usque basim. Secunda, à clauicula obliquè, deorsum ad insertionis internū latas ducitur, aut ea est, quæ hunc musculū, & brachium pectori reducentem musculum intercedit ea regione, qua inuicem ambo committuntur. Tertia uerò costa, à scapulæ basi, ubi eius spina eminere incipit, ad externū latas insertionis obliquè, deorsum in priora contendit. Cæterum ueteres Græci, qui suos pueros corporis fabricā sedulo edocebant, omniaque, ut uerisimile est, ad quasdam species puerorum gratia referebant, hac triangulari figura non contenti, uidentur & exortum præsentis musculi cuidā trianguli uertici assimilasse, quem musculus nō antea ostendit, quàm suo principio undique liberatus, in planum ponatur.

Secundus brachium mouentium.

Li. 5 de Adm. ministr. sect.

ad

A notat trianguli, de quo hic agitur uerticem.



u 5 ta. l iuxta b.

x 5 tab. b. aut i. fi. cap. 21 lib. 1 E, f. F.

y 6 ta. n mu sculi o.

z 3, 4 ta. A.

a 3, 4 ta. K, L.

b 5 tab. ab i ad l. quem ductū con- feres cū K, L ad Q 3 ta bule.

c 5 ta. L. d 3 ta. A.

e 4 ta. z. 10 ta. A. dein 1 ta. K. 2 tab.

M 3 ta. P. 3 ta. y. 9 ta. L.

11 ta. M. P. et præcipue figura eius ta. indici in- ferta.

f 4 ta. ab e ultra f.

g 3 ta. linea ab L ad Q.

h ultimariū fili. 1 Q ad 2.

i 2 fi. ca. 22 li. 1. à K per I ad G.

k 10 tab. ab N per M ad O.

l figura in diti 11 tab. inserta A,

B, C concurrunt ad D.

m 11 ta. de- pendet P.

n 4 tab. A ad Q, T.

o figura in diti 11 tabu le inserta A

per B ad C primam no tat. 2 ab A

ad D. 3 à C ad D. Aut

consule 4, 10, 11 tabu las, ne hic

in notando nimius sim.

ponitur. Quum enim ita extenditur, principij pars, quæ brachium pectori adducendi musculo proxima est, & deinde quæ ad basim scapulæ habetur, ambo magis prominent, & attolluntur ea parte principij, quæ à summo humero pendet, quasi ualde obtusum trianguli uerticem hæc pars exprimeret. Hunc autem triangulum efformabis, dum alicui longæ costæ duas alias breuissimas adijciēs, duæ enim hæc obtusum angulū efformabunt, cui præsentis musculi exortus effigies à Veteribus comparabatur. Huius fibræ inuicem non aliter uariant, quàm quòd anteriores, quæ clauiculæ debentur, deorsum obliquè in posteriora ferantur, posteriores uerò, quæ à scapulæ spina pendent, obliquè in priora descendant. Quæ autem à summo humero, & ipsius cum clauiculæ articulo pronascuntur, rectà deorsum procurrunt, nullo tamen interim pacto musculi brachium ad pectus ducentis fibrarū ritu, se inuicem decussatim intersecāt, nihilominus tamen ob inscriptiones nonnullas obliquè ductas, fibræ implicari parumper cōspiciuntur. Si itaque musculi pars, quæ à clauicula principium ducit, tensa fuerit, brachium sursum ad anteriora colli, & faciem attolletur. Si uerò fibræ à summo humero, & clauiculæ sede ipsi commissa, originem mutuantes contrahantur, brachium rectà, & in neutram partem uergens assurget. At si posterior musculi pars, ex scapulæ spina prodiens in se colligatur, ad posteriora ceruicis, ipsumq; occiput, brachium agetur. Musculi huius initia, ex tota amplitudine illorum, quæ diximus, ossium non exoriuntur, sed duntaxat instar crassioris lineæ, undecunque à prominentiori illarum sede adeò, ut parua omnino initij crassities occurrat. Neque id prorsus negligendum est, quum præter hunc musculum, qui brachium motu proprio attollat, nullus sit, neque etiam brachium hoc donatum musculo, alio egeat, qui eodē cum illo fungatur munere. Quamquam non ignorem, Galenum hīc alios quosdam describere, at id tam uerè, ut sibi in Decimotertio de Partium usu, & Quinto de Administrandis sectionibus minime constet, cuius loca si omnia prosequer, in nimiam prolixitatem præsens Caput excreceret. Quapropter unumquemque dissectionis, & Galenicæ doctrinæ (quam omnes amplecti debemus) studiosum sedulo hortor, ut hæc nostra cum Galeni lectione, diligētī interim inspectione, & sectione, quam suo loco statim prosequar, adhibita, conferre haudquaquā dedignetur, hocq; adhuc addi sinat, cercopithecis prorsus eandem esse speciem musculi brachij attollentis, cum hominum musculo. nam & in illis animalibus hunc musculum, uel Galeni gratia, non ignauiter aggressus sum. Canes autem, equi, boues in hoc articulo, non solum in ossibus, sed maxime in musculis & ligamentis, ab hominis constructione uariant. ^p Musculus brachium rectà ad dorsum agens, cōtrario munere illius^q musculi fungitur, qui omnibus suis contractis fibris, brachium pectori admouet, seu in anteriora agit, hic quoque carnosus similiter & crassus est, & inter cæteros huius articuli musculos utcunque teres. Oritur autem carneo principio, ex inferiori scapulæ basis^r angulo, à basi quidem modicam principij partē assumens, sed insignem ab inferiori scapulæ costā, ex mediā enim costæ illius longitudine, basi scapulæ propinqua, & ab externa gibbæ humilioris basis eius angulī sede, continua carnosaq; origine enascitur. Ad medium igitur longitudinis, inferioris costæ musculus hic, à scapulæ osse abscedit, & modicè sursum in priora tensus, humerum seu brachij os accedēs, in ualidum breuemq; sed latum cessat tendinem, illi ferè forma respondētem, quem musculus brachium pectori adducens, humero inserit. Neq; solum forma (quam ad latitudinem & crassitiē ac insertionem, secundum humeri longitudinem refero) præsentis musculi tendo, illius tendini respondet, qui ad pectus mouet, uerum in eandem ferè regionem, illi duo musculi implantantur, in eorum medio interuallū demittentes, cui tendo^u musculi inseratur, quem deorsum uersus dorsum, ad ilia brachium mouere paulò post subiiciam. Quamuis interim tendo musculi ab inferiori scapulæ costā pronati, paulò uiciniūs humeri capiti implantetur, quàm illius tendo, quem brachium pectori adigere relatum est. Neque hīc rursus me fugit, præsentē musculum inter brachium circumuertentes, à Galeno perperam recenseri, atq; ab illo^x musculum triangularem, & scapulæ gibbum occupantem, & mihi in circumuertentium brachium classem ponendum, ab ipso autorem ductus brachij ad dorsum poni. Verum studio, quum mihi res secus habere uideatur, ab ipsius dogmate recedo, uti profectò & tu quoq; es facturus, ubi affectu exuto, & iam admonitus sectionem aggredieris, aut debitè administrantibus astabis. Nollem enim mihi hīc fidem ex Libro dari, quum certa semper lege orem, ne qua fides Libris in ijs partibus habeatur, quæ nondum per sectionem uisæ sint. Brachium deorsum trahitur, à^y magno quodam, latòque admodum musculo, qui à spinarum apicibus, quæ à sexta thoracis uertebra spina, ad ossis sacri usque medium habentur, principium sumit, non quidem id pluriū brachij motuum opificum modo crassum, sed omnino instar amplæ membranæ tenuē continuumq; ac recta linea à dictarum modò spinarum apicibus pronatum.

Z Verum

Tertius brachium mouentium.

Lin. de Partium usu, Li. 5 de Administrandis dissectionibus.

Quartus brachium mouentium.

p 13 tab. S.
7 ta. M. 8 K
9 N. 10 R.
11 L. 12 R.
q 3, 4 ta. Δ.
r 1, 2, 3 fig.
ca 12 li. 1 Y.
sedes autē,
unde musculus
prodit 1
fi. p. 2 fi.
T.

s 4 tab. Q.
T musculi
Δ.

t 7 ta. O.
u 10 ta. O.

x 11 ta. r.

y 2 ta. r. 10
tab. O. 1 N. 3
V. 4 m. 7.
90. 11 C.
d 10 tab. ab
S ad T.

Verum ubi musculos dorsum mouentes, id principium perreptauit, eamque costarum regionem contingit, quæ maximè in dorso, uersus posteriora extuberat, carnosum densumque efficitur, & uniuersus musculus ad eum modum auctus, in^b angustum tantisper procedit, donec tendinem latum, ualidum, sed breuem humero inserat, subter ipsius ceruicem, & secundum ipsius longitudinem, in medio^c tendinis brachium pectori admouentis, & tendinis^d qui brachium rectà ad dorsum agit. Hic itaque musculus etiam triangularis est, sed planè inæqualibus conformatur^e costis, ac duas quidem longissimas exigit, unam, quæ secundum dorsum longitudinem porrigitur, alteram, quæ ab osse sacro, per ilia & inferiorem thoracis partem, sursum ad tendinis insertionem conscendit, atque alterum axillæ cavitatis uallum constituit. Tertia uerò præsentis musculi costa, à sexta thoracis uetebrae spina, super angulum scapulæ, quæ basis humilior pars ostendit, ad insertionem tendinis uehitur, atque hæc transuersim quodammodo repens, reliquis duabus costis multò breuior est. Ac pro trianguli costarum inæqualitate, etiam huius musculi fibræ differunt, quæ enim per ilia, et spuriarum costarum extrema sursum porriguntur, prolixissimæ, ac minus obliquæ sunt. quæ uerò ab inferiorum uertebrae thoracis spinis enascuntur, breuiiores sunt, & transuersim magis prorepunt. Musculus iste motus brachij deorsum opifex est, non quidem id simplici motu, sed composito, pro fibrarum uarietate, præstans. quandoquidem prout superiores fibræ, aut inferiores in se colliguntur, contrahunturue, ita quoque deorsum, nunc ad superiora, nunc ad inferiora, brachium uersus dorsum deprimitur. Porro musculus^m hic, dum scapulæ humiliorem^b transcendit angulum, fibris quibusdam scapulæ committi, atque ipsi aliqua insigniori apprehensione adnasci, Galenus scriptum reliquit. Deinde huius insertionis beneficio, non modò brachium duntaxat, ab hoc musculo moueri asserit, imò etiam illum detractionis scapulæ ad inferiora autorem esse commemorat. Profectò etsi quàm maximè uerear, Galeni placitis obuiam ire, & lubens hoc Capite, saltem unicuique musculum citra controuersiam plenè describere optem, haudquaquam tamè, ut res sese habet, hic subticere queo. Præsens enim musculus, dum humiliorem scapulæ basis angulum integit, scapulæ ossi, nisi musculorum, qui ab illo pronascuntur, interuentu, contiguus uisitur, neutiquam autem ossi connatus, ut neque etiam, cui incumbit ibidem musculorum regioni, aliqua peculiari insertione committitur, connasciturque. Non enim aliter inibi subditis adnectitur musculis, quàm musculis dorsum mouentibus, & thoracis & abdominis, qui huic musculo non minus, quàm illi scapulam occupantes substernuntur. Quum itaque musculus hic, nullam in scapulam moliatur insertionem, proprio etiam motu unà cum brachio eam nequaquam, ut Galenus opinabatur, deorsum uellit. Etsi illum tota ea sede, qua angulo scapulæ superuehitur, scapulæ innasci darè, id tantum me Hercules transuersis perficietur fibris, illis inquam, quæ in elatissima suæ originis sede habentur, atque à sextæ, septimæ, octauæ, nonæ & decimæ thoracis uertebrae spinis dependent, quæ sanè non deorsum scapulam mouerent, sed rectà ad dorsum. Huius enim musculi eminentior pars, altius à spinis, quàm Galenus arbitratur, principium ducit, nam aliquousque illi^h musculo substernitur, quem scapulam mouentium secundum numeramus, quemque Galenus inter posteriores scapulam mouentes, Demissiore uocat, amplum hunc brachij musculum, ibidem principij sui uerticem assumere astruens, ubi ille demissior scapulæ musculus cessat. At quum suo rursus loco de scapulæ motoribus sermonem instituemus, ad brachij musculos iam reflectenda est oratio, inter quos Galenus alium enumerat musculum, eiusdem functionis cum nuper dicto, gratia efformatum, ut scilicet brachium deorsum trahat, atque hunc quidem latum amplumque esse recenset, sed tenuem interim. Membranam enim, quam nos carnosam uocamus, fibris carneis augeri narrat, quum primò ilia contingit, ac fibras has sursum tensas, carnosiores tantisper effici, donec membrana ampli & tenuisⁱ musculi nature, quem buccas mouere diximus, respondeat, humerumque implantetur. Deinde hunc musculum Galenus omnes, qui illum præcesserunt confectio num Proceres, in hominum potius corporibus, quàm cum Galeno in simijs se exercitantes la tuisse, atque ab ipso in simijs inuentum nusquam non iactitat. ego profectò in simijs, & canibus, plurimisque quadrupedibus ipsum obseruauit, non tamen in omnibus æquè latum carnosumue. At in simia (ut id priuatim dicam) ad hunc modum mihi apparuit, membrana carnosaf, secundum spinæ totius longitudinem firmius subditis organis, quàm alibi connascitur haud aliter, quàm si ex spinarum apicibus principij sui portionem, aliorum ligamentorum modo educeret. Verum in ea sede, qua membrana è regione quinque lumborum uertebrae confitit, illiūque os contingit, carneis, sed tenuibus rarisque fibris adaugetur, quæ sursum oblique uersus axillam prorepentes, ac ex lata basi sensim in arcum collectæ, musculum amplum at tenuē exprimunt, qui in mucronem desinens obscure, uixque admodum in humerum implantatur, tendini

hunc

Li. 13 de Par
tium usu, & 5
de Admini
strandis disse
ctionibus.

non

Musculus ali
us quo simia et
canes abundan
tiant.

Li. 1 & 5 de
Administ. dis
sect. & 13 Li.
de Vsu parti
um.

b 2 tab. l. m
uersus n. 10
tab. S, T, X
uersus V.
c 4 ta. Q.
T musculi
Δ.
d 7 tab. M.
e 10 ta. pri
ma costa ab
Sad T. 2 à
T per X ad
V. 3 ab Sad
V.
f ad sedem
Y ta. 10.

g ad sedem
Y tab. 10.

h 9 ta. r. Δ,
uerum hic
de parte ip
sius Δ insi
gnita tan
tum agi
mus.

i 3 ta. r.

k 3, 4 ta. Δ. tendini eius^k muscoli continuus, qui brachium pectori adducere commemoratus est. In canibus manifestam insertionem in humerum non ostendit, & uidetur muscoli brachium pectori adducentis tendini aliquo pacto admisceri, aut potius propriae eius muscoli membranæ adnasci. In equis quoque, bobus, & ouibus, & id genus animalibus, admodum euadit conspicuus, unde etiam consulo illum in boue potissimum perpendi, quod fiet promptissimè, si excoriati bouis axillam inspexeris. Apparebit nanque is amplius, & conterminis musculis rubicundior, & cæteris partibus albis apparentibus, ex illo maximam portionem ablatam esse cõperies, quam lanij cuti adnatâ relinquunt eo, quod carnosam membranam unâ cum cute auferre, inter excoriandum consueuere, atque ideo etiam tantam presentis muscoli partem, quanta nondum prorsus, & insigniter carnosâ apparet, auferunt. Quapropter etiam iuuabit, excoriantes lanios uidere, qui longè acutiori cultello, maioriq; mora in axilla cutem adimunt, quàm in reliquo corpore, ubi membranam unâ cum cute à subditis corporibus separant. Non inutile quoque erit, excoriatâ cutem iubere tibi exporrigi, ut & cuti eorum musculorum portionem adhuc adnatam contempleris, obseruesq; huic musculosæ carni paulò rectiores fibras intertextas esse, quàm
 l 10 ta. Θ. amplo illi musculo, quem brachium deorsum ad spinam mouere testamur. Atque hæc in simia, & quæ proximè nominata sunt, animantibus didici, at in homine me reperisse nequeo affirmare, quantum uis rectè cutem ab adipe, & quum obesus accidit corpus, adipem à membrana carnosâ, & membranam à subditis illi musculis, per totum thoracem abdomenq; non diuulsam, laceram uel semper dissecè. Liberaui enim subinde ab adipe cutem, et adipem postmodum à membrana, & denuo membranam ab his, quibus incumbibat musculis, ac deinde manibus membranam tetendi, sed hæcenus illam nullis carnosis fibris, secundum thoracis latera nutritam auctamq; obseruaui, nec etiam spectatorum aliquis, quotquot mihi secant unquam astitè, membranam hanc musculosam fieri, asserere ualuit. Præterea si membrana, quam musculus fieri Galenus astruit, brachium deorsum traheret, proculdubio aut humero, aut articuli saltem ligamento neceretur, quod & si de simijs fortassis, & bobus dici possit, quia alium, quàm homines, motum, propter crebrum in terram prioribus pedibus innixum exigunt, in hominibus tamen nullam insertionem membranæ carnosæ in humerum fieri, audacissimè pronuncio. Nam præterquàm quod membrana in homine fibras carneas sub axillis nullas demonstrat, integrum est eam per totam axillæ regionem, ab huius loci musculis, & articulo non minus liberare, quàm in inguinibus, & poplite, quod haudquaquam perficeretur, si membrana tendinem in os brachij insereret. Porro quum omnibus dissectionum studiosis integrum sit, num hæc, quæ de membrana in hominibus proposui, ueritati sint consona, proprijs manibus inquirere, aut alijs dissecantibus iam admoniti astare possint, his prolixius immorari haud conuenit. Addam tamen & hoc, si musculus iste eum, quem Galenus narrat, ductum, situm, & fibrarum seriem nancisceretur, quod non alio planè fungeretur munere, quàm inferiores eius^m musculi fibræ, quem nos brachium deprimerè asseruimus. Nequaquam enim, ut Galenus arbitratur, huius membranæ carnosæ muscoli beneficio, brachium rectâ deorsum, & in neutrum latus inclinans duceretur, quum prorsus obliquas, ex Galeni etiam descriptione, fibras nancisceretur. Cæterum in nullam partem uergens brachium deorsum uellitur, quum et inferiorⁿ musculi adducentis ad pectus pars, & inferiores fibræ deprimentis^o musculi simul agunt, accedente unâ quoque brachij pondere. Atque duæ iam dictæ musculorū partes, illæ sunt, quæ axillæ cavitatem efformant, quasq; in Libro de Articulis Hippocrates Tendinum nomine nuncupauit, quemadmodum & Veteres, qui etiam Tendines nuncuparunt, musculos occipitis ossi connexos, ac in medio foueam efformantes, & Græcis *ivæs* quoque appellatos. Qui brachium circumagunt, tres mihi constituuntur musculi, omnes ex scapula ducentes originem, & latis tendinibus, articulum continentibus membranâ implantati.^p Primus itaque, qui ordine brachium mouentium quintus haberi potest, scapulæ^q sinum occupat, qui inter superiores scapulæ costam, & eiusdem spinam, seu magni illius processus radicem uisitur. Procedit enim à scapulæ basi, et omnino carnosus totam, quam diximus, scapulæ cavitatem implet, ossi semper ualide, ac si ab ipso toto progressu enasceretur, cõnatis. Quum uerò ad superiorem ceruicis scapulæ sedem pertingit, sub ligamento ualidissimo, summum humerum interiori scapulæ processui (quem anchoræ assimilamus) colligante, in anteriora contendit, et in amplum ualidumq; cessans tendinem, articulum humeri ad scapulam superat, eius articuli ligamento pertinacissimè, obliqua quodammodo insertionem implantatus. Est itaque musculus hic oblongus, & exterius gibbus, intus autè illi respondet cavitati, quam implet, deinde fibras secundum sui longitudinem exporrectas habet, quæ si brachium attollentis^s musculi fibris cõferantur, transuersæ prorsus existunt. Huius musculi Galenū non meminisse opinor, nisi fortè inter brachium attol-

*Axillarum
ualli.*

*Quintus bra-
chium mouen-
tium.*

Sextus bra-
chium mouen-
tium.

Septimus.

lêtes (quos uarios, neq̃ semper eosdē recenſet) illū reponat, quāuis ipſi ad ſuperiora cōtractio, quam obſcurè uerſus anteriora molitur, præcipuè demādata nō ſit. Deinde Galeni deſcriptio num nulla illi cōgruit, etiāſi ſcapulæ eminentiori coſtæ quendam exporreſtum obiter narret, quem ſi quis hunc noſtrū eſſe dixerit, nō tamen ipſi inſignem cum brachium attollente muſculo connexum (imò uix contactum) tribuere poterit. Sextus brachiū mouentium muſculus admodū eſt carnoſus, ac concauā internamq̃ ſcapulæ ſedem opplet, ex^u baſi torius ſcapulæ carneā originē deducens, & in trianguli^x uerticē, ad ſcapulæ formā tantisper arc̄tatus, dum in interiorē articuli regionē pertingat, cui amplo tendine, quaſi in ſemicirculū implātur. Huius muſculi ſuperius latus^v illi admodū continuum exiſtit, quem poſtremò recenſui, adeò ſanè, ut niſi diligenter animū adhibueris, uterq̃ unus eſſe tibi appareat. illumq̃ muſculum ad^z elatiorē ſcapulæ coſtā, inflexionē in anteriora feciſſe, atq̃ ita etiam portionē gibbæ ſedis ſcapulæ occupare aſſeres. Septimus uerò brachiū mouentiū muſculus ille eſt, quē Galenus in Decimotertio de Partium uſu (nam in Quinto de Adminiſtrandis ſectionibus omnes à ſcapula in humerū porrecti muſculi mirè cōfunduntur) brachium retrorſum, ad dorſum agi credidit, illū enim, qui uerè id munus præſtat, quemq̃ inter huius Capitis muſculos tertio loco recenſui, Galenus circumuertentis ad exteriora uice deſcripſit. Ceterū hic ſeptimus muſculus, cuius ope brachiū ad exteriora circummagi ſcio, uniuerſum ſcapulæ gibbum, quod ſub ipſius ſpina habetur, implet. Exoritur enim carnoſus ex ſcapulæ baſi, deinde arc̄tior ad ſcapulæ formam^c redditus, tandem articuli ligamento, tendine amplo at breui, tanquam in ſemicirculum extrinſecus inferitur ita, ut trium muſculorum brachium circumagentium tendines, in orbem quaſi uniuerſum articuli ligamentum amplexentur, & qua ratione ſinguli ſuis fungantur munijs, facile demonſtrent. Ligamenta uerò ſcapularum ceruici, caput humeri colligantia, ubi brachium mouentium muſculorum ſectionem abſoluero, peculiari Capite pertractabo.

MUSCULORVM BRACHII MVEN-
tium adminiſtratio. Caput XXIII.



Quā corpus in
horum muſcu-
lorum admini-
ſtratione ere-
ctum ſeruare
poſſit.

Muſculi, quē
carnoſa mem-
brana in ſimia-
rum & canū
artibus conſti-
tuit, examen.

I haſtenus ad brachium mouentes uſque muſculos, cæteros, & præcipuè latum illum, qui buccarū motibus præeſt, diſſecueris, cutis quoq̃ ex parte ſuperiori ſcapulæ, & pectore ablata erit, ac proinde cutis ab abdomine & uniuerſo thorace, uſq̃ ad femora, & oſſis ſacri mucronē nunc dūtaxat adimetur. & hanc quidem aut lanij more integram excoriabis, unica tantum linea à pectore ad pubis uſque os ducta, aut per uaria fruſta, prout commodior apparebit ratio, eam diſſecabis. Ego autem interdū, quando hominis ſectionem mihi adminiſtrare ſoleo, ſub inferiori maxilla per utrunq̃ os iugale, robuſtum funem traieci ad capitis uerticem, laquei modo uinctum, idq̃ aut ad frōtem, aut ad occipitium magis, prout aut erecto, aut depreſſo capite cadauer ſuſpendere animus fuit. Longiorem enim laquei finem, trochleæ cuidam cameræ trabi affixæ tranſpoſui, illoq̃ corpus tanquam ſuſpenſum, modò altiùs, modò demiſſiùs detrahi, atq̃ in omnem partem, prout negotio compete-^abat, circumuolui curabam, & quum ruruſ ſuſpenderetur, in meſam inclinari ſinebam, facile enim ſub trochleæ regione menſa accommodatur. Atq̃ hoc modo in omnibus muſculorum tabulis delineandis, cadauer ſuſpenſum fuit, quemadmodum Septima tabula utcuq̃ oſtendit, quamuis dum illa delinearetur, funis ad occipitium reflexus erat propter muſculos, qui in collo illic ſunt conſpicui. Et ſi fortaiſſis maxilla inferior, ex diſſectionis ſerie ablata ſit, aut etiam iugalia oſſa fuerint effracta, nihilominus ſinus temporalibus muſculis excuſpti, laqueū ſatis ualidè amplectētur. Cauendū enim eſt, ne ceruici laqueus circūponatur, niſi iam aliquot occipitijs oſſi cōnexi muſculi fuerint reſecti. Atq̃ eiſmodi corporis ſuſpenſio ideo maximè cōducit, quòd moleſtè admodū corpus humanū in menſam procūbens, modò in pectus, modò in dorſum conuolui poſſit. Et licet fortaiſſis opportunè cadauer uertatur, tamen muſculi tunc adeò producuntur, aut ex innixu lateſcunt, cōprimunturq̃, ut diſſecti propriam formā & ſpeciem uix retineant. Quocunq̃ modo igitur uſum fuerit, aut ea, qua dixi, ratione ſuſpenſo, aut in menſa reposito cadauere, cutem unā cum adipe abſq̃ ulla membranæ carnoſioris læſione, ab uniuerſo thorace abdomineq̃ auferes. Quod profectò, niſi laboris ſis ſtudioſus, diſcendiq̃ cupidus, moleſtè ac difficulter perfeceris, cum tot ſectionibus cutis proruſ aliter liberāda ueniat, quā ſi carnoſam membranā unā cum cute adimeres. Ablata cute unā ruruſ linea, à media pectoris regione, ad pubis uſq̃ os, in membrana carnoſa duces, & deinde aliam à pubis oſſe tranſuerſim, ſecundū coxendicis articulum, ad ſacri oſſis uſq̃ ſpinam, & tertiam à ſummo humero, ad uſq̃ mediam brachij regionem, ſecundū ipſius longitudinē. His ductis ſectionibus,

t 7 tab. r. 8
tab. H.

u 7 ta. ab L
ad L.

x 7. ta. ab
L, L uerſus
K.

y 7 ta. I.

z 1 ſi. ca. 22
li. 1 ab A per
a ad z.

a 11 ta. r. 2
tab. i. 9 M.

10, 12 Q.
b 13 ta. S.

c 2 ſi. ca. 11
li. 1 inter G,

I, H, D, T,
Y.

d 11 tab. ab
H, I ad K.

e 11 tab. ab
H, I ad K.

f 11 tab. ab
H, I ad K.

g 11 tab. ab
H, I ad K.

h 11 tab. ab
H, I ad K.

i 11 tab. ab
H, I ad K.

j 11 tab. ab
H, I ad K.

k 11 tab. ab
H, I ad K.

l 11 tab. ab
H, I ad K.

m 11 tab. ab
H, I ad K.

n 11 tab. ab
H, I ad K.

o 11 tab. ab
H, I ad K.

p 11 tab. ab
H, I ad K.

q 11 tab. ab
H, I ad K.

r 11 tab. ab
H, I ad K.

s 11 tab. ab
H, I ad K.

t 11 tab. ab
H, I ad K.

u 11 tab. ab
H, I ad K.

v 11 tab. ab
H, I ad K.

w 11 tab. ab
H, I ad K.

x 11 tab. ab
H, I ad K.

y 11 tab. ab
H, I ad K.

z 11 tab. ab
H, I ad K.

aa 11 tab. ab
H, I ad K.

ab 11 tab. ab
H, I ad K.

ac 11 tab. ab
H, I ad K.

ad 11 tab. ab
H, I ad K.

ae 11 tab. ab
H, I ad K.

af 11 tab. ab
H, I ad K.

ag 11 tab. ab
H, I ad K.

ah 11 tab. ab
H, I ad K.

ai 11 tab. ab
H, I ad K.

bus, membranam carnosam hamulo aut unguibus apprehendes, & ab uniuerso thorace & abdomine, ad spinam progrediens, eam auferes, ipsam interim glandulis, quæ in axillis habetur, adhuc connexam sinens. Auulsa itaq; ad axillæ usq; cavitatem membrana, hæc ad lucem extendenda est, ac diligenter aduertendum, num ea sub axillis in carnosum degeneret musculum, à lumbis, & spurijs costis incipientem. Si fortè (quòd non futurum scio) hanc carnosis fibris auctâ inspexeris, ea qua poteris diligentia, illâ ab axillis separa animum adhibens, num humero tendine aliquo inseratur, aut his partibus (ut in reliquo thorace solet) fibrosis tantum nexibus adhæreat. Atque sedulò cauebis, ne eò ruditatis uenias, ut adeps, qui in thoracis lateribus, totoq; dorso occurrit, carnis loco tibi imponat. Vidi enim quosdam, tam rudes, ac in similibus partibus dignoscendis adeò negligenter uersatos, ut primo intuitu, adipem dorsi, carnem esse arbitrarentur, quòd multò magis illum hîc, quàm alibi propter incubitum rubere cernerent. Quando enim cadauer una atq; altera die dorso incubuit, tota incubitus sedes, quasi inflammatione obsessa rubet, atq; ideo & eius sedis adeps. Hac itaque administratione, num membrana hæc musculus efficiatur, & an cutis moueâ, an brachij gratia talis facta sit, promptè examinabis. Mihi autem hæc membrana in hominibus neque musculoſa effici, neq; humero tendine inferi, imò ne ipsum quidem contingere uisa est. Cæterum ubi uniuersam membranam, à corporis trunco, & mediâ brachij regione liberaueris, brachium pectori adducentem^d musculum aggredieris, ante omnia perpendens, num alicubi promineat ille gracilis musculus, quo caudatæ simiæ donantur, quiq; à mamillarum regionibus, sursum oblique fertur. Verum quum iste in hominibus non sit, iam musculi brachium pectori adducentis caput, à clauicula, & tota ossis pectoris regione, ipsiq; insertis cartilaginibus, nouacula aut cultello abrades, ac hamulis aut summis digitis apprehensum, ad humerum usque à subiectis corporibus, aut digitis aut buxæo cultello separabis. Dum uerò musculi huius caput nouacula liberas, accurate studendum est, ne quid aliud unâ cum illo auferas. In canibus enim ac simijs, uerarum costarum cartilaginibus^e musculus obtenditur, quem ferè^f recti abdominis musculi partem esse dicemus, & qui à Galeno respirationis gratia creatus dicitur, ac uice proprii thoracis musculi, à recto distincti habetur, quemadmodum in musculorum thoracem mouentium enarratione dicturi sumus latius. Nunc enim in hoc admoneo, ut etiam si ego in homine minùs hûc reperiam, studiosi tamen illum obseruare conentur, atque commilitones inter disseccandum sese admoneant, eiusmodi musculum ex Galeni sententia hîc latere, ac proinde non oscitanter musculum brachium pectori adducentem oportere suo principio liberari, aut obiter liberatum abijci. Neque huic solum animus accommodandus est, uerum et illi, qui in simijs sub musculo brachium ad pectus mouente occultatus, ad articuli ligamentum exporrigi aliter, atque in hominibus dicebatur. Atque ita non mirandum est, me quum hominis fabricam ostendo, etiam perpetuò aut simiam, aut canem publicæ sectioni adhibere. Cæterum magnum hunc pectori brachium adigentem, in præsentia humero adhuc appensum relinquens, ad reliquos brachij accedes, quos commodè administrare nequis, nisi prius ab lato^g musculo, qui ab occipitijs ossibus procedens, per totam ceruicem extenditur, & toti scapulæ spine, summoq; humero, unâ & huic proxime clauiculæⁱ sedi inseritur, tum hinc per scapulæ gibba, & basim deorsum protensus, donec mucrone suo octauæ thoracis uertebrae spinæ committatur. Est enim musculus iste ab occipitio, ad octauam usque thoracis uertebra, spinarum apicibus quodammodo cõnexus, ab ipsisq; principium sumit. At de hoc musculo unâ & cæteris scapulam mouentibus, postea agemus. nunc autem obiter eius mentio incidit, quòd posteriores brachium mouentes conspici aptè nequeant, nisi ille à spina & occipitio, ad ipsius usq; insertionē, sectione liberatus fuerit. Administratur uerò nouacula aut cultello, secundum spinæ dorsi longitudinem facta sectione, quæ musculum illum duntaxat ad subiecta usque uulneret, deinde altera secundum occipitium est ducenda, quæ ibidem etiam musculi principium, ab occipitijs ossibus liberet. At si fortassis subiectum aliquem musculum illis sectionibus uitiare metuis, buxæum cultellum exterioribus musculi lateribus subdes, illi scilicet lateri, quod ab occipitio ad clauiculam fertur, & deinde illi, quod à summo humero seu clauicula, ad octauæ thoracis uertebrae spinam descendit. Cultello enim lateribus indito, & sursum deorsumq; acto, à subditis musculis illum scapulæ musculum abscedere coges, atq; ipsius neruei principij crassitiem facile tunc cõiecturabis, musculumq; à substratis corporibus iam liberatum, paruo negotio ad ipsius insertionem perduces. Verum rursus sub hoc, ut in peculiari huius musculi enarratione sumus dicturi, obseruandum est, ne unâ cum illo musculus ab occipitio in scapulam procedens auferatur, quem Galenus unâ cum illo, quem nunc dissecasti, scapulam quoque sursum trahere prodidit. Neq; hoc eo dico, quasi homines illum cum simijs communem

Primi brachij
mouentium
musculi admini-
stratio.

Li. 6 de Ad-
ministrandis
confectioni-
bus.

Admi. secundi
scapulam mo-
uentium, ut re-
liquos brachij
scite aggredia-
ris.

d 3 ta. Δ.

e 5 tab. abr
ad s. t.
f 5 ta. Δ.

g 9 ta. r. Δ.
ubi muscu-
lus iste ple-
ne circum-
scribitur.

h 2 fi. cap.
21 lib. 1 G, I,
K.

i 1, 2 fi. cap.
22 lib. 1 ab I
uersus Q.

*Admi. secundi
brachium mo-
uentium.*

*Quarti admi-
nistratio.*

*Tertij admi-
nistratio.*

Septimi.

Quinti.

haberent, uerum ut nō perfunctoriē, an illo quoq; homines donentur, animaduertas, & simia
administrationi simul adhibita, hæc nostra cum Galeno (si modò diligens Naturæ sis admira-
tor) conferas, neque etiam canibus hîc confidas, qui quemadmodum equi, & boues, & cæte-
ra, quæ clauiculis carent, animalia, plurimum in brachium & scapulam mouentibus musculis,
à simijs uariant. Quæ adhuc alium habent musculus, ab externa sede transuersorum procef-
sum quatuor primarum ceruicis uertebrae enatum, & in scapulæ spinam insertum, quo
homines quoque carent, esset tamen & iste quoq; si reperiretur, iam disseccandus. In simijs igitur, tribus illis musculis absectis, in homine uerò, primo duntaxat liberato, ^k musculus cuius
beneficio brachium attollitur, à suo principio separabis, eius caput ab uniuersa scapulæ spina,
summo humero, & clauiculæ media sede, nouacula aut cultello proximè semper ossi adiecto,
absicans, donec illum transuersam in humerum insertionem moliri conspexeris. Brachium ta-
men attollens musculus, postquam eius triangularem figuram, et præcipuè illius capitis, quod
absectum, iam obtusum trianguli uerticem ostendet, perpenderis, non solum in superficie un-
dique est intuendus, sed summa diligentia inquirendum uenit, num tota illa moles articulum
exterius integens, quamq; nos unius musculi loco habemus, plures musculi sint mutuò sibi in-
cumbentes, quemadmodum Galenus in Quinto libro de Administrandis confectionibus
uidetur innuere, immeritò ut aliàs sæpius, ueteribus dissectionis Professoribus (qui in homi-
num cadaueribus sese exercebant) nescio quam, oscitantiam imponens. Examinabis itaque u-
niuersum musculi principium, atq; quomodo crassescat, carnosusq; sensim musculus efficiatur,
considerabis, ac deinde tendine etiam (qui simplex est) examinato, per transuersum in omni-
bus musculi sedibus illum diuides, ut aliquando fatearis illum nihil minus, quam duplicatum
esse, neq; illam referre speciem, quam tres primi ab ilium osse enati, & femoris motibus famu-
lantes musculi pulchrè exprimunt, si simul mutuò incumbentes, uniusq; musculi loco enume-
rati perpendantur. Cæterum duobus primis brachium mouentibus musculis, ab humero
absectis, ^m musculus, qui deorsum brachium mouet, à subditis illi partibus ad insertionem us-
que liberabis, quod factum est facillimum, si secundum spinæ longitudinem, à qua principium
assumit, lineam duxeris, quæ membraneum ipsius principium duntaxat persecet. Quum itaq;
principium liberaueris, hamulo aut digitis id apprehendes, uniuersum musculus buxco cul-
tello, aut etiam nouacula retusiori, à subditis musculis separans. In hac administratione, ⁿ quali-
ter musculus iste basis scapulæ humiliorem angulum transcendat, scapulæq; adhereat, contue-
beris, & deinde si principium ipsius uariè ad originis locum protenderis, manifestè quo mo-
do hic musculus brachium detrahat, & nihil minus quam scapulam moueat, addisces. Porro
quum lineam illam moliris, qua eius musculi principium à spinarum apicibus liberas, cau-
endum sanè est, ne unà quoq; disseces ^o initium abdominis musculi obliquè ascendentis, et deinde
^p illius, qui transuersim à spinis quoque uertebrae enatus, in decimam & undecimam, tho-
racis costas inferi dicetur. Quapropter si tuis manibus parum fidis, idem in hoc musculo ten-
tabis, quod in illo experiendum probauimus, qui ^q secundus scapulam mouentium nobis nu-
meratur, ut scilicet protensam manum, aut buxum cultellum externo musculi lateri subdas,
atq; illum transuersim sursum deorsumq; actum, tantisper moueas, donec ad spinarum usque
apices musculus, à subditis organis diuisum esse coniecieris, hac nanque ratione principij sui
membranei crassitiem promptè cognosces, & quam altè cultellus aut nouacula ad hoc separan-
dum immitti debeat, exquisitè intelliges. Verum omnino opportunè feceris, si stylū aliquem
longiorem, rotundoq; ornatum tuberculo, sub musculi principio rectè protenderis, & sensim
cultello sub musculo ad styli latus demisso, principium diuideris, cultelli semper acie extrorsum
ducta, & leuiter obliquata, sursumq; semper cum stylo protusa ad eum ferè modum, quo char-
tam diuidimus. Nisi etiam eo artificio uti uelis, quo in eruendis è uesica calculis utimur,
quum siphonem instar dimidiæ canalıs effiectum, uesicæ ceruici indimus, ut dein in eius caui-
tatem sectio moliatur eo prorsus modo, quo pilosi serici textores, sericum in pilos diuidunt,
his enim rationibus omnia pulchrè diuiduntur, quæ secundum styli longitudinem disseccanda
subinde in posterum audies. Quando igitur musculus, quo brachium decliue agitur, ad
humerum perduxeris, tendinem ipsius ab humero liberabis, ac demum ^s musculo retror-
sum brachium trahenti te accingens, ipsius initium similiter ab humiliori scapulæ costa ab-
scindes, & accuratè indagabis, num Galenus uerius huic circumuertendi munus attribue-
rit, quam ^t musculo gibbam scapulæ sedem occupanti, quem que ego in circumuertentium
albo recensui. Poteris itaque hunc tam diu humero appensum relinquere, donec illum, qui
scapulæ gibbum opplet, à scapula ad articuli usque ligamentum abraferis, ut eo uerius sin-
gula expendere ualeas. ^u Musculus, qui scapulæ cauitati incumbit, quæ inter spinam &
superio-

*k 4. tab. 2.
10. tab. 4.*

*l 9. tab. 10.
14. 2. 11. tab.
2.*

m 10. tab. 6.

n 10. tab. 7.

o 11. tab. 4, 5.

p 11. tab. 4.

q 9. tab. 5, 4.

r 10. tab. 6.

s 11. tab. 7.

t 13. tab. 3.

u 12. tab. 4, 5.

H.

superiorem ipsius costam uisitur, à scapula derades duabus lineis, una per spinæ scapulæ superius latus, altera secundum elatiorem eiusdem costam, ductis, & deinde, quæ humeri articuli ligamento musculus committatur, examinato. Brachium circumagentium^x musculus, qui internam scapulæ sedem sibi uendicat, nisi prius scapulam sectionis serie à clauiculis solueris, non commodè se spectandum offert, et integris adhuc scapulam mouentibus musculis, importunè scapulā à clauicula separaueris, aut etiam unā cum clauicula à thorace eam abstuleris. Quodcumque igitur scapulam à clauicula, sectionis serie liberatam uideris, aut scapula in totum à thorace ablata fuerit, eius musculi, quem ordine brachij motorum sextum retuli, administratio facillima erit, quando quidem ocyus tum uniuersus ex scapulæ eraditur cauitate, quod ubi præstiteris, huius simul & aliorum officium absque negotio examinabis. Quanquam interdum etiam^y quinti nobis enumerati musculi sectionem, donec scapulam à clauicula solueris, referuandam censeo, quum is in scapulæ cauo thoraci proximo prorsus recondatur.

DE LIGAMENTIS HUMERI AD scapulam articuli. Caput XXV.



PRIMO Libro^a rotundum magnumq; humeri caput, & non admodum latum, neq; insigniter profundum scapulæ^b acetabulum (propter uarios, quos brachio obimus, motus) meritò extructa esse retuli. Ne autem laxus adeo articulus male custodiretur, & quouis ferè motu sua sede humerus excideret, processus quosdam scapulæ, & uaria deinde ligamenta inuicem ossa colligantia, Naturam produxisse subiunxi. Cæterum quum iam articulum munientes processus, ac plerosq; hunc stringentes^d musculos absolui, tempus lanè exigit, ut articuli etiam ligamenta nunc percurram. Superiori itaque Libro scripsimus, quæ superior humeri pars, quodammodo in duo inæqualia capita distinguere-
tur, in interius scilicet, quod amplum, & semiglobi instar rotundum est, & propter illi obnatam cartilaginem læue, articulationi q; idoneum, exterius autem asperum inæqualeq; uisitur, leui quodam patuloq; sinu, ab interno orbiculatim distinctum. Et rursus propter alium^e sinum, in anteriori parte exterioris capitis exculptum, ac^f exterius caput musculi cubiti flex-
tentium anterioris transmittentem, exterius hoc humeri caput ueluti geminum conspicitur, utrinque ad sinus illius latera magis, quàm in reliqua parte extuberans. Atque hæc omnia, præsentis articuli ligamentorum occasione potissimum sunt fabricata, interius quidem caput, articulationis gratia, exterius uerò, ut ligamentorum insertionem susciperet, aut ex se eadem por-
rigeret. Sunt autem tria robusta, quæ humerum in scapulæ acetabulum connectunt ligamen-
ta, præter commune, omnes articulos instar membranæ, nunc tenuioris nunc crassioris am-
biens uinculum. Quod itaque amplum & membranofum est, omnibusque articulis com-
mune, orbiculatim ex supercilij ceruicis scapulæ principium assumit, ac totum articulum am-
biens, in radicem interni capitis humeri primum inseritur, & deinde totius exterioris capitis
amplitudini, ac utriusque ceruici implantatur. Aliorum uerò trium^h duo quidem ad amissim
instar neruorum teretia uisuntur, tertium uerò non nihil amplum. Enascitur autem^k primum
exⁱ apice interioris processus scapulæ, & hinc procedens, internis anterioribusq;^m partibus ex-
terioris humeri capitis circuntenditur, ualidissimè huius capitis sedis impressioni adnatum.

ⁿ Alterum uerò, quod crassius maiusq; isto est, ex ceruicis scapulæ superiori^o parte, ubi summo humero submittitur, ortum ducit, & interius humeri caput superans, inseritur toti illi exte-
rioris capitis^p regioni, quæ ad externum latus eius sinus extuberat, qui exterius^q caput musculi cubiti flex-
tentium anterioris uiam præbet. Huius ligamenti anterioris latus, posteriori primi ligamenti connascitur lateri, ac simul ambo uelut transversum ligamentum efformant, caput
eius musculi in suum sinum seruans. Reliquum uerò tertium, ex eadem cum secundo re-
gione principium nanciscitur, ac oblique hinc porrectum, inseritur in totam posteriorem
exterioris capitis humeri^r sedem adeo, ut præsens ligamentum posteriorem articuli ambiat
regionem, ut enim amplum obtinet principium, ita quoque ampliorem molitur in humerum
insertionem. Cæterum præter hæc tria, quæ præcipue humerum, ne deorsum extrorsum-
que ab acetabulo scapulæ labatur, continent, aliud est adhuc^s ligamentum, humerum sursum
& in anteriora, ad mediam nimirum inter summum humerum & interiorem scapulæ processum
sedem luxari prohibens, hoc enim similiter ualidum, ab interiori quoque processu scapulæ, sur-
sum oblique ad summum humerum porrigitur, articulum humeri cum scapula nusquam

Ligamēta hu-
merum scapu-
læ connecten-
tia.

Cæteris arti-
culis commu-
ne
Tria pro-
pria.
Primum.

Secundum.

Tertium.

Ligamen ab
interiori sca-
pula processu
in superiorem
pertinens.

Ligamento-
rum adminis-
tratio.

contingens. Atque huic eidem muneri subseruit, nerueum illud caput anterioris cubitum flectentium musculi, quod ab eminentissima scapulæ acetabuli sede enatum, inter articuli ligamenta humeri caput transcendere, atque suo sinui incumbens deorsum ferri audies. Horum ligamentorum administratio, non nisi scapulam quoque mouentibus musculis, et cubitum flectentibus dissectis, aggredienda est, quæ tunc cultellis paruulis, sed acutioribus celebrabitur, atque omnium primùm id secandum ueniet, quod ex interiori scapulæ processu exoritur. deinde alia duo peculiaria, ab ipsorum radice à scapula liberans, usque ad humerum singula deduces. Neque hîc interim oscitanter animus adhibendus erit, ne quum secundum ligamentum aggredieris, unà quoque caput exterius cubitum flectentium musculorum anterioris præscindatur, nisi fortassis antea ademptum unà cum toto musculo esset. Porrò ligamentum ab interiori processu scapulæ, in summum humerum pertinens, * musculo brachii um attollente ablato, euadit citra sectionem conspicuum. Illud uerò, quod scapulæ acetabuli cauitatem aliquando auget, diuiso prorsus articulo, in conspectum uenit.

DE MUSCULIS SCAPULAM MO-
uentibus. Caput XXVI.

Primus sca-
pulam mouen-
tium.



CAPVLA hîsdem cum brachio agitur motibus, si illum duntaxat exceperis, quo brachium circumuerti diximus. Scapulam itaque pectori ad-
mouet triangularis^a musculus, illi substratus^b musculo, cuius beneficio
brachium pectori adducimus. Est nanque hic primus scapulæ muscu-
lus, quem in uigesimo tertio Capite ex secunda, tertia, quarta, quinta, &
interdum sexta, superioribus thoracis costis, paulò antequam in cartila-
gines illæ cessent, c^c principium assumere docui. Adeò ut hîc neque ipsius
substantia, quæ tota, nisi iuxta tendinem, carnea est, neque^d insertio, quam in interius latus an-
choram imitantis processus molitur, neq; fibrarum ductus, qui ex amplo principio in obtu-
sum uerticem, nusquam intersectæ feruntur, diffusius recensenda ueniant, quum abundè sit,
ipsius functionem hîc addidisse. Si itaque huius musculi altiores fibræ contrahantur, elatiùs
scapulam pectori admouent, inferioribus uerò in se contractis, uersus pectus demissiùs scapu-
la adigitur. At totius musculi fibris unà laborantibus, scapula in neutrà partem declinans, pe-
ctori adducitur. Quanquā interim scapula pectoris ossis summo, aut mucronatæ cartilagini
nō equè, atque brachiū adducitur, quod in signibus in motu differentijs, nunc pectoris elatio
riori sedi, nunc demissiōri admouetur, e^e quemadmodum ipsius quoque musculus, elatiùs &
demissiùs ipso scapulæ musculo initium ducit. Cæterum etsi Galenus scapulæ nullum tribuit
musculum, qui proprio motu ad pectus, antrorsum uè scapulam ageret, & nos tamen hunc,
quem iam narrauimus, illi priuatim ascribimus, non præterea, quæso, quin sedulò mentem
quoque accommodes^f musculo, quem cæterorum Anatomicorum more, à scapulæ basi ena-
tum, octo superioribus costis inseri dicemus, quum thoracem mouentium musculorum ser-
mo instituetur. Si enim huius naturam diligenter spectaueris, & potissimùm in quadru-
pedibus, fortassis illum quoque scapulæ motorem recensebis, quemadmodum audies,
quum sexto post hoc Capite, illum thoracem mouentium secundum enumerabo. Porrò
furfum ad caput ualidi musculi scapulam attollunt, si quidem & ipsa grandi mole con-
stet, plurimamque ipsi carnem adnatam sustineat. ^g Primus est, quem ante musculos bra-
chium mouentes disseccandum esse, tunc dicebam, quum illorum musculorum admini-
strationem secundo ante hoc Capite exequerer. Musculus iste raram, præter cæteros cor-
poris musculos, figuram sortitur, ut etiam fibras & mouendi rationem, ab alijs musculis
quodammodo differentes adeptus est. oritur enim ab occipitijs ossis transversa^h linea, quæ ab
eius ossis medio, uersus auris radicem porrigitur. Huius lineæ externum latus, ab auris pin-
nula tantum remouetur, quāta ipsius ab occipitio exortus est longitudo. Si enim occipitijs se-
dem, quæ ab ipsius medio ad aurem ducitur, in duas equales regiones diuideris, earum unam,
quæ occipitijs medio uicinior est, presentis musculi principium occupare intueberis. In occipi-
tijs medio dexter musculus sinistrum contingit, acambo inuicem iuncti, unaq; ueluti ex spina-
rum uertebra apicibusⁱ principium ducentes, per ceruicis thoracis que spinam, us-
que ad octauam thoracis uertebra protenduntur. Dexter (idem de sinistro intelliges) qua
ex spinarum apicibus enascitur, membranofus tanta ferè amplitudine apparet, quanta uer-
tebrarum in suo latere est^k latitudo, reliqua uerò regione carneus (si unicum duntaxat^l lo-
cum exceperis) conspicitur. Quis autem membraneus ille locus sit, sermonis progressus
enarrabit.

Secundus sca-
pulam mouen-
tium.

a 5 ta. r.
b 3, 4 ta. d.

c 5 tab. ab i
ad k.
d 5 tabule l
in b.

e confer K.
R 3 ta. cum
i, k tabule 3.

f 7 ta. L, L.


g 9 ta. r, d.
i ta. G. 2 K.
L. 3 b.

h 9 ta. ab E
ad F.

i 9 ta. ab E
per K ad G.
k 6 fi. ca. 15
l b. 1 ab f ad
u. 9 fi. à
t ad x.
l 9 ta. x.

enarrabit. Sunt itaque hæ duæ præsentis musculi lineæ. Vna transuersim secundum occipitium porrecta, quæ etsi tenuis sit, carnea tamen uisitur. altera recta per spinam deorsum ab occipiti medio, ad octauam usque thoracis uertebam descendit. Præter has autem, aliæ duæ obliquæ sunt, una ex termino transuersæ lineæ, quo aurem spectat, oblique deorsum uersus anteriora, seu in dextro musculo dextrorsum protenditur, quo usque latiore clauiculæ partem contingat, summo humero coarticulatam. Alia lineæ quæ similiter obliqua est, à lineæ postremo commemoratæ fine, quo ipsa clauiculam tangit, deorsum uersus posteriora oblique tantisper descendit, dum unâ cum termino rectæ lineæ, secundum spinam exporrecte, acutum angulum constituat, è regione octauæ thoracis uertebæ consistentem.

Q V A M V I S musculi huius, de quo in præsentia agimus, effigies ex secunda musculorum tabula, ad literas K & L, tum longe adhuc manifestius ex nona tabula ad r & Δ, alijs que his circumductis chara, ceteribus peti possit, nihilominus rudibus lineis in superiori figura hic illius circumscriptionem expressi. Inferiori uero effigie trapezion, quam obscure Galenus in Quarto de Administrandis sectionibus libro proponit, delineauit. Pertinet itaque ab A ad B transuersa lineæ, secundum occipitium protensa. Ab A uero ad C lineæ recta ab occipitio, ad octauam usque thoracis uertebæ spinam ducta. A B uero ad D, lineæ oblique ab occipitio ad clauiculam pertinens. A D ad C lineæ quoque oblique à clauicula, ad spinam octauæ thoracis uertebæ procedens. Postremo à D ad E, insertio musculi in spinam scapulæ, & summi humeri, & latiorē clauiculæ partē facta notatur. In humiliori porro figura F, notat trianguli rectangulum & basim etiam, G uero lineam toto ductu æquē distantem à basi. Vniuersum autem spacium, quod ab F ad G habetur, τραπεζίον, seu mensalem figuram notat, à qua secluditur acutissimus præsentis trianguli angulus.



Quatuor his lineis musculus circumscribitur, uerum præter has, musculus aliam transuersam, in ipsius medio quodammodo nanciscitur, eam nimirum, quæ toti scapulæ spinæ, & summo humero, & clauiculæ latiori parti inserta tatur. Hac parte qua suam molitur insertionem (quæ uelut ipsius tendo est) neruosus simul et carnosus uisitur, ea uero sede, qua scapulæ ceruicem spectat, & quarta ipsius lineæ à clauicula, deorsum ad octauam thoracis uertebam prorepat, semicirculum quodammodo membranæum commonstrat, quasi hinc (ne forte scapulæ gibbum occupantes musculos arctius premat) crassior carnosusque esse nequiret. Reliqua autem sede, uti iam admonuimus (nisi quæ dorsi spinæ committitur) omnino carnosus existit, sed tamen undique tenuis est, ea sui sede excepta, qua toti superiori summi humeri sedi, & latiori clauiculæ parti ualidissime implantatur. Porro fibras, non uno omnes modo porrectas habet, nam quæ ab occipitio, ceruicisque uertebarum spinis deorsum protenduntur, oblique ut & exterior eius musculi partis lineæ, ad anteriora deorsum tantisper prorepunt, donec scapulæ spinæ, & summo humero, & latiori clauiculæ sedi inserantur. Præsentibus fibræ eo semper obliquiores magisque transuersæ redduntur, quo à ceruicis uertebarum spinis, thoraci propinquieribus principium ducunt adeo, ut illæ, quas ceruicis radix exporrigit, iam paulò minus toto transuersæ sint. Quæ uero à thoracis uertebarum spinis uerè enascuntur, sursum uersus anteriora tensæ, tanto quoque rectiores, minusque transuersæ uisuntur, quo octauæ thoracis uertebæ sunt uiciniores. Eiusmodi fibrarum series commonstrat, huius musculi beneficio non modò uniuersam scapulam sursum attrahi, sed etiam deorsum uelli, rectaque ad dorsum agi. Si nanque superior musculi pars, inter secundum uersus suam originem trahatur, totam scapulam sursum attolli conspicias. At si humilior musculi pars, quæ inter scapulæ spinam, & octauam thoracis uertebam consistit, ad suum exortum tensa fuerit, scapula deorsum uellitur. Deinde uniuerso musculo inter disseccandum attracto, & præcipue quæ ex inferioribus ceruicis, & superioribus thoracis uertebarum spinis enascitur, scapulæ molem recta retrorsum duci cernimus. Atque hinc fit, ut præsens musculus motibus omnino pugnantibus præficiatur, ac, uti prius relatam est, fibras contraria serie ductas quoque exigat, quanuis interim nulla prorsus sui sede hunc disiunctum inconiunctum uel esse, quis uerè dixerit. Proinde unitatis ratione, præsens musculus unius loco mihi habebitur, quo minus autem functionis gratia is duorum, aut plurium uice à quopiam recenseri queat, per me non obstiterit. At Galenum miror, qui hunc musculus disiungens, ad medium fere Libri quarti de Administrandis sectionibus, superioris musculi partis prolixius, quam de aliquo totius corporis, contra Lycum nimis profecto inuidiosè disceptans meminit. Ad calcem uero eius Libri, inferiorem musculi partem uix obiter nominauit, tunc scilicet, quum scapulam duobus proprijs musculis, ad dorsum agi insinuaret, quorum inferior est huius nostri musculi humilior pars, à thoracis uertebarum spinis præcipue originem assumens, quam etiam alibi Demissiore scapulæ musculum appellauit. Vt cunque sit, parua hinc nobis cum Galeno futura est dissensio, si ambos à se enarratos musculos, unum continuum corpus esse annuerit. Nam etsi fortassis musculi huius insertio, quæ instar latæ ac oblique admodum procedentis lineæ perficitur (quantumuis etiam & in insertionem muscu-

musculus continuus sit) illum in duos distinguere appareret, nulla tamen prorsus discriminis nota (nisi fortè diuersus fibrarū ductus)^d inter spinam dorsi, & scapulæ basim habebitur. Vbi tamen distinctionem lineamq; confingere debes, si modò superiorem Galeni musculum trapeziæ figuræ quocuis pacto assimilaturus sis. Ea siquidem^e linea, quæ à ceruicis radice, secundum scapulæ spinam, & summum humerum, & latiore clauiculæ sedem duceretur, comparanda uenit basi trianguli rectanguli, in cuius summo linea æque distans à basi ducta sit. Quæ admodum ea musculi^f linea, quæ secundum spinæ ceruicis longitudinem fertur, illi trianguli lineæ assimilatur, quæ perpendiculariter trianguli illius basi incidit.^g Quæ autem ad occipitiū transuersim ducitur, illi lineæ correspondet, quæ in trianguli uertice æque cum basi distat. At

*Musculus
scapulæ attol-
lens, quo simia
abundat.*

quæ ab occipitiō ad clauiculam procedit, obliquo trianguli lateri confertur. Cæterum nūc magis à Galeni dogmatibus mihi reclinandum est, idq; præcipuè propter simiarum ad homines differentiam. Primum enim, si Galeno credideris, te ipsum inscitia oscitantiaq; inter secandum insimulabis, quum deinceps alios musculos scapulam attollentes in homine sedulò indagare conaberis. Ex Galeni enim placito, sub eminentiori nobis dicti iam musculi parte alium inquires, qui illo longè gracilior minorq; sed tamen carnosus totus esse deberet, & qui ex occipitijs osse sub nuper dicto principio enatus, deorsum modicè uersus anteriora, oblique descenderet, & altiori basis scapulæ angulo exporrectus, in latum tendinem defineret, ad medium usque basis scapulæ interiùs insertum, è regione radice spinæ scapulæ. Huic id munus concreditum esset, ut scapulæ basim sursum, seu ad occiput attraheret, uerum hunc frustra mecum in homine (quod ipse illo destituatur) indagabis, quū interim promptissimè is in caudatis simijs occurrat, eam prorsus naturam, quam Galenus ipsi tribuit, quamq; ego iam descripsi, seruans. Quod non eo in medium adfero, quasi illum musculum in hominibus inuestigari nollem, sed ne librorum lectioni plus satis fidei tribuēs, me illum præterisse arbitreris, aut si sectionē aggrediaris, intelligas, quo nam pacto hominis musculos sis reperturus, quanq; præter meritum Galenus ueteres dissectionum Professores subinde suis delusus simijs insimulet.

*Tertius mu-
sculus simiæ
scapulam at-
tollentium.*

Denuo in caudatis simijs alium obseruamus musculū, à Galeno quoq; enumeratum, qui carnosus principio, ex primæ ceruicis uertebrae transuerso processu, dein & ex tertiæ & quartæ uertebrae transuersis processibus enascitur, non quidem ex interna ipsorum sede, sed ab externa magis. Hic musculus, postquam primum ex reliquis musculis, qui ceruicis uertebriis adnascuntur, emerit, teres, sed tamen latior, quàm profundior apparens, deorsum in posteriora, uersus scapulæ basis superiorem angulum perfertur, ipsius internæ sedi carnosus latiorq; redditus insertatur. Rursus simiæ alio quoq; musculo donantur, quem inter Galeni musculos scapulas attollentes, si Quartū de Administrandis sectionibus ad amussim discusseris, quarto loco enumerari reperiēs. Atq; hic mihi ab interna transuersi primæ ceruicis uertebrae processus sede, deinceps & tertiæ quoq; & quartæ ceruicis uertebrearum transuersis processibus, carneo principio nasci uisus est, quod prædicto musculo latius redditum, deorsum quoque, sed minus in posteriora tantisper ducitur, dum carnea lataq; insertione, in scapulæ spinā inseratur, in ea spinæ sede, qua hæc summum humerum producit, quæ quodammodo è regione ceruicis scapulæ consistit. Cæterum ut homines prorsus secundo Galeni musculo, qui ab occipite in simijs exoriri dictus est, destituuntur, ita etiam & quarto. Verumⁱ tertium musculum homo com-

*Quartus, quæ
simiæ sibi pri-
uatim secus
quàm homines
uendicant.*

*Tertius homi-
nis scapulam
mouentium.*

munem nanciscitur, sed non nihil quàm simiæ ualidiorem. Exoritur enim homini musculus ualidus à^k transuerso primæ ceruicis uertebrae processu, deinde &^l transuerso processu tertiæ uertebrae, quartæ & quintæ, quasi disiunctis constaret principijs, uno nimirum, quod primæ ceruicis uertebrae debetur, altero autem, quod tribus secundæ uertebrae proximè subiectis ascribitur. Quanquam etiam interdum à^m transuerso secundæ quoque uertebrae processu musculus hîc, sed parua origine nasci uisus sit. Porro principia hæc, simulatque ex reliquis ceruicis uertebriis amplexantibus musculis emergunt, unà coeunt, & ualidum efformant musculum nonnihil latiore, quàm profundiore, qui lata, sed carnea insertione, inⁿ internam superioris anguli scapulæ basis sedem inseritur, scapulamq; sursum uersus anteriora, ceruicisq; latera trahit. Non inopportunè itaq; hic musculus nobis scapulæ attollentiū aliter dicetur, aut saltem omnium scapulæ motorum tertius in hac nostra serie locabitur. Galenus suis omnibus scapulam attollentibus musculis, addidit oblongum gracilemque^o musculum, quem ex ossis hyoidis lateribus procedentem scapulæ, propter ipsius ceruicem, interiori ex parte inseri scriptum reliquit, & eius musculi beneficio in anteriora colli, scapulam attolli opinatus est. Ego autem in Capite de hyoidis ossis musculis, eius ossis gratia, non autem scapulæ, hūc musculum efformatū asserui, ac proinde cuiusnā motus autor is censerī debeat, diligenti sectione uenit indagandū. In hoc enim simijs nulla cū hominibus est differentia, nisi quod

*Musculus
inter scapu-
lam attollen-
tes à Galeno
perperam de-
scriptus.*

simijs

d 9 ta. ab I
ad K.

e 9 tab. à K
per I ad H.

f 9 ta. ab E
ad K.

g 9 ta. ab E
ad F.

h 9 ta. ab F
ad H.

i 7 ta. H. 6

ta. K. 8 l. 10,

11 C. 12 G.

13 Q.

k 10 fi. ca.

5 lib. 1 S.

leiusdem fi.

z.

m 5, 6, 7 fi.

ca. 15 li. 1 u.

n 1 fi. ca. 21

lib. 1 φ.

o 5 ta. R, S.

similis toto progressu carneus uideatur, hominibus autem in medio ductu gracilescit, tendi-
 nis speciem comonstrans, & duobus quasi musculorum uentribus donatus. Quod sanè Ga-
 lenus, si hominem unquam secuisset, non minus animaduertisset, quàm^p musculos inferio-
 rem maxillam deorsum ducentes duobus donari uentribus.^q Vnus adhuc musculorum sca-
 pulam mouentium reliquus est, qui hanc retrorsum ad dorsi spinam, uersus superiora nonni-
 hil agit. Hic autem amplius & tenuis, sed omni ex parte carneus uisitur, qui à quintæ, sextæ, &
 septimæ ceruicis uertebRARUM, deinde trium primarum thoracis uertebRARUM spinis^r princi-
 pium ducens, toti propemodum scapulæ basi carneus, ac æquè ut in exortu latus^s inferitur,
 fibras obtinens non prorsus transuersas, at nonnihil obliquè à dorso, deorsum ad scapulæ ba-
 sim ductas. Quibus uerò musculis hic quadrilateris musculus, & alij omnes tegantur, quibus
 ue illi obducantur, sectionis semper series, et musculorum tabulæ leui negotio commonstrât.
 Quod profectò non oscitanter in illo^t musculo obseruandum præcepimus, qui brachij ad
 dorsum uersus inferiora motus autor est, quem Galenus in Libro decimotertio de Vsu par-
 tium scapulam quoque deorsum ducere parùm rectè prodidit, ego autem huius quoque mo-
 dò memini, ne quis in musculorum scapulam mouentium numero, Galeni nomine alium,
 quàm hæcenus narraui, requirat.

Quartus ho-
 minis scapulæ
 mouentium.

Musculum
 quo brachium
 detrahatur,
 scapulam non
 mouere.

MUSCULORVM SCAPVLAM MOVEN-

tium administratio. Caput XXVII.



PRÆSENTIVM musculorū administrationē pari, qua reliquos omnes,
 methodo aggredieris. Primū enim, quo scapula pectori adducitur, princi-
 piū, nouacula à costis, unde prodit, liberandū est, & deinde toto muscu-
 lo à thorace ad internum usq; scapulæ processum separato, ipsiusq; attra-
 ctis principijs, cuius potissimū motus opifex habendus sit, inquires,
 num scilicet brachium potius, ut Galenus docebat, quàm scapulam uti
 ego dicebam, moueat.^b Secundum musculus, quem & scapulam attolle-
 re & deorsum trahere dixi, in musculorum brachium mouentium administratione iam antea
 es aggressus, unde etiam hīc ipsius sectionem prolixius repetere penitus abs re foret. Verū
 tertium, qui à ceruicis uertebRIS ad scapulæ basis superiorem angulum ducitur, suo principio
 prorsus liberandus non est, nisi aliquot ceruicis musculis antea præsectis. Ac proinde operæ-
 pretium erit illum trāsuersim, ubi primū ex ceruicis musculis emergit, abscindere, atq; ipsius
 principio ad uertebRAS relicto, illum à scapula liberare, ipsius tamen functione prius perpen-
 sa.^c Quartum musculus leui longaq; sectione à spinarum apicibus secabis, atque ubi ipsius in-
 sertionem adamussim obseruaueris, eundem à scapula amouebis sedulo cauens, ne tertium ho-
 minis thoracem mouentium musculus simul reseces, aut saltem imprudenter suo principio
 liberes. Deinde si adhuc^e longus ille musculus, quem contra Galeni sententiam, hyoidi ossi
 proprium esse retuli, asseruatus sit, non oscitāter spectā, num scapulæ, an illius ossis gratia crea-
 tus sit. Nunc cultello, quàm licebit proximè, ligamenta à summo humero et clauiculis, quā in-
 uicem committuntur, resecabis, summum humerum à clauiculis liberans, & peculiarem hu-
 ius articuli cartilaginem obseruans, quæ illi similis est,^g quæ in maxillæ inferioris ad superio-
 rem articulo, &^h clauiculæ rursus cum pectoris osse nexu adinuenitur. Deinde accuratè per-
 pendes, num tertium aliquod os hīc, præter clauiculam, & summum humerum, cum ipsius ap-
 pendice, dictaq; nunc cartilagine existat, cuius Hippocratem in Libro de Articulis, de brachij
 luxationibus differentem meminisse Galenus docet. Sed quid de illo osse sentiā, Primolibro
 sum executus. ubi itaque clauiculam à scapula diremeris, hæc in sua sede diligenter seruan-
 da uenit. Verū uasis ex thorace in brachium proreptantibus funiculis binis interceptis, &
 deinde in funiculorum medio resectis, scapulam à thorace euertes, ut iam circumuertentis bra-
 chiumⁱ musculi naturam inspicias, qui cauam scapulæ sedem occupat. Hoc itaque ab osse un-
 dique erafo, atque ad articuli ligamentum deducto, & eius functione perpen-
 sa, illum quoque
 abijcies, ut nunc scapula nulli alteri firmata parti, à thorace maximi^k musculi interuētū hære-
 re uideatur, qui thoracem mouentium secundus, & à scapulæ basi enatus, octo superioribus tho-
 racis costis manus ritu inseritur, cuiusq; naturam cum reliquis respirationi seruientibus muscu-
 lis, tertio ab hoc Capite exequar. In præsentia enim ad capitis musculos est accedendum.

Primi admi-
 nistratio.

Secundi.

Tertij.

Quartij.

Clauicula à
 scapula libera-
 tio.

Capitis motus



VPERIORI Libro, primæ secundæq; ceruicis uertebrae constructio-
 nem diffusè admodū persequentes, caput proprijs motibus, & secunda-
 rijs moueri retulimus. Vt enim eleuato brachio cubitus unā attollitur,
 ac eques cum equo promouetur, ita quoq; motam ceruicem caput neces-
 sariò subsequitur. Ac proinde, quot proprijs motibus ceruix agitur, toti-
 dem etiam secundarijs caput mouetur, ac ceruix quidem extenditur, seu
 in posteriora uersus dorsum ducitur, & in anteriora flectitur, deinde u-

trinque ad latera, ad humeros scilicet etiam inclinatur, utcunq; aut flexa aut extensa, erecta ue-
 sit. Caput autem uno proprio motu, uel quiescente etiam ceruice flectitur, & extenditur, seu in
 posteriora anterioraq; fertur, ad latera autē nō, nisi ceruicis beneficio agi potest. quandoquidē
 immota rigidaq; ceruice, nemini ad humeros caput inclinare conceditur. Vtūque id parum
 rectè in Quarto de Administrandis sectionibus. Libro Galeno uisum fuerit. Ceterum præter
 flexionē et extensionē, quas caput mea quidem sententia, repugnanteq; Galeni placito, super
 primam ceruicis obit uertebra, alium etiam capiti motum superiori Libro largitum esse pro-

Qui musculi
 hoc Capite e-
 narrandi.

Potissimum
 4. de Admini-
 strandis sectio-
 nibus.

didimus, qui alter proprius capitis motus est, cuius ope instar rotæ quodammodo, ad axem
 circunducitur, siue flexum siue extensum cum ceruice, aut citra ceruicem fuerit, atq; hunc ad
 secundam uertebra confici, contra Galeni dogmata dictum est. Quamobrem etiā nunc ope
 ræpretium fuerit musculos omnes recensere, qui priuatis capitis motibus famulantur, & dein
 de eos, qui ceruicis ductibus præsent. Quanquam rursus de ceruicis musculis, in dorsum mo-
 uentium musculorum enarratione pertractandum erit, quos quā examissim Galenus de-

scripserit, ex ipsius Libris discas, uelim. Ego enim suis uestigijs, si modò clare uereq; eos descri-
 bere debeā, nequaquam perpetuò hæsurus sum, quāuis interim pro uiribus, ut & hinc is Ana-
 tomicorum coryphæus intelligatur, ad ipsius seriem me accingam. Primum itaq; sex musculo-
 rum coniugationes, seu paria mihi ueniunt explicanda, quæ in posteriori ceruicis sede locata,
 partim capitis, partim autem primæ ceruicis uertebrae motibus famulantur. Verū anteaquā
 ad horum enarrationem Galenus accessit, duo alia musculorum paria ex dissectionis serie præ-

Primum par
 musculorū aut
 caput, aut pri-
 mam uertebra
 mouentium.

posuit, scapulæ motibus seruiencia, quorum^a unum homines cum simijs commune nanciscū-
 tur id scilicet, cuius alterius lateris musculus in scapulæ spinam, summum humerum, & latius-
 sculam clauiculæ partem inferi dictus est. Altero autem pari homines destituuntur, cuius in
 altero latere musculus ab occipitio enatus, ad altiore basis scapulæ angulum in simijs pro-
 tendi cōmemoratus est. Atq; hinc fit, ut id, quod nunc primum appellaturus sum, Galeno ter-

tia serie enumeretur.^b Primum itaq; capitis musculorū par duobus, utrinq; scilicet singulis cō-
 stat musculis,^c originem ducentibus ex apice quintæ thoracis uertebrae spinæ, dein etiam ex
 quartæ, tertiæ, & primæ uertebrae thoracis spinarū apicibus. Principium hoc, quā primum
 ex quinta thoracis prodit uertebra, acutum refert angulum, qui sursum tensus, sensim ita late-

scit, ut musculus ad tertiam secundāq; thoracis uertebra iam porrectus, adeò amplificetur,
 ut externum ipsius latus è regione transuersorum processuum earundem uertebrae consi-
 stat. Musculi hanc seruantes latitudinē, sursum feruntur à quinque inferiorum ceruicis uertebra-
 rum spinis (sed nimis quā leuiter) exortum assumentes.^d quando autē ad tertiæ ceruicis uer-
 tebrae spinam conscenderūt, quū hætenus toto progressu dexter sinistro coniunctus fuerit, u-
 triq; ab inuicē sensim magis magisq; tantisper abscedunt, quousq; transuersa^e linea occipitijs,
 ossi carnea lataq; insertione implantentur. Eius enim insertionis tanta est amplitudo, quan-
 tum internum alterius musculi latus, à media occipitijs sede, & externum latus ab auris radice
 remouentur adeò, ut insertionis amplitudo utriusq; musculi tanta sit, quātum ab una aure ad
 alteram occipitijs est interualli, quod musculorū insertionem nō occupatur. Cæterum illius mu-
 sculorum ab inuicem recessus forma,^f triangularis exactè uisitur, si modò unam lineam trans-

uersim ad occipitium, ab interno unius musculi latere, ad internū latus alterius duxeris, & de-
 inde alias duas ab eius lineæ terminis, secundū utriusq; musculi internum latus, ad tertiæ cer-
 uicis uertebrae spinam, ueluti ad trianguli uerticem porrexeris. Rursus singuli musculi^g trian-
 gulari forma constant, si lineam secundū spinæ longitudinem ad occipitium usq; ductam,
 unius lateris loco habueris, & secundilateris uice, lineam secundū externum musculi latus
 exporrectam, & tertij lateris loco lineam, quæ transuersim musculi insertionem ad occipitiū
 describit. Fibrae horum musculorum, à spinis uertebrae sursum oblique, quasi ad transuer-
 sos superiorum uertebrae processus, tantisper ducuntur, dum simul omnes in occipitium
 finiant.

494.r.

b 12 tab. r.
 10, 11 ta. A.
 c 12 ta. A.

d 12 ta. D.

e 12 tab. B.
 C.

f 12 tab. B.
 E, D.

g 12 tab. P.
 A, C, A, C,
 B.

b 13 tab. A.
B usque ad
G. 5 tab. T.
10, 11 B. 12
F. F.

Secundū par
impenſe uari-
um.

finiant. Præsentes enim musculi, modicam prorsus & exiguam in transuersos uertebra-
rum processus insertionem moluntur.^h Secundum musculorum par admodum sanè uarium, &
secus multò in hominè, quàm canibus & simijs obseruamus. His nanque ex transuersis tertiae
quartae ue thoracis uertebrae processibus, & insuper secundae ac primae quoque thoracis, &
quinque humiliorum ceruicis uertebra-
rum transuersis processibus, musculi istius paris ena-
scuntur, & ad earundem uertebra-
rum spinas procedentes, ipsis nonnullis insertionibus applan-
tantur. Deinde dexter sinistro committitur, & nusquam toto progressu ab illo recedit, simulq;
ambo in occipitij medium ampla insertionem innascuntur, quæ sua latitudine longè superant
uniuersum spacium, quod inter externum musculorum latus, aurisq; radicem metiri possis.
Præterea præsentes musculi prorsus carnei apparent, nullibi nerueum aliquid (quod notatu di-
gnum sit) ostendentes. Attamen obliquas quasdam impressiones exprimunt, ex transuersis
inferiorum uertebra-
rum processibus, ad superiorum quodammodo spinas excurrentes, at illæ
leuiorès censendæ sunt, neque adeò penetrant, ut his aliqua ex parte musculum diuidi quis dice-
re queat. Quanquam indubiè Galenus nonnullos dissectionū Professores, non duos huius pa-
ris musculos tantum enumerasse, uerum quosdā quatuor, quosdā uerò sex ibidem recensuisse
uideatur testari. at hi fortassis ex illorū fuere albo, qui aliter ac Galenus homines aggrediebant.
In simijs enim & canibus (de quibus hætenus in hoc secundo pari locutus sum) unum dunta-
xat utrinque musculum recenserem, quandoquidem si illis attendendum foret impressioni-
bus, totidem ferè musculorum loco uterq; habendus esset, quot sunt ex transuersis uertebra-
rum processibus exortus, & in earundem spinas insertiones. Ceterum in homine multò aliter
hanc coniugationem, ac Galenus illam descripsit, aut enumerauit potius, obseruaui. Apparent
enim quàm plurimi utrinq; musculi, serie multiplici inuicem commixti, & occipitio implantati,
non tamen eodem modo omnes principium ducunt, & insertionem moluntur. Illico enim atq;
primum musculorum par subductum est, ⁱ musculus occurrit, qui acutum principium ex me-
dio transuersorū processuum quintae & quartae thoracis uertebrae educit, & ilico ab exortu car-
neus apparens, muris & lacertae formam adipiscitur, quum uerò sursum ad ceruicis initium
perrepat, carnosus esse desinit, ac ueluti in teretis tendinis naturam cessat, ^k musculum imita-
tus, qui maxillam humiliorem deorsum trahit, duobusq; uentribus donatur. Quandoquidem
inibi, qua musculus iste secundi paris caput mouentium, ceruicis radicem superat, carnosus
denuo esse incipit, quousque in occipitij ossis medium ⁿ inseratur. Verum priusquam inseritur,
cum ipso alius coit musculus, ex septimae ceruicis uertebrae spina, nerueo tereti-
q; principio ena-
tus, qui sursum ascendens, carnosus quoque euadit, dictoq; musculo ^o ante ipsius in occipitium
insertionem commiscetur, unà cum illo in occipitium implantatus. Atque in hac insertionem
dextri lateris musculi, lateris sinistri musculis cōtigui sunt, neq; ab inuicē (ut primum par) remo-
uentur. ^p Alius deinceps occurrit, qui ueluti alterius lateris tertius esse possit, ac ex apice transuer-
si secundae thoracis uertebrae, & primae etiam processus, partim carneus, partim nerueus ena-
scitur, & sursum uersus exteriora oblique exporrectus carnosus ue, ac latior redditus, occipi-
tio ad radicem ^q mamillaris in capite processus, ualidè inseritur. Sub his, ^r magna moles carnea
consistit, secundo in canibus pari quodammodo respondens, quæ à transuersis uertebra-
rum processibus, oblique sursum ad spinas exporrecta, occipitij ossi inseritur, fibras obtinens ab ex-
terioribus sursum intrò oblique repentes. Atque eiusmodi secundum musculorum coniugi-
um, in homine non semel in publicis sectionibus ostendi, nunc autem cuius integrū erit, utrin-
que in hoc coniugio quatuor musculos collocare, primum scilicet, secundum & tertium, tres
illos ante carneam molem enarratos, & quartum, ipsam carneam molem. Nisi fortassis quis de
nuo illam carnē in tot musculos subdiuidere proposuisset, quot in ipsa impressiones, aut exor-
tus insertionesq; uisuntur. At consultius fore arbitror, si unicum tantum par ex omnibus his, &
unum duntaxat utrinq; musculum numero statuerimus, quum cætera paria duobus tantum
conformentur musculis, & omnes huius secundi paris musculi eiusdem functionis gratia pro-
creati sint. Hoc enim (ut etiam primum par) capitis & obscure admodum, ceruicis quoque per
ficit extensionem, aut in posteriora ductum, quem duntaxat rectum, & in neutram partem incli-
nantem perfici nequaquam ambigo. Si itaque musculi utriusque lateris tendantur, nihil aliud
etiam, quàm caput rectissimè extendent, & si alternatim laborauerint, iam alterius motus opifi-
ces reddentur. non enim extendent, sed circumuersionis capitis motui (quem supra secundam
uertebra-
ram perfici docuimus) famulabuntur. Cæterū hæc accuratiùs intelliges, ubi uniuersum
de capitis musculis sermonem audieris, & hæc nostra cum Galeni scriptis, adhibita sectione
perpenderis. ^s Tertium par duobus gracilibus constat musculis, neutiquam cum prædictis
mole correspondentibus. Ex secundae enim ceruicis uertebrae spinæ extremo, duo enascun-

14. ta. A.
B.
14. tab. E.

Primi ac se-
cundi parium
munus.

Tertium par

a tur

tur musculi non admodum nervei, qui sursum porrecti, in occipiti medium teretes inferuntur, in ipsa insertione minus, quam in ortu inuicem contigui, ab ipso enim nonnihil oblique sursum ducuntur, sensim mutuò abscedentes. Hi si simul tendantur, caput quoque solum in posteriora agunt, at si alter tantum in se colligatur, ductus ratione, circumuersionis capitis (ut duo priora paria) opifex erit. ^k Quartum par capitis etiam extensioni præfectum, sub tertio occipitio, illi quod ad substantiam, formam, ductumque attinet, simile. A posteriori enim primæ uer-
Quartum par. tebræ sede, ^l ubi aliæ in spinâ desinunt, ipsa quoque lineæ modo prominens tuberculū processum uel exigit, utrinque ad processus eius latera unus enascitur musculus gracilis, & omnino carneus. Ambo quartiparis musculi in exortu contigui sunt, at sursum porrecti, modiceque ab inuicem re-
Quintum par. moti, occipitio inferuntur. Porro ^m quintum par, musculorum forma & substantia, duobus prædictis paribus respondens, iuxta externum latus tertij paris, ab occipiti ossis principium obtinet, atque illinc deorsum oblique descendens, in apicem ⁿ transuersi primæ ceruicis uer-
Sextum par. tebræ processus inferitur, dexter quidem musculus in dextrum processum, sinister uero in sinistrum. ^o Sextum par ^p à spina secundæ ceruicis uer-
 tebræ enascitur, & oblique sursum procedens, in transuersum quoque primæ ceruicis uer-
 tebræ processum implantatur, pari prorsus cum quinto coniugio ratione formaque. Sunt enim utriusque paris musculi oblongi, carnei, & paulò minus toto teretes. In cane uero & simijs multò, quam in hominibus crassiores & insigniores, ut etiam horum animalium secundæ ceruicis uer-
 tebræ spina per quam ampla lataque uideatur, at in illis æquè ac in hominibus tertium par cum quinto & sexto, pares æqualesque triangulos utrinque formare cōspicitur. Si enim trium illorum parium dextros musculos unâ contuleris, in dextro latere ^q triangulum statues, si uero sinistri lateris musculos inuicem comparaueris, etiam & hîc triangulum fieri obseruabis, cuius unus angulus cōsistit in occipiti medio, secundus ad secundæ uer-
 tebræ spinâ, tertius in sinistri lateris transuerso primæ uer-
 tebræ processu. Cæterum quinti & sexti parium munus est, primam uertebam unâ cum capite supra secundam circumuertere. Vtriusque enim paris dextris musculis ad suum principium contractis, prima uertebra in posteriora sinistrorsum circumuertitur, sinistris autem laborantibus, in posteriora dextrorsum motus perficitur. Atque ad hunc modum posteriores capitis musculi, qui numero duodecim erunt (nisi in plures duobus musculis secundum par diuiseris) habent, ^r anteriores uero hac ratione. ^s Vtrinque à media superiori ossis pectoris regione, secundum ipsius amplitudinem, & clauiculæ parte pectoris ossi ibidem coarticulata, amplum & neru-
Musculi à pectoris osse et clauiculis in caput inserti, atque in huius capitis numero 13, & 14. sum, membraneumque musculus prodit caput, neruosi ex pectoris osse, quam à clauicula pronatum. Caput hoc unicum, quod ad continuitatem attinet, uisitur, ac oblique uersus superiora procedens, carnosum densumque, & paulo latiore quam profundiore efficit musculum, qui carnosus crassoque admodum ^t sine, ^x mamillari in temporis osse processui innascitur, illum sua amplitudine uniuersum amplexus, sic sanè, ut & unicus duntaxat utrobique in hominibus mihi repertus sit musculus, citra etiam sectionem (quod ualidus, ac proximè ^y membraneo latoque in collo musculo subditus sit) conspicuus. Cæterum in quibusdam quadrupedibus, musculum ad superiora procurrentem, in medio ductu diuisum obseruauimus, cuius una pars mamillari processui, altera ad auris radicem caluariæ inferebatur. Tres autem fines hæcenus in nullo comperi animante, multoque minùs principium à pectoris osse & clauicula procedens, in duas tres uel partes manifestè dissectum. Quauis interim hos musculos utrinque ab aliquibus Anatomis tres, aliquando & duos enumeratos fuisse nō ignorē, uerum hic numerus pro musculi finium ratione, in simijs & canibus inter dissectionis peritos uariet, licet plerique hos à capite natos, pectoris ossi & clauiculis inseri, thoracisque motibus præfici cōtenderunt. at apud neminem interim lego, qui mentione digna descriptione eos donauerit, tantum abest, ut uerè ipsorum functionem naturamque nobis exprefferit. Vtriusque enim lateris musculus contrarijs prorsus munis præficitur, quatuor primorum parium, quæ in ceruicis posteriori sede locata recensuimus. ambobus enim tensis contractisque, caput in anteriora, siue rigida siue inclinata ceruice flectitur. Si uero dexter duntaxat contrahatur, caput in anteriora sinistrorsum circumuertitur, sinistro autem solo laborante, caput in anteriora dextrorsum circumagitur. Neque quicquid æquè ex amussim posteriorum capitis motibus famulantium musculorum functionem ostensurum est, atque duo hi priores, quorum officium iam admonitus promptissimè capis. Quandoquidem si funiculum transuersim occipitio circumduxeris, cuius fines utrinque supra aures deorsum ad pectus porrigantur, ac postmodum utrunque finem unâ traxeris, caput in anteriora flectetur, si autem alternatim fines uellentur, in gyrum caput mouebitur. Sint itaque hi nostrorum capitis motibus subseruentium musculorum, decimustertius & decimusquartus. Verum præter hos, alij
Musculi sub stomacho latitantes, & ceruicis flexioni præfecti. concipiuntur musculi, quos ferè sub ^b stomacho latitantes Veteres appellasse uidentur. hi namque quatuor

k 14 ta. F. G.

l 3, 4, 11 fi. cap. 15 li. 1 X.

m 14 ta. H. I.

n 14 ta. D.

o 14 ta. K. L.

p ab E ad D 14 ta.

q huius cō-
 stæ in 14
 tab. sunt A,
 H, K, alteri
 us autem tri
 anguli co-
 stæ B, I, L.r alterius la-
 teris musculi
 lus. 4 ta. O.
 1 ta. F. 2 ta.
 1, 5 ta. K. 9
 ta. D.
 5 4 ta. X.
 t 4 ta. Y.
 u 4 ta. Z.
 x 3, 4, 5 fi.
 ca. 6, li. 1 k.
 y 3 ta. r.a 8 ta. A, B.
 b 7 tab. E.
 aut 14 fi. li.
 s A, B.

quatuor primarum thoracis uertebraſ & omnium ceruicis corporibus connafcuntur, ac par-
 tim ab iſdem principium ducunt, partimq; iſtis inferuntur, non nimis liquidò poſtmodum in
 c 1 fi. ca. 15 occipitis os inſerti, iuxta^c anteriorem foraminis dorſalem medullam transmittentis ſedem. At
 G. hos exactius inter dorſum mouentes muſculos recenſebimus, ſeſtunt enim ſuperiorem dor-
 ſi partem, capite interim proprio motu horum ope uix flexo. Quamobrem etiam inter capitis
 d 8 ta. C. 13 muſculos uix ueniunt enumerandi, quemadmodum neque^d alij adhuc quatuor (utrinque ni-
 14. H. mirum duæ) coniugationes ad ceruicis latera reſoſiti, qui ceruicem ad latera, non autem ca-
 e 14 ta. O. put proprio motu agunt. Et rurfus^e alia coniugatio ceruicē extendens hīc prætereunda eſt, ac
 ad reliquū de dorſum mouētibz muſculis ſermonem aſſeruanda, quum illæ niſi ſecundariò ca-
 put moueāt, ea nimirum ratione, qua brachium mouentes muſculi, cubitum & extremam ma-
 num mouent.

CAPVT MOVENTIVM MVSCVLORVM

adminiſtratio. Caput XXIX.




O R V M qui capitis motibus præſunt, muſculorum adminiſtrationem;
 reſupinato cadauere, aut ad eum, quem prius dixi, modum ſuſpenſo, à
 primo pari auſpicaberis, primū perpendicularis membraneum^b cuius
 dam muſculi principium, quod ex inferiorum ceruicis uertebraſ ſpi-
 nis enatum, primo capitis muſculorū pari, reliquisq; hīc dorſum mouen-
 tibz muſculis inſternitur, ac tandem aliquot ſuperioribus thoracis co-
 ſtis inſertum, reſpirationis opifex efficitur. Licebit itaque huius muſculi
 (qui hominis thoracem mouentium tertius erit) principium, à uertebraſ ſpinis cultello li-
 berare, & muſculo ad inſertionem uſq; à ſubditis diuulſo, illum ibidem à coſtis appenſum tan-
 tiſper ſinere, dum thoracis muſculos aggreſſurus ſis. In præſentia enim cultellum reſuſorē, aut
 buxeū, ſub externo primi paris muſculi latere ſubiicies, & illum à ſubditis liberare conaberis,
 deinde ſecundū ſpinæ longitudinem ducta ſeſtione, ipſum ad inſertionem uſque in occiput
 duces, quod ubi in utroq; latere præſtiteris, huius paris muſculos ab occipitio nō amputatos,
 ita ad latus aliquò reſeſtes, ut reliquam ſeſtione non impedian. Mox uarios^c ſecundi paris
 muſculos conſiderabis, ea illos ſerie, qua enumerauī, à uertebraſ abſecans, atque ad occipitium
 deducēs, ut modò illorum tractis principijs, quarum functionū potiſſimū autores ſint, recte
 perſpicias, quod tunc demum optimè uiſitur, quum cerebrum ex caluaria ademptum eſt, ipſaq;
 inferior maxilla abſeſta. Tercium par à ſpina ſecundæ ceruicis uertebraſ poſtmodum libe-
 rabis, ſenſim illud ad occipitium uſque, à^e quarto pari ſubleuans, præcauensq; ne & id unā im-
 prudens auferas. hoc enim nunc à prima uertebra ſeparandum uenit, atq; ut cætera, ad ſuam,
 quam molitur, inſertionem ducendum. Quintum in ſuper par, ab occipitio liberatū ad tranſ-
 uerſos primæ uertebraſ proceſſus, quemadmodum^g ſextum à ſpina ſecundæ uertebraſ ad eoſ-
 dem proceſſus ducetur. Mox reſlexo cadauere à pectoris oſſe & clauiculis, h^h anteriorum mu-
 ſculorum principia ſunt acuto cultello reſecāda, mente interim adhibita, num plura muſculorū
 principia ſimul cōcurrant, aut utrinq; plures muſculi obſeruari queant. Vbi uerò & hos ad ma-
 millarem proceſſum perduxeris, illorumq; inſertionē rimatus fueris, eoſdem à capite abſecato
 atq; ceruicis proprijs muſculis in præſentia reſeſtis, ad ligamēta capiti & duarum primarū cer-
 uicis uertebraſ peculiaria, ſeſtione conſer, quibus nunc priuatim Caput dedicabimus.

DE CAPITIS ET PRIMÆ SECUN- dæq; ceruicis uertebraſ ligamenti. Caput XXX.

P R A E S E N S figura, primam ſecundamq; cer-
 uicis exprimit uertebraſ, poſteriori ſede delineatas, unā cum
 earundem ligamenti hoc Capite deſcribendis. Characteres
 autem figuræ inſcripti ita habent.

A, B, C Prima ceruicis uertebra ſecundæ cōnexa. Verūm A pri-
 uatim dexter primæ uertebraſ ſinus, qui dextrum occipitis oſſis
 caput ſuſcipit, indicatur. B autem ſiniſter ſinus, cui ſiniſtrum oc-
 cipitis oſſis caput inſidet. C uerò primæ uertebraſ ſedes, ubi in
 ſpinam alia terminantur. D, D, G, H Secunda ceruicis uertebra.

E, E, E Ligamentum membraneum, primam ceruicis uertebraſ ſecundæ uertebraſ neſtens.



G Corpus secundæ uertræ dentem produçens.

H Dens, acutus ue secundæ ceruicis uertræ processus.

I Teres ligamentum, à dente in occipitij os insertum.

K Transuersum ligamentũ, dentem in sinu cõtinens, qui dentis gratia in prima uertræ cælatur.



*Ligamentum
primam uer-
træ capiti cõ-
m tens.*

*Secundâ uer-
træ capiti.*

*Ligamentum
transuersum
denti obductũ.*

*Primam uer-
træ secun-
dæ colligans.*

*Ligamentorum
admini-
stratio.*

N VLLA non admiratione dignam capitis cum prima uertræ articula-
tionem, & secundæ cum prima, secundæq; rursus cum capite coniunctio-
nem esse, superioris Libri decimumquintũ Caput explicauit. Præsens au-
tem sermo, ligamenta his articulis præfecta obiter perstringet, hæc nanq;
spectatori Naturæ industriam, quam tunc etiam perfunctoriè enarren-
tur, abundè commonstrant. Quando itaque primam ceruicis uertræ
capiti copulari necessum fuit, meritò uniuersum articulum ambiens^a liga-
mentum (quod & cæteris articulis cõmune censetur) forte robustumq; Natura procreauit, ra-
rum tamen nihil, aut peculiare, præter robur crassitiemq;, id ligamentum adipiscitur. Cæterum
quod secundam ceruicis uertræ capitis ossi cõmittit, teres & ualidissimum est, & cartilagi-
nis naturæ participat, hoc ex uertice^c dentis enatum, occipitis ossi inseritur,^d quâ anteriorem
foraminis regionem, quo dorsalis medulla delabitur, constituit. Id ligamentũ firmissimè secun-
dam uertræ occipitis ossi colligans, unâ cum dente ueluti axem efformat, secundum quam
caput, primæ uertræ interuentu in gyrum agitur. Verum ne dens ille^e internam primæ uer-
træ sedem occupans, & dorsali medullæ ibidem prælocatus, quandoq; ex suo sinu in uehe-
mentioribus capitis motibus deuiet, luxetur ue, atq; tunc dorsale medullâ comprimat, aut fran-
gat,^f aliud ligamentũ rerum Opifex procreauit, quod ex uno latere interioris regionis primæ
uertræ prodiens, alteri lateri inseritur, posteriori dentis sedi transuersim obductum. Præsens
ligamentum, quia egregiè robustum neruolumq; existit, cartilaginisq; naturæ compos, ac de-
mum inter dentem dorsalemq; medullam locatum est, aptissimè dentem in sibi priuatim excul-
pta concauitate, ne uacillet, luxeturue, continet, dorsaliq; medullæ firmissimũ & tutum propu-
gnaculum efficitur, & interim quo minùs prima uertræ simul cum capite super secundam cir-
cumuertatur, haud quaquam prohibet. Atq; id ligamentum est, quod superiori Libro manife-
stissimè demonstrare dicebam, caput super secundâ uertræ, ad anteriora posteriora ue neuti-
quam moueri posse. Reliquũ est^g aliud ligamentum, primam uertræ secundæ colligans,
membraneum quidem, & eiusdem cum ambientibus cæteros articulos ligamentis naturæ &
usus. Constat enim non solum primam uertræ capitis ossi debuissè articulari, sed etiam pri-
mam secundæ. Si enim unâ hæ uertræ capitis ossi adnascerentur, prohiberent sanè motus
mutuos. ea namq; quæ quiescit, uelleret, & detineret agentẽ, nunc autem uicissim utraq; potest
suo motu agi, alia interim sua sede firmata. Vt autem hæc ligamenta examussim administres,
conduxerit musculos ceruicem mouentes, suo loco describendos, prius esse dissectos, ac tunc
demum acuto cultello membraneũ ligamentum, primam uertræ capiti colligans, opportu-
nè diuidetur, & capite ad anteriora inflexo, dorsalem medullam quoq; per transuersum absca-
bis, ut teres ligamentum dentem capiti colligans, in conspectum ueniat. Quod ubi intuitus fue-
ris, transuerso quoq; ictu id diuides, atq; ligamentũ illud transuersim denti obuolutũ, dentemq;
in sua cauitate cõtinens, diligẽter obseruabis, & mota omni ex parte prima uertræ, qui motus
supra secundâ & primâ complentur, discies. Postremò membraneũ ligamẽtum, primam uer-
træ secundæ copulã, in circuitu quoq; acuto cultello aggredieris, & auulsa prima uertræ,
denuò dentis sinum, & ligamentum dentem complectens, & quod ex ipsius uertice procedit,
considerabis. Cætera autem ligamenta reliquas uertræ colligantia, in id Caput commodè
reijcientur, quod dorsum mouentium musculorum administrationem subsequetur.

4 E, E, E.

b 1.

c H.

*d 1 fi. ca. 15
li. 1 G.*

*e 3 fi. ca. 15
lib. 1 K.*

f K.

g F, F.

DE MUSCULIS ABDOMINIS. CA. XXXI.



VEREO R, ne & hîc pariter morosior quispiam disciplinæ ordinem forte
culpaturus sit, quòd ante abdominis musculos, aut manus, aut thoracis,
aut dorfi motores non fuerim aggressus. Nihil enim prohibet, cubitum
mouentes musculos modò pertractare. Sed quum hos, uicinitatis ratione
dorsum agentes musculi præcedât, & ante dorfi musculos, quòd ad sectio-
nis seriem attinet, thoracem mouentes, & ante hos thoracis musculos, eos
quos abdominis uocamus, disseccari operæpretium sit, proximum est, hos
abdominis persequi. Quanquam (ut & antea admonui) integrũ cuius fuerit, paginas aliquot
inuertere,

*Octo abdomi-
nis musculorū
brevis enuncie-
ratio.*

*Obliquē de-
scendens.*

*Obliquē ascen-
dens.*

inuertere, & Caput, quod ordine prius esse arbitrabitur, reliquis lectione præponere. Musculi itaque, quos abdominis, Anatomes professores nuncupant, ab omnibus octo (utrinque nimirum quatuor) constituuntur, quatuor quidem obliqui, duo recti, & totidem transuersi. Obliqui in utroque latere bini sunt, qui inuicem incumbunt, & contrarias seque mutuò decussatim intersecantes fibras exigunt. ^a Superioris enim fibræ, deorsum uersus priora obliquè procedunt, quem huius fibrarum ductus gratia descendente[m] uulgò dicimus. ^b Inferioris uerò fibræ, sursum obliquè ad anteriora tendunt, qui ob id obliquè ascendens nuncupatur. Rectorum ab utroque latere ^c unus est, qui quum fibras secundum corporis longitudinem extensas obtineat, rectus nuncupatur. ^d Transuersus similiter utrinque unus habetur, cui id nomen, quòd eius fibræ secundum corporis latitudinem, aut à dextris ad sinistra nullo obliquo ductu ferantur, inditum est. ^e Obliquè descendēs cæteris abdominis musculis supersternitur, ^f & ex sexta, septima, octaua & nona, costis, priusquam in cartilaginem finiant, carnosum principium sumit propter musculus, quem ex scapulæ basi pronatū, octo elatioribus thoracis costis inferi, thoracemque mouere dicemus, neque hoc amplum principium instar rectæ fit lineæ, uerum instar manus. Ille enim thoracis musculus, costis quasi digitos singulis porrigendo inseritur, ex quorum interuallis prominentiores obliquè descendentes musculi partes, digitorum ritu enascuntur non secus, quam si sinistrae manus interuallis, dextræ manus digitos infereres, & musculus thoracis motibus famulantem, sinistrae manui conferres, dextræ uerò obliquè descendente[m] assimilares. Deinde post nonam costam, à tribus etiam inferioribus costis iste musculus enascitur, illam semper originem imitatus, quam ad magni thoracis musculi interualla adipiscitur, non quidem ampliùs cum illo thoracis musculo ingressu mutuo commissus, uerum cum ^g alio quodam, qui ab inferiorum thoracis uertebra[m], & unius alteriusque lumborum spinis enatus, decimæ & undecimæ thoracis costæ potissimum inferi, in thoracis musculorum enarratione dicetur. Is enim manus quoque ritu costis, priusquam in cartilaginē cessare incipiunt, implantatur, atque obliquè descendentes musculi principium, manus quoque modo ex eius musculi interuallis, ab ipsis costis alternatim procedit. atque hoc obliqui musculi principium, undique carnosum quidem est, sed tenue. Verum musculus sensim carnosior crassiorque euadens, deorsum in priora fertur, ilia (quæ quasi inania inter ilium os & infimam costam, *πνεῦναιος, & λαγόναιος* Græci uocant) carnosam ipsius parte amplectens, quousque ad ilium os perreperit, cuius ^h summitati secundum totum ipsius appendicis ductum, carneus inseritur. Est autem appendix illa, toti ossis ilium parti obducta, quam ipsius spinam proprie uocari relatum est. Quum uerò carnosam ipsius pars, ex ilium regionibus, ad anteriora mediaque, secundum abdominis longitudinē properat, in neruofam exilitatem membranæ quàm simillimam degenerat, quæ sextæ & septimæ costarum cartilaginibus, & pectoris ossis mucroni, & rectis musculis expanditur, firmissimèque superioris ossis coxendicis, & pubis regioni implantatur, tota illa nimirum sede, quæ ab ilium ossis appendice, seu spinæ antica parte, ad pubis usque ossium ⁱ cartilaginem protenditur, non quod illo ductu ab ilium osse, ad pubis ossium usque commissuram ossi inseratur, sed duntaxat, ubi os ex carne reperit. Quà enim ^j duo femur flectentes musculi, super coxendicis & pubis os deorsum prorepunt, obliquus hic musculus ossi non implantatur, sunt uerò illi musculi, femur mouentium sextus & septimus. ^k Secundum autem corporis longitudinem, in abdominis medio dexter musculus, cum membranea tenuitate sinistri ita sanè coit, ut simul utrique descendentes ueluti tunicam quandam, uniuerso abdomini obductam efforment. ^l Obliquus huic substratus, ex superiori ossis ilium regione, quam ipsius spinam circumscribere diximus, enascitur, ac simul tenuem membranæque originem, à lumborum uertebra[m] & ossis sacri spinis assumit, quæ in musculi progressu, carnosæ fibræ tandem adaugetur, enutritur ue. Musculus iste sursum tendens, ilia carnosam sui parte integit, & quatuor inferiorum costarum, quas spurias uocant, finibus carnosus & hinc quoque inseritur. Vbi autem abdominis priora & medium conscendit, in neruofam desinit exilitatem, quæ inter rectum musculus, qui ipsi subijcitur, & dictum obliqui descendentes membranæ tendinem, media intercedit, pubisque ossi, & mucronatæ pectoris ossis cartilagini inseritur, per reliquam uerò abdominis longitudinem, cum alterius lateris obliquè ascendentes musculi tendine sic unitur, ut ex utriusque lateris musculo, simul toti quoque abdomini tegumentum quodammodo efficiatur. Membranei horum musculorum tendines, eundem cum reliqua musculorum parte fibrarum ductum exigunt. Descendentium enim fibræ omnes, deorsum obliquè ad anteriora propagantur, ascendentium uerò, sursum in priora perreptant, atque duorum musculorum mutuò incumbentium fibræ decussatim, seu instar x literæ se inuicem intersecant. Cæterum ea sede, qua ascendentes descendentesque tendines, super abdominis mediū inuicem insternuntur, utriusque firmissimè simul tanta

a 3 ta. o.
b 4 tab. n.

c 5 ta. Δ.
d 6 ta. Δ.

d 3 ta. o. 4
ta. o. 9 P.
e 3 tab. cha-
racl. 6, 7, 8.
f 1 tab. O.
O. P. 2 ta.
o, o, o. p, p,
p.

f 1 tab. Δ.

g 2 fi. cap.
29 li. 1 H, R,
R, P.

h ultimariū
fig. li. 1 s.

i 8 ta. o. &
Δ.

k 3 ta. ab R
ad X.

l 4 tab. n. 5
tabu. a atq;
nunc potif-
simū u tab.
a, b.

Hic sedulo
cōfer inter
se 3 & 4 et
5 & 6 tabu-
las.

amplitudine connati occurrunt, quanta media recti musculi existit latitudo, atque id adeo ualide secundum abdominis longitudinem perficitur, ut hic in abdominis medio, quatuor obliquorum musculorum tendines, unum producere quis arbitraretur, nisi duos utrinque haberi, accuratissima sectio, fibrarumque ductus comonstrarent. Vbi dextri sinistris conascuntur, uniunturque, nullam prorsus separationis neque coitus lineam exprimunt, sed paulo crassiores redditi, in abdominis medio, recta linea sese inter rectos musculos^m ubi illi inuicem distant, imprimentes, robustissime transuersorum musculorum nervosis tenuitatibus, ipsique adeo peritonæoⁿ conascuntur.^o Quod etiam obliquorum ascendentium nervosis tenuitatibus usu uenit, secundum externa rectorum musculorum latera, priusquam illos conscendant. per abdominis enim longitudinem, instar lineae insertionem ualidam moliuntur, in nervosas transuersorum tenuitates, & etiam ad quasdam rectorum musculorum^p impressiones, quas paulo posterius exequar. Sub obliquorum itaque nervosis tenuitatibus,^q recti abdominis musculi reconduntur, singuli ex media ossis pubis regione,ⁱ duplici quodammodo principio ducentes originem, uno quidem superiori interioreque, altero inferiori ac exteriori, non quod hæc principia, singulis musculis disiecta incōtinua ue sint, sed ipsa musculi origo, diuersam substantiam ad hunc modum exprimit. Superior principij pars introrsum nonnihil uergens, exacte carnea est, ac ex lato in angustum desinens, priusquam ad mediā suminis regionem pertingat, quasi in acutum angulum terminatur. Inferius uero, quod & extrorsum paulo magis prominet, nervosum est, carnis omnino expers, uerum sursum porrectum sensim dilatescit, totumque rectum musculum producere conspicitur. Recti itaque musculi, duobus eiusmodi principijs singuli ex pubis osse nati,^s inuicem contigui sunt, recta sursum porrecti, donec ad umbilicum peruenerint,^t ibidem enim nonnihil mutuo distantes, modiceque ampliores facti, ad pectus usque feruntur, cui supra mucronatam cartilaginem, ad ossis pectoris latera, illique conexas cartilagines, lati carnosique^u implantantur. Musculi hi non uno fibrarum ductu, secundum totam longitudinem ferri uidentur, sed singuli in abdominis regione diuersa^x delineamēta, seu inscriptiones (quas Græcis *πορυγαφαὶς* appellari diximus) transuersim, & incurua albaque linea, ipsis indutas exprimunt, non aliter sane, quam si rectorum singuli plurium musculorum numero essent habendi. Non enim recta ab osse pubis, ad pectus fibræ nusquam inclinantes feruntur, sed ad nunc dictas circumscriptiones impressiones ue nonnihil implicatae obliquantur, atque ex alijs aliæ produci quodammodo apparēt. Deinde musculis rectis, non propter pubis os nerui duntaxat inseruntur, sed interiori quoque ex parte, ubi his impressionibus musculi donantur. Istarum impressionum duæ plurimum supra umbilicum consistunt, & interdum una sub umbilico in sumine, aliquando etiam tres supra umbilicum. Neque has Naturam musculis frustra largitam arbitror, uerum ut commodius recta sursum in priora nonnihil declinantes porrigerentur, & non instar duorum palorum erecti, sed secundum orbicularem abdominis regionem obliquati, peritonæum apposite premerēt, eoque, quod narraturi sumus, munere opportuniùs fungerentur. Porro quum thoracem mouentes exequemur musculos,^y unum in simijs & canibus enumerabimus, qui inter ipsos ordine quintus futurus est. Hunc uerarum costarum cartilaginibus, ad pectoris ossis latus exporrectum, docebimus totum membraneum, præterquam ad primæ secundæque costæ interuallum, ubi carnosior redditus, in primam costam definit. Profecto musculus hic in omnibus animalibus, in quibus sectione deprehenditur, mihi quantumuis accurate secanti, pars recti abdominis musculi esse uidetur, & rectum musculum ad primam usque thoracis costam in illis animalibus ascendere, prorsus assero. Quod in canibus caudatisque simijs maxime euadit conspicuum, nec quisquam inficias ire potest, illis unum musculum à pubis osse, ad primam usque costam exporrigi. In hominibus (ut uerum fatear) eundem musculum nunquam obseruaui, atque illo homines quum breuissimo donentur pectore, facile carent, quapropter etiam in hac mea hominis fabricæ descriptione, neutiquam recti partem, aut ipsi cōiunctum esse affirmo. Omnibus modò commemoratis musculis subsunt^a transuersi, utrinque unus, qui ex transuersis lumborum uertebRARUM processibus, tenui membraneoque principio enascitur, deinde in progressu ex dorsum mouentibus emergens musculis, & carnosus adauctus fibris, superiori ilium ossis regioni, & spuriarum costarum finibus exacte carneus connascitur, carnosus ipsius parte uniuersa inuestiens ilia. Vbi uero uersus abdominis medium,^b ad exteriora rectorum musculorum latera usque prorepsit, in nervosam exilitatem finit, quæ pubis ossi, & mucronatæ cartilagini implantatur. Per reliquam inter hæc extrema longitudinem, iste membranofus tendo, nervosæ exilitati alterius transuersi musculi continuatur, ac simul ambo tunicæ instar uniuersum abdomen circumcingunt, in hoc obliquos musculos imitati. Verum horum musculorum nervosa tenuitas non æque, atque obliquorum lata est, transuersi enim nonnihil sub rectis musculis, & potissimum iuxta pectoris regionem, carnei conspiciuntur. Præsentibus musculis^c peritonæum subnascitur, membrana nutritioni famu-

Recti.

Recti muscu-
li pars, qua si-
miae abun-
dant.

Transuersi.

m s tab. a q
sursum.
n 6 ta. c.
o s tab. x.
6 ta. b

p s tab. u.
u. u.
q s ta. a. 4
ta. n. 6 ta. f.
r s ta. n. no-
tatur supe-
rius, o infe-
rius.

s s ta. p ad
q.
t s tab. a q
sursum.
u s tab. r 4
tab. n.
x s ta. u. u.
u.

y s tab. ab r
per s ab t.

a 6 tab. a. s
ta. y. 12 tab.
p.

b 6 tab. b.

c prima. fi.
s lib.

famulantibus organis circumposita, huic membranæ transuersi adeò connascuntur, ut arduum sit, illos ab hac in homine illaceros liberare. Carnosæ tamen musculorū partes, uix aliter peritonæo cōmittuntur, quàm mutuò incumbentes musculi, inuicem hæere solent. Transuersi enim musculi propria musculorū membrana illic, quā peritonæo obducuntur, neutiquam (& si pleriq; secus arbitrentur) destituti secantibus occurrunt. Neque unquam alius musculorum abdominis, quàm nunc enarrauimus, situs uisitur. Vt forsitan aliquis librorum duntaxat ope nautam agēs, promptè colligeret, pugnātibus nimirū Galeni locis delusus. Quandoquidē hos aliter recenset in Libris de Affectorū locorū cognitione, rursus aliter in Libris de Partium usu, & aliter prorsus in Libris de Administrandis sectionibus, ubi eos ita enumerat, ut in Sexto libro curatiuæ methodi ipsorū situm rectè describit. Octo abdominis musculi, præter cōmunem *Abdominis musculorum usus.* omniū musculorū usum, quo corpori calefaciendo, refrigerandoq; auxiliatur, & propugnacula quædā censentur, primario usu thoracis motibus præsumunt, ut in proprio de thoracē mouentiū musculorum Capite dicturū sumus prolixius. Deinde homini ad durorū recrementorū expulsionem aptissimè subseruiunt, quando enim omnes simul tensi laborarunt, septo transuerso interim ex spiritus retentione depresso, ita intestina simul cōprimunt, ut ex angusto loco in ampliorem (qui inferior est) fæces protrudant, expellantq; & rursus ad uentriculū superiorā ue il las deferri, præcaueant nihilo secus, quàm si duabus ad brachiale tantum iunctis manibus, & semper magis magisq; sensim ad extremā usq; digitorū aciem distantibus, madentem spongiā imponeres, & manibus paulatim cōeuntibus, aquam exprimere nitereris. Verū hoc musculorum abdominis munus, nisi cognita septi transuersi functione situq; apertè percipi nequit. Pari etiā ratione, quo pacto parientibus abdominis musculi (ut cōmodiūs foetus propellatur) conferāt, nō aptè cognoscit. Atq; hæc adhuc minus ab illis assequitur, qui septū transuersum, dum cōtrahitur, thoracemq; adaperit, deorsum pelli arbitratur, nō animaduertētes, quū aërem intrò ducimus, ac thoracem cōtinuò, citra spiritus retentionē, thoracisq; repleti compressionē distendimus, septum transuersum nullum impetū in excretionem moliri, quod scilicet perpetuò sursum tractum nō deprimatur, quemadmodum id in firma sede, retento spiritu, & uī interim compresso thorace, permanet. Cæterum nostri seculi medicos, qui hos tantū musculos recensere ita uidentur, ac si alij in corpore nulli essent, omnino delirare existimandū est, qui rectis musculis cibum in uentrem attrahi, transuersis autē expelli, & obliquis retineri cōtendunt, præsentibus musculis attribuentes, quod uerè uentriculi intestinorumq; fibris ascribendū fuerat. Sed hæc absurdiora sunt, quàm quæ in mediū adduci debeāt, quū aliæ fibre uoluntario motui, aliæ uerò naturali, qui à nostro nō pendet impetu, famulentur. Neutiquam sanè hæc ab ipsis confingenda uenerāt, at laudādus erat rerū Opifex, qui quū abdomen ossē destitutū necessariò creari uoluit, tam affabras tunicas, inuolucraq; ipsi parauit, quæ præter quòd tegumenta, & aptissima receptacula sunt, thoracis quoq; motibus, uti monuimus, utilissimè subministrant.

ABDOMINIS MUSCULORVM ADMINISTRATIONE. Caput XXXII.



ADMINISTRATIONEM hanc, aut à musculorū capitibus, aut ten- *Duplicè esse horum musculorum administrationem.* dinum terminis aggredi nihil prohibet. Verū facilius est, musculorumq; naturam accuratius commonstrat, quæ ab exortibus auspicatur. Qualitercunq; igitur sectionem exordiri proposueris, cutem unā cum carnosā membrana, ab uniuerso abdomine, & lumborum regionibus, ad femora usque liberatū esse oportet, unā cum ^a musculo, quem brachiū deorsum trahere ostendimus, quanquam is iam pridē ex sectionis serie, simul cum cute ac membrana, in brachium mouentiū musculorum sectione ablatus sit. His ademptis, & perquā tenui fibrosa^c membrana musculis, præter carneam, obducta, unguibus hinc inde leuiter (ut ipsius naturam discas) diuulsa, priorem sectionem in hunc modum aggredieris. *Administratio à musculorum exortu. Oblique descendens.* ^b Medio manus adhibeas. Deinde à dextra costa niteris ^b musculi abdominis oblique descendens principium, paruo cultello, aut exigua nouacula liberare, leui sectione ducta secundum reli- ^c quas costas uersus dorsum, & secundum superiorem ilium ossis regionem, ad pubis ossis usq; medium. hanc sectionem adeò duces leuiter, ut nihil præter præsentem musculum uulneres. ^d Mox ab his ossiū regionibus eleuato musculi principio, conaberis paulatim ab ^e oblique ascendente, descendente eousq; liberare, dum ad abdominis usque medium illum perduxeris, præca- ^d uens ne unā tanquam oblique descendens musculi partem auferas, tenuem ^d musculum, qui ad decimā undecimāq; thoracis costam, cum obliquo mutuis interuallis cōmittitur. Si enim

hunc scopolum uitaueris, & in uiris quoque abstineris à tunica uasa seminaria inuolvente, musculum uersus medium abdominis promptissimè duces. Cæterum ubi ad^f mediam usque recti musculi amplitudinem peruentum erit, pertinaciùs cum ascendenti musculi tendine, obliqui descendenti tendo coire uidebitur, quem ut integrum, & non uulneratum lacerum ue ad lineam (quæ in abdominis medio ambientibus merito, quòd illi nulla subest caro, candidior apparet) disseces, impossibile arbitror, ut cunque acuta nonacula usus fueris, nam retusiori nihil prorsus promouebis. Quamobrem reflexo pendenteq; à media recti musculi amplitudine primo abdominis musculo, ascendente, qui secundus est, similiter aggredieris, ducta nimirum à pubis osse, per superiorem ilium ossis regionem, & lumborum uertebras, & fines quatuor inferiorum costarum sectione, quæ ab his omnibus musculum separare possit, & ab illo etiam respirationis musculo abstineat, qui decimæ & undecimæ costæ potissimum inseritur. Post sectionem, musculi huius principia hamulo aut unguibus attolles, & à transuerso, cui insidet, in priora procedens liberabis. Quod usq; ad exteriorem costam, latus ue recti musculi eius lateris, cuius sectionem administras, mediocri negotio perfeceris, si modò in uiris uasorum seminalium tunicis (quæ ad testium musculorum sectionem seruandæ sunt) animum adhibeas, ne unæ etiam illæ præscindantur. Vbi uerò recti musculi latus externum membranosus oblique ascendenti musculi tendo spectat, acutiori nouacula separandus est, neque id quidem oscitanter, ne totum obliqui musculi tendinē pertundas, ipsumq; hinc finire arbitreris. Tantis enim huius tendinis cum transuersi musculi neruosa exilitate iuxta externum recti musculi latus, occurrit nexus, ut aliquando obliqui ascendenti tendinē diuidi putauerim, & unam ipsius partem transuerso musculo conatam, sub rectis musculis procedere, alteram uerò super rectos expandi arbitratus fuerim, atque id potissimum supra umbilici regionē est cōspectius. Verum si ad amissum oblique ascendenti tendinē à transuerso liberaueris, recto musculo illum super sterni cōperies, à quo ad albam usq; abdominis lineam accurate separandus uenit, quod in carnosus recti musculi partibus factum est promptissimum, at in nerueis illis recti musculi inscriptionibus arduum esse obseruabis. Obliquorum enim tendo pertinaciùs in his recto musculo, quam in reliquis sedibus, ubi carnosus est, conascitur, neq; adeò promptè ab illis examissum discindit, aut potius eradit. Hinc modò doceberis, quæ ascendenti descendentiq; tendines, circa abdominis mediū inuicem conascantur, ubi recti musculi mediæ amplitudini (quæ interior est) incumbunt, & arduè, nec nisi maxima industria, & acutiori nouacula, ad albam usq; abdominis lineam separari queunt. Cæterum posteaquàm unius lateris, cuius iam sectionē aggredieris, obliquos abdominis musculos ad albam usq; lineam perduxeris, expende, qualiter obliquorum tendines, rursus transuersorum tenuitatibus in ea abdominis regione adnascantur, qua recti musculi ab inuicem magis seiunguntur. Vtroq; obliquo musculo in illud cadaueris latus, quod mensē in cubit pendente, sola manu rectum musculum à transuersi neruea tenuitate separabis, dextræ manus digitis ab exteriore musculi latere iniectis, & secundum abdominis longitudinē hinc inde sub musculo ductis. Quū primum rectus musculus à transuerso abscessit, integrum est, recti musculi fibras unæ cum transuersis illis inscriptionibus contueri, ac tandem musculum à thorace nouacula liberatū, ab abdomine detrahere, ita tamen, ut adhuc pubis ossi hæreat, ipsiusq; hinc initium accurate examines. At quū hunc à pectore in cane, aut simia adimes, studendum est, ne continuū illi membranum tendinē simul auferas, aut uulneres, qui secundum pectoris longitudinē, à recto musculo, ad primam thoracis costam porrigitur, ac re uera in eiusmodi animantibus recti pars esse conspicitur. Est autē hic tendo musculus ue, à quo in musculi brachii pectori adducētis administratione præcepti quoq; abstinendum, & num homines hunc cum simijs cōmunem habeant indagandum. Transuersum pari modo, quo obliquos aggressus es, opportunè administrabis, ducta similiter leui sectione à pubis osse, per ilium os, & transuersos uertebrarum lumborum processus, aut potius musculorum dorsum hinc mouentiū exterius latus, atq; demum ad fines spuriarum costarum, quæ intacto peritonæo solū musculū penetret. Mox transuersi principia hamulo eleuabis, et nouacula, quàm poteris, attentissimè à peritonæo paulatim liberabis, donec ad neruosam ipsius deuenieris exilitatē, quæ maiori adhibita cura, à peritonæo ita separanda est, ut neq; peritonæum, neq; tendo, neruosa ue ea tenuitas laceretur. quod quidem nō adeò arduū est, atq; operosum, & præcipue iuxta abdominis elatiora nō procul à pectore, nam in sumine tendo ipse (ut etiā peritonæum) nimis quàm tenuis occurrit. Nunc uerò ubi & hunc musculū ad mediū abdominis perduxeris, ac à peritonæo, ut licuit, optimè liberaueris, rursus in suum locū quatuor huius lateris musculos repones. Mox cadauere in dorsum reflexo, secundam administrandi rationē aggredieris, quæ à tendinum finibus, in abdominis medio auspiciatur. Duces itaq; à pectoris osse ad pubem usq; per totam abdominis longitudinē, super mediū recti musculi eius lateris, cuius

Candidior in
abdomine li-
nea.
Obliqui ascen-
dentis.

Nexus ner-
uosa tenuita-
tis oblique a-
scen. mus. cum
transuerso.

Recti admini-
stratio.

Transuersi.

Altera abdo-
minis musculo-
rum admini-
stratio, uersus
peritonæum ini-
tia.
Obliqui descen-
dentis.

e 3 ta. Y.
f Hæc esset,
in qua recta
duceretur li-
nea per u,
u, u ta. 5.

g 4 ta. n.

h u ta. Δ.

i 5 ta. γ.
k 5 ta. X.

l 22 fi. lib.
5 v.

m 5 ta. u.
u, u.

n 5 tab. su-
pra q. 6 ta.
c.

o 5 ta. Δ.

p 5 ta. u, u.
u.
q 6 ta. f.
r 5 ta. r, 5 ta.

s 3 ta. Δ.

t 6 ta. Δ.

u 13 ta. x, r.

x 1 fi. 5 li-
bri.

y 3 ta. 6 cuius administrationem moliris, adeò leuem sectionem, ut nihil præter^v oblique descendens
 musculi tendinem penetraret. Atque hanc sectionem ad mediam recti musculi amplitudinem ten-
 tandam scribo, quòd nollem frustra per albam lineam, quæ in abdominis medio occurrit, eam
 sectionem experiri, siquidem impossibile arbitror descendens tendinem non uulneratum, &
 illæso quoque ascendens tendine, seorsum liberare, quanquam & ab alba linea interdum sectio-
 nem inchoari nō improbauerim, utcunque etiam laceratos tendines inuicem separares. Qua-
 propter hac illa ue sectione ducta, adnitēris hamulo descendens tendinem attollere, ac à subie-
 cto ipsi musculo nouacula dissectare, quousque uniuersum musculum, uersus dorsi spinam undi-
 que liberatum deduxeris, post hunc, ^a ascendens tendinem à recto separabis, principium sepa-
 rationis ab alba linea exorsus. In hoc opere rursus intueberis, quū tendo ille transuersus recti
 musculi inscriptionibus adnascatur, ac cum neruosa transuersi musculi tenuitate, ad externum
 recti musculi latus coalescat. Insuper à reliqua transuersi musculi parte, oblique ascendentem
 auelles ipsum à pubis & coxendicis & ilium ossibus, & inferioribus thoracis costis, ad lumbo-
 rum usque uertebrae spinas absecans.^a Rectum similiter, ut alterius lateris dissectasti, à trans-
 uerso musculo attolles, & ipsius capite à pubis osse absecto, illum super thoracem reflectes. Mo-
 dō recta sectione secundum albæ lineæ longitudinē ducta, quæ duntaxat neruosam^b transuersi
 musculi tenuitatem illæso peritonæo diuidat, conaberis eam à peritonæo diligenter separare,
 quod quidem in homine, & potissimum iuxta pubem, ^c uasorumque feminalium transitum, fa-
 cturus es difficillimè, in porcis autem minimo negotio. Cæterum transuersi musculi, tendine
 usque ad carneam ipsius regionem à peritonæo, liberato, eum quoque tantisper auferes quousque
 uniuersus musculus à peritonæo dissectus pendeat. Integrum iam quoque est, & huius lateris
 musculos in pristinum locum reponere, & ad amissam eorum formam, situm, & fibrarum du-
 ctus examinare, ac demum resectis illis, ad testium musculos te accingere.

Obliqui ascen-
dentis.

Recti.

Transuersi.

DE VIRILIVM TESTIVM ET MULIE- bris uteri musculis. Caput XXXIII.

LICVISSET huc aliquot Quinti libri figuras reponere, ex quibus testium uterique
 musculorum natura utcumque peti posset, uerum ne easdem figuras diuersis in locis proponeremus,
 hic tantum adijciemus, in quibusnam figuris præsentis musculi conspici queant. Testis itaque
 musculus, nōnihil spectatur tertia tabula ad J, & uigesima secunda figura Libri quinti J. Ve-
 ri autem musculosa substantia eiusdem Libri uigesima quarta figura ad characterem O, uti fie-
 ri potuit, exprimitur.



AM tempestiuum est, ad musculorum thoracem & dorsum & femur mo-
 uentium inspectionem, peritonæum administrare, atque cum eo quoque
 testium musculos aggredi. Pertingunt itaque ad unumquemque testem, ^a sin-
 guli musculi graciles admodum, ex ea uasorum feminalium & testis tunica
 efformati, quæ à peritonæo principium ducens, uasa simul cum teste conti-
 net. Hæc enim in posteriori ipsius sede ilico, in ipso à peritonæo exortu,
 longis, ac inuicē sibi proximis, carneisque fibris ita adaugetur, ut fibræ illæ
 gracilis oblongique musculi naturam exprimant, qui illi testis tunicae semper innatus deorsum
 protenditur, ac tandem iuxta infimā testis sedem, unā cum illa tunica^b uasi ei seminario applan-
 tatur, quod à testibus iam paratum semen assumit, idque sursum in peritonæi amplitudinem de-
 ducens, in uesicæ ceruicem^c se profundit. Neque aliqua prorsus parte, testibus, aut seminarijs ua-
 sis tunica illa pertinaciter adnascitur, quā ubi simul cum musculosa ipsius substantia, inserti-
 onem ad eius uasis inflexum molitur, qui ad infimam testis sedem reflectitur adeò, ut musculus
 ipse nusquam testem contingat. Respondet itaque testis musculus illis, qui ex carnosā membrana
 efformantur, quandoquidem is aliud nihil prorsus est, quā carneæ fibræ uasorum semina-
 lium, & testis inuolucro innatae, quemadmodum carnosæ membranæ^d musculi, carneis quo-
 que fibris per membranam digestis constituuntur. Porro testium musculorum beneficio, uiri
 arbitrario motu testis modicè (ut & ipsi musculi graciles tenuesque sunt) sursum alliciunt, ne
 testes plus æquo laxati, ac ad anteriora pendentes, nimio oneri^e seminarijs uasis sint. Hunc u-
 sum musculi in coitu potissimum præstant, si enim testes uasis seminarijs oneri semper essent,
 atque hæc ad inferiora protracta perpetuò arctarentur, non adeò commodè semen transmittē-
 rent, atque modò, quū testium à musculis iam attractorū pondere subleuata, magis patefcent.
 Constat itaque musculos hos (qui *νεμωδῆς* Græcis uocantur) ex eorum classe censendos esse, qui

Virilis testis.
musculus.

a 22 fi. lib. 5
 v. atque ex
 illa figura
 et 20 seria-
 tum hic sub-
 sequentia
 petes.

b 22 fi. li. 5
 x, i. 23 fi. li.
 5 n. 8, i.
 c 23 fi. lib. 5
 8. o.

d 3 ta. A. C.
 E. r.

e 22 fi. lib. 5
 8, n.

Musculi muliebris uteri.

In Libro de Uteri sectione.

qui nullum sortiuntur musculum, contrarij motus autorem. Nullus enim, qui testes ad inferiora reuellat, extructus est, quandoquidem testes, quos nisi rectà deorsum, nec in ullam partem inclinantes prolabi decebat, abundè à naturali ipsis indita grauitate dimittuntur, idq̃ subinde adeò, ut ne minimum quidem sursum ægris, senibusq̃ allici queant. Quid uerò Arabibus in mentem uenerit, ignoro, qui binos in uiris cuiusq̃ testis musculos, in mulieribus autē unicum haberi scriptum reliquerunt. Vnicum enim hactenus ad singulos porrigi testes semper in masculis obseruauī. Mulieribus porrò Natura similiter musculos largitur, quos in peritonæo, ut & reliqua ipsarum generationis organa, recōdidit. Ea nanque peritonæi pars, seu processus, qui utrinque à lateribus, ad uterum instar^s mesenterij pertingit, uenasq̃ & arterias uterò deducit, & demum cum alterius lateris peritonæi processu, exteriorem uteri^h tunicam procreat, carnosus quoq̃ adaugetur fibris, ex ilium regionibus deorsum oblique, ad uteri latera perreptantibus, adeò sanè, ut & mulieribus utrinque singuli sint musculi, illis specie similes, quibus uiri testes donantur. Et quamuis plerunque graciles sint, neque admodum carnei, crassi ue, ego tamen eos aliquando in nonnullis mulieribus uteri cornua esse arbitratus sum, Galeni uteri descriptione eleganter delusus, qui non muliebrem, a uaccinum & caprinum describit^k uterum, cornua arietū cornibus longè simillima obtinentem secus multò, quàm muliebris uterus. Porro his uteri musculis, obscura uteri ad superiora attractio perficitur, quam mulieres tunc facile percipiunt, quum ilia trahere colligereq̃ conantur, atque adeò (ut sic dicam) uteri ceruicis os, totumq̃ uterum, penitiùs in peritonæi amplitudinem allicere student.

f 24 fi. li. 9
O, P, Q
26 fi. E, E,
27 l. I.
g 10 fi. li. 5
L, L, M, M.
h 27 fi. li. 5
H, H.
i 24 fi. 5 li.
O.
k 29 fig.
lib. 5.
l 25 fi. lib.

MUSCULORVM TESTIVM ADMINISTRATIO. Caput XXXIII.

Qui ea que peritonæo cōtinētur, modò ressecanda ueniunt.

Virilis musculi administratio.



VE M A D M O D V M in Quinto libro musculorum, quos testibus ascripti, mentionem incidere necessum erit, ita quoq̃ eorum administrationem cum reliquarū partiū illo Libro enarrandarū sectione pertractabo. Quod tamen ad administrationē hoc Libro persequendam spectat, à mucronata pectoris ossis cartilagine, ad pubis usq̃ os, nouacula peritonæum diuides, alia rursus sectione per transuersum utrinq̃, ab umbilici regionibus ducta. Mox absque delectu, in uiris omnia, quæ peritonæo cinguntur, præter re-
cti intestiniⁱ finem, & uesicam, auferes. His itaq̃, ut in Quinto libro docebimus, ademptis, & etiam scorto à testibus unà cum carnea membrana ipsi subdita liberato, stylum exiguum ab interiori peritonæi parte meatui indes, qui seminarijs uasis in humiliori peritonæi regione, ad inguina uiam præbet. Posteaquā uerò stylum ad testem usque protruseris, atq̃ ad illius latus, seu (si modò talis stylus ad manum sit) in ipsius rimam ac canalem, cultellum indideris, longa sectione à peritonæo ad testem usq̃ secundum styli longitudinē facta, membranā tunicam ue, uasa cum testibus inuestientē diuides. Atque ita uasa in conspectū cum testibus sese offerent, & extenso quoq̃ uasorū inuolucro, gracilem testis^e musculū, quo inuolucrum id uelut enutritur, conspicias. Hoc musculo ab humillima uasis à testibus semen deferētis inflexione liberato, eius naturā promptissimè cōdisces, qualiterq̃ testem sursum trahat, intueberis. Liceret modò testibus cum suis uasis musculisq̃ absectis, penis & uesicæ ceruicis musculos aggredi, at quum ante hos integrū sit, & thoracis & dorsi & manus diffecare, ad thoracis sese iam conuertet oratio. Cæterū mulierū musculi aperto iam peritonæo, & intestinis ad latera sursumq̃ reductis & mulieris testibus quoq̃ subleuatis, in conspectū citra aliam sectionē ueniūt, dummodo uteri lateribus membranisque, illum peritonæo alligantibus animum accommodare non pigeat. At hæc uniuerſa (ut & antea admonuimus) in Quinto libro accuratiùs prosequemur.

a uti factū est in 2 fig. lib. 5.
b 20 fi. li. 5
o, de in p.
c uti in 20 fi. li. 5 ad r.
st, u, x.
d id facturus, quo 22 fi. lib. 5 à uigesima differr.
e 22 fig. lib. 5.

Muliebris musculi administratio.

f uti ferè se offert 24 fi. lib. 5.

DE MUSCULIS THORACEM MOuentibus. Caput XXXV.

Thoracis motum iure arbitrarium esse.



THORACEM eius motus, quo respirantes indigemus, gratia² non unico cōformatum osse, aut omnino osseum esse, superiori Libro declaratum est. Iam uerò proximū erit, thoracis motum ex nostro arbitratu debuisse pendere, nō autem naturalem esse, sermone persequi, dein si uoluntarium esse, ex usu homini fuerit, quibus is motus perficiatur musculis, subiungere. Summus itaq̃ rerum Opifex respirationē homini animalis spiritus reficiendi, & cordis occasione largitus est, quod & ipsum quidem substantia aëris indigeat, & plurimū feruens in eo calor refrigerari expetat. Inspiratio quidem cor refrigerat,

d 1, 2 fi. ca. 19 li. 1.

gerat, suppeditata ei frigida qualitate. exspiratio autem feruentis in eo, & quasi combusti, & fuliginosi recrementi effusione expulsiōeque, cordi etiam refrigerando conducit. Atque huius potissimum causa duobus contrariis motibus respiratio perficitur, attrahit enim in distentione & dilatatione, euacuat uerò in constrictione, eisdem scilicet motibus, quibus & cor ipsum perpetuò fungitur. Quanquam respirationis cordisque motus, genere plurimum uariant. Siquidem cor naturali motu, uelimus nolimus, mouetur, respiratio autem adeò ex nostra pendet uoluntate, ut quosdam spiritus retentione sese necauisse legamus. atque id magnoperè non ad bene uiuendum duntaxat, sed etiam ad ipsam uitam, homini utile censetur. Si enim idem rhythmus consonantiaque respirationis cum cordis pulsu necessariò esset, neque ipsa respiratio ex nostro impetu uoluntateque penderet, multum diuque loqui nequiremus, quod non exiguam commodæ uitæ noxam præstaret. Porro si non possemus interdum citra respirationem per fumum, uel puluerem, uel quanpiam prauam & uenenosam aëris qualitatem, uel loca putrescentibus cadaueribus, cloacis, aut alijs occasionibus inquinata incedere, ea uitam ipsam quàm celerrimè læderent, hominemque prorsus corrumpere. Constat itaque, ex nostro impetu, aëris per asperam arteriam in pulmones inspirationem, atque rursus fuliginosorum recrementorum cordis exspirationem oportuisse celebrari. Cum uerò pulmo thoracis motum, quoties ille cōprimi-
tur, dilatatur ue, uacui potissimum ui sequatur, musculos thoracem mouentes debuisse extrui certissimum est, qui thoracem dilatarent, arctarentque. Erunt autem hi in uniuersum unà cum octo abdominis musculis in homine, ^b octuaginta nouem, utrinque scilicet quatuor & quadraginta, ac postmodum unus utrique lateri cōmunis. Verum canes & simiæ duobus abundat utrinque, ut simul tres habeant & nonaginta, quos Galeni intelligendi occasione, in serie sua enumerare haud grauabor, enumerationem ab altero tantum latere uniuersam absoluturus, ut deinde enarrato utriusque lateris communi musculo, amborum laterum musculos unà numeri gratia coniungam. ^c Primus itaque ex inferiori interiorique clauiculæ regione, secundum ipsius longitudinem, quā primam respicit costam, exoritur, principium carnosum undique obtinens, & carnoso quoque termino primæ costæ, quā pectoris ossi committitur, antica ex parte insertus. Musculus hic breuis, sed amplius est & tenuis, ac omnino carneus, fibras sortitur impen-
se obliquas, propemodumque transuersas, quæ à clauicula antrorsum procedentes, supremæ thoracis costæ, & nonnihil pectoris ossi, quā eius costæ cartilaginem excipit, implantatur. huius beneficio prima costa, sursum uersus exteriora retrahitur, hacque ratione ibidem thorax dilatur. ^d Secundus musculus grandis est, carnoso principio, ex tota scapulæ basi interiori in parte enatus. hinc carnosus perpetuò procedens, ac costis exporrectus, admodum latefcit, tenuior tantisper redditus, donec primæ, secundæ, tertiæ, quartæ, quintæ, sextæ, septimæ & octauæ, aliquando & nonne, thoracis costis sese inserat, atque id media potissimum costarum sede, si modò costæ longitudinem à uertebis, ad os pectoris usque metiaris, qui locus est, multò anteaquam costæ in cartilaginem cessant. Reliqua autem parte, qua musculus costis exporrigitur, ipsis duntaxat incumbit, exiguisque tantum fibris (ut mutuò instrati solent musculi) illis committitur. Cæterum non recta simplici-
que linea ipsius, quem dixi, finis costis implantatur, sed hic tanquam in digitos discretus est, qui per costarum ossa prolixiores, quàm musculi pars, quæ interuallis con-
nascitur, in priora procedunt, ^e contrario nimirum modo, quo oblique descendens abdominis musculus, ex inferioribus sex costis suam assumit originem. Hic enim ex interuallis costarum prolixius suos digitos educit, atque cum secundo respirationis musculo ferratam compagem efficit. Secundi thoracem mouentium musculi fibræ, si quando ad suum principium, quod ex scapulæ basi pendere credimus, tendantur, uniuersas costas (præter inferiores, quibus musculus non inseritur) uersus exteriora uellunt thoracem dilatantes. Hic musculus in hominibus ita ferè habet, in canibus uerò & caudatis simiis secus, non enim solum ipsis in octo costas inseritur, sed etiam ualidissimè transuersis septimæ & sextæ & quintæ & quartæ ceruicis uertebra-
rum processibus implantatur, aut (si ausim eloqui) ab illis processibus sui principij portionem mutuatur. Velim enim non oscitanter expendi, an præsens musculus à scapula, costis & uertebis illis insertus, thoraci mouendo seruiat, an uerò à costis, illisque uertebis intium ducens scapulæ implantetur, ipsiusque secundum thoracis latera, antrorsum motus occasio haberi queat. Duorum qui iam subsequuntur in numero musculorum, ^f unicus tantum hominibus adest, is scilicet quæ ordine quartum statuemus, nam^g tertio simiæ ac canes tantum donantur, numero autem ipsum quoque, sicuti paulo superius monui, ne quis Galeni lectioni nimium citra sectionem confisus, aliquos me præterisse musculos præter meritum nugetur. Tertius itaque, & quartus, ab utroque secundi musculi latere habentur, unus in priore ipsius sede, alter in posteriore, ambo simul cum secundo (si modò id præstet) thoracem dilatantes. ^h Tertius qui

*Musculorum
thoracem mouen-
tium nume-
rus.*

*Primus tho-
racem mouen-
tium.*

Secundus.

*Tertius &
quartus in nu-
mero, uerum
tertio simiæ
abundant.*

3

*b sensim sin-
gulos seor-
sim adnota-
bimus.*

*c 4 tab. d. 5
ta. Z.*

*d 1 tab. O.
O, O. 2 tab.
O, O, O. 3 ta.
cha. 5, 6, 7.
tab. l. 4 5 m.
6 R. 7 L. 8
F. 11 X. 12
S. 13 T.*

*e Obserua-
tur id 1 ta.
O, O, O, P,
P, P. 2
ta. O, O, O, P,
P, P.*

*f 11 ta. F.
g 6 tab. r.*

*h 6 tab. r. 5
ta. X.*

qui secundum anteriora secundi musculi exporrigitur, carnosus ex interiori parte transuersi secundae ceruicis uertebrae processus¹ enascitur, ac deorsum protensus, ex sequentibus quoque i 6 ta. O. principium ducit, donec uarijs auctus exortibus, primae thoracis costae committatur. hic enim latior, sed tenuior efficitur, & quatuor superioribus thoracis costis, perpetuo carnosus inni- k 6 ta. P. tur.² Vbi uero quartam, interdum, idque praecipue in canibus, quintam praetergreditur costam, l 6 tab. Q. in membraneum neruosumque ligamentum definit, quod subsequenter costis ad septimam aliquando, & octauam usque exporrigitur, singulis, quibus incumbit, costis firmiter adnatum. Procedit uero huius musculi carnosus pars, quae costis committitur, una cum ipsius membraneo tendine, iuxta musculi^m secundi regionem, quae in digitos diffusa, costis implantatur. Hunc in m 6 ta. R. caudatis simijs, & canibus liquidissime ita in publicis sectionibus sese habere ostendi, non ta- men instar manus suas insertiones tentantem, in hominibus autem, me unquam aut reperisse, aut ostendisse minus affirmare possum, quam audacter asserere, illo homines carere. quod non ita dictum esse uelim, ut postposita Galeni autoritate, studiosi illum in hominibus inda- gare cessent. " Quartum in huius Capitis musculorum serie, homines iuxta ac simiae canesque n u tab. F. adipiscuntur, sed nonnihil diuersum. Hominibus enim ex trium inferiorum ceruicis uertebra- 10 ta. E. rum, ac primae thoracis uertebrae spinis, membraneum latumque exoritur principium, quod pri- o u tab. A. mo caput mouentium musculorum pari & hac sede^p repositis, dorsum thoracemque mouenti- p u ta. Q. bus musculis instratum, in priora, seu si dextrum spectas musculum, dextrorsum decliuus ex por- R, S. rigitur, carneum euadens, latique musculi naturam ostendens, simulatque primi illius paris exter- num latus superauit. Deinde ubi primam thoracis costam contingit, in latera sensim oblique ductus, in tres ueluti digitos tripartitur, singulos tribus quatuor primarum costarum inter- uallis exporrigens, illisque sese costis inferens. Canibus porro ex eodem principio musculus iste prodit, nisi etiam altius nonnihil exoriatur, uerum ubi membraneum eius principium magis oblique, quam transuersim descendens, ad tertiam thoracis deuenit costam, carnosus latusque inibi conspicitur, qui tertiae costae, & tribus ordine deorsum ipsi succedentibus implantatur, in priora, seu in latus semper oblique tantisper descendens, donec aliquousque sub^q secundi q u ta. X: thoracem mouentis musculi principio reconditus, atque in digitos discretus finiat. Caeterum duos hos musculos, tertium uidelicet & quartum, thoracem quoque attollere distendereque in simijs est manifestissimum, quemadmodum etiam in hominibus quartum musculum eidem mu- neri praesse, tres itaque in hominibus, quatuor uero in canibus & simijs haecenus descripsi.

" Quintus igitur ordine, quo & homines distituuntur, anteriori costarum parti, qua pectoris r 5 ta. r, s, t. ossi proximae sunt, exporrigitur, paulo enim supra latus mucronatae cartilaginis, membranei ualidique ligamenti instar, super costarum cartilaginum fines, sursum nonnihil in posteriora incli- nans procedit, quousque secundae costae supersternatur. Ibidem enim tendo illae membraneo ligamento respondens, carnosus adaugetur fibris, & haec carnosus musculi pars, primae costae cartilaginis principio, & ipsius ossis fini adnata, ad superiorem eius costae regionem termina- tur. Verum non hic magnam teretemque carnem obtinet, sed tenuem utcunque, & tendinis sui modo latam, superiori ipsius sede orbicularem, & in externo latere, quam in interno, quo pecto- ris os respicit, longiorem. Tendo iste, seu ligamentum (utcumque appellare uisum fuerit) costarum cartilaginibus, quas ascendit, firmissime adnascitur, caro autem, carneaue ipsius portio, supe- riori secundae costae parti, & toti primae secundaeque costae intervallo adnata uisitur. Musculum hunc (ut in abdominis musculorum enarratione admonui) nullum peculiarem esse arbitror, nam recti abdominis musculi portio, quantumuis accurate dissecanti apparet. Videtur enim carnosus^s recti musculi pars, quae paulo supra mucronatae cartilaginis latus consistit, in hunc s 5 ta. A. membraneum ualidumque tendinem definire, atque ita sursum conscendens denuo carnosus sine pri- mae costae inferi, eiusque musculi naturam referre, qui maxillam inferiorem deorsum trahit, qui in t 5 ta. H, I. medio tendinis speciem exprimens, duobus uentribus donatur. Aut si haec costis exporrecta portio, recti musculi pars non censenda sit, nemo illius termino hanc firmissime connatam, aut potius ex ipsa enata ibit inficias. Vt cumque uero res habeat, siue peculiaris sit musculus, siue recti portio, eiusdem semper functionis opifex erit, nimirum uerarum costarum terminos pectoris ossi coarticulatos comprimendi cōstringendi-que, ob idque & thoracem arctandi. Caeterum quum in hominibus mihi nunquam uisus sit (uti neque ijs, qui Galenum praecesserunt, Anatomicis sese in hominum cadaueribus exercentibus) hominis duntaxat tres musculos haecenus recen- sui, in simijs uero & canibus quinque, atque id adhuc ea conditione, ut reclamantibus oculis, quintum musculum à recto abdominis distinctum recenseamus. " Sextus igitur simiarum, u 12 ta. A u & quartus hominum, ad dorsum mouentium musculorum latera, costarum radicibus, & t 4. Q. 13 ta. O, O. transuersorum uertebrae processuum apicibus exporrigitur. " Originem enim ducit cum x 12 ta. K. longissimo

Quartus mu-
mero, humani
autem thora-
cis tertius.

Quintus ca-
num, quo hu-
manus thorax
destituitur.

Hominis
quartus, simi-
arum 6.

712 ta. r. 12 ^{tab. N.} Longissimo dorsum mouentium musculo, ex posteriori ossis sacri regione, & interiori ilium
 212 ta. à K ^{ad L.} ossis sede, quam extra sacrum os in posteriora prominere nouimus. Hinc cum undecimo dor-
 sum mouente musculo, transuersis uertebrarū lumborum processibus innixus, sursum dedu-
 citur, tam pertinaciter ² toto per lumbos ductu illi musculo cōmixtus cōnatusq̃, ut meritò ip-
 sius pars cēseri queat, neque facile ab ipso sectione dirimi possit. Quū primū uerò uterq̃ du-
 odecimā thoracis respicit uertebrā, sextus hic musculus à dorsum mouente undecimo, notatu
 digno interuallo abscedit adeò, ut inibi incuriosè secantibus ex illo principiū sumere uideretur.
 Hinc modicè obliquus sursum in latus conscendit, & decem superioribus costis, ex carnosa
 sua substantia ³ tendines paulò minus toto teretes pullulat, non perpetuò carnis cōstans parti-
 bus, quantunuis etiam Galenus hunc undique carnosus partibus constare in Quarto de Ad-
 ministrandis sectionibus libro prodiderit. Inferuntur autem illi tendines costarum ^b tubercu-
 lis, quæ ex ipsis paulò postea, quàm à transuersis uertebrarum processibus abscesserunt, extube-
 rare relatum est. Cessat autem musculus hic ad primam thoracis uertebram, interdum tamen
 adeò conscendit, ut & transuerso septimæ ceruicis uertebræ processui tendinem quoque non
 minus, quàm costis offerat. Undecimæ & duodecimæ costæ carnosus duntaxat inijcitur, quo
 enim altius musculus ascendit, eo nunc dicti tendines magis euadunt conspicui, ipseq̃ muscu-
 lus quasi à tendinum generatione absumptus, sensim gracilior redditur, eas infimas thoracis
 costas, & omnes reliquas deorsum trahens, easq̃ comprimens, ac denique thoracem arcans.
 c 11 ta. A. ⁴ Septimus musculus, homini pariter & cani cōmunis in posteriori thoracis sede, secundum
 inferiora collocatur, originem ducens membraneam latamq̃, ex undecimæ & duodecimæ ac
 aliquando decimæ thoracis uertebrarum spinis, tum aliquot etiam primarum lumborū uerte-
 brarum spinis. Principium hoc ^d musculis dorsum agētibz, & quarto humani thoracis super-
 sternitur, transuersim rectā in priora porrectum. Vbi autem septimus musculus hos transcen-
 dit, costarumq̃ ossibus committitur, statim carnis adaugetur fibris, & tandem uelut in aliquot
 diuisus digitos, nonæ, decimæ, undecimæ & duodecimæ costarum interuallis, ipsisq̃ costis sese
 inserit, implantatur uerò ipsis multò antè, quàm in cartilaginē cessant. Atq̃ hic musculus homi-
 nibz longè latior est, quàm simijs & canibus, quanuis etiam in canibus insignior, quàm in si-
 mijs uisitur, & in omnibus ferratam quoque compagem, cum abdominis ^e musculo oblique
 descendente efformat. Musculus iste retractionis earum, quibus inseritur, costarum opifex est,
 f 8 ta. B. unde etiam thoracem distendentiū numero opportunè ascribitur. ^f Octauus hominibus ac
 simijs & canibus communis, in thoracis cavitāte situm sibi peculiariter uendicat, extenditur au-
 tem per uniuersum pectoris ossis latus, sub tota uerarū costarum cartilaginum regione, prope-
 modum costarum os, exteriori ipsius latere contingens. Est autē musculus iste triangularis, ex
 duobus longissimis lateribus, & uno breui constructus, & tenuis, omniq̃ ex parte carnosus.
 Fibras fortitur obliquas, ex ossis pectoris lateribus, sursum in posteriora protēsas, nisi fortassis
 mauis asserere, ipsas à costis ad pectus, à posterioribus deorsum in priora ferri, huncq̃ muscu-
 lum huius sedis intercostalibus annumerare. Adnascitur autem omnibus uerarum costarum
 cartilaginibus, ^g illas ad pectoris os, in sinus nimirum, quibus illæ inarticulantur, attrahens,
 & eo motu thoracem quoque arcans, & costarum cartilagines inuicem colligans. ^h Super-
 sunt præter utrique lateri communem adhuc, utrinque duo & uiginti, ac deinde duodecim. In
 singulis enim costarum interuallis, quæ undecim in alterutro latere sunt, bini producuntur mu-
 sculi, unde & intercostalium musculorum nomen mutantur. Siquidem ad illorum generatio-
 nem, per totam costarum longitudinem, ⁱ ab inferiori regione superioris costæ, in superiorem
 humilioris, & in descensu proxime sedem, nervosæ quædā fibræ deorsum producuntur. ^k Et
 rursus à superiori parte inferioris costæ, aliæ fibræ in inferiorē elatioris costæ sedē oblique sur-
 sum procedunt sic sanè, ut in singulis costarū interuallis duo intercostales musculi habeantur,
 qui mutuò incumbunt, ac fibras decussatim prorepentes sortiuntur, & per uniuersum interual-
 lum semper carnosī permanent, nec ob loci angustiam in tendinē cessant. Ac proinde interco-
 stalium musculorū alios exteriores, alios uerò interiores non ineptè dicimus. ^l Externi in singu-
 lis costarum interuallis, simulatque costa ^m à transuerso uertebrarū processu, in anteriora obli-
 què prorepit, principium habent, ac fibris constant ex superiori costa, in inferiorem oblique in
 priora deorsum proreptantibus. Hunc fibrarum ductum, per uniuersa spuriarum costarum
 interualla, tam quæ inter ossa, quàm quæ inter cartilagines consistunt, exteriores musculi ser-
 uant, & uerarum costarum musculi, usque ad costarum partem, qua in cartilaginē finiunt,
 eam quoque retinent. ⁿ Vbi autē uerarum costarum ossa in cartilaginē degenerant, mox fi-
 brarum ductus uariat, ab inferioris nanq̃ costæ cartilagine, sursum in priora oblique, uersus
 superioris costæ cartilaginē fibræ inibi procedunt, donec & in hac parte exterior musculus
 b pectoris

Hominis 5
 Simiarum 7.

Hominis 6.
 Simiarum. 8.

Intercostales
 musculi uerū
 que triginta
 quatuor.

Externi in
 tercostales.

712 ta. r. 12
 tab. N.
 212 ta. à K
 ad L.
 d 12 ta. M.
 M.
 b 4 fi. cap.
 19 lib. 1 O
 uersus R.
 c 11 ta. A.
 dijs qui hac
 sede in 13 ta
 bula & 14
 occurrunt.
 e 3 ta. O.
 f 8 ta. B.
 g 3 fi. ca. 19
 lib. 1 E in u.
 aut x, aut y
 fig. 6 uel 7.
 h Specta 6
 ta. V, X. 8
 ta. D, E. &
 figuram illi
 tabule ap-
 positā, dein
 V 11 ta.
 i 6, 11 ta. V.
 k 8 ta. E.
 l 6 tab. V.
 X. 8 tab. D.
 11 V.
 m 3 fi. cap.
 19 lib. 1 à c
 per f, ad A.
 n eiusdē fig.
 à B ad E,
 aut potius
 6 ta. T de-
 in X.

*Interni inter
costales.*

*Intercostalium
musculorum mu-
nus.
In Fragmento
de Respirationis
causis.
Ad finem de
Morum musculorum.*

*Septum trans-
uersum, seu mu-
sculus utriusque
latri commu-
nis.*

pectoris ossi committitur. Externis his intercostalibus musculis id priuatim accidit, quod longe magis neruosi excarnesque uisuntur in ea costarum sede, quae a uertebis primum abscedit, quam per reliquam interualli longitudinem. deinde non solum ab inferiori sede superioris costae, in superiorem humilioris costae sedem ducuntur, uerum etiam ab externa superioris costae incipiunt sede, & in externam inferioris inseruntur. Internorum intercostalium musculorum fibrae, praedictis situm contrarium exigunt, & exteriores ad x literae similitudinem intersecant. Interiores enim musculi, quae uertebularum corporibus proximi sunt, ex inferioris costae superioris sede, in elatioris costae inferiori sedem, fibras oblique fursum in priora protensas mittunt. Hanc fibrarum seriem interiores musculi, per singula spuriarum costarum interualla retinent, & in uerarum quoque interuallis, ad eam usque costarum sedem, ubi in cartilagine degenerant, ibidem enim ilico ac interni eodem deueniunt, fibrarum ductum emutant, nam a superioris costae cartilagine, in inferioris, fibrae in priora deorsum oblique protenduntur. Atque ut semel dicam, in uerarum costarum interuallis musculi, qui inter costarum ossa habentur, omnino his, quae inter cartilagine existunt, contrario fibrarum situ donantur. quod quum pressius Arabes animaduernerent, in singulis interuallis non duos, sed quatuor musculos esse, ueterum quorundam Anatomicorum modo tradiderunt, quanquam de sex tantum uerarum costarum (quae septem numero censentur) interuallis id uere asseruerint. Nam in spuris costis, bini duntaxat musculi numerari queunt. Quum itaque sex sint uerarum costarum interualla, nihil ex fibrarum serie obstiterit, utrinque quatuor & triginta intercostales musculos enumerare, quemadmodum & ego paulo ante, quum adhuc utrinque duos & uiginti, ac deinde utrobique etiam duodecim, praeter musculus utrique lateri communem, enarrationi deesse dicerem. Intercostalium musculorum beneficio Galenus plerisque locis thoracem stringi & laxari censet, at quum duplices hi sint, exteriores expirationem moliri prodidit, quod est costas simul adducere, thoracemque comprimere, interioribus autem inspirandi munus ascripsit, quod est costas ab inuicem abducere, amplioremque thoracis cavitatem efficere. Interdum uero non sibi constans, exteriores inspirationi, interiores autem expirationi praesse uoluit, num uero, uel altera, quaecunque magis tibi arridet, harum sententiarum ueritati sit consona, diligenter (at seposito interrim affectu) perpendas, uelim. Ego enim Galeno deditissimus non ausim ilico ipsius placitis prorsus contraniti, & multo minus obiter illis assentiri, quandoquidem haecenus, qua ratione intercostales, siue interiores siue exteriores musculi, costas dirimere, ac ab inuicem deducere queant, haud quaquam comperi, quantumuis etiam uiuas Galeni sectiones animaduernerim, & primum solus mihi has, & deinde publice in scholis Patauinae ac Bononiae easdem aggressus fuerim, quae profecto contrarium potius Galeni dogmatibus probant, quam quod illis subscribant. Ad haec, intercostalium musculorum situs, figura, fibrae, aliaque omnia ad eorundem fabricam spectantia, dilucidius hos musculos inuicem costas adducere, quam laxare suadent. Exteriores quidem inter uerarum costarum ossa, & per uniuersa spuriarum interualla repositi, inferiorem costam superiori adducere apparent, interiores autem, superiorem inferiori. Deinde exteriores musculos, inter uerarum costarum cartilagine collocatos, superiorem cartilagine inferiori, & interiores inferiorem cartilagine superiori attrahere existimo. quod si sit, quid id aliud est, quam simul omnes thoracem arctare, angustioresque efficere? Neque me Hercule a ratione absolum est, ad expirationem thoracis uel arctationem, Naturam omnes musculos intercostales produxisse, quum fortiori motu impetuque ad efflationem, uocem, tussim, sternutationem, facium excretionem, ad partum facilius excludendum, breuiter ad thoracis compressionem, quam ad inspirationem indigeamus. Quauis interim musculi inspirationis autores, inuualidi pauci que sint. Iam omnes unius lateris musculos, qui in altero latere pares sortiuntur, explicauimus, ac proinde opportunum erit, orationem ad musculus utrique parti communem deflectere. Est autem is, quem Graeci *φρένας*, & *διαφραγμα*, & *ἀνω κοιλίας*, Latini uero Septum transversum, nonnunquam & Praecordia uocarunt, hic neque situ, neque forma ulli totius corporis musculo respondet, siquidem amplius est, & orbicularis, & in ipsius medio caput suum principium uel gerit. Hic enim ad amplam latitudinem exacte membraneus existit, ex quo fibrae instar linearum ex centro, ad circuli circumferentiam excurrunt, his, quibus septum inseritur, partibus exporrectae. Haec carne simplici adactae, reliquam musculi partem carnosam efficiunt, quae paulatim in progressu densior carnosiorque, pro fibrarum ductus longitudine redditur. Procedunt itaque fibrae ex membraneo circulo, ad inferiorem ossis pectoris regionem, iuxta mucronatae cartilagine radicem, deinceps aliae sese succedentes ordine, ad spuriarum costarum extrema inseruntur, non quidem exteriori cartilagine sede, at in interiori, ut costarum cartilagine simul cum mucronata pectoris ossis cartilagine, tutissimum septi transversum propugnaculum effici-

o 8 ta. E, E
ac dein figura
ra illic inter
nam pecto-
ris sedem o-
stendens.

p 7 ta. Δ.

q 7 ta. Δ. 1
fi. li. 61, l. 2
fi. R. 3 fi.
H. 4 Q. 5
E. 6 n. o. 12
l.
r 7 ta. inter
h, l, m, n.

s Insertio-
nem uniuersam
7 ostendit ta.

lum efficiantur. Duodecimæ autem costæ cartilagini non solum inferitur, sed toti ipsius longitudini carnosus adnascitur, & ad inferiorum costarum extrema, oblique ascendente abdominis musculo, & longè magis^u transuerso admodum unitur. Cæterum septi fibræ ad uertebrae dorsi prorepentes, non in undecimâ thoracis uertebra, quam spectant, insertionem moluntur, quod magna^x arteria sub septo transuerso repens, & sextus femur mouens musculus, adeo undecimæ uertebrae obducatur, ut septum ipsi connasci nequeat. Ac proinde fibræ, quas hic undecimæ thoracis uertebrae connecti oportebat, in^z duo membranae, sed perquam ualida desinunt ligamenta, seu tendines. Qui deorsum ad magnæ arteriæ latera protensi, lumborum musculis inibi coherent, & sensim arctiores redditæ, ac arteriæ nonnihil sese subijcientes, tantisper porriguntur, donec lumborum uertebrae excarnes reperiât, ipsisq; robustissimè & longo ductu inferantur. Vniuersum itaq; septum paulò minus toto orbiculare est, situm uerò obliquum exigit, nam à pectoris osse per spuriarum costarum extrema, ad eam quam diximus, in lumborum uertebrae regionem protenditur, situmq; ob id à prioribus deorsum ad posteriora uergentem obtinet. Quinetiam^a duos sortitur circulos, unum membraneum, qui caput ipsius putatur, alterum hunc succingentem, qui carneus est, uerum quemadmodum hic semper, quo costis propinquius accedit, carnosior efficitur, ita & ille, quo septi centro uicinior est, membranoser eua dit, non tamè ambo exacti circuli imaginem referunt, sed talem, qualè quis latum esse diceret, & una parte in acutum angulum cessare. Membraneus enim sursum, atq; in anteriora acutum porrigit angulum, carneus autè deorsum, atq; ad inferiora illis reticulis quam simillimus, quibus in paruè plæ ludo utimur, & præcipuè si eius reticuli capulus dissolutus, modiceq; patescens fuerit, & ipsum lignum (quo breuius & latius reddatur) non segniter parietibus attusum. Cæterum uniuersum septi transuersi corpus, duabus obducitur mēbranis, totam enim inferiorem ipsius amplitudinem, qua nutritionis organa spectat, peritonæum succingit. superior uerò uniuersa latitudo, cor pulmonemq; respiciens, tunica costas succingente obducitur. Quinetiam contra aliorum musculorum naturam, b paucis demptis, septum transuersum quibusdam foraminibus peruium est, quæ Galenus ex Hippocratis sententiâ duo esse recensuit, c unum, quod uertebrae, arteriæ magnæ, & descendenti ad uentriculi orificium stomacho uiam præbet, d alterum, quo uena caua in thoracem transscendit. Nobis uerò tria esse obseruantur, e primum, ubi ab inuicem deducuntur f ligamentorum aut tendinum illorum principia, quæ solam trāsmittunt arteriam, & finem g uenæ paræ carentis, quæ costas enutrit, & h ramos deinde sexti paris neruorum cerebri, qui ad costarum radices, sub membrana costas succingente propagantur, ac post modum iecori, lienî, renibus, intestinis & omento numerosa serie inferuntur. Si quis modò uertebrae his cum Galeno adnumerare uelit, permitto quidem, quanquam improprie admodum uertebrae septum uiam præbere uideatur, imò uix appositè, uiam, qua arteria fertur, foraminis nomine donamus, quum hæc potiùs semicirculum in septi transuersi circumferentia exculptum, quam foramen referat, septumq; uertebrae, corporum superiori seu anteriori partî, non autem lateribus committatur. i Secundum foramen, ad septi transuersi medium, uersus dextrum tamen consistit, & k uenæ cauæ in thoracem reptanti extructum est, cuius corpori septum firmissimè, membranarum ipsi obnatarum beneficio connascitur, quemadmodum & hæ membranæ reliquis quoq; quibus septum iter præbet, pertinaciter committuntur. l Tertium foramen paulò inferius, quam mediâ septi sedes est, ad sinistrum latus modicè uergens habetur, quo m stomachus, & sexti neruorum paris rami, ad uentriculi orificium dimittuntur longè profectò secus, ac Hippocrates, Galenus, cæteriq; Anatomicorum procures arbitrati sunt. Meg huic sententiæ non sectio duntaxat, sed & ipsa ratio quoq; astipulatur, arduus enim fuisset stomachi anfractus, si dorso propter duodecimam thoracis uertebra in primo foramine innixus, sursum ad priora in uentriculi superius orificium detorqueretur. Est enim primum foramen paulò inferius, quam n mediâ uentriculi regio, & ipse uentriculus ea parte, qua stomachus illum ingreditur, teres existit, neque magis uersus priora, quam posteriora stomachus cum ipso continuum corpus efficitur. Cæterum quum hæc de septi forma naturâ que dixisse sufficiat, meritò nunc ipsius functionem exequar. Plato existimauit hunc musculum duntaxat concupiscibilis, seu naturalis animæ & animosæ septum esse transuersum, Aristoteles uerò, quum has animas, unius tantum in cor repositæ partes esse arbitraretur, in hoc septum à Natura procreatum affirmauit, ut cordis sedem à uentre dirimat, & animæ originem inoffensam à ciborum exhalationibus, & caloris aduentitij copia seruet, uerum id non modò præstat, sed inter musculos thoracem mouentes, ad respirationem, ac ad propellenda uentris incrementa in primis conducit. huius officium quo thoracem mouet, obscurum est, neque sat scio, an quispiam uerè id scriptum posteris reliquerit, aut etiam illud ex proposito tradere aggressus sit. Id enim Galeno

Septi forami
na.

Septi munus

(si ausim proloqui) peculiare est, ut quum prolixissimus sit, fabula quapiam sese surripiat, atque quod maxime explicandum fuerat, quasi id non ex proposito faceret, tacite prætereat. Profecto nisi quis exactissime septi situm formamque cognoscat, & in uiuorum sectionibus ipsius munus examinauerit, id neutiquam se oscitanti offeret. Porro quantum hactenus assequor, septum transuersum proprio motu ossis pectoris inferiorē terminū, & spuriarum costarū extrema, ad suum caput tanquam ad centrū intrō trahit, nonnihil quoque sursum uellens. Septi enim transuersi caput in medio mouendarum partium reponitur, & elatiori sui capitis sedi, quæ thoracis amplitudinem respicit, nerui à ceruice decurrentes inferuntur. Quum itaque septum in se conuellitur, & spuriarum costarum extrema quodammodo ad centrū colligit, solam inferiorem, eandemque anteriorem thoracis partem, quam spuriarum costarum cartilagine constituant, arctat. posteriorem uerò, quæ ab harum cartilagine ad uertebrae usque habetur, dilatat, ac inuicem quinque inferiores costas dirimit, unā cum sexta & septima, thoracis costis, quarum etiam cartilaginibus septum applantatur. Hac igitur ratione inferiorē thoracis partem septum transuersum dilatat, ac distendit. Vt uerò quod dico, assequaris manifestius, primum utranque manū notharum costarū cartilaginibus accommodato, & ui attracto spiritu, quī intrō sursumque cartilaginū extrema uellantur, sentito, deinde hīc una manu relicta, alteram posteriori costarū regioni extēsam impone, & rursus spiritu assumpto, qualiter iuxta dorsum costæ dirimantur, & cartilagine inuicem conniueant, examinato, nisi fortassis canis, aliud uel animal ad manum sit, cuius uiua sectio septi functionem doceat. Atque in hac administratione cauendum est, ne dum animal intrō spiritū ducit, id exspirare arbitreris, quod sanè faceres promptissime, si duntaxat spuriarum costarum extremis, illisque sedibus animū adhiberes, quibus septum implatur. Neque adhuc me latet, quosdam nostræ ætatis præcipuos uiros, qui mihi interdum administranti assistere, proprium septi motum ad inferiora fieri contendere, quos præter^o neruorum insertionem, quæ ex ceruicis dorsali medulla in superiorē septi sedem perficitur, & uiuam sectionem longè euidentissimā docere oportuit, quod alium exonerātes spiritum, ualide compresso interim thorace, retineamus, non autem continuo inaspiremus, & thoracem dilatemus, quod sanè tum faciendum esset, si in thoracis dilatatione septū deorsum duceretur, ut scilicet tunc cum abdominis musculis, excretioni opitularetur. Atque id etiam docet ualidissima inspiratio, quoties illam ita moliri conaris, ut spuriarum costarū cartilagine, sursum introrsumque moueri non statueris, quandoquidē quum ui illas retines, una atque altera inspiratione facta, ita cartilaginum sedes laborat, ac si ui eam pugnis collisisses. Verū opinor & te quoque uarijs modis hæc experiri, quemadmodum & ego nunc adeo uarijs respirationibus attento, ut præ lassitudine calamus ē manibus ueniat reponendus, addā tamen, & suffocatos liquidò meæ sententiæ subscribere. His nanque quoniam distento dilatatoque thorace, septum transuersum ad superiora attractum distentumque, adeo inter secandū apparet, ut septum in thoracis amplitudinē allatum, iecur & uentriculū in thoracē trahat, difficilemque illorum sectionē nobis exhibeat, quæ tamen ilico prompta euadit, si thorax alicubi inter costas, aut ipsum septum perforetur, id enim tunc statim flaccidum, instar madidi panni deorsum concidit, ac plus, quam uoles, iecur, & uentriculū propendere finit, quod, quonā pacto fiat, illi demū non ignorant, quibus musculorum contractionis & laxationis ratio perspecta est. Hactenus omnes musculos solis costarū motibus subseruientes explicauimus, qui simul omnes in simijs numero sunt octuaginta quinque, hominibus autē octuaginta unus. Quū uerò & his octo abdominis musculos, in thoracē cōprimētium classem prorsus reponendos subnectimus, in homine omnes sunt octuaginta nouē, in simijs autē tres & nonaginta.^p Obliqui enim descendentes si tendantur, admodū humiliorem thoracis sedē cōprimētes, thoracē arctant.^q Recti uerò, cū oblique ascendētibus costas deorsum trahunt, thoracemque non parū cōstringunt.^r Transuersi autē intrō costas adducētes, ad arctandum thoracem faciunt. Porro eos qui brachiū & scapulam mouent, parum etiam thoracis motibus auxiliari, aliquis arbitrari posset, si aliquando thoracē fortius cōstringerent. uerū ita longē ad huc magis respirationis musculorū numerus excresceret, qui omnes, non in omnibus respirationibus simul operantur. Sed singulis respirationis speciebus, Natura proprios largitur musculos. Sunt autē primum respirationis duo genera, inspiratio scilicet, & exspiratio, & hæc rursus singula duplices partes habent. Expirationū enim alia est naturalis, & nō uiolēta, quæ nulla nisi naturali urgēte necessitate fit, alia uehēmēs & uiolēta, quam efflationē nuncupamus. Sic quoque inspiratio alia naturalis, alia ad uocis generationē, aut ad aliud quippiā uiolēta existit, atque hæc rursus differētiæ plurimum maioris minoris uel ratione inter se uariāt. Naturalis inspirationis & expirationis septum duntaxat autor censetur, abundē enim ipso contracto tenso uel, medici thoracem dilatari, inspirationēque perfici arbitrantur. deinde rursus laxato septo, thoracem sua

grauitate

*Musculorū
thoracem mouentium enumeratione, & quando illi suo fungantur officio.*

o 2, 3 fi. ca.
11 li. 4. n. n.
or 1 fi. lib.
6 p.

p 3 ta. o.
q 5 ta. Δ.
r 4 tab. π.
s 6 tab. Δ.

t 7 tab. Δ.

grauitatē promptē concidere, expirationem moliriq; affirmant. Atq; id est, quod Galenus naturalē expirationem citra musculorū opem perfici scriptum reliquit. At si aut cordis caloris *Li. de Motu musculorum.* qualitas increseat, aut ad uocē, aliud ue munus maiori indigueris aëre, mox^u primus, secūsus, & hominis^v tertius & quintus, ac simiarū canumq;^a tertius, utrinq; unā cum septo operabunt; & ex Galeni suffragio^b interiores intercostales musculi quoq; agent. Quanquam nesciam, num^c exterioribus, an uerò interioribus musculis intercostalibus inspirandi munus Galenus assignauerit. Si autem maioris expirationis efflationis ue, ad uocem, clamores, tibias ac tubas, & id genus instrumenta inflanda necessitas ingruerit, exteriores intercostalium musculi sese operi accingent, unā cum interioribus, nam & hos quoque costas inuicem adducere, thoracemq; arctare autumo. His statim in opere succedet, ^d qui in simijs recti abdominis musculi pars esse dicebatur, præterea qui ad longissimi dorsi mouentis musculi latus utrinq; porrigitur, & ^e qui in thoracis cavitae, sub uerarum costarum cartilaginibus latitat, postremo ipsi abdominis musculi, uix autem aut brachium, aut scapulam mouentium aliqui.

MUSCULORVM THORACEM MOVENT

tium administratio. Caput XXXVI.



M N I B V S musculis, quos hucusque diffecari docuimus, reiectis, musculorum thoracem mouentium administrationem à^a primo auspicabere, haud quaquam omittēs, quin simiā, aut si eius nō detur copia, canem unā operi adhibeas. Acuto igitur cultello membraneū, sed impense ualidum ligamentum, quo clauicula pectoris ossi nequitur, primū discindes, mollem nerueamq; ^b cartilaginē expendens, quæ præter cartilaginē ossibus obnatam, pectoris os & clauiculā interuenit. Ad hæc, inter reliqua huius articuli ligamenta, ualidum quoddam ligamentum inquires, quod ab humiliore clauiculæ sede enatum, illic pectoris ossi inseritur, ubi primæ costæ cartilago, pectoris ossi adnascitur. Mox clauiculam à prima thoracis costa nunc fursum, nunc deorsum reflectes, ac primi musculi originem & insertionem, simul cum fibrarū ductu cōsiderabis, & musculo dein à clauicula liberato, illum pectori adhuc adherere sines. ^c Secundus musculus, quoniam scapula modò à thorace dependet, totus sese offert, unde etiam citra aliam operam, à scapulæ basi diffecandus est, & usque ad insertiones, quas in costas molitur, deducendus. In hac administratione sedulo animaduertes, num secundus musculus à scapulæ basi in costas porrectus, thoracis motibus suppetias ferat, num uerò à costis initium ducens, in scapulam inferatur, ipsumq; moueat. atque ad hanc speculationem non mediocriter cōfert, quod in canibus, tot transuersis uertebrae ceruicis processibus illum aut inseri, aut ab eisde enasci intueberis. Adempta nunc pariter cum brachio scapula, illam aliquò repones, quo postmodum hæc ad musculorum brachium, & cubitum, & extremam manum occupantium sectionem subseruiat. Cæterum iam ^d tertium canini thoracis musculum aggredieris, & illo à uertebra liberato, ac ad insertionem diuulso, ^e ligamenti ipsius seu tendinis naturam ad amussim examinais. Quum itaque huius naturam in cane didiceris, in homine tibi is quoque quærendus est, atque ubi aliquantisper frustra illum inuestigaueris, ad ^f quartam canis, hominis uerò tertiam sectionē conferes, huiusq; membraneo principio à uertebrae, unde prodit, spinis longa sectione liberato, musculum ad suas, quibus inseritur, costas, à subiectis illi sedibus detrahes, nisi fortassis huius principium, quando capitis aggrediebaris musculos, à spina diremeris, & à ^g primo illorum musculorum pari auulseris. ^h Septimum canis, hominis autem quintum similiter à suis quoque, unde enascitur, spinis auferes, ac ipsum à dorsi hinc mouentibus musculis, & canis ⁱ sexto, hominis autem quarto thoracem mouentium, ad terminum, quo costis implantatur, liberatum thoracē appendere sines. Postquam hos prædicta modò ratione administraueris, integrū est singulos ad suum principium tuis manibus trahere, ipsorumq; motum, quo thoracem dilatare creduntur, obseruare, ac postmodum in totum à thorace illos reijcere. Ut uerò ^k quintum canis ad amussim examines, dummodo abdominis musculos aggredienti is sese tibi non obtulerit, aut eosdem nondum diffecueris, optarim te transuersa linea, recti musculi carnosam ^l partem, quæ pectus conscendere incipit, in totum diuidere, ac superiori parte hamulo aut digitis eleuata, eam à costarum cartilaginibus nouacula liberare. Conspicies enim unā cum carnosa musculi recti parte, latum illud ligamentum seu tendinem, à costarum cartilaginibus separari, atque, ut dixi, à carnosa recti parte enasci, ac quintum nobis inter thoracis motores enarratum musculum, recti abdominis musculi portionem censendum esse. Atque id quidem in canibus & caudatis simijs

*Primi admi-
nistratio.**Secundi.**Tertij canis
musculi admi-
nistratio.**Tertij homi-
nis. 4. canis.**Quinti homi-
nis. 7. canis.*

b 3 inue-

Quarti homi-
nis 6 canis.

Septi trans-
uersi.

Sexti homi-
nis, canis or-
clau.

inuenies, in hominibus autem (utpote quibus breuissimum pectus cōtigit) neuti quam, quam-
uis interim accuratè, num & is quoque musculus homini obtingat, expendendum suadeo. Hæc
intuitus, ^m quarti hominis, canis uerò sexti musculi caput, ab ⁿ undecimo dorsum mouente di-
uides, ac illum à costis omnibus dissecans, qui ipsi inferatur, inuestigabis. huius itaque fun-
ctione obseruata, & ipso musculo à thorace absciso, intercostales musculi exteriores uniuersi
manifestissimè oculis sese obijciunt. Quò autem & interiores cōtuearis, leui admodum sectio-
ne, in uno costarum interuallo, secundum inferiorem costæ sedem, conaberis exteriorem mu-
sculum diuidere, ac paulatim hamulo eleuatum, ab inferiori separare, ilico enim ipsorum natu-
ra, & fibræ occurrent inuicem contrario situ incumbentes, quanquam & interiores, aperto
thorace, rursus licebit examinare. Hortor interim, utcunque eos indagaueris, ut diligentissimè
inquiras, num & interiores, & exteriores diuersis fungantur munijs, ac illi inspirationi, hi uerò
expirationi (aut contrà) famulentur, an simul omnes mea sententia eidem muneri præfician-
tur, omnesque thoracem arctent. Quoniam autem iam antea, quæ peritonæo succinguntur, ex-
empta sunt, iecur inquam, lien, uentriculus, intestina & renes, nulla sectione adhibita, inferior
° septi transuersi pars, conspicua euadit, ubi mox duos inspicias circulos, membraneum unum,
& carnosum alterum, ad hæc tria, quæ dixi, foramina, & tendines, ligamenta ue lumborum
uertebis adnata. Vt uerò fibras ad amussim, & tendines illos, reliquamque sedem septi inferio-
rem exactius intuearis, peritonæum ab inferiori septi superficie manibus uenit dirimendum,
quod in porcis citra omne fiet negocium, in homine autem & cane non item. Cæterum ut su-
perior septi pars thoracis amplitudinem respiciens, in conspectum quoque ueniat, in homine
cultro aliquo mediocri, aut nouacula, aut paruo etiam cultello (quum cartilagine hominum,
quàm canum & simiarum molliores sint) ^p à primæ costæ cartilagine, quæ ossi ipsius costæ com-
mittitur, sectionem ad infimam usque costam, per cartilagine utrinque molieris. deinde mu-
cronata cartilagine, sinistra manu eleuata, ab inferiori ossis pectoris regione, & huius loci carti-
laginibus septum transuersum abrades. Deinceps erectis cum pectoris osse cartilaginibus,
^q membranas interiori ossis sedi connatas, ac thoracis amplitudinem intersepientes, & uenas
simul & arterias, è iugulo pectori exporrectas absecabis, donec pectoris os ab omnibus libe-
ratum, cum cartilaginibus à thorace commodè auferas. Reposito itaque paulisper pectoris
osse, à septo membranæ thoracis amplitudinem intersepientes, & cordis etiam inuolucrum, re-
scinduntur, ^r quod longè secus, quàm Galenus undique arbitratur, magna sui parte septo in
hominibus adnascitur, multò sanè aliter, quàm in canibus, & Galeni simijs. Insuper à septo ner-
uos ipsi insertos, uenam cauam, & stomachum absecabis, id à lumbis sensim cum suis ligamen-
tis abradens, liberatum uerò, ac mensæ exporrectum, rursus si libuerit, examina bis. Iam pecto-
ris os in manus assumes, atque in parte ipsius interiori, secundum illius longitudinem singu-
los utrinque ^s musculos tenues, carnosos, & amplos exporrigi conspicias, licebit hos à pectoris
osse ac cartilaginibus, nouacula acutiori liberare, & cuius motus autores sint, inquirere. Vbi
& hos absecueris, interiores intercostalium contemplaberis, ac corde, pulmone, uenis, arterijs,
stomacho, & si quæ alia in thoracis capacitatem habentur, ablatis, thoracis musculorum admini-
strationi summam manum impones.

m 12 td. A.
n 12 td. N.
13. tab. r.

Pete hæc ex
8 tabula.

o 7 td. A.

p uti factū
est in 8 ta-
bula.

q Hæc pe-
tes à 2 fig.
lib. 6.

r Specta se-
riatim 3 et
4 fig. lib. 6.

s 8 td. A.

DE THORACIS LIGAMENTIS.

Caput XXXVII.



DIGNIORA notatu thoracis ligamenta, ad duodecim thoracis uerte-
bras spectant, unde & hæc cum reliquis dorfi ligamentis examinanda ue-
niunt. Costis autem ad uertebras nullum peculiare ligamentum obdu-
citur, præter membraneum, articulis omnibus commune, quod hîc du-
rissimum est, & cartilaginis naturæ particeps, atque id potissimum ^a in-
ter transuersi processus radicem, seu primæ costæ ad uertebam articu-
lum, & transuersi processus apicem, uel secundum articulum accidit.
Cartilagine ipsi costis non alligantur, uerum uti dictum est, ipsa costarum ossa in illas de-
generant. Pectoris ossi, qua cartilagine ipsi oblongis capitulis inarticulantur, nulla quoque
propria adsunt ligamenta, nam duntaxat membraneum obtinet alijs articulis commune. Ni-
hil enim pectoris os, in ligamentis sibi peculiare uendicat. Verum ut & cæteris ossibus, mem-
brana quædam, quam quòd os ambit, *μυρίαση* Græci uocant, pectoris ossi obducitur, at-
que hæc ualida ac quasi duplicata est, & hanc etiam ipsæ costarum cartilagine, unà cum co-
starum

a 3 fi. ca. 19
ab a ad c.
atque ita ex
ossium sedi-
bus ligamē-
torum pte
naturā, quæ
quum mem-
brana sint,
picturis no-
stris propo-
ni nequeunt.

starum ossibus communem exigunt. Atque hæc in thoracis constructione illa est membrana, quæ Veteribus Altera costas succingens tunica nuncupabatur, ut scilicet una sit continua, totam ambiens thoracis cauitatem, peritonæi naturam seruans, altera autem singulis costis propria, ipsisq; & pectoris ossi omni ex parte obuoluta. Licebit itaque eiusmodi membranas & ligamenta, exiguis cultellis in pectoris osse & cartilaginibus obseruare. quæ autem costas uertebri committunt ligamenta, non nisi ablatiis dorsum mouentibus musculis, opportunè aggrediuntur.

DE MUSCULIS DORSVM MOVENTIBUS.

Caput XXXVIII.



MUSCULORVM sanè uicinitas, ilico musculis caput mouentibus illos, qui dorsi motibus præsumunt, subiungi oportuisse nobis insinuat. Verùm quum ante thoracis & abdominis musculos, dorsum agentes musculi aptè administrari nequeant, nunc primùm eorum quoque sermonem aggredi tempestiuū fuerit. In quo me Hercule (si modò in aliqua musculorū enarratione ossium cognitio necessaria sit) memoriam in promptu habere oportet, eorum quæ superiori Libro de dorsi fabrica narrauimus.

Non aliùs itaque uniuersum dorsum in ceruicem, thoracem, lumbos, sacrum os, & coccyx os partientes, neque diuersam uertebRARUM articulationis rationem repetentes, neque etiam duodecimæ thoracis uertebrae, aut quæcunque ea sit, quæ supra infraq; suscipitur, & ossis sacri quietem enarrantes, quot motibus dorsum agatur, modò recenscamus. Uniuersum dorsum à capite ad sacrum usque os, instar semicirculi quodammodo in neutrum latus inclinans flectitur, deinde in rectam ueluti lineam, in neutram uergens partem erigitur, postea in latus quoque, nec antrorsum, nec retrorsum exporrectum, instar semicirculi quoque inuoluitur, ut iam quatuor simplices sint dorsi totius motus, flexio scilicet, & extensio, & ad dextrum, ac sinistrum latus inclinatio, atque hi motus (si qui alij corporis) in obliquum quoque seu in alteram partem uergentes fiunt. Flectimus enim dorsum non solum rectà, sed etiam dextrorsum aut sinistrorsum magis inclinatum. sic etiam, quum ueluti in semicirculum ad latus id inuoluimus, ad anteriora quoque, & ad posteriora, non autem solum rectà in latus, illud ducere ualemus. Rursus hos motus, uti iam diximus, totum simul peragit dorsum, aut dorsi parte, quæ sub ceruice est, quiescente, sola ceruix eisdem prorsus, quos iam toti dorso tribuimus, motibus pollet, quos non solum quiescente reliqua dorsi parte ceruix obit, sed etiam reliquo dorso, aut flexo, aut extenso, aut in latus inclinato, quandoquidem laxè admodum & priuatim ceruicem mouere hominì utilissimum fuit, & imprimis quum in contrarios oppositos uè motus reliquis dorsi partibus ceruix agi queat. Vt cunque enim lumborum uertebra una cum thorace in anteriora flexeris, atque in flexione reseruaueris, nihil obstiterit, quo minùs ceruix in posteriora ualidè reclinari extendiq; possit. Lumborū autem uertebRARUM motus, à thoracis uertebRARUM motu non admodum distinctus est, unà enim ferè mouentur, præterquam quòd lumborum uertebriis, laxior motus in omni differentia cōcreditus sit, quod tum costarum uertebriis thoracis adnexarum occasione perficitur, tum etiam musculorum, qui ipsis motibus præficiuntur. Totus enim thorax unà quodammodo in latus inclinatur, quum tamen singulae lumborū uertebrae priuatim id magis possint. Verùm ut hæc omnia ossium articulatio commonstrat, ita multò maximè hos motus ipsi spinales dorsales uè musculi docent, nimis quàm frigidè, & nequaquam omnes à Galeno descripti. Erunt autem omnes utriusque lateris musculi simul in minimum numerū reducti, sexdecim, octo nimirum paribus complexi, quorum ceruicis primùm recensēbimus, ab illis qui sub stomacho latitare dicuntur, exorsi.

Quot motibus dorsum agatur.

Sedectm dorsum mouentes musculi.

Primus ac secundus, seu primus par.

Primus itaq; qui parem in altero latere secundum habet, à quintæ thoracis uertebrae corporis latere, ubi ipsi costa coarticulatur, principium sumit, quod carnem tenuēq; & acutū instar angulī uisitur, & sursum obliquè conscendens, uersus medium magis quartæ thoracis uertebrae corporis, obliquo fibrarum ductu proficiscitur. Illæ nanque ab exterioribus, sursum obliquè in interiora prorepunt adeò, ut iam ad tertix thoracis uertebrae corpus utriusq; lateris musculi ampliores facti, inuicem quodammodo uiciniores fiant, in exortu enim tantum ab inuicem distabant, quanta corporis uertebrae est latitudo. Atque hanc seriem (ut scilicet ex inferioris uertebrae corporis latere, principium seu explantationem ducant, atque magis uersus medium superioris uertebrae corporis insertionem moliantur) perpetuò seruant, quousq; sensim mutuò appropinquantes, ad anticam primæ ceruicis uertebrae sedem usq; conscenderint.

• b 4 scenderint


Figura cap.
14 li. hæc
ferè propo-
nit.

a Scorsim
singulos ad
notabimus.
b 7 tabu. E
aut 14, 15
A, B.
c 8 ta. A, B.
7 ta. C, C.

scenderint, cuius ibidem extuberanti^d processui, nervosa insertione simul ambo coeuntes, tanquam trianguli uertice inseruntur, non admodum manifeste occipitis ossi, ad anteriorem dorsalis medullae foraminis^e sedem implantati. Ego hos musculos duorum duntaxat loco, ut scilicet unus utrinque habeatur numero, quamuis ex Galeni sententia singulos, duorum uice, aut trium etiam nonnulli enumerasse uideantur, quod quibusdam (uti opinor) inscriptionibus, secundum ipsorum fibrarum ductum exporrectis, instarq; albae lineae apparentibus animum attenderint. quamuis interim haec neque semper eadem, neq; tam paucae appareant, ut eorum beneficio utrinque solum duo tres ue recenseri possent muscoli, deinde etiam longe minus penetrant, quam ut in plures musculos alterius lateris musculum distinguere possent. At si muscoli principijs insertionibusq; dissectionum Proceres attenti fuere, multo pluribus, quam tribus musculis hic noster conformaretur, nam tres muscoli ad tres superiores thoracis uertebras ducerentur, & septem ad septem ceruicis, quare longe satius est, utrinq; unum enumerare musculum, aut, uti iam dixi, decem. Duobus his musculis ceruix proprio motu, & obscure caput ipsum flectitur, si enim utriusq; musculi partes simul omnes egerint, recta efficietur ceruicis flexio, uertebis scilicet mutuò sese succedentibus, at si alteruter tantum in se colligatur, in contracti lateris ceruix inclinabitur, uti etiam musculi exortus, insertio, & fibrarum ductus, ipsiusq; continuïtas, luce clariùs commonstrant. Cæterum hi muscoli non solum ceruicem creduntur flectere, at etiam, uti paulò post audies, thoracis uertebras superiores. Quod uerò Galenus parum recte in Decimotertio de Partium usu hos musculos caput releuare, & sursum ducere docuerit, etiam si non prolixius id modò exequar, neminem latere sat scio. ^f Tertius & quartus, quorum alter in dextro est latere, alter uerò in sinistro, ad hunc modum habent. Dexter ex superiori exterioriq; primae thoracis costae sede, carnosus ampliusq; enascitur, ex totius nimirum dextri lateris primae costae sede, quae à uertebis ad eam usque costae ossis^g regionem pertingit, quae iam in cartilaginem degeneratura est. Musculus ex hac enatus basi, sensim arcatur, & in omnium ceruicis uertebRARUM transuersis processibus, interiori ipsorum sedi implantatur, fibras sursum oblique intrò produciens. Fibræ enim à costae regione uertebis proxima principium ducentes, in transuersum septimae ceruicis uertebrae processum inseruntur. Deinde huic sedi pro-

Tertius & quartus.

Præsentī figurā musculi, quem hic describimus, fibrarū naturā & seriē, ac latera ruditer delineauimus. Significatur *A* ad *B*, ipsius latus uertebis exporrectū, *C* ad *B*, latus secundū costā ductum. *C* autem ad *A* latus, quod ab anteriori costae sede, oblique sursum ad musculi apicem contendit.



Quintus & sextus.

Musculi 3, 4, 5, 6, unus.

Septimus & octauus.

ximè in ortu subsequentes, transuerso sextae uertebrae processui adnascuntur, atque ita continua semper serie insertionem moliuntur, ut illae tandem, quae costae cartilagini proximae sunt, primis ceruicis uertebis implantentur, totusq; musculus triangularem figuram referat, cuius primum latus primae thoracis costae exporrigitur, cui & id priuatim obtingit, quod^h foramine quodam peruium sit, quo axillari uenae, & arteriae, in brachium excurrentibus iter exhibet. Secundum autem latus ad ceruicis longitudinem, ipsiusq; in transuerso processus insertionem fertur, tertium uerò, à costae cartilagine, ad transuersum primae ceruicis uertebrae processum. Huius musculi & sui coniugis functionem orationi adijciam, ubi quintum & sextum expressero. ⁱ Quintus itaque, qui sextum in sinistro latere sibi parem sortitur, principium in dorso assumit, ex transuersi sextae thoracis uertebrae processus radice, ad primum eius uertebrae posterioris processus, seu spinæ exortum. Hinc ascendens ex reliquarum quinque superiorum thoracis uertebRARUM transuersis processibus enascitur, sensim crassior ualidiorq; redditus, quousq; admodum pertinaciter in externam sedem transuersi processus septimae ceruicis uertebrae, insertionem tentet, huic enim primum musculus inseritur, & deinde reliquarum omnium ceruicis uertebRARUM transuersis processibus, ad^k exteriorē eorundem sedem, quanquam inualidam, & non admodum patentem, in transuersum primae uertebrae processum implantationem (ut neque etiam tertius musculus) perficiat. Quinto itaq; & tertio musculo, qui dextris uertebRARUM processibus inseruntur, ceruix duntaxat in dextrum latus inclinatur, recto quidem ductu, utrisque musculis unà laborantibus, obliquo autē, alterutro duntaxat se colligente. Tertius enim, quiescente quinto, in latus quidem, sed magis antrorsum ceruicem inclinat, quintus autem in posteriora magis. ^m Septimus musculus, cui in sinistro latere octauus respondet, à septimae thoracis uertebrae spinæ radice, deinceps & à reliquarum succedentium uertebRARUM spinarum quoq; radicibus, ubi inuicem uertebrae articulantur, principium sumit, non autem à spinarum lateribus, quaeⁿ musculo occupantur, quem decimumquintum enumerabo. Quando septimus hic musculus sensim ad ceruicem exporrectus, infimam ceruicis uertebrae contingit, uehementius ampliori q; sede ab illa enascitur, & obscuram admodum insertionem illarum fibrarum, quae à thoracis uerte-

d 2, 10 fig. cap. 15 lib. 1 M. e 1 fi. ca. 15 li. 1 G.

f 7 ta. G. 8 C. 14 ta. N.

g 1 fig. 19 ca. li. 1 A, B elatissima.

h Id expressimus in tabulis epitomes horum librorum.

i 13 ta. H.

k 9, 10 fig. ca. 15, li. 1 Z. e 8 fi. cha. 5, 6. l 2, 3, fi. ca. 5 lib. 1 S.

m 14 ta. O. 13 ta. I.

n 14 ta. Y.

o 7 fi. cap.
15 lib. 1 f.

uvertebris originem duxere, in illius uvertebræ spinam molitur. Reliquis autem ceruicis uertebrarum spinis ualidè innascitur, atque ab earundem transuersorum processuum radice, noua semper initia educit, enatas perpetuò fibras spinæ superioris uvertebræ tantisper inferens, donec ualidissimè in totam^o inferiorem spinæ secundæ ceruicis uvertebræ sedem implantetur, dexterq̃, musculus sinistro coniungatur, uti et toto per ceruicē progressu mutuò accumbunt, hærentq̃, duntaxat uvertebrarum spinis inuicem dirempti. Horum musculorum fibræ, non prorsus rectà sursum conscendunt, uerùm ab exterioribus sursum modicè intrò feruntur, quare etiam & hi quoq̃ musculi obliquis præsumt motibus. Si enim septimus unà cum octauo cōtrahatur, recta ceruicis peragetur extensio, aut sinistro laborante, & quiescente dextro, sinisterorsum extensio fiet. Quemadmodum solius dextri lateris musculo contracto, in dextrum quoque latus ceruix magis extenditur. Atque hi omnes, ceruicis potissimùm famulantur motibus, ac inter musculos caput agentes subinde recensentur, etiam si caput secundariò duntaxat moueant.

p 7 ta. u. 8
tab. 3. 13 v.
14 P.
q 13 tab. f.
r 14 ta. T.

^p Nonus autem & decimus, quorum utrinque etiam unus est, in illorum musculorum habetur numero, qui *Ψάα, & νευρομήτραι, & ἀλώπικες* Græcis dicuntur, quanquam Clerachus exteriores quoque, quos^q undecimum, & duodecimum, &^r decimum tertium, & decimum quartum in sermonis progressu numerabo, sic appellauerit. Quàm uerò dilucidè uereq̃ Galenus hos musculos, seu lumborum carnes (ut Interpretis uoce utar) descripserit, & num etiam simiæ, aut cani (qui hîc musculis admodum ab homine uariat) ipsius enarratio conueniat, penes te esto iudicium. Ipsa enim simiæ non admodum quadrat, & longè minus homini, quod tum demum (si modò Galeni, uti sanè debemus omnes, studiosus fueris) abundè intelliges, quando hæc nostra adhibitis sectionibus, cum ipsius oraculis contuleris. Nolo enim prolixius sermonem uera narrantem, & aliàs satis diffusum quibusdam disceptationibus hîc inturbare, id satis esse ratus, si mea hæc cum Galeno pugnare moneam. In lumbis itaque, quando iam omnia intestina simul cum peritonæo resecta sunt, in hominibus utrinque tantum^r duo apparēt musculi, quorum alter femoris famulatur motibus, alter uerò huius Capitis nonus, erit dorsi motuū opifex. Qui femoris motui præest, in Capite musculorum femur mouentium sextus habebitur, quantum nunc obiter Galeni gratia, illum & hîc describere nihil prohibeat, ut præsens sermo, Galeni de lumborum carnibus enarrationi abundè conferri possit. Ab undecimæ itaque & duodeci-

Nonus & decimus.

In Quinto, et secundo de Admi. sectio.

Qui musculi in anteriori lumborum sede de occurrant.

r unus 7 ta.
t. u. alter 8
ta. 10. 3.

s 8 ta. 4.

t 1, 2, 3 fig.
ca. 29 lib. 1
T.

u 8 ta. b.

x 1, 2 fi. ca.

30 lib. 1 a.

y 13 ta. B. 14

ta. c.

z 8 ta. A.

a 8 ta. 3. 14

ta. P.

b 3 fi. ca. 29

li. i. sedes ad

sinistru K.

K confi-

stems.

c ad Z. fi.

ca. 18 lib. 1.

d Si ex mu-

sculorum ta-

bulis ossium

seriē non as-

sequeris il-

lam ex tri-

bus ultimis

libri i. petes.


e ad elatius

K 3 fi. cap.

29 lib. 1.

mæ thoracis uvertebræ corporis latere, quo costarum tuberculum excipit, carnosus^s oritur musculus, qui etiam à duarum, aliquando & trium, superiorū in lumbis uvertebrarum corporibus carnosum similiter initium ducit, quod collectum teretem efficit musculum, ab interioribus deorsum uersus exteriora oblique descendentem, & semper quousque coxendicis^t os contingat, carneū.^u inibi enim arctatus & excarnis redditus, in teretē finit tendinem, qui tandem in^x minorem internam ue femoris processum^v insertus, femoris flexui auxiliatur. Hic musculus in lumbis modò magis, modò minus apparet liuidus, & potissimum iuxta ipsius tendinis productionem. Atque hic unus lumborum interiorū est, non quòd lumbi uvertebrarum motibus præsit, sed quòd hîc situm exigat.^z Musculum autem, qui ex ilium ossis cauitate enatus, eandem cum prædicto in femur insertionem molitur, in lumborum musculorum numerum, uti nemo, quòd sciam, & hætenus, non repono. At^a secundus lumborū musculus insignis, crassus & carnosus est, priori subiectus, sed illo longè breuior & amplior. Enascitur enim ex^b posteriori superiori^{q̃} ossis ilii cauitatis sede, quæ è regione superioris^c sedis primi sacri ossis transuersi processus habetur, deinde etiam ex tota illa ossis sacri quoque parte, musculus iste carneo crassoq̃ admodum principio exoritur, & modicè angustior redditus, sursum ad duodecimam ultimamq̃ thoracis costam protenditur, cui carnea insertionem inferiori in parte inferitur. Ab interno autem latere musculus iste^d transuersis omnium quinque lumborum uvertebrarum processibus, secundum ipsarum longitudinem, ab interna sede inferitur, lateribus etiam uvertebrarum, unde nerui primum emergūt, applantatus adeò, ut quadrangulum musculus hic cōstituat. Cuius unum latus in ilium osse, & sacro, ad exortus radicem censetur, secundū duodecimæ thoracis costæ longitudinis pars, tertium ipse lumborū uvertebræ. quartum uerò à duodecima costa, ubi iam à duodecima uvertebra aliquousque abcessit, ad externam exortus partem producit, quæ prope modum ad^e medium ossis ilium spinæ longitudinis consistit. Fibræ autem ipsius, ab exterioribus introrsum oblique ad superiora ascendant, & quæ ab osse sacro principium ducunt, quintæ & infimæ lumborum uvertebræ inferuntur. quæ autem has ordine insequuntur, sensim in superiores uvertebras desinunt. Huic musculo, qui inter dorsum mouentes nonus mihi enumeratur, & decimo, qui noni musculi cōiunx est, infe-

Præsens figura musculi, quem hic persequimur, circūscriptionem aliquo pacto proponit, & D ad B latus, quod modò primum appellatur, terminat. C ad A, secundum. A ad B, tertiu. C ad D, quartum.



*superior quæ**Vndecimus
& duodeci-
mus.
Ad finem s. li.
de Admi. secti
onibus.**Decimuster-
tius & 14.*

inferioris dorſi partis, lumborum ſcilicet uertebRARUM, ſlectendi munus concreditum eſt, ipſiq; ambo duntaxat, illius motus autores ſunt. Sed quum horum utrinq; unus conſiſtat, & is obli- quis donetur fibris, præſentes muſculi obliquam quoque flexionem molientur, prout hic ille ue ſolus in ſe colligitur. Sola itaque inferior dorſi pars, proprios muſculos flexionis opifices ex igit, quorum etiam beneficio media dorſi pars, ipſæ uidelicet thoracis uertebæ, ^f quorum cor- pora ſunt excarnea, nō nihil inclinātūr ſuperioribus ſcilicet, unā cū ceruice, inferioribus uerò, ſimul cum uertebriſ lumborū inflexis. Quanquam non ineptè fortalliſ quiſpiam dixerit thora- cis flexioni (quæ non niſi uniuerſo thorace ſimul inflexo perficitur) etiam ^g rectos abdominis muſculos, thoracē deorſum trahentes, ſuppetias ferre. Superſunt ad huc enarrationi ſex mu- ſculi, in utroq; latere terni, in exteriori dorſi ſede repositi. ^h Vndecimus itaque & duodecimus dorſum mouentium utrobique ſunt ſinguli, & ſoli duntaxat ex ſex adhuc recensendis Galeno co- gniti, quanuis etiam neque undecimi ſeu duodecimi (quum par utriuſque ſit ratio) deſcriptio- nem rectè nobis tradiderit. Vndecimus enim, quem in dextro latere, uti duodecimum in altero reponimus, ex longioribus totius corporis eſt ⁱ muſculis, ab infima nanque offis ſacri ſede, ad primam uſq; thoracis uertebRAM exporrigitur, illi thoracis ^k muſculo natura ſimilis, quem ipſi in exortu, & in lumbis progreſſu connatum, atque in omniū coſtarum radicibus, ubi primum à tranſuerſis uertebRARUM proceſſibus abſcedunt, inſertionem moliri diximus. Hic enim dorſi muſculus, de quo in præſenti ſermonem inſtituimus, ex totius offis ſacri ſpinæ ſummo, ſecun- dum ipſius longitudinem, & deinde ex ſpinis quinque uertebRARUM lumborū, nerueo ualidoq; admodum principio enaſcitur, quod ^l illi, quem in tota ſerie decimumtertium appellauimus, inſternitur. At principium id tota quoque offis ilium interna ſede, ^m quæ extra tranſuerſam offis ſacri regionem prominet, carnoſum omnino educitur, & ut ſedes, à qua muſculus exo- ritur, acuta eſt, ⁿ ita quoque acuti inſtar anguli muſculus uiſitur. Hinc ſurſum aſcendens, atq; ueluti dicebam, admodum neruoſus craſſuſque, ab offis ſacri & uertebRARUM lumborum ſpinis principium ducens, carnoſior paulatim ad externū ipſius latus efficitur, tranſuerſis lum- borum uertebRARUM proceſſibus inſertus, ac ueluti teretis muſculi imaginem ^o carnoſa ſua ſede exprimens. Si enim & ^p neruoſo ipſius, quod ex ſpina pendet principio attenderes, latior mul- tō quàm profundior dicendus eſſet, attamen externa ipſius ſede læuiſ æqualiſ ue eſt, inter- na autem parte, propter ſuę carnoſæ partis craſſitiem, & neruoſæ tenuitatem, ſecundum ipſius longitudinem ^q ſinus quodammodo illi inciuſ uidetur, quo decimotertio nobis enarrando muſculo cedit, & locum porrigit. Vbi uerò ad undecimā uſq; thoracis uertebRā conſcendit, arctior longè redditus, neq; reliquis ſuperiorum uertebRARUM ſpinis adeò connatus, ſenſim ad primam uſque thoracis uertebRAM anguſtior redditur, tranſuerſis omnibus thoracis uertebra- rum proceſſibus innixus, quibus ſingulis ex interna ſua ſede, ^r tendinē inſtar anſulæ cuiuſdam exporrigit, ipſorum proceſſuum apicibus, & ueluti coſtæ cum ipſis articuli termino inſertum pari omnino modo, quo ^s quartus hominiſ thoracem mouens muſculus, qui coſtiſ ſingulis tendinem quoq; offerebat, uerūm iſ thoracis muſculus ab externo ipſius latere eiufmodi ten- dines remotiùs à ſe diſpargit. Dorſi autem muſculus, non ex altero latere, ſed potiùs ab interna anteriori ue ſede tendines emittit, non recto tramite, uerūm obliquè uerſus exteriora ſurſum expansos. Quemadmodū etiam muſculi fibræ, omnes obliquæ ſunt. Vnde quoq; euenit tho- racē lumbosq; horum muſculorū, undecimi ſcilicet & duodecimi ope, rectā, & etiam in latera extendi. Ambobus enim æquè contractis, tota illa dorſi pars, cui præſentes muſculi inſeruntur, in neutrum latus uergens extenditur, at altero tantum protenſo, in ipſius latus ſpina inuolui- tur extensionem experta, quod ſanè nihil minori negocio, quàm ipſa ſectio docet. ^t Decimus tertius, cui in ſiniſtro latere decimus quartus reſpondet, atque ſub ^u undecimo occulitur, ab il- la offis ſacri ſede ^x principium obtinet, quæ ab ipſius ſpina ad connexum eiùs, cum ilium offe pertinet. Atq; ut illa ſedes ſurſum aſcendens modicè lateſcit, ita muſculi huius quoque initium, infima ſede acutum eſt, & latius modicè redditum, tandem ad tranſuerſum quintæ lumborum uertebRę proceſſum ducitur, & illic reliqua ipſius ſede latior redditus, à tranſuerſis reliquarum uertebRARUM proceſſibus initium ducens, ^y ad undecimæ uſque thoracis uertebRę ſpinam con- ſcendit, & gracilior tenuiorq; factus, inibi ad undecimæ thoracis uertebRę ſpinam in acutum angulū finitur. Exortus, quem decimustertius muſculus ab offe ſacro ducit, ſui coniugis exor- tui contiguus eſt, quemadmodum etiam per reliquum in altiora progreſſum præſentes muſcu- li inuicem cōmittuntur. Vtrique enim ſeſe inter ſpinarū interualla inſinuantes inuicem internis lateribus cōmittuntur, tantū mutuò dehifcentes, quanta ligamenti eſt craſſities, quod inter ſpi- narū interualla reponi ſecundo ab hoc Capite auditurus eſ. Horum muſculorum fibræ, ab in- ferioribus ſurſum uerſus interiora obliquè aſſurgunt, & ex inferiorum uertebRARUM tranſuerſis proceſſi-

*f Oſtendit
hoc 8 ta.**g 5 ta. Δ.**h 13 ta. r. 12
ta. N. 14 ta
bula Q. R,
S.**i 16 tab. L
or Δ ac alij
ferē tibiam
mouentes.
h 12 tab. Δ.**l 14 tab. T.
m Quæ cō-
ſiſtit ad ſini-
ſtrum H, 13
figu. cap. 28
lib. 1.**n 14 ta. S.**o 14 ta. Q.
p 14 ta. R.**q 14 ta. in-
ter Q or
R.**r 13 ta. M,
M.**s 12 tab. Δ.
dein M, M.**t 14 ta. T.
u 14 ta. Q.
R, S.
x 14 ta. V.**y 14 ta. X.*

processibus, & spinarum radicibus enatae, in totam superiorum uertebrae in posteriori sede amplitudinem perpetuo sese inferunt. Quotiescunque igitur utriusque lateris musculus in se colligitur, suasque fibras contrahit, lumborum uertebrae, & si quae thoracis sub uertebra utrinque suscepta reperiantur, spinæ ad se inuicem conuiuent, earundemque interualla constriunguntur adeo, ut simul contracti musculi totam illam spinæ partem, cui committuntur, appositissime extendant. at altero in se tantum collecto, in obliquum hæc dorso pars extenditur, latera

2 14. ta. Y. lemque illam in semicirculum quodammodo inuolutionem patitur. ² Decimusquintus & decimus sextus, utrinque etiam unus, ab undecima thoracis uertebra ad primam usque ipsius protenduntur, totam spinarum amplitudinem, quæ ab ipsarum radice ad apicem usque constitit, amplexantes, & uti postremo loco dicti, omnino carnei, sed ualidissimis neruosisque fibris admodum intertexti. Hi musculi ^a ad duodecimam thoracis uertebrae, aut ad eam, quæ utrinque suscipitur, tenues sunt, quemadmodum decim tertij quoque ad eandem uertebrae insertionis tenuis prorsus uisitur, at sursum exporrecti paulatim crassescunt, ^b quousque ad quintæ thoracis uertebrae spinam ascendunt. hinc enim tota sua mole crassiores euadunt, & sursum ten-
a iuxta X
14. ta. que suscipitur, tenues sunt, quemadmodum decim tertij quoque ad eandem uertebrae inser-
b Ad Y 14. tio tenuis prorsus uisitur, at sursum exporrecti paulatim crassescunt, ^b quousque ad quintæ
ta. thoracis uertebrae spinam ascendunt. hinc enim tota sua mole crassiores euadunt, & sursum ten-
c propter a
14. ta. si, denuo ^c extenuantur, ut propter primæ thoracis uertebrae spinam, paræ crassitiem, cum illa,
quæ ad undecimam est, fortiantur. His quoque musculis interualla spinarum opplentur, & inui-
cem inibi contigui sunt, quum inter illos, ut & in lumborum uertebrae spinis, nihil mediet,
præter membraneum ligamentum à superiori spina, in inferiore porrectum, & illo ligamento
d 7. ta. V respondens, ^d quod inter radium ac ulnam, & tibiæ os ac fibulam, quæ hæc ossa inuicem dehi-
inter S & scut, haberi dicam. Functio uero horum musculorum potissima est, spinas, quibus inseruntur,
T. mutuò colligere, atque ita eam dorso partem, cui adnascuntur, cum reliquis musculis extendere.
Sed ut presentes musculi inter reliquos dorso motuum autores, rectis fibris magna ex parte do-
nantur, ita quoque ipsi admodum modicè obliquis motibus præfunt.

MUSCULORVM DORSVM MOVENTIVM administratio. Caput XXXIX.



48. ta. A, B.

b 8. tab. C.

c 8. tab. e.

d 8. z.

e 13. tab. H.

f 14. ta. O.

g 14. ta. Y.

DORSVM mouentium musculorum administrandi ratio iam in prom-
ptu est, si huc usque sectionis nostræ seriè obseruaueris. In anteriori enim
dorso parte, illi etiam citra sectionem conspicui sunt, quos ^a primum, & se-
cundum nominauimus. si uero horum ortum, & insertionem lubet ex
actius condiscere, illos à suis uertebrae paruo & acutiori cultello abrades.
Deinde ^b tertio à prima thoracis costa liberato, quæ transuersis ceruicis
uertebrae inseratur processibus, examinabis. In lumbis quoniam peri-

Administratio primi & 2.

Tertij & 4.
Noni & 10.

tonæum, & septum quoque transuersum auulsa iam sunt, si hominem diuidis, licebit musculum,
quem nos ^c primum in lumbis recensuimus, ac femoris motibus famulari diximus, suo princi-
pio à uertebrae corporibus liberare, & ad coxendicis usque os, à subdito illi ^d musculo, qui
noster lumborum secundus est, dorsum autem mouentium nonus, solis manibus diuellere, ut
omni ex parte nonus musculus in conspectum ueniat, quem ab osse ilium & sacro osse erasum,
à transuersis lumborum uertebrae processibus, & earundem corporibus, & duodecima tho-
racis costa acutiori cultello discindes, eius naturam munusque non oscitanter intuearis. At si ca-
nis, aut caudata simia ad manum sit, primò illum diffecabis, quem in illis animalibus membra-
neo nerueoque principio, à coxendicis ossis elatiori sede enasci conspicias, qui oblique uersus
interiora sursum ascendens, ac carnosâ auctus substantia, in superiorum lumborum & inferio-
rum aliquot thoracis uertebrae corporibus inseritur, dorso quoque flexioni subseruiens,
quam canes in circulum magis, quam homines moliuntur. Si enim hunc indagaueris, Galeni
de lumborum carnibus enarratio, tibi aliquantulo reddetur dilucidior. Hoc igitur quo homines
destituuntur adempto, reliquos duos canibus & hominibus in lumbis communes in cane quoque
diffecabis, ut nonnullam in illis quoque musculis differentiâ Galeni intelligendi gratia intuearis,
& mireris pariter, quid Galeno in mentem uenerit, quod subinde aliorum Anatomicorum uera
euerat dogmata, quod secus corporis humani partes docuissent, quam ipse suarum simiarum
partes obseruauerat. Atque ita demum ipse expendito, quoties propter pietatem in Galenum,
ab ipsius locis à ueritate absonis mihi temperem, eorumque uolens nullam mentionem faciam,
simulque breuitati parcem. Resupinato igitur iam cadauere, ^e quintum musculum à thoracis
uertebrae, paruo cultello continuo derades, donec illum in omnibus insertionibus conspexeris.
Huic septimus succedet, similiter à uertebrae deradendus. At in hac functione cauendum est,
ne ^f decimi quinti musculi portionem septimi loco abscindas, inuicem enim pertinaciter herent, &
decimus

Ad finem & de
Admi. dissecti
onibus.Quimi & 6
administratio.

Septimi & 8.

Undecimi &
duodecimi

decimusquintus septimi musculi principium aliquousque^h subit. Nunc nouacula, aut ualido acutioriⁱ cultello, secundum spinarum in lumbis & in osse sacro ductum, tentanda est sectio, quæ^l undecimi musculi principium à spinis liberet. Ne uerò simul^k decimumtertium (ut Galenus proculdubio in simijs alioquin ad sectionem aptissimis fecit) imprudens auferas, ac decimi partem esse arbitreris, sectio illa non altius iniicienda est, quàm ut undecimi duntaxat exortu diuidat, atq; huius crassitiem facile cōiecturabis, si paruo cultello musculū à tranuersis lumborū uertebrarū processibus eleues, atq; à decimotertio subleuatū, ad spinas quoq; uertebrarum illū inuertas. Hoc itaq; musculo à lumborū, & ossis sacri spinis liberato, cauendū est, ne illū thoracis uertebrarū spinis adeò connatū arbitreris, ut^l decimūquintum musculum unā cum undecimo auferas, atq; cum reliquis omnibus Anatomicis hallucineris. Postquam igitur internum musculi latus, utcunque à subditis connatisq; sibi partibus diremptum conspexeris, ab ilium quoq; osse deradetur, & principio ipsius apprehenso, sensim musculum attolles, ipsum ab illis, quibus inseritur, partibus liberans, ut tandem intuearis^m tendines illos, quos à se aloēs radicis instar, in tranuersorum thoracis uertebrarum processuum apices elegantissima serie digerit. Hoc adempto, citra aliam sectionemⁿ decimustertius, &^o decimusquintus, sunt in conspicuo, ut tamen illorum naturā ad amussim inquiras, necessum est & hos quoque à uertebis sedulo deradere, quod sanè in spinæ musculis eo operosius præstiteris, quo iūdem pluribus ossibus & innascantur, & à pluribus ortum ducant. Ob quod laudandus etiam uenit rerum Opifex, qui ita musculos hos fabrefecit, ut seorsum unamquāq; dorsi partem succedentibus motibus agere possimus, ne simul uniuersum, multas actiones impedituri, mouere cogamur. Cæterum ubi & hos abstuleris, tranuersam duces sectionem, quæ sacrum os & infimā lumborum uertebam, ab anteriori sede, ad dorsalem usque medullā penetret, ut deinde inflexo unā cum costis thorace, dorsum ab osse sacro diuidere queas, uertebrarum ligamēta iam indagaturus.

h 1 Ad 4.
tabula.
i 13 tab. r.
k 14 tab. T.

l 14 tab. Y.

m 13 ta. M.
M.

n 14 ta. T.
o 14 ta. Y.

Decimustertij
14, 15, 16.

DE VERTEBRARVM LIGAMENTIS.

Caput. XL.


Ligamenta
uertebrarum
corpora com
mittentia.
Li. de Offi
bus.



LIGAMENTA primam uertebra capitū, & secundam primæ, & secundam rursus capiti colligantia superius enarraui,^a quæ autē reliquas uertebras inuicem cōiungunt, nunc pertractabo, ab illis, quæ uertebrarum corpora colligant, sermonis facturus initium. Inter secundæ itaq; & tertiæ uertebræ ceruicis, ac deinceps inter reliquarum omniū uertebrarum corpora,^b substantia quædam reponitur, quam Galenus Cartilaginem uocat, & qua uertebras inuicē haud colligari, aliter, ac qui illum præcesserunt dissectionis Proceres, asserit. Nam nō huius cartilaginis beneficio ipsas cōmitti uult, uerū tertiæ dorsalis medullæ tunicæ inter uertebrarū corpora se insinuātis interuentu. Cuiusmodi uerò sit tertia hæc tunica, in dorsalis medullæ sermone persequar, tunc nimirū, quando præter duas cerebri membranas, dorsali medullæ proximè adnatas, uertebrarū amplitudinem (quæ dorsali uiam præbet) membrana quadā ossibus undiq; cōnata succingi audies. Eiusmodi in uertebrarum amplitudine occurrēs membrana, nihil prorsus, nisi fortassis crassitie ab illa differt, quæ quoniā ossi circūducitur, *σπίλον* Græcis nuncupatur. Num uerò Galeni sententiæ, an Veterū illorū, qui in dissectionibus, quantū Galeni scripta liquidò ostendūt, admodū fuere seduli, accedendum sit, penes te esto iudiciū. Nam & si humanū cadauer ad manū non sit, nō tamē fieri poterit, quin tibi iam à lectione surgētī, alicuius animalis dorsum mensē adhibeatur, uel etiā si pisce uescendū erit, ac proinde uel ludī causa (dum modo diuina illa Diui Hippocratis in Libro de Articulis oracula non fastidiueris) unā uertebam ab alia seiungito, & quacunq; etiam corporis adhibita cartilagine, tecum perpendito, num illa uertebrarū cartilago, exquisitæ cartilaginis naturam obtineat, num uerò ligamēti cartilaginosi. Hac enim ratione manibus pedibusq; in Veterum sententiam, relicto procul Galeni placito, iturus es, neq; tibi persuaderi sines, membranam quandā, cuius beneficio uertebræ inuicem cōnecterētur, duci inter uertebræ os, & cartilaginem hanc ligamentosam, fibrosam, mollem, mucosam, neq; cartilaginis modo solidam cōtinuam ue, ne fortē duntaxat de duritie loqui uideamur. Quum tamen hæc ex

a Neque
hæc etiam li
gamenta se
cus, quàm
quis ad ossi
um circum
scriptionem
figere pos
set, propone
re nobis li
cuit, quare
etiam ad of
fate conse
res.
b si. ca. 14
li. R, R.

Ut leuiori negotio, quæ
hic pertracto, assequaris,
duas è thorace uertebras,
anteriori facie ex puerili
corpore depictas habes. In
quibus 1 notat superioris
uertebræ cartilaginē, sui
corporis inferiorē appen
dicem, ipsumq; corpus in
teruenientem, 2 eiusdē uer
tebræ humiliores appendicem, 3 cartilagineū ligamentum,
superioris inferiorisq; uertebræ appēdices intercedēs, 4 su
perioris inferioris uertebræ appēdicem, 5 cartilaginē, di
ctam modo appendicem suæ uertebræ copulantem.



pendes

pendes, sedulo cauendū est, ne in agnī aut hœdī, aut recens nati uītuli spinā incidens cartilago, inter appendicē corporis uertebrae, & ipsum corpus reposita, tibi imponat, illamq; cartilaginem eam esse arbitreris, de qua hīc sermonē instituimus. Quin potius in illis uertebis perpendito tres cartilaginū, ut sic dicā, ordines duobus ossibus inter duas uertebras dirēptos, ac postmodū illis ordinibus animaduēsis, cartilaginū naturas obserua, firmitusq; adhuc Veterū dogmati subscribito. Conspicies enim duas cartilagines inter utrarunq; uertebrarū corpora, et ipsarū appendices positas, ad amissim esse cartilagines, nihilq; ab illis differre, quæ reliquos appendices & ossa interueniunt. At cartilaginem inter appendices mediā, profectō (nisi Galeni nomine oculis parū fidas tuis) nihil prorsus aliud quā ligamentū esse dices, quod Asclepiadū familiæ, quæ pueros suos in cadauerū sectionibus tanta cura exercebāt, *νδρροχονδρῶδιν συνδῆσµα* appellarunt, atque huius interuentu, non autem tertiæ dorsalis medullæ tunicæ, uertebrarum corpora colligari astrues, nulla interim interueniente membrana. Quapropter si Veteribus accedis, inter ligamenta cartilaginis natura pollentia, has uertebrarū cartilagines cōnumera. Ceterū alijs adhuc ligamētis uertebrarum corpora colligantur, per totā enim dorsi longitudinē, ualidissima ligamēta toti uertebrarum corporū ambitui obuoluuntur, quæ etsi undiq; crassa, spissa & robusta, sed mucoso interim humore oblita sint, attamē in anteriori corporis sede ad utrūq; latus, ob sui crassitiem conspectiora euadunt. Quum itaq; hæc ligamenta, aut si unius nomine omnia complecti uelis, ligamentum hoc durum forteq; euaserit, et omnibus uertebis ex quo obducatur, obstaculo sanē est, ne in extensione dorsum nimiū porrigatur, incuruetur ue. Dorsum enim si plurimū reflecteretur, stomacho, arteriæ magnæ, & uenæ cauæ fuisset summē noxiū, plerunq; enim hæc extensa frangerentur, & si plus satis laxa, et ad extendendū prompta hæc Natura creasset, in dorsi flexu in se cōplicarentur. Est itaq; ligamentum id ita in duritiē temperatum, et suo mucore, ut Hippocrates dicebat, imbutum, ut tantum extendi dorsum permittat, quantum homini sit ex usu, & ut tutō simul uertebras colliget, & dorsum ex tot conformatum ossibus, unius corporis modo efformet. Rursus ex singulis transuersis processibus in singulos, membraneum ligamētum tota interualli amplitudine porrigitur. Sic etiam in spinarum interuallis, ab una spinā ad alteram, membranea ligamenta continentur, spinas inuicem colligantia, & ueluti musculorum interstitia. At in uertebrarum apicibus hæc membrana adeo crassescunt, ut ad apicem simul cōeuntes quasi toti dorsi spinæ ligamentum constituent, cartilaginis etiam naturæ compos. Deinde ubi ascendentes uertebrarum processus descendētib; coarticulantur, membranea quoque ligamenta (sed perquā ualida) articulum undique ambiunt. At priuatim quoddam idq; subflauum ligamentum, omnibus corporis ligamentis si non robustius, profectō saltem non inualidius, inter singulas uertebras habetur. Ex internā enim sede foraminis uertebæ, quod dorsali medullæ exsculptum est, ad radicem spinæ posteriorisue uertebæ processus inter duos ascendentes, aut descendentes processus ligamentū exoritur, quod semper in subsequētis uertebæ eandē sedem inseritur. Quod uerō nihil intersit, nū à superiori uertebra ad inferiorē, aut contrā, ab inferiori in superiorē ligamentū inseri dicā, cuius manifestum esse arbitror, nam etsi hinc ligamētum enasci, et illic inseri dixerō, neminem ambigere putarim, utrunq; os, seu utrumque, qui enarratur, locum, parem operam ad ligamēti generationem conferre. In canibus, & illis animalibus, quæ rictum tergo leui opera accōmodant, & longē laxiores ceruicis uertebrarum articulos, & etiam longiores ceruicis uertebras, quā homo obtinent, ligamentum quoddam obseruamus, cuius naturam Galeni gratia hīc non grauabor subiungere. In canibus igitur simulatque secundum par musculorum capitis motibus famulantiū aggressus es, in ceruice ligamentum sese offert rarum, & nulli in uniuerso corpore respondens, nisi fortassis illis uertebrarum ligamentis, quæ postremo loco recensui mus, id enim cæteris durius est, & colore flauum, & in fibras multas dissolui potest. Enascitur autem id ex apicis septimæ ceruicis uertebæ spinæ lateribus, & sursum ascendens, nulli connascitur uertebæ, quousque ad secundam ceruicis pertigerit, cuius spinæ lateribus in summo apice inseritur. aliquibus quoque animalibus, ut ouibus, occipiti ossi inseritur. Ligamentum hoc peculiari inuolutū est membrana, geminūq; apparet ob impressionē illius longitudini exporrectam. Porro huius ligamenti naturā discere licebit, quoties uītuli, aut porcelli, aut hœdī, aut uetustioris etiam bouis ceruix mensæ apponitur. Est enim ligamentum hoc, flauum illud corpus, quod ex carnibus liberatum canibus offerre solemus, nam inter reliqua corporis ligamenta solum tanquā esui ineptum reijcitur. Vnde etiam à robore Bruxellensibus Vuas nuncupatur, qui huius esum puellis ad comam prolxiorem cōciliandam commendant, hinc opinor ipsas ridentes, quod uelut in comam inter reliquas corporis partes dissoluatur, et præterea flauī pallidiq; coloris uisatur. hoc præcipuo usu accommodum est, ne uertebæ ceruicis suo

*Ligamēta a
lijs sedibus,
quā ad cor
pora uertebra
rum posita.*

*Propria ca
num ligamen
ta.*

Administra-
tio ligamentor-
um.

loco promptè exilient, quum illæ laxè admodum coarticulentur, & præ cæteris uertebis admodum obliquè agantur. Atq; ita etiam in bobus secundum totius dorsi longitudinem ferè, utrinque unum amplum huius naturæ ligamentum, inter musculos dorsum mouentes occultatum, secundum spinas ferri conspiciamus, quale Galenus hominibus ferè in Libris de Partium usu tribuit. Ligamentorum dorsi administratio peculiare nihil obtinet. Quum enim spinæ dorsales uel musculi omnes adempti sunt, in anteriori dorsi parte, secundum omnem corporis uertebiarum circumferentiam, membranea illa duraq; & mucore quodam imbibita ligamenta in conspectu sunt, quæ cultellis paruis transuersim ipsis subditis, à uertebiarum corporibus liberare potes, non præteriens haud unum hîc simplexq; ligamentum apparere, at ueluti multas membranulas inuicem incumbentes adnatasq;. Postmodum costis à uertebis dearticulatis, earum quoq; ligamenta inspicies, quemadmodum & membranea illa transuersorum processuum et spinarum interualla occupantia. Vt uerò ad amussim cartilagineum inter uertebiarum corpora ligamentum uideas, aliquot uertebre inuicem sunt cultro aliquo dirimendæ. Dum uerò uertebas, quarum corpora iam seiunxisti, in spinam reflectis, & dorsalem medullam extrahis, tunicam membranæ uel, uertebiarum cavitatem sublinentem intueris, atq; uertebis ab inuicem prorsus dissectis, ualidum illud ligamentum occurrit, in medio ascendentium descendentiumq; processuum locatum. Reiectis nunc uertebis, & aliquò quod adhuc ex reliquo corpore superest, reposito, scapulam & brachium, quod reponi antea uolebam, repetes, musculos qui humerum, cubitum, & extremam manum amplexantur, iam seriatim aggressurus.

DE MUSCULO NERVOSA SVÆ EXIL

litate mediæ uolæ, & internæ digitorum cuti subnato.

Caput XLI.



Lib. 1 de Ad-
ui. & 1 et 2 de
Vsupar.

QUANDO QUIDEM musculos ea doctrinæ serie exequi semel institutū est, quo in uno corpore omnes administrare soleo, commodum fore arbitratus sum, nunc musculos in summa manu, & cubito & brachio repositos priuatis Capitibus aggredi, ac postmodum communi omnium Capite, ipsorum confectionem, atque simul collectorum numerum subnectere. Vt itaque Galeni ordini in his musculis, quos cæteris omnibus prolixius descripsit, me accomodem, à musculo exordiar, qui propemodū toti depili, nudæq; manus regioni, dilatante neruosa ipsius exilitate subtenditur, ac neruoso tereti^h principio, ex interioris humeri^c tuberculi apice enascitur, medio^d duorū brachiale flexentium musculorū (qui ex eodē tuberculo prodeunt) incubens adnatusq;, nō tamen in illorū capitum medio (ut alij scribunt) repositus. Principium hoc illico carnosum crassiusq; redditū, musculi uentrem non impensè crassum constituit, qui priusquam ad medium longitudinis cubiti obliquè nonnihil, uersus mediam cubiti amplitudinem ductus prorepserit, rursus tenuis gracilisq; factus, in tendinem angustum, sed ampliorem, quàm profundiorē, & neutiquam prorsus teretem cessat. Hic ad brachialis usque radicem pertingens, sensim in brachialis interiori sede^f latescere incipit, ac summæ manus cuti, ad extremam usque digitorum aciem subnascitur. Atque id fibrosis nexibus adeò ualidis continuisq; perficitur, ut internam manus cutem à neruosa tendinis tenuitate, uel etiam acutiori nouacula liberare arduum sit. Verum interim Galeni suffragio acquiescendum minimè est, si hunc toti depili manus summæ cuti in hominibus subnasci (ut de suis docet simijs) arbitratus fuerit. Siquidem tendo mediæ uolæ cuti in palma tantum subnascitur, non autem cutem contingit, quæ obducitur^e musculo, quem paruum digitum à cæteris in obliquum abducere docebimus, neque etiam cuti subtenditur, inuestienti^h musculosam carnem, quæ primo pollicis articulo incumbens, ex pluribus muscularis constituitur. Ad hæc, nullæ huius tendinis portiones in digitorum latera excurrunt. quinimo per quam obscurè præsens tendo, internæ etiam digitorum regioni obnasci uisitur. Musculus tendinem hunc producens gracilis est, atque in cubiti medio super reliquos huius regionis, uti monuimus, exporrigitur, nullòque peculiari ligamento ulla ex parte amplexus, in summa duntaxat manu dilatescit. non enim decuisset hunc magnum extrui, quum nullius ossis motu illum præfici credamus. Vt enim cutis circumactu pertinax depilisq; hieret, ac proinde ad accuratiùs sentiendum manus aptior efficeretur, cuti internæ summæ manus, hunc tendinem substerni (sed fortè nimis) nobis persuasum habemus. Conueniebat nanque, ut manus appræhendens instrumentum, hanc internam ipsius cutem adipisceretur, non modò aggrè

Cuiusmodi in-
ternam sum-
mæ manus cu-
tem parari de-
cuit.

4 1 tab. Y. 2.
ta. h. 3 ta. n.
4 ta. n.
b 3 ta. i.
c 1, 2 fi. ca.
23 li. 1 S.
d 4 ta. unus
A, alter m.
qui etiam
9 ta. 3 indi-
catur. ubi
etiam spe-
ctabis chæ-
raft. q.
e 3 ta. k ad l.
f sub l 3 ta.
bulæ.

g 3 ta. r.

h 3 ta. p. q.

dò ægrè mobilem, cum ob alia quædam, tum maxime ob exactiorem tutioremq; corporum compræhensionem, sed & cutem totius corporis, reliqua cute sensu exactiori præditam, internæ manus sedî meritò obduci decuit. Non enim aliud apprehendēs, & aliud tangens instrumentum esse oportebat, neque denuo aliud quidem, externa corpora leuando & transferendo, aut omnino pertractando assumere, aliud uerò post hæc de apprehensorum calore, frigore, duritie, & mollitie, alijsq; quæ tactu percipiuntur, qualitatibus iudicare ex usu erat. Sed mox ubi manus quiduis apprehendit, satius fuit hanc apprehensi naturā unā cognoscere, idq; internis duntaxat partibus, quibus quoque est apprehendens organum. Si igitur propterea tangens organum oportuit eam fieri, quoniam & apprehendens est instrumentum, iure manus eisdem partibus tangens, quibus apprehendens extructa est. Quanquam non huius tendinis beneficio, manus accuratum tactus sensum nanciscitur, uerum plurium neruorum auxilio, ex quibus ad singulos digitosⁱ quatuor surculos in Quarto libro propagari docebimus, duos nimirum externæ digitorum sedî, et totidem internæ, qui exteriores mole admodum superant. Confert quoque non parum ad exquisitum tactum, depilem esse interiorem manus cutem, quod eam à tendine sub illa dilatato præcipue obtinere Galenus affirmat. si enim admodum pilosa foret, nequaquam sibi appropinquantia tangeret, quòd pili nimirum tangendo corpori ante cutem occurrerent, illiusq; contactum arcerent. Quoniam autem tendo iste etiam huius regionis cutem duram efficit, cuius manifestum est, et id ad plurimos usus nobis conducere, horum itaq; gratia, tendo internæ manus summæ cuti subnatus est. Ostendi uerò non semel Patauij et Bononię hunc, quem narramus, musculum certò defuisse, ac portionem tendinum brachiale flectentium, priusquam illi brachiale ascendant, in latum tendinem desisse. Interdum uerò non ab illis tendinibus portionem, quæ lati tendinis uicem gerit, porrigi uidimus, uerum àⁱ ligamento transuerso tendinibus in interna brachialis sede obducto. Quemadmodum etiam in hominibus secus, atq; in simijs, sub pede nullus tendo dilatescit, nam à calcis osse in^m membranam enasci audies, lati tendinis naturam appositissimè exprimentem. Cæterum interim ob nonnulla Galeni loca haud colligendum est, hos tendines nerueam uel naturam, cuti citra alicuius interuentum adnasci, aut nullo interuallo cutem à tendine femoueri. Inter tendinem namq; & cutem in manu et pede, adeps plurimus cōtinetur, cuius naturam iam iam explicabo, illum aliorum Anatomicorum more carneam substantiam nuncupaturus, neq; hanc solam habent homines, imò canes plurimam quoque obtinēt. Vniuersum enim tuberculum, quod ad illorum quatuor digitorum radicem prominet, & quo pedem præcipue figunt, adiposæ eius substantiæ præsentia extuberat, ut cunq; interim adipe inter carneam membranam & cutem, simiæ ac canes prorsus destituantur.

Musculi suo tendine latescerem, non semel deesse.

Inter cutem & tendinem, adipem reponi. Lib. 2, 3 de Usu par. et 1, 2 lib. de Admi. sectionibus.

DE CARNEA SUBSTANTIA, IN

teriori digitorum regioni, ipsorumq; radicibus, & mediæ uolæ superstrata. Caput XLII.

SUBSTANTIAM præsentî Capite describendam nulla figura expressimus, neq; illam secus delineare integrum erat, quàm cutem & adipem in dextro pectoris latere fingere conati sumus in uigesimaquinta Quinti libri figura.



*a musculi n
3 tabula insigniti.*

b Spectamen ultime figure 3 et 4 libri.

ER uniuersam quatuor digitorum, & secundi tertijq; articuli pollicis longitudinem, ac quatuor manus monticulos, quos in Chiromantia ad quatuor digitorum radices reponimus, & ad uolæ medium, carneam quædam substantia reperitur, quæ inter latum^a tendinem & cutem partim interiacet, partim (sed minori portione) tendini subijcitur. Cæterum hæc substantia non quidem, quemadmodum in musculorum uentribus exacta simplæue caro existit, sed substantia quædam subalba, & (quo id aptius explicem) duriori neruosoq; adipi, seu pinguedini respondens. Opinor enim ab ossea, & neruea, quæ undecunque pinguedini huic accedit substantia, ipsam duriores effici, illius ritu, quæ in ossium articulis subinde colligitur. Præterea pinguedo hæc, frequentibus^b neruorum fibris, uenarumq; terminis adaucta, medium quippiam inter carnem & induratum adipem adipiscitur, ac etiam in summè extenuatis, & marasmode mortuis ipsius portio semper inter secandum aliter, quàm reliquus adeps occurrit. Verum Arabes hallucinantur, hanc substantiam extra musculi corpus, carnem simplicem immixtamq; esse affirmantes illorum modo,

c 2 qui

qui nescio quam, simplicem carnem in gingivis ac pene collocant. Haudquaquam enim expenderunt innumeras nervorum fibras, & capillorum modo tenues uenas, hanc substantiam intercurrentes, illamque nec colore, uel substantia, nec æqualitate continuitate uel etiam musculorum carnem (quæ alioquin tot fibris implicatur) referre. Natura huiusmodi substantiæ, quam nisi duriusculæ conglobatæque pinguedini ad amissim assimilaueris, tanquam stratum aliquod, aut terram præparauit, cui apte infiniti neruulorum surculi implantentur, quos ob exquisitum tactus sensum, à maioribus nervorum propaginibus, internam manus sedem adeuntibus diffundi undique oportuit. Cæterum, etsi hæc pinguedo durior admodum que neruea sit, nihilominus in rerum substantia mollis est, ac proinde occurstantibus cedit, et ad aliud quippiam, neque id minimum, digitis conducit. Media enim inter digitum flectentes tendines, & dura, quæ apprehendimus, corpora reponitur, & aptissimè tendines, ne aut premantur, aut contundantur, munit, unde etiam meritò huius substantiæ quàm plurimum infernæ pedis cuti subijcitur, præterea ossium rectitudinem tunc corrigit, quando in circulum manus quippiam est comprehensura. Ac proinde externæ digitorum regioni hanc rerum Opifex minimè communicauit, ut quæ ibidem inutile pondus digitis inferret, quum hæc regio, neque illo absolutissimo indigeat tactus sensu, neque quicquam in obliquum apprehendat, neque toties subulas scalpellæue, & id genus artium instrumenta propellat. Quinetiam in interna manus sede, ipsis quidem articulis minimum, in partibus uerò inter articulos medijs, plurimum huiusmodi substantiæ industrius rerum Conditor produxit. Haudquaquam enim ossium sedes, quibus illa inuicem coarticulantur, huiusmodi substantia indiguit, quum flecti debeat, & substantia ea, præterquam quòd nihil commodi præstaret, obstaculo motui fieret, tum grauans ut superflua, tum etiam articuli spacium excludens occupansque, & etiam prohibens, quo minùs articuli in acutos angulos flecti possent. Lateribus autem digitorum tantum eius substantiæ adnutriuit, quantum medias ibidem regiones, quæ uacuae mansissent, replere potuit, quo et inde manus, nò solum ut diuisum in multas partes organum, sed etiam uelut uariè indiuisum suo munere fungi ualerent. Adductis enim inuicem digitis, ita eorum media regio ab hac substantia oppletur, ut si quid etiam liquidum manu supina continere libuerit, id non elabatur. Postremò huius substantiæ beneficio extrema manus, illa mollit, subigit, & terit, quæ mediocriter mollia, molientibus & terentibus organis indigent, qualia per omnes artes sunt plurima. Quantum uerò huiusmodi substantia ad corpora summis digitis apprehendenda auxiliij præstet, nemini non perspectissimum est, quem minimè latet, si ossium finibus nihil, quod cederet, appositum fuisset, ea facile debuisse rumpi, nec illis potuisse plurima corpora eleuari. quod modo huius substantiæ, & renitentium illi unguium opera obimus felicissimè. Atque eiusmodi sunt huius substantiæ proprii usus, communis uerò; quem cum carne adipeque parem exigit, is censetur, quo æstus tempore refrigerare, frigoris uerò calefacere apta putatur.

DE MUSCULIS MANVS DIGITOS

mouentibus. Caput XLIII.

Digitorum
motus.



SSIVM quinque digitorum constructionem superiori Libro prosequentes, longè aliam articuli speciem in primis quinque digitorum internodijs, & in secundo pollicis haberi scripsimus, quàm in secundo & tertio quatuor digitorum, & tertio pollicis internodio. Hæc nanque internodia mutuò ea articuli specie ingrediuntur, quam γίγλυμοι Græci uocant. Superius enim os in sui sinum inferius excipit, ipsumque inferius in suis sinibus superioris ossis tubercula admittit. Vnde etiam simplicem tantum motum hæc internodia, seu articuli exigunt, qui extensione & flexione nusquam ne tantillum quidem in latus declinantibus perficitur. At quatuor digitorum prima internodia in articulatione cum illis, quibus sustinentur ossibus, coarctantur. Vnicus enim inferioris ossis sinus, unum caput superioris ossis excipit. quapropter etiam non simplici tantum motu, sed duplici aguntur, flexione nimirum extensioneque, & postea ad latera obliquo deductu inclinantur, seu ut semper loqui instituiamus, ad hos illòsue digitos adducuntur, uel abducuntur. Porro cuius perspicuum esse arbitror, nihil referre num flexionem & extensionem simul pro simplici motu, aut pro duplici, ut unus scilicet flexione, alter uerò extensione perficiatur, enumerem. aut rursus motum, qui in latere fit, unius loco habeam, aut duorum motuum uice recenscam, ut scilicet unus in hoc, alter uerò in oppositum latus perfici dicatur. Cæterum hos omnes digito-

a Seriatim
hanc ostendunt figuræ
ca. 27 lib. 1

digitorum ossium motus uiginti & octo musculis celebrari docebimus, à digitos flectentibus
 sermonem inchoaturi, in quo^b musculi cuiusdam brachiali inserti necessario incidet mentio,
 quem quia cum digitorum musculis numerabimus, hoc Capite nouem & uiginti describen-
 tur. Primi musculi^d principium teres, & statim ab exortu grande, ac ex carne neruea^q sub
 stantia mixtum, ex interiori humeri^e tuberculo enascitur. non quidem ex superiori magis^q
 prominente tuberculi sede, sed ab interiori sub^f musculi ad summæ manus internam cutem
 latum tendinem porrigentis, &^s duorum quos brachiale flectere audies, capitibus, præterea
 & sub^h illius ferè musculi origine, qui inter radium in prouum agentes, superior enumera-
 bitur. quanquam potius ex anteriori sede & inferius illa origine, primus hic digitorum mu-
 sculus initium ducat. Musculus iste à crasso alioquin suo exortu latior efficitur, atque uer-
 sus ulnæ radij^q medium perreptans, perquam obscure ab ipsis principij sui portionem assu-
 mit. Hinc exactè carnosus et teres, in amplitudinem tamè modicè depressus, ad brachiale pro-
 repit. Anteaquam uerò brachialis radicem contingat, notabili satis à brachiali interuallo,
 ipsius uenter in angustum magisⁱ coactus, in quatuor carnosas partes diuiditur, quæ singule
 neruosiore angustiores^q factæ, ilico in exactos tendines cessant. Hi examussim teretes simul
 communi membrana utcunque tenui & mucosa inuoluti, brachialis cum cubito articulum
 ipsum^q brachiale transcendunt, communi omnes^k ligamento in brachialis sinu obducti. Est
 autem ligamentum id ualidum, & transuersum, ex una brachialis parte in alteram pronā-
 tum, anuli^q formam (quòd ad eius cavitatem spectat) præcipuè referens, & totam brachia-
 lis sinus amplitudinem, quā ex ipsa originem ducit, succingens. Simulatque uerò tendines
 ligamentum id præteriere, inuicem diducti, tres acutos & interuallis pares constituunt an-
 gulos, & singuli unumquemque quatuor digitorum sibi præpositum adeunt, ac secundi
 digitorum ossis radici latiores membranei^q facti inferuntur, toti ossis longitudini implan-
 tati. Dum uerò primum digitorum os perreptant,^l transuerso quoque & robusto admo-
 dum ligamento obuoluuntur, quod ex uno ossis latere natum, alteri inferitur: aut potius
 id ex tota internæ ossis sedis amplitudine enatum, canalem oblongum seu anulum effingit,
 quo primi musculi tendo unā cum^m alio quem huic subiici dicemus, per digiti longitudi-
 nem securissimè deducitur, ac ne sua sede à digito declinet, eleuetur uè, pulchrè amplectitur,
 ita tamen ut tendini liberum iter citra omnem connexum per ligamentum pateat. Tendines
 enim quā primis digitorum ossibus porriguntur, neque transuersis ligamentis, neque ossi-
 bus, uel quouis pacto adnexi hærent, sed ligamenta uelut per anulos sibi laxè exculptos, mi-
 nimè impediti perreptant. Cæterum his primi musculi tendinibusⁿ ubi primo digitorum
 ossi incumbunt, & priusquam secundum conscenderunt (quanquam secus Galeno uisum
 fuit) peculiare rarumque ex abundanti id accidit, quòd longa sectione diuisi, alium ipsis sub-
 stratum transmittant tendinem, de quo statim ac præsentis musculi functionem sermoni ad-
 didero, sum pertractaturus. Functio autem ipsius est, secundum quatuor digitorum os flecte-
 re, illud brachialis medio ubi inuicem adhuc ipsius colligantur tendines, quā potest pro-
 ximè admouens. Et quemadmodum minimi digiti secundum os, cæteris digitorum secun-
 dis ossibus minus est, ita quoque & eius digiti tendo reliquis tribus gracilior uisitur, ut & il-
 la musculi carnosæ pars parui digiti tendinem promens, cæteras gracilitate superat. ° Se-
 cundus musculus^p primo subiectus ab interiori humeri^q tuberculo sub primi capite, sui ini-
 tij uix aliquam portionem assumit. Ex ulnæ enim anteriori^r processu, quo illa humero coar-
 ticulatur, secundus hic musculus potissimè enascitur, id^q præcipuè ab eius processus radi-
 ce, quandoquidem ipsius superior pars seu apex, illius^s musculi excipitur insertionem, qui in-
 ter cubitum flectentes est posterior. Secundus itaque musculus hinc^t prodiens, exactè car-
 nosus & teres (non nihil latus tamen, & ut primus modicè depressus) euadit, & mediam cu-
 biti sedem comprehendens ulnæ adhuc adnascitur, à qua exortus sui robur non modicum ea
 sede asciscit, qua ulnæ^u membraneo connectitur ligamento, inter radium & ulnam tota cu-
 biti ferè longitudine consistenti. Quando uerò musculus parum ultra mediam cubiti lon-
 gitudinem descendit, aliquanto angustior redditus, ^x in quatuor carnosas portiones simili-
 ter ac primus finditur. quæ ante brachiale in teretes cessant tendines, tanto primi musculi ten-
 dinibus spissiores, quantum secundi musculi moles primi magnitudinem superat. Hi tendi-
 nes communi membrana perquam mucosa, ac cæteris omnibus membranis rubicundiori
 inuoluuntur, simul^q cohærentes, sub primi musculi tendinibus per^y transuersum internæ
 brachialis sedis ligamentum, in manus uolam contendunt, in qua (quemadmodum primi
 tendines) æquales angulos efficientes, mox inuicem dirimuntur, singuli ad unum quatuor
 digitorum excurrentes. Quemadmodum autem per uniuersam cubiti longitudinem & bra-
 chiale

Digitos mo-
uentes muscu-
li 28.

Primus.

Lib. i de Vsu
par.

Secundus.

chiale secundus musculus primo substernitur, ita quoque primi tendinibus secundi tendines subiiciuntur, & eodem simul ambo secundum primi ossis digitorum longitudinem, transuerso ligamento obducuntur, æquè atque in uola & brachialis sinu teretes. Minimè enim ueritati consonum est, primi musculi tendinem in primo internodio, ut Galenus asserit, dilatari. Porro ut secundi musculi tendines ad tertium digiti internodium pertingerent, primi iam musculi tendinibus in secundum os necessariò insertionem molientibus, operæ pretium fuit secundi musculi tendines, aut ad tendinum primi musculi latera porrigi, aut quum ipsi rectè subiiciuntur, incumbentem ipsis tendinem perforari, hacq; ratione substratum secundi musculi tendinem transmitti. At quum ossium latitudo, ut tendines secundi musculi ad latus declinent, minimè admittit: & si fortè ad latus ducerentur, obliquum sanè situm, ac proinde obliquum etiam motum exigrent: reliquum profectò fuit, longa sectione superiorem tendinem, qui primi musculi soboles est, à summo rerum Opifice mirabili industria findi, qua sectione secundi musculi tendo uectus, ad tertij ossis radicem pertingeret. Verum etsi tendines primi musculi perforantur, ob id tamen cum Galeno neuiquam credendum est eos secundi digitorum ossis lateribus inseri, quum maximè internæ illorum sedi implantentur, ac suis apicibus post perforationem, sub secundi musculi tendinibus colligantur, & perinde ac si non fuissent perforati, sed tantum latiores redditi, insertionem moliantur. Cæterum ut in brachiali & tota primi ossis longitudine, tendines transuerso ligamento cinguntur: sic quoque in secundi ossis tota longitudine aliud ligamentum tendinem hac porrectum obuoluit, aut, ut semel dicam, eiusmodi ligamentum toti internæ digitorum sedi obtenditur, quod nulla membrana, nullo ue alio uinculo, aut fibra etiam, tendinibus in interna digitorum sede adnascitur, nec ibidem quicquam membranæ interduos tendines inuicem suffultos interuenit. In uola tamen priusquam tendines digitorum ligamenta subeunt, singuli proprijs induuntur membranulis, quæ tendinibus, quibusdam fibrosis nexibus adnascuntur. Tertius musculus à secundo mihi prorsus distinguitur, non anxie interim sollicito, num secundo illum adnumeres, ac secundum tunc in quinque carnosas partes totidemque tendines diffissum rectè proferas, dummodo uera tertij musculi descriptio subiiciatur, qui tota cubiti longitudine, superiori lateri secundi musculi exporrigitur, illi nusquam, nisi fortassis ad cubiti cum humero articulum, continuus, sed perinde ac cæteri musculi mutuò accumbentes solent, toto progressu illi duntaxat cohærens. Enascitur quidem carneo teretiq; principio ex ulnæ sede, qua hæc radij capitulum in proprium sinum amplectitur, ac ubi radius ab ulna primum dehiscit. Hinc enatus radio attenditur, uniuersæ ipsius propemodum longitudini adnatus, & ab ipso principium continuè ducens, ex ea potissimum sede, ubi membraneum ligamen secundum cubiti longitudinem porrectum ex radio ad ulnam enascitur, quod etiam huic musculo principij portionem offert. Quum uerò musculus radio ad hunc modum expansus ad brachiale properat, in teretem cessat tendinem peculiari membrana, quam mucor imbuit, obtectum, non autem communi membrana, quæ in brachialis sinu secundi musculi tendines inuestit. Quinetiam tertij musculi tendo nulli secundi musculi quatuor tendinum subiicitur, quamuis etiam per transuersum brachialis ligamentum feratur, illius ligamenti lateri attensus, quod ad pollicis radicem consistit: ubi etiam brachialis os pollicem sustinens, sinum huic tendini insculptum gerere, in primo Libro diximus. Tendo ad hunc sinum reflexus, atque medius inter musculos primum pollicis os & secundum flectentes occultatus, ad secundum pollicis repit internodium, ubi transuerso ligamento in tota secundi ossis longitudine exceptus, tertium os accedit, cui latefcens ualide inseritur. In caudatis simijs, hunc musculum non reperies, uerum à tendine secundi musculi medium digitum petente, in medio uolæ, exigua portio enascitur, quæ transuersim ad pollicem ducta, ultimo ipsius ossi implantatur. Atque hæc tendinis portiuncula, peculiarem portionem carnosam, ut cæteri quatuor secundi musculi tendines, neuiquam adipiscitur, aut etiam illi, medij digiti tendini alligatur, at ab ipso prorsus enascitur, super indicis tendinem uecta. Porro si hunc sermonem permulta Galeni placitis in primo libro de Partium humani corporis usu renitentia adduxisse animaduertes, & potissimum illi figmento, quo is pollicem non ad uolam uersus brachialis medium, cæterorum digitorum modo, sed super alios, & ad uolæ medium, flecti comminiscitur, non me inscitæ, aut in Galenum impietatis prius insimulato, quàm proprijs manibus sectionem obieris, aut alteri accurate secanti, admonitus, astiteris, rem uniuersam diligenter expendens. Reperies nanque non modò quæ iam commemorauimus, sententiæ Galeni meritò reluctari, sed & id quoque maximè, quod de secundi tertijq;

Li. de Par.
usu.
Secundi mu-
sculi tendinum
per primiten-
dines transi-
tus.

Lib. de Ad-
mi. sectio.

Tertius mu-
sculus.

Tertius quali-
ter in caudatis
simijs habeat.

Pleraq; hic
Galeni placi-
tis contraria
proponi.

z hic seria-
tim specta-
extrema:
manus 5, 6,
7 tabularii.

a 6 tab. n. 3
ta. 7 ta. b.
b 6 ta. z.

c 1 fi. cap.
24 li. 1 L. et
deu h.

d 7 ta. V in
ter 8, T.

e 6 ta. 8.
f 6 ta. z.

g 4 ta. 8.

h 1, 2, 4 fi.
cap. 25 lib. 1
processus
P notatur,
ad cuius in-
ternum la-
tus sinus
iste specta-
tur.

i 6 tab. n. 2,
7 ta. cha-
ract. 1, 2, 3,
k quasi à te-
dine 7 in 6
tab. notato
ad 8 portio
duceretur.

tertijque musculi functione subnexurus sum: ut nunc taceam Galenum suis lusum simijs, non uerè tendinem¹ tertij musculi graciliorem illis dicere, qui à^m secundo musculo producuntur. Opinatur enim Galenus, & cum illo omnis refectionis professorum chorus, secundum musculum quatuor digitorum primum tertiumque os flectere, & quem nos tertium recensuimus, secundi pollicis ossis & tertij flexum moliri: quum tamen ambo duntaxat tertij quinque digitorum ossis, ut primus secundi, flexionis reuera opifices sint. Nullum enim musculum os mouere, nisi eidem inferatur, Galeno cæterisque Anatomicis firmissimi axiomatis loco habetur. at secundi musculi tendines neque primo quatuor digitorum ossi, neque tertij tendo pollicis secundo ossi, ne obscurissimè quidem inferitur applantatur ue: ergo nec eorum quidpiam hi musculi agunt. Neminem enim fore arbitror, qui ex primo de Partium usu astruet, secundi musculi tendinem primo internodio dilatescentem implantari: quum Galenus in dissectione temporis successu exercitator, tribus interiectis de transuerso ligamento uocibus, integram paginam ibidem restituere conatus fuerit: parum tamen sui memor, quum insertiones tendinum in digitos, simul in numerum colligit. Ac proinde si beneficio transuersi ligamenti, quod in primis quatuor digitorum ossibus, & secundo pollicis existit, hæc ossa à secundi & tertij musculi tendinibus flecti, quis pro Galeno certans illiusque posteriora uerioraque sensa capiens contenderit, respondeat is quaeso, cur minus & primi musculi tendines, prima quatuor digitorum ossa flectant: quum & hi eodem ligamento contineantur. Non enim quicquam prorsus est, cuius beneficio potius secundi musculi, quàm primi tendinibus prima internodia flecti, quis demonstrare posset. Quinciam in medium adferat obsecro, quamobrem Galenus non senserit secundi quatuor digitorum ossis flexionis, tendines secundi musculi autores esse: quum tamen & in secundi ossis radice totaque ipsius longitudine hi tendines transuerso obuelentur ligamento. Ad hæc illum me docere optarim, quamobrem & primus, & secundus, & tertius digitos mouentium musculi etiam brachiale non flectant, quum & in interna brachialis sede^o transuerso ualidoque ligamento non mediocri ductus longitudine contineantur. Similiter rationem comminisci uelim, quapropter quamplurimi tibiam occupantes musculi, qui pedem aduntes, ac^p transuersis ligamentis inter tibiæ ossis extremum & calcem, ac rursus inter fibulae apicem exteriorem ue malleolum ac calcem obuoluuntur, non illorum ligamentorum etiam auxilio pedem moueant, quum tamen in his omnibus par sit ratio: uti etiam in omnibus cæteris musculis, qui transuerso ligamento in alio osse, quàm unde principium duxere, induuntur. Ac proinde plerisque in^q cubiti exteriori sede, & in^r tibiæ anteriori regione tendines ibidem ligamenti circundatos in medium, ad robur huic meo paradoxo conciliandum, non adfero. Vt itaque tres hæcenus ex digitorum musculis enarratos brachiale non flectere certo certius constat, ita quoque nisi suorum quibus inferuntur ossium flexionis opifices censendi sunt. Deinde si primi musculi quoque tendinibus prima quatuor digitorum ossa, & secunda tendinibus secundi musculi non inflectuntur, haudquaquam secundi tendinum ui, prima quatuor digitorum ossa, & tertij musculi beneficio secundum pollicis os flecti credendum est. Proprios enim his quoque ossibus sagax rerum parens Natura musculos largitur, quos ubi sermonem trium primorum absoluerò, seriatim persequar: id adhuc admonens, ut si quis fortè secundi musculi ac primi auxilio, primum quatuor digitorum os, & tertio item musculo secundum pollicis flecti arbitratus fuerit, non oscitanter cuiusque internodij flexionis uim perpendat. nam primum internodium, quod ex ipsius sententia, primi ac secundi musculorum tendinibus, præter alios totidem paulo post explicandos musculos inflecteretur, uix tamen firmiter flexionis robur, quàm tertium internodium commonstrat, utcunque etiam unicus tantum tendo huius motus dux censeatur. Tres itaque nunc dictos musculos ex dissitis regionibus, per totam nimirum cubiti longitudinem Natura produxit, ne si fortè in extrema manu principium assumerent, eam carne obruentes, magnam ponderosamque redderent: quod quantum ad uaria quæ manu obeuntur munia incommodi intulisset, quiuis promptissimè colligit. Deinde robur in flexione maius requirebatur, quàm quod breuibus musculis præstari ualebat, qui ex proximis ijs quæ mouenda erant ossibus principium ducerent. Atque hanc pariter ob causam, ut digiti scilicet ualida flexione pollerent, non unius tantum musculi beneficio tres digitorum articuli flectuntur, sed singuli proprios exigunt. Illi quidem quos recta duntaxat, & in neutrum latus inclinante flexione agi oportuit, unico eodemque ualido contenti fuere tendine: articuli autem, qui in latera etiam inclinationem experiri debebant, pluribus tendinibus musculisque, & illis non admodum ualidis (ut

*Naturæ in
musculis digi-
tos flectenti-
bus industria.*

*Transuerso-
rum ligamen-
torum usus.*

*Mucosarum
membranarū
usus.*

*Tredecim
post tertium
ordine in nu-
mero succe-
dentes.*

*Illorum octo
qui quatuor di-
gitis seruiunt.*

*Illorum duo,
qui pollicis pri-
mo ossi famu-
lantur.*

*Tres qui se-
cundo pollicis
ossi famulan-
tur.*

etiam illorum flexio infirma est) eguerunt. Porro tendinibus transuersa ligamenta secundum digitorum ossa obducuntur, ne quoties secundum aut tertium digitorum os inflectimus, tendines tanquam recti protensiq; funiculi, & uirgulæ secundum ossium flexionem non incuruatae, à flexo iam osse ad cubitum tensæ exurgerent, & cutem in miram altitudinem eleuantes manus uolam turpiter implerent. Ligamenta enim etsi tendines musculorum uentris beneficio contrahantur, eos tamen ossibus quibus non inseruntur, adiacere cogunt. In uola uerò & brachialis sede mucosis membranis tendines induuntur, quo tutiores procederent, easq; membranas tanquam propugnacula & muros fortirentur. Sed secundi musculi membranæ alius quoque usus existit, siquidem^u musculi oblongi & parui, quorum ope digitos quatuor pollicis adducimus, ab illa enasci audies. Quum itaque secundum quatuor digitorum internodium à primo musculo flectatur, tertium autem à secundo, & tertium pollicis à tertio, tandem opportunum erit, musculos prima quatuor digitorum ossa, & primum secundum que pollicis flectentes aggredi. Sunt autem hi omnes numero tredecim: ad singulos nimirum quinque digitorum primos articulos bini, & ad secundum pollicis terni. ^x Qui quatuor famulantur digitis, omnes rectà secundum postbrachialis longitudinem digitos adeunt, omni propemodum ex parte carnei, ac postbrachialis^v ossibus connati. inseruntur autem lateribus interiori in sede, primorum ossium. Duorum igitur paruum digitum flectentium^z unus ab exteriori latere superioris partis postbrachialis ossis, quod paruo prælocatur, carnosio principio oritur, etiam nonnihil inibi adnatus brachiali. Hinc rectà digitum accedens, ad primum usque digiti os carnosus permanet. ubi uerò os contingit, latiusculo tendine exterioris ossis lateri, uersus interiora tamen inseritur. Alter ex interiori eiusdem postbrachialis ossis latere, ad superius iuxta brachiale extremum, originem ducit, & inter id os & sibi proximum ad digitum tendens, carnosum quoque permanet, donec membraneo tendine interiori lateri primi ossis parui digiti implantetur. Quando utrique musculi colliguntur, primum digiti os, in neutrum latus uergens flectitur. Si uerò exterior egerit, interiori quiescente, digitus in exteriorem partem nonnihil inclinans flectitur. At solo interiori laborante, ad interiora conniuens digitus flexionem experietur. Ad hunc sanè modum aliorum trium digitorum musculi habent, adeò ut bini in singulis postbrachialis ossium interuallis (quæ tria sunt) reponantur, &^a is qui indicis interiori lateri inseritur, interno postbrachialis ossis indicem sustinentis lateri adnascitur, in uolam magis quam in externam manus regionem, ut & cæteri primos articulos flectentes musculi, protuberans. ^b Musculi autem quorum beneficio primum pollicis internodium flectitur, unà cum^c musculo, qui pollicem à cæteris digitis maximè abducere dicetur, carneam molem constituunt, quæ ad pollicis radicem reposta montem, quem chiromantici modò Veneri, modò Marti ascribunt, effingit. Galenus in Libris de Vsu partium hanc molem falso unicum esse musculum arbitratus est, quem pollicis ab indice abductionis autorem recensuit. Quemadmodum etiam ueritati parcens, ^d molem illam carneam quam chiromantici lunæ monti tribuunt, unum quoque musculum quo paruus ab alijs abducitur esse, ibidem docuit, quum interim maiorem ipsius portionem exterior musculus primum minimi digiti os flectentium procreat. ^e Primus itaque pollicis musculus ex superiori^f transuersi brachialis ligamenti sede carneus enascitur, & toti primi pollicis ossis longitudini interna regione attensus, perpetuò carneus illi inseritur, perquam obscurè secundum pollicis contingens internodium. ^g Secundus, qui nuper dicto prorsus occultitur, longèque minor ipso est, ex transuerso quoque ligamento, &^h osse brachialis pollicem fulciete enatus, in primi pollicis ossis radicem implantatur, non ultra medium longitudinis primi eius ossis pertingens. Sunt itaque hi duo pollicis musculi inter digitorum motores duodecimus & decimustertius, si modò octo musculos quatuor digitorum prima internodia flectentes ante hos enumerare uisum sit. Porro qui secundum pollicis os flectunt, ⁱ tres numero censentur, magis differentem situm ab illis, qui quatuor digitorum prima ossa flectunt, obtinentes, quàm duo primi pollicis ossis flexus opifices. Qui enim quatuor famulantur digitis, rectà secundum manus longitudinem procedunt: qui autem primum pollicis os flectunt, nonnihil obliquè ducuntur. sed præsentibus musculi secundi pollicis internodij flexionis autores, quodammodo transuersi cernuntur. Operæ precium namque erat, quatuor digitos uersus brachiale inclinari: pollicem uerò illis in functione oppositum, ad ipsos inflecti. Merito igitur tres musculi secundum pollicis os flectentes, ex uola tanquam è quarta circuli parte, principia fortiuntur, nimirum ad eius lineæ circumscriptiorem, quæ uitalis & cordis Chiromanticis appellari consueuit. quamuis nonnihil ulterius, quàm ea consistat linea, ex uola initium ducant, ad trianguli illius quem in media uola collocant

*u 6 ta. f. ad
7. 7 tabu. d
ad f.*

*x Sub Δ 8
tabula.
y 1, 2 fi. ca.
25 li. 1, II,
III, IIII.
z 4 ta. f.*

a 8 ta. Y.

b 6 ta. x, n.

*c 3 tab. p. 4
tab. u.*

*d 3 ta. r, ac
dein 4 tab.
u. f.
e 4 tab. 6
tab. u.
f 4 ta. θ.
g 6 ta. x. 7
tab. a.
h Figurariū
cap. 25 lib. 2
charact. 5.*

*i 7, 13 tab.
charact. 1,
2, 3, 8 ta. Y.*

cant, superius & exterius latus. Primus itaque musculus obliquum latumque principium ducit, ex postbrachialis osse, cui medius innititur, modicè subter ipsius capitulum, quod sinum primi ossis digiti subingreditur. Hinc carnosus prorepens nonnihil angustior redditur, & membraneo tendine, secundi pollicis ossis lateri, quod indicem spectat, uersus interiora se inferit. Secundus superiori suo latere iam dicto musculo cōtiguus, ex mediā sede postbrachialis ossis, quod medio præponitur, originem ducit, nonnihil tamen & os, quo anularis fulcitur, contingens. Origo huius quoque tenuis lataque est, & statim carnea ad insertionem usque conspicitur, quam in medio interioris partis secundi pollicis internodij tentat. Tertius huic inferiori ex parte contiguus, ex postbrachialis ossis, quo anularis sustinetur radice, quæ brachiali coarctatur, originem pariter latiusculam sumit, et obliquè pollicem accedens, lateri interiori secundi pollicis internodij, uersus priora implantatur. Isti tres musculi dum unà tenduntur, fortissimè secundum pollicis internodium flectunt, primo autem duntaxat agente, ad superiora uersus indicem pollex dirigitur, dum uerò secundus solus contrahitur, ad medios digitos pollex flectitur, quemadmodum infimo ad suum principium contracto, pollicis ad inferiora, & magis uersus paruum digitum flexio perficitur. Hos tres, & si in caudatis simijs obseruētur, Galenus non modò ignorauit, uerumetiam falsas rationes in Primo de Partium usu astruit, quibus imperitior aliquis animum adhibens, ne hos quidem aggredi tentaret. Neque etiam uerisimile est, quum secundò administrationes anatomicas emitteret, hos musculos ipsi cognitos fuisse, quum illos nullibi descripserit, quemadmodum fecerunt Arabes, hos, quantum auguror, cognoscentes, & duos, qui primi pollicis ossis flexioni præsumunt, negligentes. Vndecim namque musculos, in extrema manu digitis flectendis extructos recensuerunt, octo quidem ad quatuor digitos, tres autem ad pollicem referentes. Quanquā rursus ambigem, nū casu ipsi Vndecim, loco Decem ex Galeno scripserint, quū citra aliam descriptionē, musculos tantum Orbisij more enumerent. Quinetiam in Primo de Administrandis sectionibus Galeni libro omnes, quos hætenus uidi, codices tres mendas in numeris habent. Octo namque Duorum loco illic leguntur, ubi extremæ manus musculi, pollicis obliquis motibus seruiētes enarrantur, & rursus ad calcem propemodum libri, quo cubitum mouentes musculi recensentur, Tres scribuntur ubi Duo, in super Duo ubi Tres scribendi fuerant, non secus sanè, quàm malè etiā Primi usus, pro Secundi illic legitur, ubi Galenus in eodem Libro ligamentorum usus commemorat. Verum hæc cum innumeris alijs, pro mea uirili in Galeno sunt restituta, quem

IO. BAPTISTA MONTANVS in gymnasio Patauino medicinæ Professor eximius, non sine incredibili artis Candidatorum utilitate, nuper in absolutissimum ordinem redegit, maximè ac penè diuini ingenij uir, ob singularem illā tum Medicinæ, tum cæterarum scientiarum cognitionem, nulli ætatis nostræ medicorum secundus, & præstantissimis laboribus suis, quos in publicum dedit, ac pertinaci indefessaque in docendo diligentia, de studiosis omnibus quàm optimè meritis. Cui uiro utinam Deus aliquis aurem statim uellicet, ei que in animum inducat, ut & alias cogitationes suas longè pulcherrimas, & iam dudum præmaturas in lucem prodire patiat, eas que posteris uel non inuideat, uel eorum calumnias, qui iudices cæterorum esse solum cupiunt, ipsique nihil unquam præstare queunt, non ita reformidet. Hætenus itaque sexdecim musculos, quibus digiti mouentur, commemorauimus, ac proinde nunc decimus septimus, qui digitos extendentium primus erit, describetur, in cuius enarratione hoc mihi Galeni intelligendi gratia uelim donari, ut illum in quatuor diffundi tendines liceat asserere, & deinceps adijcere musculos, qui ex cubito procedunt, & quatuor digitos à pollice abducere creduntur, bipartito in duos tendines digeri, & eam quem Galenus narrat, insertionem in digitorum ossa moliri. Atque id mihi tantisper concedi optauerim, quousque omnes tres musculos sermone absoluerò, tunc enim primum uariam ipsorum tendinum commixtionem coitumque, ac munus denique subiungere licebit. Quanquam interim in reliqua præsentium musculorum descriptione, in ortu nimirum, ductu, substantia, forma, & id genus reliquis nusquam aberraturus sum, quemadmodum etiam in falsam tendinum seriem nequaquam impingerem, si mihi eadem perpetuò hæc occurrisset, & Galeni obseruanda auctoritas negligētui à me haberetur. Sed age negotium, uti sese enarrandum offeret, aggrediamur. Decimus septimus principio ex carne nerueaque substantia mixto, & utcunque lato, ab elatiori sede exterioris humeri tuberculi enascitur, & per mediam cubiti sedem, magnus & carnosus, & paulò minùs toto teres porrigitur, nulli alteri connatus ossi, neque aliunde, quàm ab humero principium ducens. Quum uerò propter radii extremum, cui brachiale inarticulatur, pertigerit, arctior redditus, in quatuor breues carnosas portiones, in musculi substantia non procul diremptas finditur, quæ simul communi membrana indutæ, fibrisque

Tres secundū
pollicis os fle-
ctentes muscu-
li Galeno i-
gnorati.

Decimus sep-
timus digitos
mouentium.

d 9 ta. Z. 2
tabu. V. 10
ta. f.

e unus 9 ta.
o, alter 10
ta. p.

f 9 ta. a.
g 2 fi. ca. 23
li. 1 P.

h 9 ta. b.

fibrisq̃ tenuibus inuicem cohærentes, atque in tendinem illico ab ipsarum à muscoli uentre deductu degenerantes, perⁱ sinum in radij exteriori sede exculptum, ad brachiale contendūt. *i 2, 4 fi. ca. 24 li. 1.* Est autem sinus ille, ex quatuor in exteriori sede appendicis radij excuatis, radij cum ulnæ^k articulo proximus. Huic itaque sinui utcunque amplo, & admittendorum corporum magnitudini ad amissim respondenti, quatuor hi tendines incumbunt, & transuerso^l ligamento ipsis peculiari, & radio quoque proprio obuoluuntur, ne aliquando ex sinu declinent, & ne contracto ipsorum musculo in altum exurgant. Cæterum ut Galenus radij sinus non ap- *h 1 fi. ca. 24 li. 1. aut potius 2 figurae 8. l 1, 2 ta. character. 3. m 2 ta. character. 1. n 2 fi. cap. 24 lib. 1. 8. o 9 tab. 8.* tē expressit, ita quoque falso hos tendines communi radio & ulnæ^m ligamento contineri tradidit. Nam communi amborum ossium ligamento & sinu is^o musculus utitur, quem ego decimum octauum in tota serie paulò post recensebo. Quum itaque proprium ipsorum ligamentum tendines isti transcenderūt, brachiali^q iam incumbunt, latescentes & ab inuicem deducti, tres æquales constituunt angulos, & singuli ad unumquemque quatuor digitorum properunt. Illico autem atque digiti principium contingunt, adhuc multò ampliores tenuioresq̃ redditi, primi ossis radici inferūtur, ac sic per totam digiti lōgitudinem ascendentes, medio exterioris ossium regionis adnascuntur, non autem, ut Galenus malè arbitratur, ijs duntaxat ossium sedibus, ubi articularum consistunt compages. Cæterum qua ratione aliorum musculorum tendinibus, hi in digitorum sede commisceantur, quum quatuor digitos, à pollice in obliquum abducentes musculos sermone absoluerò, audieturus es. Nunc enim & si decimus septimus musculus^p tres tantum tendines ut plurimum nobis exhibeat, quatuor illi Galeni nomine largiti sumus.^q Decimus octauus musculus gracilis longusq̃ est, inferiori lateri decimiseptimi secundum cubiti longitudinem exporrectus. Ab exteriori enim humeri^r tuberculo, hic musculus principium sumit inter decimiseptimi caput, & principium alterius^s musculi, qui post brachialis ossi, quo minimus digitus fulcitur, insertus, brachialis extensionis dux censetur. A principio musculus hic secundum latus decimiseptimi carnosus fertur, quousque cubiti finem attigerit, ubi in duos bipartitus tendines, communi radio & ulnæ^t sinu, & ligamento utitur. Tendines statim atque brachiale superarunt, inuicem dirimuntur, & unus ad paruum, alter anularem contendit digitum, ac singuli in sui digiti primum os implantantur, membranae instar, exteriori lateri uersus posteriora tamen sese inferentes. Hic musculus duobus, quibus inferitur, digitis à pollice abducendis creatus à Galeno dicitur, quum interim obliquum situm nequaquam adipiscatur, quemadmodum sanè^v decimus nonus, duobus ultimo enarratis substratus, obliquo ductu donatur. Ab exteriori nanque ulnæ processu, posteriori humeri sedi coarticulato, usque ad ulnæ sedem, quæ non multò ante brachiale est, continua serie, tanquam ex recta linea^z musculi quidam enascuntur, omnes obliquo situ præditi. Atque hi tres exigunt radices principiæ ue, ac primum quidem, quod elatissimum & humero uicinum est, ad musculum refertur radio peculiarem. Secundum autem, primo iam ordine succedens, ad pollicem & brachiale spectat, cuius seriem, ac in plures ueluti musculos distributionem, musculorum pollicem extendentium enarratio docebit.^a Tertium autem, quo in præsentia potissimum egemus, quodq̃ secundo principio ordine succedit, ab ulnæ osse ultra medium ipsius longitudinis, uersus brachiale enascitur, ne utiquam uerò (ut Galenus parum bene asserit) à tota ulna, aut ulnæ superiori parte brachio proxima. Hoc principium exactè carneum, & instar oblongæ lineæ originem ducens, paulò angustius ab exortu redditur, & oblique deorsum, uersus radij ad brachiale appendicem conscendens, in^b duas carnosas portiones discinditur, quarum inferior decimum nonum efformat musculū, à superiori illius principij parte distinctum, quem doctrinae gratia uigessimum primum, & pollicem uersus alios digitos euerterentem appellaturus sum. Hoc igitur tertium principium in duos musculos distinguam, quāuis interim principij ratione nō obstem, quo minùs ambas ipsius partes, unius musculi loco quiuis recensere possit. Decimus itaque nonus digitos mouentium musculus, ab ulna eo, quo dixi, modo enatus, oblique radij appendicem petit, ac priusquam hūc contingit, in duos inuicem cohærentes tendines finitur, qui proprio^c sinui in radij appendice incumbentes, & peculiari^d ligamēto transuersim obuincti, super brachiale expanduntur. atq̃ hīc dirēpti, illorū superior indici, inferior autē medio exporrigitur, exteriori inferioriue digitorum lateri, uersus posteriora implātati. Sinus autem horum tendinū nomine, in radij extremo priuatim exculptus, inter^e sinū decimiseptimi musculi gratia incisum, & illum quo bicornis tendo eius^f musculi uehitur, cuius beneficio brachiale extēditur. Atq̃ hic etiā sinus^g alteram portionē tertij illius ex ulna prodeūtis principij trāsmittit, quā pollicis motibus famulari audies. Haud enim arbitrandū est, ambas tertij principij portiones unico sinu et ligamēto uti, et huic decimo nono musculo ligamentū peculiare nō obduci. Quod uerò præfens musculus à pollice abduc-

Lib. 1 de Ad-
mi. sectio.

Lib. 1 de Ad-
mi. sectio.

Decimus octauus.

Decimus nonus.

Tres musculorum radices ab ulnæ longitudine procedentes, quarū tertia est 19 musculus. Lib. 1 de Ad-
mi. sectio.

19, 18 & 17 musculorum tendines & mus.

p ut in 9 spectas ta. ad Z, decin b. q 9 tab. 8. 2 ta. X. 10 ta. r. r 2 fi. ca. 23 lib. 1 p. s 9 ta. A. t 9 ta. d. u 2 fi. cap. 24 li. 1. 8. x 2 ta. character. 1. y 10 tab. p.

z 10 ta. A. 3, n.

a 10 tab. n.

b 10 ta. os superior, puerò inferior notatur.

c 2, 4 fi. ca. 24 li. 1. A. d 2 ta. character. 4.

e 2, 4 fi. ca. 24 li. 1. unus y, alter & notatur. f 11 ta. A. g 10 ta. 0.

tionis

tionis eorum, quibus inseritur, digitorum autor sit, situs ipsius insertioque liquidissime commōstrant. Cæterum hunc non semper in indicem & medium, digitos, tendinem porrigere obseruaturus es, sed dūtaxat in indicem. Sic etiam^h decimumoctauum musculum in minimum & anularem simul, tendines, qui statim in brachiali dirempti fuerunt, digerere non semper cōspicies, sed frequentissime unicum tendinem in paruum digitum ferri obseruabis, eius digiti extensionis ducē. Pariterⁱ decimusseptimus in tres tantum tendines diuidi uidebitur, qui in brachiali inuicem deducti, indici medio, & anulari implantabuntur, in minimum autem digitum statim à brachiali tendinem, ut ad cæteros digitos, ferri rarissime reperi, quū decimus nonus parui digiti extensionis autor sit. At his omnibus tendinibus, ubi post brachiali membranulis et fibrosis nexibus committuntur, priuatim id accidit, ut singuli latefcentes uelut in plures diuidantur, ut iam latiores multo, & tenuiores redditi, ad digitorum radices, mirabili neque semper eadem serie inuicem misceantur, unius digiti tendinis portione etiam cōspicua, ad alterius digiti tendinem pertinente. Quod & in tuis manibus conspici potes, animum, quando digitos flectis, ac reflectis, et in latera ducis, digitorum radici adhibens. Quamuis in manu cute liberata, id intueri magis conduxerit, ut non mireris, cur Galeni tendinum seriei minùs ilico accesserim, arbitrerque decimumseptimum, decimumoctauum, & decimumnonum quatuor digitorum, unā et extensionis & abductionis à pollice opifices esse, ob uariam illam, quæ per obliqua prorsus sit, commixtionem, & rectum situm, & ipsorum insertionem, quam in totam digiti longitudinem moluntur. Nullam tamen prorsus tendinum commixtionem unquā perfici obseruauimus, cuius beneficio uel obscurissime paruum digitum à pollice abduci ausim asserere, imò rectus ille musculi decimioctauum ductus insertioque arguunt, nulla prorsus ratione paruum digitum eius opera, extrorsum à pollice abduci. Atque eiusmodi etiam quid in pede obseruari, suo loco dicam. Habeto igitur mea quidem sententia decimumoctauum pro præcipuo parui digiti extensionis autore. Decimus autem nonus insigniter ad indicis & aliquando medijs à pollice abductionem, idoneum esse neminem ambigere conuenit. Verum quia paruum adeo atque ex abundanti à cæteris abduci oportuit, quoties rotundas figuras manu complectimur, & quum huiusmodi motus^k decimooctauo musculo acceptus ferri nequeat, rerum Opifex^l musculum breuem, sed ualidum in extrema manu reposuit, illi motui præfectum. A^m quarto enim brachialis osse, quod rectum appellauimus, musculi huius principium prodit, quod per lunæ monticulum ad paruum digitum pergens, toto ductu carneum uisitur, muris seu lacertæ formam eleganter exprimens, quippe musculus iste, in exortu utcunque tenuis, in medio teres crassusque est, in insertionem autem, quam in externo primi ossis parui digiti latus molitur, gracilis tenuisque, & nerueus euadit. sit itaque hic ordine uigesimus. Cæterumⁿ uigesimus primus, pollicis peculiaris cēsetur, estque ille altera^o tertij ex ulna pendētis principij portio, quam à^p decimonono, qui ad indicem & medium potissimum fertur, distinguimus. Ab ulnæ itaque exteriori sede, iuxta^q ligamentum membraneum inter cubiti ossa, qua inuicem dehiscunt, consistens, & iuxta medium longitudinis cubiti iste musculus enascitur, uersus radium oblique properans. Priusquam uerò radij inferiorem contingit appendicem, in paulò minus toto teretem cessat tendinem, qui cum^r tendine bicorni, quo brachiale extenditur, sinu, et ligamento plerumque deductus, ad brachiale contendit, & ilico latefscens totius pollicis longitudini inseritur, non quidē in medio exterioris regionis, sed exteriori ipsius latere, quod indicem spectat. Cuius autem motus hic musculus opifex sit, ilico subiiciam, atque duos sequētes nunc musculos descripsero, in quorum enarratione ambigo, num illos primum unius, aut duorum, aut trium musculorum loco recensere debeam. Sed age, ac si unus esset, illos pertractemus, eundem postea, uti uisum erit, in plures diuisuri. Ex^u tribus musculorum radicibus seu principijs, quæ ab ulna secundum ipsius longitudinem exoriri relata sunt, ^x medium principium utcunque uisitur amplum, longæue latis linea enatum, & oblique super radium conscendens, illi insternitur^y musculo, quem bicorni tendine in brachiale inferi, idque extendere docebo. Simulatque uerò principium hoc cum musculo integit, in^z duas impares portiones diuiditur, à sese nullo interuallo distantes, sed mutuò incumbentium musculorum ritu inuicem hærentes, superior portio aliquandiu carnea permansens, in tendinem quodammodo teretem cessat, insertum exteriori brachialis^a ossis sedi, quod pollicem sustinet. Inferior autem principij portio statim, ac aliquousque in anteriora prorepsit, in^b duas rursus carneas partes distinguitur, quæ singule in tendinē finiunt, ac cum superioris portionis tendine, proprio^c sinu in radij appendice leuiter inciso insident, peculiari^d ligamento tres simul tendines obducuntur. Postquam uerò inferioris portionis tendines brachiale superarunt, unus in primi pollicis internodij radicem implantatur, illic in

Vigesimus

Vigesimus primus

Vigesimus secundus, qui secundum ulnam cēsetur.

exter

externam ipsius regionem iuxta internum latus finiens. Alter tendo membranoso tantum nexu primi pollicis ossis longitudini adherens, in secundi ossis radicē exteriori sede, uersus internū latus inseritur, neq; is inibi totus desinit, uerū ad summū usq; pollicis apicē, secundo et tertio ossibus pertinaciter quoq; adnascitur. Duorū inferioris portionis tendinū alter tantum, quē nunc enarrauimus, Anatomēs professoribus perspectus fuit, unde etiam aliqui attendentes principij continuitati, musculum hunc unum esse tradiderunt, alij uerò quoniam in progressu dirimitur, & unus tendo brachiali, alter uerò, qui ipsis cognitus erat, pollicis inseritur, duos hīc musculos constituerunt. Nobis autem integrum esset, trium musculorum loco hunc enumerare, singulos musculos singulis tendinibus ascribentes, quanquam nos opportuniū facturos existimo, si duos tantum enumerauerimus, inferiorem portionem, quæ pollicis ossibus tendines duos offert, uigessimum secundum in hoc Capite appellantes. Superiorem uerò portionem, quæ brachialis etiam extensioni, & obscuro cuidam radij circumductui secundario opem fert, uigesimalterij nomine habituri sumus, nisi quia digitorum motibus nō famulatur, in horum musculorum serie illi locum abnegaueris, quod non incusamus, modò tuum interim placitum, in subsequentiū musculorum numero recensendo, memoria non exciderit. Nos enim ac si præfenti Capite enumeraretur, reliquum de digitorum musculis sermonē percurreremus, silentio non prætereuntes, in caudatis simijs unicū duntaxat apparere tendinem, qui partim in pollicem, partim in brachiale inseritur, secus longē, quā hominibus ut plurimū accidere nouimus.⁸ Vigesimo itaque secundo, & quem prius enumerauimus,^h uigesimaloprīmo pollex rectā euertitur, extenditur ue, quoties utriq; musculi unā contrahuntur, quippe uigesimo secundo duntaxat contracto, pollex obliquē à cæteris digitis abductus extensionem patitur, à uigesimo autem primo ad indicem magis euertere solet. quare etiam integrum est, hos musculos in digitos ad latera ducentium, & etiam in extendentium classē, ut uisum fuerit, reponere. In hunc usque locū seruasseⁱ decimooctauum, &^k decimumnonum, ut iam musculos obliquis motibus præfectos simul enarrarem, nisi uaria illa tendinū iuxta digitorum radices commixtio obstitisset, & nisi decimooctauus extendētib; potius, quā abducentibus fuisset adnumerandus, deinde huius commixtionis & decimioctauī musculi ductus gratia, necessariò et^l illum prius recensui, cuius beneficio paruus digitus à reliquis ualē dissimē abducitur, qui ordine uigessimus erat. Ac proinde adhuc reliqui sunt,^m duo obliquis pollicis motibus famulantes, &ⁿ alij quatuor, quibus digiti quatuor ad pollicem ducuntur. Pollex enim quum instar alterius manus, reliquis digitis opponi debuit, meritò musculos sibi uendicat, quorum beneficio à cæteris maximē abducitur, & rursus uariarum actionum gratia cōmodissimē indici admouetur.^o Qui igitur pollicē maximē abducit, atq; in tota serie uigessimus quartus censerī potest, ab anteriori sede ossis brachialis, cui pollex innititur nerueo principio, quod statim carneum euadit, enascitur, ac deorsum protensus, secundo pollicis ossi, membraneo tendine inseritur. Hic musculus unā cum^p duobus, primū pollicis internodium flectētib; quibus iste insternitur, carnosam uolē partem efformat, quæ ad pollicis radicē consistit. Galenus in Libris de Partium usu præsentem musculum, nō admodum uerē in primum pollicis os inseri scriptum reliquit, quū notabili & uera insertionē ipsi nō adnascatur, sed duntaxat fibrosis nexibus inualidē hereat. Verū non mirum est, Galenum eiusmodi insertionem nos docuisse, quum id scribens, duos musculos primum pollicis os flectentes ignorauerit, ac illos uigesimalquartī musculi partes esse arbitratus fuerit. Musculus iste^q interioris pollicem euertētium, qui ordine uigessimus secundus erat, actionem excipit, atque ita quā maximē pollicem ab indice remouet, id priuatim adeptus, quod inter extremæ manus & cubiti musculos, solus quodammodo liueat, propriæ ipsius, quæ crassior est, membranæ gratia.^r Alter musculus obliquis pollicis motibus seruīēs, ex interiori latere, uersus posteriora tamē, ossis postbrachialis, quod indici præponitur, initium ducit carneum, & secundū totam eius ossis longitudinem enatum. Musculus iste inseritur carnea implantatione, toti externo lateri primī pollicis ossis, membraneum tendinem radici quoq; secundi ossis porrigens, huius fibræ transuersæ quodammodo sunt, à brachiali ad pollicem ductæ. Vnde etiā huius musculi auxilio pollex indici proximē accommodatur, illoq; musculo pollicem ad exteriora euertentis (qui in nostra serie uigessimus primus est) actio excipitur. Porro^s musculi quatuor digitos pollicis adducentes, quia in firmiter digitos uersus pollicem obliquē adduci, quā ab illo reduci oportebat, nequaquam ex cubito principium sumunt, sed graciles & teretes sunt musculi, singulis quatuor secūdi musculi tendinibus (qui quatuor digitorum tertium os flectunt) exporrecti. oriuntur enim ex membraneo inuolucro, tendines illos, cum brachialis sinum, &^x transuersum ipsius ligamentum perreptant, induente. Hinc simul singuli cum singulis tendinibus ad digitos procedentes, ac inte-

Vigessimum tertium hoc Capite enumeratū, digitorum nō seruire motibus.

Vigesimali secundi & 21 ossis ficiū.

Sex musculi digitos mouentes adhuc reliqui.

e 10, 11 tab. n.

f 10 tab. k, m, n, 11 tab. p, q, r.

g 10 tab. l, de m, n, 11 tab. q, r. h 10 tab. o. 11 tab. u.

i 9 tab. e. k 10 tab. p.

l 3 tab. r. 4 tab. u. m 3 tab. p. 4 tab. u. unus, alter uerò 11 tab. f. n 6 tab. s, s. 7 tab. d. o 1 tab. i, 3 p. 4 m. p 6 tab. n, a.

q 10 tab. m, n, 11 tab. q, r.

r 1 tab. h, 2 d. 98. 10 tab. u. f. 12 n. s 1, f. cap. 24 li. 1 l.

t 10 tab. o. u 6 tab. s, s. ad 7. 7 tab. d. ad f.

x 4 tab. l.

ac interiori tendinis lateri attenti, in digitorum radicem inferuntur, ad internum eorundem latus, uersus interiora insertionem membraneam moliti, ista nanque sede illos inferi decuit, qui in latus ad pollicem, quatuor digitos erant reclinati. Præsentibus musculis hoc sanè rarum, perinde ac oculi^v musculis obuenit, quòd non ex osse aut cartilagine, sed ex membraneo tendinum inuolucro originem sumpserint. Iam si his quoque musculis tuum numerum disciplinæ gratia auxeris, in uniuersum uigintinouem in hoc Capite descripti exurgent, quorum uigintiocto digitorum duces sunt, ^z uigesimalitertio interim ad brachiale relato. Porro mirabitur forsitan aliquis, cur minus^a musculos quatuor digitos pollicis adducetes, & ^h eum qui paruum à cæteris abducit, primo quatuor digitorum ossi dixerim inferi, nulla interim mentione succedentium internodiorum facta, quum tamen Galenus in omnibus digitorum ossibus, secundum totam illorum longitudinem tendines, membranæ modo inferi cōnasci^q in Primo de Administrandis sectionibus scriptum reliquerit secus, quàm in Libro de Partium usu, ac illo etiam priores Anatomici. Ego nequaquam inficias eo, uti neq; aliquis, qui mihi refecati astitit unquam, digitorum ossa secundum longitudinem, è regione insertionis illorum musculorum membranis obduci, uerum non talibus, quales commemorati modò musculi porrigere deberent. quandoquidem illæ nullum fibrarum genus, secundum longitudinem excurrans ostendunt, neque parem etiam ductum, cum musculorum ex cubito in exteriorem digitorum sedem insertorum tendinibus retinent. Quinetiam solius primi in quatuor digitis articuli, & primi secundi^q in pollice beneficio, digiti in obliquum aguntur, cuius causa, dum digitorum ossa persequeretur, articulationis differentia esse commemorabatur. Si itaq; quispiam eiusmodi membranas, musculorū in obliqua agentium tendines esse cum Galeno contenderit, frustra eos, & ligamenti tantum uice secundis & tertijs digitorum ossibus commissos fateatur, oportet. Quòd autem^c illorum tendines, qui ex cubito procedentes, à Galeno abductionis autores simpliciter enarrantur, toti digitorum longitudini liquidò inferuntur, uehementius colligere cogor, eos musculos extensioni etiā præesse. Denuo studiosior aliquis in Galeni Libris uersatus, illum^q contraria de insertione tendinum docere animaduertens opperietur, donec omnes musculorum digitos mouentium insertiones in unum numerum redegero, Galenum in Primo de Partium usu imitaturus, qui eas parum rectè persequitur, quoniam^d tredecim musculos, qui in extrema manu locati digitorum flexus autores sunt, omittens, falsò^e secundi musculi tendines, primo^f quatuor digitorum ossi implantatos tradit. Cæterum si obiter^f decimumseptimum in quatuor tendines, digitos extendentes, & ^g decimumoctauum & ^h decimumnonum in binos tendines, qui quatuor digitos à pollice abducant, diuidi concesserimus, & deinde tum in omnes digitorum acies, ut extendentes inferi annuerimus, ut interimⁱ illi, qui in extrema manu reponuntur, lateralibus^q motibus priuatim præsunt, ita habeant, ut inos descripsimus, sexaginta omnes ueræ insertiones (non accubitus leues ue annexus dico) erunt. In primum scilicet pollicis articulum quinque, in secundum septem, in tertium tres, in minimi digiti primum internodium sex, in reliquorum autem trium digitorum prima internodia duntaxat quinque, in quatuor uerò digitorum secundum & tertium internodium tres. Quæ porro eiusmodi sint insertiones, ipse tecum, ut musculos rursus in memoriam, quasi in epilogum cōtrahas, repetito, atque deinde rursus perpendito, quot uniuersæ essent, si etiam musculi obliquis motibus præfecti, qui in summa manu reponuntur, insertiones in succedentia ossa, quæ in obliquum (nisi secundariò) non aguntur, ex Galeni sententia molirentur, & deinde etiam^k uigesimaliterti musculi utrunque tendinem, primo pollicis ossi inferi uera insertionem admiseris, ut nunc primum pollicis internodium sex admittat insertiones (^l qui enim pollicem maximè abducit, in primum ipsius os non inseritur) tertium autem pollicis quinque, & secunda tertiā^q internodia indicis, medijs, & anularis etiam quatuor, parui autem digiti secundum & tertium internodium, quinque insertiones obtineant, consurgent omnes, septuagintatres. Si etiam ligamentorum beneficio ossibus applicationes (nollem enim cum Galeno insertiones dicere) adnumeraueris, & secundum quinque digitorum internodium una applicatione, & primum quatuor digitorum duabus auxeris, inuenies (nisi me additio fugerit) octuaginta sex, nam primo pollicis internodio^m tertij musculi tendinem tribuere nequis, quanuis hic numerus adhuc & ⁿ lati tendinis applicationes sibi uendicare possit, ut tria quatuor digitorum, & duo pollicis internodia, adhuc una augeantur commissione, numerus^q nonaginta octo constituat. Quem si ad utramque manum conferens duplicaueris, quot numeris, centum & octodecim Galeni ^{μφν} σεις & παραφύσεις modò superasti.

Ex uigintinouem descriptis musculis, 28 digitorum motibus famulari.

De tendinum insertionibus nonnulla.

Musculorum insertionum collectio.

Lib. 1 de Usu partium.

DE MUSCULIS MOTVVM BRACHII

his opificibus. Caput XLIII.

Brachialis
motus.
Primus mu-
sculus.



V M brachiali reliqua summæ manus pars flectitur, ac extenditur, deinde etiam obliquo (ut uocamus) motu in utrunque latus agitur, idq̃ quatuor musculorum beneficio. Quorum^a primus ex^b interiori humeri tuberculo^c principium ex carnea nerueaq̃ substantia mixtum assumit, hinc totius ulnæ longitudini adnatus, & semper in progressu ab ipsa principij sui robur assumens, atq̃ hoc præcipue in superiori ipsius sede, non procul ab articulo cubiti ad humerum. Exporrigitur autem hic musculus inferiori lateri musculorum,^d qui ex cubito enati digitorum flexionibus præfunt. unde etiam inter nam ulnæ sedem^e magna ex parte amplectitur, quemadmodum & medium quoq̃ sedis ipsius inferioris, toto ferè ulnæ ductu occupat, quo scribentes innitimur. ^f Reliquum autem inferioris illius ulnæ sedis, quod exterius est, ^g alius musculus sibi uendicat, quem ante paruum digitum postbrachiali insertum, huius extensionem moliri audies. Duo enim illi musculi inuicem fibrosis nexibus ualide hærentes, uelut stratum quoddam & puluinar, quo commodè totum cubitum inniti sinimus, efformant. Cæterum primus hic musculus, quum ad ulnæ usq̃ finem prorepfit, paulò ante cubiti cum brachiali articulum, in^h ualidum, & quodammodo teretem cessat tendinem, carniformi semper substantia ad brachiale usq̃ auctum, qui dum articulum transcendit, prorsus excarnis est, ualidissima insertione, inferioriⁱ quarti brachialis ossis sedi implantatus, quod nō immeritò rectum cartilaginofumq̃ appellatū, ac^k unico tantum ossi commissum, in Primo libro dicebatur. Præsens tendo, quā ulnæ appēdice articuloq̃ brachialis suffulcitur, peculiare ligamentum, quod ipsi transuersim obducatur, nullum exigit, sed cōmuni omnium musculorum membrana, quæ ligamenti uice est, quamq̃ inter manus ligamenta etiam recensēbimus, circundatur, & perquā ualide brachialis cum cubito articuli ligamentis connectitur.

Secundus. ^l Secundus brachiale mouentium musculus, ex interiori quoque humeri tuberculo exoritur, illius, quem nuper commemorauimus, capiti proximus, & unā cum illius quoque capite in stratum obtinens^m caput eius musculi, qui internæ summæ manus cuti dilatescentem exporrigit tendinem. Secundus itaque musculus, ab interno humeri tubereⁿ enatus, obliquo ingressu ad elatius^o primi digitos flectentis musculi latus contendit, ipsi magna ex parte instratus, & radio exporrectus. ^p Ante brachialis autem radicem in exactè teretem degenerat tendinem, qui simulatq̃ brachiale ad pollicis radicem^q cōtigerit, incuriose illum secantibus, ibidem brachialis ossibus inseri putatur. Verū ubi^r musculus ab indice pollicem abducens, unā cum duobus primum pollicis internodium flectentibus, à brachiali liberatus fuerit, hic brachialis musculus conspicietur internam brachialis sedem præterire, atq̃ latescens in postbrachialis^s ossis, quod indici præponitur, radicē inseri, internæq̃ transuersi hīc^t ligamenti sedi ualide adnasci. Duo^u bus internis alijs duo externi respondent, ^v unus ab^x exterioris tuberculi humeri radice principium capit, ad latus eius^y musculi, qui Galeni suffragio minimum digitum, & anularem à pollice abducit, nostro autem, præcipuus extensionis minimi digiti autor est. Siquidem plurium ex eo tuberculo certa serie prodeuntium capitum, hic brachialis musculus, humillimam & ulnæ proximam sedem obtinet, unde etiam & ex^z posteriori ulnæ processu, qui humero adarticulatur, hic musculus principij ducit, illi instratus^{aa} musculo, qui hinc quoq̃ originem sumens, radium adit, illum in supinum acturus. Hinc itaq̃ tertius brachialis musculus^{ab} prodiens, humiliorem exterioremq̃ ulnæ regionem amplexatur, ^{ac} inter primum brachiale flectentium, & quem nos paruum digitum extendere proposuimus, exporrectus. Quando uerò brachiali appropinquat, in teretem finit^{ad} tendinem, qui sinui in appendice ulnæ ad processus stilum imitantis internum latus exculpto, innititur^{ae} transuerso ligamento, quod unicum ulna proprium nanciscitur, obductus. Quum primum ligamēto superato, brachiali superuehitur, latior factus postbrachialis^{af} ossi minimum sustinenti, non procul à brachiali inseritur. ^{ag} Alter exteriorum, qui ordine quartus est, latiusculo^{ah} principio longè supra exterioris humeri tuberculum enascitur, ubi humerus uelut in oblongam^{ai} acutiem prominet. Hinc carnosus, & longa utcumque linea prodiens, radio infertur, & propter illius longitudinis medium, in robustum degenerat^{aj} tendinem, qui bicornis bipartitus ue statim ab ortu uisitur, utramq̃ partem paulo minus toto teretem gerens, est enim nonnihil latior, quā profundior. Hæ partes aut tendines & si inuicem dirimantur, non tamen digno notatu interuallo diffiti, recto tramite radio exporriguntur, ad illius appendicem iuxta brachiale cōtendentes. quò quum peruenerint, inuicem iam magis magisq̃, sed non tamen insigniter seiuncti, illis priuatim exculpto^{ak} sinui incumbunt, & com.

a 4 tab. x.

i tabula

Z. 2 a. 3 m.

5 * 9 z.

b 1 fi. ca. 23

li. 1 S.

c 4 ta. y.

d 4 ta. p et

5 ta. o.

e 1, 6 fi. ca.

24 li. 1 d.

f 2, 6 fi. ca.

24 lib. 1, c

iuxta a, a.

g 9 ta. a.

h 4 ta. d.

i 1, 3, 5 fig.

cap. 25 lib. 1

cha. 4.

h earundem

fig. cha. 3.

l 3 tab. A. 1

tab. X. 2 g.

4 e.

m 3 ta. i mus

sculi n.

n 3 ta. f.

o 4 ta. b.

p 3 ta. g.

q 3 ta. h.

r 3 ta. p. de-

in 6 ta. a, a.

s 1 fi. ca. 25

lib. 1 l.

t 4 ta. d.

u 9 ta. A. 2

Y. 10 q.

x 2 fi. ca. 23

lib. 1 p.

f 9 ta. o.

g 1, 2, 5, 11

fi. ca. 24 li.

1 D.

h 10, 12 ta.

A.

i 9 ta. c.

k 9 ta. inter

z. 2.

l 9 ta. d.

m 2 ta. cha.

2.

n 2 fi. ca. 25

li. 1 III.

o 11 tab. A.

1 b. 2 T. 3 c.

9 Y. 10 f.

12 o.

p 11 ta. i.

q 1, 2 fi. ca.

23 li. 1 Q.

r 11 ta. k.

s 2, 4 fi. ca.

24 li. 1, f.

tota. o. & communi ipsis & illi^r musculo, qui pollicem uersus indicem euertit, ^u ligamento circunda-
 11, 2 ta. cha tur. Quod deinceps superantes, ac magis tum quam prius, inuicem distantes, in postbrachiale
 ract. 5. amplis insertionibus^x implantantur. unus enim in radicem ossis indicem sustententis, alter ue-
 x u ta. l. rò in radium eius cui medius innititur, insertionem tentat. Quartus hic musculus unà cum ter-
 7 2 ta. b. 10 tio, brachiale, si ambo tendantur, extrorsum reflectunt, extendunt^{ue}. Atq; his auxiliatur^y mu-
 h. sculus, quem brachialis ossi, quo pollex sustentetur, inseri tunc docuimus, quum digitorum du-
 ces recensentes, hunc musculum in tota serie uigesimalum tertium nominaremus: & ut his duo-
 bus brachiale extēditur, ita etiam duobus interioribus seu primis idem pulchrè flectitur. Dein
 2 3 ta. A u. eisdem musculis, quibus brachialis flexio extensioq; concreditur, brachiale ad latera quoque
 nus, alter 12 ducimus. ^z Si enim interior musculus, & exterior, qui indicem spectant, ^a reliquis duobus la-
 tabula A. xatis contrahantur, brachiale introrsum atque ad interius latus agetur. At si his laxatis, alijs duo
 a 9 tab. u. qui minimum respiciunt digitum, tensi fuerint, ad exteriora in latus brachiale mouebitur. Con-
 nus A, alter stat itaque Naturam admodum industriè, duos musculos flexioni, & totidem extensioni præ-
 fecisse. Quandoquidem si uni flexionem commisisset, neq; is certæ articuli totius, neque firmæ
 flexionis dux fuisset, imò promptè cir cūuersatilis laxæq; ut uerò nunc habet, firma prorsus ac
 tuta perficitur flexio. Ad hæc præter flexionem & extensionem, brachiale alijs indiguit moti-
 bus, ac proinde alios creari tendines operæ precium esset, qui ad latera motuum opifices habe-
 rentur. Sed nunc demum, quum duo flectunt, & duo extendunt, ilico quidem & obliquos bra-
 chialis motus adepti sumus. Cæterū præter hos quos brachiali tribuimus motus, Galenus ipsi
 in pronum ac supinum uersionē adscripsit, peculiarem ab ea, quam secundariò manus extrema,
 radij beneficio sortitur. Mihi nullum extremæ manus aut brachialis quiescente radio, in pro-
 num supinum^{ue} motum perfici, hætenus percipere licuit. ^b Deinde radij sinus, cui brachiale
 inarticulatur, oblongus est, & ipsum quoque brachiale, quā sinui imponitur, oblongum quo-
 que, neq; ut humeri, aut femoris superius caput, rotundum uisitur, adeò ut eiusmodi ossium ar-
 ticulus consurgat, qui ad motus in gyrum prorsus ineptus existit. Adde, quam nos primi ob-
 seruauimus, neque perfunctoriè perpendendam^c cartilaginem, quæ à radio pronata, brachiale
 & ulnam, instar interstitij cuiusdam mediat, ostenditq; totam brachialis ad cubitum articulatio-
 nem propemodum soli radio ferendam esse acceptam. quod ne in puncto quidem citra dictæ
 modò cartilaginis interuentum, brachiale contingit. Non enim audiendus est Galenus in Li-
 bro de Ossibus, in quo^d processui styli imaginem exprimenti nimium fauens (ne dicā Naturæ
 opera destruens) præter omnem rationē, illius processus beneficio, manum extremā in latera
 obliquaq; agi protulit. parum attendens, si eam processus ille, quam ipsi tribuit, cōstructionem
 obtinuisset, non solum motui, in latera non iuuaturum, imò tanquam palum aliquem prorsus
 præpediturum: quanquam rursus alibi illum ad proprios manus in pronum & supinum mo-
 tus cōducere, uideatur docere. At quum nullum eiusmodi motum, nisi radij ope, & secundariò
 in manu expendere ualeo, præter animi sententiam musculos, quibus illi motus celebrentur,
 ementiri nequaquam uisum est. Galenus tamen ut & hos motus brachiali præbet, sic quoque
 quatuor enarratos musculos illorum autores esse contendit, prout hic nimirum illè ue contra-
 hatur, aut quiescat. cuius sententiam si non oscitanter perpenderis, hæc illum finxisse, ima-
 ginatumq; citius, quam in resectione perspexisse (ut alia in Libris de Vsu partium pleraque)
 animaduertes.

Musculi
minus.Brachiale
proprio motu
in supinum &
prorum non
agi.
Li. 2 de Par-
tum usu.Libris de V.
su part.

DE MUSCULIS RADII PRONVM ET supinum constituentibus. Caput XLV.

a 9 fig. cap.
24 lib. 1 O
ad P 1 fi. ca.

23.

b 1, 2, 5 figu-

rarum cap.

25 li. 1 cha.

1, 2, 3 in x,

7, 2 fi. 8 ca.

24 li. 1.

c ca. 24 li. 1

fi. 11, k. aut

m 2, 9 fi. in

li. 11 figu. &

rursus p 5,

10 fi. in o 7

figura.

d 7 tab. X.

8 s.



V M M O D O in præsentem meminere eorum, quæ^a de radij ad rotundum
 humeri capitulum articulo,^b & brachialis rursus cum radio,^c radij^q & ul-
 næ inter se commissuris, superiori Libro tradidimus, nunc mediocri ne-
 gocio percipies, qua ratione radius à proprijs tractus musculis, quiescen-
 te interim ad humerum ulna, in pronum supinum^{ue} que circumducatur, &
 quonam pacto radij auxilio, extrema manus eosdem motus necessariò se-
 quatur. Quando itaque radius ulnæ & superiori ipsius & inferiori extre-
 mo articulatur, ac secundum reliquam longitudinem duo illa ossa inuicem distant, operæ pre-
 cium fuit & in prioribus ac posterioribus radij regionibus, musculos, qui illum mouerent,
 extrui. Sunt autem hi quatuor, duo quidem superiori radij extremo subseruientes, reliqui au-
 tem duo inferiori: atque ex his duo internam cubiti sedem, alijs duo externam occuparunt. inte-
 riores radium in pronum mouent, exteriores eundem ad supinum conuellunt. ^d Interior, qui

Quatuor ra-
dium peculiari-
ter agentes
musculi.
Primus.

d 2 radij

Lib. 1 de Ad-
mi. sectio.

Secundus.

Primo de
Administran-
dis sectio.

Tertius.

Quartus.

externo latere.

radij partem brachiali proximam mouet, secundum ulnae longitudinem, ex tota amplitudine interioris ipsius sedis enascitur, qua brachiali proxima est, hinc carneus, ad interiorem radij regionem transuersim procedit, ipsi carneus adhuc insertus. Habet itaque musculus hic, si cum reliquis secundum cubiti longitudinem expansis conferatur, fibras transuersas, ex ulna nimirum in radium recta conscendentes. Neque hic musculus, ut uisum est dissectionis Professoribus, radium ulnamque intercedit, sed secundum cubiti amplitudinem, totam interiorem radij ulnaeque sedem complectitur, & ad amussim quadratus est. Tantam enim obtinet longitudinem, quanta est latitudo interioris cubiti regionis, quam simul cum radio ulna constituit, deinde tam latus uisitur, quam longus, ad haec omni ex parte carneus, & in ipsius medio spissus extuberansque obseruatur, instar puluinaris ipsum transcendentibus ad digitos tendinibus substratus. Huius musculi fibrae, radij partem quae brachiale spectat introrsum trahentes, radium in prouum adigunt. Exterior musculus contrarij motus autor, huic neque situ neque figura respondet. Si enim Natura in exteriori sede eiusmodi carneum musculum constituisset, cubiti pars brachiali praeposita, minimè leuis, carnisque expers mansisset, neque commodè tot musculorum tendines huc reponi potuissent. Proinde quum exteriorem interiori parem effingere nequiuisset, ualidiorique motu hunc, quam interiorem, radium ducere oportuit, breuissimo per cubitum expansorum musculo, qui interior est, longissimum omnium qui cubitum perreptant, Natura opposuit, quantum scilicet ad musculi uentrem, & longiorem carnis ductum attinet. Alias nanque perperam illum omnium longissimum esse Galenus dixisset, quum plerique ad digitos protensi, simpliciter multo longiores sint: neque id fortassis solum tendinum gratia, sed si quis diligenter omnes perpendat, uentris quoque. Ab externa itaque humeri regione elatius, quam musculi bifido tendine brachiale extendentis caput consistit, huius radij musculi principium educitur: quod quia secundum humeri longitudinem latum nascitur, carneumque est, longè supra exterius humeri tuberculum incipit. Musculus hinc deorsum expansus, & latus ualidusque apparens, radio insternitur, superiori lateri musculi bifido tendine brachiale extendentis contiguus. Vbi uerò ad radij finem, cui brachiale coarctatur, processit, in exactum finit tendinem, qui membranæ modo latefcens, radij appendicis superiori regioni inseritur, quadantenus in interiora productus. Musculus iste interiorem radij partem, quae brachiali committitur, in exteriora trahens, radium supinum efficit. Ceterum musculi, superiorem radij finem humero proximum in prouum supinumque ducentes, in hunc modum habent. Interior ex interioris humeri tuberculi radice, & ex interiori ulnae latere, quae humero articulatur, carnosus ualidusque principio enascitur. hinc admodum oblique internam radij sedem conscendit, carnea insertione ante medium ipsius longitudinis insertus. A carnea hac insertione, neruea implantatio ad medium usque radij longitudinis exporrigitur, radijque superiori regioni hic ualidissime inseritur, peculiarem inibi in radio asperitatem, cui inseratur, sibi uendicans. Musculus iste, quoties contrahitur, intrò radium ducens, illum constituit prouum. exterior, qui peculiarium radij musculorum quartus est, ductu figuraque nunc dicto propemodum par, enascitur ab exteriori articuli cubiti regione, ab articulum circumdante ligamento, ualidè etiam ex ulna in posterioris sui processus, quem *ωλίεραν* Graeci uocant, externum latus, principij sui portionem sumens. Hinc ad radium in priora conscendit, & radio propter interioris musculi insertionem applantatur, huius tamen insertio non aequè atque interioris neruosa est, neque adeò in radij longitudinem producit. Attamen ductus breuitas hos duos, ut & primum, qui ad brachiale habetur, exacto tendine destituit. Musculus itaque, quem postremo recensui, superiorem radij partem extrorsum oblique conuellens, radium ad supinum adigit. Cõstat igitur totum radij os, interiorum musculorum beneficio prouum, exteriorum autem supinum effici: ac deinceps radij ope, summam manum eisdem motus ostendere.

DE MUSCULIS CUBITVM FLECTENTIBUS & extendentibus. Caput XLVI.



Cubitus mo-
uentes musculi
aut 3, aut 4,
aut 3.

VE M A D M O D V M radius sui cum humero articuli beneficio prouus supinusque constituitur, ita quoque ulnae cum humero articulus appositissime cubiti totius flexioni extensionique famulatur, & interim radius in eum modum humero est articulatus, ut simul cum ulna ad humerum flexi extendique queat. Musculi uerò horum motuum duces, si in maximum redigantur numerum, duo flexionem, & tres extensionem perficiunt. si autem ad minorem referantur, aut duo, aut unus, erunt extendentes: duo tamen, utcunque numeraueris, flectentes. In canibus & caudatis simijs necessario tres semper

e 5 ta. mu.
sculi p. 6 ta.
musculi =
e n.
f 6 ta. A. 12
o. 1 a. 2 S. 3
d. 4 a. 5 n.
7 Y. 9 X.
10 c. 11 h.

g 11 tab. A.

h 2 fi. ca. 23
li. 1 p.
i 12 tab. d. 6
ta. i.
k 6 ta. u. 12
tab. b.
l 2 fi. ca. 24
li. 1 uersus
a.

m 7 ta. Q.
1 V. 2 f. 3 e.
4 Y. 5 1. 6 X.
8 R. 13 f.

n Sub L fi.
1 ca. 24 li. 1.
o 12 tab. c,
13 g.

p 2, 4 fig.
cap. 24 lib.
1 u.

q 10, 12 t. l.
A. 11 m. 13
h.

r 1, 2, 11 fi.
ca. 24 lib. 1
D.

s 12 tabu. d
iuxta c.

d 1, 2 fi. ca.
23 lib. 1. K,
L, M cu C,
D, E 1, 5, 11
fi. ca. 24.

per extendentes recensentur: quorum etiam descriptionem ilico, atque hominis musculos enarrauero, subnectam, quo accuratius Primi de Administrandis sectionibus Galeni libri calcem assequaris. Atque hos ea tamen tradam lege, ut omnia de cubitum mouentium musculorum figmenta Secundi de Vsu partium libri, non cogar recensere. quandoquidem quum ueram illorum musculorum naturam didiceris, abunde (si modò ueritatis cum Galeno studiosus fueris) ea tuo Marte refelles, stupens profectò, qua ratione eiusmodi sensui repugnantia Galenus posteris prodiderit, ac postea etiam sectione peritior factus, non recognouerit.^b Primus flectentium, duobus ualidissimis & mutuò distantibus enascitur principijs: ^c unum quidem exactè nerueum, & adamussim teres exoritur, ab eminentiori ^d parte ceruicis scapulæ, seu ex superiori ipsius acetabuli supercilij sede. Hoc sub ^e ligamenti humeri articulum continentibus, & huic principio transuersi instar ligamenti obductis, super humeri caput in anteriora procedit, ^f sinuq; uehitur, ipsi in prioribus capitis & ceruicis humeri regionibus priuatim cælato.^g Alterum prioris musculi principium, à radice interioris ^h processus scapulæ, quem anchoræ comparamus, duplex quodammodo enascitur, non quidem disiunctum, sed duplicem substantiæ speciem exprimens, & dicto nuper ⁱ principio (& si Galeno secus uisum fuerit) multò latius. Principij enim ^k pars, ab apice processus initium ducens, exactè, ut exterius musculi principij, neruea est & crassa, & propemodum teres: ^l pars autem huic continua, ac ex reliqua processus sede prodiens, carnea lataq; uisitur. Neutrum istorum principiorum, statim ab exortu deorsum tendens, humeri ossi adnascitur. Verum aliquantulo sub humeri capitis ceruice, ubi ambo ^m inuicem coitura unum efformare musculum incipiunt, carnosa pars interioris principij, ab interno scapulæ processu enata, humeri ossi lata & utcunque carnea insertione adnascitur, priuatam ossis ⁿ asperitatem, cui aptè committatur, nanciscens. Consistit autem hæc asperitas ad radicem eius ^o sinus, quem externo musculi præsentis capiti incisum diximus. Eiusmodi insertio adeò ualida interdum mihi apparuit, & carnosa illa interioris principij pars adeò procera uisa est, ut proprium musculum à scapulæ interiori processu in humerum nasci arbitratus fuero, qui brachium etiam attolleret. Postquam uerò hic anterior cubitum flectentium musculus, ex duobus illis efformatus principijs, hanc insertionem in humerum molitus est, ab humero iam abscedens, & adamussim teretis carnosiq; ^p musculi effigiem, ante resectionem in macilentioribus & musculosis conspicuam præferens, alium conscendit ^q musculum, ipsi toto progressu subtensum. non amplius enim, uel puncto etiam, primus hic musculus, humerum seu brachij os contingit. Cæterum paulò supra cubiti articulum, ^r neruosior excarnisq; redditus, in robustum & crassum, & adamussim teretem finit tendinem, qui articulo expansus, & subdito ipsi musculo suffultus, in interiorē radij partem, modicè latefcens ^s inseritur, non nihil & articuli ligamento adnatus. Vt uerò commodior tendinis in radium efficeretur insertio, iam antea ^t latum, & modicè prominentem, inæqualemq; admodum in radij superiori fine processum extrui diximus. Atque hæc primi musculi est series, hoc sibi cum alijs quibusdam proprium uendicantis, quod liuidus comperiatur. ^u Secundus musculus huic succumbit omnino carneus, & nusquam insigniter nerueam ostendens substantiam, præterea longè primo musculo breuior, multoq; iuxta humiliorem ipsius ^x sedem latior existit. Ex humero enim ea sede principium ducere incipit, ubi infima musculorum brachium mouentium fit ^y insertio, quam attollens brachium musculus cum illo qui brachium pectori admo- uet, molitur. A latere nanque exteriori insertionis brachium attollentis musculi, secundus hic musculus carneum ^z principium ab humero sumit, quod acutum est, & sensim deorsum obliquè in priora humeri tendens, secundum attollentis musculi insertionis formam (quæ transuersa est) dilatescit, ac ab exterioribus introrsum modicè uersus inferiora declinat. Quum autem principium id, ad intimum insertionis brachium attollentis musculi latus prorepsit, ^a sursum denuò ad internum insertionis latus modicè repit, non adeò altè conscendens, atque iuxta externum ipsius latus enascebatur. Propter medium igitur longitudinis humeri secundus cubitum mouentium musculus enascitur carneo latoq; principio, quod ^b bicornè est, & in sui medio obtusum exprimit angulum. Quandoquidem principij exortus, linea ab externo latere humeri in anteriora deorsum obliquè fertur, & hinc ab anteriori parte sursum obliquè, uersus internum humeri latus ducitur, adeò ut unum principij cornu in externo humeri habeatur latere, alterum uerò in interno, & angulus in antica humeri sede consistat. Porro si præsens obliquæ huius lineæ ductus, illaq; duo principij cornua tanti æstimes, ut duplici principio posteriorem hunc musculum cum nonnullis Anatomicis enasci dicas, nunc me uerissimè, & multò aliter quàm ipsos, huius musculi initia enarrasse putato, atque mihi u-

mouentibus muscularis

Primus flectentium.

Li. 3 de Admini. sectio.

Secundus, seu flectentium posterior.

nus principij loco duo, quæ ponis, principia haberi finito, ne omnibus latis musculorum exortibus, præter morem plura principia cogar ascribere. Nisi enim id mihi donares, omnia lata musculorum principi ageminanda, aut si cum hoc secundi musculi principio cõferantur, pleraque principia etiã decuplanda præter omnem rationẽ forent. Præsens itaque musculus hoc enatus principio, sensim crassior carnosiorque efficitur, deorsum recta protensus, & humero ualidissime adnatus, ex ipsoque exortus sui robur toto descensu tantisper assumens, quousque cubiti articulum cõtingat, quem sua amplitudine carneaque substantia in tota anteriori sede integens, ualidissime articuli ligamento, & anteriori ulnæ ac radij sedi, ampla implantatione inseritur, sua sede, qua articulum transcendis, montis speciem appositissime repræsentans. Cæterum ut huius musculi ductus recto perficitur tramite, ita quoque prorsus rectas exigit fibras, quemadmodum & primus, quem nulla ratione huius subiecti fibras instar x literæ decussatim incumbere ausim asserere. Et quantumuis accuratè horum musculorum functionẽ intueor, haud aliud colligo, quàm utrumque rectissimæ cubiti flexionis autorem esse, siue ambos unà, siue seorsim singulos duntaxat contrahi ponamus. & cur, quæso, Galeni dissectionis professorum principis gratia, quas nunquam conspiciamus, cubiti flexiones nos decet cõfingere? Vt scilicet cubitum recta, & deinde in alterum latus inclinantem, flecti dicamus, ut primum utrisque musculis simul rectam flexionem, ac insuper singulis priuatim ad latera flexionem tribuamus, quando Galenus sibi non constat, utriusnam musculo, in internum latus, an in externum, flexionis munus assignari debeat. Aliter enim longè in Libris de Humani corporis partium usu, atque in Libris de Administrandis confectionibus, de horum musculorum dignitate usuque sentit. In his nanque posteriorem musculum cubiti flexionis in exteriora inclinantis autorem esse censet, anteriorem uero flexum moliri tradit introrsum uergentem. In illis autem, musculum anteriorem introrsum magis, posteriorem uero extrorsum magis flectere scriptum reliquit. Verum non ignoro, quum hæc perpendis (si modo ueritatis amator discendi que cupidus sis) te cubiti flexionem sedulo moliri, atque quum digitos summo humero adducis, arbitrari rectam flexionem effici: quum uero ad clauiculam pectorisque ossis summum, extremam manum ducis, in externum latus flexionem fieri: dum autem uersus scapulam digitos agis, in externum latus inclinantem cubiti flexionem celebrari. Ac proinde unà mecum Galeno nimium fidens colligis, ipsum rectissime has flexionis species proposuisse, etiam si interim in enarranda musculorum functione, sibi in commemoratis modò libris haudquaquam consentiat. Cæterum iam paulo post secus autumabis, quando humeri quoque in scapulæ acetabulo motum unà expenderis. Conare igitur nudis alicunde ascitis ossibus, ab omni circumductu tuum ipsius brachium immotum seruare, atque tunc demum stude in eodem brachij situ diuersam cubiti flexionem moliri: quam si tunc obseruaueris, tempus erit fibrarum decussationem seu intersectionem, & diuersum cubiti flexionis opificum musculorum ductum cum Galeno (etiam si tale quid nihil sit) comminisci. Porro quum præter rectissimam flexionem aliam nullam fieri conspicias, summi rerum Opificis solertiã encomio celebrabis, quòd huic motui duos ualidissimos præfecerit musculos, quia illum ualidum & ad plurima utilem homini futurum cognosceret. Atque huiusmodi rectissimos duntaxat motus in omnibus articulis, qui uerè mutuo ingressu, quem *γίγλυμον* appellamus, committuntur, obseruabis. Quomodo cunque enim quemlibet quatuor digitorum moueris, nunquam secundum & tertium internodium primario motu in latus aut flecti, aut extendi intueberis. Pariter etiam neque tibiam. & si Galenus coxendicis articulo deceptus, illi diuersos, & impense obliquos motus assignauerit. At de tibiæ motu suo agemus loco. nunc enim ad ulnæ cum humero cõmissuram reuertendū est, quæ mutuo ingressu (si modò totius corporis alia quæpiam) perficitur: ut interim de radij ad humerum connexu nihil asseram, qui omnino ne introrsum cubitus flecti posset, uel solus prohiberet. nisi fortè quis Galeno nimium deditus, externum humeri capitulū instar laxi cuiusdam tumoris esse contenderit, ut scilicet in flexione, quæ extrorsum perficeretur, radio tanquam digito cederet, & denuo quum introrsum cubitus flecteretur, humerus nō amplius compressus extuberaret. Quæ modò de flexione dixi, eadem de extensione proposita arbitrator: quam & si uarijs modis experiri queas, nullo tamen melius cubitum ne tantillum quidem in latus agi animaduertes, quàm si exactè protensum, uel pilo in alterum latus dimouere frustra conatus fueris. Inter cubitum extendentes musculos, primus ualido latoque & nerueo prorsus principio, ex humiliori scapulæ costa non procul ab eiusdem ceruice exoritur, peculiarem illic unde prodeat sinum obtinens. Cæterum principium id paulo post exortum carne adaugetur, musculumque constituit, qui recta deorsum ad internum latus posterioris sedis humeri fertur, illi non nisi magno satis sub ceruicis ipsius interuallo firmiter adnatus. Iuxta infimam

Primi & 2
musculorum
munus.

Lib. 3 de Usu
part. 5 de
Admi. sectio.

Extendentiū
primus.

c 84. N.

d 114. f. 1,
9, 12 T. 2 P.
10, 13 b. 4 u.
52. 6 f. 7 N.
10 d.
c 1 f. 64. 21
li. 1 Q.

nanque

f¹⁰ tab. 6. nanque sedem insertionis^f musculi brachium ad spinam uersus inferiora trahentis, iste cubi-
 tum mouens musculus primū humero connascitur, aut potius^g alia ex humero inibi enata
 g¹² ta. X. carnosī musculi pars, ipsi commiscetur, quemadmodum caudatæ simiæ & canis musculi manū
 13 ta. d. festō arguunt. In his nanque musculus, qui ab inferiori scapulæ costā enascitur, ab illo qui hīc
 ex humero prodit, omnino distinguitur. Carnosa igitur explantatione primus noster muscu-
 lus adauctus deorsum rectā fertur, medio interni lateris humeri & medio posterioris sedis hu-
 meri tantisper adnatus, dum partim carneus, partim nerueus, amplissimē in internū latus^h po-
 sterioris ulnæ processus inseratur, in descēsu semper ab ea quam dixi humeri sede ad finem usq;
 ipsius, humero adnatus, ac ex ipso principij robur assumens. Integrū itaq; est, in hominē hunc
 musculum uniuersum, aut unum dicere, aut duos: utⁱ unus quidem à scapula enascatur,^k al-
 ter autem ab humero, qui cum illo cōfunditur, cui scapula principium præbet. At Galeni no-
 mine, quum in caudatis simijs duo manifesti apparent, duos illos in præsentia ponamus.^l Ter-
 tius igitur extendentium, qui in uniuersa cubiti musculorum serie quintus censetur, à poste-
 riori sede ceruicis humeri, ad capitis ipsius radicem neruosus^m enascitur, & sensim rectā deor-
 sum descendens, & externam sedem posterioris humeri regionis occupans, carnosus euadit,
 & pertinacissimē humero adnatus ab ipso principij sui uigorem mutuatur.ⁿ Priusquam uerò
 medium longitudinis brachij hīc musculus superauit, duobus nuper dictis ita commisce-
 tur, & cum ipsis adeò coit, ut nullo prorsus pacto in hominibus discerni queant, nihilq; aliud
 quàm unum ex tribus effici musculū asserere possis. Quamuis interim tertius musculus suum
 quem à principio obtinebat ductum obseruet, atque ualidissimē in externum latus posterioris
 ulnæ^o processus partim carneus, partim nerueus inseratur. Atque ita tribus his musculis mu-
 tuò coeuntibus, totus ille posterior ulnæ processus amplexatur, in sui sedis inferiori parte, cui
 innitimur, neruosiorē insertionis partem, quàm in lateribus, & superius exigēs. Mutuus enim
 ille musculorum concursus, ac ueluti ex omnibus unus efformatus musculus, in posteriori se-
 de admodum liuidus cōspicitur, tanto neruosior euadens, quāto ulnæ processui propiūs acce-
 dit. Vtunque uerò inter se musculi hi concurrant, nullus tamen ab initio inceptum fibrarum
 ductum deperdit, sed rectæ omnes deorsum, nusquam implexæ, neque sese decussatim inter-
 secantes feruntur, & eandem omnes functionem obeunt, qua cubitum in neutrum latus incli-
 nantem extendunt. Liquet igitur tres hos musculos unius loco recenseri posse, qui ex tribus
 conformatus esset principijs, aut duorum, si uidelicet primum & secundum unius loco habue-
 ris. At in caudatis simijs & canibus fieri id nequit. nam his animalibus perinde ac equo, & bo-
 uī, & alijs plerisque, quæ anterioribus cruribus innituntur, atque in ingressu ualida extensio-
 ne cubiti indigent, tres obtigerunt musculi egregiē conspicui, præter unum gracillimum in
 caudatis simijs à scapula ad ulnam porrectum, & penitus à Galeno prætermisum. Quum in-
 terim canibus unicus tantum flexionis autor adsit, ut sanē simijs duo, illis prorsus similes qui
 in homine uisuntur, nisi quod posterior nonnihil posteriūs ab humero in simijs procedit, &
 neruosior in ipsa insertionē cōspicitur. Cæterum simijs exteriorum primus ex scapulæ humi-
 liori costā, ut hominibus, oritur: sed duo principia mox inuicem coeuntia obtinet, & deorsum
 tensus, carnosusq; admodum redditus, nulli connascitur musculo, sed paulò supra cubiti ar-
 ticulum extenuatus, nerueusq; factus, internæ sedi posterioris ulnæ processus inseritur. Se-
 cundus huic subiacet, & ubi homini secundus nasci dictus est, exoritur, toti humeri longitu-
 dini tantisper adnatus, quousque ualida insertionē mediæ, & posticæ processus ulnæ sedi in-
 seratur. Tertius, ut in hominibus, ab humeri ceruice principium ducit: inde carnosus eua-
 dens, & nulli musculo, præterquam fibrosis nexibus, hærens, in exteriorem sedem postero-
 ris ulnæ processus implantatur. Atque hi sunt musculi, quos post scriptos de Vsu partium li-
 bros Galenus diligenter secuit: quamuis obscurē interim, ne ipsius errorem animaduertere-
 mus, nobis in libris de Administrandis sectionibus eos expressit, non passim libros de Vsu
 partium, quos iam olim Boëtho dedicarat, reformaturus. Quanquam tamen suo exempla-
 ri, quod postea ad posteros demanauit, illum nonnullas lineas inseruisse certò colligo. at in
 cubiti motus ducum enarratione, in libris de Vsu partium nihil sub incudem reuocauit.
 Quæ omnia ostensurus sum meis in Galeni Anatomica annotationibus, iam pridem non in-
 feliciter ceptis, ac seorsum aut cum Galeni libris multo quàm an-
 tea emendationibus aliquando cudendis.

Carnosa pars
 qua primus ex-
 tendentium au-
 getur, quem se-
 cundum consti-
 tuere licet.

Li. de Admi-
 ni. sectio.
 Tertius ex-
 tendentium.

Quomodo in
 canibus cubitū
 agētes muscu-
 li habent.

In Galeni
 Anatomica
 Annotationes.

ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS
DE MANVS LIGAMENTIS.
Caput XLVII.

Cuiusmodi in
manu sint liga-
menta.



Ligamenta
anulorum mo-
do tendines
continentia.

Lib. 1 de Ad-
mini. sectio.

Membrana
musculis obna-
ta.

Ligamenta
ossa inuicem
committentia.

ANVM Hippocrates appellauit, quicquid à scapula ad extremam usque digitorum aciem protenditur, cuius nunc ligamenta nobis enarranda ueniunt. Horum igitur alia inuicem ossa colligant, alia subditis corporibus munimenta existunt, instar tunicarum musculis obducta. Alia ad hæc, tendines in suis sinibus ita continent, ut quocunque modo tracti fuerint, sua sede ne tantillum quidem uagari queant. Porro tendinum^a inuolucra, abunde prius explicauimus, quum singulis tendinibus per brachiale, & uolam ad digitos reptantibus obductas dixi membranas, mucore quodam imbutas, & ligamentorum ritu tendinibus obductas. Quæ uerò subditis corporibus munimenta, & ne ex ipsorum cauitatibus declinent uincula censentur, transuersa sunt ligamenta, tendines in suis sinibus continentia. Sunt autem huius generis in manu quàm plurima. Siquidem uniuersæ interiori^b sedis quatuor digitorum unum exporrigitur, & pollicis etiam secundo & quasi tertio interno^c dio unum eius generis expanditur, atque hæc omnia eundem præstant usum, quo^d tendines digitos flectentes amplexantur, & anuli modo continent. In interna brachialis regione^e unum conspicitur, omnes digitorum tendines, qui hæc prorepunt constringens. atque hoc latum est, & cæteris omnibus huius generis robustius, sed interim neque postbrachiale, neque cubitum contingens. Cæterum in externis cubiti partibus quæ brachiali articulatur, sex transuersa ligamenta sese offerunt, quorum beneficio tendines in ossium sinibus reseruantur. At hæc, si in superficie tantum spectentur, unicum esse uidebuntur, totius cubiti latitudini expansum, quod dissectum sex spectandos offert anulos, transeuntibus tendinibus obductos. Unde etiam id in sex ligamenta, perinde ac cæteri Anatomici, distinguimus, non sanè quòd omnia ipsis cognita fuerint (nam Galenum duo latuerunt) sed quòd ipsi hic tot ligamenta recensuerint, quot reperièrè anulos. ^fPrimum ex ulna in radium procedit, atque ad communem ulnæ radij^g sinum refertur, quod non^h tendinibus, digitos quatuor extendentibus (ut Galenus non rectè arbitratur) obuolutum est: at illud sibi peculiare uendicat isⁱ musculus, quem ipse paruum & anularem à reliquis abducere tradidit, nos uerò paruū digitum præcipuè ab illo extendi asseruimus. ^kSecundum ad externum primi ligamenti latus repositum, soli ulnæ illi^l musculo peculiare est, qui ante paruum digitum insertionem tentans, brachialis extensionis opifex censetur. ^mTertium ad internum primi ligamenti latus habetur, soliⁿ radio proprium est, eos amplectens^o tendines, qui Galeni suffragio quatuor extendunt digitos. ^pQuartum ad internum latus tertij positum, angustissimum efficit anulum, ut & tendo, quem transmittit, gracilis est. ille enim à^q musculo procedit, qui indicem & medium à pollice deberet abducere. ^rQuintum bicorni^s tendini, quo brachiale extenditur, & illi qui pollicem uersus indicem euerit, uiam largitur: quanquam interdum pollicis musculo priuatum quoque ligamentum obducatur, adeò ut septem tunc ligamenta in externa cubiti sede reponantur. Alioquin enim^t sextum^u tres tendines transmittit, quorum unus brachialis ossi ante pollicem, alter primo pollicis ossi, tertius autem secundo & tertio inseritur. Sanè & hos tendines, quum hæc ligamenta ad amussim perpendimus, singulos sua ligamenta sortiri, non semel obseruauimus. ^xPræter hæc ligamenta, per uniuersam cubiti longitudinem, omnibus musculis ualida membrana obnascitur, musculos inuicem committens, atque ne sua sede illi dimoueantur, atque inter sese implicentur, transuersi alicuius ligamenti ritu continens, cuiusmodi etiam in tibia haberi audies omnibus illic repositis musculis eleganter obductum. Quum itaq; & huius membranæ ligamenti ue naturā inter disseccandum ad amussim didiceris, id quoq; in transuersorum ligamentorum classe reposito: quanquam non laxè, sed pertinaciter musculis adnascitur, propriæ musculorum membranæ modo. Ligamenta quæ ossa inuicem colligant, in omnibus sunt articulis, nullam (nisi paucissima) peculiarem naturam à cæteris articulos amittentibus ligamenti sortita. ^yMembraneis enim & articulum solum circundantibus ligamentis digitorum necestuntur internodia. Postbrachiale autem brachiali, ualidis ligamenti per exteriora etiam ductis colligatur. At postbrachialis ossa, quæ mutuò in ipsarum radice iuxta brachiale se spectant, cartilaginis naturam referentibus ligamenti inuicem committuntur, quæ non orbiculatim ossa tantum ambiunt, uerum & in ipsorum medio habentur, quæ, uti diximus, ossa se inuicem respiciunt. Brachialis ossa ualidissimis ligamenti cartilaginis naturam referentibus, simul unita hærent, atque hæc ligamenta ipsis undique obducuntur, & quibusdam etiam sedibus illa intercedunt: idq; potissimum in illorum ossium interuallis, quæ

a In 3 ta. uo-
la.

b Extrema
manus 4 ta
bula.
c 5 tab. 1. 6
ta. 1. 7.
d 4 tab. 1. 5
v. 8.
e 2 ta. cha-
ract. 1. 2, 3,
4, 5, 6. 7
ta. 1. cha. 3,
4, 5, 6.

f 2 ta. cha-
ract. 1.
g 2 fig. cap.
24 li. 1. 8.
h 2 ta. mu-
sculi V. aut
9 ta. 2. dein
b.
i 2 ta. X. 9
o.
k 2 ta. cha-
ract. 2.
l 2 tab. X. 9
A.
m 1, 2 tab.
cha. 3.
n 2 ta. mu-
sculi V.
o 1, 2 tab.
cha. 4.
p 10 tab. p.
q 1, 2 tab.
cha. 5.
r 11 ta. mu-
sculi A.
s 10 ta. o.
t 1, 2 tab.
cha. 6.
u 10 tab. k,
m, n.

x Hanc quæ
tenuissima
et pellucida
sit, picturis
aliter pro-
ponere ne-
quimus,
quàm totæ
1, 2, 9 tabu-
le se offerunt
y Et hæc
ex ossibus
duntaxat
petenda sunt
quæ

quæ in secundo ordine reponuntur, quibusq; postbrachiale coarctatur. Quæ cubitum seu radi-
dium ulnamq; brachiali colligant, membraneis reliquorum articulorum ligamentis respon-
dent, sed ab apice processus stylium imitantis, ligamentum huius articuli durius efficitur, quasi
hinc peculiare quodammodo teres in brachialis os duceretur, quod rectum est, & cæteris ma-
gis cartilaginofum, uniq; tantum ossi commissum. Huic ligamento Galenus digniorem, quàm
ego assequor, usum tribuit. nam ad nullum mihi motum priuatim magis, quàm uniuersum hu-
ius articuli ligamentum famulari uidetur. Quin etiam ex apice radij appendicis simile & insi-
gnius quoque in brachiale fertur, quod liquidissimè eum usum, quem Galenus alteri asscri-
bit, uanum esse commonstrat. Radius uerò & ulna, propter brachiale & cubiti cum humero ar-
ticulum, ligamentis ualidis, in circuitu ossa ambientibus alligatur. At accuratissimè tibi in me-
moriâ reuocanda uenit ea^a cartilago, quam à radio procedentem ulnam à brachiali distin-
guere diximus, quæ ualidè etiâ ulnæ ad radicem acuti illius processus, quasi ligamenti naturam
nacta inseritur. Per totam longitudinē, qua inuicem radius & ulna dehiscunt, ualidum & mem-
braneum^b ligamentum habetur, ab acutiori ulnæ^c linea in radij^d lineam insertum. Hoc non
simplex conspicitur membrana, uerum (ut pleraq; ligamenta) ex fibris conflatum spectatur, à
radio deorsum in ulnam obliquè proreptantibus. Huius beneficio, præterquam quod ipso ossa
inuicem alligantur, interiores cubiti musculi ab exterioribus dirimuntur, & ut antea monui, ex
ipso^e musculi etiam nonnulli suorū principiorū robur asciscunt. Radius humeri exteriori capiti
ualidis, sed membraneis ligamētis perinde ac cæteri articuli, alligatur. Et quamuis tutissimus sit
ulnæ cum humero articulus, tamen robustis quoque ligamentis humerum ulnæ Natura com-
misit, quæ similiter articulum in circuitu amplexetur. Præter hæc ligamina in manu nulla sunt,
nisi & horum albo^f ligamenta, quæ in musculorum constitutionem ingrediuntur, & proprias
ipsorum membranas efformant, reponere statueris. quæ interdum in tantam pertingunt cras-
sitiem, ut quum musculi caro ipsis subsit, liuorem quendam musculis inducant. Atque eius-
modi crassius ligamentum uentri obducitur^g musculi, pollicem à cæteris digitis maximè ab-
ducentis. Præter hunc, ^h musculus anterior flectentium cubitum, uentrem quoque liuescen-
tem, ob membranæ crassitiem adipiscitur, quemadmodum etiam illi; idq; admodum clarè, qui
cubitum extenduntⁱ multò ante ipsorum insertionem, quam in ulnæ posteriorem processum
moliuntur.

Ligamenta
musculorum
cōstitutionem
subeuntia.

ADMINISTRATIO MUSCULORVM ET

ligamentorum manus, ac dein quot quaq; sede reponantur
musculi. Caput XLVIII.



N præsentia brachium id cum scapula depromendum est, quod ad manus
musculorum administrationē, quum thoracis aggredieris musculos, ali-
quò relocandum præcepi. Priusquam uerò sectionem auspiceris, quot in
singulis partibus musculi reponantur, in memoriâ reuoca. quod ut prom-
ptius facias, nunc omnes in compendium tibi digeram. In extrema manu
utcunque illos numeres, uiginti enarrauimus. ^a decem nimirum, quibus
prima quinque digitorum internodia flectuntur, quorum bini ad singu-
los referuntur digitos. ^b tres, quibus secundum pollicis flectitur internodium, ^c unus pollicem
maximè à reliquis digitis abducens, ^d alius eundem proximè cæteris digitis admouēs, ^e tertius
qui minimum à cæteris ualidissimè in latus remouet: postremò ^f quatuor illi graciles musculi,
quorum beneficio quatuor digiti ad pollicē obliquo ductu agūtur. Internā cubiti sedem octo
musculi occupāt, quorum^g primus latum educit tendinem, ^h secundus & ⁱ tertius, quibus bra-
chiale flectitur, ^k quartus secundū quatuor digitorum flectens os, ^l quintus qui tertiu quatuor
digitorum os flectit, ^m sextus qui tertij pollicis ossis flexus est autor. ⁿ septimus & ^o octauus, ra-
dium in prouum ducunt. Si uerò musculum, tertiu quatuor digitorū os flectentē, unum esse
cum illo qui tertio pollicis ossi famulatur, putaueris, interna cubiti sedes septem tantum muscu-
los habitura est. In externa autē cubiti regione nos decem numerauimus: ^p tres scilicet, qui qua-
tuor digitos extendūt, & à pollice abducūt, ^q unum qui pollicē ad indicē magis euertit, ^r alium
qui pollicem euertens, eundem ab indice magis remouet, ^s alium illi proximū, ac ad brachialis
extensionem aliquid accommodantem, ^t duos insignes brachiale extendentes, & ^u duos quorum
ope radius in supinū ducitur. Si uerò illud principiū, quod ex ulna enasci, & in duas carnosas
partes diffundi diximus, quorum altera indicem præcipuè, & medium digitū, altera pollicem
petebat, unius musculi uice enumeratū esse uelis, hîc reponētur nouem; dein si secundum prin-
cipium

Quot muscu-
li in extrema
manu.

In interna cu-
biti sede.

In externa.

a 6 ta. x. 2.
b 8 ta. sub
Δ.
c 7 ta. cha.
12. 23.
d 3 tab. p.
e 11 tab. f.
4. 11.
f 3 ta. r. 4. x.
g 6 ta. f. f. 7
ta. d.
h 3 ta. n.
i 3 tab. Δ.
j 3 ta. m.
k 4 tab. β.
l 5 ta. o.
m 5 tab. q.
n 7 tab. V.
o 7 ta. X.
p 9 tab. Z.
q primus, se-
cundus o, ter-
tius 10 ta. p.
r 10 tab. o.
s 10 tab. l.
t 11 ta. Δ. 9
ta. Z.
u 12 tab. o.
v Δ.

Poteris hîc
spectare i, k
12 ta.

a 1, 2, 3 fig.
ca. 24 lib. 1
T.

b 7 ta. V in
ter S & T.
23 tab. k in-
ter e & i.

c 1 fig. cap.
24 lib. 1 cc.
d eiusdem
fi. r. r.

e 6 ta. Z. n.
10 ta. 3. n.

f Talia o.
mmium mu-
sculorum
sunt princi-
pia.
g 3 ta. p.
h 6 ta. o.
i 2 tab. sub
Q ad R.

*In brachio.**Sectionē spe-
rantū negli-
gentia.**Manus exco-
riatio.**Musculi la-
tescentem ten-
dinem educen-
tis administra-
tio.**Lib. 1 de Ad-
mi. sectio.*

cipium iunxeris, uniusque musculi loco habueris, octo erunt, nam bis unum, ubi nos duos con-
stituimus, recenses. In anteriori brachij sede^x duo flectentes cubitum sunt, in posteriori au-
tem sede extendentes, aut^y tres, aut duo, aut unus, pro ratione nimirum collectionis in pau-
ciores, uel distributionis in plures, quam tuo arbitratu proponere nihil obstat, si modò accu-
ratè illorum situm, connexum, amplitudinem, compositionem, functionem, & id genus alia
secando didiceris. Quippe ridiculum est de numero anxium esse, quanquam in publicis sectio-
nibus, quum huius aut illius articuli musculos ita ostendi, ut nō minùs quàm proprii ungues
cognosci possint, perpauci studiosorum aliud recensere ualeant, quàm hac prælectione qua-
draginta ostensos esse musculos. id satis arbitrati, si numero condiscipulum deterreant, nego-
cijque difficultatem, & me unica ostensione nimium multa aggredientem incusent. In hoc ta-
men, qui inter illos diligentiores uideri uolunt, sedulò student, ut in quibus à Galeno dissen-
tiam, sæpe quid uelim, non intelligentes excipiant & ad hos & illos ipsis indoctiores transcri-
bant. Quo labore ut ipsos liberem, hæc à me toties efflagitata candidiori animo, quàm à ple-
risque accipienda erunt, describere neuiquam grauior: unumquemque amicè monens, ne quis
huic libro, neque alteri cuiquam, utcunque uetustate autoritateque probato fidem præbeat, nisi
accuratissima sectione, quæ scribuntur, prius, idque non semel inspexerit. Porro hanc, brachio
eius quod secas, cadaueris assumpto, ad hunc modum in manus musculis administraturus es.

Primum cutem cum adipe & membrana, quam carnosam uocare libuit, adimes: atque id per-
feceris commodissimè, si ab externa brachij sede, secundum radij ductum, & pollicis exteriora
sectionem duxeris, quæ cutem membranamque carnosam diuidat. Dein ad cuiusque digiti la-
tus alia ducenda est sectio, quæ depilem (ut sic dicam) manus cutem, ab exteriori dirimat, ut illa
cum brachij & cubiti cute auelli queat, ea quæ internam summæ manus sedem integit, adhuc
relicta. Neque in cute adimenda nunc alio indiges artificio, quàm quo lanij boues excoriant.
Quum tamen ad radicē brachialis, in interna manus sede peruentum fuerit, transuersa sectione
cutem nunc liberatā ab illa, quæ in uola adhuc reliqua est, refecabis, hæc namque latescens^a ten-
dinis nomine asseruāda uenit. Priusquā uerò tendinē illum aggrediaris, accuratè perpendito,
totam cubiti sedem paulò minus toto liuescentem, ob membranam quæ musculis proximè
adnata, illos inuicem committit, atque ne ipsi sua sede declinent, amplectitur. In conspectum
enim cubitum occupantes musculi iam ueniunt, sed ita commissi, ut solum lineas, quæ ipsos di-
riment, intuearis: quum tamen mutuò prorsus disiuncti apparebunt, si leues duntaxat sectiones
secundum dictas modò lineas duxeris. Huius membranæ naturam eo obseruabis diligentius,
quo magis perfunctoriè, imò nihil prorsus Anatomici illius meminerint. Cæterum ut latecen-
tem uideas tendinem, animum accommoda cubiti internæ sedi, in cuius longitudine ipsius mu-
sculus, & tendo, quum adhuc gracilis est, exporrigitur. Cultello itaque à brachialis radice sectio-
nem leuem, ad tendinis & musculi latus utrinque,^b uersus internum humeri tuberculum mo-
lieris, & postmodum iuxta brachiale, tendinem à sublati organo liberabis, & cultello transuer-
sim ipsi subiecto, & sinistrae manus digitis tendine eleuato, uniuersum musculum ad ipsius us-
que caput separabis. Deinceps acutiori nouacula cutem manus adhuc reliquam, à uola & digi-
tis absecare conator, à brachiali sectiones semper transuersas molitus, eadem omnino ratione,
qua cutem à carnea membrana diuidere iam dudum assueuisti. Quemadmodum enim in illa
sectione membranam corpori affixam seruas, ita quoque tendinem dilatescentem manui iam
hærere sinis. Quū uerò id tentas, duriusculus sese offeret adeps, cutem & tendinem illum inter-
cedens, qui tanto diligentius quoque animaduertendus est, quanto tendinem magis à cute diri-
mit: & tendinem non toti cuti proximè adnatum, sed duntaxat fibrosis nexibus membranæ
carnosæ modo, & adipis interuentu, pertinacissimè commissum ostendit. Examinata cute, mu-
sculi caput ab humero liberatum, à brachiali pendere fines latefcentem tendinem, à subditis
quoque aut nouacula, aut paruo, sed acutiori cultello auulsurus. Si uerò aliquando uisum
fuerit, tendinem unā cum cute adimere, id feceris facillimè, si tendinem priusquam cutem se-
paras, unā cum cute abstuleris, at tunc arduum erit, tendinem à cute integrum liberare: quam-
uis non adeò, ut Galenus arbitratus est, qui nihil medium inter cutem & tendinem posuisse
uidetur. Porro si hic musculus in interna cubiti sede sese non offerat, atque^c duorum musculo-

rum, qui brachiale flectunt, capitibus ad humeri interius tuberculum, nullum musculum in-
cumbere uideris, præsentem musculum deesse cōiuncto: quod sanè non infrequenter tibi occur-
surum scio. Nō quòd negligentia illum præteriturus sis, uerū quòd prorsus deerit, eius uicem
tunc supplente^d inferiori, interdum etiā^e superiori brachiale flectentiū musculo, aut^f transuersi
in brachiali ligamenti portione, quam pari modo ut latum tendinē indagabis. Iam itaque omnia
cute libera sunt, unde etiam & quosdā extremæ manus musculos citra aliam sectionem aggredi
possis,

x 6 ta. 8, 8
ta. r.
y 13 tab. b,
c, d.

a 3 ta. mu-
sculi n.

b Versus 3
tabula.

c 3 ta. A, m.

d 3 tab. m.
e 3 ta. A.
f 4 tab. f.

g 3 ta. p. possis, eum uidelicet^s qui pollicem à reliquis digitis remotissimè abducit, & deinde^h duos pri-
 mum ipsius internodiū flectentes, sic &ⁱ muscolum, cuius beneficio paruus digitus à reliquis
 i 3 ta. r. aut maximè abducitur, &^k exteriorem primum eius digiti os flectentium diffecare liceret. At op-
 4 ta. n. portuniùs feceris, si donec omnes summæ manus musculos adimere possis, hos seruaueris, atq;
 h 4 ta. f. ad internam cubiti sedem te rursus contuleris, in qua primum administrandi ueniunt^l duo bra-
 l 3 ta. A, m. chiale flectentes, quos rectissimè primum ab ipsorum tendinibus, iuxta brachialis radicem ag-
 gredieris. Si enim hos à subditis musculis aliquantisper auulsos eleuaueris, ac deinde transuer-
 sis sectionibus, illos ad internum usque humeri tuberculum à subditis liberaueris, uniuersam
 m ut 3 ta. *. ipsorum ferè naturam mediocri negotio spectabis. Inferioris nanque capite absecto, & muscu-
 lo ab ulna liberato, ut is duntaxat ab insertionem^m dependat, ipsum ut uisum fuerit, aut adimes,
 n ut in 3 ta. sinistra ma- aut adhuc appensum fines. Superioris autem tendo, à brachiali nō est absecandus, uerum aut
 nu. nit resecandus, ut in sectionis serie, eius tendinis insertio reddatur conspicua. Mox^o primus di-
 o 4 ta. b. o. gitus mouentium sese totus offert, quem uel solis digitis à subdito dirimes, quemadmodum
 atq; ita seri etiam omnes, quorum latera non committit neruosa illa membrana, quæ communis ligamen-
 atim nota- timunere fungitur. Vbi itaque ipsius capite adhuc ad exortum commissio, quatuor ipsius an-
 tam in mar te brachiale carnosas portiones inspexeris, ualidus cultellus in transuersum^p ligamentum re-
 gine tabu- ctā est iniiciendus, ut huius acie antrorsum ducta, id ligamentum diuidatur. Dein eadem ra-
 lam, & hac tione secundum indicis longitudinem, transuersum internæ ipsius sedis ligamentum diuides,
 precedentē & sequen- mentem accommodans, ne hac prorepentes tendines lædas, quod optimè caueris, dummo-
 tem unā, uti do cultelli dorsum semper tendines respiciat, ipseq; cultellus rectus sit. Eandem sectionem in tri-
 in ceteris bus reliquis digitis moliri in præsentia posses, nisi sensim magis magisque horum ligamentorū
 administrati- tionibus in- naturam aut discere, aut alijs ostendere propositum esset. In indice itaq; duntaxat, aut alio quo-
 spicito. uis digito hac ducta sectione, primi musculi digitos mouentium caput liberato, & illo appre-
 p 3 ta. f. henso, & ad te sursum tracto, id ex brachialis sinu tantisper reponito, quousq; quatuor ipsius
 tendines ad quatuor digitos porrigi conspexeris, & deinde priuatim illius tendinis insertio-
 nem obseruaueris, qui indici exporrigit. Hac enim inspecta, & musculo rursus in suam sedem
 reposito, eius caput trahendū uenit, ut ipsius innotescat munus, intuearisq; qua ratione primo
 indicis articulo in flexu secūdi, tendo ille adniti nolit, uti sanè reliqui transuersis adhuc ligamen-
 tis inuoluti innituntur, proxime ue attenduntur. Nunc ligamentis trium reliquorū digitorum,
 ac cuiusq; tendinis insertionem & perforationem, qua subditum transmittunt tendinem, notatis,
 muscolum à manu in anteriora reflexum mensæ exporriges, aut si in sinu manum habueris,
 q 6 ta. z. propendēre à digitis fines, ac^q eum qui tertium quatuor digitorum internodium flectit, suo
 capite liberabis, quod nōnihil occultitur sub musculo, superiorem radij partem in pronum du-
 cente. Priusquam tamen id ab ulna abrasas, cōducet ex brachialis sinu quatuor ipsius tendines
 r 6 ta. v. attollere, & animum adhibere, quī citra omnem operam musculus hos tendines produciens
 ab^r illo diuellatur, qui ipsius superiori lateri accumbēs, tertij pollicis ossis flexionis autor habe-
 tur adeo, ut utrunque musculi unius loco in homine habere nequeas. Liberato itaque secūdi
 s 7 ta. v in musculi capite & ipsius quoque exortu, quem ab ulnæ^s ligamento assumit (quod inter ra-
 ter S. T. dium & ulnam, ubi inuicem hæc ossa dehiscunt, obuium est) uniuersum musculū ex brachialis
 sinu repones, eius mucosam perpendens membranam, & tendinum ipsius seriem. Cauendum
 t 6 ta. f. 7 tamen est, ne quum eos attollere studes, gracilem^t muscolum singulis tendinibus exporre-
 ta. d. ctum uioles, hic enim quum tendini committitur, atq; etiam primo digiti ossi inseritur, ad ter-
 tium usque articulum secūdi musculi tendines oscitāter eleuare prohibet. Quum itaq; hos ten-
 u 6 tabu. 1 dines^u primi musculi tendinibus trañci atque in tertium os inferi uideris, utrunq; muscolum in
 transmittit suum locum reponito, examinaturus num secūdi musculi tendines primū digitorū os flectant
 tendines z. soli, aut simul cum ipsiis primi musculi tendines, & eius generis reliqua, quæ in horum muscu-
 lorum functionis enarratione proposuimus. Primo musculo à digitis resecto, secundum in
 brachialis sinu transuersim diuides, ut ipsius tendines adhuc in uola referuentur, gracilium
 x 6 ta. n. musculorum causa, quatuor digitos pollici adducentium. Modò^x tertium muscolum pollici
 subseruientem à radio liberabis, & ad tertium pollicis internodium duces, ipsius tamen trans-
 uerso ligamento, ut in reliquis digitis, prius diuiso. Hunc ubi abstuleris, y musculi brachiale
 y 3 ta. A. flectentium superioris insertionem specularere, quam in radicem postbrachialis^z ossis in-
 z 1 fi. ca. 25 dicem sustinentis molitur. Atque nunc tibi in interna cubiti sede adhuc^a duo tantum muscu-
 li. 1. l. li supersunt, radium in pronum mouentes, qui quum citra aliam operam conspicui sint, do-
 a 7 ta. Q. nec & horum oppositos uideas, opportuniùs seruabuntur. In præsentī itaque ad externam
 b 2 ta. cha. cubiti sedem accedas, in ea potissimum obseruaturus^b transuersa ligamenta, quæ ac si unum
 2, 3, 4, 5 essent,

Primi & se-
cundi brachia-
le mouentium.

Primi digitos
mouentium.

Secundi.

Tertij digi-
tos mouentū
administra-
tio.

Transuerso-
rum ligamen-
torū in exte-
na cubiti sede.

Tertij brachiale mouentiu.

Decimioctauus & 17 digitorum mouentiu administratio.

Decimimonus administratio.

21, 22 digitorum mouentiu, et dein eius qui in illorum descriptione 23 numeratur.

Quarti brachiale mouentiu. Radium mouentiu admi.

Quatuor musculorum quatuor digitorum pollicis adductum, & aliorum extremam manu occupantium.

Ligamentorum reliquorum administratio.

essent, sese offerent, uerum dum tendinibus, quos ligamenta continent, mentem accommodabis, ac seorsum unumquodque, ut in interna digitorum sede præcepimus, administraueris, ut minimum sex numero occurrant, quæ antequam musculos separe, diuidere possis, nisi prius in cubito cuiusque musculi tendinem separare statueris. At commodius erit aut simul omnia ante musculos, aut priuatim unumquodque saltim ante suum musculum aggredi. Primus autem esse potest, qui postbrachiali ante paruum digitum insertus id extendit, cuius tendo ex suo^d sinu eleuabitur, & deinde acuto cultello, aut nouacula totus musculus ab ulna liberabitur accurate interim ab illo, qui superiori ipsius lateri committitur, qui parui digiti extensioni potissimum famulatur, diuisus. Vbi itaque huius caput ab externo humeri tuberculo dissectueris, illum postmodum à postbrachiali liberabis, nisi appensum ipsi asseruare lubeat, quo tandem brachiale extendentium & flectentium musculorum munus conspici ualeas. Post hunc is ex sinu attolletur, qui minimos digitos à cæteris deberet abducere, cuius tendines, aut tendo potius ad digitos ducendus non est, nisi ab externo humeri tuberculo is, cum subsequenti iam in enarratione musculo (qui digitos mouentium decimus septimus numerabatur) liberatus fuerit. Illum autem diligenter ex suo, quem nos ipsi tribuimus, sinu attolles, atque ab illis, qui superiori ipsius lateri exporriguntur, diuisum, ab humero quoque resecabis, nunc sedulo animaduertens, num intres, aut quatuor ducatur tendines, & quibusnam digitis illi inserantur, quæque ipsorum ad digitorum radices sit commixtio. Idem in illo, qui paruum digitum præcipue extendit, molieris, neutrum ab ipsis digitis absecans, nisi & modò^e subsequentem ad insertionem usque deduxeris. Occurrent enim nunc tria illa, quæ ulna producit principia, quorum inferius, & brachiali propinquius obseruandum uenit, à quo musculus pronascitur, qui indicem & medium à pollice abducit. Huius itaque principij portionem, quæ illum musculum constituit, ab ulna diuides, atque ex suo peculiari sinu eleuatum, & sensim à brachiali & postbrachiali, quibus fibroso nexu hæret, liberatum, ad digitos usque deduces, ad amissum nunc trium illorum musculorum tendines, & insertionem perpendens, quam multò accuratius intueberis, quam ego illam (quum varia sit) describere possim. Cæterum illis à digitorum internodijs ad unguem usque radicem resecatis, qui pollicem euertit, aggredieris, ab ulna itaque, reliqua tertij principij parte resecta, musculus pollicem uersus indicem evertens, ad ipsius insertionem ducetur, similiter secundij principij musculi, qui bicornem transcendunt tendinem, ad pollicem & brachiale usque auellentur, atque una cum reliquis à digitis reicientur.^m Qui bicorni tendine brachiale extendit, modò prorsus est conspicuus, nisi quod nonnihil sub musculo longiori radium mouentium occultatur. hic itaque suo exortu liberatus, ad postbrachiale ducetur, & ipsius examinata functione, etiam cum cæteris abijci poterit. Super sunt adhuc in externa cubiti sede, duo radium in supinum agētes, qui citra sectionem etiam, ut & interiores radij duces, sunt conspicui, longissimi tantum capite excepto, quod penitus nonnihil inter posteriorem cubitum flectentium musculum, & extendentium^s exteriorem latitat, non tamen adeò impense, ut non liceat ipsius capite ab humero resecto, illum ad insertionem usque cum reliquis radium mouentibus musculis perducere. Si itaque nunc ligamentum in cubiti longitudine inter ossa positum animaduertentis, extremæ manus musculos ordine aggredi tempestiuum fuerit, ex quibus quatuor statim graciles erant dunt conspicui, quos Natura^x tendinibus tertium digitorum os flectentibus exporrexerat. Deinceps ille liberatur, qui pollicem ab indice maximè remouet, mox^z duo primum pollicis internodium flectentes. Deinde tres secundum pollicis os flectentes, quos eo diligentius obseruare oportet, quo magis antehac dissectionis Professoribus incogniti fuerint. Hos subsequetur, qui pollicem indici proximè accommodat, dein qui paruum ualidissimè abducit, ut tantum octo adhuc sint reliqui, quorum ope prima quatuor digitorum internodia flectimus. Iam digitorum articulos diuides, ligamenti & articuli speciem obseruas, & attentissimè perpendens, ossiculorum usum, quæ à sesami seminis similitudine nomen mutuatur. Reperies enim in interiori secundi pollicis articuli regione, duo reliquis in manu insigniora, in hoc ibidem fabricata, ut quum in articulatione illum articulum Natura fieri uoluerit, is tamen firmitus esset, & ad flexionem in acutissimum angulum pertinax, & obliquorum etiam motuum obscurissimè particeps. Deinde tanto minora eius classis ossa in primis reliquorum internodijs uidebis, quanto in acutum magis hos articulos Natura flecti uoluit, & ipsos obliquioribus motibus, quam secundum pollicis internodium, donare uisum fuit. Insuper primum pollicis articulum diuides, eiusmodi ossibus destitutum, & laxum admodum. Idem quoque in postbrachialis & brachialis ossibus experieris, at longè diligentissimè brachialis ad cubitum articulo animum accommodabis, quod hic cartilago examinanda ueniat, ulnam à brachiali dirimens. Quinetiam perpende, obsecro, stylium imitantem processum non procerius extra sinum, quo brachiale excipitur, prominere, quam radij

c 9 ta. A.
d 2 fi. cap.
24 lib. 1. V.
c 9 ta. O.

f 9 ta. Z.

g 10 tab. p.
h 10 ta. A.
z, n.

i 24 fi. ca.
24 lib. 1. d.

k 10 tab. o.
l 10 tab. z.
dein k, l.

m 11 ta. A.
n 12 tab. o.

o 12 tab. o.
A.
p 7 tab. Q.
X.

q 12 tab. d.
r 12 ta. Y. 8
ta. r.

s 11 tab. o.
aut illic inter o & g
occultatur h.
t 7 ta. V. in
ter S, T. 12
ta. h.

u 6 tab. J. J.
7 ta. d.
x 6 tab. y.
7-f.

y 3 ta. p.
z 6 ta. n. a.
a 7 ta. cha.

1, 2, 3.
b 11 ta. f.
c 3 tab. r.
d sub A. 8.
tabula.


e 1 fi. ca. 24
li. 1 N, T, V
V, X, X.

f 12 fig. ca.
24 lib. 1. T.
g earundem
fi. R.

h ca fi. a. radij appendicis^h mucronem. Dein expendito, parem ligamenti huius articuli in utroque
i 12 tab. latereⁱ formam esse, ut unà mecum omnibus quoque similem usum ascribas, ne quum Natu-
ram celebrare instituis, illi inartificiofissimam constructionem, cum Galeno imponas. Reie-
cta nunc summa manu, ^k priorem cubitum flectentium musculum suis principijs liberato, ^l Cubitum mo-
i 6 ta. f. quorum exterius ex suo sinu eleuandum est, & ^m ligamento articuli humeri ipsum continente uentium admi-
recta sectione dissecto, id à scapulæ collo adimetur. interius ualido quoque cultello ab inte-
riori scapulæ processu diuidetur, & utroque principio deorsum reflexo, huius musculi carno-
sa insertio in os humeri animaduertetur: qua dissecta ad radium usque, sola manu à subdi-
to musculo iste prior auelletur. Vbi uerò huius insertionem intuitus fueris, is appensus
m 8 ta. r. seruabitur, & ⁿ posterior ab humero derasus ad ipsius quoque insertionem ducetur. Po-
n 11 ta. o. steriores eadem ratione aggredieris, primùm ^o illum qui ab humeri ceruice pronascitur li-
berans, ac dein ^p illo cui scapula initium præbet, ut postmodum hoc deorsum tracto, ^q secun-
dum animaduertas ipsi innatum, ac sub illo ab humero prodeuntem. Quod tum demum ex
sententia feceris opportunissimè, ubi hos in cane aut simia prius spectaueris. Quando ita-
que hi ad insertionem producti sunt, neque ulla fibrarum insertionem animaduertes, cu-
biti articulum subinde flectito & reflectito, examinaturus num uel tantillum quidem extra re-
ctum tramitem dimoueri queat. quod quum in articulo solis ligamentis hærenti, & iam pro-
pemodum luxato, obseruas, quid fieri in nobis arbitrare, articulo tot musculis adhuc uesti-
to? Vt tamen hæc omnia exactius rimeris, ossa inuicem seiungenda sunt, non solum humeri
cum ulna articuli gratia, uerùm & radij cum humero, & radij rursus cum ulna. Præter hoc
nim quod nihil utilius sese inspiciendum in tota resectione luxationum gratia offert, ita pro-
fectò eiusmodi articulorum inspectione, nulla in uniuersa Anatome mihi iucundior specu-
latio occurrit.

DE MUSCULIS PENI PECULIARI-
bus. Caput XLIX.

QVADRAGESIMI NONI CAPI-
TIS TABVLA.



QVADRAGESIMI NONI CAPITIS TABV

læ, eiusdemq; figurarum & characterum Index.

- P R A E C E D E N T E M** paginam occupans tabula, quatuor complectens figuras numero insignitas, nō huic tantum Capiti, uerū etiam & alijs plerisq; utilis erit. Ne uero dein pluribus præfigēda sit Capitibus, hic omnes suarum notarum indices sum explicaturus.
- 1 Prima itaq; figura corporis in mensa proni, & oculo ad perinæum, seu interfemineum directo, ostendit femora in latera admodum distensa, & penis corpus uniuerso interim scorto cum testibus, cute, adipe, uenis, neruis, & arterijs undiq; absectis.
 - 2 Secunda figura nuda quodammodo commonstrat ossa, quæ sacri ossis lateribus committuntur, ac ilium & coxendicum & pubis ossa appellantur. His femorum ossium portiones adhuc appendent, unā cum ani & penis musculis: quos ideo ab ipsorum exortu dependere finximus, ut penis corporum origo urinæq; & semini communis meatus inibi in conspectu esset, qua sursum sub pubis ossibus flectitur.
 - 3 Tertia, penem transuersum dissectum in hoc ostendit, ut penis corporum substantia, & coalitus, & cum urinæ meatu connexus oculis subijcerentur.
 - 4 Quarta figura integrum commonstrat penem, unā cum uesica hic exporrectum, ut proprius uesicæ ceruicis musculus intueri possit.
- A, B** 1, 2, 3, 4 Duo penis corpora, penem quodammodo uniuersum constituentia.
- C, C** 2, 4 Duorum penis corporum exortus.
- D** 1, 2, 3, 4 Penis glans, quam alij præputium nuncupant: eo nomine cutem, qua penis obtegitur, non dignantes.
- E, E** 3 Fungosa rubraq; penis corporum substantia.
- F** 3 Mutuus penis corporum connexus, & neruea eorundem substantia, quæ orbiculatim fungosam substantiam complectitur.
- G** 1, 2, 3, 4 Vesicæ meatus, urinæ seminiq; genitali communis.
- H, I** 1, 2 Duo primi penis musculi, in prima quidem figura suam seruantes sedem, in secunda autem ab eorundem principio dependentes.
- K, L** 1, 2 Duo posteriores penis musculi, seu tertius & quartus, qui in prima figura integri, in secunda uerò ab insertione pendentes conspiciuntur.
- M** 1, 2 Musculus orbiculatim recti intestini finem ambiens, fæciumq; excretioni præfectus.
- N, 4** Vesicæ ceruicis musculus, urinam, ne præter nostrum arbitrium defluat, cohibens.
- O, O** 2 Membrana pubis ossium foramina occupans.
- P, 2** Teres ligamentum, à coxendicis osse in rotundum femoris caput insertum.
- Q, 4** Vesicæ corpus.
- R, 4** Glandosum corpus, uasorum semen deferentium insertionem excipiens.
- S, S** 4 Portiunculæ sunt meatuum, quibus urina è renibus in uesicam ducitur.
- T, T** 4 Portiunculæ sunt meatuum, semen in uesicæ ceruicem eiaculantium. Musculos autem in prima figura femur amplexantes, characteribus non insigniuius, quòd illi in musculorum tabulis diligentissime annotati fuerint.



Penis constitutio.

Primi duo penis musculi.

T S I penis constructionis enarratio in quintum librum, ubi generationis organa persequetur, opportunè referuanda ueniet, nihilominus tamen in præsentī tantam huius mentionem facere expedit, quanta ad musculorum penis descriptionē ex usu est. Penem itaq; præter^a cutem qua inuoluitur, duo grandia, & neruea, & intus spongiæ modo caua efformāt corpora, quorum dextrum à pubis ossis dextri^b sede enascitur, paulò inferius quàm ubi inuicem pubis ossa dehiscere incipiunt. hoc uersus sinistrum latus modicè exporrectum, cum sinistro coit corpore, à pubis osse sinistro principiū ducente. His corporibus tota penis constat moles. atq; hæc corpora ad inferiorem ipsorum sedem, qua coeunt uesicæ^c meatum sibi toto ipsorum ductu ad^d glandis usque radicem subnatum exigūt, ubi canalem hunc urinæ seminiq; communem, corpora illa in unum prorsus corpus confusa amplexantur, quemadmodum quinto libro audietur es prolixius. Nunc enim ad quatuor musculorum descriptionem, modo dicta, abundè sufficiunt. Ab anteriori itaq; sede anularis^e musculi, quem recto intestino ut excrementorū præsit egestionī obnatum esse docebimus,

420 fi. lib. 5 r.

b Præsentis ca. figurarū A, B.

c 3 fi. E, E.

d 2 fi. ca. 29

lib. 1 q. uerū

hic 2, 4 fig.

C, C exor-

tus nota-

tur.

e 1, 2, 3 fi. G.

f 1, 2, 3, 4

fi. D.

g 1, 2 fi. M.

h 1,2 fi. H.
i 4 tit. S, T.
k 1,2 fig. G.
l 1,2 fig. K, L.

cebimus, ^h duo carnei enascuntur muscoli, ⁱ illis prorsus similes qui à pectoris osse ad os ^v referens porriguntur. Ambo enim inuicem proximi sunt, & internis lateribus mutuò cōmittuntur, recta^q sursum in priora ad urinarij ^k meatus sub corporibus illis ad superiora reflexum ascendentes, eius meatus lateribus inseruntur, & inuicem dirempti, corpora penis non nihil digitorum modò amplexantur. ^l Alij duo utrinq; habentur singuli, ab appendice ossis coxendi cis paulo inferiùs quàm penis corpora, principium ducentes. quod carneum est, & gracile, et obliquè sursum procedentem efficit musculum, qui carnosus semper permanēs, sui lateris corpori non procul ab exortu inseritur. Quatuor his musculis penis radix uoluntario impetu trahitur, hinc & erectionis quandam uim, præter naturalem facultatem ipsi insitam, obtinens. Quanquam duo priores muscoli in urinæ seminisq; excretionibus, communem illum urinæ seminiq; meatum ueluti digitis quibusdam aperire uideantur, ne meatus in obliquo hoc reflexu restrictus, eiusmodi humorum expulsionem prohiberet, & potissimum seminis, cuius eiaculationē (etsi urina multo crassius sit) impetu Natura perfici uoluit. Nisi enim hi muscoli inferiorem meatus sedem in hoc reflexu deorsum uellerent, in penis tentigine totus meatus occluderetur, quòd ipsius superior pars à distentis corporibus adeò pertinaciter huc illuc alliceretur. Porro, ut musculos hos commodè aggrediaris, reliqua cadaueris pars, quæ adhuc reliqua est, resumetur, ac distentis quàm maxime possis femoribus, orbicularem sectionem inani ambitu duces, qua cutem ad adipem usque (quem hic habes copiosissimum, maximeq; humidum) diuidas. Deinde longam sectionem per suturam in penis inferiori sede ac scorto conspiciam in cute per perinæum (quod interfemineum alij uocant) molieris, quæ ad anteriore usq; orbicularis lineæ sedem pertingat. Postmodum cutem hamulis, aut digitis eleuatam, hinc inde à subditis organis nouacula diuellis, atque musculos qui sese absecta cute offerunt, paruo cultello à suis exortibus liberatos, ad insertionem usque perduces, non per transfennam singulos seorsum expendens, cum calculorum eruendorum gratia, tum fistularum ulcerumq; nomine hac sede non infrequenter homines infestantium. Deinde eo obseruandi sunt quoq; exactius, quo minus aliquid à Galeno de his proditum habemus. Quàdoquidem locus in quo illos in opere de Administrandis sectionibus prosecutus est, unà cum quinque & dimidio eius operis libris incuria temporum intercidit, unà cum ipsius de Musculis peculiari libro, in quibus proculdubio horum mentionem illum fecisse Arabum libri commonstrat: unde etiam prorsus sperandum est, in Bochara Persiæ ciuitate cuiatem Auicennam fuisse sat nouimus, hos libros omnes aliquando non inuidentibus superis, inueniendos. Nisi fortassis Auicenna etiam illis libris destitutus, Orobasij duntaxat operibus usus fuerit, è quibus uerbotenùs hoc quidquid de hominis fabrica prodidit, descripsisse uidetur.

Tertius & quartus.

Musculorū officium.

Administratio in anj

Bochara Persiæ ciuitas patria Auicennæ.

DE CERVICIS VESICÆ MUSCVLO,

urinam, ne præter arbitrium ex uesica profluat, inhibente.

Caput L.

HUIVS musculi effigiem in uiris quarta figura tabulæ præcedenti Capiti præposita commonstrat, *N* litera notatam, quemadmodum & uigesima secunda & uigesima tertia figuræ ad characterem *p*. Muliebris uerò uesicæ musculum proponit uigesimæ quintæ libri quinti figuræ *γ*. Quòd autem illas figuras hic non proponam, hinc potissimum fit, quòd eisdem figuris paginas occupandas minime duxi.

a 4 fi. cap.
49 Q.
b eiusdē fi.
R.
c eiusdē fi.
N.



D uiril^a uesicæ finem; ubi in collum ceruicem ue terminatur, ^b glandosum quoddam corpus ipsi obnasci, quintus liber declarabit, qui etiā uersum meatus ductum explicaturus est. Musculus autē iam nobis propositus inter glandosum id corpus & reflexum consistit, quē uesicæ ceruix sub pubis osse primū molitur. Musculus totā ferè hāc meatus sedē orbiculatim ambit. Est nanq; orbicularis, & oblongi anuli, aut oblongi rotundi^q meatus effigiem exprimit, fibris transuersim circularibus intertextus, & superiùs iuxta glandosum corpus crassior quàm inferiùs. Atq; ita in uiris habet. In mulieribus uerò, quarum ^d uesicæ ceruici eiusmodi corpus glandosum non adnascitur, ^e musculus totum meatum ambit, qui à uesicæ corpore in superiorem sedem colli uteri nō procul à pudendo ^f subingreditur: & musculus hic quanto in mulieribus prolixior est, tanto etiam tenuior uisitur, eundem tamen prorsus usum in his ac in uiris præstās. Primariò enim in hoc ipsum Natura condidit, ut meatui uesicæ præficeretur, obstaculo futurus ne transuersæ uesicæ fibræ motu suo naturali urinam præter nostram uoluntatem excernant. Operæ precium

Virilis uesicæ musculus.

Muliebris.

Musculi usus.


enim fuit egerendis ex corpore recrementis motus præesse uoluntarios. si casu enim naturali duntaxat motui excrementorum propulsio committeretur, continuo recrementa emanaret: atq; id præterquam quod foedissimum censeretur, ad plurimas actiones, quas tota uita obimus, insignes noxas inferret. Quo minus igitur uesicæ circulares fibræ, urinam quoties ipsa aut copia, aut mala quapiam qualitate hominē grauat, etiam citra hominis impetum propelleret, Natura meatui uesicæ hunc musculum præfecit, quo laxato urina transuersarum uesicæ fibrarum ui pressa excernitur, interdum etiam huic functioni auxiliantibus^b abdominis musculis, & ⁱ septo transuerso spiritus compressu ad inferiora depulso. Quum uerò urina effluxit denuò musculus constringitur, quicquid ex urina reliquum meatui adhuc inhæret protrudens. Relinquuntur autem tres quatuor ue guttulæ, quæ emissâ iam urina promanare solent. Atq; hic alter præsentis musculi usus censendus est. Quod uerò ad excretionis promptitudinē uelocitatemq; quicquā (ut Galenus asserit) auxilietur, quodq; is præcipuus ipsius sit usus, nequeo satis assequi. Quo enim magis remittitur, suamq; comprimēdi uim laxat, eo liberiorē reddit meatum, qui apertus & amplius maiorem urinæ à circularibus uesicæ fibris pressæ copiam transmittit, quàm si laxatus musculus nōnihil suas fibras ad expulsionē dum urina profluit quoq; intenderet, ac nescio qua ratione per uniuersum egerendi tempus ageret, ita angustiorē meatum reddens, foelicioremq; urinæ excretionem uitians. Nec profectò aliud (& si Galenus secus arbitretur) est, quo meatus ne præter arbitrium urina emanaret, arctaretur, ab hoc, quem modò narramus, musculo. Quandoquidem à Galeno in medium adductam meatus angustiam & longitudinē uarijs circumactibus iunctam, refellit muliercularū urinæ^k meatus: qui etsi perinde ac uirorum ad insertionem usq; quam in uteri ceruicem molitur, arctus sit, breuis tamen est, & rectâ deorsum breui interuallo uteri collo exporrigitur. Cæterum ceruicis uesicæ musculi administrationem in secundum post hoc Caput reijciam, ibidem illum unâ cum sedis musculis aggressurus.

Lib. 5 de Vsu
par.

h 3 ta. o. 4
tab. n. 5 Δ. 6
Δ.
i 7 ta. Δ.

DE RECTI INTESTINI MUSCULIS.

Caput LI.



RECTI intestini portio cū suis musculis à corpore resecta, quā dū reliqua eximimus intestina, in corpore adhuc relinquere solemus.
A Rectum intestinum, quod in libri quinti tabulis euadet conspicuum, præsertim autem octaua figura & uigesima secunda.
B, C Duo musculi, intestinum post egestionem sursum trahentes.
D Musculosa substantia penis radici adnata, in mulieribus porro ad infimam pudendi partem commissa.
 Insuper **D** sedes notatur, à qua in penem musculi duo pronascuntur.
E Circularis musculus, ne præter arbitrium excrementa deijciantur præcauens.



Musculi se-
dem attollen-
tes.

AVDATA nunquā satis Natura^a recti intestini extremo musculos largitur, qui in fecium excretionē protrusum recti intestini finem, alacriter sursum reuellunt: dein alium dat musculū, qui intempestiuam inuoluntariamq; excrementorum egestionem prohibet.^b Musculi itaq; sedem sursum attrahentes, lati & tenues, neq; admodum carnosī aut rubentes sunt, uix ab aliquibus ossibus originem ducentes. A^c ligamētis enim ex pubis ossibus, & coxendicis osse, & sacro exortis, quæ huius regionis musculis obducuntur, ipsaq; demum peritonæi infima sede utrinque singuli enascuntur musculi, qui deorsum protensi, rectum intestinum amplexantur,^e extimæ ipsius tunicæ inserti. Præsentēs musculi quum lati admodum sint, & suis finibus totam intestini latitudinem ambiant, ipsorum^d portio radici quoq; penis, mulieribus uerò uteri collo adnascitur. Quod nonnulli perpendentes, tres sedem sursum agentes musculos recensuerunt. Vtuncq; uerò sit, omnes horum musculorum partes pari præficiuntur muneri, quo sedē ilico ab excretionē sursum alliciunt, qui deorsum pellebatur ui abdominis musculorum, & septi transuersi, auxiliantibus etiam subinde omnibus thoracem arctantibus spiritumq; continentibus musculis. Cæterum illis qui anum sursum ducunt musculis nullus ē regione opponitur contrariæ functionis opifex, quemadmodū in omnibus ferē alijs partibus musculi equidem opponi consueuerunt. Neque oscitanter hic Natura priuatim ab aliorum musculorum constructione aberrauit, sciebat enim interdū à musculis octo abdominis unâ cum septo transuerso,

a 8 fi. li. 5 ab
Y ad a. &
20 fi. li. 5 o.
& 22 *.
b B, C. & 8
fi. li. 5. b, c.

c 9 fig. lib. 5
L.

d D.

uerſo, ſedem adeò propellendam, ut ne à relatis quidem muſculis promptè queat reuelli. Ab horum ſine^e alius præterea muſculus extremum recti inteſtini ad cutem uſq; amplectitur, qui prædictis ſimiliter non admodum carneus, ſed mucore quodam oblitus exiſtit, fibras tamen orbiculares tranſuerſas ue adipiſcitur. Elatiori parte qua dictis muſculis connaiſcitur craſſior, quàm inferiori eſt: quàm autem cuti (ut labrorumⁱ muſculi) permifcetur, peculiare cum ipſa corpus efformat. Cohæret autem fibroſis nexibus^s meatui ueſicæ in uiris, in mulieribus ueròⁿ ceruicis uteri principio. Quanquam etiamⁱ duorum muſculorum, quibus in uiris principium porrigit interuentu, peni committatur. Cæterum poſteriori ſua regione,^k quatuor ad offis ſacri finem locatis officulis (quæ Galeno incognita oſtendimus) adnaiſcitur. Ex lateribus connectitur teretibus^l ligamenti à ſacro offe incoxendicis os pronatis. Præſens muſculus non adeò, atq; medentiū uulguſ arbitratuſ, breuiſ eſt, ſed longuſ, & ſecundum magnum recti inteſtini longitudinis interuallum exporrectuſ uiſitur. Quod nō perfunctoriè ab illis uenit perpendendum, qui ſedis fiſtulas & excreſcentias, quas *αρενώματα* & *κονδυλώματα* Græci appellāt, ſubinde præſcindere uerētur, huius muſculi muneris abolendi metu. Licet enim muſculi portio aut ferro diuidatur, aut quauis alia occaſione diuulſa laceretur, tamen quum latior ſecundum inteſtini longitudinem ſit, eiſ munuſ nō ita promptè in eiſmodi adminiſtrationibus aboletur. Muſculus iſte circulatim inteſtinum ambiens, illiuſ oriſiciuſ ſtringit, ne præter uoluntatem inteſtina naturali ſuo motu recrementa continuo egerant, ſed ut tēpeſtiue dum aut mole, aut uitia ta quapiam qualitate hominē excrementa moleſtāt, muſculus hic laxatuſ inſtar fidi ianitoris ea tranſmittat. Quemadmodum itaq; huius muſculi cum ueſicæ meatu^m amplexante eadem eſt effigies, ita etiam utrorumque par uſuſ, quo nimirum conſtringunt: ob quod etiam ambuſ nonnulli *σφιγκτήρας*, quaſi dicas conſtrictoreſ, appellarunt.

*Muſculus
orbiculatim in
teſtino obdu-
ctuſ.*

COLLI VESICÆ ET ANI MUSCV-
lorum adminiſtratio. Caput LII.



COLLI ueſicæ & ani muſculorum adminiſtratio ab ipſa ueſica inchoabitur. hanc enim à peritonæo^a quàm internæ pubiſ offiſ regioni obtēditur, cultello aut nouacula liberare adeò conuenit, ut ipſa non ampliuſ aliqua ſua ſede peritonæo ſit continua. Deinde penem à pubiſ offiſibuſ dirimere oportet: quod ubi inuicem hæc committuntur, mediocri negotio perficiet, quum nerueiſ duntaxat & fibroſiſ nexibuſ peniſ ibidem hæreat. At ubi inuicem offa remouentur, peniſq; corpora^b initium ducunt, acutiori cultello horum corporum initia proximè ab exortu ſunt abraſcenda, ut peniſ ab offiſibuſ liber pendeat. Mox cultro aliquo pubiſ offa inuicem dirimeſ, ſectiōne per ipſoruſ cartilaginem ducta. quam ſanè leuiori opera quàm plerique autumant perfeceriſ, ſi modò offiū medium ad admuſſim tetigeriſ. Hæc ſectiō quoniam priuſ femora erant diſtenſa, ilico ut inuicem offa abſcedant, occaſio erit. Quo uerò remotiūſ offa diſiungas, uehementiūſ quoque femora abduſcenda ſunt. quod feceriſ longè commodiſſimè, ſi uno cadaueriſ crure à menſa pendente, & reliquo adhuc illi incumbēte, in menſæ latuſ acutuſ ue, os ſacruſ collocaueriſ, & deinde utrinque femoriſbuſ & iliuſ offiſibuſ reflexiſ, offa pubiſ quantum lubet diduxeriſ. Nunc ueſica uniuerſa cum pene in conſpectu adeò iacet, ut etiam^d muſculuſ ueſicæ collo obduſctuſ promptè animaduerſuſ ſiſ. Ut autem ſediſ^e muſculoſ pariter intueariſ, cultello ſenſim ueſica ſimul cum ipſiſ ceruice à recto inteſtino tranſuerſiſ ſectiōnibuſ ſeparanda eſt. In quo opere ſanguinem, ſi iſ ex ueniſ & arteriſ profluſerit, ſpōgia ſedulò elueſ. Vix enim (niſi fortaiſſiſ admodum operoſe omnia uafa uinculiſ ita intereipere poſſiſ) fiet, quin inter diſſecanduſ uas aliquod, aut caſu punctuſ ictuſ, aut tranſuerſim neceſſariò inciuſuſ, ſanguinem profundat. Ablata igitur ueſica, et connexu recti inteſtini muſculorum ad peniſ radicem et ad muſculuſ ueſicæ perpenſo, eiſ inteſtini muſculoſ aggredieriſ, qui ſanè citra operoſam ſectiōnem ſunt ſummè conſpicui, ſi modo diligenter ab ipſiſ ſanguinem, qui hīc ſolet eſſe moleſtiſſimuſ, abſterſeriſ. Operę preciuſ nunc foret, ualidiūſ adhuc pubiſ offiſibuſ diremptiſ, cultro aliquo acutiori ligamentuſ ſacruſ os iliuſ offi connectens in ſiniſtro latere diuidere, ut utruſque cruſ cum offe quod ſacro committitur ſeoriſum tractari poſſit, dextroq; cruri ſacruſ adhuc hæreat, aut ſiniſtro, prout nimirum muſculoſ qui adhuc reliqui ſunt, in dextro aut ſiniſtro crure aggredi uiſuſ erit. Ad hanc effigiem cruſ illud conſpicitur, quod decimam ſextam muſculorum tabulam conſtituit.



Galenus in li. 3
de Usu par-
te de tibia mo-
uentibus mu-
sculis senten-
tia.

Galenus in 2 de
Admi. sectio.
sententia cum
vera musculor-
um descripti-
one enarra-
tur.
Tibiae motus.

PROXIMUM quidem nuncerat femur mouentes musculos describere, si demum explicatis antea musculis situ uiciniore aggredi institutum fuisset: uerum quando sectionis potius, quam uiciniore seriem sequi propositum est, ante musculos femoris motuum opifices, tibiae motores in praesentia ueniunt pertractandi. nam quousque hos asseruas integros, commodè illos administrare nequis. Ceterum quo tibia mouentes musculi insigniores, & proceriores, magisque conspicui sint, eo etiam minus Galeni sententiae, & potissimum in illorum functionibus explicandis assentire queo, quamuis interim etiam non omni ex parte is sibi consentiat. Quandoquidem non procul à calce tertij de Partium usu libri tibiae motores recensens, atque sua potius imaginatione aliorumque dissectionis professorum libris, quam uera sectione ductus, nouem musculos enumerat, quos femoris os amplexantes, tibiae motores esse hac breui sententia scribit. Tres qui anteriorem femoris sedem occupant, atque omnium huius loci musculorum maximae sunt, recta ad genu feruntur: horum quidem unus implantatur patellae carnosae apprehensione, duo autem reliqui unum maximum procreant tendinem, qui latescens implantatur toti patellae, stringens eam exquisitè, & continens cum subiectis. Deinde autem praeteruectus articulum, anterioribus tibiae partibus inscitur, eum si iubeatur extendens, una cum toto ipsius genu articulo. Alij uero duo musculi utraque praedictorum parte, hic quidem externus, ille autem internus, in tibiae lateribus inseruntur, ambo obliqui motus opifices. Qui namque internus est, crus intro adducit, alter autem extrorsum abducit. Enascitur autem ille quidem ex commissura ossium pubis, hic uero ab extremis partibus ossis coxendicis: optimè enim sic utriusque crus ad motus obliquos abducturi erant. In medio autem inter hos spacio, aliae tres sunt musculorum explantationes, paruis motibus ipsum genu mouentes. Flectit enim genu, et ad interiora adducit tibiae is qui est continuus interioribus: abducit autem extrorsum simul flectendo, uelut inuoluens eam, is qui tangit externos. Reliquus, qui & medius omnium est, in femoris caput internum insertus, flectit quidem totum quoque femur, cum eo autem simul & totam tibiae euellit, immittens se eis quae articulum ambiunt [ligamentis] usque ad alterum maximorum musculorum, qui in tibia reponuntur, ut simul quoque tibia ipsam totam trahat. Reliquus uero nouem musculorum articulum genu mouentium gracilis & longus, ex ilium osse enatus, tibiae sursum extedit: in ea potissimum figura crus totum statuens, in qua molientes, ac subigentes, pedem ad inguina alterius cruris sursum ducimus. Post haec uerba Galenus Naturam in horum musculorum constructione laudaturus, proculdubio in primis exemplaribus subiunxerat, mirifice & hinc Naturam omnia prouidisse, et quae reliquo contextu subsequuntur. At eum musculum, quem in poplite latitare inuinit temporis successu, et in resectione simiarum peritior, cognoscens, haec quoque suo quod ad nos demanauit, exemplari interiecit. Praeter autem hos omnes est paruus musculus in poplite, genu quoque flectens. Ut simul omnes ab ipso hac serie enarrati, numero decem censeantur. Haec sane ipsius oratio clarissima est, ex qua quicquid etiam citra inspectionem quos enarrat musculos imaginatione sibi pulchre cōfingit, at quam sit ueritati consona, partim ab ipso in secundo de Administrandis sectionibus, partim uero ex sectione discito. Verum quando ipsius orationis series in secundo de administrandis sectionibus longior est, quam ut tota hinc describi debeat, ego femoris musculos eo ordine, quo ibidem recensentur, enarraturus sum, Galeni sententiam post musculi descriptionem continuo subiiciens, ac pariter addens, in quo ordine in praescripta ex libris de Partium usu oratione hunc illum uel enumerauerit. Nihilominus priusquam musculos aggrediar, id summo studio abste cōtendo, ut quot motibus tibiae agis, accuratè examines. Galenus in libris de Usu partium, ut praecedens attestatur oratio, tibiae extendi simpliciter dixit, non adiungens eam magis aut introsum aut extrorsum, aut prorsus in medium recta extendi. At flexionem uidet triplicem enumerare: unam quae tibiae retrorsum, seu in posteriora sursum uersus exteriora duci inuinit, alteram, quae introsum illam sursum tractam agi dicit, tertiam, quae tibiae in neutrum latus inclinantem, recta flectimus. Quanquam tertium hunc ductum duntaxat flexionis nomine, & praecipue in secundo de Administrandis sectionibus donare uideat. Deinde in praescripto ipsius sermone, secus atque in libris de Administrandis sectionibus tibiae in latera moueri affirmat, quum unum musculum hanc extrorsum abducere, alterum introsum adducere scribit. Postea, ubique motum tibiae assignat, quo haec sursum oblique uelut ad alterius cruris femur ducit. hoc motu tibiae agi ab illis cōspicimus, qui pedibus coria in ligneis stratis emolliunt, aut quum pistores massam apud plerasque nationes calcant. Atque hos motus ita Galenus enarrat, ut proprios prorsus tibi illos esse arbitret, ipsisque peculiare musculos assignet,

Quoniam in orationis serie tibiae mouentis musculos seorsim singulos pertractabimus, ante nostram enarrationem nullas notas margini adijcimus.

a Intelligit opinor primum pedem mouentem, in 12 ta. in signum.

b 14 tab. r.

gnet, quū interim rectissima flexione et extēfione tibia, quiescēte femore, solū agatur. Si enim tibia cū pede in latus digna animaduersione ducit, id sanē femoris sit beneficio. Neq̃ est quōd huic paradoxo corroborādo plixiūs insitā, quū ipse iam admonitus luce clarius animaduertas, tuā tibiā immoto prorsus femore, dūtaxat rectissimo tramite flecti extēdiq̃. Quanquā quū motus hos examinas, nō perfunctoriē animus femoris motibus adhibēdus sit. nisi enim gnauius attēderis, te inscio femoris caput in coxendicis osse sitū mutabit. unde etiā mox alia tibiā flexio extēfioq̃, quā prius, apparebit. Sed quum in re maximopere notāda, nō adeō secordē nūc fore quēpiam arbitrer, quin adhibitis ossibus hęc sedulō rimetur, atq̃ in ipsa sectione expēdat, musculos ipsos aggrediar ea lege, ut secūdo de Administrandis sectionibus Galeni libro adaperto hęc legas. nisi enim illius libri obstaret enarratio, diuersa lōgeq̃ faciliōri, quā Gale

c 3 tab. 2.
1 tab. o. 2 q.
4 tab. cha-
ract. 2. 9 ta.

e. 16 L.

d 3 ta. f.

e 1, 2, 3 fig.

ca. 29 lib. 1

P.

f 3 ta. t.

g 1, 2 fi. ca.

30 li. 1 E.

h 3 ta. cha-

ract. 1.

i 1, 3 fi. cap.

31 li. 1, 2, 3.

k 16 ta. A. 1

p. 2, 3, 1. 4

x. 5 cha. 6.

9 y. 10 r.

l 16 tab. N.

m ultimariū

fi. li. 1 r.

n 3 ta. cha-

ract. 2.

o 10 ta. 4. 2

p. 9 t. 11 ta.

ch. 1. 5. 16 ta.

R.

p 2 fi. ca. 29

lib. 1 ab l ad

q.

q 10 ta. v. 11

td. 2.

r 2 fi. ca. 29

lib. 1 m.

Primus tibiā
mouentium.

Lib. 2 de Aq.
mi. sectio.

Secundus.

Tertius.

nus serie, presentes musculos recenserē. Primus itaq̃ acuto exortu^o principiū, ē neruea substātia & modica carne cōmixtum ducit, ab^c anteriori ossis iliū spinæ sede, aut ab iliū ossis appendicis anteriori extremo. Hic musculus non procul ab origine totus carneus euadit, & modicē dilatescens, gracilis permanet: eius tamē latitudo ipsius crassitiem spissitudinemue duplo (ut sic dicam) superat, & hanc formam musculus ad tendinis usq̃ productionē retinet, qui ab iliū ossis spina, deorsum oblique uersus interiora sensim adeō prorepit, ut internū femoris latus tandem iuxta mediam femoris lōgitudinem exquisitē occupet: hinc adhuc magis in interiora retrorsum paulatim procedens, ē regione^s interni femoris capitis iuxta genu cōsistit, ad quod ueluti obliquo ductu reflexus, antrorsum descendit, tendinem in anteriorem tibiā sedē^h inferens. Porro musculus tendinē hunc tum primum producit, quando ad anteriora secundū femoris caput reflexus, gracilior teresq̃ efficitur. Tendo enim ipsius non latus, sed adamussim (quicquid Galenus suis fidens simijs asserat) teres est, tibiā ossi ad internū latus acutæ illiusⁱ lineæ secundum ipsius longitudinē exporrectæ insertus. Hunc musculū Galenus in secūdo de Administrandis sectionibus primū enumerat, in præscripta autē oratione nonū. & utrobique huius musculi beneficio tibiā sursum ad alterius cruris inguina, aut ad femur allici arbitratū: qui motus nō huius solū musculi opera, uerum femur mouentium & tibię musculorum auxilio unā perficitur. Tibia nanq̃ suis musculis flexa, & femore deinde suorū musculorū ope sursum in interiora ducto, motus ille succedit. Nisi enim flexa prius tibiā femoris motū sequeretur, eiusmodi motu tibiā nequaquā alterius cruris femori, aut tibiā, obduceretur.^k Secundus musculus amplo, et prorsus nerueo^l principio ex pubis osse enascitur. Vbi enim pubis ossa in uicē^m cartilagine cōmittuntur, secundum cōmissuræ longitudinē duo sibi contigua oriuntur musculorū principia, quorū alterum ad dextrū crus, alterū uerò ad sinistrū defertur, secundū hunc musculū constituens. Tanta itaq̃ huius musculi principij est amplitudo, quāta pubis ossium cōmissuræ est lōgitudō. Principiū hoc nō procul ab origine strictius crassiusq̃, et carnosum prorsus efficitur, ut eius latitudinē crassities uix cedat, & musculus paulo minus toto teres euadat, qui deorsum per femoris interiora descendēs, sensim gracilior tantisper efficitur, ut iam internū femoris caput non procul à genu articulo cōtingens, in exactū teretēq̃ⁿ tendinē finiat, eadē sede qua primi musculi tendo tibiā innatū, sed tanto interiūs, seu posteriūs, quanta primi musculi tēdinis est crassities. Hic musculus in parū obesis mulieribus, rigidum quoddā & durū ligamentum, seu neruus, seu tale quid esse apparet, eò quod excarnis in illis musculus nerueā substantiā dūtaxat habeat, & exiguo adipe obtegatur. Præsentis musculi beneficio Galenus in præscripta oratione, tibiā ad internū latus duci attestatur, illū in serie quintum enumerans. In secundo autē de Administrandis sectionibus libro, tibiā elatiūs & interiūs musculi huius auxilio attolli prodidit. hoc est (si modò rectē ipsius sententiā assequor) præsentē musculū tibiā uersus interiora maximē inclinantē flectere. quod enim attollere ipse dixit, mihi flexū insinuat. Perficeres autē eiusmodi motū, si tibię extremū unā cum pede alteri tibię imponeres, qui motus & flectentiū tibiā musculorū ope, & femur quoq̃ introrsum ducentium flectentiūq̃ auxilio celebratur. Quippe si crus utrūq̃ rectū, neq̃ prorsus inflexū habueris, nō integrū tibi erit immoto femore alterius cruris tibiā, uel minimum, alteri cruri implicare, aut uel obscurissimē rigidū etiā cruris tibiā in alterū latus, immoto femore, deducere.^o Tertius cū alijs ut minimū tribus musculis, ex infima coxēdicis ossis sede enascitur. Ab eius nāq̃ ossis^p appendice (quę nobis stātibus in eius ossis infima sede, in simijs uerò & canibus quū anterioribus innitunt pedibus, in extima habet) ordinata serie multorū musculorū capita principiū ducūt, quorū tertius hic musculus omniū^q postremū exigit. Ab elatiori em̄ & maximē posteriori eius appēdicis^r sede, nerueū gracileq̃ principiū educitur: quod deorsum descendēs, aliquantulū sub origine carneū fit, teretē quodāmodo constituēs musculū, suo principio iam lōge crassiorē. Hic deorsum per femoris posteriora prorepit, aliquantulū oblique tātisper ductus, donec ad posteriōrē se-

e 4. dem

*Lib. 2 de Ad-
mi. sectio.*

dem interni femoris capitis propter genu pertingat. ⁵ Ibidem enim extenuatus, & in teretem quoque (non uero ut Galenus docet, latum) degenerans tendinem, in tibiae anteriora reflectitur, eadem regione qua nuper commemorati, insertionem tentans. Sed eius musculus tendo hoc sibi priuatim uendicat, quod anteriori tibiae sedi ad internum acutae illius lineae latus haerens, ad medium usque longitudinis tibiae properet, alijs tendinibus tibiae insertis, haud aequè descendantibus. Galenus nulli musculo tibiam mouenti, adeò obliquum assignat ductum, atque huic tertio: non animaduertens, primum ⁶ musculum longè obliquius duci, quum is scilicet ab ilium osse antrorsum in interiora femoris ad posteriora usque propemodum descendat, & hinc rursus obliquo ductu in priora tibiae feratur. Deinde ^x musculus qui ordine quartus erit, obliquior tertio uisitur. illum namque similiter atque hunc à coxendicis osse pronatum, in anteriora tibiae secundum femoris externum caput, prorepere audies. Vnde etiam tanto obliquiorem ipso tertio quartus iste situm exigit quanto coxendicis ossis sedes, unde uterque principium sumit, femoris interiora magis spectat. Tertius musculus in praescripta Galeni oratione sextus est, quem inibi inquit tibiam in internum latus inclinantem flectere. In libris uero de Administrandis sectionibus ut obliquissimum ipsi ductum assignat, ita quoque obliquissimi motus illum autorem statuit. Necessè enim (inquit) est, tibiā hac tractam ansa, retrorsum sursumque ferri, & hac in orbem conuolui. Atque hunc quidem motum obimus, at non quiescente femore.

Quartus.

*Lib. 2 de Ad-
mi. sectio.*

necessum enim est hoc motu tibiam flecti, & femur extrorsum circumuerti. ^y Quartus musculus non aequè latum principium, atque tertius, ex coxendicis ossis ^z appendice ducit. Huius enim ^a principium gracilius est, sed spissum tamen. Deinde ad tertij musculi ^b principij externum latus nonnihil sub ipso occultatum enascitur. Falsum enim est, quod à Galeno in quinti musculi enarratione, de capitibus à coxendicis ossis appendice principium ducentibus asserit, quum quatuor capitum ab illo osse originem ducentium, quarti huius musculi extimum esse scribit, & deinde succedere tertij musculi caput. Cæterum principium quarti musculi paulò sub exortu primum efficitur carneū, exacti musculi formam multo quam tertij crassio rem referens, ac per femoris posteriora sensim deorsum, uersus exteriora descendens. Quum uero musculus femoris mediā longitudinē superauit, tenuior redditur, & externa sui sede nerueus admodum, quasi tendinem educiturus, apparet. In interna autem sede, ^c alia pars carnosā hinc ex femore pronata ipsi ubi tendinē uidetur procreaturus, ita adnascitur, ac si alius hinc oriretur musculus, qui quartum augeret: atque simul ex ambobus unus efformaretur musculus, qui denuò crassescens carnei cuiusdam musculi imaginem exprimit, & deorsum protēsus exteriorique parte admodum neruosus, insigni tendine fibulae implantatur, ualidam insertionē in ^d processum superioris appendicis fibulae pertinaciter molitus. Huius enim tendinis occasione fibula acutum huiusmodi processum, quā tibiae coarctatur, exigit. Quinetiam femoris externum caput in externo ipsius latere oblongum sinum gerit, tendinis huius occasione, ut aptè ac tutò ueheretur, priuatim exculptum. Cæterum siue quartum hunc musculum unius loco, aut duorum enumeres, nihil interest: quanquam Galeni gratia, ne ordinem perturbes, unicum opportunius statues. Is enim quum hunc musculum in homine non uiderit, unicum duntaxat istum recenset, atque ut in caudatis simijs illū ego reperi describit. In simijs enim à femoris osse enascēs portio, quarto musculo non admiscetur, sed is unicus est admodum insignis et latus. Vnde etiam Galenus illum perpetuò latum, in libris de Administrandis sectionibus appellat. Hunc musculum praescriptae ex tertio de Partium usu orationis septimū collocabimus, quo ibidem Galenus asserit tibiā extrorsum, simul cum flexione abduci & quodammodo inuolui. In secundo autē de Administrandis sectionibus, totam tibiam huius ope simplici motu in externā partē agi attestatur, eorū quae in libris de Vsu partium tradiderat oblitus, et proculdubio huius musculi naturā exactissimè propter curforem illū, cui hunc in certamine auulsum uiderat, cognoscēs. Verisimile enim est, Galenū illo cursoris symptomate allecū, sedulo huius musculi naturā in simijs perpendisse, atque tunc (ut sanè debuisset in omnibus) didicisse, hunc simplici quod ad genu articulū attinet, motui à natura fuisse praefectum, & flexionem in neutrum latus inclinantem moliri, utcunque etiam obliquo ductu quartus hic musculus ad tibiam prorepat. Porro quintum musculū Galenus recenset, quem à coxendicis osse tertium caput sub tertij tibiam mouentis musculi & quarti ^f principijs assumere testatur, quēque non in tibiae anteriora tendinem cum reliquis porrigere scribit, uerū ad femoris caput & ^g musculi tibiae principium, parte interna inferi, & simul ligamentum articulum circundans apprehendere. Praesens musculus, in praescripta Galeni ex libris de Vsu partium oratione est numero octauus, cuius auxilio totum femur flecti, & cum eo simul totam tibiam euelli, ibidem docet. In secundo autem de Administrandis sectionibus primum hūc tibiam sensim in exteriora circūuerrere, ac motu

Quem Galenus quintū recenset. de inquisuerē quintus sit.

*s 10 tab. f.
t 3 ta. cha
ra. 3.*

*u 16 tab. L.
M.*

x 10 tab. r.

*y 10 tab. r.
u 11 f. 1 u. 2
a. 6 ta. x. v.
f. 12 u. v.
z 2 fi. cap.
29 li. 1 o.
a 11 tab. u.
b 11 ta. a.*

c 11 ta. f.

*d 5, 6 fi. ca.
31 li. 1.*

*e 2 fi. cap.
30 lib. 1 N.*

*f 12 ta. n. u.
est tamē Ga
leni muscu
lus 12 tabu
le 2.
g 12 tab. o.*

tertij

tertij nobis cōmemorati musculi fungī dixerat, quamuis non æquē ualido. Secundò autē de huius musculi functione differens, inquit: Si hūc musculum ad caput suum tendas, cum femore etiam tibiā retrorsum introrsumq̃ ferri uidetur. Deinde rursus non ita multo pōst subiunxit: Poplitis, aut tibiā flexum inter infirmas tibiā actiones referendum, ac proinde Naturam neque magnis, neque multis musculis ipsius flexum commisisse, uerum (inquit) propemodū dixerim, ex commemoratis unum solum capiti interioris surae^h musculi insinuatū, ut dixi, tibiā flexus autorem existere: quanquam non magis ipsam flectere, quā ad internam regionem abducere uideatur. Hic quidem musculus leuiter & obscure quodammodo genu articulum mouet. Postmodum alios inculsat Anatomicos, qui magno cuiuspiam musculo ad femoris motum prorsus spectante, flexionem tibię tribuerunt, quum is inquit: Vel omnino non attrahit tibiā, uel certē parum, quia & finis ipsius in os tibię, ne minima quidem parte ingreditur. Verū coacti sunt hunc poplitis flexuræ autorem dicere, quod nimirum ignorarent alterumⁱ musculum articulo latenter quidem insinuatū, qui uel solus ipsum flectere potest, uel maxima potentia præditus est, porrò hunc prius cernere non est, quā à tibiā musculos ademeris, qui suram efficiunt. Deinceps Galenus coxæ articuli musculos aggrediens, quendam primum enarrat, quo alios Anatomicos genu articulum flecti perperam arbitratos asserit. Huiusmodi sanè Galeni sententijs colligere promptum est, quantum illi in Anatome, qua potissimū excelluit, quāq̃ passim gloriatur, fidendum sit, & quā bellè ab ipso humani corporis fabricā nobis discere datum sit, quāq̃ dilucida nostra redderetur oratio, nisi toties Galeno contradicendū foret. Sed age ceptum negociū absoluamus, summa Galeni autoritate ob oculos perpetuò uersante. Musculus itaque iste quem quintum enarrat,^k quartum caput à coxendicis ossis appendice sumit, nō autem (ut ipse innuit) terciū. Alius enim est^l musculus, quem hīc Galenus præterijt, qui^m tertium caput ab illo appendice nanciscitur, et, ut paulo pōst dicam, in anteriora tibiā sub tertio musculo repositus deducitur. Sub hoc igitur qui Galenum latuit, illeⁿ musculus quem is quintum recenset, exoritur ualido & admodum crasso^o principio, quod posteriori sua sede planè nerueum uisitur, anteriori autem magis carneum et latum. Principiū hoc carne uictū, maximum mole constituit musculū, qui priusquam mediam femoris superat longitudinē, gracilior fieri incipit, adeò ut paulò supra inferiora femoris capita in teretē finiat. P^p tendinē, pro musculi portione nimis quā gracilem. Hic tendo^q radici interioris femoris capitis ad capitis illius interius latus inseritur, contiguus^r exortui primi pedem mouentis musculi, ab interiori femoris capite ducentis originem. Quintus hic Galeni musculus in posteriori ipsius sede, et utrinq̃ in lateribus nulli connatus est musculo, præterquā communi connexu, quo inuicem incumbentes musculos fibris aliquot herere scimus. Verū anteriori ipsius sedi, qua femoris os spectat, illi continua connataq̃ est^s tota ea musculosa substantia, quæ antè rursus quā huius musculi initium, à coxendicis ossis appendice ad pubis usque ossium commissuram enascitur. Quam uerò hæc musculosa substantia in femur insertionem molitur, quibusq̃ fibris donetur, dum femoris motores pertractabuntur, exequar: ubi hunc quintum Galeni musculum cum illa unius loco recensebo, illum quintum femoris motuum opificem enumeraturus. In præsentī autem id duntaxat addendum est, infimum^u eius musculosæ substantiæ insertionis terminum, non procul ab inferioribus femoris capitibus distare. Ac proinde Galenum de hac locutum arbitror, quum alios inculsaret Anatomicos, atq̃ illos perperam eiusmodi musculū tibiā flexionis autorē posuisse affirmaret. Habeto itaq̃ in præsentī eam quā nobis modò musculosam substantiā nuncupare libuit, eius musculi loco, quem inter coxendicis articuli motores Galenus primū enumerat: quinti autē tibiā motorū Galeni musculi uice, illū quem tendinē in interioris femoris capitis radicē inferere retuli. Nisi fortè nō nimis in Galeni uerba iuratus, semel & lōgè rectius dicere mauis, illū, eundem musculū et primū femoris motorē, & quintū tibiā perperā constituere. Vt cunq̃ uerò statueris, inter disse candū Galeni loca & hæc nostra reuoluens, sedulò inspicias, nū quintus hic Galeni musculus inter tibiā mouentes recēseri debeat. Mihi quidē pro quinto femoris motuū duce habebitur, modò uix annuētī illū uel obscurissimè proprio motu tibiā mouere, & nullā mentione dignam insertionē ab huius musculi tendine in articuli genu ligamēta moliri. De^v musculo autē in poplite latitāte, ad reliquorū tibiā mouentiū enarrationis calcē, nonnulla priuato Capite subiiciā, in præsentia ad Galeni seriē & numerū sermonē, ut cœpi, accōmodans. Quū itaq̃ quintū Galeni musculū non inter tibiā motuū duces, sed omnino inter femoris enumerare uisum sit, quin^z tū sermoni ego illū addā, quē paulo antè à Galeno prætermisum dixi.^a A^a coxendicis ossis appendice sub terij et quarti musculi capitibus, et ante caput quinti à Galeno enumerati musculi, aliud neruosum principiū enascitur, quod meritò inter capita ab illo appendice originē ducētia, tertium

In 2 de Anat.
ni. sectio.

h 12. 14. 9.

i 14. 14. 5.

k 12. 14. 8. re
conditū sub
u tabulæ n.

l 11. 14. 2.

m 12. 14. 3.

n 12. 14. 4.

o 12. 14. 5.

p 12. 14. 6.

q 1. 14. 30.

r 12. 14. 7.

s 8. 14. 8.

t 2. 14. 29.

u 1. 14. 31.

v 14. 14. 1.

w 11. 14. 1.

x 12. 14. 1.

y 14. 14. 1.

z 11. 14. 1.

aa 12. 14. 1.

ab 12. 14. 1.

ac 12. 14. 1.

ad 12. 14. 1.

ae 12. 14. 1.

af 12. 14. 1.

ag 12. 14. 1.

ah 12. 14. 1.

ai 12. 14. 1.

aj 12. 14. 1.

ak 12. 14. 1.

al 12. 14. 1.

am 12. 14. 1.

an 12. 14. 1.

ao 12. 14. 1.

ap 12. 14. 1.

aq 12. 14. 1.

ar 12. 14. 1.

as 12. 14. 1.

at 12. 14. 1.

au 12. 14. 1.

av 12. 14. 1.

aw 12. 14. 1.

ax 12. 14. 1.

ay 12. 14. 1.

az 12. 14. 1.

ba 12. 14. 1.

bb 12. 14. 1.

bc 12. 14. 1.

bd 12. 14. 1.

be 12. 14. 1.

bf 12. 14. 1.

tertium enumerabitur. Hoc similiter neruosum est, & nisi aliquousque sub exortu carneum efficitur, sensim crassescens. Quum tamen ad mediam femoris longitudinem musculus iste descendit, exactè carnosus uisitur, quanquam interim posteriori ipsius sede (uti paulo post dicā) liuidus appareat. Ad hunc igitur modum præsens musculus deorsum per femoris posteriora delatus, & carnosus permanens, secundum posteriorem interioris femoris capitis sedem reflectitur, & simulatque elatissimam tibiæ partem contigit, in teretem cessat tendinem, interiori lateri anterioris tibiæ partis insertum, in ea nimirum regione, in quam primum, secundum & tertium tibiæ mouentes musculos ipsorum^d tendines porrigere relatum est. Verum quinti huius musculi tendo non æquè deorsum atq; tertij musculi tendo in tibiæ prorepat. Vix enim tibiæ appendicem prætergreditur, sed minimè interim (ne quis hoc in Galeni gratiā expectet) in femoris internum caput aut articuli huius ligamentum inseritur. Huic musculo ex abundanti^c sinus quidā oblongus accidit, in posteriori ipsius sede statim ab exortu ad mediā usq; femoris propemodum longitudinem ipsi insculptus. Totus hic sinus liuidus admodum est, & musculi tertij gratia incisus uisitur, is nanq; sinui incumbit, ipseq; sinus illius moli accuratè congruit. Cæterum quum huic quinto musculo idem ortus et par omnino ductus cū tertio sit, etiā unā cum illo tibiæ flexioni non segniter opem fert. Si hic musculus in internū femoris caput insertionem uel obscurissimam moliretur, aut quauis primaria ratione femur flecteret, & minus obliquo ductu quā tertius donaretur, fortè nihil obstaret hunc quintum Galeni musculus fuisse, aliqua ratione arbitrari: et quem ego quintum Galeni esse dixi, illum esse de quo Anatomicos redarguit. Sed quum ita res non habeat, patientur Galeni manes & nos ueritatē protulisse: qui etiā suis simijs nimium confisus, alios dissectionis professores nō semel immeritò insimulauit. ^b Sextus musculus eo accuratius uenit inspiciendus, quò rariorem inter reliquos musculos Naturam adipiscitur. A latere enim externo primi^h musculi ab ilium ossis spina enascitur, intus acutum carneumq; caput obtinēs, quod muris lacertæ uel modo latefcens, deorsum ad regionem coxæ dicis articuli fertur, ubi rursus caput id seu musculus angustior redditur, & priusquam magnū exterioremq; femoris^k processum perreptet, nō amplius carneus conspicitur. adeò ut sextus musculus aliud nihil tandem erit, quā longissima & latissima membrana tendinis naturam referens, cui nunc descripta & carnei exactiq; musculi formam repræsentans pars innascitur. Statim enim ab initio in exteriori parte instar latæ membranæ in conspectum uenit, aliquousq; coxæ dicis articulum amplexantibus musculis obductæ. Quum uerò membrana magnum femoris processum superauit, totam anteriorem femur amplexantium musculorum sedem, deinde & posteriorem & exteriorē cutis quasi modo tantisper integit, quousq; ad genu articulum descendat: quem ubi similiter quoq; membrana obuoluit, ipsa in anteriorem tibiæ sedem et externum illius latus inseritur. Cæterum ipsius membranæ, seu tendinis, utcunq; appellare lubeat, non eadem undiq; est crassities. Tota nanq; pars, quæ anteriori femoris sedi, et posteriori obducitur, tenuissima est: atq; hæc tanto tenuior conspicitur, quāto interiorem femoris regionem uiciniùs accedit. Ea uerò membranæ pars, quæ externo femoris lateri exporrigitur, ualida crassaq; est, & accuratè lati tendinis speciem exprimit. Huius fibræ recto tramite, quousque anteriori tibiæ parti ad latus magis externum & ad fibulam inserantur, decliues descendunt. Tendo autem hic ad insertionis sedem illis tendinibus commiscetur, qui cum ipso quoque tibiæ extendere dicuntur. Præsens nanque musculus extendentium numero uenit ascribendus, quanquam insignem usum femur ambientibus musculis etiam præstet, transuersi cuiusdam ligamētū ritu omnes, quos amplectitur musculos, in sua sede (ne aliquo scilicet permutentur) continens. Atq; eiusmodi membranæ uices gerit, cuiusmodi cubitum occupantibus musculis circulatim obnasci, prius insinuauimus. Quam uerò perfunctoriè Galenus hunc musculus describat, tria quibus illum dignatur uerba, in secundo de Administrandis sectionibus ostendunt. Arbitror enim hūc in libris de Vsu partium Galenum latuisse, quum in trium quos ibidem recenset tibiæ extendentium classē illum non reposuerit, & quia quarti præscriptæ orationis musculi ortum sermoni addiderit. Si enim simpliciter, ut de cæteris musculis loquitur, quarti insertionē et motum expressisset, arbitratu fuisset hunc^m sextum ab ipso eius musculi loco haberi, quem in externum latus tibiæ abducere tradidit. Quod sanè hic musculus, si sitū ipsius ductūq; spectes, præstaret, modo tibiæ uel minimū in latus ageretur. Verum quū explicatius de quarto musculo locutus, eius originē sermoni addidit, liquidò Galenus cōmonstrat se sextum hunc nō proponere, quādoquidē hic nō abⁿ appendice coxæ dicis ossis cū^o tertio, quarto et quinto nobis enarratis principiū ducit: ut ipse tamē innuebat, ab extrema sede ossis coxæ dicis abducentē musculū exoriri affirmās. Adeò sanè, ut fateri cogamur, hunc musculū Galeno in præscripta oratione incognitū fuisse, & quem

c u ta. o.

d 3 ta. cha.

1, 2, 3.

e Sinui & in

11 tabula in

scribitur.

f 10 ta. o.

g 3 tab. o. 1.

q. 2 r. 4. cha

raff. 3. 9 ta.

p.

h 3 ta. 8.

i 3 tab. ab x

ad y.

k 1, 2 fi. ca.

90, Y, Q.

l sub y 3 ta.

m 3 ta. o.

n 2 fi. ca. 29

lib. 1 ab lad

q.

o u ta. 2, 4.

v. & cha.

raff. &.

& quemadmodum falsos tibiæ motus sibi effinxit, ita quoque musculum aliquem sua imaginatione excogitatum, nobis tradidisse.^p Tres qui adhuc enarrandi supersunt, dilucidius fortassis recenserentur, si quem Galenus postremum numerat, nunc septimi loco describeremus. uerum quum hoc Capite Galeni ordinem sequi uisum sit, eos etiam qui adhuc reliqui sunt, sua serie aggre- diamur: postea in horum omnium administratione, uti nobis cōsultius uidebitur, omnes dissecturi.^q Septimus itaque neruea lataque & ampla^r origine ab externo femoris ossis latere nasci- tur, totam radicem magni femoris^s processus in orbem amplexus. Origo hæc statim ab ini- tio crassa carnosaque efficitur, & ilico à femoris osse abscedens, illi insternitur^t musculo, quem octauum nominabimus. Is namque aliqua sui portione huic septimo subensus in causa est, quo minus septimus tota femoris longitudine ipsius ossi, quemadmodum octauus, adnascatur. Se- ptimus itaque musculus sua amplitudine totum externum femoris latus citra omnem, præter- quam in exortu, ad os connexum amplectitur, magnam quoque anterioris & posterioris fe- dis femoris partem occupans. Hic toto descensu carnosus uisitur,^u paulò supra molam aut pa- tellam in amplum^x tendinem desinens, quem octauum musculi & noni^v tendinibus commixtū, simul cum illis patellam apprehendere, atque tandem in anteriorem tibiæ sedem inferi audies. Quamquam etiam septimi musculi tendinis posterior pars ualide sexti^z musculi permiscetur tendini, qui præ cæteris femur amplexantibus musculis huius septimi externam sedem inte- git. Posteriori autem septimi sedi^a quartus huius Capitis musculus adtenditur, quemadmo- dum anteriori is qui^b nonus omnium futurus est. Quotus uerò ordine iam septimus muscu- lus in præscripta Galeni oratione habendus sit, ubi & duos alios adhuc absoluerò, ipse augu- rabere. ^c Octauus musculus totam propemodum femoris ossis amplitudinem succingit. In posteriori enim duntaxat sede iuxta femoris longitudinis medium, nudam relinquit^d lineā, cui maximus totius corporis^e musculus, seu femur mouentium quintus, inferi docebitur. De- in ad radicem quoque inferiorum femoris capitum, posteriorem quoque femoris^f amplitudinem octauus hic musculus non integit, cuius^g principium à femoris ossis ceruice nerueum exori- tur: sed sensim carne adauctum, à femoris quoque magni processus radice ipsius portio ita ena- scitur, ac si eius obliqui ductus gratia, duo principia obtinere non inepte diceretur: ac unum quidem femoris ceruici, alterum uerò magno illius processui ferendum esset acceptum. Vt cū- que sit, musculus obliqua hac & ampla origine enatus deorsum descendit, uti diximus, femo- ris os adeò ambiens, ut duo ipsius latera in posteriori femoris regione paulo minus toto sint contigua. Quo uerò magis descendit, crassior semper carnosiorque efficitur, quousque ad inter- num latus anterioris in femore regionis, quodammodo in crassum & admodum carneum^h semicirculum propter patellam extuberet, ex quo latus ualidusque enatus tendoⁱ patellam, si- cuti paulo pòst dicam, amplectitur. Hic musculus tota ipsius longitudine è directo semper illius carnei semicirculi & ceruicis femoris carnosior crassiorque apparet, quam quā * septi- mo musculo substernitur. sub illo enim tenuior euasit, attamen carnosus inibi quoque perma- net. Quando itaque secundum femoris longitudinem in anterioris ipsius sedis interno latere octauus musculus procerius extuberat, & septimi quoque anterior pars è directo lateris exte- rioris eius sedis femoris quæ anterior est, exporrigitur, in medio anterioris femoris sedis septi- mus unà cum octauo^k sinum efformant impen- se liuidum, cui tota femoris longitudine mu- sculus innititur, quem ordine nonum esse dicam, simulatque octauum musculum in Galeni oratione proculdubio primum esse addidero: quandoquidem adhuc quodammodo carno- sus molæ seu patellæ iniicitur. ^l Nonus (cui Galenus exortus sedem perperam assignat) nō ex femoris osse enascitur, uerum ex iliū ossis^m tuberculo, in anteriori ipsius regione super coxæ dicis ossis acetabulū prominente. Ab hoc enim tuberculo nonus musculusⁿ principium ner- ueum acutumque assumit, quòd deorsum rectà in femoris anteriora descendens, lacertæ muris- que formam adipiscitur carnea substantia auctus, et illi sinui incumbens, quem septimum mu- sculum cum octauo efformare nuper retulimus. Priusquam uerò nonus medium longitudi- nis femoris descendendo superarit,^o arcior graciliorque sensim efficitur, ut multò supra genu articulum in^p tendinem finiat, utcunque amplum, sed tenuem: qui rectà patellam accedens, in anteriori ipsius sede denuo dilatatur,^q tendinibus septimi & octauum musculi permixtus. At tamen hic tendo alijs non adeò ualide, atque septimi & octauum musculi tendines inuicem, con- nascitur. quandoquidem transuersis, quæ nouacula ducuntur, sectionibus, non admodum laceratus, à subditis tendinibus ad anteriorem usque tibiæ sedem auelli potest. Vt cunque sit, hic ex tribus postremò enarratis musculis, unus tendo conflatur, cui patellæ corpus uniuersum innascitur. Nihil enim ipsius patellæ tendine non obducitur, præter interiorem ipsius su- perficiem, quæ læui cartilagine incrustata, sinū inferiorum femoris capitum respicit, mutuoque ingressu

Septimus.

Octauus.

Nonus.

p 4 ta. 4. 5
ta. 4. 6 tab.

II.

q 5 tab. A. 1

r. 2. 4. u. 6

4. 9. 10. u.

11. 12. l.

r 5 ta. cha.

r. 2.

5 5 ta. v.

t 5, 6 ta. n.

u 5 ta. cha.

r. 3.

x 8 ta. g.

y 8 ta. h. i.

z 3 ta. 4.

ta. cha. 3.

a 10 tab. r.

ad tenditur

u.

b 4 ta. 4 ad

tenditur u.

c 5, 6, 7 ta.

r. 1. 2. u. 3.

9 8. 4. 7. 8 l.

10, 11. 7. 12

u. 13. d. 1. 16

d 1 fi. ca. 30

lib. 1 d. 13

ta. 4. 1.

e 13 ta. 3, 2,

p.

f 1 fi. ca. 30

lib. 1 c.

g 6 ta. 7.

h 6 ta. v.

i 8 ta. k. pa-

tella nota-

tur, tendo

autem h.

* 5 tab. A.

h 5 ta. n. ex

cuius chara-

cteris indi-

ce presen-

tia petes.

l 4 tab. 4. 5

tab. cha. 5. 1

ta. 3. 3 ta. a.

9 7. 16 p.

m 1, 2, 3 fi.

ca. 29 li. 1 s.

n 4 ta. o.

o 4 ta. w.

p 4 ta. p.

q Specta

hic 8 ta. 2,

g. h. i. k.

ingressu cum illo respondet, Quum uerò tendo iste ad eum modum patellam amplexus, & interna ipsius sede, qua femoris ossi non connascitur, multo adipe & mucoso uiscidoque humore imbutus, genu articulum transcendit, arctior & crassior efficitur, ualidissime in anteriorem tibiae sedem, non procul sub articulo, implantatus. In caudatis uerò simijs non æquè arctatur, neque etiam pariter crassescit, sed membraneus quodammodo tibi inferiorius multo, quàm hominibus, inseritur. Deinde illis quoque simijs reliqui tendines in tibiā implantati, membranosiores latioresque quàm hominibus obtigerunt. Quod uel Galeni nomine expendendum est diligentissime, qui omnes propemodum teretes tibiā mouentiū musculorum tendines, ac si lati amplique essent, ut in simijs uiderat, describit. Si igitur septimum & nonum secundi & tertij loco in præscripta ex tertio de Vsu partium oratione enumerari uoles, per me quidem licet, si modò neque numero duntaxat nimium attentus, neque libris fidens, rem ipsam aggrediaris, aut alteri sedulo administranti astes. Quod non solum in nouem enarratis tibiae motoribus obseruabis, uerum etiam in musculo sub alijs in poplite recondito, cuius naturam secundo ab hoc Capite ipsi dedicando, sum explicaturus.

Lib. 2 de Ad.
mi. sectio.

r 1 fi. ca. 32
lib. 1 A, B,
a, b.

s 3 ta. cha.
1, 2, 3.

t 14 tab. r.

NOVEM TIBIAM MOVENTIUM MV
sculorum administratio. Caput LIIII.



Sexti musculi
administratio.

SECTIONEM tibiā mouentium musculorum in illo crure aggredieris, cui dum pubis ossa in ani musculorum administratione seiungeres, sacrum os adnexum siuisti. Ab ilium igitur ossis summo ad medium usque tibiae longa ducetur sectio, cutem, adipem, & carneam membranam diuidens. absque omni enim arte cutis cum carneā membrana laniorum artificio ad mediam usque tibiae longitudinem attollenda est. Mox secundum femoris longitudinem in interna ipsius parte obseruabitur sexti musculi membrana, seu tendo, quem cutis modo à subiectis liberare conuenit. eius igitur parte quæ anteriorem femoris sedem ambit, ad externum femoris latus deducta, eam quoque quæ posteriorem sedem integit, similiter uersus externum latus dirimere necessum est, quo manu transuersim inter ipsius tendinem & septimum musculus interiecta, & sursum deorsumque mota, tendinis insertionem & musculi quoque originem intuearis. Vbi originis locum inueneris, nouacula, aut cultello, hanc ab ilium ossis spina absecabis, & illam digitis attollens, ad tibiā usque totum musculus auelles, accurate tendinis istius amplissimi naturam, & carnosam huius musculi partem inspiciens, & musculus à sua insertionem pendente relinques, quo postea ipsius functio rectius innotescat. Post hunc, primi musculi caput ab anteriori summaque ossis ilium parte cultello liberabis, & ipsius capite digitis apprehenso, absque negotio ad insertionem usque à subditis diuelles. Mox nouacula à pubis osse, quæ id alterius lateris pubis ossi cartilaginis interuentu committebatur, secundi musculi initium dirimes, & illo similiter digitis apprehenso, musculus uniuersum ad insertionem usque perduces. Iam nonum aggredi liceret, uerum commodius feceris, si uerso crure illos qui à coxendicis osse oriuntur, prius administraueris. Quod ut recte succedat, necesse est insignem musculus, qui alteram natem constituit, auferre, qui à spina ossis coccygis & posteriori parte ossis ilium spinæ enatus, magno femoris processui potissimum inseritur, femur, uti suo loco audies, moturus. Nouacula igitur huius musculi carneum principium ab illis unde prodit ossium sedibus est abradendum, ut à subditis musculis quoque eleuatum, in latus commodè reflecti possit. Alias enim ex coxendicis ossis appendice pronati musculi sese suis capitibus non ostenderent, quæ sua exortus serie iam ueniunt dirimenda. Cæterum ut exactius uoti compos fias, digitis in posteriori femoris sede, adhibita quoque si uoles retusiori nouacula, musculos inuicem seiunges, ut capitum mutuò incumbentium crassitiem leuiori cura coniectari liceat. Animum itaque hic adhibebis, num tertij musculi caput ut ego dixi, quarti insternatur, num uerò tertij caput, quarti musculi capiti, ut Galeno uidetur, succumbat, & quoniam pacto è regione illa inuicem magna ex parte situentur connascanturque. Quod ubi præstiteris, utrunque à coxendicis osse absecabis, & tertij capite in manum sumpto, ad ipsius usque insertionem à subditis detrahes. hoc solum perpendens, qualiter quinti à me commemorati musculi sinui incumbat. Quum uerò quarti etiam musculi caput similiter diuellis, sedulo attendendum est illi carnosæ parti, quæ à femore pronata, quartum augeat. Hæc enim cultello à femoris osse liberanda est, priusquam totus musculus ad insertionem perduci possit. Iam quintus Galeni musculus erat diffecandus, uerum noster ipsi incumbens sese adeò manifestè offert,

brana, seu tendo, quem cutis modo à subiectis liberare conuenit. eius igitur parte quæ anteriorem femoris sedem ambit, ad externum femoris latus deducta, eam quoque quæ posteriorem sedem integit, similiter uersus externum latus dirimere necessum est, quo manu transuersim inter ipsius tendinem & septimum musculus interiecta, & sursum deorsumque mota, tendinis insertionem & musculi quoque originem intuearis. Vbi originis locum inueneris, nouacula, aut cultello, hanc ab ilium ossis spina absecabis, & illam digitis attollens, ad tibiā usque totum musculus auelles, accurate tendinis istius amplissimi naturam, & carnosam huius musculi partem inspiciens, & musculus à sua insertionem pendente relinques, quo postea ipsius functio rectius innotescat. Post hunc, primi musculi caput ab anteriori summaque ossis ilium parte cultello liberabis, & ipsius capite digitis apprehenso, absque negotio ad insertionem usque à subditis diuelles. Mox nouacula à pubis osse, quæ id alterius lateris pubis ossi cartilaginis interuentu committebatur, secundi musculi initium dirimes, & illo similiter digitis apprehenso, musculus uniuersum ad insertionem usque perduces. Iam nonum aggredi liceret, uerum commodius feceris, si uerso crure illos qui à coxendicis osse oriuntur, prius administraueris. Quod ut recte succedat, necesse est insignem musculus, qui alteram natem constituit, auferre, qui à spina ossis coccygis & posteriori parte ossis ilium spinæ enatus, magno femoris processui potissimum inseritur, femur, uti suo loco audies, moturus. Nouacula igitur huius musculi carneum principium ab illis unde prodit ossium sedibus est abradendum, ut à subditis musculis quoque eleuatum, in latus commodè reflecti possit. Alias enim ex coxendicis ossis appendice pronati musculi sese suis capitibus non ostenderent, quæ sua exortus serie iam ueniunt dirimenda. Cæterum ut exactius uoti compos fias, digitis in posteriori femoris sede, adhibita quoque si uoles retusiori nouacula, musculos inuicem seiunges, ut capitum mutuò incumbentium crassitiem leuiori cura coniectari liceat. Animum itaque hic adhibebis, num tertij musculi caput ut ego dixi, quarti insternatur, num uerò tertij caput, quarti musculi capiti, ut Galeno uidetur, succumbat, & quoniam pacto è regione illa inuicem magna ex parte situentur connascanturque. Quod ubi præstiteris, utrunque à coxendicis osse absecabis, & tertij capite in manum sumpto, ad ipsius usque insertionem à subditis detrahes. hoc solum perpendens, qualiter quinti à me commemorati musculi sinui incumbat. Quum uerò quarti etiam musculi caput similiter diuellis, sedulo attendendum est illi carnosæ parti, quæ à femore pronata, quartum augeat. Hæc enim cultello à femoris osse liberanda est, priusquam totus musculus ad insertionem perduci possit. Iam quintus Galeni musculus erat diffecandus, uerum noster ipsi incumbens sese adeò manifestè offert,

Primi. ctio rectius innotescat. Post hunc, primi musculi caput ab anteriori summaque ossis ilium parte cultello liberabis, & ipsius capite digitis apprehenso, absque negotio ad insertionem usque à subditis diuelles. Mox nouacula à pubis osse, quæ id alterius lateris pubis ossi cartilaginis interuentu committebatur, secundi musculi initium dirimes, & illo similiter digitis apprehenso, musculus uniuersum ad insertionem usque perduces. Iam nonum aggredi liceret, uerum commodius feceris, si uerso crure illos qui à coxendicis osse oriuntur, prius administraueris. Quod ut recte succedat, necesse est insignem musculus, qui alteram natem constituit, auferre, qui à spina ossis coccygis & posteriori parte ossis ilium spinæ enatus, magno femoris processui potissimum inseritur, femur, uti suo loco audies, moturus. Nouacula igitur huius musculi carneum principium ab illis unde prodit ossium sedibus est abradendum, ut à subditis musculis quoque eleuatum, in latus commodè reflecti possit. Alias enim ex coxendicis ossis appendice pronati musculi sese suis capitibus non ostenderent, quæ sua exortus serie iam ueniunt dirimenda. Cæterum ut exactius uoti compos fias, digitis in posteriori femoris sede, adhibita quoque si uoles retusiori nouacula, musculos inuicem seiunges, ut capitum mutuò incumbentium crassitiem leuiori cura coniectari liceat. Animum itaque hic adhibebis, num tertij musculi caput ut ego dixi, quarti insternatur, num uerò tertij caput, quarti musculi capiti, ut Galeno uidetur, succumbat, & quoniam pacto è regione illa inuicem magna ex parte situentur connascanturque. Quod ubi præstiteris, utrunque à coxendicis osse absecabis, & tertij capite in manum sumpto, ad ipsius usque insertionem à subditis detrahes. hoc solum perpendens, qualiter quinti à me commemorati musculi sinui incumbat. Quum uerò quarti etiam musculi caput similiter diuellis, sedulo attendendum est illi carnosæ parti, quæ à femore pronata, quartum augeat. Hæc enim cultello à femoris osse liberanda est, priusquam totus musculus ad insertionem perduci possit. Iam quintus Galeni musculus erat diffecandus, uerum noster ipsi incumbens sese adeò manifestè offert,

Eorum qui à
coxendicis ossis
appendice
enascuntur.

Tertij &
quarti.

Lib. 2 de Ad.
mi. confectione.

Quinti.

a 3 ta. 4.

b 4 ta. 10.

c 3 ta. 2.

d ultimariū

fig. lib. 1.

e 16 tab. Δ.

f 4 ta. 9.

g 10 tab. 4.

h 11 tab. 1.

i 9 ta. n.

i 11 ta. 1, 2.

k 12 tab.

l 10 ta. 1.

m 10 ta. 1.

n 11 tab. 1.

o 12 tab. 2.

p 11 tab. 1.

q 11 tab. 1.

r 11 tab. 1.

s 11 tab. 1.

t 11 tab. 1.

u 11 tab. 1.

v 11 tab. 1.

w 11 tab. 1.

x 11 tab. 1.

y 11 tab. 1.

z 11 tab. 1.

aa 11 tab. 1.

ab 11 tab. 1.

ac 11 tab. 1.

ad 11 tab. 1.

ae 11 tab. 1.

af 11 tab. 1.

ag 11 tab. 1.

ah 11 tab. 1.

ut admodum Naturæ artificium admiraturus sis, quæ illum sinum tam affabre exculpfit, ut tertius musculus, in illo repositus^a unâ cum hoc, ac si unus ambo essent, à Galeno auulsus fuerit. quapropter huius quoque capite ab ossis coxendicis appendice liberato, totus musculus ad suam quoque insertionem detrahetur. In præsentia quintus Galeni musculus se ad amussim in lateribus, & posteriori sede ostendit. Verum quia femoris motibus subministrat, opportuniùs in femur agentium musculorum sectione administrabitur. Quanquam nihil etiam prohibeat ipsius^r capite nerueo à coxendicis appendice liberato, illud deorsum trahere, transuersis que sectionibus ab illo, qui ipsi in anteriori sede adnascitur musculo diuidere. Vt simul & huius, & carnosæ illius partis insertionem ortumque intuearis, numque ego hætenus uera tibi enarrauerim, obserues. Verso nunc crure, noni musculi principium altius nonnihil inter^r quosdam femoris motores reconditum, ab ossis coxendicis^u tuberculo separabis. quod ubi digitis attraxeris, ad patellam usque citra sectionem adimetur, & liuida ipsius substantia, quæ^x sinui octauo & septimi musculi insidet, unâ cum ipso sinu spectandam sese exhibebit. Hoc ad patellam relicto, septimi musculi exortum ab osse sedulo derades, & musculi principio sensim in exteriora reflexo, ab octauo musculo illum ad patellam usque liberabis.^z Octauum uero operosius à femore deradere conuenit, quum undique ferè ossi adnascatur: ubi tamen ad patellam usque abrasus, atque unâ cum septimo & nono à femoris osse reflexus erit, operæ precium feceris, si singulorum musculorum motum expendaris, quod pari ratione atque in alijs musculis præstiturus es, illorum scilicet capitibus ad sedes unde pronascuntur attractis. Verum hîc tibie motus propter frequentia in genu & femore uulnera tibi tantus esse debet, ut pede à tibia absecto, & tibie carnibus quam possis examussim citra horum musculorum læsionem ademptis, ipsos aggredi debeas, ut num ego de tibie motibus immerito secus atque alij omnes senserim discas. Neque sanè pedem cum tibie carnibus ademptum esse, sat est: imò nihil æquè conducet, atque omnem carnem coxendicis articulo incumbentem unâ auferre, ne femoris motus tibi cum alijs Anatomicis in hoc opere illudat. Nudo enim articulo, semper unâ intuebere, num femoris caput, uel tantillum in suo sinu mutetur. Et quo minus præter rectam flexionem extensionemque tibiam immoto femore, aliam nullam moliri cõspicaberis, expende quanto minus id in nobis tibia præstet, quum tot carnibus undique femur circumuestitur. Porro extendentium^a tendinum permixtio nouacula inquirenda uenit: ut scilicet intuearis, quis musculorum insigniorem commixti tendinis portionem obtulerit. Quinetiam attendendum erit, cuiusmodi patellæ in illo tendine nexus sit: ac demum quâ nullius ligamenti beneficio, imò nullius prorsus corporis interuentu patella femori innitatur.

DE MUSCULO IN POPLITE OCULTO

to, qui non rectè Galeno præcipuus tibie flexionis autor habetur. Caput LV.

Lib. 2 de Admi. sectio.

a 14. tab. r.
13. tab. n. 15
td. C.

b fi. ca. 1. V.

c 14. tab. h.



d 14. tab. i.
e 2. fi. ca. 13
li. 1 A, B.

f 12. tab. o
r, ac 13. tab.
g 13. tab. r.

INTER tibie motuum duces Galenum, quendam^a musculum in poplite latitantem recensuisse, antè diximus: modò autem qua sede is contineatur, cuiusque formæ, ductus, & magnitudinis sit, narrabimus. Ex ligamenti itaque femur tibie cõnectentibus (quorum naturam peculiari capite unâ cum coxendicis articuli & pedis ossium ligamenti persequar)^b unum in externo genu articuli latere habetur, admodum ualidum & crassum. Ab huius itaque posteriori parte nerueum musculi^c principium exoritur, quod sua amplitudine in exteriori latere posteriorem genu articuli sedem contingit, atque ex tota hac ligamento regione prodit. Hinc uero principium id carnosum adauctum fibris, admodum oblique deorsum uersus interiora descendit, musculum efformans paulò longiorem, quam ampliorem. Finis enim huius, seu insertio^c iuxta radicem appendicis tibie ossis consistit, in ipsius posteriori parte adeò ampla, atque totius musculi uisitur latitudo. Deinde ut musculus hic obliquus est, obliquam quoque molitur insertionem, à posterioris enim tibie sedis interno latere, deorsum uersus internum latus oblique ita descendit, ut minima huius musculi pars genu ligamenti, maxima uero tibie committatur. Neque solum huius insignior portio in tibia consistit, at tibie quoque ossi, quemadmodum retulimus, proluxa & ampla insertionem implantatur. femoris autem ossi nullibi connatus est, multoque minus ab hoc originem ducit. Præsentī musculo alius nullus, aut in exortu, aut in insertionem subiicitur, sed articuli ligamenti & ossibus proximè attensus, sub illis^f musculis occultatur, qui ab inferioribus femoris capitibus enati, sura cum^g tertio quodam musculo efformant. adeò ut non iniuria hunc in poplite latitantem Galenus uocauerit, num uero huic tibie flectendæ munus rectè tribuerit, ipse ratiocinator. Eo usque enim

f Galenus

Galenus huic musculo (quod fortè illum primus inuenisset, aut quod alij Dissectores illum flectendi opificem non recensuissent) fauit, ut in secundo de Administrandis sectionibus hunc solum posse poplitem flectere, aut maxima potentia præditum esse scripserit. Mihi uerò non modò haud maxima potentia ad tibiam flectendam ualere uidetur, sed nulla prorsus. Quandoquidem musculus hic obliquus recto motui præfici nequit: deinde adeò est inualidus, ut ne tantillum tibiam sursum uellere possit. Ad hæc, nulla huic cum reliquis tibiam agentibus est proportio, quum breuissimus & tenuissimus sit, femorisq; ossi, & multò minus illi ossi quod sacri ossis lateri commissum uidemus, non cōnascatur. At hæc inter secandum exactius multò obseruabis, quum hic musculus inuentu facilis sit, ilico nanque ac suræ musculi à femoris capitibus enati, à femore liberantur, ac deorsum reflexi pendent, is musculus est admodum conspicuus. Priusquam uerò ex dissectionis ordine is detegatur, femur mouentes musculos describemus: quorum administratione absoluta, pedis, & deinde digitorum motoribus nos accingemus, in quorum Anatome obliquus hic in poplite latitans musculus spectandum se offert: ac ostendit pariter, num commune aliquod munus obeat cum ¹ superiori radium in primum mouente musculo.

h 1, 2, 3 fig.
ca. 29 li. 1.

i 7 ta. Q.

DE MUSCULIS FEMUR MOVENTI- bus. Caput LVI.

Femoris mo-
tus.



Primus fe-
mur mouen-
tium.

Secundus fe-
mur mouen-
tium.

FEMUR decem, aut si in maximum redigantur numerum, quatuordecim proprijs agitur musculis, qui id extendunt, flectunt, introrsum alteri cruri adducunt, extrorsum in latus amouent, & circumagunt. Flectitur itaque femur ad inguina, nobis id sursum antrorsumq; ferentibus. Extenditur autem nobis deorsum, & uersus terram id deducuntibus. Summam autem extensionem habet stantibus, tunc maximè quum uni pedi innitentes, alterum crus in posteriora, quàm licet remotissimè protendimus. Vnde etiam meritò Natura magnis & fortibus multisq; musculis extensionem concedidit, quos iam enitar persequi, eum Galeni ordinè seruaturus, quem ad calcem decimi quinti de Partium usu est secutus. Is nanq; longè mihi potior, & ex aliorum dissectionis procerū suffragio magis descriptus apparet, quàm is quo coxæ articuli musculos in secundo de Administrandis sectionibus aggreditur. ^a Primus itaq; ipsorum sub summa cute cōsistit, alterius lateris natem præcipuè efformans. ^b Exoritur enim lato & admodum carnosio principio, ex ^c tota spinæ ossis ilium posteriori parte, quæ uersus os sacrum magis eminet, deinde etiam spinæ superioris regionis portionem quoque suo exortu apprehendit. Infimam autem sui exortus partem à coccygis ossis & infimi ossis sacri posteriori sede assumit: in qua etiam sede unius lateris musculus, musculo alterius lateris contiguus uisitur. Ex his ilium ossis spinæ sedibus, & sacro osse, & coccygis osse musculus uelut ex semicirculo pronatus, in corporis latus nonnihil obliquè deorsum proreptat, toti coxendicis articulo superuectus. ^d Vbi uerò articulo insternitur, ^e gracilior angustiorq; tantisper efficitur, donec in latum & ualidum finiat tendinem, quo ^f exteriori magni femoris processus parti secundum ipsius longitudinem obliquè inseritur. Principium enim insertionis paulò sub superiori eius processus apice nonnihil uersus anteriora molitur: hinc deorsum in posteriora modicè descendens, & magnam eandemq; ualidam sui tendinis ^g portionem, in processus eius radicem, longa linea secundum femoris posteriora inferens. ^h Secundus magna ex parte primo femoris musculo substratus, ab anteriori superiori ossis ilium spinæ regione lato quoque & carneo exortu nascitur, ⁱ totam ferè ilium ossis spinæ sedem occupans, à qua primus initium nō mutuauit. Verum hac tantum sede secundus musculus non cōtentus, ab ilium ossis dorso, ubi primus musculus ab osse primum abscedit, sub illo quoq; nascitur, adeò ut huius quoque ^j initium tanquā ex semicirculo prodeat, posteriori sua sede, etiā in exortu primo musculo subiectum. Ex hac ossis ilium sede deorsum obliquè nonnihil ad latus descendit, ut sensim arctior redditus, primum musculum totus subeat, articulum quoque coxendicis integens: ^k cuius regione in membraneum, sed ualidum ^l tendinem cessat, qui elatiori magni femoris processus parti implantatur: ^m anteriorem quoque processus regionem aliquantulum comprehensdens, latamq; & transuersam insertionem (si cum primo conferatur) molitus. Quum itaque primi musculi fibræ, quasi transuersim in latus minimum scilicet deorsum inclinatae prorepant, secundi autem recto quasi ductu decliues, & modicè admodum in latus protensa propagentur, utriusque musculi fibræ sibi mutuò x literæ modo decussatim incumbunt. Hic musculus similiter ac primus, nulla ex parte aut amplior, aut crassior, aut carnosior conspicitur, quàm

a 9 tab. n. 2
tab. u. 10 n.
b 9 tabu. i.
k, l.
c Ossis circumscripti-
onem petes
ex 2 fi. cap.
29 li. 1.
d 9 ta. m.
e 9 ta. ab m.
ad n.
f 1 fi. ca. 30
lib. 1 S, de in-
T.
g 10 ta. à 2
uersus n.
h 10 ta. 2. 2
ta. y. 4 tab.
u. 5. 9 0, 11
a.
i 9 ta. n.
k Hic con-
feres 9, 10
et 11 tabulas
inter se.
l 10 ta. u. x.
m 10 ta. y.
n 2 fi. ca. 30
lib. 1 V.

ubi

ibi ab ilium osse (unde principium ducit) primum abscedit, ac tertio in sterni musculo incipit.

Tertius enim musculus tanto minor est secundo, quanto secundus primo. Subijcitur autem penitus secundo musculo, ^p initium ducens ab ^q externis & demissioribus ossis ilium dor-
^r sedibus, ubi id coxendicis ossis nomen primum obtinet, atque id tertij musculi initium si-
militer latum & semicirculare est, & ut duorum primorum principia carneum, crassumq̃.
Præterea hoc in priora modicè deorsum procedens, coxendicis articuli ^r ligamento fibrosis
nexibus hæret: & arctius quoq̃ redditum, in latum robustumq̃ cessat ^s tendinem, qui maiori
femoris processui expansus, anteriori ipsius ^t parti, atque adeò apici innascitur. Hic musculus
admodum liuidus, & præcipuè in musculosis, & nõ admodum obesis apparet, in quibus & secun-
dus quà tertio incumbit pariter liuet, ut etiã tota ipsius pars primo musculo non obtecta, quæ
præterquã quòd liuet, etiã ualida membrana obducitur, superiori lateri primi musculi pertina-
citer ea sede cõnatus, qua illum subit musculus. In obesis autẽ & præpinguibus nimis quàm
parum liuent, imò plerunq̃ nerueæ fibræ per hos musculos exporrectæ in mulieribus per totã
musculi carnosam partem, adipe enutritæ cõspiciuntur: aut quum id in muliere obseruabis, in
pinguedinem potius carnosas fibras porrigi asseres, quàm pingues fibras in carneã molem:
quòd tanta pinguedine hi musculi, & potissimum primus, scatere soleant, ita cõmodius stratur
sedentibus futuri.

Quartus musculus magna etiã ex parte liuidus, & paulò minus toto te-
res, non autem dictorum modò amplius existit, neque cæterorum ritu ab ilium osse principi-
um adipiscitur, at à lateribus ^x trium inferiorum ossis sacri uertebRARUM, quibus ilium ossa
non coarctantur, carneum crassumq̃ educit caput, non quidem duntaxat ab illorum ossium
lateribus enatum, at nonnihil quoque ita ex illorum interna sede, ut utriusque lateris musculi
sefe inijs aliquando in interna ea sede contingant. Hinc in latus, seu extrorsum ab osse sacro
scilicet ad femoris magnum processum transuersim excurrent, carneus aliquousq̃ permanet,
& tandem arctior redditus, priusquàm femur contingat, in teretem cessat ^v tendinem, poste-
riori maioris femoris processus sedi implantatum, iuxta ipsius ^w summum & apicem. Porro
& si Galenus in decimoquinto de Partium usu libro, præsentem musculum à sacro osse ena-
sci dixerit, & rursus in secundo de Administrandis sectionibus unum quoque à coccyge ena-
sci testetur, non ob hoc illum alium indicasse musculum arbitrandum uenit. In libris enim de
Vsu partium nusquam præter quatuor ossis sacri ossa cognouisse uidetur, nulla prorsus coc-
cygis ossis facta mentione: ac proinde ab osse sacro hunc musculum inibi prodire scripsit.
In libris autem de Administrandis sectionibus ita os sacrum cognouit, quemadmodum in li-
bro de Ossibus id enarratur, ut scilicet tribus tantum uertebRIS Galenus id conformatum ar-
bitraretur, & tria ossa his tribus uertebRIS proximè subiecta coccyx os appellaret: interim qua-
tuor illorum ossiculorum, quæ nos ita uocanda duximus, nullam faciens mentionem, quum
non ab illis, sed à quarto, quinto & sexto ossis sacri ossibus hic quartus musculus principium
mutuetur.

Qui modò subsequitur musculus, aut unius, aut duorum, aut trium etiam uice
prout cuique uisum erit, referri poterit. Est nanque musculus iste, cuius dum tibiæ motores
enarrarem, superius memini, ipsum quintum Galeni musculum ibidem appellans. Sub ^b tri-
bus enim posterioribus capitibus, quæ à coxendicis ossis appendice pronata, tertium, quar-
tum, & quintum musculos tibiã mouentes constituiebant, ^c quartum caput consistit, quod
etiam obiter dum illos recenserem, descriptum est. A tota igitur appendicis ^d sede, tribus dictis
iam posterioribus capitibus non occupata, ad pubis ossis usque regionem qua inferior ossium
^e commissuræ finis habetur, principium ducit musculus amplius insignisq̃, & ut semel dicam,
totius corporis citra controuersiam mole maximus. Hoc principium secundum eius appen-
dicis amplitudinem prodiens, exactè carneum uisitur, ea tantum ^f parte excepta, quæ tribus
commemoratis tibiæ musculorũ capitibus proximè succedit. Hæc enim neruea admodumq̃
ualida posteriori sede existit, sed interna sede, ut & totus musculus carnea, similiter ac reli-
quus musculi exortus, ^g conspicitur. Musculus iste eiusmodi enatus principio, ^h statim parui
femoris ⁱ processus radicem ad ^j posteriorem ipsius regionem amplectitur, & deinde ab hac
in acutam asperamq̃ femoris ossis ^k lineam cõtinuò inferitur, quam in posteriori femoris sede
secundum ipsius longitudinem deorsum à parui processus radice protendi, in primo libro di-
ctum est. Quemadmodum itaque musculi huius principij continuus est ortus, ita quoque
continua eiusdem uisitur insertio, si modò ^k posteriorem musculi partem excipias, quam
^l tendinem in interni femoris capitis radicem inferere modò dicam. Hæc enim pars à coxendi-
cis appendice nerueo exortu pronata, musculum quodammodo per se efformat, qui in miram
uentris amplitudinem dilatatus, deorsum rectà per femoris posteriora fertur, donec denuò
gracilescens, teretem tendinem ^m in internum femoris caput inserat. Et nisi huius maximi cor-

poris seu quinti femur mouentium musculi parti, reliqua musculi parsⁿ adnascetur, illa di-
 stincti & peculiaris musculi uice ab omnibus merito haberetur. Nunc autem quum poste-
 rior hæc pars adnatam continuamq; eiusdem musculi aliam habeat partem, nihil obstat di-
 uersis doctrinæ modis, aut unum (uti nos hæcenus fecimus) uniuersum hunc musculū appel-
 lare, aut primū in^o duos illum distinguere: ut scilicet unus esset, qui femoris interno capiti
 tendinem porrigat, alter uerò qui acutæ femoris lineæ implantatur. Atque hæc una est^p in-
 scriptio, istam posteriorem partem ab anteriori distinguens. Verū &^q anterior rursus pars
 inscriptionem quoque obtinet, non tamen adeò manifestam, ac modò narratam, uerū ta-
 lem, cuius gratia hanc partem in duas portiones, aut si quis uelit, in duos musculos subdi-
 uidere, integrum sit. Huius nanque anterioris quinti musculi partis portio, quæ enascitur ab
 anteriori appendicis ossis coxendicis sede, quæ à pubis ossium commissura ad infimam us-
 que coxendicis partem pertinet, ab illa anterioris musculi partis portione, inscriptione qua-
 dam dirimitur, quæ à reliqua appendicis sede usque ad posterioris partis musculi totius an-
 teriorem regionem pronascitur. Præterea duæ hæc anterioris partis portiones, non inscri-
 ptione impressione ue solū distinguuntur, sed etiam fibrarū ductu, ac item insertionē: quem-
 admodum etiam totius musculi posterior pars ab anteriori fibrarum insertionisq; occasione
 differt. Portio nanque anterioris partis, quæ pubis ossium commissuræ proxima est, admo-
 dum obliquas & ferè transuersas exigit fibras, quæ ab exortu retrorsum ad radicem parui fe-
 moris processus contendunt, & superiori parti acutæ femoris lineæ inferuntur. Reliqua au-
 tem anterioris partis portio, quæ ad infimam magis coxendicis ossis sedem principium du-
 cit, obliquas quidem exigit fibras, sed propemodum rectas, & inferiori asperæ prominentisq;
 lineæ sedi continuò implantatas. Ac proinde aut mecum unum constituito in uno femore
 musculum, aut si uisum fuerit utrasque partes duorum musculorum uice enumerato: aut si
 maiori adhuc numero, iam in sectione peritior, caperis, anteriorem partem in duos muscu-
 los subdividito, tres enarraturus, ea tamen lege, ut situi, functioni, figuræ, crassitie, neruo-
 sæ & carnosæ parti magis quàm numero attendas, & obserues pariter me de hominum, non
 autem simiarum musculis secus quàm Galenum loqui, ne si fortè aliquando illum legens me
 posteriorem huius quinti musculi partem, quæ radici interioris capitis femoris implantatur,
 oscitanter spectasse arbitreris, quod illam tendine insertionem moliri scripserim, quum inte-
 rim carneam insertionem in caudatis simijs tentet. Hæcenus commemoratis quinque mu-
sculis, tensio femoris primariò conceditur, & idem quoque femori in motu, qui in latus &
in circumactu quoque fit, ut nunc audies, famulantur. Primus enim ualidæ & in neutram uer-
 gentis partem extensionis autor est, amplo ipsius principio, & lato tendine femur reuellens.
 Si uerò elatiorem duntaxat sui principij partem tetenderit, aut humiliorem, non quidem in
 neutrum latus inclinantem efficiet tensionem, uerū in hoc illud ue latus uergentem. Se-
 cundus autem extendit simul, & sursum uersus exteriora trahendo femur, ipsius caput intrò
 in coxendicis ossis acetabulum adigit. Tertius &^x quartus femur quoque modicè sursum
 trahentes, tendunt. Deinde & quartus etiam foras circumagit: tertius autem femur circum-
 uertit paulò magis in posteriora tendens, quàm sursum trahens. At utrique multò infirmius
 motui qui in gyrum fit subministrant, quàm musculi, quibus hoc proprium munus dele-
 gari paulò post audies. Cæterum^v quinti musculi fibræ posteriores, seu musculi illius poste-
 rior pars, rectis donata fibris, crus firmum stabilit, ac terræ affigit, femur extendens. Anterio-
 ris autem partis posterior portio, non minus id ipsum suis fibris præstat, cum modica tamen
 femoris ad interiora adductione. Altiores uerò fibræ, quæ ossis pubis^z cartilagini uicinæ sunt,
 aut potius anterioris musculi partis prior portio, introrsum ducit femur, & fibræ huius por-
 tionis altiores, ita femur ducentes, illud quoque sursum reuellunt, flexionisq; quodammodo
 autores euadunt. Nunc enarratis quinque musculis, flectentes opponuntur, qui illis paucio-
 res sunt, nempe tres tantum proprii, quos sextum, septimum & octauum memoriæ confir-
 mandæ gratia numerabimus. Sextus itaque is est musculus, quem dum dorsum mouentes
 musculos recenserem, atque de lumborum musculis sermo incidisset, Galeni gratia, descripsi,
 quòd is in lumborum musculorum enarratione ab hominum compositione, suis simijs dele-
 ctatus, aberrauerit. Hic igitur musculus ex undecimæ & duodecimæ thoracis, & primæ, &
 secundæ, & tertiæ lumborum uertebrae lateribus, carneo enascitur^b principio, quod si-
 mulatque prodijt, musculum teretem constituit, deorsum oblique uersus exteriora descen-
 dentem. Procurrit enim per interiora ossis ilium semper carnosus permanens,^c quousque ad
 eam ossis pubis^d regionem deuenit, quæ coxendicis ossis nomen assumit. Hic nanque in ua-
 lidum & teretem cessans tendinem, dictam nunc pubis ossis sedem transcendit, & deorsum
 produ-

Quinque pri-
 morum femo-
 ris musculorū
 munus.

Sextus.

Lib. 2 de Ad-
 m. sect.

n ut c ad
 in 8 ta.

o 13 tab. z
 distinguitur
 à s. c. n.
 p inter o et
 c 8 tab.
 q 13 tab. z,
 n, quæ di-
 stinguitur
 in n c z.

r conferin-
 ter se 12 ta.
 z, n, z.

s 9 ta. n.

t 10 ta. z.

u 11 ta. z.

x 11 ta. p.

y 12, 13 ta.
 z, s, n.

z ultimam
 fi. li. i. c.

a 8 ta. o. 4.

c. 5 x. 6 w.

7 t. 13 s. 14

c. 16 K.

b 8 ta. d.

c 8 ta. b.

d 1 fi. ca. 29

lib. 1 T.

e 1, 2 fi. ca. 30 li. 1 d. f 13 td. B. productus, tandem interiori seu minori femoris^c processui^f implantatur, elatiorem processum partem occupans. Musculi huius gratia, ubi pubis ossi expanditur, uelut sinus aliquis insculpitur ligamento ex osse nato obductus, ut simul tutò nec errabundus hanc sexti musculi tendo descenderet, nec intensus laxatus ue ossis duritie uitiaretur. ^g Septimus ex tota interiori ossis ilium^h regione tanquam ex semicirculo quoque carnosam originem accipit, & lato hoc eductus principio, paulatim arctior crassiorq; redditur, deorsum in priora corporis procedens. Ex omnibus enim eius lati principij fibris teres efformatur musculus, qui per altiore ossis coxendicisⁱ regionem uectus, adhuc carnosus ad minorem femoris processum descendit. Vbi uerò processui uicinius appropinquat, in teretem quoque cessat^m tendinem, qui humiliori eius processus parti, prædicto nunc tendini proximus inseritur. Porro quàm hic musculus super coxendicis ossis elatiore deorsum tendit, cavitatem quoque quodammodo & sinum, ne uagabundus feratur, in osse obtinet. ⁿ Octauus musculus oscitanter secantibus femur mouentium^o quinti & maximi totius corporis musculi portio censetur, ex pubis osse carneo amploq; initio in homine enatus. Ex tota enim ossis pubis^p linea, ab anteriori coxendicis ossis acetabuli sede ad osseum pubis usque commissuram extuberante, musculus hic principium ducit, quod ad posteriora admodum oblique descendens, æquè amplum tantisper asseruatur, donec breui, sed amplo, tendine femoris ossi^q inferatur. Fit uerò ipsius insertio e regione parui femoris processus in interius femoris latus, oblique deorsum uersus posteriora tendens. Hic musculus in hominibus liuidum se spectandum offert, at non æquè, atque in caudatis simijs, quibus musculus iste minor & non similiter lato principio enatus conspicitur. ^r Tribus his musculis Natura ut simul femur flecterent, & introrsum uersus alterum crus ad mouerent, commisit. Sextus enim, quem flectentium primum recensuimus, sursum ualide femur attrahit flectitq; ad interiora id adigens. Septimus similiter femur sursum attollendo flectit, & paulò insignius sexto, uersus interiora, admouet. Octauus modicè sursum femur contrahit, infirmæq; flexionis autor censetur, uerum adhuc magis septimo introrsum uellit. Ita profectò ut flectentes & extendentes musculos, duobus quoque reliquis ad interiora exterioraq; motibus, Natura præfecerit. Porro tribus flectentibus, ^s musculus quem inter tibiæ motores nonnum enumerauimus, aliquid auxiliij suppeditare creditur. Non enim adeò absonum est, & hunc secundariò quum tibiæ extendit, ad femoris flexionem accommodare, quum ex coxendicis ossis^t tuberculo quopiam enatus, rectà deorsum in priorem tibiæ partem excurrit. Verum quemadmodum hunc femoris flexioni opem ferre arbitramur, omnes etiam reliquos tibiæ mouentes, qui ex coxendicis, aut pubis, aut ilium osse in tibiæ procurrunt secundariò femoris motuum opifices esse, meritò (quamuis non ita rectè) assereremus. Cæterum duo adhuc supersunt musculi femur contorquentes, quos in præsentis sermone nonnum ac decimum numerabimus. ^u Nonus itaque liuidus, & ut cæteri huius articuli, carnosus uisitur, & transuersim in exteriora protensus, totum pubis ossis^x foramen exterius contegit. Deinde per exteriorem^y ceruicis femoris sedem productus, ualido satis & utcunque amplo tendine, insertionem molitur, in magni femoris processus^z sinum, qui femoris ceruicem & caput ossis coxendicis acetabulum subintrans, è directo respicit. ^a Decimus internam dicti nuper foraminis sedem occupat, nono longè ualidior, & ob Naturæ artificium accuratè perpendicularis. Huius nanque principium exoritur à tota^b linea, quæ ab interna ilium ossis sede, qua primi ossis sacri ossis transuerso processui committitur, per internam coxendicis ossis & pubis regionem, ad pubis usque osseum commissuræ elatiorem partem protenditur. Latum hoc decimi musculi principium, quod ueluti tribus lineis seu inscriptionibus insignitur, similiter ut reliquorum ferè præsentis articuli musculorum capita, carnosum est, & totam internam ossis pubis & ossis coxendicis sedem occupans, liuidumq; apparens, sensim adeò^c arctatur, ut eius amplitudo coxendicis ossis^d interuallum non uincat, quod inter acutum ipsius processum, & posteriorem sui appendicis sedem habetur. Ad hoc enim interuallum, quod amplum sinum sibi insculptum gerit, decimus musculus^e reflectitur extrorsum, magnum femoris accedens processum. Atque hunc sanè reflexum magna Conditoris industria musculus molitur. quàm enim musculus ad^f sinum hunc circumuoluitur, externa parte carnosus est, ea autem parte qua sinum tangit, omnino neruosus conspicitur, & ueluti^g tres teretes com-
 monstrat tendines, serie quadam ad sinum reflexos. Tendines hi lati in musculi substantia incipiunt paulò anteaquam musculus sinum contingat, sed quàm sinui obuoluuntur strictiores euadunt, singuli rursus in magno hoc sinu peculiarem sinum sibi uendicantes. Amplius enim sinus duos leuiter extuberantes ostendit lineas, quæ transuersim ductæ magnum sinum
 f 3 ueluti

Septimus.

Octauus.

Sexti, 7, &
8 unus.

Nonus.

Decimus.

ueluti in tres partiuntur, tribus eius musculi tendinibus cælatos. Tendines ubi sinum superarunt, inuicem collecti in unum finiunt tendinem,^h sinui magni femoris processus unà cum nono musculo implantatum. Quum itaq; tres hos tendines, qui exteriori parte carnem obnatam habent, intueberis, facile colliges hîc Naturam decimo musculo robur additum uoluisse: ne si carneus omnino esset, in reflexu & motu, ossis duritia compressus laceraretur. Quin etiam sinui ligamentum, seu crassa ualidaq; membrana obnascitur, ne ossis contactus musculum in reflexu uitaret. Ad hæc, ligamentum id læue admodum, & uiscido unctuosq; humore oblitum est, quo facilior musculi ad sinum efficeretur circumactus: quod Naturæ artificium in rotulis & cardinibus sedulo imitatur, non solum motum accelerantes, uerum ut seriùs, qui reflectitur funis, attritu corrumpatur studentes. Præterea ut solo rotulæ sinui funem non committimus, sed rotulam in trochleo aut furcula (ne ex sinu funis labatur) firmamus, ita quoque Natura ossium sinu non contenta, à superiori sinus parteⁱ unum, & ab inferiori alterum eduxit musculum, qui ambo unà cum decimo porrecti, illum quo minus sua sede declinaret, asservant. Ab acuto enim coxendicis ossis^k processu, carneus enascitur musculus, superiori parti decimi musculi ad ipsius usque insertionem adnatus. Deinde ab appendice quoque ossis coxendicis alius similiter carnosus & gracilis prodit, inferiori decimi musculi sedi ad insertionem exporrectus. Vterque enim in sinum magni femoris processus insertionem cum decimo molitur, & cum ipso circumductui femoris subministrat. Cæterum subinde non solum eiusmodi musculos ad elatiorem & humiliorem reflexus sedem pronasci conspicias, imò etiam ab interna regione, ubi iam flexus nō amplius obliquatus ad femur ducitur, carnosam substantiam à coxendicis osse nasci obseruaturus es, quasi tres illi tendines in carneam à coxendicis osse pronatam substantiam, post flexum immitterentur, itaq; inuoluti ad magnum femoris processum contenderent. In tuo igitur est arbitratu, aut hos musculos, aut carneam molem tendines excipientem decimo iungere, atque ita proprios femoris musculos decem enumerare: aut si mauis, utrunque distingues, & duodecim recensebis. Rursus si quintum musculum in tres diuideris, omnes erunt quatuordecim. In nostro itaque numero decimus unà cum duobus illis gracilibus femur in posteriora circumagat, nonus uerò in anteriora, nihilò secus quàm si baculum inter duas manus extensas repositum, alternatim in priora & posteriora ductis manibus circumuerteres. Nonus enim & decimus manibus respondent, baculo autem femur non ineptè assimilaueris.

*Carneæ por-
tiones decimo
musculo atten-
sa.*

*Quot femur
mouentes mu-
sculi possint
constitui.*

*i unus u. ta.
1.12 β. 13 X.
14. f. alter
earundem
ta. n. p. 2. g.
h 2 fi. ca. 29
li. 1 d.*

l 13 ta. y.

MUSCULORVM FEMVR MOVENTIVM administratio. Caput LVII.



*Primi muscu-
li administratio.*

P R V M qui femoris motibus præsumt musculorum administratio-
nem, ab extendentibus meritò in illo crure, in quo tibiæ motores ag-
gressus es, exordieris. Assumpta itaque ex minus fragili ferro nouacula,
quæ ossis impetum aliquando sustinere possit,^a primi musculi caput (si
modò dum mouentes tibiæ musculos dissecares, illud non abstuleris)
ab osse coccyge & ilium ossis dorso, transuersis sectionibus niteris abra-
dere, quousque in secundum musculum incidas. Quando autem uni-
uersi musculi principium ab osse derasum erit, licebit hoc reflectere, & solis manibus (nisi no-
uacula quoque uti uoles) à subditis partibus ad magnum usque femoris processum liberare.
Quod ubi præstiteris, ipsius longam intueberis^b insertionem, procul etiam sub magni femo-
ris processus radice descendente. Hæc enim non uulgariter uenit perpendenda, uti neque
huius musculi forma, substantia, fibrarū ductus, & munus, uel abscessuum duntaxat nomine,
quos crebro in ipso & præcipue iuxta magnū processum in illis tendine incidimus.^c Secun-
dus dein pariter ab ilium osse nouacula dirimendus est, mente adhibita, ne tertij quoque prin-
cipium unà adimatur. exortus enim cōtinuitas, quæ linea duntaxat interstingitur, utrunque
musculum unà facile auferri sinit. Vbi itaq; sensim reflexo secundi musculi initio, & transuersis
semper secundum ilium ossis dorsum factis sectionibus, ad tertij musculi principium deuenieris,
secundus iam totus uenit reflectendus, & manibus attractus, ad insertionem usq; à tertio diuel-
lendus.^d Tertius quoq; eadem ratione ab ossis ilium dorso, post secundum abradetur: atq; hoc
ad ipsius etiam insertionem deducto, quartus ab ossis sacri lateribus cultello auferetur, & mani-
bus apprehensus, ad magnum usq; femoris processum à ligamento cui innititur, & coxendicis
articulo dirimetur. Facillima enim horum, postquam primum administraueris, est aggressio,
qua

a 9 ta. n.

*b tota. n. ita
sinistro crura
re.*

c tota. z.

d ut a. z.

e 12, 13 tab. 2, 3, 7. qua obita, licebit singulorum motibus examinatis, omnes quatuor abijcere. Quintum post hos muscolum à coxendicis ossis infima sede, & pubis ossè acutiori nouacula simul totum cal- lidè abrades, & ad suam in femur insertionem illum perducens, eam accuratè obseruato, non neglectis ipsius inscriptionibus, seu delineamentis, fibrarumq; ductus differentia. Animum etiam dum hunc præscindis accommoda, ne simul quoque octauum muscolum, tanquam quinti partem incautus auferas. Quinto itaque à femore rescisso, acutiori cultello à lateribus corporum undecimæ & duodecimæ thoracis uertebrarum, & trium primarum lumborum, s sexti musculi caput uenit liberandum, & capite eius apprehenso, totus musculus ad paruum usque femoris processum, à subditis est dirimendus. quod si uoles, solius manus ope, perfeceris. Nisi fortè & hunc muscolum, quum dorsum mouentes administrares, iamdudum inspexeris. Postquam uerò ipsius tendinem, & quo super pubis os ferturⁿ sinum indagaueris, septimus opportunè aggredietur. Hunc itaque nouacula transuersis ductis sectionibus, ab interna ossis ilium sede ad coxendicis usque os quà descendit erades, & musculo manibus eleuato, ad mi- norem usque femoris processum, ipsius insertionem consideraturus, detrahes: non præterita interim sinus sui, quo deducitur, inspectione. Mox^k octauum transuersa linea à pubis ossè abscutum usque ad insertionem, quæ similiter suo principio lata est, diuelles: obseruans inte- rea, ne nonum quoque imprudens adimas. Duo qui adhuc supersunt musculi, quoniam pubis ossa dum uesicæ & sedis spectares musculos, dirempta sunt, atque iam unum tantum crus, in quo tibiam mouentes musculi administrabas, ad manum habes, facile secabuntur. No- num itaque &^m decimum à pubis ossè & coxendicis abrades, & ipsorum connexum & in ma- ioris femoris processus sinum, ac implantationē examinabis, nequaquam perfunctoriè præte- riens decimi reflexum, & quæ ad huius latera undiq; nascitur, musculosam substantiam cum decimo musculo ad insertionem usque exporrectam. Hæc enim citra corporis nostri Opificis solertiæ laudem hymnumq; nunquam prætergredieris. Quum hos femur circumuertentes refeceris, membrana se spectandam offert, totum pubis ossis foramen comprehendens, & hoc loco sibi utrinque incumbentes musculos dirimens. Similiter etiam ab acuto coxendicis ossis processu, in quinti sacri ossis latus^p durum ligamentum produci contueberis, cui^q quar- tus femur mouentium musculus innitebatur, quodq; hæc ossa firmius committit. Deinde aliud iamdudum sese obtulit ab eodem sacri ossis latere, cui nuper dictum inferitur, enatum, atq; in posteriorem, illicq; elatiorem coxendicis ossis appendicis^s sedem insertum, quod recti inte- stini, ut & mox in enarratione præcedens, musculorum firmamentum efficitur. Articuli ue- rò coxendicis ligamenta, unà cum genu articuli, & pedis ligamentis in unū Caput reijciam, pe- dis & digitorum ipsius musculorum sermoni subnectendum.

Quinti.

Sexti.

Septimi.

Octau.

Noni & de-
cimi.Quorundam
ligamentorum
inspectio.

DE LATESCENTE TENDINE, CVTI plantæ subnato. Caput LVIII.



MNES quos hætenus non commemorauimus musculi, in tibia & pede reponuntur pedis, ipsiusq; digitorum motibus famulantes. Quo autem & hi aptius pertractentur, primū pedis motores recensebimus, & dein de qui digitorum duces existunt, ut tunc postmodum quot quaque sede sint, unà colligentes, eorundem administrationem subnectamus. Verū quanto Galeni oratio in secundo de Administrandis sectionibus obscu- rior imperfectiorq; est, & non undiq; suis in tertio de Partium usu placitis respondet, tanto eiusmodi musculorum diligentior nobis sermo instituendus uenit. Ne- que profectò cum Galeno arbitrari conuenit, simiam ab homine duntaxat in pedis digitorum diductu differre, quòd scilicet simia longiores, & magis discretos digitos quàm homines adi- piscatur. Imò musculis magna sanè est differentia: quam si non omnem, ne prolixior fiam, expli- cuero, prout orationis tamen ordo requireret, quæ mihi animo obuersabitur, lubens enarra- turus sum: sedulò studiosos hîc admonens, ut non solum uera hominis musculorum enarra- tione & inspectione contenti, simiam quoque aggrediantur, quo Galenum (qui nusquam æ- què ac in Anatome arduus est) foelicius intelligant, ne quum hunc (uti profectò debemus om- nes) profiteri instituerint, suos præceptores imitati, elegantissimam, maximamq; ipsius libro- rum copiam, qui Anatomica complectuntur, negligant: & solū illis quæ quiuis mediocri- ter in liberalibus studijs eruditus citra omnem præceptoris operam assequitur, sese totos de- dant: memores, quàm turpiter in leuibus Galeni operibus pedem, qui sese Galenicos hodie ap-

Ordo in reli-
quorum adhuc
musculorum
tractatione ob-
seruandus.Magna si-
miae ad homi-
nem differen-
tia.

*Simia ab ho-
mine in tendi-
ne pedi subna-
to differentia.*

pellitant, retrahere cogantur, quoties in sectionis & corporis partium mentionem Galenus incidit. incidit autem creberrimè, tum quòd dissectionibus mirificè oblectabatur, tum quòd medico in corporis quod sibi curandum proponit, mentionem subinde sit prorumpendum. At age^a tendinem plantæ cuti subtensum aggrediamur, in quo in primis homo à simia insigniter differt. Hæc nanque proprium qui hunc producat tendinem exigit musculus, ab externi femoris capitis radice in posteriori sede carnosio principio enatum, & sub^b duobus musculis occultatum, qui ab inferioribus femoris capitibus enati, prominentem in sura partem efformare, atque in calcis os inferi dicentur. His itaque musculis is simiæ musculus coopertus deorsum carnosus fertur, illi forma perquam similis, qui latum in manu producit tendinem. Postquam uerò ad mediam usque longitudinis tibiæ descendit, in gracilem cessat tendinem, qui duobus illis musculis non amplius obrectus, ad horum tendinis, quem ipsi producant, internum latus porrigitur, declivis ad posteriorem calcis sedem descendens, quæ priuatim in caudatis simiis, ut & canibus, sinum sibi exsculptum gerit, quo hic tendo non errabundo ductu, tutò uehitur: calcis ossi interim, nisi fortassis transuersi alicuius quo obducitur ligamenti interuentu, non adnatus: atq; in hoc à Galeni descriptione in primo de Administrandis sectionibus libro uarians, quòd in duas non diffcindatur partes, altera quidem calcis insertus, altera uerò in latum tendinè explicatus. Calcem enim totus superat, & in pedis plantam dilatescit, musculo quem secundum quatuor digitorum articulos flectere audies, obnatus, atque manifestius in inferiorem quinque pedis digitorum sedem protensus, quàm latus manus tendo digitos accedit. Deinde ut latus tendo manus cuti citra alicuius corporis medium non obnascitur: ita neque in pede, quando quidem multus adeps tendinem & cutem intercedit, id que potissimum in hominibus, quibus nullus omnino musculus latum tendinem educit. Verum ab infima calcis parte, qua terræ innititur, ualidum ligamentum prodit, totam inferiorem pedis amplitudinem subiens, si unum utrinque musculus exceperis, cui id non obducitur. In interno quidem pedis latere is musculus est, qui pollicem à cæteris abducere dicitur. in externo autem, qui minimum digitorum à cæteris amouet. Obnascitur itaque hoc ligamentum longè manus tendine crassius, & robustius, toti inferiori sedi eius musculi, quem secundos quatuor digitorum articulos flectere docebimus, atque id eo fit pacto, ut quis propriam eius musculi membranam hoc ligamentum diceret, nisi iuxta digitorum radices, quæ eius musculi tendines transuersum digitorum ligamentum subeunt, id abscederet. & dein transuersis digitorum ligamentis obductum, ac in quinque partes discretum, inferiori quinque digitorum sedi obnasceretur. Cæterum uti paulo antè monuimus, plurima duriusculi adipis copia ligamentum id (aut utcunque appellare tibi uisum sit) & cutem intercedit, quanquam interim fibrosis nexibus admodum frequentibus ipsi committatur. Eiusmodi itaque ligamentum priuatim homines tendinis lati uice exigunt: quod si fortè ab aliquo ducendum fuisset tendine, profectò illum ualidum crassumq; admodum procreari oportuisset. Nam si manus tendinem cum hoc corpore ligamentoso contuleris, quadrupla tendinis per cubitum exporrecti crassities, in tibia neutiquam suffecerit. Nihilominus tamen in hominis tibiæ posteriori sede musculus reponi audies, qui carnosio principio ab exteriori femoris capite enatus, & carnosus priusquam bene poplitem superauit esse desinens, tendinem producit, longè illo qui manus latum tendinem educit, graciliorem. Verum hic tendo pedis plantam hætenus mihi neutiquam subire uisus est, at interno calcis lateri ad posteriorem ipsius sedem implantatur, neutiquam summè posticam calcis sedem, ut ille caudatarum simiarum musculi tendo, attingens, multoq; adhuc minus sinum in hac calcis ossis sede sibi uendicans, quo non errabundus uehatur. Quòd uerò mihi commemoratum in hominis pede ligamentum, & simiæ latus tendo, parem usum cum lato qui manum subit tendine præstent, conformationis similitudo argumento est, atque id eo adhuc firmiter persuadet, lati in manu tendinis non infrequens defectus. Haud semel enim illum in manu deesse, & transuersum in interna brachialis sede repositum ligamentum sui portionem porrigere, quæ tendinis lati uicem supplebat, in homine secus multo quàm in simiis comperi. Vti etiam à tendinibus brachiale flectentibus, eum tendinem produci interdum obseruatum est, nunc ab illo qui quarto brachialis ossi insertus brachialis flexus autor est, nunc ab illo qui per transuersum

brachialis internæ sedis ligamentum ductus, postbrachialis ossi indicem
suffulcianti multo antè inferi dicebatur.

d 13 tab. w.
14 f.

b 12 tab. q.
r.

c 3 ta. n.

d 14 ta. o.

e 13 tab. w.
14 f.

f 13 ta. p.
g 13 ta. s.
h 14 ta. o.

i 13 ta. q.

k 4 ta. l.

l 3 ta. a, m.



UNIVERSUM pedem perinde ac extremam manum flectimus, & exten-
dimus, & deinde in latera (quamuis interim obscurissime) ducimus, idq;
plurimum & diligentissime ob crebra quæ ipsis contingunt uulnera distor-
tionesq; obseruandorum musculorum beneficio. Qui uerò articuli his
motibus subministrant, in pedis ossium enarratione, superiori libro non
obiter percurramus, hîc autem pedem mouentium musculorum nume-
rus à posteriorē tibiæ sedem occupantibus, opportunè inchoabitur. ^m Pri-
mus itaque à radice interni femoris ⁿ capitis unico enascitur principio, si modò ipsius continui-
tatem spectes. si autem substantiæ animū attenderis, id principium duplex apparebit. ^o unum
quidem superius, & magis iuxta femoris medium interius: ^p alterum uerò inferius, & nonni-
hil exterius, pari omnino modo, quo rectum abdominis musculus ^q enasci retulimus. Supe-
rior nanque principij huius musculi pars carnea lataq; est, & deorsum protensa, paulo sub ge-
nu articulo cum reliqua initij parte confunditur, quæ exactè neruea liuidaq; in exortu erat, &
deorsum rectà per genu articuli posteriora descendens, ualde carneum crassumq; efformat mu-
sculum, qui formam exacti (ut sic dicam) musculi refert. ^r Priusquam uerò musculus iste ad me-
dium tibiæ longitudinis iam angustior redditus pertingat, carnosus esse desinit, & ex suæ infe-
rioris partis amplitudine tendinem latum educit, in cuius medium aliquandiu adhuc carnosus
musculi pars porrigitur. Atque hic musculus in interno latere posterioris tibiæ sedis ducitur:
in externo autem latere ^s secundus musculus consistit, qui similiter ac primus ab externo femo-
ris capite enatus, deorsum fertur, omni ex parte primo musculo similis. Quum uerò utrique à
femoris capitibus deorsum tendunt, non procul ab exortu sese ^t contingunt, inuicem fibrosis
nexibus herentes. At quo magis deorsum prorepunt, eo ualidiùs connascuntur, ut iam tendo,
quem singuli producant, ^u unus omnino sit, ab utrisq; enatus musculis. Interior tamen, seu pri-
mus musculus nonnihil diutius carneus, quàm secundus, deorsum ducitur, quod in musculo-
sis citra confectionem est euidentissimum. Duo enim in sura prominentes musculorū uentres,
carneæ partes sunt præsentium musculorum, suræ magnam molem efformantium. Tendo au-
tem ab ambobus musculis enatus, & paulò angustior redditus, in caudatis simijs in postero-
rem calcis sedem ualidissime inseritur. In hominibus uerò non multo sub carnosus musculo-
rum sede, subiecto cuidam ^x musculo ^y adnascitur, quem quartum inter pedis motores recen-
sebitur. Atque hic connexus adeò est pertinax, ut nulla ratione hunc tendinem ad calcem
usque à subiecto musculo dirimere queas, & asserere cogaris, ab hoc tendine & quarti muscu-
li tendine, ^z unum efformari in posteriorem calcis sedem insertum. Ac proinde etiam Galeno
succensebis, dum alios sectionis professores falso increpat, quòd duorum primorum musculo-
rum tendines tertio cuidam tendini commisceri, neque alteri non connexos in calcem inseri
scripserint. Hoc nanque uerè de hominibus illi prodiderunt, parum solliciti, num tendines se-
cus in simijs calci implantarentur. ^a Tertius musculus ille est, quem superiori Capite tendi-
nem insigniter gracilem producere diximus. Ab externo enim femoris propter genu articu-
lum capite teres enascitur principium, iamiam in ipso exortu carneum & gracile. Ab ortu ta-
men non ita procul dilatescit, exacti musculi uentrem utcunque crassiusculum referens: uerùm
mox sub poplite uenter iste ^b gracilescens, summè gracilem tenuemque educit tendinem, qui
quemadmodum & musculi uenter, sub duobus nuper commemoratis musculis occultatus,
& super quartum expansus, sensim oblique deorsum prorepat, quousque ad internum duo-
rum primorum musculorum tendinis latus ^c elabatur, ubi is quarto musculo ualidissime con-
necti incipit. Tertij musculi tendo hinc deorsum ad internum usque calcis latus fertur, iux-
ta posteriorem calcis sedem ipsi implantatus, non autem pedis plantam subiens, illius mu-
sculi modo, quem in simia latum plantæ tendinem educere prius recensui. ^d Quartus non
solum suram constituentium musculorum, uerùm etiam omnium tibiæ amplexantium ma-
ximis, posteriorem tibiæ regionem sua amplitudine occupat. ^e Enascitur enim ex posteriori se-
de ^f coarticulationis fibulæ ad tibiæ, nerueo & ualido initio, quod deorsum modice ductum
adeò dilatescit, ut latitudinem tibiæ ossis & fibulæ uincat. non tamen æquè crassus est, ac latus
ampliusue. Ex hac uerò amplitudine priusquam medium tibiæ longitudinis superauit, sen-
sim arctatur, & paulo supra calcis regionem in ualidissimum & crassum degenerat tendinem,
non solum ab ipso ^g formatum, sed etiam à primi & secundi musculi tendinis concursu.
Ex tribus itaque his musculis procreatus tendo, uniuersæ posteriori calcis ^h sedi implantatur,
quam

Pedis motus.

Primus pedis
mouentium

Secundus.

Lib. 2 de Ad-
mir. secti.

Tertius.

Quartus.

m 12 td. d.
1 d. 2 u. 3 p. 8
p. 9 u. 13 r.
14 n. 16 d.
n 1 fi. ca. 30
lib. 1 E.
o 12 tab. w.
p 12 tab. p.
q 5 td. n. o.

r 12 td. c.

s 12 td. y. 1
n. 2 u. 4 ch. 1
r. 16. 16. 6
tab. ch. 9.
9 td. f. 13 r.
14 o. 16 b.
t 12 td. r.
u 12 td. v.

x 13 td. y.
y 13 td. ad
n.

z 13 tab. a.
aut 8 r. ad f.

a 13 td. p. 1
td. 1. 2 v. 3 r.
8 f. 9 u. 12 u.
14 n. 16 c.

b 13 td. f.

c 2 tabu. v.
16 c.

d 13 td. y. 1
td. x. 2 f. 3 s.
8 td. t. 14 q.
e 13 td. d.
f 2 fi. ca. 31
li. 1 V.
g 13 tabule
a constitui
tur à 7, r, et
r.
h 8 fi. ca. 33
lib. 1 c.

quam Natura, quo facilior promptiorque tendinis perficeretur insertio, depressam asperamque efflinxit. Cæterum quia calcis os extra tibiæ ossis rectitudinē¹ prominēt, & ipse quartus musculus propemodum toto progressu tibiæ ossi & fibulæ incumbit, paulò ante insertionem² tendo à tibiæ osse procul abscedit triangulam efformans cauitatem, cuius basis est longitudo calcis extra tibiæ ossis rectitudinem prominentis: alia autem duo cauitatis latera constituuntur, unum quidem tendinis ipsius anteriori sede, alterum uerò posteriori regione illorum³ musculorum, qui sub quarto reconditi, posteriorem tibiæ regionem occupare dicuntur. Atque hæc ea demum est cauitas, cui Homerus Achillem in Hectoris crure funem traicisse, illumque ad currum religatum, circum moenia Troiæ traxisse cecinit. Quod etiā lanios, quum boues aut oues iugulatas attollunt, imitari conspiciamus, baculum transuersim sub hoc tendine transmittentes. Porro quartus musculus externa sede, qua primi duo illi incumbunt, admodum liuidus est: quemadmodum & primus quoque & secundus, ea potissimum parte qua quartum respiciunt musculum. Interna uerò sede quartus non admodum liuet, & ipsius etiam tendo in anteriori sede longius carniformi substantia enutritur, quam in posteriori. Non enim à fine carniformis musculi huius substantiæ, ad calcem usque insigne interuallum in hominibus uisitur: quamuis & id quoque notatu dignum sit. In simijs uerò etiam quartus hic musculus quodammodo carneus calci inseritur: quod Galenus animaduertens, alios Anatomicos insinuat, quos hominum cadauera, non autem cum ipso duntaxat simiarum, sedulo secuisse, uel ex ijs constat quæ præter meritum illis à Galeno imponuntur, digno sanè qui interdum (nisi ipsius obstaret autoritas, & quam illi tribuimus fides) à nobis notaretur, cuiusque etiam errata enumerarentur: idque tunc potissimum, dum pro hominum Anatome suarum simiarum historiam, secus ac ueteres illi, nobis obtrudit.

Quintus. Quintus pedem mouentium musculus in posteriori etiam tibiæ sede locatus, sub⁴ duobus musculis adhuc occultatur, quos digitorum pedis flexui famulari docebimus. Priusquam enim quintus in conspectum ueniat, quatuor commemoratos iam pedis musculos, pariter cum duobus illis digitorum flexui subseruientibus ademptos esse conuenit. Quintus nanque⁵ ligamento membraneo proximè incumbit, quod in tota tibiæ longitudine porrectum, tibiæ ossi fibulam colligat.⁶ Principium siquidem quinti musculi à tibiæ osse, & fibula, quæ hæc ossa inuicem dehiscere incipiunt, exoritur, & statim ab exortu carneum latumque uisitur, eadem prorsus latitudine ad inferiorem usque tibiæ ossis appendicem progrediens. Hac latitudine præsens musculus posteriorem illius membranei ligamenti sedem & magnam quoque tibiæ ossis posterioris regionis partem integit, ligamento interim, & interno fibulæ lateri adnatus, ab ipsisque toto progressu, exortus sui robur asciscens.⁷ Cæterum ilico atque inferiorem tibiæ ossis contigit appendicem, & propemodum æquè latus adhuc atque in media tibiæ sede conspicitur, ab interno ipsius latere teretem profert tendinem, qui iam aliquousque in musculi carniformi substantia incipere uidebatur. Vbi igitur tendo prorsus excarnis est, deorsum fertur,⁸ sinui incumbens in posteriori sede appendicis tibiæ processus, qui interiorem malleolum constituit, exculpto. In hoc sinu transuersum ligamentum⁹ tendini obducitur, hinc oblique pedis inferiora subeunt. Sub omnibus enim¹⁰ musculis inferiorem pedis sedem occupantibus, præsens tendo tantisper prorepit, dum in inferiorem¹¹ tarfi ossis sedem ualide inferatur, quod cubum tesseramue imitanti ossi proximum est, quodque cum alio sibi commissio cunei formam appositissimè exprimere, præsentisque musculi gratia priuato¹² processu donari, in primo libro diximus. Est itaque quintus musculus ex¹³ illorum albo, qui sua carniformi substantia non arctati, ex altero tantum latere tendinem teretem emittunt, ac maximæ laniorum securis imaginem præ se ferunt. Quinetiam unus quoque eorum est, qui peculiari sinu ligamentoque transuerso utuntur. Inter calcem enim interioremque malleolum tria peculiaria huius generis ligamenta, &¹⁴ sinus tres consistunt, tribus tendinibus parata. Quod autem ligamentum ex tribus malleolo proximum est, quinti pedis musculi tendini, quemadmodum etiam paulo ante diximus, proprium censetur. Reliqua autem duo illis creata sunt¹⁵ musculis, qui quinto superstrati extrema digitorum internodia flectere cōmemorabuntur.

Sextus. Sextus pedem mouentium musculus in anteriori tibiæ sede locatur, omnium huius regionis anterior, & exacti musculi formam representans.¹⁶ Enascitur autem ab anteriori sede coarticulationis fibulæ cum tibiæ osse, ab utrisque ossibus, & communi illorum¹⁷ ligamento exortus sui portionem assumens. Exortus iste acuto incipit angulo, qui ilico dilatatus musculi uentrem ostendit nonnihil latiore quam profundiore. Priusquam uerò medium longitudinis tibiæ superat, sensim arctatur, & multò supra pedem, in teretem finit¹⁸ tendinem, qui deorsum per tibiæ ossis anteriora prorepens, in transuersum¹⁹ ligamentum à tibiæ osse in fibulam pronatum subit, & simulatque transuersum id ligamentum superauit, deorsum in pedis interiora descendens, modicè patenti sinu in tarfi

i Obserua
id in 2 & 3
ultimarum
fi. lib. 1.
h 13 tab. x.
l 14 ta. A.
E.

m 15 ta. D.
E, dein c. 1
u. 2 p. 3 p. 8
x. 14 n.
16 f.
n 14 ta. A.
E.
o 14 ta. n.
o, p, q.
p 15 ta. T in
ter S, R.
q 15 ta. D.
r 15 ta. E.

s 2, 4 fi. ca.
31 li. 1 m. &
15 chara. 1.
t 16 ta. d.
u 13 tab. p.
dein 14 o
& 2, 4, ac
tendines d,
o, & 15 tab.
L.

x 1, 2, 12, 13
fi. ca. 33 li. 2
chara. 3.
y 13 fi. cap.
33 lib. 1 d.
a 14 ta. A.
E. 15 O, P.
b 15 ta. cha.

1, 2, 3.
c 14 ta. A.
E.
d 3 tab. r. 1
x. 2 p. 4 ta.
chara. 4
t. 16 ta. g.
e 3 ta. d.
f fi. 1 ca. Y.
g 3 ta. n.
h 1 tab. A. 2
ta. A. aut A.

i 1 fi. ca. 33 tarſi offiumⁱ cum offe cymbam referente ligamentiſſo, tantisper uehitur, quouſque ad
lib. 1 cha. 1. internum latus pediſſi offiſſi pertingat, quod pollicis præponitur. Illius enim offiſſi peculiari^k pro-
2, 3 cum o. ceſſui^l inferitur, ualida ſanè applantatione offiſſi pediſſi cum tarſi commiſſuram apprehendens.
h 2 fi. ca. 33 Sexti itaq; muſculi anteriori ſedi alius nullus obtenditur: poſteriori autem ſede illis incumbit
lib. 1 w. muſculis, qui ſub eodem tranſuerſo tibiæ^m ligamento contineri dicentur, & qui præcipuè di-
l 15 ta. K. gitorum extensionibus famulantur. Verùm ſextus muſculus ſuo interiori latere committitur
m 4 ta. r, lateri externo acutæ tibiæ offiſſi^o lineæ, quæ excarnis tibiæ ſedis externum latus conſtituit, quæ
cha. 14. etiam ſecundùm ſexti muſculi latus introrſum obliquatur, tum ut huic cedat muſculo, tum ut
n 1 ta. d. alijs quoq; ſedes exhibeatur, qui ſub ſexto reponi cōmemorabuntur. Externum uerò ſexti mu-
o 1, 3 fi. ca. ſculi latus in ipſo ortu, & toto quo dilateſcit progreſſu cōmittitur muſculo, quem iam deſcri-
31 li. 1 77. pturus pedem mouentium^p ſeptimum appellabo, qui quemadmodum &^q octauus ſermoni
p 6 tab. 9. 1 addendus à fibula principium ducit, totiuſq; fibulæ externo ferè lateri adtēditur, adeò ut neq;
ſ. 2 x. 3 a. inter tibiæ muſculos anteriores, neque poſteriores recenſeri deberet, ſed priuatim in externo
4 ta. cha. tibiæ latere reponi, aptè diceretur. Quanquam non ita multum interſit, ad quam ſedem is refe-
17. 5 ta. cha. ratur, dummodo ipſius ſitum, formam, munus, & id genus reliqua, quæ in muſculis ſpectare
*8. 8 ta. * 9* conſueuimus, non oſcitanter prætereātur. Septimus itaq; muſculus nerueum ualidumq;^r prin-
ta. x. 14 h. 15 cipium ab^s externo appendicis fibulæ latere, & ligamentiſſi oſſa hīc cōnectentibus aſſumit, inibi
v. quā^t quartum tibiā mouentium muſculum inſertionem moliri diximus. Principium id non
q 6 ta. r. longo progreſſu fibulæ connatum, ab ipſa abſcedit, ſibi ſubſtratum obtinens^u caput muſculi,
r 6 ta. cha. pedem mouentium octauū. Quum igitur ſeptimus muſculus à fibula abſcedit, externa ipſius
raſt. 2. ſede liuidus ſemper apparet: interna autem, qua alijs accumbit muſculis, rubicundus, & exactè
ſ 1 fi. ca. 31 carneus uiſitur. Non enim ita multò ab origine carneus factus dilateſcit, exacti muſculi, ſeu, ut
lib. 1 C. ita loquar, muris ſpeciem exprimens. Ad hunc modum carnoſus paulò ultra medium longi-
t 6 ta. x. tudiniſſi fibulæ rectā decliuſ fertur, in exteriori ipſius ſede non exquisitè carneus. Quandoqui-
u 6 tab. r. dem hīc muſculus iſtud ſibi priuatim uendicat, quòd in externa ipſius ſede etiam ſupra mediū
x 6 ta. cha. longitudiniſſi tibiæ^x utrinque ad latera carneus ſit, uerùm inter duo illa latera ualidiſſimum
raſt. 3. 4. tendinē cōmonſtrat interna ſede, & à lateribus carne enutritum. Vbi uerò muſculus digno
y 6 ta. cha. notatu interuallo medium longitudiniſſi fibulæ ſuperauit, totus excarnis efficitur, teretem pro-
raſt. 5. creans tendinē, qui ſenſim obliquè retrorſum uerſus fibulæ poſteriora cōtendit. Non enim
z 6 ta. w. amplius totum externum fibulæ latus integit, ſed muſculi tendo iam in poſteriora reflexus,
a 6 fi. ca. 31 externum malleolum excarnem nudumq; relinquit. Tendo enim poſterioreſſi inferioriſſi fibu-
lib. 1 q. q. læ appendicis^a ſedem adit, hīc ſinum proprium & tranſuerſum quoq;^b ligamentū obtinens.
b 2 ta. 2. Tendo itaq; hoc ligamento inuolutus, quod à fibula in calcem talumq; procedit, deorſum in
c 2 fi. ca. 33 priora uerſus pediſſi plantam ducitur, adeò ſanè inflexus, ut in radicem pediſſi offiſſi inferatur,
li. 1 w. quod pollicis præiacet, quodq; in externo ipſius latere^c proceſſum obtinet, cui ſeptimi huius
d 1 fi. ca. 33 muſculi tendo aptè implantetur. Aliquando tamen non in hoc pediſſi os ſeptimus muſculus in-
lib. 1 III. fertionem moliri uiſus eſt, at in radicem pediſſi^d offiſſi medium digitum ſuffulcientiſſi. Cæterū
e oſtendit Natura non obiter neque negligenter obliquum huius tendiniſſi ductum molitur, ſed tendi-
hæc ſinistra nem pediſſi inferiora ſubeuntem inter oſſa & muſculos pediſſi inferiora occupantes, medium
figura 15 ta deduxit, ne ſi fortè inter cutem & muſculos illum duxiſſet, tendo ipſe ſurſum contractus, mu-
buæ ad X, ſculos in planta locatos cōprimeret, & quo minus ſuo poſſent fungi munere, obſtaculo eſſet.
y. Cæterum quum non ſolum ad poſterioreſſi ſedem exterioriſſi malleoli tendinē hunc reflecti
f 1, 2, 12, 13 oportuerit, ſed etiā ad aliud quoddam in externo pediſſi latere locatum^f os, Natura incredibili
fi. ca. 33 li. 1 artificio huic etiam reflexui prouidit. In inferiori enim ſede offiſſi teſſeram imitantis, quæ plan-
cha. 4. tam & externum pediſſi latus ſpectat,^g ſinum latiſculum, neque admodum profundum excul-
g 2 fi. ca. 33 pſit, quem uiſcido humore obliniuit, & perquā læui ligamento circūdedit. Dein ad hunc
lib. 1 4. ſinum Natura tendinē circumduxit, non quidem ut reliqua ipſius regione, teretem, ſed
h 15 tab. X. quā tendo ad ſinum reflectitur, illum dilatauit, ut eo firmiūſſi ad modicè patentem ſinum re-
i 2 tab. 4. 4 uolueretur; & ne ſi teres permanſiſſet, hinc aliquò declinaret. Denique hac latitudine nequa-
14. cha. 15. 5 quam contenta, tendinē etiam peculiari artificio eouſque inibi indureſcere uoluit, ut carti-
ta. cha. 9. 6 laginiſſi ſpeciem exprimat: imò interdum cartilaginiſſi duriciem uincens, tendo ibidem oſſeus
ta. r. 9 8. 13 conſpiciſſi, quo iſ promptiūſſi ad acutum angulum flexuræ uim exoluat.ⁱ Octauus mu-
v. 14 l. m. 15 ſculus, qui ſub ſeptimo prorſus (ſi tendiniſſi ipſius anterioreſſi ſedem excipias) reconditur,
a ſub V. ex fibula quoque totus prodiſſi. Aliquantulo enim ſub fibulæ ſuperiori appendice ab exter-
 no fibulæ latere, uerſus anteriora nonnihil enaſcitur, & ad amuſſim carneus fibulæ que ſem-
 per adtenſus, ſub ſeptimo deorſum prorepiſſi. Quum autem medium longitudiniſſi fibulæ
 aliquouſque ſuperauit, in teretem quoque ceſſat tendinē, qui ſimiliter atque ſeptimi tendo
 deorſum

Septimus.

Octauus.

deorsum uersus fibulae posteriora reflectitur. Verum hic tendo septimi tendine omnino non integitur, sed in priora prominens, anteriori septimi tendinis lateri attenditur, & sinui in posteriori fibulae appendicis sede exculpto incumbens, transuerso etiam ligamento circumdatur. Hinc rursus in priora descendens, processui pedis ossis ualidissime inseritur, quod tesseram referenti ossi adnexum, paruum pedis digitum sustinet. Verum hic tendo aliorum hactenus dictorum ritu, non simplicem¹ insertionem perficit, uerum nonnihil ante insertionem ipsius tendo bicornis redditur, duplici insertionem dicto ossi implantatus. Neque est, quod quispiam Galeno confusus, sextum nobis commemoratum musculus, in duos quoque tendines diuidi arbitretur. Hominiibus enim ad eum quem scripsi modum sextus musculus habet, aliter sane quam in caudatis simijs obseruatur. non enim in his tantum duplex tendo uisitur, uerum etiam duo sunt musculi admodum conspicui, quorum anterior posteriore minor est, ambo in pedis os pollicis praepositum implantati. Caeterum quando his (& si ad Galenum intelligendum iuent) non admodum concinne sermonem uera enarrantem interpellimus, nonum musculum iam praedictis addamus, quem quis proprium per se musculus recensere poterit, alius uero^o alterius cuiusdam partem non inepte dicet, prout nimirum ille motui & insertioni, hic uero^o connexui & principio attenderit. A musculo enim, qui in anteriori tibiae sede locatus, quatuor pedis digitos extendit, carnosa quaedam portio iuxta mediam tibiae longitudinis ab externo ipsius latere enascitur. Quae deorsum ducta in tendinem degenerat, qui⁹ transuersum anterioris tibiae sedis ligamentum subit, & superiori pedis regioni exporrectus, fibrosisque nexibus subditis^r musculis commissus, in^s duas portiunculas bipartitur, quas pedis ossi paruum digitum suffulcienti inserit, non procul ab eius ossis superiori sede, qua imitanti tesseram ossi al ligatur. Nihil itaque prohibet, hunc musculus aut partem digitos extendentis recensere, aut illum numero ab extensionis opifice distinguere, illumque nonum musculus enumerare, ut hactenus enumerati nouem censeantur pedis motibus famulantes. Primus itaque, & secundus, & quartus, qui suram seu tibiae uentrem praecipue efformant, atque in posteriori tibiae sede locati ualidissimum fere corporis tendinem simul constituunt, robustissimi pedis motus autores sunt. Calcem enim sursum in posteriora trahunt, pedemque terrae firmant, seu in posteriora deorsum reflectunt, atque his^u quintus suppetias fert, pedem quoque terrae admouens, & interdum ut summis tantum digitis erigi queamus, in posteriora ducens. Neque est quod magnopere illius tendinis in calcem inserti officium praedicem, quum secundum mortem homini nihil pestilentius inferre pleraque nationes studeant, tendinis illius praecisione. Quod uero munus tertio pedem mouentium musculo concedatur, non ita affirmare possum, nam latum tendinem in pedem non producit, & sane inualidior uisitur, quam qui cum insignibus illis quatuor musculis, in pedis extensione conferri queat. Si tamen hunc tantum opus subire posse quis crediderit, id addendum prorsus erit, eum obliquo & in internum latus, pedis motui suppetias ferre, quem admodum & praedicti quoque faciunt: prout hi illi ue soli, aut tendantur, aut laxentur, quemadmodum de brachialis motoribus dictum est. Caeterum sextus una cum^z septimo, octauo & nono contrarii motus, quum simul tenduntur, duces sunt. pedem enim sursum ad tibiae anteriora flectunt, motu sane non aequae atque posteriores digno & ualido. Si uero alternatim cum posteriori tibiae sedem occupantibus musculis contrahuntur, in hoc illud ue latus pedem agent, atque ita, qui flexionis extensionisque autores sunt, etiam motus in latera appositissime obeunt.

Nouem musculorum pedem mouentium munus.

DE MUSCULIS PEDIS DIGITOS MO uentibus. Caput LX.

Pedis digitorum motus.



DIGITI pedis huiusdem prorsus motibus aguntur, quibus quatuor manus digitos duci relatum est. Pedis enim pollicis (qui duobus tantum ossibus donatur) primum internodiu pari omnino ratione cum primis reliquorum digitorum internodijs flectitur, non autem ut in manu, opposito flexu alijs digitis obducitur. Atque hic primorum articulorum flexus, aut rectus est, aut in alteram partem modice inclinans, quemadmodum primos quatuor manus digitorum articulos moueri diximus. Secundum autem pollicis internodium, & secunda quoque & tertia reliquorum digitorum internodia, simplici duntaxat ac in neutrum latus uergenti donantur flexione ac extensione, nullo interim proprio motu in latus (quemadmodum neque manus digiti) praedita, quum interim prima internodia & adductionis & abductionis motum in pede non minus quam in manu nanciscantur. Caeterum ut motus digitorum manus & pedis par quodammodo est ratio, ita fere etiam similis

Primus pedē
mouentium.Secundus &
tertius.

g digitorum

milis musculorum in utrisque est series. Vnde etiam in illorum descriptione non inopportune eundem ordinem, quem in manus musculis obseruauimus, aggrediemur. ^a Primus itaque is futurus est, qui quatuor digitorum secunda flectit internodia, in hoc à manus ^b musculo uarians, quod breuior sit, & pro sua mole amplior & tenuior, quodque non ex tibia (quemadmodum musculus digitorum manus est cubito) porrigitur. Totus namque inferna duntaxat pedis sedem occupat, uersae ipsius carnosae substantiae pertinaciter subnatum habens ^c ligamentum, quod lati in manu tendinis uices gerere, iam antea proditum est. ^d Ab inferna itaque calcis ossis sede, & anteriori illius calcis tuberculi parte, quod terrae innititur, primus hic musculus ^e principium ducit, partim nerueum, & partim carneum, quod ilico ab exortu prorsus carnosum euadens, sensim dilatatur, multo latius, quam crassius redditum. Quum uero mediam pedis longitudinem ad digitos repens ^f superauit, in quatuor carnosas portiunculas dirimitur, quae inuicem ductae, & aequales constituentes angulos, singulae unum producunt tendinem, ad sibi prepositum digitum excurrentem. Tendo iste similiter ac in manu, ad primi internodii radicem transuerso ligamento excipitur, quousque longa sectione diuisus, & subiecto sibi tendini ^h uiam praebens, in secundi internodii radicem implantetur, & toti ossis sui longitudini latescens innascatur. Huius musculi beneficio, secundum quatuor digitorum flectimus articulum, eum quam possimus proximè ad calcem recta linea protrahentes. ⁱ Secundus uero & ^k tertius digitorum musculi, tertij quatuor digitorum & secundi pollicis articuli flexus opifices sunt. Atque hi non in pedis planta reponuntur, sed in tibiae posteriori sede locati, totam illius longitudinem perreptant. Sunt porro hi, quos ^l quarto pedem mouentium musculo, qui suram constituentium maximus est, proximè substerni, & ^m quinto pedis musculo incumbere diximus. Ut uero eandem cum quinto pedis musculo sedem occupant, ita quoque illi forma admodum similes sunt. latiores enim quam spissiores uisuntur, deinde tota carnei in tibiae regione existunt: & quum ad calcem usque descendere, ab interno tantum ⁿ latere non admodum prius arctati, teretem promunt tendinem, peculiari sinu & transuerso ligamento, inter tibiae & calcem, inferiora pedis subeuntem. Eorum itaque ^o prior, qui digitos mouentium secundus censebitur, à posteriori sede connexus fibulae ad tibiae, ^p enascitur, statim ab ortu carnosus, & latus utcunque, uersus tibiae extremum prorepens. Toto hoc progressu, maximo suram efformante ^q musculo contegitur: anteriori autem parte qua tibiae posteriorem sedem respicit, fibulae posteriori ^r parti attenditur, ipsi etiam aliquandiu adnatus: deinde qui ordine ^s tertius futurus est, externo suo latere ipsi secundo hinc quoque subiicitur. Illico uero atque secundus ad infimam tibiae sedem descendit, ab interno ipsius ^t latere tendinem edit teretem, qui prius aliquandiu in carne pronasce uisus est. Huius tendinis nomine ad internum calcis latus, ubi talum excipit, ^u sinus insculpitur, qui transuerso ^v ligamento obductus, praesentis musculi tendinem tutissime deducit. Postquam tendo ligamentum id superauit, pedis inferiora oblique subit, & inter ^x illos qui quatuor digitos pollicis adducere dicuntur, & ^y eos qui primum digitorum internodium flectunt, prorepit, totus propemodum ad pollicem contendens. A praesenti enim tendine ad plantae ferè mediū ^z portiuncula diffunditur, quae aliquot ^a tendinibus eius quem tertium numerabo commiscetur, atque una cum illis tendinibus ad tertij indicis, & quasi ad medij quoque digiti, articuli flexionem auxiliatur. Reliqua autem tendinis secundi digitos mouentium musculi portio (quae profectò ualidissima est) ad pollicem uti diximus oblique perfertur, atque secundum pollicis longitudinem transuerso ligamento exceptus, in secundi pollicis internodii longitudinem lata infertione implantatur, eius internodii flexionis autor. ^b Tertius musculus, qui quinto pedem mouentium insternitur, pari prorsus ratione cum secundo digitorum musculo in posteriori tibiae sede ex-
porrigitur ad internum magis latus, quam secundus, respiciens. longè enim ^c magis tibiae ossi, quam fibulae innititur. Quum autem ad calcem ferè descendit, atque adhuc latus conspicitur, ab interno ipsius ^d latere teretem promit tendinem, cui peculiarem ^e sinum & transuersum ligamentum Natura fabrefecit, in medio duorum qui hic quoque habentur sinuum. Tertij itaque musculi tendo, hoc ductus sinu, teres adhuc pedis inferiora subit, secundi musculi ^f tendini uersus plantae cutem magis subiectus, & cum illo ^g literae imaginem efformans. Secundi enim musculi tendo ab exterioribus introrsum oblique in anteriora fertur: tertij autem tendo quodammodo ab interioribus extrorsum contendit, ob idque in plantae medio cum secundi tendine decussatim constituitur. Tertij musculi tendo pedis plantam hoc modo subintrans, modicè ^h dilatatur, ac in quatuor alios tendines digeritur, singuli ad unum quatuor digitorum excurrentes, illis que manus ⁱ tendinibus respondentes, qui tertium quatuor digitorum articulum inflectunt. Sub primi enim musculi tendinibus occultati, ^j

a 14 tab. 3.
b 5 tab. 0.c 13 tab. w.
d 3 tab. mu-e 2 fi. ca. 33
li. 1 Y, Z.

f 14 tab. x.

g 14 tab. a.

h ut in sta-

bule manu
iuxta o. aut6 tabulae y
per d.i 14 tab. A.
15 O.k 14 tab. E.
15 P.l 13 tab. y. 14
ta. q.m 15 tab. D.
E.

n 14 tab. A.

o 14 tab. y.

p 13 tab. x.

q 15 tab. B
S.

r 14 tab. E.

s 14 tab. i.

t 15 tab. cha-
ra. 3.

u 1 tab. v.

x 14 tab. a.

y 15 tab. L.

z 15 tab. Q.

a 14 tab. d.

b 14 tab. E.
15 tab. P. 1 a.c 15 tab. ma-
gis A quam

d 14 tab. x.

e 15 tab. F. et
cha. 2.

f 14 tab. d.

g 14 tab. l.

h 6 tab. y. mu-
sculi scilicet
z insigniti.

Lib. 3 de Vsu
par.
Lib. 2 de Ad-
mi. sectio.

Primus & 2
& 3 muscoli
quo modo in si-
mijs se habeant.

Musculi pri-
mos articulos
flectentes, ter-
tium musculū
in numero suc-
cedentes, ac de-
cem nobis enu-
merat.

digitorum radices subeunt, unā cumⁱ primi musculi tendinibus transuersoⁱ ligamento, ut in manu quoque obducti. Ut uerò ad tertium usque internodium proreperent, primi musculi tendines sectione per longum diuisos permeant: & latiores redditi, tertij internodij longitudini implantantur. Cæterum tendini qui indicem adit, & interdum illi pariter qui medio exporrigitur, hoc priuatim obtingit, ut in plantæ medio^k portiunculam secundi musculi tendinis ad pollicem proficiscentis nanciscantur, quæ cum illis digitorum tendinibus omnino coit, & permiscetur. Interdum uerò quantumuis accurate singula obserues, à secundi tendinē nihil porrigi, sed hunc totum in pollicem absumi conspicias. Atque ita sanè tres digitorum primi musculi habent, quorum primus secundum quatuor digitorum flectit internodium. Reliqui autem duo, ultimi quinque digitorum internodij flexionis opifices sunt. Verum hinc non ambigo studiosissimum quemque, qui accuratissimè Galeni loca iam pridem euoluit, atque si rectè ipsius sensa tenet, illū sibi haud conformia dicere, & libros ipsius hinc quoque uitiatos esse intelligit, auidè expectare, quamobrem à Galeno dissentiam. Cui in præsentia aliud nihil additū esse uelim, quàm uerissima me hætenus de pedis digitorum musculis in hominibus enarrauissē, & Galeni loca (ut iam audies) uix simijs conuenire. Ut itaque nunc præteream functionem, quam cum manus digitorum musculis communem esse censui, quumⁱ secundus musculus secundi pollicis internodij flexus autor poneretur, nulla primi articuli, quod ad flexum attinet, facta mentione: quemadmodum^m tertij musculi beneficio tertium reliquorum digitorum internodium moueri iam antea scripsi. Quum interim ex Galeni sententia primos etiam articulos duobus posterioribus musculis flecti, dictum esse oportuerat. Arbitratur enim Galenus, eandem hinc atque in manu horum musculorum functionem esse. Imò exactè in secundo de Administrandis sectionibus suum ipsius perpendens placitum, quo transuersorum ligamentorum ope primos manus digitorum articulos flecti innuerat: dixit ab illis qui tertio digitorum internodio inseruntur in pede, nō solum tertios primosque articulos in flexionem duci, uerum primum, secundum & tertium internodiū ipsorum ope flecti. quod sanè necessum esset, si modò transuersi ligamenti uel tendines illa quibus tantū incūbunt, ossa mouere donaremus. At ita non suffecerat adhuc illisⁿ tendinibus, quos nos tertium internodiū flectere diximus, à Galeno insigne illud flectēdi munus ascribi, quinetiam^p primum musculum, qui secundis quatuor digitorum internodijs inseritur, prima quoque internodia flectere, orationi addendum uenerat. quum & illius musculi tendines eodem cum alijs tendinibus in primo digitorum osse ligamēto obuelentur. Cæterum functione postposita, qualiter in caudatis simijs præfentes musculi habeant enarrare nō grauabor, haud interim immemor Galeni loci, quo tendines nō eodem semper modo permisceri tradidit, ne fortè quis me ipsius dogmata nimis perfunctoriè arbitretur expendere. Simiæ igitur primū musculū, quo secunda digitorū flectuntur internodia, cū hominibus cōmunem habent: at tanto longioribus donatū tendinibus, quāto interuallo simiæ pes hominū pedē unā cū digitis in longitudine pro proportionē superat. Secundus quoque & tertius in tibia eodē modo simijs atque hominibus collocantur. quū tamē tendinē educūt, nō ex altero latere illū promūt, sed cæterorū musculorū modo coarctati illū emittunt. quod etiā in simiarū quinto pedē mouentiū musculo usu uenit. Deinde tendines quoque pedis plantā ut in hominib. subeunt, & ubi x literæ instar in sectionē moluntur, secundi musculi tendo tendini tertij musculi prorsus permiscet, atque ex ambobus unus quodāmodo confurgit tendo, à quo transuersim portiuncula ad pollicē fertur, illi prorsus similis quā in caudatarū simiarū manu à tendine indicē accedente, in uolæ medio ad pollicē ferri retulimus. Reliqua uerò huius permixtionis pars in quatuor tendines diuiditur, eam portionē quæ pollici exporrigit mole uincētes, hi ut in homine sub primi musculi tendinibus deducti, tandē latiores redditi tertio internodio inseruntur. ^p Musculi primos digitorum pedis articulos flectentes, in homine illis ferè respondent, ^q qui in extrema manu inter postbrachialis ossa conduntur. uerum in pede ita exactè ac in manu distingui nequeunt. Rudis enim indigestaque moles in planta conspicitur, quæ ad amussim carnea est, & fibris rectis interstincta. deinde secundum pedij longitudinem ducta, & illius quoque interualla opplens, in quinque digitorum radicem implantatur, utrinque ad primi internodij latus uersus interiora insertionem tentans. Hanc sanè carneam molem ex sententia in musculos proprios, quemadmodum in manu subdividere nequeo, quantumuis etiam sibi implicatas quasdam inscriptiones commonstret. Vt cunque sit, hæc non minus quā in manu ualida est, & primorum articulorum flexionem perficit, quam primus pollicis articulus parē cum primis quatuor reliquorū digitorū flexione adipiscitur. Vnde etiā carneæ illius molis ^r pars ad pollicem porrecta illis respondet partibus, quæ cæteros digitos adeunt. Integrū itaque erit propter obscuras impressiones, & quandā cum manus musculis imaginem, &

k 15 ta. Q.

l 14 tab. A.
m 14 ta. z.

n 14 tab. B.
o 14 ta. C.

Hæc ex hominis fabri casunt obuia.

p 15 tab. L.
deine.
q 8 tab. sub Δ

r 2 fi. ca. 33
li. 1, 2, 3.

s 14 ta. B.

& parem quoque functionem, hîc decem musculos quinque digitorum primis articulis in flexione famulantes enumerare, ut binî ad singulos digitos referantur, atque hî decem tribus reli-

quis flexionis autoribus ascribantur. ¹ Decimusquartus igitur, cui quatuor digitos extendendi munus concreditur, in anteriori tibię sede locatus, sub ^u sexto pedem mouentiũ musculo reconditur. Aⁱ tibię enim ossẽ, qua fibulę sub genu articulo connectitur, hîc musculus nerueum assumit ^x principium, quod ilico ab exortu carneum euadens, recto tramite deorsum uersus pedem descendit, in medio propemodũ ^v ductu carnosam sui ^z portionẽ ab externo latere diffundens: quę deorsum protensa, ea est quã nonum inter pedem mouentes musculos recensuimus. Postquam uerò decimusquartus digitos mouens musculus hanc eduxit portionẽ, carnosus adhuc deorsum tantisper fertur, dum transuersum ^a ligamentũ à tibiã in fibulã pronatũ, anterioremq; tibię sedem occupans, contingat. Ibidem enim in ^b tendinem degenerat, qui per id ligamentum ueluti per anulum prorepit, ac priusquam ligamentum prætergreditur, in quatuor alios tendines scinditur, qui per pedis superiora æquales angulos constituentes, ad quatuor digitos pertingunt, ac toti illorum longitudini ampliõres redditĩ inferuntur, & simul tres

illorum articulos extendunt. ^c Decimusquintus musculus ad pollicem spectat, & in anteriori tibię sede collocatus, partim nuper commemorato ^d musculo subiicitur, partim uerò illius interno lateri exporrigitur. Aⁱ tibię enim ossis ^e externo latere, ubi membraneum ^f ligamentũ tota tibię longitudine fibulam tibię ossi colligans, ab ipsa educitur, hîc musculus principũ sumit, quod carnosum in ea sede incipit, qua iã tibię os à fibula dehiscit. Hinc musculus deorsum protensus, ac ligamento illi pertinaciter adnatus, anteriorem tibię ossis sedem adit, ac in ^g tendinem finiens, per transuersum ^h ligamentũ in anteriori tibię regione consistẽs ducitur, dein per pedis superiora ad pollicẽ prorepẽs, toti ipsius longitudini inseritur. Huius musculi beneficio pollex in neutrũ latus insigniter uergens extendit. Neq; alius ex tibiã homini in superiorẽ pollicis sedẽ inseritur. Verũ ⁱ alius toti pedis superiori regioni secundũ longitudinẽ obductus, externo superioris pollicis sedis lateri tẽdinẽ inserit, cuius ope pollex alijs digitis adducit. Iuxta latus enim tali, ^k ubi calcis ossi os tesserã referens coarticulat, ab huius sedis ligamẽtis ampla moles carnea enascitur, quę antrorsum oblique uersus digitos porrecta, in quatuor carnosas partes dirimit, quę singule teretẽ efformant tendinẽ. Horum quatuor tendinũ intimus pollicis externo lateri uersus superiora inseritur. Secundus ab hoc, indicis externo lateri implantatur, tertius uerò mediũ digiti, quartus autẽ anularis, adeò ut solus paruus huiusmodi tendine destituatur. quanquã semel & admodũ obscure illi quoq; exiguũ tendinẽ exporrigi animaduertim. Horũ tendinũ beneficio, quatuor digiti illis donati, in externũ latus abducunt. Num uerò huiusmodi carneũ corpus in hos deductũ tendines, unius aut pluriũ musculorũ uice numerandũ sit, nõ uehementer instandũ arbitror, quũ in ortu unicus uideatur esse musculus, et postmodũ uti diximus, plurimũ in quatuor tendines subdiuidat. Verũ ex Galeni sententia, duo hîc essent musculi, quorum unus indicẽ & mediũ à pollice abduceret, alter uerò anularẽ & paruũ extrorsum in latus amouerẽt, deinde ex tibiã in pollicẽ alius infereretur, eius tendinis uicẽ supplens, quem ab hoc carneo corpore in pedis superiori sede locato, in pollicẽ inferi cõmemorauimus. Verũ nõ mirum est Galeni descriptionẽ hîc plurimũ à nostra uariare, quũ insigniter ibidẽ simiã ab hominum constructione differant. Illis nanq; in pollicis superiora à tibiã duo exporriguntur musculi, quemadmodũ in manu accidit, deinde duo in superiori pedis sederepositi uisuntur, quatuor digitos à pollice abducentes. Age igitur doctrinę gratia, in homine nobis enarratũ iam musculorum corpus unius loco habeatur, sitq; is pedis digitos mouentiũ decimussextus. ¹ Decimusse-

ptimus igitur in externo latere pedis reponitur, insignis utcunq; musculus, & ab externo latere calcis ossis, ubi id ^m tuberculũ quoddam gerit, nerueo principio enatus. Atq; hoc quidem illud est, quod ferẽ in medio longitudinis ossis calcis extuberat, huius quem nunc narramus musculi gratia efformatum. Principium musculi non procul ab exortu carnosum efficitur, exquisiti musculi formam exprimens. Priusquam uerò ad primum parui digiti articulum pertingat, in teretem finit tendinem, externo lateri primĩ illius ossis insertum. Hîc musculus quum ualidus admodum sit, etiã si paruus digitus à decimosexto nullum tendinem exigat, eius digiti abductionem plus satis perficit, quemadmodum etiã in hominis manu factum esse affirmauimus. ⁿ Decimusoctauus interno pedis lateri secundũ totam ipsius longitudinem pro-

tenditur, muris quoque effigiem proximẽ exprimens. à ligamentis enim calcem talo connectẽtibus nerueum assumit principium, quod crassius carnosiusq; effectum, tandem in teretem degenerat tendinem, externo lateri prioris articuli pollicis implantatum. Huius musculi beneficio pollex introrsum à cæteris digitis abducitur. In simijs adhuc unus est à pedis ossẽ indicis præposito in pollicem pronatus, ac illum indici quã potest proximẽ admouẽs, quo homi-

Decimusquar-
tus.Decimusquin-
tus.Musculus in
superiori pe-
dis sede loca-
tus, & polli-
cẽ tresq; ip-
sos extrorsum
abducens, &
numero 16.Decimussepta-
mus.Decimusocla-
uus.

Quatuor mu-
sculi, digitos
quatuor polli-
ci adducentes,
feu 19, 20, 21,
22.

nes destituuntur. Quare etiam post decimum octauum in homine^o quatuor tantum adhuc su-
persunt musculi, quatuor digitos in internum latus ducentes. qui similiter atque in manu, illis
tendinibus exporriguntur, qui tertium digitorum flectunt internodium. Quamuis in hoc pe-
dis musculi à manus uariant, quòd illi non à tendinum inuolucris horum modo, sed à calcis osse
exoriantur. A ligamentis nanque ossa tarfi posterioribus pedis ossibus in planta colligantibus
musculorum corpus enascitur, quod in quatuor postea graciles diductum musculos, interno
quoque lateri quatuor digitorum inseritur. Si itaque carneam hanc molem quatuor musculorum
loco habueris, omnes pedis digitorum in homine musculi, duo erunt & uiginti. Si uero unius
loco id corpus numeraueris, tantum erunt decem & nouem. Rursus prout id^q corpus, quod
pollicem & tres ipsi proximos digitos in externum latus ducere dixi, in plures disseueris, nu-
merum quoque augebis.

o 14 ta. 2,
u. 15 tab. N.
p 14 tab. 8,
dein v.

q 6 tab. 2.

DE LIGAMENTIS ILIUM OSSA SACRO

colligantibus, & coxendicis ac genu articuli, de quibus reliquis omnibus quae in
tibia & pede habentur ligamentis. Caput LXI.

Ligamenta
sacri ossis cum
ipsis adnexis.



Membrana
pubis ossis fo-
ramen occu-
pans.
Femoris ad
coxendicis os.

LIGAMENTVM ilium os sacri ossis lateri colligans, robustum est, & mem-
braneum, uniuersam commissuram ambiens. Portio tamen ipsius in me-
dio, ubi inuicem ossa committuntur, sese inserit, ac ita ualida crassaque effi-
citur, ut cartilaginei ligamenti naturam prorsus repraesentet, cuius bene-
ficio, & demum cartilaginis quoque interuentu, ilium os sacro ualidissime
nectitur. Quemadmodum igitur cartilaginis intercessu, & ligamento or-
biculatim commissuram ambiente, pubis ossa inuicem connectuntur, ita
quoque ilium os sacro coarctatur. Praeter haec sacri ossis ligamenta^a aliud ex latere connexus quin-
ti ossis sacri cum sexto quodammodo teres enascitur, atque in acutum processum coxendicis os-
sis inseritur. Quin etiam ab eodem sacri ossis latere, in ossis coxendicis appendicem, aliud^b li-
gamentum enascitur, quod una cum praedicto ossa haec firmiter connectit, & praeterea recti in-
testini, & musculorum ipsius fulcrum existit. Postremo in pubis ossis foramine^c membrana ui-
situr, illi omnino similis, ^d quae secundum cubiti longitudinem radium ulnae colligat. Substan-
tia enim huic ad amussim respondet, & fibris constat deorsum in latus oblique procurrenti-
bus. Ligamenta femur coxendicis ossi adnectentia, duo magis praecipua censentur, ^e unum
orbiculatim articulum amplectens, cuiusmodi etiam alijs articulis est commune. Caeterum ne
aliquando femoris caput luxaretur, quoties uarijs motibus femur magnam corporis molem
sustentans mouetur, ligamen hoc quod diximus, crassissimum robustissimumque euasit, nulli li-
gamento ex his quae articulos circundant, crassitie secundum. Et tanti momenti ususque id liga-
mentum Graeci esse putarunt, ut etiam totius articuli nomine illud *ἰχίον* appellare non dubita-
uerint. Quin etiam huic ligamento articulum ambiente, non solum priuata crassities duritiesque
accessit, uerum hoc peculiariter sibi uendicat, quod neque capitis femoris, neque acetabuli ossis co-
xendicis supercilio inseritur, aut ab illis prodit: totam enim femoris ceruicem ambit, illi nusquam
quam ad magni femoris processus radicem orbiculatim circumnatum, reliquae autem parti tantum
citra omnem connexum incubit. deinde acetabuli supercilio non adnascitur, sed paulo supra su-
percilij radicem ossi coxendicis. Atque hic prouide Natura ab aliorum articulos ambientium liga-
mentorum fabrica reclinauit. nam si aliorum ligamentorum ritu supercilijs connatum fuisset, neutiquam
oblongum femoris caput apte moueri permisisset. Quod sane ad amussim spectabis, quum in-
ter secandum femora inuicem adducere, & rursus abducere conaberis. Mirum enim dictu est,
quam femoris caput antrorsum extra sinum fertur, dum alterius pedis calcem, ueluti perpendi-
culi lineam, medio interioris lateris alterius pedis adhibemus: quod in illo pedum situ fieri cer-
nimus, quum in choreis notam, quam bis simplicem uocant, hocque signo. *ss*. indicant, erecti sin-
gimus. Ad haec, praeter quam quod coxendicis ossis sinus admodum cauatus est, aliud adhuc
ligamentum orbiculatim sinus supercilio adnascitur, quod sinum adauget, & eorum ligamen-
torum naturae participat, quae cartilagineae sunt. Verum id cauitatem non solum auget, sed etiam
in causa est, cur minus ossis supercilijs in uehementibus femoris motibus, quum fragile sit,
abrumptur: sua enim duritie ligamentum impetui resistit, & sua mollitie cedens, eundem exol-
uit. Porro^f aliud coxendicis articulo peculiare ligamentum teres est, & adeo durum, ut cartila-
gineus neruus merito ab alijs appellatus fuerit. Hoc ex medio capitis femoris enatum, non in
acetabuli centrum inseritur, at in humilissimam ipsius sedem, ^g ubi adeps, non autem cartilago, si-
nui oblinitur. Haud secus quam si Natura ad superiora primas femoris luxationes futuras me-
tuisset,

Per pauca li-
gamenta de
lineamus,
et qui mem-
branae sint
ab ossibus po-
tissimum cir-
cumscripti,
onibus pe-
tenda et con-
fingenda ue-
niunt.

a 13 tab. o.
b 10 ta. 2.

c 14 tab. b.
d 7 ta. v in
ter S, T.

e fi. ca. 1 P.
P.

tulisset, quum corporis truncus tot oneribus grauatus, femoris capiti tum præcipue innititur, quum baiulos tot sæpe centenis libris onustos incedere, atq; ita uicissim uno pedi insistere animaduertimus. ^h In genu uero articulo, præter commune ligamentum omnibus obductum articulis, alia quædam ualida robustaq; rerum Opifex fabrefecit. quando enim quinque sunt genu articuli regiones, anterior, posterior, interior, exterior, & media, singulis peculiare quippiam Natura præposuit. Anteriori quidem, quæ membraneo ligamento prorsus destituitur, & tamen regio admodum fallax, & summopere laboratura est, ⁱ mola patella ue simul cum illam continentibus tendinibus prætenditur: quæ quum abunde articulum stringat, nullo hîc opus erat ligamento, neq; etiam (ut dixi) membraneo, omnes articulos ambiente. Posteriori similiter laboraturæ, robustum neruosumq; ligamentum præponitur, quod ex media posteriori tibiæ regione originem capiens, rectâ sursum fertur, & bifidum ^k utrorumq; femoris capitum posteriori sedi, qua maxime illa dehiscunt, implantatur. Cæterum mediæ regioni duabus nuper dictis digniori maioriq; egenti firmameto, Natura ualidissimum & cartilagineum largitur ligamentum, quod ex tota prominētiore inter duos tibiæ sinus ^l parte enatum, femoris posteriori parti, qua ipsius capita maxime inuicem distant, cum paulò antè dicto inseritur. Verum præter hoc ligamentum interdum adhuc mucosum quoddam & gracile reperias, in medio genu articulo locatum, in anteriori nuper dicti regione: quod similiter à tibia in femur pronascitur. Exteriori regioni iniurijs magis quàm interior patienti, teres quoq; obductum est ligamen, femoris & fibulæ tibiæq; os inuicem colligans. Huius ligamenti humiliter extremum, capiti ^m musculi substernitur, cuius tendinem ad posteriora inferioris fibulæ appendicis perreptatē, ad pedij os pollicis præpositum protendi relatum est. Porro interior genu regio, quæ cæteris omnibus & minus erat motibus famulatura, & ijs quæ cruri lædendo occurrant minus obuiatura, ligamen nanciscitur, iam dicto tum gracilius, tum mollius. Quod etsi ex interiori femoris latere enascatur, in tibiæ tamen latus non insertatur, sed uelut ad aliud exterius in tibiæ priora maiori sua portione contendit. Cæterum præter hæc omnia, peculiaris huic articulo, quemadmodum superiori libro scripsi, ⁿ cartilago iniicitur, quæ duritia exquisitæ cartilaginis non nihil cedit, atq; cum ligamento quippiam cōmune exigit. Quantum uero ad articuli genu securitatem ea cartilago ualeat, illic quoq; diximus. nunc autem in exteriori ipsius circumterētia, qua quodammodo ex articulo eminet membraneis ligamentis ex ipsa prodeuntibus, femori & tibiæ colligari, additum esse uoluimus. ^o Ligamen fibulam tibiæ iuxta genu articulum colligans, forte quidem est, sed ut aliorum ossium commissuris, ab exteriori tantum parte ossium connexum circūdat. Quæ uero tibia fibulaq; inuicem dehiscunt, per totam ossium longitudinem ^p ligamentum membræneum habetur, illi par ^q quod in cubito repositum esse cōmemorauimus. atq; idà tibiæ osse in fibulam porrigitur, fibris intertextum à tibiæ osse deorsum oblique in fibulam excurrentibus. Quemadmodum uero conformatione hoc tibiæ ligamentum cubiti ligamento respondet, ita etiā parem cum illo usum præstat. fibulam enim tibiæ alligat, & interstitij ritu anteriores tibiam occupantes musculos à posterioribus dirimit, illisq; qui ipsi adnascuntur, exortus robur porrigit. Pedis ligamentorum nonnulla prius exposita sunt, ^r transuersa nimirum, quæ tendinibus obducuntur: quorum quædā ad ossium cōmissuram simul faciunt, alia uero duntaxat munimenta quædā tendinū, & ne illi è suis sinibus exurgant, uincula existunt. Sunt uero transuersa pedis ligamenta, si obiter considerētur, tria. ^s Primū in anteriori tibiæ sede ad ipsius cum pede articulum consistit, atq; ad tibiæ os & fibulam refertur: hoc enim ossa connectit, & plurimos tendines transmittit. Istud utcunq; perpendas, unū simpliciter est. ^t Secundum ab interno malleolo in calcis os inseritur, atq; ossium quoque alligationi auxiliatur. si uero exactè diuidatur, tres anulos, & ueluti tria ligamenta efformare uisitur, quæ priuatim ad suos quosque spectant ^u sinus, trium tendinum nomine, ut & ipsi tres sunt, exsculptos. quorum calci proximus ^x musculi tendinem admittit, qui pollicis secundum flectit internodium. Sinus huic accubens, secundusq; tendini uiam præbet, tertios quatuor digitorum articulos flectenti. Tertius uero sinus unā cum ligamento in posteriori interioris malleoli sede repositus, à Natura illi tendini præparatus est, quem ^y musculus efformat, inter pedis motores quintus. ^z Tertium porro transuersum pedis ligamentum à fibula in calcem fertur, atq; ad ossium ita colligationem iuuat: qua autem duobus sinibus obducitur (quum illi sinus duobus ossibus simul non sint communes) tantum tendinibus famulatur, ^b septimi & octauī musculorum pedem mouentium. Ad hæc, in inferna pedis digitorum regione transuersa ligamenta perinde consistunt, ac in manu. Verum præter transuersa ligamenta, quæ etiam prius expressimus, in pede alia permulta habentur. Primum ex tibiæ osse in fibulam procedens, inferius tibiæ ossi fibulam colligat, membræneum similiter ac aliorum articularū ligamenta existens. Deinde & aliud quoq; reliquis articularum

Ligamēta genu articuli.

Ligamēta fibulæ tibiæ ossi committentia.

Pedis ligamēta transuersa.

Alia pedis ligamenta ossa tantum cōmittentia.

ligamentis responder, quod uniuerſum articulum tibiæ cum talo amplectitur. Poſthæc quatuor ſunt ligamenta cartilaginofa, ex quibus nonnulla in alto conduntur, alia exterius offa ambiunt, quæ ſimul omnia talum quatuor quibus firmatur offibus connectunt. Primum ex internis tali partibus, quibus interno malleolo excipitur, originem obtinet, & in tibiæ offis partem, quæ talum reſpicit, innafcitur, id os talo colligans. Secundum exterius eſt, interioriꝑ reſpondet, fibulam talo neſtens. Tertium cæteris robuſtius, & admodum inſigniter cartilagineum, ab inferiori tali ſede propter ipſius ceruicis radicem, nimirum quæ calci ſis committitur, principium ducit, & calci inter duas quibus talo coarticulatur, commiſſuras innafcitur. Quartum tali caput offi nauiformi connectit. Ex tali enim ceruicis termino originem ducens, iam dicto offi inferitur, uniuerſumꝑ que ambit articulum. Verum præter cartilaginea hæc, membraneum aliud ligamentum omni ex parte calcis cum talo obducitur articulo, & ualidum quoque aliud à tali ceruice in teſſeram imitans os implantatur. Porro ligamen calcis os huic teſſeræ ſimili offi committens, robuſtum quoque eſt, & cartilagineum, ſed duntaxat articulum amplectitur. Quemadmodum uerò in manu brachialis offa inuicem duriffimis cartilagineisꝑ ligamentis colligantur, ita quoque tarſi offa tum inuicem committuntur, tum etiam offi cymbam imitanti adneſtuntur. Validiffimum autem & peculiare uinculum in inferiori parte tarſi offa obtinent, quod non ſolum extrema uincit, imò penitiùs ſingulis inſertum, offium quoꝑ media inuicem conſtringit. Pedij autem & digitorum ligamenta manus ligamentis correfpondent. Sunt enim omnia membranea, his tantum exceptis quæ ſuperiori pedij offis interuallorum parti immittuntur, illa ſiquidem cartilaginea ſunt, & in profundo articuli genu reſoſiti^d ligamenti naturam referunt.

Hæc nulli, bi pñturis propoſui- mus, ſed ex offium delineationibus petitur, ex figuris ſcilicet ca. 31. & 33 lib. 1.

d. ſi. ca. i. X.

MUSCULORVM IN TIBIA ET PEDE SE-

dem obtinentium, & ligamentorum omnium quæ hætenus non reſecta ſunt, adminiſtrandi ratio, muſculorumꝑ qui tibiā & pedem occupant, numerus. Caput L XII.



Quot muſculi in poſteriori tibiæ ſede conſiſtant.

Quot in anteriori tibiæ ſede.

Quot in pede.

Adminiſtrati onis ſeries.

I modò omnes muſculos pedis ac digitorum motibus famulantes memoriae confirmandæ cauſa in ſuis ſedibus ordine recenſebis, in poſteriori tibiæ ſede, primū^a duo occurrent, à radice inferiorum femoris capitū ducentes originem, & ſuræ non medio crem portionem efformātes. poſt hos ſeſe exhibet^b qui totius corporis longiſſimum promit tendinē. Sub hoc ſuræ^c maximus, ſeu pedem mouentium quartus conſiſtit, in calcem ualidiſſimè cum nuper commemoratis inſertus. Huic ſuccumbit^d qui pollicis ſecundum internodium fleſcit, deinde^e qui quatuor digitorum tertij internodij fleſxionis præcipuus autor eſt. omnium autem intimus habetur, ^f qui pedem in poſteriora ducens, uni ex tarſi offibus implantatur: adeò ut iam omnes poſterioris tibiæ ſedis muſculi ſeptenarium conſtituant numerum. præter^g muſculum in poplite latitantem. Si enim & illum poſterioribus tibiā amplexātibus muſculis adnumerare uiſum fuerit, octo tunc in poſteriori tibiæ ſede conſtitues. In anteriori tibiæ ſede unā cum illis, ^h qui propriè externum ipſius latus occupant, ſex numero deſcripſimus. ⁱ Primus quidem, qui pedij offi pollicē ſuſtinenti inſeritur. ^k Secundus, qui quatuor digitos extendit, atꝑ huius^l portio, quæ in pedij os minimo prælocatum digito inſeritur, tertius erit. Aut ſi hanc portionē à ſecundo non diſtinxeris, iam duo duntaxat hætenus tibi in anteriori tibiæ ſede habentur. At age, tres eſſe dona, ac^m quartū enumera, cuius ope pollex extenditur. ⁿ Quintus uerò, qui fibulæ exporreſtus, pedisꝑ inferiora ſubiens, in os pedij pollicē ſuſtentans inſeritur. ^o Sextū autē, qui iam dicto ſuccūbens, pedij offi ante minimū colloca to implantatur. In inferiori pedis ſede^p ligamentū primū ſeſe offert, lati tendinis uicē gerens: poſtmodū^q muſculus ſecundum quatuor digitorū os fleſtens, deinde^r utrinqꝑ ad huius latera unus, hic quidem pollicē introrſum ducens in latus, ille uerò minimum extrorſum abducens. poſt hos in conſpectum ueniunt^s tendines, tertia quatuor digitorū internodia fleſtentes: quibus exporriguntur^t quatuor illi muſculi, quatuor digitos pollicis admouentes: omniū autē intimi illi conſiſtunt, ^u qui primos digitorū articulos fleſtunt. In ſuperiori autē pedis ſede illud duntaxat^x muſculoſum corpus reponitur, quod pollicē & tres illi proximos digitos in latus externū abducit. Ceterum hæc muſculorū ſeries, etiam ſectionis rationē cōmonſtrat, quam in eo crure conſpicaberis, in quo iam antè tibiā mouentes muſculos reſecuiſti. Per ſuræ itaqꝑ longitudinē ſectio in cute & adipe & carnoſa mēbrana ad calcem uſꝑ ducetur, deinde alia ab interno pollicis latere ad calcē uſꝑ, & hinc per pedis exteriora ad paruū uſꝑ digitiū tentabitur, adeò ut uniuer-

a 12 tab. 9.
b 13 tab. 4.
c 13 tab. 1.
d 14 ta. A.
e 14 tab. 3.
f 15 tab. D.
g 14 tab. 1.
h 2 ta. 10. V.
i 3 tab. 1.
k 4 tab. 1.
l 4 tab. 12.
m 5 ta. 9.
n 6 ta. 4.
o 6 tab. 1.
p 13 tab. 10.
q 14 ta. 10.
r 13 ta. 10.
s 14 ta. 10.
t 14 tab. 10.
u 15 ta. N.
x 6 tab. 12.

uniuersam tibiæ & pedis cutem auferre possis, ea tantum relicta quæ plantam induit. Quum primum igitur laniorum more hoc præstiteris, acutiori nouacula à calce cutem adimes, per adipem transuersis semper ductis sectionibus. In quo opere attento animo cutis connexus spectandus uenit, qui ad liuescentem perficitur^r sedem musculi secundum quatuor digitorum os flectentis, num scilicet tendo aliquis citra adipis interuentum cuti proximè adnascatur: ac deinde quum nullus erit tendo, cuiusmodi ligamentum id censere debeas, quod ego nunc primus lati tendinis in manu uices gerere dixi. Vbi hæc (adhibita sectioni quoque simia, aut si eius copia non detur, cane) hæc in pedis planta eo diligentius, quo ego hic tibi plura recensuerim paradoxa, intuitus fueris, ad tibiam te conferes, ligamento illo à musculo qui secundos quatuor digitorum articulos flectit, nondum derafo. Atq; hic omnium primum spectabis, qui ex tota excarni tibiæ ossis^r sede membraneū ualidumq; ligamentū prodit, quod pertinaciter omnibus in tibia repositis musculis obnascitur, & eorum summas superficies unà connectit, & ueluti uinculi usum præstat, cuius beneficio musculi in sua sede non errantes, continentur.

Mox nouacula, aut cultello à femoris inferioribus capitibus, duorum musculorum principia liberabis, quos primos in posteriori tibiæ sede dicebam occurrere. In horum capitum dissectione aliud nihil cauendum est, quàm ne cum externo musculo, tertij^b musculi caput ab externo femoris capite unà imprudens adimas. Illud enim capitulum opportunissimè seruetur, donec primos duos à quarto eo usque diuulseris, ut iam amplius communem illorum tendinem à quarto^c disseccare non ualeas. Reflexis itaque his duobus, tertij quoque caput liberabis: quod in manu sinistra assumens, à quarto^d musculo deorsum uelles: atque id citra negotium tantisper feceris, dum ad quarti musculi internum latus peruenias. hic enim cultello acutiori à subditis ad calcem usque est disseccandus. Dein ipsius insertio tanto accuratius est animaduertenda, quanto hæc in hominibus à simijs magis uariat. Hoc itaq; à calcis osse liberato, pedem mouentium quartum, & totius suræ maximum musculum suo exortu libera, & utrinque ad ipsius latus, quàm subditis incumbit corporibus, longam sectionem ducito, quæ membraneum id ligamentum inuolucrum ue diuidat, cuius auxilio musculos inuicem externa superficie connecti diximus. Siquidem ilico atque musculum suis lateribus & capite liberaueris, promptissimum erit illum à subditis ad calcem usque detrahere. Vt uerò accuratius insertionem spectes, profuerit illum proximè ab osse acutiori nouacula separare, & dein studiosè expendere, num fortassis aliqua tendinis huius portio latum in pede produceret tendinem. nam & id quoque semel Galenus uidetur innuere. Tempestiuum itaque erit, à^e musculo quatuor digitorum secundum internodium flectente, ligamentum illud abradere, quod ego tendinis lati uicem gerere protuli. Deinde sedulo à calcis osse, musculus ille liberabitur, qui paruum digitum in externum latus abducit, & statim ille^h qui pollicem in internum latus à cæteris digitis amouet, utⁱ musculus quatuor digitorum secundum articulum flectens sese offerat, isq; à calcis osse liberari queat, ac postmodum ad digitorum radices duci. In tendinum uerò ipsius administratione, pari modo ut in manu fieri præcepimus, cultello exiguo transuersum digitorum ligamentum secundum ipsius longitudinem diuides, ac deinde qualiter subditos tendines transmittant, atque in secundos articulos inferantur, spectabis, sectionem rursus ad tibiæ posteriora conferens. Iam enim in poplite latitans^k musculus adeò pulchrè occurrit, ut ipsius naturam non minus atque ego illam describere possim, intueri ualeas, & non oscitanter animaduertere integrum sit, num uel minimum tibiæ flexioni opitulari queat. Hæc intuitus, illum à genu articulo liberabis: & nisi articulum ad ligamentorum inspectionem seruare propositū sit, nihil prohibet à tibia femur liberare, quo cōmodius tibiam & pedem postmodum pertractes. Absceto igitur, aut relicto ut lubet femore, musculū secundum pollicis flectens internodiū, suo principio liberatum à subditis ad calcem usq; detrahes. Deinde & illum quoq; similiter auelles, qui tertium quatuor digitorum os flectit. Vt iam utroq; ad suos sinus deducto, transuersa ipsorum ligamenta, longa sectione diuidere, ac postmodum ipsorum x literæ instar in cubitum examinare liceat. Ille enim è uestigio obuius est, quū ex suis sinibus detractos tendines à pedis plāta deorsum reflectis: neq; ita duntaxat incubitus ille cōspicitur, imò etiamⁿ portiuncula se offert à musculi pollicem flectentis tendine, illi admixta tendini, qui tertium indicis internodiū flexurus est. Quinetiā hac administratione occurrunt^o musculi quatuor digitos pollici adducentes, quos à calcis osse liberatos atq; ad insertionē per ductos, unà cum tendinibus quibus illi porriguntur, adimere conuenit, ut^p carnea moles primos digitorum articulos flectens inspiciatur. quam ex tuo arbitrato, aut prorsus à pedij ossibus abrades, aut illis connexā sines. Iam^q musculus, qui adhuc in posteriori tibiæ sede reliquus est, quiq; pedis motibus famulatur, à fibula & tibiæ osse, & horum membraneo ligamento ad posteriorem usq; interni malleoli sedem liberabitur,

Ligamenti la-
tescentis tendi-
nis uicem sube-
untis.

Primi & se-
cundi mouen-
tium.

Tertij.

Quarti.

Lib. 2 de Ad-
mini. sectio.
Primi digitos
mouentium.
Decimi septi-
mi.
Decimiocta-
ui.

Musculi in
poplite latita-
tis.

Secundi & ter-
tij digitos mo-
uentium.

Musculorum
tres digitos
pollici adduce-
ntium, & pri-
ma quinq; digi-
torum ossa fle-
ctentium.
Quinti pedem
mouentium.

tur, ac peculiari ipsius transuerso ligamēto longa sectione diuiso, ad insertionem usq; musculus ille ducetur. Cæterum iam opportunum est, & anteriores tibiæ musculos aggredi, atque hîc omnium primum transuersum^r ligamentum sectione per longum facta diuidere conuenit. In quo opere magna tendinum congeries sese exhibebit, quorum (ut singulos ordine intuearis) primum tendinem attolles, pedem mouentium^s sexti. Huius musculi caput aliorum musculorum modo, ab exortu liberatum, ad insertionem usque ducendum est. quod mediocri sit negotio, si utrinque musculi latera ab ipsi connatis cultello aut nouacula diuiseris. Post hunc totus sese ostendit quatuor digitos extendens^t musculus, unâ cum portione illa, quam nonum pedem mouentium recensui. Vbi hic à tibia liberatus ad insertionem ductus erit, is aggredietur^x qui pollicem extendit, quem similiter à tibia liberatum ad insertionem ducere expedit. Superfunt in tibia^y duo pedis motibus famulantes muscoli, qui fibulæ exporriguntur. Horum sectio à^z ligamenti transuersi inter calcem & fibulam positi dissectione inchoabitur, & deinde tendinibus eleuatis, uniuersum musculorum corpus à fibula dirimetur, ut postmodum ipsorum insertionem liquidò uideas, ac demum^a musculos, qui superiorem pedis sedem occupant, suis principijs liberatos ad insertionem perducas, atque ita uniuersæ musculorum fabricæ unâ nunc mecum summam manum imponas, ac ligamentorum quæ adhuc reliqua sunt naturam spectes. Atq; horum omnium administratio proprium nihil, aut peculiare exigit. Si enim iam ligamenta ex latere ossis sacri, ubi quintum os sexto committitur, prodeuntia inspexeris, unâ cum^b membrana pubis ossis foramen occupante, integrum erit ilium os à sacro, impetu abruptum, & commissuram ambiens ligamen simul cum cartilagineis ligamentis intueri. Mox ad coxendicis articulum accedens, orbiculatim illum ambiens^d ligamentum acutiori cultello transuersim diuidito, atque eius crassitiem, sed præcipuè ortum & insertionē, inspicito. Si modò femur in exteriora modice duxeris, ex acetabulo ipsius caput elabetur, & teres^e ligamentum se spectandum exhibebit. Hoc transuersim dissecto, acetabulum accuratè obseruandum uenit, propter iam commemorati ligamenti insertionem, & id ligamentum quod sinum augere diximus. Priusquam uerò genu^f ligamenta administrentur, opportunum est perpendere, anteriori articuli sedi præter^g patellam, cum extendentibus tibiā tendinibus nullum ligamentum præponi. Id enim ubi constabit, exterius ligamentum à femoris capite liberatum ad fibulam deduces. Post hoc internum quoque à femoris interno capite liberatum, similiter uersus anteriora tibiæ dissecabis. Posterioris uerò regionis ligamentum opportunè à tibia dissectum, ad ipsius in femur insertionem perduces. Diuiso postmodum ambiente articulum ligamento, in latus tibiā postmodum reflecte, ac cartilagineum huius articuli ligamentum ad amissim expendito, &^h cartilagineas tibiæ ossis sinum augentes, ab articulo acutiori cultello adimito. Ligamenti, quod tibiæ fibulam alligat, natura, si ad cōmissuram id diuidatur, citra negocium conspicitur. Membrana quoque isthæc ossa, quæ inuicem distant, intercedens, sese iam citra ullam sectionem offert. Transuersa omnia modò dissecta sunt, atque iccirco superest duntaxat fibulam à tibia dirumpere, & ligamen ambo ossa colligans inquirere: dein acutiori cultello fibulam à talo, & postmodum à tibiæ ossē talum liberare. ita enim duo sese offerunt tali ligamenta, cartilaginis specie donata. Duo autem reliqua disces, si cultello talum ab ossē cymbam imitante diuiseris, & à calce talum abraferis: quod difficulter, idq; nisi acuto cultello perfeceris. Ad hunc modum reliqua pedis ligamenta aggredieris, nempe ipsis secundum ossium commissuras circumsectis. Quàm uerò concinnè hæc omnia à Natura sint formata, ex cuiusque ossis usu, & generali ligamentorum facultate, cuius notum esse arbitror. Quapropter neque hîc, neque alias sæpius ad summi rerum Opificis encomia digressus sum, ne eadem semper aut de musculis aut ligamentis repetenti, in nimiam molem hæc excreverent. Præcipuè quum nihil facilius sit, quàm prolixè in usus enarrationem excurrere, si modò actio à me semper descripta non lateat.

ANDREAE VESALII³ 157

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER TERTIUS, QVO VENARVM ARTERIA-

rumq; per uniuersum corpus series describitur, & peculiares ipsi

figuræ, quibus cōueniunt Capitibus præponuntur.

QVID VENA, ET QUAE IPSIVS SUB-

stantia & usus. Caput I.



a Ostendit
has 5. 6. 7 li-
brorum fi-
guræ.

b figura 5
ca. figura 6
ca.

SSIVM musculorumq; historia superioribus libris enarrata, proximum uidetur, uenarum arteriarumq; per uniuersum corpus distributionē aggredi: siquidem Galenus in primo de Administrandis sectionibus libro, hunc in Anatome discenda ordinē obseruandum rectē præceperit. Nam alius fortasse earum partium, quæ peritonæo & costas succingente membrana & caluaria cōtinentur, descriptionem, non uenarum modò ac arteriarum, uerùm & neruorū quoque descriptionem oportere necessariò præcedere, haud inepte arbitrabitur, quòd absq; earum partium notitiâ, omnis de uenis, arterijs & neruis sermo tam difficilis futurus sit, ut ego nequaquā improbauerim hunc librum, & quartū qui neruis dedicabitur, quinto libro, sexto ac septimo subiici, eosq; præsentem anteire. atq; id maximè, cū quis sectionum prorsus rudis in istos libros primū inciderit, & nō in nostra Epitome uel obiter sese exercuerit. Ne tamen longiùs in præsentia à Galeni & cæterorum qui ipsum præcessere dissectionis professorum placito declinem, hunc librum uenis arterijsq; consecrabo, à uenis, quòd plures sint, atque arterijs magna ex parte insternantur, sumpto sermonis exordio, liberaq; sententia lectori in nostris libris transponendis relicta. ^b Vena igitur pars est instrumentaria, teres, fistulæq; instar cauata, & uniuerso corpori sanguinem partes enutriturum unâ cum naturali spiritu insigniter (si quis modò sit) caliginoso deferens. Hæc unica peculiari propriâ ue cōstat tunica, quæ colore, crassitie & forma, membranis respondet, sed aliàs ab illarum natura plurimū difcrepat. Membrana nanque simplex ac simile corpus censetur, & omni ex parte quomodo- cunque discerpatur, perpetuò membranæ nomen retinet. Venæ autem tunica, corpus est instrumentarium, ex similaribus partibus, fibris uidelicet, cōformatum. Quemadmodum enim membranei musculorum tendines, ferè unico fibrarum genere intexuntur, atque hac occasione non in similarium, sed instrumentariarum partium classem reponuntur, ita uenæ tunica triplici fibrarum genere constituitur. Huiusmodi fibræ Græcis *ινδρ* nuncupantur, & substantia quidem, forma, & colore musculorum fibris respōdent, actione autem plurimū ab illis uariant. Hæ enim carne musculorum substantia oblitæ, arbitrario: illæ uerò nulla carne implicite, naturali motui præficiuntur. quippe ut motus è nostro arbitratu pendentes, fibrarum in musculis auxilio perficimus, sic naturales motus uniuerso corpori subseruientes, fibris quibusdam obeuntur, quæ organis toti corpori famulantibus intertextæ sunt. Quanquam naturales motus non omnes, sed materiæ duntaxat alicuius attractio, retentio & expulsio, huiusmodi fibræ adimpleatur. Voco autem in præsentiarum uim attractricem, retentricem & expultricem, non quæ singulis partibus ad sui nutritionem à Natura est ingenita, sed qua quædam corporis partes commune uniuerso corpori munus præstant. Etenim prorsus alia censetur attractio cibi per stomachū in uentriculum, & sanguinis è caua uena in dextrum cordis sinum, & aëris ex arteria uenali in sinistrū cordis sinum, & seminis in uterum, & sanguinis in uenas, & spiritus in arterias, quàm attractio, cuius beneficio partes illæ nutrimentum sibi familiare, & quo priuatim aluntur, ad sese pelliciūt. Rursus longè alia excretrix facultas est, qua uentriculus cibum à se cōfectum in intestina propellit, & qua rursus intestina superiora eundem in inferiora protrudunt, & qua cor sanguinem in pulmones ac uitalem spiritum simul cum sanguine impetu per corpus ruente in magnam arteriam mittit, & qua sanguinem una uenæ pars in subsequen- tem cōtinuò deriuat, & qua uterus foetum & uesica urinam excernunt: quàm ea sit, qua nunc dictæ partes proprii nutrimenti recrementa à se abigunt. Ad hæc, prorsus alia putatur cibi potusq; in uentriculo, & foetus in utero, & urinæ in uesica, & sanguinis in uenis, & spiritus in cor-
de

Quid tertio li-
bro docendū.

Quid uena.


Venæ corpus
in quo à mem-
brana diffe-
rat.

Fibrarū quæ
naturali mo-
tui præstant;
ab ijs quæ ar-
bitrario famu-
lantur diffe-
rentia.

Fibrarum species & functio.

de retentio, quàm ea sit cuius beneficio cor, uentriculus, uesica, uterusque familiare nutrimentum sibi seruant, & retinent. Motus igitur omnibus partibus proprii, atque alijs non subministrantes insita partibus duntaxat ui, citra fibrarum opem omnino fiunt. Sed partes quas aut attractionem, aut retentionem, aut expulsionem partibus alijs, uel toti etiam corpori administrantem & commodam subire necessum est, ad eam functionem fibras quasdam sibi uendicant, quarum auxilio illam complent. Et quemadmodum tres specie sunt motus, ita quoque triplex fibrarum genus à Natura constructum est, rectum uidelicet, obliquum & transuersum. Ac rectæ quidem fibræ attractioni conducunt, obliquæ autem retentioni, transuersæ expulsion.


Rudis fibrarum delineatio, in qua A transuersas indicat, B autem & C utriusque obliquarum generis differentias, D uero rectas. At E triplicis fibrarum generis implexum quodammodo exprimit, quem mox subiicienda uenæ effigies accuratius proponet.



Rectæ enim sunt, quæ secundum organi longitudinem expanduntur. Obliquæ autem, quæ secundum obliquum organo obducuntur. Atque hæc circulares sunt: sed quum in duplici sint differentia, inuicem contrariantur, ac se mutuò x literæ, aut potius duorum inuicem implexorum circulorum modo decussatim intersecant, ita commodè quicquid organi cauitate compræhenditur, retinētes. Transuersæ secundum corporis latitudinem exactè transuersim locantur, corpusque orbiculatim, quemadmodum obliquæ, ambiunt, quanquam interim transuersæ, circulares orbicularesque priuatim nuncupentur. Discet porro quiuis fibrarum naturam (si modo molestius duxerit hominē hoc solo nomine aggredi) quoties uentriculus, aut intestina alicuius animalis mensæ apponentur, si unguibus uentriculi & intestinorum fibras inuicem diuellere, eaque corpora nihil præter certas quasdam fibras inter se ordine, & prout

Venæ compositionis usus.

Venæ caue portio à dextro cordis sinu ad ingulū usque conscendens, qua fibrarum in uenarum corpore naturæ doctriinæ gratia studiose finximus. Si forte interim ramorum hic passim abtruncatorum rationē expetis, hanc



Afficitia & non peculiaris uenæ tunica.

uenæ portione integra caue uenæ delineationi quinti

ca.

Capitis fini subiicienda confer, in illa quid D, F, G, H, I, K, N, S, T, & a indicent perpendens.

ad se admissuram, rectas illi cōmunicauit fibras, quibus uena sanguinem in ipsius alliceret cauitatē. Deinde quia sanguinis ad subsequenter uenæ partem tanquam per riuum propulsione opus erat, transuersis quoque fibris eam donauit. Ne uero statim uniuersus sanguis in proximam uenæ partem citra moram ex alia assumeretur propellereturue, obliquas etiam fibras uenæ corpori implicuit. Ex tribus itaque fibrarum generibus uenæ corpus instar albæ membranæque seu neruæ tunicæ conflatum est, distendi & rursus (ut contentæ materie appositè congruat) in se collabi aptum. Præter hanc peculiarem tunicam, uena aliam subinde affiscit, plerisque etiam corporis partibus communem. Quandocunque enim uenæ longo tramite aliquò ducuntur, aut ossi, aut duriori cuiuspiam corpori incumbunt, aut alicubi suspenduntur, tum membrana illis

ueluti alia peculiaris tunica obtenditur. Huiusmodi tunica uenæ per uniuersum corpus induuntur, quoties extra uiscus aliquod, aut musculi corpus eminent, nec uisceri aut musculo intexuntur. Tunc enim semper ex cōterminis membranis alia quædam tenuis tunica ipsis obuoluitur, cum tutioris ductus, tum ad uicinas partes firmioris nexus gratia. Cæterum uenæ corporibus quibusdam insertæ, ac in illis propagatæ, huiusmodi tunica nequaquam indigent, quod abundè in illis corporibus firmentur, quodque ea tunica impedimento esset, quo minùs promptè sanguis ex uenis sudaret, aut ut sanguis in uenis collectus, substantiæ alicuius uisceris uim tardius experiretur. Et hac potissimum ratione in nulla corporis parte, uenæ neque tenuiorem adipiscuntur suam peculiarem tunicam, neque in plures diffunduntur soboles, quàm in iecoris substantia, quæ succum in uenis contentum in sanguinem mutatura, suisque recrementis liberatura erat. Omnes uenas ratione primaria ut sanguinem singulis corporis partibus deferant, rerum Opifex procreauit: quanquam quibusdam earum ramis, ut portæ uenæ propagi

Venarum usus.

c figura ca. 5.

a fi. 6 ca. 9.
et fi. 22 li. 1
m, n.

nibus, ad cibi in uentriculo elaborati ad iecoris portas attractionē, ceu alijs ad excrementorum (ut^d quæ in renes seorsum sanguinem deferunt) repurgationem abutatur, quas omnes suo loco commemorabimus. Num uerò ipse (ne sanguis frustra nullam à uenæ corpore elaborationem sentiens, per uenâs deflueret) quandam sanguificationis uim uenâs indiderit, non adeo promptè assertum uelim, etiamsi id omnibus confessum sit dissectionis proceribus. & si fortassis hæc uirtus uenâs tribuitur, ea nō rubicundum parabit sanguinem, sed uenæ corporis modo album, siquidem in omni naturali corporis nostri partium cōcoctione, concoctum necessariò sibi concoquentis colorem asciscit. Verum iam tempestiuum erit, ex quibus nam partibus arteria fabricetur, persequi.

Li. 4 de Vfu
par.

QV ID SIT ARTERIA, QV AEQVE ipsius substantia & usus. Caput II.

a figura ca.
12.



b fi. 38 ca.
lib. 1.

ARTERIA uas est similiter ut uena membraneum, teres ac fistulæ modo cauum, quo uitalis spiritus, & tenuis flauus calidusq; sanguis per uniuersum corpus diffunduntur, quorum beneficio, ac dein arteriæ ipsius motu (qui dilatatione ac contractione fit) naturalis singularum partium calor uitalisq; spiritus refocillantur. Porro Hippocratis adhuc, & Platonis, & Aristotelis tempore, arteria nuncupabatur, qua inspirantes è naribus aut ore aërem in pulmones attrahimus, quæq; rursus expirantes è pulmonibus eundem educimus. Nobis uerò uocatas arterias, illi uenas appellabant: atque arterias à uenâs nonnulli ea ætate distinguébant, quum has quidem non pulsantes, illas autem pulsantes dicerent. Ad hunc sanè modum Hippocrati arteria uenæ nomine donatur, cuius agitatio, quum in infantis partu uelox & magna & ualida reperitur, ualidam ac uegeto feruidoq; calore præditam in corde irascibilem uim esse testatur. Cæterum alijs arteriæ nominabantur, uenæ flauum & spirituosum, ac per corpus impetu diffusum & tenuis subtilisq; substantiæ sanguinem uniuerso corpori deducentes. Ita enim Platoni arterias uenas uocare libuit, quando in Timæo attestatur, cor simul & uenarum fontem esse, & sanguinis qui per omnia membra uehementè circumfunditur. Nam quum uasa pulsantia (inquit Galenus) nondum, ut nunc, arteriæ dicerentur, sed tantū illam sic ueteres appellarent, quæ ex ore in pulmones diuaticatur, iure Plato ut distingueret, quarum uenarum cor esse sanguinem uellet, sanguinis qui per omnia membra impetu defertur, meminit. Aristoteles autem in libris de Animalium partibus, & eorundem historia, subinde arterijs uenarum nomen elargitur. Nam ut reliqua præteream loca, is magnam arteriam cauæ uenæ comparans, in tertio historiæ de Animalibus illam minorem uenam crebrò appellat. Sed successu temporis eam quæ ex ore in pulmones per


Quid arteria

Li. 2 Morbo
rum uulga.

In libris de
Placitis.

“
“

tingit, asperam uocare ueteres cœperunt: uasa autem pulsantia, naturalemq; calorē recreantia, læues nuncupauere. Verum nunc sola quæ ab ore in pulmones diffunditur, suum nomen seruauit, asperaq; arteria uocatur. Arteriæ itaq; similiter ac uenę membraneo cōstant corpore, cōprimi ac in se collabi, & rursus distendi idoneo: at longè solidiori, duriori, ac ex pluribus tunicis cōformato. Arteria enim duas peculiare sibi uendicat tunicas, quarum exterior profectò robore ac crassitie uenarum peculiari tunice respondet, interior autem plurium dissectionis procerū suffragio, crassitie huius ferè quintupla: ac postmodum totum arteriæ corpus ad uenam collatum sextuplum censetur. Hæc tunica quibusdam, quia durior & quauis membrana longè crassior sit, *χονδροειδής* seu cartilaginea appellatur. Vnde etiā Arabes forsitan arteriā neruum pulsatilem uocauerunt. Tunica arteriæ similiter ut uenæ, fibris cōformantur: ac interior quidem transuersis duntaxat intertextitur, exterior uerò rectis, & quibusdam mediocriter obliquis, transuersis autem nullis constat. Interior arteriæ tunica, ceu cutem quandam internæ intestinorum & uentriculi superficiiei modo continet, latæ continuæq; araneorum telæ mani-



Arteriæ magnæ quæ ex corde pronascitur portio, quam dissectâ apertamq; finximus, ut arteriæ hic cōspicerentur tunica: ac A quidem locum indicat, in quo potissimum ea occurrat tunica, quam araneæ telæ assimilamus. B autem & C interiorē notant arteriæ tunicam. Numerus autem ille 1, 2, 3 insinuat tres membranas magnæ arteriæ orificio præfectas, ac in decima sexti libri figura B, C, D notandas. Hic uero E & D duarum coronalium arteriarum originem ostendunt. Foramina autem in arteriæ trunco ad uertebrae deorsum deflexo conspicua, earum propaginum sunt ora, quæ costis, dein septo, & alijs ad renes usque organis digeruntur. Verum hæc suo loco erunt dilucidiora. in præsentem enim figuram arteriæ tunicas obiter adnotare uisum fuit.

Arteria cor-
pus quale, &
duæ ipsius pe-
culiæres tuni-
cæ,

festo

*Afficitur ar-
teriarum tuni-
ca.*

*Arteria con-
structionis ra-
tio.*

nifesto per similem, in grandioribus quidem arterijs conspicuam, ac à nonnullis tertiæ arteriæ tunicae loco descriptam. Quarta uero alia peculiaris nulla est, sed ueluti quibusdam uenarum, ita quoque arterijs alicubi membrana tenuis obhaerescit & circumtenditur contegens, aut stabilis, aut connectens ipsas proximis partibus, quemadmodum de altera uenarum tunica retulimus. Atque hæc omnia iustissime à summo rerum Opifice sunt extructa, qui in hoc arterias (uti in Capitis initio dicebam) formauit, ut illæ uitalem spiritum & sanguinem impetu per corpus diffusum, singulis partibus deducerent, ingenitumque calorem recrearent. Fibras enim arteriæ corpus, eiusdem quo uenæ usus gratia fortitur, ac plurimas quidem transuersas exigit, ut ocyus ipsi ex sinistro cordis sinu immixtum sanguinem & uitalem spiritum toti corpori dispenseret, neque alium in transmittendo recipiendoque rhythmum, quam cor ipsum efficiat. Ad hoc nanque munus magnopere transuersæ conducunt, quas expulsionem à Natura præfectas esse dudum asseruimus. Obsunt autem expulsionem insigniter obliquæ, ut quæ materias retineant ac referuent. Vnde etiam Natura paucissimas obliquas arterijs elargitur. Quæ quum tenuiorem rarioremque & uelociori impetu ruentem substantiâ, quam uenæ, erant amplexuræ, ac dum uiuit animal perpetuo dilatandæ cōstringendæque, merito etiam durioribus & crassioribus pluribusque tunicis conformantur.

*c patet in 9
et 10 figu-
lib. 6.*

QVIS VENARVM ET ARTERIARVM numerus. Caput III.



*Quatuor ue-
næ.*

Duæ arteriæ

*Naturæ ar-
tificium in ue-
narum arteri-
arumque serie.*

VOT in uniuersum corpus uenæ, & item arteriæ deriuentur, si uniuersæ soboles uasorumque omnes distributiones enumerandæ sint, indicare arduum prorsus est, atque propemodum impossibile. At si uenæ arteriæque propriam exigentes circumscriptionem, ac ueluti proprijs terminis finitæ, duntaxat numero quodam sint complectendæ, in procinctu est numerus. In natis enim absolutisque hominibus omnes uenæ ut plurimæ quaternario numero comprehenduntur, quæ cæterarum omnium radices censentur. Atque una ex caua iecoris sede prodiens in bilis uesiculam, uentriculum, lienem, intestina, mesenterium & omentum excurrit. Secunda ex gibbis iecoris, aut ut quibusdam uisum est ex dextro cordis sinu originem sumens, in reliquum corpus solis duntaxat exceptis pulmonibus, innumera ramorum serie dispensatur. Tertia, ex dextro etiam cordis sinu nata, frequenti admodum propagine in pulmones digeritur. Verum hanc uenam hoc sibi peculiariter uendicare audies, quod arteriarum constet corpore, unde etiam arterialis uena nuncupabitur. Quarta ab umbilico in iecur, ut sic dicam, producit, ac ad foetus nutritionem duntaxat animali famulatur, neque hinc in uenarum numero recte haberi potest, uixque propria circumscriptione donatur. Ab his itaque uenis reliquæ omnes quæ in corpore occurrunt originem mutantur, eisque continuæ sunt. Arteriæ autem numero binæ censentur, una quæ ex sinistro cordis sinu originem capiens, in uniuersum corpus præterquam in pulmones, dispergitur. Altera ex eodem cordis sinu pronata, in solos pulmones distribuitur: quæ quia uenæ corpore constat, uenalis arteriæ nomen obtinuit. Porro duæ arteriæ ab umbilico secundum uesicæ latera descendentes, ac foetus quodammodo propriæ, cum magnæ arteriæ propaginibus iuxta ossis sacri regionem uniuntur, quare etiam propriarum arteriarum loco neutiquam recensendæ ueniunt. Cæterum si foetus uenæ & arteriæ priuatim sibi aliquid uendicent, id suis locis ubi foetus uasorum tradetur historia, fiet obuium. iam enim operæ precium est à perfectorum uenis exordium sermonis sumere, ac singularum enarrata distributione, ipsarum usum diuicationisque rationem subiungere. Verum quoniam singulis corporis partibus arterias uenasque deduci oportuit, nonnullæ autem partes procul ab horum uasorum initijs distant, longè optimum fuit, neque tot numero ramos ex principijs originem sumere, quot corporis sunt partes huiusmodi uasis indigentes: neque omnino multos: sed summopere expediebat maximæ organa caudicum instar unoque principio deduci, & ab illis in proximas partes ueluti ramos propaginesque deriuari, à quibus singulæ partes, quod sibi familiare sentiunt, in nutritionem allicerent.

*a 5 ca figu-
ra et 12 fi-
li. 5 b.*

*b figura 6
capiti præ-
posita. et 5
fi. li. 6 C, D,
E.*

*c patet in 7
et 8 fi. li. 6.
d 1 fi. ca. 15.
et 6 fi. li. 6
1, et 3 fi. C,
D.*

*e 1 fi. ca. 15
B, C.*

*f fi. cap. 11,
et 2 fi. lib. 5
F.*

*g fig. capituli
12 præposi-
ta. et 10 fi.
lib. 6 A.*

*h 2 fi. ca. 15.
et 9 fi. li. 6
C, C.*

*i 2 fi. li. 5 K,
L. et ca. 12
fi. 1.*

DE GLANDVLIS, VASORVM DIDVCTI- bus roboris gratia immixtis adnexisque. Caput IIII.

PRÆSENTI Capiti figuram non duxi præponendam, quod quamplurimæ huc simul locari debuissent quinti ac sexti et septimi librorum formæ, præter aliquot etiam musculorum

sculorum tabulas, ad quas à Capitis contextu, dum alicuius glandulae mentio incidet, opportune remitteris.



ICVT Natura uenae & arteriae præter proprias ipsarum tunicas, aliam subinde membranam circundedit, cuius beneficio opportunè contermi-
nis partibus alligetur, tutoq; prorepat: sic quoque quum minimè ignora-
ret unumquodq; uas inibi noxijs opportunè expositum esse, ubi in ra-
mos discinditur, tutae fissionis gratia, præter eiusmodi membranas, sub-
stantiam quandam mediocriter mollem modicèq; cedentem condidit,
qua nodorum in arboribus ritu, uasorum diuaricationes, sic passim reple-

Cur, & quan-
do uasorum di-
stributionibus
glandulae im-
mittuntur.

uit, hancq; ramorum scissionibus substrauit ac circundedit, ut nulla ipsarum facile findi, uel in-
ualida fieri possit. At quoniam per motum uiolentiorum uasorum diuaricationes iniurijs po-
tissimum patent, & super molliac mediocriter cedente substantia opportunè uasa quiescunt,
& demum huius auxilio quamuis moueantur uehementius, impercussa integraq; custodiuntur,
Natura haudquaquam ut fors ferebat, singulis uasorum distributionibus huiusmodi substantiam
interiecit. Quandoquidem hæc paucissima, aut nullam propemodum diuisionibus, quæ neq;
suspensæ feruntur, neque articulis qui in acutum angulum flectuntur extenduntur ue incum-
bunt, comunicauit, quod illas uasorum partitiones ex uiolento motu nihil passuras ei perspectum
esset. Verum ubi diuisiones quapiam membrana suspensæ, aut super articulos, qui in acutos
mouentur angulos longius porriguntur, eaq; plures in istiusmodi sedibus numero habentur,
Natura hanc de qua agimus substantiam non mediocri copia circumdedit, uti per uniuersam
portæ distributionem est cernere, quod hæc nimirum uniuersa membranæ duntaxat suffulta
ad uentriculum, lienem & intestina excurrit. Pari insuper ratione in^b membranæ amplitudinè
thoracis intersepientibus, & in^c cerebro super cerebri testes (quod inibi suspensæ ferantur uenae)
hanc substantiam pro creatâ ex cõsectione doceberis. Sub superiori uerò pectoris ossis sine, sub
^dauribus, ad^e asperæ arteriæ caput, in axillis, in cubiti flexu, in inguinibus, in poplite & alijs
nonnullis corporis sedibus, propter adiacentium partium motus & numerosam uasorum di-
stributionem, eiusmodi substantiam diuisionibus interijci, in sermonis progressu ostendam.
Substantia hæc communi nomine Græcis *αδλω* & *δυνος* dicitur, Latinis glans & glandula &
glandium, estq; omnium corporis partium summè imbecillis, ac fluxionibus imprimis obnoxia.
Haud enim decuisset partes reliquis uiliorem corpori usum præstâtes, cæteris ualidiores esse,
imò deiectis uiribus præditas & recrementis excipiendis aptiores creari. Cæterum non omnis
huiusmodi corporis substantia, colore, forma, nomine, duritia sibi respõdet, quædã enim mol-
lior, rubicundior, & quercinæ glandi forma prorsus dissimilis est, qualis ea censetur^f quæ prin-
cipio gracilium intestinorum non procul ab inferiori orificio uentriculi exporrigitur: & ea^g quæ
in elatiori inferioris membranæ omenti regione sub uentriculo cõsistit. Hæc quia rubicundior,
idq; potissimum in canibus, & mollior & undiq; sibi similis uisitur, à carne Græcis *ωάγκρα* &
καμίνεον nuncupatur.^h Quæ uerò in iugulo sub pectoris osse habetur, iam dictæ propemodum
specie respõdet, & à Græcis *θύμος*, à Latinis autem cõmuni uoce glandiū appellatur. Cæterum
quæ in reliquo corpore passim occurrit, & nuper dicta durior est, glandis quercinæ imaginè
quodammodo accedit, & peculiare nomen in quibusdam corporis sedibus obtinet. Cuius ge-
neris in cerebro^k glans pineæ nucis imaginè referes, & forsitan in mesenterio^l lactes seu per id
distributæ glandes censi possunt. Verum hominis fabrica etiã alijs donat glandulis ad alios
usus, quàm ad uasorum firmam distributionem procreatis: in quarum numero^m glans habetur, cere-
bri pituitâ ad palatum defluentem excipiens, ⁿ tonsillæ^o glandes laryngis radici adnatæ, ^p glando-
sum uirilis uesicæ ceruicis corpus, cui semen deferentia uasa inferi docebimus, quodq; uasorum di-
uaricationi uix quicquã auxiliatur. Cuius uerò potissimum usus gratia nuper cõmemoratæ glan-
des paratæ sint, suis locis abunde persequar. hinc enim suffecerit glandes cõmemorare uasorum
distributioni præfectas, ex quibus nonnullæ non solum uasis præfunt, uerum etiã aliquæ mea-
tibus humectandis præterea idoneæ censentur. quemadmodum glandes in mesenterio repõsi-
tæ, & quæ duodeno intestino exporrigitur, ut intestina lento humore imbuant, progenitæ à dis-
sectionum professoribus creduntur. Aliæ rursus replendis sinibus & cavitatibus etiã sunt ac-
commodæ, ut^q quæ in faucibus omnium infimæ, & sub aurium radice consistunt, & quæ axil-
larum & ^ringuinum cavitates infarciunt. ^s Quæ autem in mamillis habentur, præterquam quod
lacti generando subseruiunt, etiam uasorum partitiones utcunque firmant ac roborant. At de
his omnibus, uti paulo antè innuebam, suis locis affatim disseremus, oratione ad uenarum se-
riem nunc properante.

Glandosæ
stantia non
ac imbecillitas.

Glandularum
differentia a
nomine, colore
& imagine.

Ab usu.

Ad finem se-
cundi de Semi-
ne Galenus.

*VENAE PORTAE ORTVS, IPSIVSQUE
propaginum series. Caput V.*

VENAE PORTAE AB VNIVERSIS QVI-


**BVS COMMITTITVR PARTIBVS LIBERAE, INTEGRA
delineatio, in ea proportione expressa, ad quam secundum praesentem fi-
guram aliquis iecur, bilis uesiculam, uentriculum, lienem, omen-
tum, mesenterium & intestina ex illorum magnitudi-
ne, ac insuper in suo situ depingeret.**



**NVDAE VENAE PORTAE DELINEATIONIS
characterum Index.**

A, A etc. QVINQVE his characteribus portae uenae propagines indicantur, per iecoris
corpus diffusae, & hic ueluti iecoris formam secundum cauam ipsius sedem exprimentes.
1, 2, 3, 4, 5 Numerus iste quinque portae uenae ramos (nisi subinde etiã pauciores sint) notat, ex quibus ipsius
caudex quodãmodo proximè cõstituitur, aut in quos is primum in iecoris substantiam digeritur.
Venae

- B Vena portæ, quæ primum à iecoris substantia libera & amplissima cernitur.
- C, C Duo ramusculi bilis uesiculam in caua iecoris sede positam adeuntes.
- D Vena ad posteriorem inferioris uentriculi orificij sedem excurrent.
- E Hac sede uena portæ in duos maximos bipartitur truncos.
- F Truncus sinister & elatior. G Truncus dexter & humilior.
- H Vena dextram fundi uentriculi sedem perreptans, & geniculatim illi sedi ac superioris membranae omenti dextræ parti ramulos præbens.
- I Vena duodeno intestino & ieiuni principio exprompta.
- K Ramus in dextram regionem gibbi uentriculi quæ id dorsum respicit, aliquot surculis digestus.
- L Vena in dextrâ sedem inferioris omenti mēbranae & colum intestinū quæ hac fertur excurrēs.
- M Soboles quædā à sinistro trunco in glandosum corpus inferiori mēbranae omēti innatū, sparsæ.
- N Vena insignis sub uentriculo, ubi dorso is innititur, uersus elatius ipsius orificiū oblique conscen-
- O, O dens: quò priusquam pertingat, utrinque unam educit propaginem O insignitam, & in uentricu-
- P lum hac sede qua dorso incumbit, digestam. P uerò præsentis uenæ reflexum per dextrum orifi-
- Q cij uentriculi latus in anteriore uentriculi sedem: Q autem reliquā præsentis uenæ seriē notat, quæ instar coronæ id orificium amplexatur. Vmbra qua hanc uenam aliqua ex parte ornaui-
- mus, hic ut in reliquis uenarum & neruorum arteriarumq; delineationibus uenæ partem in po-
- steriora & in magis recondita deductam interstinguit, ab illa quæ in priori seu anteriori sede oculis subijcitur, aut oculis propinquior est.
- R Ramus uenæ superius uentriculi orificium ambientis, qui secundum elatiora uentriculi proce-
- dens, inferiori orificio surculos exhibet, soboles etiam satis frequentes in progressu ad antero-
- ra posterioraq; uentriculi dispergens.
- S Grandis utcunque uena in inferiorem omenti membranam & colum intestinum quæ uentriculo exporrigitur, numerosa sobole procurrent.
- T, T Sinistri truncidiuaticatio, ubi is iam lienem est accessurus.
- V Venula in sinistram sedem inferioris membranae omenti distributa, cuius radicem in integra fi-
- gura (quod subinde desit) duntaxat delineauimus, eius seriē hac peculiari figura quam margini
- adhibemus exprimentes, in qua T uenam, quæ lienī exporrigitur, cōmonstrat utrinq; abtrunca-
- tam. præsens uerò uenula V insignitur.
- X, X Vena ab illis quæ elatiora lienis petunt, in sinistram uentriculi latus dispensata.
- Y Eiusmodi etiam uena hic, qualem utrunque X indicabat, insignitur.
- Z Vena in sinistram fundi uentriculi sedem perreptans, multasq; soboles uentriculo superiori-
q; omenti membranae offerens.
- a, a, a, a His characteribus uenarum in lienis substantia distributio indicatur, adeo frequens, ut lienis imaginem facile ostendat.
- b, b, b Prima dextri portæ uenæ trunci in mesenterium series. Hæ in mesenterium digestæ uenæ qui-
- busdam meseraicæ ac mediæ & lacteæ nuncupantur.
- c Vena colo intestino quæ recto continuatur, exporrecta.
- d, d Vena sub recto prorepens intestino indicatur, unâ cum ramulis intestino in uenæ progres-
- su digestis.
- e, e Venularum soboles, recti intestini finem amplexantes. Præter hanc figurā cuius modò cha-
- acterum indicem absolui, aliæ complures quinto libro dedicatae, huc reponi possent, quibus illa
- exprimuntur organa, in quæ portæ soboles diffunduntur. Præcipuè autem huc spectarent secun-
- da, tertia, quarta, decima, duodecima, decimatertia, decimaquarta, decimaquinta. Quinetiam
- huc maxime facit, figura ex horum librorum Epitome sumpta, quam ad præsentis libri calcem
- in alia quadam in hoc subnectam, ut uenarum & arteriarum mutua series oculis obuersare-
- tur. Quotiescunque igitur in interiori Capitis contextus margine simplex character ponetur,
- illum ad nudam quam huic Capiti præposuimus figuram refer. reliquos autem ad eas figuras ad
- quas illos spectare adiiciemus, ac proinde manifestioris doctrinae gratia ultimam præsentis li-
- bri figuram totius libri contextu notabimus, ulti. fi.



Portæ ramo-
rum in iecoris
substantia se-
ries.



Portæ caudi-
cis extra ie-
cur distribu-
tio.

Ad bilis uesti-
culam.

Ad uentricu-
li humilioris ori-
ficiū.

Portæ caudi-
cis in duos
præcipuos
truncos se-
ctio.

Ad dextram
uentriculi fun-
di sedē, & ipsi
proximam o-
menti partem.

Ad duodenū
intestinum.

Li. 4 de Vsu
par.
Sinistri trun-
ci series.

IECORIS substantia ab omnibus^a demissioribus & quæ orbicula-
tim consistunt extremis ipsius partibus^b exiguae admodum numerosæq;
uenarum propagines incipiunt, quæ uersus iecoris medium porrectæ, sen-
sim in maiores soboles, & inde in grandiores adhuc tantisper coeunt, do-
nec omnes (quæ profectò sunt quàm frequentissimæ) in^c quinque, interdum
etiam in pauciores ramos colligantur, qui in caua iecoris regione uersus
eius medium, ad interiora tamen & posteriora, iuxta dorsum magis uniti,
^d unam grandem & impenſe amplam constituunt uenā, quæ nobis portæ uena nuncupabitur.
Hæc ad eum modū ex iecoris cauo enata, aut (si nō minus uerè quàm clarè loqui uoles) omnes
nuper dictos ramos, soboles & propagines in iecoris substantiā dispargēs, oblique deorsum
uersus sinistrum procedit in multos uenarū surculos, ad bilis uesiculā, uentriculū, intestina, lie-
nem, omentum, mesenterium, hac serie digesta. Primum^e duos ualde exiguos ramulos ex supe-
riori, seu anteriori sui corporis parte (non autē latere) bilis uesiculæ ceruici distribuit, qui eam
ceruicem amplexātes, ac in surculos capillorū modo prætenues diducti, in uniuersum uesiculæ
corpus eo pacto excurrūt, quo in^f alba adhærentē ue oculi tunica, uenulas porrigi cernimus.
Post hos aliquanto inferius ab elatiori quoq; & anteriori uenæ corporis sede, uersus dextrum
tamen latus magis^h alius ponitur ramus, nuper^h commemoratis insignior, qui humilior uen-
triculi orificium & uentriculi portionem huic iuxta dorsum proximam aliquot ramulis adit,
nulla prorsus sobole anteriorem uentriculi sedem perreptās. At portæ uenæ caudex deorsum
magis protensus, postquam hos diffudit ramos, in duos maximos bipartitur truncos, quo-
rum elatior (quem & sinistrum doctrinæ studio opportunè nominabimus) propemodum u-
niuersus in uentriculum, & omentum, & quandam colī intestini^k regionem, quæ secundum
humiliorem uentriculi sedem fertur, deinde & in lienem absumitur. Alter, qui & humilior &
grandior est, ac dexter meritò appellabitur, totus penè in mesenterium & intestina exhauritur.
Ab huius nanque dextro latere iuxta ipsam caudicis portæ in duos truncos distributionem,
ut cunqueⁱ insignis uena uentriculo exporrigitur, quæ omenti membrana superiori suffulta, &
sub dextra uentriculi fundi sede transuersim producta, ^m exiguas frequentesq; uenulas certo or-
dine, ac quodammodo geniculatim uentriculo diuaricat, qui & anteriorem & posteriorem fun-
di uentriculi regionem multa sobole aliquouſq; intertexunt. Hæc uena ubiⁿ ad mediam fundi
uentriculi sedem processit, in quosdam exiguos ramulos finitur^o illi uenæ cōtiguos, quam non
multo post reliquam fundi uentriculi regionem occupare audies. Porro quemadmodum hæc
uena plurimas uenulas ex elatiori ipsius sede seriatim uentriculo offert, ita quoque innumeras
uenularum soboles per totam dextram superioris membranæ omenti regionem diffundit, illis
ferè numero correspondentes, quas in uentriculi fundum spargi paulo antè dicebam. Verum
præſens uena^q interdum, neque id sanè infrequēter, à portæ uena supra quam illa in duos gran-
des truncos bipartitur, originem obtinet, imò quandoq; à^r sinistro portæ trunco non semel
hanc ipsam pronasci obseruauimus. Quemadmodum uero hæc subinde in ortu uariat, ita
etiam^s uena quæ ipsam subsequitur, non idem semper principium exigit. nunc enim à dextro
dextri trunci latere, nunc uerò à latere dextro uenæ portæ caudicis priusquā is in duos eiusmo-
di truncos dirimitur, uena quædam originem ducit, quæ^t primum intestinorum quod duode-
num uulgò uocamus, numerosa serie implicat. Hæc enim intestinum ad mediū ferè ipsius lon-
gitudinis primum contingens, deorsum ad reliquam intestini longitudinem paulo ultra ieiuni
principium exporrigitur, & superiori membrana omenti & glandoso corpore huic intestino
adnato suffulta, geniculatim intestinorum sedi, quam perreptat, ramulos dispergit, non negli-
gens interim glandosum quo sustinetur corpus. nam & illi, & omenti regioni quæ prorepat,
surculos quosdam impartitur. Cuius uerò naturæ illud corpus sit, in Capite præcedente execu-
tus sum: quanquam idem rursus in quinto libro Galeni nomine, qui falso id^v inferius uentri-
culi os cōprimere ac occludere opinatur, agendum erit. Hic enim sermo reliquæ, quam portæ
uena molitur, distributioni dedicandus est. ^z Sinister itaque portæ truncus transuersim ad in-
feriorem omenti membranā, quæ hæc posteriori uentriculi subijcitur regioni, properat, hæc
omenti sede dein & ^z glandoso corpori huic membranæ innato sustinetur, apteq; suffulcitus
in plurimas notatu dignas soboles digeritur. Non procul enim ab ea sede, quæ à portæ caudice
truncus iste discinditur, inferioriq; omenti membrana implicatur, ab elatiori ipsius regione
^b uenam germinat, quæ non admodum frequenti ramorum serie in gibbum uentriculi, quæ
dextram dorsi sedem id spectat, diffunditur. Ab humiliori autem trunci sede, ^c alia diducitur ue-
na, nuper dictæ quodammodo in ortu respondens, quæ deorsum in dextram inferioris omenti
membranæ regionem surculos aliquot deriuat, & quibusdam ramulis in colum intestinum,
quæ

d 12 fi. lib. 5
I, K, L, M,
N, O.
b A, A, A.

c cha. 1, 2,
3, 4, 5.

d B, & 12
fi. lib. 5 h &
20 fi. l.
e à B spar-
gerentur A,
A, A.

f C, C, & 13
fi. lib. 5 g ad
V. aut ab I
ad H fi. 20.
g 18 fi. cap.
14 li. 7. u. u.
h D, 15 fi. li.
5 a.

i E partitur
in F, & G.
h 6, 8 fi. lib.
5, à P ad Q.

l H. 14, 15
fi. li. 5 c. &
2 fig. R. &
4, 5 fi. o. o.
m 2 fi. lib. 5
V. 4 fi. p. p.
n 2 fi. lib. 5
ad T.
o Z.
p 2 fi. lib. 5
X. 4 fig. q.
q.
q ut o ab l
m 4 fi. lib. 5.
r ab F.

s I. & aliter
4 fi. lib. 5 r.
12 fi. h.
t 7 fi. li. 5, l.
K.

u 7 fi. lib. 5
L.
x 12 fi. lib. 5
i. i.

y 14, 15 fi.
li. 5 H.

z E.

a 4 fi. lib. 5
x, x.

b K. 4 fi. li.
5 u. 15 fi. b.
c L. 4 fig.
lib. 5 x.

qua hac omenti membrana id continetur, præsens uena pertinet. Porro ulterius in sinistri trunci uersus lienem progressu, præter^d exiguas soboles quas priuatim glanduloso ipsum suffulcanti corpori elargitur, ab elatiori sua sede^e uenam promit omnium uentriculum adeuntium facile capacissimam. Hæc inferiori quoque omenti membrana continetur, & oblique sursum uersus sinistrum sub uentriculo quâ dorso id innititur prorepens, mox in ascensu huic uentriculi sedi^f duos communicat ramos, utrinque singulos, in hanc uentriculi sedem multis etiam surculis dispersos. Reliquâ uenæ sursum ad^g elatius uentriculi orificium, per uentriculi posterio-
d inter Ket N supra, in fra M. e N. 4. fi. li. 1. 2. 14. 15. fi. d. f O. O. g 14. 15. fi. lib. 5. G. h P. i Q.
 ra exporrectum, ad dextrum orificij latus ad anteriora ipsius orificij^h emergit, & totam anteriorem sedem ambiens, secundum sinistrum eius latus denuò in posteriora retorquetur, ac ut semel dicâ coronæ prorsus modo uentriculi superius orificium concinnèⁱ perreptat, in progressu rectâ deorsum in uentriculi corpus ramos geniculatim offerens, qui magnam uentriculi sedem occupant. A superiori autem sede, uena hæc ramulos etiam diffundit, sed exiguos prorsus, & in stomachi terminum, quâ is uentriculo continuatur, excurrentes. Porro inter cæteras propagines, ab hac uena coronæ ritu uentriculi elatius orificium succingente exortas^k utcunque insignis uena ab ipsa pronascitur, quâ à posteriori uentriculi regione secundum dextrum orificij latus antrorsum contendit. Atque hæc propago à dextro eius uenæ latere nata, secundum superiorem uentriculi sedem, inferius uentriculi adit orificium, id frequentibus utcunque uenis amplexans, & in progressu geniculatim ramos in priorem posterioremq; uentriculi sedem spargens. Iam commemoratæ uenæ tot propaginibus in uentriculum pertinenti, alia respondet, ab humiliori sede sinistri uenæ portæ trunci prodiens, ac inferiori omenti membranæ implicita, quæ non ita longè ab initio in duos ramos plurimum ab inuicè discedentes bipartitur, ex quibus denuo quamplures furculi deorsum prorepunt, & in coli intestini partem (quæ inferioris membranæ omenti beneficio tanquam à mesenterio ad dorsum committitur) excurrentes, & nonnullis propaginibus inserti in partē inferioris membranæ omenti, quæ intestinis incumbit, ac ueluti à colo intestino pronascitur. Atque hæc quidem de hominibus me hætenus dixisse arbitrator. nam à sinistro portæ trunco ne minima quidem soboles canibus ad colum intestinum digeritur, uti etiam in ipsis colum intestinum nulla ex parte omento alligatur, adeò ut neque mirandum sit, si hac orationis serie interdum à Galeni placitis recedam, qui simi-
k R à P. 14. fi. lib. 5. e l s. 4 fig. lib. 5. Y. m T. T. n Spectata bulas fi 19. lib. 5. o 4, 4, 4. p v. 4 fi lib. 5. d. q s. r X, X. 14. 15 fi. li. 5. g. s Z. 2. fig. lib. 5. S. 4 fi. 3. t X. u H. x 2 fi. lib. 5. T. y Y. 14 fi. lib. 5. g. g.
 arum uenas, uti ipse etiam ad Antisthenem scribit, ex professo docens, hominum uenas non persequitur. Cæterum postquam sinister portæ truncus commemoratas eduxit propagines, ad lienem transversim accedens, in^m duos ramos secatur, qui rursus in alios partiuntur, atque hi denuò in alios tantisper dirimuntur, quousque numerosa ramorū serie inⁿ cauam simam uenæ lienis sedem recta linea secundum totam lienis longitudinem inferiori membrana omenti perpetuò suffulti implântentur, atque^o infinita sobole uenulas oppidò quàm graciles inuicemq; implexas, per uniuersum lienis corpus digerant. Ab infimo ramo, lienis inferiora petente, priusquam sinister portæ truncus in frequentissimas soboles illas dispargatur, interdum^p tenuis uena prodit, quæ in sinistram inferioris membranæ omenti sedem uno atque altero furculo dispensatur: idq; tunc potissimum, quando primus^q maioris in humiliorem omenti membranæ pertinentis uenæ diductus angustior est, quàm ut commodè uniuersæ membranæ inibi ramos communicet. Præterea à ramo quopiam ex illis qui ad superiorem lienis regionem repunt, quum is iuxta lienem consistit, uena exoritur, quæ dextrorsum lata, atque omenti membrana superiori intertexta, in eam uentriculi sedem pertingit, quæ elatiori lienis sedi propinquior uisitur. Hæc quandoq; sed rarius, in uentriculi tunicas adeò excurrit, ut non admodum procul à sinistra sede superioris orificij uentriculi distet. quod autem hæc uena illud contigerit, uidi nunquam. Neque etiam præsens uena ab elatissimo lienem adeuntiu ramo promitur, sed ab illo qui ferè huic proximus est. Quemadmodum uerò hæc iuxta eminentiorē lienis partem principium ducit, sic à maiusculo ramo imam lienis sedem accedente, alia exurgit uena utcunque insigni amplitudine donata. Hæc perinde atque nuper^r dicta dextrorsum retorquetur, & sinistram uentriculi fundi regionem perreptans, illi accuratè conuenit uenæ, quam ad fundi^s medium usq; dextram eius sedem amplecti retulimus. Ambæ enim ad hoc medium in exiguos definunt ramulos, mutuoq; implicantur. Dein sinistra perinde ac dextra in sinistram fundi uentriculi sedem furculos geniculatim antrorsum retrorsumq; dispergit, ac superiori membranæ omenti in sinistram ipsius partem oblongas frequentesq; soboles communicat. Cæterum canes ea quam fundi uentriculi dextram sedem adire commemorauimus, destituuntur: & illius uicem ea supplet, quæ sinistram fundi sedem ramis conserit. Atque ad hunc modum frequentissimè sinistram portæ uenæ truncum absumi spectabis. nō rarò autem ad huc in hominibus ex singulis uenis concauæ lienis regioni iam inferendis, singulas uenas in uētriculum ad eum modum
h 3 digerit,

In lib. de Venarum & arteriarum sectione.

Dextri caudicis portæ trunci series.

Vena portæ distributionis ratio.

Portæ nomina.

Li. 6 de Placitis.

digeri, ac lienem uentriculo pertinaciter colligari comperies, quo^z duas nuper commemora-
tas à uenis lienem accedentibus propagari scripsimus. Atque hîc sedulo obseruandum uenit,
huiusmodi uenas ab eis quæ lienem accedunt in uentriculum digestas, neque distributionis
forma, neque colore, neq; implantationis specie, quicquam ab alijs in uentriculum excurren-
bus uenis differre.^a Dexter uenæ truncus (quem in intestina potissimum diffundi narrabam)
quà primum mesenterio à dorso nascenti committitur, in^b tres præcipuos diffinditur ramos:
qui in alias denuò innumeras uenarum soboles diuaricati, inter duas mesenterij membranas
producentur, atque inferiorem posteriorem ue intestinorum partem quæ mesenterio alliga-
tur, & quam dissectionum professoribus cauam uocare libuit, amplectentes, in ieiunum, ileum,
cæcum & dextram coli sedem, qua id dextro reni & iecori adiacet, finiuntur. Quot uerò ab his
diffindantur soboles, quum prorsus sint innumerae, dictu est arduum: dein nō omnibus ean-
dem distributionis exhibent seriem, quamuis (uti diximus) ad intestina illæ propagines excur-
rant. A tertio dextri portæ trunci ramo, qui in sinistram partem medijs mesenterij potissimum
diffinditur,^c insignis uena in^d sinistrum mesenterium, quod colon à liene ad rectum usque in
testinum dorso alligat, porrigitur, atq; nunc dictis uenis in intestina diffusis similiter, in plures
deriuata furculos, eam coli regionem, quæ à uentriculi sinistra sede ad rectum usq; intestinum
pertinet, adit. Inter omnes sinistri mesenterij uenæ ramos,^e unus insigni magnitudine inter
duas sui mesenterij membranas (quæadmodū cæteri omnes rami) intertextus, secundum coli
finē deorsum sub recto intestino prorepit, multas uenulas ex superiori anteriori ue ipsius sede
ad eam intestini partem, qua porrigitur, depromens. Præfens ramus quum ad recti intestini
extremum usque contendit, non amplius rectā sub intestino deducitur, sed in^f plures utcunq;
exiles diffusus ramulos, finem recti intestini orbiculatim amplectitur. Porro & si frequentissi-
mæ sint trium nunc dictorum dextri portæ trunci ramorum soboles, tamen plures numero-
sioresq; in gracilia, quàm crassiora intestina distribui, cuius ex dissectione obuium est. Quo
enim intestina uentriculi fundo sunt magis continua, eo pluribus uenarum implicantur furcu-
lis, quoniā ex illis plus succi quàm ex sedi uicinioribus sit exugendum. Quemadmodum uerò
nōnullis prius enarratis uenæ portæ ramis^g corpora quædā glandulosa atq; ad amissum quo-
dammodo carnea attendi circumduciquæ dicebam, sic etiam ramorum per mesenterium ad inte-
stina diffusorum sectionibus,^h glandulæ quædam interiacent, proportionem in magnitudine
cum distributis propaginibus seruantes. In grandioribus enim propaginū diductibus (quem-
admodum ubi dexter portæ truncus in tres primos ipsius ramos finditur) magnæ reponuntur
glandulæ, in subsequen-
tibus uerò horum ramorū diuaricationibus graciliores minoresq;. Hu-
iusmodi quoq; glandulæ, capillorū modo prætenues uenulas, à uenis quas interiacent mutuan-
tur. In has igitur propagines portæ uena digeritur, quæ omnes aut ad nutritionem, aut excre-
menti alicuius expurgationem, aut in uentriculo excocti cibi in iecoris portas deductionem,
propagatæ censentur. quippeⁱ quas bilis uesiculæ oblatas dixi, alimentū illi subministraturæ
ad eam excurrunt. Pari modo^k propagines numerosa sobole in omentum diffusæ duntaxat
ut illud enutrient, multoq; adipe imbuant, à portæ uena deriuantur.^l Propagines lienem peten-
tes rerum Conditor fecisse conijcitur, ut simul lienī alimentum deferant, atq; ex iecore fœculen-
tum sanguinem seu melancholicum succum in ipsum expurgēt. Quum enim crassius sanguifi-
cationis recrementum his propaginibus in lienem uehatur, & quum hæc illud lienī porrigant,
simul quoq; necessariò lienī nutrimentū offerūt. siquidem, ut in quinto libro, nō sine religione
tamen quadam, scripturus sum, lien atrum illud sanguificationis recrementum in sui nutritio-
nem conficit, & lien per^m uenas ab illis quæ lienī inferuntur in uentriculum profusas, quod ipsi
ex fœculentiori sanguine reliquum est, neq; sibi concoquere ac adaptare ualet, in uentriculum
eruclat. uerū id nō (ut dissectionum professores malè arbitrātur) in superius uentriculi orifi-
cium diffundens, sed ad fundū præcipuè, quòⁿ maior uena à uenis lienem adeuntibus exorta,
in uentriculū pertinet.^o Surculi capillorū modò tenues ad glandia in hoc à rerū Opifice dedu-
cuntur, ut illa à portæ ramis alimentū colligāt. Cæterū^p reliquæ omnes portæ propagines
in uentriculū & intestina digestæ, duplici nomine extruuntur, partim ut illis nutrimentū submi-
nistrent, partim ut suis finibus & osculis in uentriculum & intestina hiantibus cōfectum à uen-
triculo cibū ex ipso ac intestinis exugant, atq; ad iecur tanquam cōcoctionis officinā toti huma-
no corpori cōmunem transferant. Ingressus autem & ascensus in hanc regionē, ex multis, quæ
nunc narrauimus, strictis itineribus unus præparatur, ipsæ nimirū portæ uenæ^q caudex, quem
ueterum quispiā Naturæ operū peritus ante Hippocratem *πύλας* nuncupauit, à quo in hunc
usq; diem portæ uenæ nomen ad nos manauit, ipsaq; (ut & Galenus testatur) à nōnullis porta
iecoris, ab alijs ianitrix appellatur, uerū nonnulli totā uenam hoc nomine donari nolunt, sed
partem

a G. 4. fi. li.

5 t. 12 fig. k.

b, b, b, b. de

inspecta 10.

11, 13, 14 fi.

lib. 5.

c, c, c. 12 li.

5 n.

d 11 fi. lib. 5

R, S, T.

e d, d, 9 fi. li.

5 h, k.

f, e, e.

g 4, 5 fi. li.

5 n, n, 12 fi. i.

h 10 fi. lib. 5

l, M, 14

fi. G, F.

i C, C.

k 4 fi. lib. 5

q, r, x, y, d.

l T, T.

m x, y, z.

n Z.

o M.

p D, I, K.

N, G.

q B.

partem ipsius duntaxat, quæ primùm à iecoris substantia cernitur libera. Dicitur & caudicis nomine *σπληνῶνα*, quod etiā nomen Galenus interdū cauæ uenæ quæ iecori est proxima, & præterea magnæ arteriæ, quæ à corde pronascit, tribuisse uidet. Dein portæ uena ab alijs etiā iecoris manus nunc cupat, quod iecur ea ad elaborati in uentriculo cibi attractionē tanq̃ manu utatur. Sunt qui lacteā appellēt, quod succus quē hęc ab intestinis iecori defert, lacteus sit. Porro uenā portæ, succū eū quē uentriculo, præcipuē autē ex intestinis ad se allicit, atq̃ in iecur defert, iecoris modo in ipso deductu concoquere, ac eidem præparare, & in rudem sanguinem mutare haud facile concessero: quantumuis grauius id in quarto de Vsu partiū libro Galenus asserat. Nullam enim sanguificationis uim mēbraneo & coriaceo uenæ corpori assignare possum: & si quæ esset, illa profectò album pararet sanguinē, non secus quàm à uentriculo emutata, lacteū colorem referunt, uti & uentriculi substantiā albam. non autem iecoris modò concreti sanguinis instar rubram esse liquidò cernimus. Atque hoc Galeni placitum non semel ab ipso repetitum altius refellerem, nisi Galenus ipse sexto de Dogmatibus Hippocratis & Platonis eam mutasset sententiam, sup̃ius, quo acrius Aristotelem oppugnaret, oblitus. ^{s. d. d.} Ramum portæ, quē sub recto intestino decliuem ac mesenterio suffultum porrigi scripsimus, nonnunquam ad fæculenti sanguinis per anī uenulas, sanguine interdum manantes, expurgationem plurimum conducere arbitror. Quandoquidem dum aut ob lienis obstructionem, aut aliud quodcunq̃ ipsius uitium, fæculentus sanguis non uniuersus, uel nullus planē in lienem absumitur, uel lien eundem ad uentriculum eructare nequit, huius rami beneficio certis quibusdam interuallis, uti mulierum menstruæ purgationes solent, per anum excerni credo. Rarius enim ex uniuerso corpore hæmorrhoidum uitio laborantibus ad uenæ cauæ ramulos in sedem pertinentes, lutosum eiusmodi sanguinem regurgitare uerisimile nobis uidetur, dum ueram uenæ portæ distributionem perspectam habemus. Quippe ex hac coniecturari est promptissimum, quī is sanguis à liene non attractus, aut ob meatuum obturationem non admissus, unde fluebat rursus regurgitet, atque sua grauitate per ramum ad intestinum rectum pertinentē deorsum procumbat, ibi que tantisper reseruetur colligatur que, donec nimium turgentes uenæ osculis referatis per anum manare illum sinant. Huic meæ sententiæ magnum robur adiecit is quem hoc sanguinis defluxu per interualla laborantem rescuimus. Huic enim minor, sed durior lien fuit, & uena sub recto intestino excurrent, pollicis quasi crassitiem superauit, eoq̃ modo sanguine turgēbat, quo iam parturientium animalium uenas uterum amplexantes, insigniter amplas distensasq̃ cernimus. Verū hęc paulo latius à nobis relata sunt in epistola, qua dextrā axillarem in laterali morbo (si modò dextram aut sinistram feces, quicquam inter sit) aperiendam docui, ac proinde nunc ad uenæ cauæ seriem est accedendum: nam portæ uenam secandi modum ad finem Quinti libri reiiciendum duxi, in quo omnium nutritionis generationis que organorum administrationem unā persequar.

*Portæ uenā
sanguinem nō
conficere.*


*Melancholicum
succū per
portæ ramos
purgari.*

CHARACTERVM TOTIVS VENAE CAVAE DELINEATIONIS, QVAM SVBSEQVENS pagina proponit, Index.

FIGVRA, quam in proxima reponemus pagina, quatuor Capitibus seriatim subsequentibus communis est, proportionēq̃ illi correspondet, qua integram arteriæ magnæ seriem ante duodecimum huius libri Caput, ac dein dorsalis medullæ neruorum distributionem ante undecimum quarti libri Caput exhibebo. quæ in ea uirilīs corporis magnitudine (quemadmodum & hęc uenæ cauæ figura, & musculorum & ossium simul compactorum tabulæ) depinguntur, quam huic papyro (quæ regalis uulgò dicitur) accommodam fore putauī. Verū si cuiquam postea uisum fuerit, eiusmodi nudas uenarum, arteriarum, & neruorum icones aut ex proportionē, ut clariores reddantur, augere (uti in mea Epitome factum cernis) aut propter chartæ angustiam, seu potius ob typographorum sordes & auaritiā imminuere, id unum moneo & rogo pariter, ne quis has figuras circumscribens, aliam hominis imaginē illis adiiciat: quemadmodum plagiarij quidā profectò, ex quibus hanc uenarum seriem sedula dissectione collegissem dignissimi, in meis Anatomicis tabulis Argentinæ impressis tentarunt. Hęc enim circumscriptio, et si multis rationibus negociū uitiet, ob id tamen etiā respuenda est, ne omnes uenæ hac expressæ figura in una tantum corporis superficie digeri, ac anteriori tantū parti peculiare esse uideantur: potissimum quum nemo tam rerum ignarus in his Naturæ mysterijs operam nauet, qui in

INTEGRA ET
PARTIBVS
nuda uenæ

AB OMNIBVS
LIBERA AC
cauæ delineatio.



hac proportionem non cernat quam totius corporis superficiei sedem singulae uenae perreptent. Quinetiam ex quinti, sexti & septimi librorum figuris facile constabit, cuiusmodi illae debeant esse effigies, quae cum uenis etiam partes quae illis implicantur oculis subiiciunt.

- A, A, A** Tres isti characteres propaginem notant à uena caua ubi iecori adnascitur, in iecoris gibbum passim perquam numerosa ramorum serie sinistrorsum distributam. Alteram autem propaginem in dextram iecoris sedem similiter diffusam characteribus non insigniuimus, uti etiam nullas uenae cauae soboles, quae pariter utrinque habentur, & priuatim nihil in altero latere sibi uendicant, ne fortassis characterum copia delineationem obscuraremus. Vnde etiam dextrum latus potius quam sinistrum characteribus liberum conspicitur.
- a** Huiusmodi etiam gracilior soboles à caua iecori sub grandibus illis propaginibus **A** indicatis digeritur.
- B** Venae cauae sedes inter iecoris gibbum & septum transuersum consistens.
- C** Sinistra propago duarum, quas caua septo offert, & à quibus etiam surculi in cordis inuolucrum pertinent.
- D** Cauae uenae orificium in dextrum cordis sinum pertinens. Optarim hic sedulo expendere, uniuersamque cauae delineationem accurate contemplareris, consideraturus an ne uerius hoc orificium cauae uenae principium ueniat statuendum, an ea cauae pars ubi **A** & **a** in ipso caudice scriptum cernis, & ipsa uena secundum iecoris posteriora deorsum prorepat, cuius etiam gratia in dextrum latus incuruatur, tantum scilicet, quantum iecoris sedes, cui cauae caudex committitur, ad dextrum latus à uertebrae medio declinat.
- E** Vena coronae modo cordis basin amplectens, ac deorsum per cordis substantiae exteriora ad ipsius usque mucronem surculos à se deriuas, & sequentia seu coronalis nuncupata. Haec & si ab anteriori sede orificij uenae cauae hic oriri uideatur, perpetuo tamen quum simplex sit, à posteriori sede eius orificij pronascitur, uti in septima sexti libri figura ad **G** est cernere.
- F, F** Vena coniugis expers, quae à cauae dextro latere prodiens, decliuus secundum dextrum uertebrae latus ad secundam ferè lumborum uertebrae descendit.
- G, G** Characteres isti hic atque illic ad uenae pari carentis latera repositi, uenae illius propagines in sinuant: eas nimirum quae costarum offeruntur interuallis, ac postmodum in dorsalem medullam, & in musculos uertebrae ipsiusque costis instratos, ac etiam membranas thoracis amplitudinem intersepientes, surculos promunt.
- H** Cauae sub pectoris ossis elatiori sede iuxta iugulum bipartitio, quam lanij boues & porcos iugulaturi petunt.
- I** Vena primae thoracis costae innixa, atque ad alam transuersim perducta, brachijque axillarem postquam aliquot propagines diffudit constituens.
- K** Exilis uena in sui lateris aliquot superiorum costarum succingentem membranam soboles deriuas.
- L** Vena sub pectoris ossis sinistro latere ad abdominis usque superiora descendens, ramosque uerarum costarum cartilaginum interuallis, ac demum thoracem intersepienti sui lateris membranae, ac etiam musculis pectori instratis, & abdominis cuti ramos exhibens. Praecipuum autem ramum sub recto abdominis musculo dispergit, qui supra umbilicum in aliquot finiens surculos, alterius
- M.** uenae ab imo sursum ascendente, ac **T** notandae terminos respicit, ea nimirum sede, ubi **M** ascripsimus.
- N, N** Vena per foramina transuersis processibus uertebrae cervicis insculpta, ad caluariam properans, ac dorsali medullae geniculatim ramos offerens, ut & in musculos quoque inibi cervicis uertebrae adnatos, soboles dispensat. Qua uero ratione haec uena in duram cerebri membranam exhauriatur, etiam si hanc hic quoque delineare conatus sim, in peculiari de cerebri uasis figura decimoquarto Capiti praeposenda non minus discas, quam reliquarum caluariam petentium uenarum seriem.
- O** Vena musculis humiliores cervicis, & superiores thoracis sedem iuxta uertebrae occupantibus, multiplici utcumque sobole exporrecta.
- P** Vena ad musculos pectori instratos, & huius regionis cutem, & ipsam demum mamillam excurrentem.

Q Vena

- Q** Vena in posteriora thoracis proficiscens, ac in cauam scapulae sedem uicinosq; musculos deriuata. Huic proximae sunt uenulae in glandium axillae excurrentes, quarum hic una inter **P** & **R** expressa est.
- R** Propago secundum thoracis latera deorsum ducta, & potissimum distributa in musculum, quo posterior axillae cauitatis sedes constituitur, brachiumq; in posteriora deorsum uellitur.
- S** Interior iugularis, quae graciles surculos asperae arteriae lateri & hac deductis neruis spargit. quod uero ipsius praeter aliquot propagines reliquum est, in caluariam prorepat, & uarie ut in cerebri uasorum descriptione prosequar, discinditur.
- T** Exterior seu superficialis iugularis. Verum iugularias uenas (quae Graecis *σφαγιτιδες* uocantur) nonnulli appellant, quae statim in thoracis amplitudine sub summa pectoris ossis sede bipartita caua producuntur. Alij non totas illas, seu integros eius diuisionis truncos iugularias uenas nuncupari uolunt, sed id demum quod ex ijs iam supra clauiculas ceruici intextum cernitur. In Arabum interpretibus iugularias ita fere appellatas legimus: Guidez, Guades, & corrupta Graecorum uoce grandes, sphragitidas, iuueniles, pensiles, organicas, subeticas, uertiginosas, apopleticas, uenas somni. Atque ita tam interiores quam exteriores appellitant. & has quidem patentes, illas uero immerfas & occultas nuncupant. Porro exterioris iugularis seriem, ut plurimum mihi apparuit, hic delineatam habes, ut scilicet simplex per colli latus prorepat, surculos tantum aliquot in conterminas sedes diffundens.
- V** Exterioris uenae iugularis iuxta fauces in duos ramos distributio.
- X** Exterioris iugularis ramus oris interiora subiens, ac uarie in laryngem & hyoidis ossis musculos, linguam, palatum, narium amplitudinem, ac demum in caluariam tribus propaginibus, ac etiam aliquot surculis in oculos digestus.
- Y** Exterior ramus diuisionis externae iugularis iuxta fauces factae, qui numerosa uenarum serie in faciei musculos & cutem, deinde ad tempora & post aures uniuersamq; capitis cutem digeritur.
- Z** Ac **Z** quidem portionem huius rami **Y** notati insinuat, quae in faciem exporrigitur. **9** uero, **9.a.*.** frontis uenam indicat. **a**, portionem secundum tempora sursum repentem. & ***** eam notat, quae post aures & ad occipitis cutem fertur. Caeterum reliqua uenarum hic in capite series ad cerebri uasa spectat: quam ob id characteribus non insigniui, quod haec peculiaris figura decimoquarto Capiti praeposenda explicabitur. Quanquam interim si quis hanc cauae uenae effigiem characteribus occupare uoluerit, ad eum modum quo nos illam finximus, quae huius libri adhibebitur calci, uenas simul cum arterijs ostensura: primum characterem apponere licebit dextro lateri, ut is dextrum seu primum mihi sic appellandum durae cerebri membranae sinum hic quasi instar semicirculi porrectum indicaret. Secundus uero character sinistro, seu secundo eius membranae sinui inscriberetur, qui in sinistro latere semicirculi quoque modo fertur. Tertius autem character tertio durae membranae sinui adhiberetur, qui illic incipit, ubi primus & secundus sinus seu duo illi semicirculi inuicem congregiuntur, & ubi ab ipsis alius semicirculus quodammodo sursum exporrigitur, cuius posterior pars occipitio propinquior adumbrata cernitur, anterior autem quae frontem adit lucida. Quartus autem durae membranae sinus, quem ex anteriori sede trium dictorum sinuum concursus pronasci, atque recta antrorsum duci suo loco audies, hic non est delineatus. In figura tamen huius libri calci insuta, **y** insignitur. Praeterea tribus illis characteribus quartus succederet, qui in primi durae membranae sinu radice positus, ingressum indicaret uenae **N** notatae: deinde ingressum rami interioris iugularis etiam insinuaret, qui per foramen sexti neruorum cerebri paris caluariam subit. Quinto caractere internae iugularis ramus per proprium foramen in latera durae cerebri membranae excurrentis insigniretur. Sextus rami exterioris iugularis notaret, qui proprio foramine ad radicem posterioremque sedem processus mamillaris temporum ossis exsculpto, caluariam subit. Ad haec praeter alios characteres etiam unus illis uenulis inscribi posset, quae sub frontis uena **9** insignita hic umbratae feruntur, ut scilicet uenae etiam indicarentur, quae per calariae sedem cui olfactus organa incubunt, & per foramen secundi neruorum cerebri paris gratia celatum, in caluariam repunt. Atq; haec omnia sane adnotauissem, nisi illa in grandiori figura decimi quarti Capitis fuisse propositurus. quanquam etiam cerebri uasorum seriem absque arterijs minime liceret aggredi, quandoquidem

dem in illos duræ mēbranæ sinus nō uenæ modò, sed & arteriæ exhauriantur, ipsiq; sinus non minus arteriæ quàm uenæ fungantur munere. Verùm interim non improbauerim & hanc uenæ caua delineationē, uti iam monui, characteribus quibusdam à studiosis insigniri, iam in cerebri uasorum serie ex huius libri decimoquarto Capite, & ex septimo etiam libro eruditis: aut, ut antè dixi, exemplum sumentibus, ab ea figura quæ ad huius libri calcem insuitur, ac nuper commemorata seriatim literis t, t. u, u. x, x. s. e. l. u, exprimit.

- a, a Vtrunque a uenam humerariam indicat, uerùm superiori a ipsius exortus ab externa iugulari T notata, radix significatur. inferius autem a humerariæ sedem notat, qua iam humeraria ex alto in brachij superficiē cutemq; emerget. Huius uenæ nomina paulo post absoluta manus characterum narratione, propter Arabum interpretum uoces subiiciam.
- b Humerariæ propago ab ipsius elatiori sede non procul ab exortu in posteriores ceruicem occupantium musculos, ipsamq; huius regionis cutem sparsa.
- c Humerariæ etiam propago, in gibbam scapulæ sedem frequenti utcunq; sobole excurrens.
- d, d Venæ ab humeraria, priusquam ipsa penitus sub summo humero contorquetur, pronatæ, ac in summi humeri sedis cutem & superficiem musculi brachium attollentis, interdum quoque & ad mamillam digestæ.
- e, e, e Tenuēs uenulæ ab humeraria in externæ brachij sedis cutem, anterioremq; regionem musculi cubitum flectentium prioris propagatæ.
- f Humerariæ iuxta externum humeri tuberculum in tres ramos partitio, qui nunc inuicem amplitudine æquales, nunc inæquales uisuntur.
- g Primus humerariæ tripartitionis ramus in altum immergens, ac sub musculorum ab externo humeri tubere pronatorum capitibus aliquousq; excurrens.
- h Secundus dictæ nuper tripartitionis ramus, qui sub cute deorsum obliquè ad mediam sedem flexus cubiti deductus, cum axillaris uenæ ramo t notando coit, ac cum illo uenam communem constituit, cui æ ascriptum est.
- i Tertius humerariæ tripartitionis ramus, per radium in externam cubiti regionem obliquè contendens, ac uenulas passim in proximam ipsi cutem dispergens. inter quas ferè præcipua k insignitur, quam ad exteriorē cubiti articuli sedis cutem ad posteriora quodammodo digerit. Quando præsens ramus in eum modum obliquè repens, ad brachialis usque radicem è regione ap
- l. pendicis ulnæ pertingit (nimirum ubi hic l spectatur) axillaris uenæ propaginis x notandæ soboles ipsi commiscetur, ac una ab hac axillaris sobole & humerariæ ramo uena consurgit, brachialis & postbrachialis sedem sub paruo digito, ipsumq; adeo paruum digitum & quodammodo anularem, uaria ramulorum serie accedens.
- m Axillaris uena, cuius nomina paulo post recensebuntur.
- n Axillaris uenæ ramus, in capita deriuatus musculorum cubitum extendentium.
- o Ramus nuper dictis musculis & posteriori brachij sedis cuti exporrectus.
- p Insignis propago obliquè deorsum sub humero uersus exterius humeri tuberculum ducta, quæ musculis hinc principium ducentibus ramos exhibēs, aliquousq; in externam cubiti sedem cum quarto brachium petentium neruo fertur.
- q, r Axillaris uenæ in duos truncos distributio, quorum alter binis q insignitus in alto semper totoq; ipsius ductu occultitur, ac prorsus pari modo cum manus arteria digeritur, quam in totius magnæ arteriæ figura. duodecimo Capiti præponenda licebit intueri. Alter uerò axillaris truncus (cui r inscribitur, & quæ tota orationis serie nobis axillaris uocabitur) passim sub cute excurrit, ac in uarias soboles dispensatur. Cæterùm hanc axillaris uenæ distributionē interdum etiam altius fieri quàm hic delineauimus, obseruabis: unde etiam tanto minus Galeni descriptionibus eam conuenire animaduertes.
- s Venæ ab axillari in anterioris brachij sedis cutem, & nonnihil quoque in posterioris sedis cutem digesta.
- t Anterior axillaris uenæ ramus, eius diuisionis quæ hic iuxta interioris humeri tuberculi cutem est conspicua. Præsens ramus t insignitus, obliquè ad mediam cubiti articuli flexus sedem sub cute fertur, ac cum humerariæ ramo h notato coiens, communem efformat uenam æ indicatam.

u Axillaris

- u *Axillaris iuxta interius humeri tuberculum bipartitionis posterior uena, quæ plures easdemq̃ uarias à se soboles diffundit.*
- x, x *Posterioris uenæ u notatæ ramus, qui sub ulna deorsum ad brachiale porrigitur, & passim in conterminam ipsi cutem digestus sobolem offert humerariæ ramo brachiale iuxta minimum digitum conscendenti.*
- y *Vena in posterioris articuli cubiti sedis cutem excurrent.*
- z, z *Notatur multiplex uenarum series, in interioris cubiti sedis cutem diffusa, & dein in interioris summæ manus sedis cutem excurrent. Verum superius z uenam notat ab axillaris uenæ ramo t insignito principium ducentem. Inferius autem z indicat propagines, quas axillaris uenæ ramus x & x insignitus internæ cubiti regioni offert.*
- q̃ *Venularum Veneris monticulum implicantium cum ramo d notando coitus. est nanque ramus is propago illarum uenarum, quæ externam manus summæ sedem inter pollicem & indicem perreptant.*
- a *Vena communis ab axillaris ramo t & humerariæ ramo h conflata, quæ per internam cubiti sedem deorsum oblique radium conscendens exporrigitur, ac tandem radium supergressa in exteriorem cubiti sedem propter inferiorem ipsius regionem excurrit, ramulos quosdam in progressu ad proximam ipsi cutem dispergens.*
- β *Communis uenæ iuxta radij humiliorem partem, qua brachiale respicit, diuisio, γ aut Y aut γ. A non absimilis: cuius quidem alterum crus γ insignitum, externam summæ manus sedem pollicis ac indici subiectam, ipsumq̃ pollicem & indicem accedit, & ramulum d indicatum in internam manus sedem digerit. Alterum autem crus e insignitum, uersus medium & anularem potissimum absumitur. Ramis externam summæ manus sedem adeuntibus uaria à nostris medicis imponuntur nomina, quæ quum inter se admodum pugnent, & passim sint obuia, aliquid de ipsis iam dicendum arbitror: hūc characterum indicem lubentiùs barbaris nominibus occupaturus, quam orationis qua has uenas describam seriem. Græci igitur & Latiniore medici in uniuersa manu paucas uenas proprijs nominibus appellarunt. Venam nanque per brachij interiora alamq̃ excurrentem in utroque brachio, quia axillam seu alam perreptat, axillarem uocauerunt: quemadmodum & cubiti interiorem, quod scilicet per cubiti interiora potissimum exporrigatur. Verum priuatim dextræ manus axillarem iecorariam uocarunt, quod in iecoris affectibus illam diuidere soleant. Sinistræ autem manus axillaris lienaria ipsis dicitur, quod in lienis morbis hanc plerunque aperiant. Sic rursus à quāā seu humeralis a insignita, simpliciter suum nomen obtinuit, quod per humerum in manum feratur: etiam cubiti exterior nuncupata, quoniam cubiti exterius latus perreptat. Hippocrates in libris de Articulis hanc uidetur crassam uenam nuncupasse. Quia uerò capitis morbis hæc mederi creditur, etiam capitis uena est dicta. Ramos uerò h & t notatos & uenam communem, quam a notauimus constituentes, medias uenas nuncuparunt, quod scilicet ad flexus cubiti medium ducerentur, aut quod inter cubiti exteriorem uenam & interiorem essent mediæ. Ab obliquo autem ipsorum ductu obliquas quoque illas uocarunt. Communem (quæ a insignitur) nuncuparunt, quæ ab illis ramis h & t notatis consurgit, atque interiori & exteriori cubiti uenis communis est. Præter hæc nomina uix alia apud illos reperias. At si Arabum libros uerses, nominum acerui passim occurrent eidem uenæ uix unquam accommodatorum. Quo autem aliquid certius de his quoq̃ depromam, studioforum nomine qui me his nominibus in Anatome remorari solent, non grauabor Auicennæ interpretis nomina hic recensere, quæ Fen prima libri primi doctrina quinta Capite quarto leguntur. In quo Capite Auicenna ex proposito manus uenas describit, earum seriem à Galeni libro tertio de Administrandis sectionibus, aut potius ab Oribasio petens. Auicenna igitur, aut ipsius interpres, Spatularem uocat humerariæ partem à iugulari externa ad eam usque sedem ductam, qua humeraria brachij cutem primum subit, quæ pars duobus a in nostra delineatione complectitur. Quæ autem humeralis brachio exporrigitur, illam Cephalicam quasi capitis uenam nuncupat. Hæc inter inferius a & f continetur. Tertium humerariæ ramum, quem i insigniuimus, Funem brachij appellat. Axillaris ipsi Asellaris dicitur. Communis uerò a notata, Nigra: ubi autem hæc oblique ad radium contendit, Basilica ipsi uocatur. Al-*

terius

terius communis uenæ cruris, illius nimirum diuisionis quam γ aut Y assimilauimus, sub anulari & indice porrectus, Syelen Auicennæ appellatur. Verum aliàs subinde apud Arabes & barbaros illam Syelem uocari obseruabis, quæ iuxta brachiale ab humerariæ ramo i notato, & axillaris uenæ propagine x insignita constituitur, & l notatur. cui eadem quæ axillari medicorum uulgus nomina imponit, hanc quoq; Saluatellam & Salubrem uocans. Quamquam rursus communis uenæ ramum γ notatum uersus pollicis & indicis regionem exporrectum, alij saluatellam uocent, huic eadem quæ humerariæ nomina largientes. Ad hæc, axillaris medicis potissimum Basilica, interdum & Nigra, aliquando & Funis brachij nuncupatur. Humeraria etiam ocularis & auris, quod scilicet earū partium inflammationibus medeatur. Nisi forte horum nominum impositores adeo stulti fuerint, ut cum Aristotele & illis qui hodie uenas à me rectè antea pictas turpiter in lucem suo nomine emisserunt, arbitrati sint humariæ ortum sub aure primum esse. Cæterum communis uena Media, Mediana & Corporalis uulgò dicitur.

§ VENA E cauæ portio, qua inferioribus corporis partibus nutrimentum administratur.

u Vena in pinguem membranamq; sinistri renis tunicam, conterminasq; sedes excurrentes.

θ Grandis uena ad dextrum renem exporrecta.

ι Grandis uena sinistram renem petens. hæc, uti & dextra, quod serosum sanguinem ad renes deferret, serosusq; humor quodammodo ab ipsa emulgetur, Emulgens uulgò nuncupatur.

κ Propago à uena in dextrum renem deducta, in pinguem renis dextri tunicam excurrentes.

λλ Seminalis uena sinistra. μμ Seminalis uena dextra. Hæ uenæ in progressu peritonæo cui ad dorsum firmanantur, hærentq; surculos communicant, & ramulos membranæ testem uasq; seminaria ambientibus diffundunt.

ν Seminalium uenarum sedes, qua hæc primum implicari, ac uaricum modo conuolui incipiunt.

ξ Venæ geniculatim à caua in dorsalem medullam, quæ lumborum uertebriæ continetur, ac demum ad ipsas lumborum uertebriæ, ipsiq; accumbentes musculos & peritonæum digestæ.

ο Venæ cauæ supra ossis sacri initiū in duos trūcos distributio, Λ aut inuerso ν aut V nō absimilis.

ω Ramus utcunq; amplius, transuersim in peritonæum & lumborum carnes, abdominisq; musculos distributus.

φ Ramuli aliquot in superiora ossis sacri foramina missi.

ρς Sinistri trunci magnæ illius super os sacrum bipartitionis in duos ramos distributio, quorum interior ρ notatur, exterior σ.

ττ Interioris rami, quem ρ notauimus, exterior propago, in musculos exteriorē ilium ossis sedem occupantes, & in clunium cutem conterminasq; partes frequenti ramorū serie transuersim digesta.

υ Interioris rami ρ insigniti interior propago, atq; eius propaginis rami humilioribus sacri ossis foraminibus distributi. χ uero & ψ reliquas interioris huius propaginis soboles, uti hac parua tabella eas delineare datum est, exprimunt. Porriguntur autem illæ ad ani musculos, uesicæ fundum, & ceruicem: mulieribus etiam ad humiliorem fundi uteri sedem, ipsumq; adeo uteri collum.

ω Vena ab exteriori ramo, quem σ indicatum conspicias, deprompta, atq; cum reliquo interioris rami ρ notati coiens, quæ id pubis ossis foramen perreptat.

ε Hac sede uena pubis ossis foramen permeans, præter alios ipsius surculos uenulam in coxendicis acetabulum porrigit, hicq; in istius regionis musculos disseminatur.

κ Vnus ex ramis uenæ pubis ossis foramen transeuntis notatur, qui cutem ad internam femoris sedem inibi subit.

χ Congressus dictæ nuper uenæ, cum ramo magnæ in crus distributæ uenæ perficitur, quem 2 notabimus.

Γ Vena ab elatiori sede exterioris magnæ illius trunci rami, quæ is peritonæum perforat, principium ducens, quæ peritonæo et abdominis musculis cutiq; ramos offert. inter cæteros autem præcipuus sub recto abdominis musculo sursum conscendit, & supra umbilici regionem in aliquot dissectus surculos, eas respicit soboles, quæ huc à uena sub pectoris osse deducta pertingunt, ea uide licet sede cui M ascriptum cernis.

Δ Propago uenæ in crus tendentis, quæ transuersim ad genitalia conterminasq; sedes in surculos exhauritur.

- ⊖ Prima magnæ crus petentis uenæ propago per interiorē femoris tibiæq; sedē sub cute deorsum ad summum usq; pedem perreptans.
- Λ Propaginis ⊖ insignitæ ramus, femoris interiora ad inguina accedens.
- Ξ Dictæ propaginis ramus ad anterioris femoris regionis cutē uersus exteriora digestus.
- Π Dictæ propaginis ramus, primo tibiam mouentium musculo oblati.
- Σ Dictæ propaginis soboles, quas in anteriorem genu sedē & posteriorem quoq; dispensat.
- Φ Hac sedē propago ⊖ indicata per sedē tibiæ interiorē, sub cute in uarios multiplicesq; ramos diffcinditur, hicq; opportunē dum sanguinem mittimus aperitur.
- Υ Hac ad anteriorem interioris malleoli sedē nuper dicta propago ducitur, atq; uti cernere est in pedis superiora exhauritur.
- Ω Ramus à grandi uena crus petenti in anteriorem coxendicis articuli regionem exporrectus, eiusq; sedis musculis & cuti soboles utcunq; frequentes deriuans.
- 1 Ramus septimo nonoq; tibiam mouentibus musculis & cuti femoris iuxta externam ipsius sedē ramos deducens.
 - 2 Grandis uena in quintum femur mouentium musculum digesta.
 - 3, 4 His duabus propaginibus inuicē coeuntibus uena cōstituitur, quæ inter musculos posteriorem femoris sedē occupantes excidens, sursum in femoris cutē ramos porrigit, quos 5 insigniui. Verū maiori ipsius parte 6 notata, sub cute per poplitem genū ue flexū fertur, & in suræ cutē numero 7. sa serie inibi digeritur, ubi 7 ascriptum spectas. Porro in delineatione, obscurus ille ramulus, qui 8 respicit, deorsum magis deberet ferri: neq; sat scio qua uel mea uel sculptoris negligentia, is illic desinit. Verū mediocris est negotij illum uersus 8 notam, calamo deorsum protrahere, quum in dextro crure illum non neglexerim.
 - 9 Magnæ crus petentis uenæ in duos ramos distributio, quā hæc inter duo inferiora femoris ossis capita continetur.
 - 10 Interior dictæ diuisionis ramus, ad posteriores suram tibiæ ue uentrem constituentē musculos et
 11. ad cutē internā sedis tibiæ suræq; digestus, inibiq; 11 insignitus.
 - 12 Dicti iam rami quem 10 notauimus portio, secundū interioris malleoli posteriorem sedē ad internum pedis latus exporrecta.
 - 13 Exterior ampliorq; ramus diuisionis 9 insignitæ, qui mox in alias duas impares propagines digeritur.
 - 14 Dictæ modò diuisionis exterior propago.
 - 15 Exterioris dictæ modò propaginis portio externum perreptans malleolum.
 - 16 Interior illius diuisionis propago, quæ inter tibiæ & fibulæ medium quā hæc ossa inuicem debiscunt deorsum fertur, inter musculos uidelicet posteriori tibiæ ossis & fibulæ sedis adnatos, & ligamentum quod hæc ossa secundū tibiæ longitudinem mutuò colligat.
 - 17 Diuisio interioris propaginis 16 insigniti, quæ ad medium longitudinis tibiæ perficitur. Atq; hæc alterum ramum inter calcem & tibiæ os ad pedis inferiora mittit, alterum uerò inter fibulam & calcem.
 - 18 Soboles iam ultimo commemorati rami, quæ inter tibiæ os & fibulam per membraneum eorum ossium ligamentum in pedis superiora digeritur, alijsq; uenis hæc proreptantibus commiscetur. Atq; ita quatuor ferè uenarum radices ad pedis superiora surculos porrigunt, nimirum 12, 8, 18, 15 insignitæ.
 - 19 Venarum ad digitos series indicatur. Præter hanc causæ uenæ delineationē, & plerasq; quinti sexti et septimi librorū figuras, huc imprimis spectat quā ad horū librorū Epitomē parauimus, & huius libri calci uarias ob causas uti commodissime fieri potuit insuendam duximus. Quotiescunq; igitur in quatuor subsequentium capitum interiori margine simplex character occurret, illum ad nudam causæ delineationem refer, quam siue sexti Capituli libri tertij figuram, siue figuram sexto tertij libri Capiti præpositam alibi in margine uocemus, nihil interesse arbitror.

3
275

DE HUMANI CORPORIS FABRICA LIBER III.

QUONAM PACTO VENAE CAUAE SOBO

les in iecoris substantia, portae uenae propaginibus committantur, quaque ratione uenae
caua à iecore prodeat, aut in ipsum ramos diffundat. Caput VI.

Quoties alicubi in interioribus marginibus figuram sexti Capitis libri tertij scribimus, nudam
uenae cauae delineationem indicamus, ne semper addendum sit, figura sexto Capiti praeposita.

a tota figu-
ra huic capi-
tu praeposi-
ta.



ROLIXE admodum de uenae cauae exortu agendum esse, si quis auto-
rum cōtrouersiam in medium adferendam arbitraretur, cum pleraque Ga-
leni loca, ipsius operibus passim interiecta, tum maximè sextus de Hippo-
cratis et Platonis dogmatibus liber attestantur, quē uniuersum huic que-
stioni, ex quo nam uiscere uenis origo ducatur, dedicauit. Si enim ex pro-
posito eadem disceptatio mihi aggredienda foret, neutiquam Galeni ar-
gumenta oscitanter praeterire liceret, quin singula seorsim essent accura-

Prolixam au-
toribus de ue-
nae cauae ortu
esse disceptati-
onem.

Galeni argu-
menta de uenae
cauae ortu in
Aristotelem
scripta, non
omnia ex tri-
pode dicta.

b à D.
c 7 fi. lib. 6
C. C.
d D ampli-
us est, quam
B. f.
e fi. ca. 12 C
dud tur in
i ac V cum
D.

f Hic con-
fer 5 fi. li. 6
C, D, F, cum
O, P, R, figu-
ra 6. Dein
specta hanc
sedem in ul-
tima 3 li. fi.

g 1 fi. 15 ca.
h fi. ca. 5.
i 2 fi. ca. 15.
k confer C
5 figu. lib. 6
cū G 6 figu-
re ubi aliā
seriē etiam
uidebis I
quā G.

tillimo studio examinanda, & quae uera, & quae falsa ducerem, enarranda. Haudquaquam e-
nim adeò Galeni uerbis acquiescendum est, ut omnia quae illic in Aristotelem congerit, uera in
dubitataque esse ducamus. Vt iam in sermonis progressu, qui ueram uenae cauae seriem enarra-
turus est, cuius reddetur obuium. Quippe relicta de uenae cauae ortu (de quo non immerito
Herophilus ille Anatomicorum coriphæus ambigebat) contentione, ipsius distributionem
aggrediar, quam quidem à corde auspicarer, si modò à maxima amplissimaque uenae cauae sede
hanc auspicandam opinarer. Nam contra Galeni placitum, in Aristotelicae sententiae robur,
uelimus nolimus, nobis quantumuis etiam ringentibus, fatendum erit, uenae cauae orificium
quod ad dextrum cordis sinu pertinet amplius esse, quàm uenae cauae corporis amplitudinē,
quacumque etiam ex parte hanc metiendam duxeris. Deinde subsequens Caput commentum Ga-
leni falsum esse docebit, quo cauam, quā iecoris gibbo committitur, amplissimam esse astruit,
quodque illam statim ab exortu in duos truncos arteriae magnae modo findi, ac unum superio-
ra petere, alterum uerò deorsum explicari, & postmodum ex illis truncis eum qui deorsum se-
cundum lumborum uertebras fertur, grandiorē esse tradit. Vnde etiam ilico in Galenum pro-
pria ipsius iacula, quae ex fontium fluuiorumque ductibus & arborum radicibus tanta indu-
stria et callidè texuit, repellenda ueniunt. Eodem modo Galeni dogma prorsus est respuendū,
quo uenam cauam ex corde prodire inficiatur, quod illic non similiter, ut magna arteria, ena-
scatur, hoc est, quod mox ab ortu in duos truncos nō diuidatur, sed rectā secundum cordis la-
tus ducatur. Primum enim, ut falsum & dissectionis professori indignissimum est, Galeni axio-
ma, quo uenam è iecoris gibbo pronatam in duos truncos, perinde ac magnam arteriam, par-
tiri affirmat: ita etiam non sua demonstratiua methodo concludit, hac occasione cauam à cor-
de non oriri, quod rectā secundum cordis latus porrigatur. Nam si quis arteriae ortum attentè
examinauerit, animaduertet profectò (quod & Galenus nō ignorabat) illam è cordis basis me-
dio tanquam ex ipsius centro nasci, ac proinde si arteriae pars aliqua deorsum ducenda fuerit,
ab ortu statim arteriam necessariò diuidi oportuisse. Venam autē quae ex cordis basis latere (ut-
pote uas mollius quàm arteria) secundum Aristotelis sententiā enasceretur, nō oportuit in duos
truncos statim ab ipso ortu discindi, quum citra diuisionem peropportunè fursum deorsumque
reperere possit, illaque diuisio incassum fieret, praeterquam quod prorsus esset inartificiosa. Nam
si hinc prodiens uena, arteriae modo bifurcatur, primum ipsius origo & caudex aliquousque
in dextram thoracis sedem omnino proreperet, ac inde primum diuideretur, cuius diuisionis
trunci denuò sinistrorsum deberēt du-
ci, si modò uersus corporis mediū (ut
nunc fit) cauae caudex porrigi debuisset.
Accedit huc Galeni argumentū, nunquam
nō grauissimè ab ipso resumptū: Si cor
uenarum esset principiū, omnes uenas
necessariò oportuisse ad cor ptingere,
uti sanè ad iecur pertingunt, quasi uerò



HAC figura finxi cauae seriem, quam necessariò
moliretur, si in duos truncos ad cordis dextrum la-
tus discinderetur. Quò autem hoc Galeni argumen-
tum toties ab ipso repetitum, et optimè demonstratio-
nis loco habitum, accuratius obserues, cōfer praesen-
tem figuram cum aliquot sexti libri et potissimum cum
quinta, & etiam cum totius cauae figura, ut animadu-
ertas quā illā citra diuisionē obliquari oportuerit, ut
ex dextro dorsi latere ad ipsius medium pertingeret.

arterialis uena ad iecur non minus, quàm portae uena ad cor, accederet. Aut si fortè Galeni
sententiae suffragaturi contenderimus, arterialem uenam ob id ad iecur nō pertinere, quod arte-
riae constet corpore, concedamus rursus oportet uenalem arteriam uenae corpore efformari,
atque ab illa sinistri cordis sinus sede principium petere, à qua caua è dextro cordis sinu nascitur.
Adde & hanc nō secus ab origine in dextrā pulmonis sedem et in sinistram duci, quàm caua sur-
sum ac deorsum à corde ducitur: ac dein uenam arterialem aliquādiu unum caudicē ab ortu ser-

uare, ac postea in duos truncos diuidi, perinde sanè ac magna arteria, quæ similiter ac uena illa arterialis è cordis basis medio pñasci, suo loco docebit. Præterea irrefutabilis illa (ut Galenus inquit) demonstratio, quam in Aristotelem de animalibus dextro cordis sinu destitutis contexit, minimè efficax est: quandoquidè illis animalibus caua uena unico cordis sinui eum in modum tunc committitur, ut in alijs dextro sinui, quum & his animalibus sanguis à iecore ad cor arteriarum saltem nomine (etiam si non pulmonum occasione) diffundatur. Et quis obsecro eò uenit stupiditatis, ut Aristotelem cauam uenam eiusmodi animalibus ex dextro uentriculo, quem non habent, exoriri uoluisset cum Galeno dicat, & non cognoscat Aristotelem aliud orationis genus de animalibus pulmone destitutis, quàm de illis quæ hoc non priuantur, institutum fuisse. Ad hæc, quis perfunctoriè in dissectionibus uersatus ambigit, argumentum quod à membranulis uenæ cauæ orificio præfectis ducitur, per uenalis arteriæ^m membranas dilui posse? Neque sat scio quid de auium uenæ cauæ distributione Galenus comminiscatur, quum nihil peculiare in uenæ cauæ serie in illis obseruem, nisi quod iecur duabus fibris seu lobis ipsis priuatim constituatur, à quibus si caua principium ducit, profectò arteriæ magnæ ritu ab origine in duos truncos non diuiditur. Insuper Galeno, quando cauam à corde non oriri asserit, eo quod arteriæ modo non pulset, animaduertenda uenerat arterialis uenæ ac uenalis itidem arteriæ natura. Pariter quum obijcit, cor sanguificationis uim iecori per cauam non offerre, quod illa coriacea sit, ipsi expendendum erat, quàm breue interuallum inter cor et iecur consistat: & quo pacto ipse in quarto libro de Partium usu, toti uenæ portæ sanguificationis facultatem iecoris uirtuti similitam tribuerit. Cuius uenæ distributionis seriem Anatomici à iecore inceperunt recensere, non autem ab intestinis & uentriculo, à quibus confectum ex cibo & potu succum in iecur deducit. Sed ne hîc Galeni dissectionis, atque adeò totius medicinæ principis placita, nimis uilipendere, ac seriatim ipsius quæ adhuc reliqua sunt argumenta refellere uidear, & non potius tanquam pro aris & focis unà cum alijs medicis, qui manus sectioni nunquam adhibent, pugnare, ac probabilia saltem affingendo defendere, à iecore seriem uenæ cauæ iam auspicabor, quod ab hoc sanguinem in cauam deriuari, aut saltem ex portæ propaginibus in cauæ soboles assumi non negem. Ortum uerò cauæ hinc esse non ita annuo. Neque quicquam à me de ipsius origine assertum uolo, quicquid etiam casu mihi inter scribendum exciderit, ne hircosis quibusdam medicis calumniâdi ansam ipse suggeram, qui non nisi huius generis nugas morantur, & interim ossium ac musculorum cognitionem & uasorum reliquam seriem tanquam ad se nihil pertinentem reiiciunt: & si forte hic quicquam texere in me possent, mirè suis pestilentibus odijs nos traducerent. probe & tacite ad innumera loca conuiuentes, in quibus Galeni lapsus Anatomicos hætenus ostendi: & fortè in posterum illos silentio uel ob hoc non sum præteriturus, ut eiusmodi sycophantis & uilitigatoribus inuidiæ, & in illis quæ propter inscitiam auersantur exercendi argumentum præbeam. Verùm ideo de cauæ principio ex iecore nihil absolutius subiiciam, quod iecur mihi potius è uenis quæ ipsi intexuntur, quàm uenas ab ipso, uel etiam in prima fœtus conformatione, originem ducere colligatur. Aliud enim nihil in quinto libro iecur esse audies, quàm uenularum infinitam sobolem, cui concretus sanguis (qui propria iecoris est substantia) obnascitur, quum interim uenæ cauæⁿ os ad cor pertinens, simile prorsus sit magnæ arteriæ, & uenalis arteriæ arterialisquæ uenæ orificijs: quæ à corde enasci nemo sanæ mentis inficiari potest, si modo diuersæ quasi substantiæ corpus (ut ligamentum ab osse) ex alio pronasci affirmare audeamus. Cæterùm quemadmodum (ne fortè rursus aliò excurrat oratio, cui, ne prolixior fiam, rationes nullas ex sententia addo) ab extremis iecoris partibus orbiculatim ex ipsius concava sede^o exiguas uenularum propagines paulatim ad iecoris medium uersus posteriora contentes inuicem coire, maioresquæ uenas constituere diximus, et deinde ex maioribus illis rursus grandiores tantisper effici, quousque omnes illæ soboles in uenæ portæ caudicem finiant: pari etiam ratione ad concavæ uenæ generationem (ut ita modò loquar) ex summis orbicularibusque iecoris finibus, in gibba ipsius sede, innumerae uenularum propagines exoriuntur, quæ sensim uersus medium posterioris sedis iecoris prorepentes, in insigniores uenas coeunt: atque hæc rursus in ampliores eousque colliguntur, donec tandem in elatiori iecoris parte, qua dextram uertebrarum sedem respicit, in unam congregiantur^a uenam, quæ ab insigni amplitudine Græcis *ποίλη, μεγάλην* interdum, & *σελεχιάα* (quemadmodum & portæ uena) deinde & *ήπατις*: in Arabum autem interpretibus uocatur hanabub, uena uentrem habens: Latinis uerò caua, magna & iecoraria, rariùs autem caudicis uena nuncupatur. Vnde uerò nonnulli hanc Galeno communem uocari scripserint, non satis assequor, quamuis existimem hos^r illa delusos uena, quam eo nomine in cubito peritiores medici uocant. Vti etiam

Venæ cauæ distributionis descriptionem à iecore incipientem.

Cauæ in iecore series.

Cauæ uenæ nomina.

l 7 fi. lib. 6
K, L, M.
m 9 fi. li. 6.
E, F.

n 7 fi. lib. 6
C, C. atq;
ita inuicem
confer 6, 8,
9, 10 figuras
lib. 6

o fi. ca. 5. A,
A, A utrius
cha. 1, 2, 3.
4, 5 & tan-
dem ad B.
p A, A, A ad
B.

q B. f.

r a.


dextri

s sinistra ax
illis r, u
notatur.
t 1, fi. lib. 5
Z incumbit
Y.
dextri cubiti axillarem, Hippocrates iecorariam, non minus quam ipsam cauam quæ cordi proxima est, appellauit. Porro uenæ cauæ rami per iecoris corpus exporrecti, portæ ramis incumbunt, & utriusque uenæ ramulorum extrema osculis inter se conniunt, ut cauæ propagationes optimè citissimeque sanguinem iecoris beneficio in portæ ramis elaboratum, ac bile flaua sæculentoque sanguine repurgatum, transsumant, & postmodum uniuerso corpori ad partium enutritionem deducant. Venarum itaque cauam constituentium, atque è iecore eductarum coitus, non in medio gibbi iecoris perficitur, ut Anatomicorum uulgus ridiculè arbitratur: sed, ut iam prius admonui, in ea parte iecoris quæ dorsi seu spinæ dextro lateri proxima est. adeò sanè ut nihil prorsus substantiæ iecoris toti posteriori uenæ cauæ parti, quæ dorsum spectat, obduci cernatur. Neque rur-


sus, quemadmodum Galeno & omnibus dissectionum professoribus hætenus uisum est, uenæ cauæ rami ex iecore procedentes, cauam in eum modum constituunt, quo portæ uenam efformari colligique dictum est: aut ut radices ad arboris caudicem pertinere conspiciamus. Nam cauæ rami, ac si uenam per posteriorem iecoris sedem rectà quodammodo deorsum porrectam, et duntaxat iecoris cuidam sinui innatam ingrederentur, eam constituunt. Sunt autem hi^x duo insigniores rami, propter iecoris elatiora, in anteriorem cauæ sedem, non autem latera, aut posteriorem sedem, subingredientes, qui neutiquam cum uenæ cauæ amplitudine sunt comparandi.

imò si non nimis anxie in Galeni uerba mecum iuraueris, neque tuis oculis fidem derogaueris, proculdubio asseres uenam cauam à corde deorsum per iecoris posteriora ferri, atque ab huius anteriori se-

de duas insignes uenas pullulare, numerosa serie in iecoris substantiam diffusas. Præter eas uenas quas caua, simulatque deorsum à corde descendens, iecoris substantiæ adnascitur, iecori offert, in reliquo ipsius per uisceris posteriora descensu (qui sanè breuissimus est)^y paruulos etiam spectabis ramulos ab anteriori cauæ sede etiam in iecoris substantiam excurrentes, et in omnibus hominibus numero neutiquam pares. Atque hæc omnia sedulo hominem secanti, adeò sunt obuia, ut nullus nunc uenæ cauæ seriem spectans, non multò magis probauerit hanc, quod ad seriem, non autem sanguinis ductum attinet, oportere à corde primum describi, ac demum ipsius ad superiora inferioraque ductum esse enarrandum. Sed quum concedam, sanguinem qui in caua passim continetur, à iecore confici, uenæ cauæ ramorum distributionem à iecore quodammodo auspicatus sum, ac deinceps eam uenæ partem primum describam, quæ supra iecur consistit, non eam quæ ad partes iecori subditas porrigitur: longè omnibus de cauæ ortu postpositis altercationibus. Quanquam interim sedulo studiosos adhortor, ut nullis autorum suffragijs fidem dantes, ipsi non modò hominis iecur, uerum & simiarum & canum, quibus alia iecoris forma accidit, aliaque ramorum à caua in iecur series, accurate secant, ac uenæ cauæ iuxta iecur & cor progressum examinent, dummodo inutili quoque Anatomes parte delectentur. Quo autem id fieri debeat artificio, partim in calce quinti libri, partim & in sexti libri fine docebitur.



PRÆSENS figura iecoris gibbi posteriorem ipsius sedem commonstrat. ac A quidem & A indicant elatiorem gibbi regionem septo transuerso uersus anteriora conterminam. B uero & B regionem humiliorem. C cauæ uenæ pars notatur, qua hæc septum permeat, ipsique ramos exporrigit. D ad E usque sedem indicat, qua caua iecoris substantiæ adnascitur. H portæ



ginem notat. B uero & B propaginem indicant, quæ per dextram iecoris sedem spargitur. Cautè & C paruas soboles insinuant, quæ iecori etià à caua præter duas maximas propagines, diffunduntur. Nihil enim interesse uelim, an propagines has & soboles à iecore enatas cauam constituere dicam, an à caua in iecoris substantiam diffusas. Ceterum D cauæ uenæ sedes notatur, qua hæc septum permeat, ipsique ramos depromit.

HÆC figura uenæ cauæ portionem oculis subijcit, posteriori iecoris sedi exporrectam. Hanc longa sectione secundum posteriorem uenæ sedem ducta dissectui, ac dein distendi, ut propagationum foramina, quæ caua in iecur diffundit, aut quæ cauam constituunt, in conspectum uenerent. Ac utrumque A propagationis quæ à caua in sinistra iecoris sedem diffeminatur, orificium, & ipsam denique propa-

ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS
 VENAE CAVAE, EIVS PARTIS
 quæ supra iecur consistit, distributionis series.
 Caput VII.



Caua partem
 septum transe
 unt, illa quæ
 sub iecore cõsi
 stit, non arcti
 orem esse.

Caua per sep
 tum transitus,
 ac ipsius in sep
 tum rami.

Caua in cor
 dis dextrum si
 num adaper
 tio.

Cordis basim
 cingens uena.

AVDQVAM Galeno & reliquæ Anatomicorū turbæ illius pla
 cita sectanti satis fuit, falsum uenæ cauæ ortum à iecore comminisci, ac ut
 ab Aristotelis placito uerius declinare uiderentur, fingere, uenam cauam
 mox à suo è iecoris gibbo progressu in duos truncos arteriæ magnæ mo
 do bipartiri, unumq; ad superiora corporis, alterum uerò ad inferiora du
 ci: quinimo ut etiam probaret sanguinem in corde non generari, adhuc
 nō ueritus est, truncum qui superiora petit multò strictiorē esse, minusq;
 amplum illo qui deorsum porrigitur. Sed iam asseruimus, cauam in eiusmodi truncos non di
 uidi: & etiā ueritati neutiquā cōsonum est, cauæ uenæ partem quæ inter iecur^a dextramq; cor
 dis aurem conspicitur, angustiorē illa uideri, quæ sub iecore lumborum uertebis explicatur,
 quod nō perfunctoriē inter disseccandum obseruari uelim: quo minus aliquis, qui mihi secan
 ti nō astiterit, aut ipse sectionem studiosē non fuerit aggressus, hæc me confingere arbitretur.
 Nam si quis obiter sectioni studium impendat, & iecur aut cor, aut aliud mēbrum inter secan
 dum mouens, plus sanguinis in uenæ partem uertebis lumborum exporrectam, quàm in illā
 quæ supra iecur habetur propulerit, is sanè Galeni sententiæ subscribet. at si uicissim ex hac ue
 næ parte in illā sanguinē compressum sursum duxerit, leui opera Galeno non amplius assentie
 tur. Præterea, ubi hæc sectione indagauerit, necessum est Galeni rationem pressius expendere,
 qua conficit ascendente uenæ partē multò oportere minorē esse descendente, quòd hæc plures
 quàm illa partes enutriet. Nam si hæc Galeni ratio uera est, etiā citra sectionē ipsius commentū
 nulli nō innotescet, quandoquidē ascendens pars plus sanguinis contra Galeni dogma, quàm
 inferior quæ lumborum uertebis exporrigitur, requirit. Primū enim neq; bilis uesicula, neq;
 uentriculus, neq; intestina, neq; omentum, neq; mesenterium, neq; lien ramulum aliquem à ca
 ua assumunt, hæc q; sub iecore collocantur. Verū soli renes, altera uesica, testes et crura, & in
 ferio abdomenis pars ab ea quæ descendit cauæ parte sanguinem adipiscuntur. Ab ascenden
 te uero septum transversum et uniuersus thorax alitur. nam & thoracis pars iecori proxima, ad
 secundam usq; lumborum uertebam pertinens, à^c uena coniugis experti nutrimentum obti
 nere audies. deinde manus, collum & caput uniuersum, ut taceam nūc sanguinis copiam in ce
 rebrum tot uenis scaturientem, et eam quæ in cor defertur, non solum cordis & pulmonis om
 nium maximi uisceris nomine, uerū & omnium arteriarum quas sanguine ad cor delato im
 pleri credimus, & arteriæ demum, si cum descendente cauæ portione comparentur, quanto mi
 nus quàm illa sanguinis continent: Sed quorsum spectat eiusmodi rationes, ut Galeni placitū
 subuertatur, colligere, quum sectio iam admonitis studiosis abundē non hoc solum infirmet,
 sed & alia quæ in Galenilibris de Hippocratis & Platonis decretis passim leguntur, quamplu
 rima, à medicis propter secandi imperitiam, & nimiam quam autoribus damus fidem, tanquā^d
 Apollinis oracula, libenter concessa. Cæterū ego in præsentia relictis Galeni placitis, partē
 cauæ ascendente lubens persequeretur, quò oratio uera duntaxat enarrans minus excresceret,
 & Galeni nomine non interrupta, longè redderetur faciliior. Verū ea ipsius est autoritas, &
 nostra in illum obseruantia, ut nisi ipse interdum quando illius sententiæ non acquiesco, admo
 nerem, nullus non me falsissima proponere sibi persuaderet: quum interim collatis inuicem ad
 hominis sectionem locis, in promptu sit, an perperam ab illo declinem. quod si alibi accidit, pro
 sectò nunc in uenæ cauæ serie mihi quantumuis inuito continget: quam prius aliquousq; uerē
 persequar, ac postmodū ubi à Galeni dogmatibus sermo dissenferit adijciam. Vena itaq; cauā
 neruosam septi trāuersi partem in dextro ipsius latere peculiari foramine^e permeat, unā etiam
 cordis^f inuolucrum perforans, quod insigni amplitudine tum alibi septo continuatur, & con
 nascitur, tum potissimum ubi caua septum transit, ac septo^g duas non uulgares offert propagi
 nes, per uniuersam septi sedem multiplici sobole excurrentes, & ramulos quoq; cordis inuolu
 cro, quā id septo committitur, diffundentes. Quum primū uerò caua septum^h superauit, mo
 dicè uersus sinistram cordisq;ⁱ basis dextrum latus procedens, sinistro ipsius latere^k adaperi
 tur, atq; in dextrum cordis sinum pertinet. Non quidem ut Anatomicorum fæx scribit, aliqua
 propagine aut ramo quopiam, uerū duntaxat foramine quodam seu scissione adeò ampla, ut
 cauæ uenæ amplitudo ipsi neutiquam conferenda sit. Anteriori cauæ uenæ parti hīc^l dextra
 cordis auricula connascitur. A^m posteriori uerò cauæ ad cor connexus sede,^m insignis uena
 promitur (non autem, ut Galenus libro de Venarum sectione docet, exigua) quæ secundum
 cordis

a respondet
 B, f.
 b 5 fi. lib. 6
 B.

c F, F.

d B.

e 7 muscu.
 ta. f. prope
 Δ.

f 3 fi. lib. 6
 C, D, E, F,
 G. 4 fig. B,
 B.

g C altera
 notatur.

h 5 fi. lib. 6
 D.

i 4 fi. lib. 6
 C, D.

k D, & 7
 fi. li. 6 C, C,
 C.

l 5 fi. li. 6 B.
 m E, & 7
 fi. li. 6 G. &
 6 fi. D.


6 *fi. lib. 6* cordis posteriora & sinistrum latus ita porrigitur, ut cordis basim coronæ modo succingat, ac
 E, E.
 6 *Specula 11* ab inferiori ipsius sede " ramos deorsum ad cordis usque mucronem dispergat. quorum præci
 6 *fi. lib. 6.* pui sunt, qui cordis substantiam illic petūt, ubi hæc est ° crassissima. Vnde etiam frequentiores ue
 nas sinistro cordis lateri, & ubi sinuum ipsius septum consistit, nobis occurrunt. Hæc uena in
 interdum gemina uisitur, grandiori quidem à posteriori sede orificij cauæ initium ducente, mi
 nori uero ab anteriori sede. Verum longè sæpius unica tantum obseruatur, etiam si Galenus a
 6 *Super H* fit, & cordis inuolucrum perforat, & uersus corporis medium sensim ducta magnæ arteriæ
 4 *5 fi. li.* p innititur, non autem retrorsum ducta uertebrae corporibus insidet, quæ à stomacho occu
 6 *aut spe* pantur, cui rursus aspera incumbit arteria, & huic non infima magnæ arteriæ propago cui ul
 6 *hic ulti* timo caua insternitur: adeò sanè ut quum caua tantum à uertebis distet, mirabili artificio illis
 3 *li. fi.* uena fuerit offerenda, quæ ipsis costis que sanguinem subministraret. Quum enim septum
 9 *fi. 8.* transuersum impedimento sit, quo minus caua ubi sub iecore exporrigitur, ac renibus sobo
 les dispensat, uertebis costisq; propagines tribuere queat, & deinde quum cordis basis adeò à
 7 *F, F. ulti.* uertebis eleuetur, & uasa in pulmones diffusa cauam à uertebis ita subleuent, ut etiam hinc
 5 *fi. 0. 5 fi. li. 6* ad ipsas caua nullos deriuare queat ramos, rerum Opifex à caua magnam eduxit propagi
 5 *Specula 12* nem, postquam hæc cordis inuolucrum transcendit, atque pulmonis dextræ partis cum sinis
 5 *fi. lib. 6.* tra^s connexum (qui uasorum pulmonis interuentu perficitur) superauit, ipsaq; dorso propin
 quius quàm antea accedit. Hæc propago seu uena à dextro cauæ latere pronata, deorsum ad
 4 *infimū G.* quartæ propemodum thoracis uertebrae corpus contorquetur, & decliuis secundum dex
 7 *muscu.* xtrum uertebrae latus porrecta suo fine unà cum magna arteria, sub septo transuerso ad
 20 *fi. li. 5* aliquot lumborum uertebas pertingit. Hæc uena, cauæ uicem toto progressu gerit, quo
 22 *fi.* ipsius caudex uertebas ita^x atque in lumborum regione nequiuuit contingere, ac geniculatim
 8 ramos ad uertebas ipsas que adeò dorso partes offerre. Porro caua hanc sine coniuge & pa
 7 *fi. cap. 12* ri uenam à se tam grandem deprompsit, ut arteriæ magnæ ritu utrinque ad costarum inter
 8 *diffundit* ualla, ^y ut nunc dicam, ^z ramos germinare posset, quos quidem à lateribus non diffudit, sed
 8 *h. h.* ex media regione posterioris ipsius sedis, quæ uertebis innititur. Quia uero coniuge priua
 8 *G, G.* tur, neque in altero latere parem affiscit à caua propaginem, & *αυγου* Græci, nos uenam absque
 coniuge, & paræ expertem nominamus. Oritur autem potius à dextro cauæ latere, quàm à
 sinistro, quod secundum dextram dorso sedem explicari debuit, sinistra nimirum sede, & me
 dia quodammodo à magna arteria dignissimo organo occupandis. Ab anteriori etiam ca
 uæ sede non enascitur, ne frustra tunc longiori ductu quàm nunc uersus dextrum reflecti, ita
 que spinam accedere deberet. A posteriori quoque principium sumere nequiuuit, quod hæc se
 des alijs incumbat organis, quodque hinc uenam coniugis expertem dextrorsum magis de
 duci, quàm nunc, oportuisset. Ab hac uena utrinque geniculatim pullulant propagines, sin
 4 *1, 3 fi. ca.* gulæ ad unum nouem costarum inferiorum interuallum perreptantes, quæ in uerarum qui
 19 *lib. 1 A,* dem costarum interuallis ad eam usque^a sedem contendunt, ubi hæc in cartilaginem degene
 19 *B.* rant: in spuriarum uero costarum interuallis, etiam in anteriora magis abdominis, quàm in
 19 *fig. lib. 5* terualla pertinent, propagines hæc pertingunt, abdominis musculis etiam^b implicitæ. In ipso
 19 *E.* autem per costarum interualla progressu ramulos diffundunt, qui in musculos illi thoracis se
 di quam ipsæ perreptant incumbentes, disperguntur. Præterea ab hac sine pari uena ad sin
 19 *fi. lib. 6* gulas secundum quas deducitur uertebas soboles quædam pertinent, quæ in uertebrae
 19 *H, H. aut 2* corpora, & dorsalem medullam, & in musculos his sedibus accumbentes excurrunt. Præ
 19 *fi. G, G. 1, 1.* terea^c membranæ thoracem intersepientibus, quæ illæ dorso continuantur, ab hac uena fur
 culi etiam offeruntur. Deinde non obaudiendum est, ab huius uenæ lateribus, quam pri
 mum ab ortu uertebas contingit, subinde ramum quoque educi, eumque in tenues propa
 gines diuisum, etiam sui lateris superiores costas adire, atque inibi in membranam costas suc
 cingentem numerosis, sed gracilibus furculis distribui. atque hi non seriatim ac rectè secun
 dum costæ ductum feruntur, quemadmodum rami inferioribus costis digesti, uerum erra
 bundo ductu excurrunt. Atque id adeò frequenter in hominibus (quod his scilicet multò bre
 uior thorax, quàm quadrupedibus, à natura datus sit) usu uenit, ut eodē anno in publica sectio
 ne in uiro & item muliere omnes thoracis costas enutrir, interdū Patauij uiderimus. Et Bono
 niæ etiam (ut priuatas fileam sectiones) quū primū illic dissectioni præessem, atq; de uenæ se
 ctione in laterali morbo satis pertinaciter contenderetur, una eademq; demonstratione tria no
 bis obtigerūt hominū cadauera, quibus omnes thoracis costas huius uenæ propaginibus enu
 triri, nemo ex tanto eruditorū uiroꝝ cœtu inficiari potuit. Atq; ut id subinde obseruatur, ita sa
 nè interdum hanc sine pari uenam, quum ad nonam ferè thoracis pertingit uertebam, in duos

Li. 7 de. Ad.
mi. dissectionio.

Qui uenam co
iugis experte
à caua educi
oportuerit.

Varia uenæ
pari carens
series.

DVA
bus his figu-
ris geminas
uenas pari
carentis se-
ries expres-
simus, quæ
ab illa uari-
ant, quæ in-
tegra uenæ
cauæ deline-
atio indica-
uit. Notat
autem hic *A*
uenæ sine pa-
ri truncum.
B ipsius ra-
mum, qui in
sinistram du-
ctus, in plu-
res digeri-
tur propa-
gines. Cui
rò in infe-
riori figu-
ra, insinuat
cauæ uenæ
caudicis por-
tionem.



truncos diuidi cernes, quorum unus quidem dextri lateris costarum radicibus, alter autem sinistri exporrigitur, suique lateris costis, quæ prorepit, ramos offert. Interdum uero à sinistro uenę pari carentis latere in eadem propemodum regione, grandem uenam pronasci obseruabis, illi prorsus similem quæ à portæ uena inferiorem omenti membranam adeuntium facile maxima est. Hæc enim ubi primum transuersim uertebrae illius cui exporrigitur corpus transcendit, in duos ramos diffunditur, quorum alter sursum, alter deorsum secundum costarum radices fertur, ac suarum costarum interuallis ramos deriuat. Non secus sanè quàm si Natura aliquando maluisset, unum gradem ramum à dextro latere hinc ad sinistram porrigi, quàm super singulas uertebras unum tenuem gracilemque ramulum ferri. Adeò ut mihi etià persuasum sit (quamuis id nunquam uiderim) interdum à sinistro cauæ caudicis latere, ubi iugulum contingit, uenam depromi, quæ secundum sinistram uertebrarum latus decliuis ducta, sinistris costis ramos offerat, illa quam sine pari uenam nuncupamus dexteris costas duntaxat alente. Atque huiusmodi uenæ ortum non tantum à iugulo primum posse fieri, sed paulò inferius, etià agnus attestatur, in quo tale aliquid semel obseruauim. Verum eiusmodi non nisi rarissime occurrentes uenarum series, Anatomes studiose non aliter expendendas putauerim, quàm si interdum sextum in manu digitum, aliud uel monstruosum se spectandum offerret. Adeò ut si quādo in publicis sectionibus hæc obseruo, ea tanquā non essent, tacite præteream, ne artis candidati in omnibus corporibus hæc obseruari arbitrentur. Idque tanto, non in sectionibus solum, sed modò in absoluti hominis historia persequenda,

d 5 ca. fi. S.
et 4 fi. lib.
57.

*Quæ hæc-
nus scripta
Galenī placī-
tis parum con-
ueniant.
Li. 7 de Ad-
mi. sectio.*

*Lib. 6 de Pla-
cit. lib. de Se-
cti. uenæ. lib. 7
de Admi. et 2
Commentario
rum in Hip-
po. de Viciis
rati. in morbis
acutis.*

faciendum duxi studiosius, quanto pertinacius ipsos monstruosa illa admirari, experientia non semel didici: quum interim ipsis dolendum magis esset, tale ad integrā sectionem corpus obtigisse, quod ab hominum canone plurimum uariat, nisi fortè etià crebro absolutorum & non monstruorum hominum sectionibus astitissent, Galeni præcepta ad finem libri primi de Administrandis sectionibus nobis datum nunquam negligentes. Porro iam sermoni adijciendum est, mihi hæcenus in homine nihil esse prætermisum: uti sanè arbitrabitur, qui Galeni placita sedulo euoluens, primum à me quintam pulmonis fibram seu lobum requireret, quo caua in interuallo inter septum & cordis inuolucrum ex Galeni sententia suffulciretur. Quippe quum hunc lobum Galenus in simijs reperisset, immerito oscitantia alios dissectionis proceres arguit, quasi illum ignorassent: uti sanè & Galenum is lateret, si hominum cadauera potius quàm simiarum secare aggressus fuisset. Quum enim in homine nullum sit interuallum ductus uenę cauę à septo in cordis inuolucrum, sed uti superius docui, hæc duo simul connata una semelque perforentur, nullus sanè pulmonis lobus hic consistere potest, qui in illo interuallo uenam sustineret, nisi fortè hunc (quod summè est absolum) in cordis inuolucrum reponi quis sectionum imperitus arbitraretur. In caudatis uero simijs, et magis adhuc in canibus, amplum occurrit interuallum, inter septum transuersum & inuolucrum cordis mucronem, ac hinc inter membranas thoracis intersepientes inane uacuum uel est spacium, per quod caua prorepit, sibi substratum habens pulmonis lobum, quo mirabili Naturæ opificio is cauæ caudex tanquam manu apprehenditur et suffulcitur. Proinde quando Galeni descriptionem canibus, nostram autem hominibus conferes, utramque ueram esse fatebere. Verum Galeni sententia nusquam non à caua priusquam cor pertingat, uenas in membranas thoracem intercipientes, deduci ac distribui docens, ueritati parcat, quum hæc membranae uenas assumant, partim ab illis ramis quos à iugulo ad has ferri audies, partim à uena sine pari. Caua autem quum ad cor fertur, intersepientes thoracis cauitatem membranas ne contingit quidem, tantum abest ut ramulos ipsis ita tenues ut in illas digeri debeant, offerat. Præterea alius Galenum in libro de Venarum sectione, probe affecutus mirabitur, qui priusquam caua supra cor progressum attingerem, à caua statim atque in cor pertingit uenam arterialem in pulmones porrigi non ascripserim, quum interim illud Galeni sit dogma. Quod quàm ueritati consentiat, ipsa uasorum continuïtas arguit: quippe quum nihil ab alio pronasci uerè dicamus, nisi id ei sit contiguum, aut saltem attiguum, arterialem uenam à caua principium ducere ne utiquā quis asseret. præterquam enim quod arterialis uena sextuplo crassiori constat corpore quàm caua, illa hanc non contingit, sed non mediocris cordis substantiæ portio inter caua orificij elatiorem sedem & dextram orificij arterialis uenæ, intercedit. Dein arterialis uenæ orificium

*Licebit hic
6 libri 3, 4,
5, 6 fi. et ul-
timam hu-
ius libri spe-
ctare.*

*et L. 1 fi. li.
6 M, N, Q,
fi 1 fi. ca. 15.*

*f 6 fi li. 6. 1.
8. fi. C, D.*

*g 1 fi. ca. 15
B, C.*

orificium non minus in cordis dextrum sinum quam orificium cauae orbiculatim liberumque pertingit, nihilque minus apparet quam soboles aliqua à caua ad arterialem producta. Vnde etiam hæc, quia propriam obtinet circumscriptionem, non minus priuatim quam caua uenit pertractanda. Huc accedit Galeni de uenæ pari carentis principio, sibi non constans sententia: Primum enim in commentario decimo secundi libri in Hippocratem de Victus ratione morborum acutorum, sibi ipsi ter pugnat. nam in initio sermonis de uenæ cauae per thoracem distributione uniuersim inquit, uenam octo inferiores costas enutrientem à caua pronasci antea quam ad cor pertingat. mox subiicit, in quibusdam animalibus supra cor hanc à caua deprimi: in homine autem ex ea cauae sede eandem emergere docet, qua hæc dextram cordis aurem contingit. Rursus sui oblitus aliquanto inferius subnectit, hominis infernas costas à uena nutriri, quæ sub corde à caua exorditur. Huic sententiæ propemodum conformis est, quæ in sexto libro de Hippocratis & Platonis dogmatibus legitur, quum scribit, cordis inuolucrum simul cum omnibus membranis, quæ tum thoracis cauitatem intersepiunt, tum quæ pulmonem ambiunt, alimentum ex caua priusquam ad cor deferatur sumere. Quando enim inquit, *καὶ ὁμοῦ ποδιαλέφσει τὸν πνεύμονα*, aliud nihil ipsum intelligere arbitror, quam membranam costas succingentem, quæ maxima ex parte uena sine pari nutritur. Non enim intelligit opinor membranam pulmonum substantiæ proximè obnatam, quum hæc ne surculum quidē à caua mutuetur. In libro autem de Venarum sectione, uenā sine pari à dextra auris sede ad sinistras thoracis partes proficisci, atque ad quintam thoracis uertebam perferri in quibusdam animalibus attestatur. In simijs autem, paulo supra aurem in dextris partibus hanc poni docet, plurāque hic quam in libro de Victus ratione, costarum interualla præsentī uena nutriri fatetur. Eandem sententiam in septimo de Administrandis sectionibus complectitur, nisi quod hīc ipsam à uena quæ iuxta dextrum cordis sinum consistit, pronasci simpliciter tradit: quum illic ad sinistras thoracis partes illam proficisci, malè adiecerit. Quinetiam alio septimi eius libri loco hæc

8 F sine pari uenam ex dextro cordis sinu non secus ac ^s coronalem pronasci docet: quamuis id in simijs haud euenit. At non est quod prolixius alia huius ordinis loca ex libro de Fetus formatione & aliunde in medium adferam, quum ex modò propositis, Galeni de uenæ pari carentis ortu progressuque sententia utcunque constet. quæ quam ueritati consentiat, ex nostra enarratione ueram eius uenæ seriem prosequente, petere licet. In homine enim non minus quam in simijs, & canibus, & suis, & bobus, & quotquot uidi quadrupedibus à caua procedit, postquam hæc cordis inuolucrum superauit, ac eò usque pertingit, ubi nullus amplius pulmonum apparet connexus, qui uasorum interuentu perficitur. Et si quis sectioni fidem de rogans, rationem huius uenæ exortus petierit, illam sanè adinueniet ex nostro sermone, qui Naturæ artificium in illius uenæ propagatione superius enarrauit. Haudquaquam enim hæc pari carens uena à cauae caudice sub corde enasci potuit, tum quod nimium periculosè suspensa fuisset, propter ingens interuallum ab ea uenæ cauae sede ad uertebas usque conspicuum: tum etiam, quod si illinc uena pari carens exoriretur, tota dorsi pars sub corde & ea sede quæ eius uenæ principium nunc exporrigitur consistens, uenis indiga relinqueretur: aut Natura denuò aliam uenam illinc, unde nunc illa enascitur, producere debuisset, illis uertebis alimentum subministraturam. E regione autem ^h dextræ auriculæ pronasci nullo prorsus modo qui

B. uit, quod uasa pulmonem adeuntia, uenalis scilicet arteria, & arterialis uena, & aspera quoque arteria, illam ad dorsum ferri prohibuissent, nisi ipsa aliquòusque prius aut deorsum aut sursum prorepens, aptam descensus sui sedem callidè inuenisset. Præterea si è regione dextræ cordis auriculæ uena paris expers diffunderetur, ipsa etiam cordis inuolucrum peculiari foramine secus atque nunc permearet. unde etiam uel hīc affatim docet, quam procul à corde principium ducat. Neque est quod ad huius sententiæ robur, hominis dorsi quæ id cor spectat obliquitatē adferam: quæ quū multo maior in homine, quam quadrupedibus aut auibus sit, facile liceret conficere, sine pari uenā hominī etiam altius, quam illis animalibus à caua oportere enasci, quod his & succinctior ductus è regione dextræ auris ad dorsum quam illi uisitur: uti profectò inter secandū non solum iucundū est expendere, sed etiam promptum. Quamobrem uerò Galenus ita uariè & de hominis uena pari carente, ipsique nunquā uisa, magis perperā adhuc quam de simiarū uena senserit, in ea Epistola utcūque perstrinxi, qua dextri cubiti axillare in laterali morbo (si modò quid intersit cuius lateris uenā diuidas) secādam docui. Galenus enim aliquam rationē alicundè cōminisci studuit, qua Hippocratis sententiā probabiliorē redderet, qua is sanguinē non mittendum docet, quum dolor inferiora ac sub septum petit. Quasi uerò Hippocrates arbitratus fuisset, à ⁱ uena sine cōiuge per phlebotomiā nihil educi posse, aut

1 F. eā remotius ab ^k axillari distare, quam ut hæc aut alia queuis, illius gratia aperiri posset. quum

Galenī de uenæ sine pari ortu sententiæ.

Vnde uenam pari carentem enasci oportuerit.

h. s. li. 6.

B.

1 F.

k, m, r, u.

interim

interim in pulmonum, cordis, iecoris, uentriculi, lienis & renum affectibus, uenam in cubito nō Hippocrates solum, sed omnis medicorum chorus fecit. Ceterum quoniam Epistola nuper commemorata, hæc prolixius cum aliquot alijs paradoxis persequitur, cauæ uenæ distributionem deinceps non interrupta sermonis serie aggrediar. ne mihi præter ueræ hominis historię narrationem in hoc negocium augeam, ut ubi à Galeno dissentendum est ascribam, ipsiusq; sententiam uerbis aliquot refellam: & ne propter meam in eum pietatem, etiam prolixè mihi uenia petenda sit, quo rabularum animos leniam, quos miras excitaturos noui tragœdias, si semel atque iterum Galenum purgare, & friuolis quibusdam ratiunculis ab errore uindicare poterunt, parum solliciti, quod tot innumeris locis ipsius placita à ueritate dissona certò (quantumuis interim inuitus) ostendam. Hactenus enim non semel expertus sum, quàm eius modi homines apud dissectionum imperitos gloriari soleant, quum rationem aliquam excogitassent, qua Galenus excusari, aut ut ipsi loquuntur, cum ostensa à me parte concordari possit. Quàm turpiter uerò se tum postea in publicis sectionibus dederint, quum suos Achilles mihi proponerent, ipsi probè norunt. Vena igitur caua, postquam sine pari uenam à se diduxit, ad iugulum rectà sub pectoris osse¹ conscendit, membranis thoracem intersepientibus elegantè suffulta, ^m molleq; & glandosum corpus hîc in iugulo passim adstratum obtinēs, quod Græci θυμὸν, Latini uerò communi glandularum nomine glandium uocant. Est autem glandium id in elatissima thoracis sede exstructum, ut ab omni noxa frequentissimas uasorum distributiones hîc supensas, immunes seruet. Vena enim caua² inibi primùm in duos insignes truncos discinditur, à quibus omnes uenæ cauæ partis ad elatiora corporis porrectæ soboles pendent. À sinistro namq; trunco, quemadmodum & à dextro, ^o grandis uena promittitur, quæ primæ thoracis costæ innixa postquam aliquot à se dispar sit ramos, sub clauicula in axillam^p properat. Ab huius etenim radice^q exilis uena enascitur, deorsum per costarum radices ad tertiam usque costam exporrecta, & exiguas soboles tribus superioribus costarum interuallis, aliquando duntaxat duobus, deriuans. Præsens uena non semper ab eius quæ axillam petit radice pronascitur, uerum nō nunquam à caua priusquam in duos illos grandes truncos bipartiat, principium ducit. Quinetiam interdum hanc penitus abesse obseruaturus es, aut araneæ filorum modo prætenuem, quum breuiora illarum costarum interualla ab ipsis incumbente uena quæ axillam petit, aliquando autem à uenæ pari carentis propaginibus (idq; potissimum in dextro latere) satis nutrimenti assumant. Ab anteriori sede illius^r magnæ in iugulo bipartitionis, ^s duæ prodeunt uenæ, quæ introrsum ductæ, ad elatiorem pectoris ossis sedem contendunt, & sub pectoris osse deorsum perreptantes numerosas à se diffundunt soboles. Sinistra (quod & de dextra subauditum uelim) secundum læuum pectoris ossis latus, ubi costarum cartilagine ipsi coarctantur, decliuis ad abdominis superiora tendit, in progressu ad sex superiorum septem costarum interualla singulas propagines distribuens, quæ ad terminum ossis costarum ubi uenæ coniuge carentis^t ramos cessare diximus, finiunt. Quemadmodum uerò à ramis uenæ pari carentis, propagines extra thoracis amplitudinem ad musculos costis instratos excidere relatum est, sic quoque à uenis ad cartilaginum interualla disseminatis, ramuli notatu digni in musculos pectori incumbentes, ipsasq; adeò mamillas propagantur, si modò ad has à uenis pectoris ossi exporrectis, furculi deriuentur. Porro quod ex uenis sub pectoris osse deductis^u reliquum adhuc est, ad latus mucronatæ cartilaginis deorsum in carnosam rectorum abdominis musculorum partem distribuitur. Venæ enim è thoracis amplitudine prolapsæ, sub rectis musculis ad mediam usq; abdominis sedē feruntur, ramulos quosdam in proximas partes utrinque transmittentes. Quorum præcipuus ad abdominis cutem subit, atque obliquè secundum costarum cartilaginum terminos propagatus, in gracillimas et capillorum modo subtiles uenulas exhauritur. Ceterum insigniores uenarum rami, sub rectis musculis exporrecti, in plures furculos^x supra umbilici sedem cessant, qui rectorum abdominis musculorum substantiæ implexi, ^y illarum uenarum terminos finesq; spectant, quas in sermonis progressu, ab imo propter genitalia sursum sub rectis musculis cōscendere audies, quū earum usus quem in menstrui sanguinis ad lactis generationem, & sanguinis item ex mamillarum sedibus ad uterum fœtus enutriendi gratia reuulsionem, ipsas præbere credimus, explicabitur. Harum uenarum sub pectoris osse reptantium originem ex anteriori mediâq; in iugulo bifurcationis sede, ut plurimum fieri animaduertes. interdum uerò eas ab^z axillarium uenarū radicibus, postquam illæ nō nihil à iuguli medio in latera recesserāt, enatas obseruauimus: quæ admodum aliquando alteram ipsarum, & præsertim sinistram ab axillari, alteram uerò ab ipsa bifurcatione pronatā uidimus: quemadmodum etiam nō infrequenter occurrit ab anteriori uenæ cauæ sede, ubi in duos insignes truncos partitur, unicam pronasci, quæ sursum ad pectoris os ducta,

Quam ob rem
non semper ser
moni addendū,
ubi is à Gale
ni placitis de
clinet.

Cauæ ad iugu
lum incessus.

Cauæ caudi
cis in iugulo
bipartitio.

Venæ axillar
rem constitu
entis ortus.
Venæ superio
ra costarum
interualla pe
rens.

Venæ sub pe
ctoris osse de
orsum repen
tes.

lab F ad H.
m 2 fi. lib. 6
F.

n H.

o I.

put F sub E
in 1 figura
lib. 6.
q K.

r H.

s Altera L
insignitur.
dein utraq;
2 fi. li. 6 B.
C.

t G, G.

u 1 fi. lib. 3
K. 6 mus. 14.
a. ubi etiam
rectum mu
sculum f in
signitū spe
ctabis.

x M.

y r.

z ab I.

ducta, in duas diffcinditur uenas, ac unam dextro pectoris ossis lateri, alteram sinistro exporrigit. Ab his quoque uenis secundum pectoris os deducendis, membranæ thoracis cauitatem interdiuidentes primos mutuantur furculos, ac subinde etiam à caua ubi nunc dictas promit uenas, ^a graciles quasdam propagines sibi uendicant, secundum totam membranarum longitudinem cum ^b neruis septi transuersi exporrectas. Quinetiam, ut et antea monui, à ^c uena pari carente in membranas thoracis cauitatem intersepientes furculi accedunt, uenis quæ ^d adhærentem oculi tunicam implicant, quàm similimi. Ab his uenis etiam soboles in cordis inuolucrum, ubi membranæ thoracem intersepientes ^e hoc continent, pertinent. Cæterum ^f uena axillam accedens priusquam è thorace procidit, non ita procul ab ipsius initio ex elatiori sede ^g uenam utcunque amplam promit, quæ sursum obliquè in posteriora tendens, ad transuersos uertebraarum ceruicis processus deducitur, & per ^h foramina illis priuatim exculpta sursum conscendens in musculos uertebrais proximè adnatos, soboles spargit. At præter illas, certo ordine & ueluti geniculatim singulas soboles unicuique foramini neruorum exortibus in ceruicis uertebrais inciso deriuat, dorsali quæ medullæ ipsis quæ ad eò uertebrais alimentum suppeditat. Quod uerò eius uenæ reliquum est, in caluariam contendit, ⁱ peculiare sibi cum ^k sua coniuge arteria foramen obtinens, quod ad posteriorem occipitis ossis capituli sedem excauatum antea dixi. Vbi uerò uena in caluariæ amplitudinem pertingit, in ^l secundum seu sinistram duræ cerebri membranæ sinum, uti postea auditurus es diffusius, exhauritur. Præter hanc uenam, ^m alia adhuc ab illa quæ in axillam contendit, priusquam è thoracis cauitate labitur, ex ipsius posteriori regione principium ducit, quæ in musculos, humilioribus ceruicis & thoracis elatioribus uertebrais adnatos, ac capituli dorso & thoracis motibus famulantes, dispensatur. Simulatq; uerò axillam petens uena inter primam thoracis costam & clauiculam ex thoracis cauitate progreditur, ⁿ musculumq; perforat qui secundi paris dorsum mouentium alter est, non semel ^o cam ^p promit uenam quæ humeralem postea uocabimus, & ilico atq; decliuus ducta glandulas in axilla ad firmam uasorum distributionem à Natura procreatas contingit, quas nunc dicam à se emittit propagines. Primum utrinque singulas promit uenas, ad thoracis quidem anteriora ^q unam, ad posteriora autem ^r alteram. Quæ antrorsum exporrigitur, in ^s musculos à pectoris osse & costis ad brachij os & scapulam pertingentes diffunditur, & pectoris cutem simul & mamillas frequenti admodum ramorum serie in mulieribus adit. Vena autem retrorsum proficiscēs in musculos cauam scapulæ sedem occupantes, uicinasq; sedes multiplici etiam sobole digeritur. Ceterum nonnunquam à ^t priori & quæ pectus accedit uena, interdum uerò ab ipso qui in axilla consistit ^u trunco ^x alia grandis utcunq; uena exoritur, quæ deorsum secundum thoracis latum exporrecta, potissimum absumitur in ^y musculum, cuius beneficio brachiū decliue dorso ad mouemus. Præter hos ramos maior uena quæ in axilla habetur, ^z exiguos ablegat furculos glandulis & mēbranis, quæ inibi uasorum distributionibus eorundēq; colligationibus præfunt. Qua autem serie axillaris uenæ reliquum in totam manum excurrat, peculiari Capite mox atque cæteras ascendentes uenæ cauæ propaginis soboles absoluerò, expediam. Proinde ad iugulum rursus sermone conuerso, cæteros truncorum ^a magnæ illius in iugulo diuisionis ramos aggrediamur. Vena itaq; caua ad eum quem dixi modum priusquam pectoris ossis summum transcendat, in duos truncos diducitur, ac statim à diuisione nuper ^b commemorata uena, quæ axillam petit, principium obtinet: quod autem alterius diuisionis illius trunci adhuc superest, à media primæ thoracis uertebrae corporis ^c sede, cui prius innitebatur, modicè recedens, sursum extra thoracem protenditur, & simulatq; clauiculam pectorisq; ossis summum superauit, in ^d duos impares ramos scinditur. Interior namque exteriori magis quàm pleriq; arbitrantur gracilior est, & secundum asperæ arteriæ latus ^e ascendens, nonnullas uenulas in speciem capillorum exiles asperæ arteriæ conterminisq; membranis communicat. Hæc interior censetur iugularis, quæ cum sui lateris ^f soporali arteria uersus cerebrum fertur, ac in ascensu graciles ramulos membranulis ^g sexti neruorum cerebri paris in collo & in faucibus etiam septimi paris neruos colligantibus digerit, uniuerso ductu soporariæ arteriæ ad caluariæ usque basim commissa. quò cum ^h peruenit, in duos inæquales amplitudine ramos diffcinditur, ac ⁱ amplior obliquè retrorsum, secundum caluariæ basim ductus, caluariam simul cum quodam soporalis arteriæ ramo ingreditur, ^j foramine utens sexti neruorum cerebri paris gratia exculpto. Qua uerò serie in caluariæ cauitate præsens ramus digeratur, in cerebri uasorum descriptione affatim persequar: modò autem sat erit, ad caluariæ usque amplitudinem uenas, quæ eò pertingunt, sermone deducere. Ab ampliori hoc iugularis internæ ramo, quum uti diximus in posteriora secundum caluariæ basim is contendit, ^k propago diducitur, in

Aliquot rami
à uena axillā
petente sparsi
priusquam bra-
chium subeat.

Caua per col-
lum caputq; se-
ries.




Interior iugu-
laris.

Exterior iu-
gularis hume-
rariae q̄ ortus,
& priusquam
brachium su-
bit series.

Exterioris iu-
gularis series.

in elatiorem sedem¹ musculorum pertinens, qui anteriorem cervicis vertebrae regionem occupant, stomachoq̄ subiacent.^m Gracilior uerò internæ iugularis ramus soporali arteria pe-
nitus relicta,ⁿ priuato foramine caluariam subit, quod iuxta foramen tertio^o & quarto pari
neruorum cerebri commune cælatum retulimus. Priusquam uerò ramus ille in duram cerebri
membranam digeratur, totus que in caluariam mergatur,^p sobolem non admodum insignem
ad auditus organum depromit, eam per^q foramen quoddam transuersum mittens, quod huic
soboli & neruulo cuidam quinti paris neruorum cerebri commune censetur. Porro^s exterior
idemq̄ grandior supra clauiculam factæ diuisionis ramus, ab exteriori ipsius latere postquam
musculorum dorsum mouentium secundi paris^r alterum perforauit,^u insignem à se diducit
uenam, quæ deorsum uersus clauiculam reuoluta ad summum humerum ipsumq̄ adeò bra-
chium contendit. Antequam tamen huc pertingat, non procul ab ipsius ortu^x ramum edit,
qui in cutem posteriori cervicis sedi obductam, & externos eius sedis musculos, numerosa ue-
nularum serie digeritur. Præter hunc uena sub clauicula brachium petens,^y alium quoq̄ gran-
diorem depromit ramum, in gibbam scapulæ sedem frequenti etiam sobole dispersum. Dein-
de quando ad^z summum pertendit humerum, atq̄ sub illo in brachium prorepit, priusquam
penitus demergitur, in summi humeri cutem^a propagines deriuat, quarum præcipuæ in cutē
digeruntur, quæ^b musculum integit, cuius ope brachium attollimus. Eiusmodi propagines
interdum, idq̄ potissimum in mulieribus, ad mamillarum usq̄ cutem^c excurrunt, deorsum in
priora secundum clauiculam errabundo progressu deductæ, & ante sectionem in plerisq̄ mu-
lieribus uirescente quodammodo aut cæruleo colore apparentes. Qua autem serie eius uenæ
brachium adeuntis reliquum (quod humerariam uenam constituit) in manum digeratur, po-
sterius dicā, quando peculiari Capite ipsius axillarisq̄ uenæ distributionem persequar. Cæte-
rum^d maior ramus, quē supra clauiculā haberi, atq̄ ab externo suo latere humerariā germinare
diximus, sub cute ac^e lato buccas mouēte musculo secundum colli latus ad fauces porrigitur, ex-
teriorem efformans iugularem, quæ non parī semper modo (uti in uociferantibus, aut aliās ui-
spiritum retinentibus, & uetulis indies obseruamus) per colli cutem fertur, sed ferē quadru-
plicem distributionis speciem proponit. Prima (quam frequentius est cernere) ea est, qua
unus tantum ramus hīc sub cute ad fauces usque procedit, in ipso progressu nullibi insigni-
ter discissus, sed duntaxat graciles ramos in musculos conterminam que cutem partim rectā,
partim obliquē, & interdum transuersim conscendentes, uariē spargens. Secunda autem

P R I.
mam distri-
butionis ex-
terna iu-
gularis ue-
næ seriem,
nuda caue
delineatio
docet, re-
liquas ue-
rò tres pri-
uatis &
nunc seria-
tim hīc re-
positis for-
mulis ex-
pressi, ac
earum pri-
mæ eosdem
characte-
res, quos in
tegra deli-
neatione ac-
commoda-
ui, ratus
ex illa hāc
ita faci-
lius posse
perpendi.



ea uisitur, qua in medio ductu iuxta colli longitudinis medi-
um iugularis in duos insignes ramos dirimitur, & unus qui-
dem in priora, alter in posteriora quodammodo sursum pro-
perat. Tertiam rariùs accidere conspiciamus, nimirum qua pro-
pter clauiculam adhuc, ubi humeraria originem ducit, exterior
iugularis in duas propagines diffunditur, quæ sursum sub cu-
te inuicem distantes feruntur. Quarta ex tertia paratur. aliquo-
ties enim illæ propagines inuicem perpetuò distant, ac nusquam
se mutuò contingunt. interdum uerò ad humiliorem faucium se-
dem mutuò rursus coeunt, ac ex ambabus una constituitur ue-
na, quæ mox bipartita, uti modò subiungam, in ramos cessat.
Verum subinde & ex tertia serie alia adhuc consurgit differen-
tia. Nam aliquando altera, neque illa sanè minor propago, cu-
ti non subtenditur,ⁱ musculo recondita qui à pectoris ossis sum-
mo & clauicula pronatus, mamillari temporis ossis processui in-
feritur. atque ea propago in eum modum submersa, frequenter
adeò insignis occurrit, ut etiam nonnulli dissectionum professo-
res hanc internam iugularem uideantur appellasse: illam^s ue-
nam interim negligentes, quam prius internam iugularem no-
minauimus. Vtunque igitur exterior iugularis aut unica u-
trinque, aut in medio per collum ductu, aut statim à clauiculis
gemina ascendat, semper cuti quā prorepit insignes notatūque
dignos offert furculos, ac quum ad fauces usque iuxta inferio-
ris maxillæ humiliorem sedem sub aurium regioneⁿ contendit,
suiⁱ portionē ad oris interiora & duram cerebri membranā trans-
mittit,^k reliquum uerò ipsius in faciei cutem & illius musculos, &
ad tempora, & post aures, & uniuersam breuiter capitis cutem
trans-

l 8 mus. ta.
A, B.
m fi. ca. 14
F. faciēs ra-
mos 0,0,0.
n 2, 3 fi. ca.
12 lib. 1 R
iuxta Q.
o 14 fi. lib.
7 1 & K.
p fi. 14 ca. n.
q 2 fi. ca. 12.
lib. 1 V
r 2 fi. ca. 2
li. 4 b ab a
enatum.
s T.
t 8 mus. ta.
C.
u a.
x b.
y c.
z ultime fi.
lib. 1 n
a d, d.
b 4 mus. ta.
E. 10. ta. Δ.
c 25 fi. lib. 5
A, A.
d T.
e 3 mus. ta.
r.

f 4 mus. ta.
o.

g s.

h v.
i X.
k Y.

transfunditur. ¹ Portio interiora oris subiēs, in primis suis scissionibus ^m glandulas exigit, quæ in faucibus sunt inferiores, quasq; tertium glandularum genus in sexto libro recensēbimus. His glandulis quæ uasorū hīc præsunt distributionibus, ab interiori externę iugularis portione ramuli dispensant, mox notatu digni in laryngē & ⁿ glandulas ipsi proximē adnatas, et musculos ossis ^v referentis, & lingue, & uniuersim ad omnes fauciu sedes, furculi deriuantur, quorū insignis sub lingua secundū ipsius longitudinē prorepat, in multiplices & errabūda serie prorepentes ^o ramulos scissus. Quinetiā ab hac iugularis portione præter ^p grandē ramū qui in caluariam per ^q foramē subit, ad posteriōrē mamillaris processus sedē cælatur, rami etiā in palatū & tunicā nariū amplitudini obductā digeruntur, à quibus postmodū nō negligendę ^r soboles caluariam petunt. Vna enim per ^s foramē, quod secundo cerebri neruorū pari inſculpiť, caluariā accedēs, in durā membranā aliquot furculis excurrit, quemadmodū & altera soboles duræ membranæ offertur, caluariā ingrediens per grandius foramen ^t illorū quæ in octauo capitis osse odorum gratia exſcunt. Hæ soboles quū caluariā ingrediuntur, furculos quosdā oculo elargiuntur, in frontis cutem interdum disseminatos. Exterior externæ iugularis portio per capitis exteriora passim repens, perinde atq; interior, cuius seriē iam absolūimus, mox glandulas suis distributionibus præfectas obtinet, quæ inibi reponunt, ubi inferior maxilla superiori articulatur. Præfens portio inter has glandulas bipartitur, et ^u uno ramo in buccas, nariū alas, & ad ^x frontē uariē exporrigit: altero autē ^y tēpora & ^z auriū sedem adit. Hic enim ramus rursus in duos præcipuos furculos diuisus, unū in sui lateris tempus admodū errabundo & inuoluto ductu digerendum offert: alterū uerò post aures & ad occipitis cutē diffundit. Verūm exterioris iugularis soboles in faciē ac capitis cutē digestæ, hoc sibi priuatim uendicant, quòd dextri lateris uenæ, sinistri lateris uenis permisceant, ac inuicē coēant, idq; potissimū in faciē & uertice, & imprimis adhuc in fronte: adeò ut frontis uena plerūq; ab utrarumq; iugulariū propaginibus per internos oculorū angulos sursum deductis conflatur. Ad hæc, per ^b exigua uerticis ossiū foramina et suturas ^c gracillimæ uenulæ in caluariā procidunt, nō aliter atq; rursus ex caluariā in cutē alias emergere tum dicā, quando cerebri uasorū seriē priuatim persequemur. Quippe hæc opportunē tantisper dū in caluariā arterias quoq; sermone perduxerimus, asseruabitur, quòd uaria cerebri uenarum arteriarumq; sit cōmixtio: quā incognita adhuc arteriarū ad caluariā diuaticatione, arduū foret percipere. Quanquam interim cuius integrum sit, Caput à præsentī septimum, cerebri uasis dedicandum, aut hīc, aut ipsius quo id reponam loco aggredi.

VENAE AXILLARIS ET HUMERARIE

varie per manum series. Caput VIII.



a I ad m.
b a, d.
c T.

d Sub a &
Qult. figu.
lib. 1.

e inter I &
a iuxta T.
f ut in sinistro latere
ultimæ fig.
g b, c, d, d.
h 3 mus. ta.
inter P &
Δ per lineā
ab L ad Q.
i 6 mus. ta.
k e, e, e.
l f.
m f.
n 2 ft. ca.
o 2 li. 1 P.

VENAS duas à caua in manum propagari, prius relatum est: unam quidem, anteaquam caua thoracis amplitudinē superet: alteram uerò ab ^b externa iugulari, ubi ea clauiculam pectorisq; summum aliquantisper superauit. Hæc quòd ^d sub summo humero ipsaq; adeò clauicula in externā brachij sedem procedat, humeraria & cubiti exterior dicitur. illa autē quòd per axillā internamq; brachij sedem prorepat, axillaris interiorq; cubiti uena nuncupatur. Et quāuis utraq; uena in plurimos pullulet ramos, cū in superficie sub cute, tum altius inter musculos propter ossa deductos, attamen axillaris quanto humeraria grandior ampliorq; uisitur, tanto etiam in frequentiores numerosioresq; soboles dispergitur. Humeraria nanq; ab externo latere exterioris iugularis longē minori, quā uulgus arbitratur, ^e interuallo, & interdum à communi cum axillari trunco, quā is primam thoracis costam superat, principium ducens, atq; ^s illos quos præcedente Capite recensuimus ramos dispergens, ad posteriorem clauiculæ sedem contorquetur, ac sub summo humero prorepens, ⁿ inter internū latus musculi brachium attollentis, et ualidum tendinem musculi brachium ad pectus ducentis in brachium procedit. Dein carnea membrana sub cute suffulcitur, deorsumq; porrecta etiam ante sectionē in omnibus euadit cōspicua, nisi fortē graciliores omnino uenas homo obtineat, obefiorue sit. Porrigitur itaq; recto tramite deorsum per anteriorem (uersus exteriora tamē magis) brachij regionem, secundū exterius latus ⁱ musculi cubitum flectentium anterioris. In descensu uerò ad cubiti usq; articulum ^k graciles duntaxat ramos utrinq; in cutem sibi proximam, anterioremq; musculi cubitum flectentium prioris sedem dispensat, qui partim rectā, partim obliquē & transuersim in cute ita prorepunt, ut interdum uersus internam brachij sedem ad axillaris uenæ ^l soboles in cutem digestas pertinere, cum illisq; coire uideantur. ^m Quando humeraria cubiti attingit articulum, iuxta ⁿ exterius humeri tuberculum in tres diducitur uenas ^k ampli-

Humer. series
iuxta cubiti ar-
ticulum.

*Li. de Venarum
sectione.
li. 3 de Admi.
sectione.*

*Axillaris in
brachio consi-
stentis series.*

*Præcipua ax-
illaris in duos
truncos distri-
butio.*

amplitudine interdum æquales, nonnunquam uerò una cæteris ampliori. ° Prima (quam fre- o g.
quentissime, ac potissimum in hominibus deesse reperies) penitus obliqua deorsum ad me-
dium flexus cubiti articuli deferitur, atque sub^p musculorum secundos tertios^s que digitorum p 5 mus. ta.
articulos flectentium, hincq; ab humero & ulna originem fumentium capitibus in aliquot ra- o. 6 ta. 3, n.
mos digesta cessat. non autem uti Galenus scribit, alicui^r axillaris uenæ ramo (quemadmodum r aut q, aut
^s ea quam nunc persequar) commiscetur. Vt enim Galenum axillaris uenæ portionem sub mu- r.
sculis reconditam minus rectè descripsisse obseruabis, ita etiam primæ huius humerariæ pro- s h.
paginis (si quando hæc unquam cernitur) seriem non est assequutus. Vti sanè admodum con-
cinnè uereq; eas descripsit uenas, quæ citra sectionem in nudato, ut in uenæ sectione fit, brachio
plurimum & frequenter illi occurrerunt. ° Secundus itaq; humerariæ ramus, quem cum alijs t h.
duobus paulo suprà cubiti articulum deriuat, cæteris plerunque crassior existit, & obliquus
quoque sub cute ad cubiti cum humero articuli flexus medium descendit, ac cum axillaris ue-
næ^u ramo, quem postmodum commemorabo, coit, ° unaq; ex ambobus ramis, humerariæ ni u t.
mirum & axillaris uena conflatur. ° Tertius humerariæ ramus, ° musculū qui radio iuxta bra- x a.
chiale insertus, radij in supinū motus autor est, conscendit: & paulatim deorsum prorepēs, obli- y i.
quus per radium iuxta medium ipsius longitudinis in externam cubiti regionem perfertur, a 6 mus. ta.
quam ubi attingit, ut in reliquo super commemoratum nuper musculum ductu, ° furculos quos Δ. 12 ta. o.
dam in proximam sibi cutem depromit, quorum non ° infimus esse solet, qui ab ipso educi- b k, k.
tur, quæ humeraria in tres illos ramos iuxta externum humeri tuberculum diffcinditur: Cæ- c superius
terum tertius hic ramus sensim oblique uersus ulnæ appendicem, brachialisque radicem k.
prorepens, tandem ° alteri cuiuspiam inibi ° commiscetur uenæ, hacque adauctus externam d x, x.
brachialis sedem conscendit, & in aliquot furculos errabundo ductu sparsos dissectus, regionē e l.
intercurrit, quæ ante paruum digitum & anularem habetur, externa etiam illorum digitorum
fede soboles quasdā sibi uendicante. Cuius uerò uenæ propago illa demū sit, quam tertio hume-
rariæ ramo uniri iam scripsimus, subiungam, ubi primum aliquot axillaris uenæ propagines
absoluerō. quippe ab axillaris ramo sub cute per totam ulnæ longitudinem exporrecto, illius
propaginis initium pendet. Axillaris itaque, ° quum primum axillam superat, brachium^f que f m.
subingreditur, inter musculos brachij os amplexantes delitescit, præcipue uerò inter antero-
rem sedem ° primi seu interioris cubitum extendentis, & posteriorem sedem tendinis ° muscu- g 1, 12 mus.
li, quo brachium pectori admouetur, & dein iuxta cubitum flectentium musculorum ° poste- ta. T.
riorem. Hæc primum capitibus ° musculorum, quorum ope cubitus extenditur ° propagi- h 3 ta. Δ.
nem offert, illis ° uenulis ē regione eductam, quæ ab axillari in glandulas hic repositas dige- l 8 ta. r.
runtur. Post hanc, sed demissius, ex posteriori ipsius sede ° uenam ipsdem musculis dispensat, a m 11 ta. o, f.
qua mediocris etiam magnitudinis soboles in externæ brachij sedis cutem disseminantur. Ab n n.
externo latere axillaris uenæ, ° alia notatu dignæ amplitudinis propago diffunditur, oblique o inter P et
deorsum sub humero ad ° externum usque ipsius tuberculum descendens, ac sub ° musculis cu p o.
bitum extendentibus occultata, ° musculorumq; capitibus ab externo humeri tubere prona- q p.
scentibus, ramulos quosdam exhibens, ac demum aliquousq; in externam cubiti sedem prore- r 2 fi. ca. 23
pens, simul cum ° neruo quem brachium petentium opportunè quartum enumerabo. Has pro li. 1 P.
pagines axillaris adhuc in alto latitans edit, ipsaq; in ° duos truncos diffcinditur, quos sanè ac s 9 mus. ta.
curatissimè examinatos uelim. non tantum Galeni nomine, quem hæc axillaris diuisio latuit, T, S.
sed eorum quoq; qui se operæ precium aliquod in Anatome arbitrantur præstitisse, dum sectio t eiusdē ta.
nem semel atque iterum aggressi, simul cum axillari uena humerariam porrigi, se animadu- Y, Z, o, Δ.
eritisse scribunt, oscitanter humerariam (quæ etiam uel ante sectionem notissima esse debuit) unā u 2, 3 fi. ca.
cum carnea membrana à brachio auferentes, & postmodum ° alteram axillaris uenæ partem 11 li. 4 o.
(quam modò persequar) humerariæ loco describentes. Axillaris itaq; hominis uena non pro x in q or.
culab ipsius ē thoracis cauitate in axillam egressu, in duos quodammodo pares diffcinditur y q, q. or ul
truncos, quorum alter interiùs atq; in profundo toto ductu submergitur, ac ° arteriæ in ma ti. fi. f. f.
num exporrectæ perpetuò attensus, eadem ferè cum ea distributionis serie digeritur, simul etiā z fi. cap. 12
° neruo brachium adeuntium tertio concomitatus. Inter ° duos enim cubitum flectentes mu- N.
sculos deorsum ad mediam sedem flexus articuli cubiti porrigitur, illis musculis, & dein mem- a 2 fi. ca. 11
branis quibus nerui induuntur ramulos spargens. Quando autem cubiti articulum supera- lib. 4 z.
uit, atq; inter musculos digitorum flexus autores in alto reconditus ferri incipit, in ° duos diri- b 6 mus. ta.
mitur ramos, qui modicè ab inuicem recedentes, ac musculos quos perreptant furculis impli- inter o or
cantes, unā cum tendinibus internā summæ manus sedē petunt, qui per ° ligamentū in interna r, r.
brachialis regione anuli modo conspicuum porriguntur. Rami inibi in alias soboles partiti c Pete id ex
sub ° tendine feruntur, qui latescens uolæ cuti subnascitur, atque hinc ita in internam digito- arteriæ se-
rum ric.
d 4 muscu-
ta. o.
e 4 ta. ten-
do musculi
n.

rum sedem digeruntur, ut binæ soboles pollicis, & totidem indici, & una medio offerantur, à ramo qui secundum radiū per cubitū porrigitur. Ab illo autem qui ulnæ exporrigitur, binæ soboles anulari, & minimo, & una medio exhibentur, ab illoq; ramo furculus^f musculos adit, qui externam uolæ sedem occupant, atq; ita ab altero ramo furculus in^g musculos penitiùs pertinent, qui primo pollicis ossi connascuntur. In hunc igitur modum axillaris truncus sub cute nusquam prodit, totusq; in altis & delitescentibus sedibus absorbetur.^h Alter truncus sensim ex alto ad internę brachij sedis cutem emergit, uersus humeriⁱ interius tuberculum properans, ac ante sectionem sub media cubiti longitudinis sede non minus quàm humeralis supra cubitum conspicua. Vbi autem anteriori tuberculo humeri incumbit, ad elatiorem eius tuberculi sedem paulo elatiùs quàm cubiti cum humero articulus consistit, in^k duas magnitudine propemodum æquales partitur uenas, quarum anterior cuti substrata (quemadmodum & omnes præsentis trunci soboles) oblique deorsum ad mediam cubiti articuli flexus sedem repit, ac cum^l secundo humerariæ ramo ad humiliorem mediamq; flexus illius sedem coit, ^m unaq; inibi ex ambabus confurgit uena, quam communem, quia ex axillari & humeraria constituitur, merito appellamus. uulgus tamen medianam uocat, etiam si Græci & Latinorum præcipuiⁿ ramos qui hanc communem efformant, medias & obliquas nuncupauerint. ^o Posterior autem uena huius axillaris iuxta interius humeri tuberculum bipartitionis, frequentes ramos deriuat inferioris cubiti sedis cuti & interioris itidem exteriorisq; sedis humiliorum, ac secundum ulnā sitarū regionū cuti inter præcipuos ramos huc excurrētes, ^p unus secundū ulnæ inferiorē sedem, ad exteriora tamē magis declinans, uersus brachiale porrigitur. Huius rami soboles cū humerariæ^q ramo huc contendenti^r coeſ, simul cū illo, uti prius diximus, digeritur. Interdū autē illo humerarię ramo deficiēte, ea axillaris uenæ propago abundē eius rami uices in extrema manu gerit. Præter hunc ramum posterioris illius axillaris trunci uenæ primariū, ^s aliud ex illa cutē adit, qua posterior cubiti articuli sedes induitur, atq; is ramus in externā cubiti sedem nō admodū procul perreptat. Verūm aliq; etiā^t rami ab^u hac posteriori uena in internæ cubiti sedis cutē digeruntur, qui uario & admodū incerto implexu permiscuntur et coeſ, furculos ab insigniori illo^x ramo quē ulnæ exporrigi dicebā assumentes, aliosq; rursus ipsi furculos impartientes. His furculis & propaginibus in eum modū per cubiti interiora reptantibus, ^y alia frequentissimē accedit non contemnenda, quā axillaris uenæ^z ramus communē uenā cum humerarię ramo efformans, ab humiliori sede & ex medio ductu emittit. Hæc interdū rectā ad brachiale contēdit, interdū uerò errabundo ductu perfertur, alijsq; huius sedis propaginibus cōmiscetur, quæ adeò graciles sunt uarięq; inuicē implicantur, ut interna cubiti regio nō minus frequēter quàm tibie uenter seu sura uaricibus moleſtetur. Propagines hæ neutiquam ad brachiale terminantur, sed partim oblique, partim rectā, partim uerò transuersim, & modò inuicem commixtæ, modò rursus diremptæ, totam summæ manus internam cutem perreptant; ipsi cuti passim connatæ, ac inter cutem carneamque membranam consistentes. Porro harum propaginum quæ pollicis radicem, seu Veneris, aut ut alijs uisum est, Martis collem accedunt, priuatim id sibi uendicant, quod ipsis^a ramus ab illis uenis^b permiscetur, quas à communi uena in externam pollicis regionem diffundi iam dicturus sum. ^c Communis enim uena ilico^d atque^e duabus illis axillaris & humerarię propaginibus conflatur, oblique deorsum ducitur, ad elatiorem cubiti sedem paulatim contendens, quousque radium paulo ultra ipsius longitudinis medium hinc inde transcendat: neque id eodem semper modo, ramos diffundens, & interdum aliunde ab interna cubiti sede alios assumens, ac tandem in externam cubiti sedem peruenit, perpetuò cuti substrata. Vbi itaque hanc sedem euicit, priusquam mediam radij appendicis sedem accedit, ^f supra radium aliquanto ante illius cum brachiali articulum, in^g duos ramos communis uena diffunditur. Atque hanc sectionem aliq; Græcorum^h γ (non autem ρ) aliq; uerò Y & Λ etiam referre scripserunt. ⁱ Alter istius sectionis ramus, qui elatior est, ^j portiunculam ad internam brachialis sedem uersus pollicis radicem dispensat, quæ dictis nuper hanc sedem perreptantibus furculis^k commiscetur. Quod uerò elatioris rami reliquum est, exterius inter pollicem & indicem sursum ascendit: atq; hinc in uarias soboles inuicem aliquando unitas, aliquando autem rursus seiunctas dispergitur. ^l Alter ramus qui inferius γ aut Y caput constituit, indicis, & medijs, & aliquousque anularis sedem petens, in uarias quoque soboles exhauritur. Quippe hæc uenarum in summæ manus cutem series adeò uaria est, pugnansque, ut hanc explicare prorsus arduum sit, præsertim quum inter quamplurimos homines uix duos æquali correspondentique uenarum in ramos propagine inuenias, adde eiusdem hominis dextram sinistræ rarò admodum congruere. Operæ precium itaq; fuerit, uenarum in manum propagines non hinc, sed ex sectio-

Axillaris uenæ portionis cutem subeuntis series:

Communis uenæ constitutio.

Communis uenæ series.

Variā extremitatis manus cutem implicantium uenarum esse seriem:

*Venarum se-
nem crebro
uariare.*

ne & ante confectionem in brachijs uinculo interceptis, quum uenam diuidimus condiscere, atq; ad amissim expendere, quam in uenarum sectionibus nostri, si dijs placet, Æsculapij hallu-
cinentur, qui grauiter num humeraria, aut communis, aut axillaris in eadem manu diuidenda
fit, ridiculè contendentes, humerariam sese aperire existimant, quoties uenam inter pollicem &
indicem aperiunt: & axillarem, si uenam inter anularē & minimum, aut ut alijs arridet, inter me-
dium & anularem incidunt. Ad hæc, quis non conspiciat ipsos in cubito quamcunq; uenam ar-
bitrentur referendam, propemodum nullam præter axillaris uenæ^m ramum ad communem
uenam exporrectum incidere: Cæterum ut in extremæ manus cute etiam in eodem homine ue-
narum distributio uariat, pari quoq; ratione & in cubito subinde uenarum propagines diuer-
sas uidere est. Interdum enimⁿ duarum mediarum ad communis uenæ generationem concur-
sus non in cubiti fit flexu, sed multo humilius, nō procul à medio longitudinis cubiti. Aliquan-
do humerariæ ramus communem accedens occultitur, axillaris ramo uisum non fugiente. Non
nunquam rursus contraria est ratio. Contingit etiam nō semel, axillaris ramum, qui ad commu-
nem fertur, humerariæ ramo longè aut graciliorem aut ampliorem esse, & interdum hunc aut il-
lum geminum uideri. Quandoq; (& id non infrequenter)^o tertius humerariæ ramus exter-
nam cubiti sedem accedens, omnino deest, ipsius uicem tunc suppleantibus ramulis, qui à^p com-
muni uena in cutem excurrunt, ac subinde etiam ab axillaris ramo, qui toti ulnæ longitudini p^a
exporrigitur.

VENAE CAUAE PORTIONIS AD PAR- tes infra septum transuersum locatas distributæ series. Cap. IX.



*Ad sinistri
renis inuolu-
crum uena.*

*Ad dextri re-
nis inuolucrum.*

*Ad renes ue-
na.*

*Sinistræ semi-
nalis uenæ se-
ries.*

REQVENTES sanè & insignes admodum propagines etiam à cauæ
portione sub iecore lumborum uertebri exporrectæ pullulant, quæ in
hunc se habent modum. Simulatq; caua secundum posteriorem iecoris se-
dem deorsum prorepens, nō amplius iecori cōnascitur, nō nihil obliqua
ex dextris quodammodo corporis partibus introrsum, ad mediū uideli-
cet dorsi fertur, ilico^r ramum nō admodum grandē ex sinistro latere pro-
mēs, qui potissimū numerosa uenularū serie in pingue mēbraneamq; sini-
stri renis tunicā digeritur, quæ à peritoneo pronata, renē inuestit, eundemq; dorso alligatū con-
tinet. Hic ramus infrequenter ex dextro cauæ caudicis latere, uenā coniugē adipiscitur. Quan-
doquidem^s uena dextri renis pingue tunicā conterminasq; peritonæi sedes accedēs, nō à caue
caudice principiū ducit, sed ab elatiori regione^t eius uenæ qua dextro reni serofus sanguis de-
portatur. Aliquando interim uena frequenti sobole in sinistri renis tunicam disseminata, ab ea
quæ in sinistram renem proficiscitur, originē sumit, ea quæ dextri renis tunice offertur, à caue
dextro latere pronata. Cæterum caua ab utroq; latere^u amplissimā propaginem, ubi iam mediæ
uertebrearum sedi innititur, in renes distribuit, dextrā quidem propaginē dextro reni, sinistram
autem sinistro deriuans. Atq; ut situs renū uariis est, ita quoq; harum propaginū exortus è di-
recto sibi neutiquā correspondet. quum enim dexter ren (uti plerunq; accidit) sinistro elatius lo-
cetur, dextri lateris propago altius quàm sinistri renis principiū ducit. Si uerò sinister ren dex-
tro superior sit (quod etiam crebrius quàm dissectionum professores tradunt, euenit) propago
quoq; in ipsum à caua transuersim quodammodo repens, elatius quàm dextra propago prin-
cipium ducit. Quamobrē uerò harum propaginum ortus nunq; è directio inuicē opponatur,
in quinto libro, qui renū functiones pertractabit, cōmemorabitur. Præsens enim sermo cauæ
ramorū distributioni potissimum est dedicandus. Venæ itaq; ad utrunq; renē protensæ, gran-
des admodū sunt, ac quamprimū concauā renū sedē contingunt, hominibus in^x duos ramos
partiunt, ac dein in renū substantiā mirabili quodā artificio hætenus nemini Anatomicorū co-
gnito digerunt. quod nam uerò id sit, in quinto libro perstringā. Cæterum priuatim ab humi-
liori sede^y uenæ eius quæ sinistrū renē petit, iuxta ductus ipsius ferè mediū, ^z uena pronascit in
uiris ad sinistrū testem tota excurrēs, præterq; quod graciles^a exiguosq; furculos in peritonēū,
quā porrigitur, ac in mēbranas tunicas ue sinistrū testē & seminaria ipsius uasa ambientes pro-
ducat. Hæc enim uena peritonæo, quā id lumborū^b carnibus in sternit adnata, deorsum super
pubis os fertur: quod quū superauit, atq; ex magni peritonæi amplitudine elabitur, in^c uarios
anfractus gyrosq; conuoluitur, quorū basis superiori testis sedi cōnata, ramulos in tunicā testis
substantiā proximè continentē digerit, & alijs frequentioribus ramis in testis substantiā passim
disseminatur. quemadmodū quintus liber, ubi generationis organa persequar, diffusius doce-
bit. Vena hæc sinistrū testem accedens, aliquando propaginem à cauæ caudice sub uenæ ad si-
nistram

m t.

n h, t ad a.

o i.

p a.

*q f. et 20 fi.
li. 5 Q. 22 fi.
g. 25 P.*

*r . et 20 fi.
lib. 5 X ad
V.*

*s . et 20 fi.
li. 5 Y.
t f.*

*u f. 1, et 20
fi. lib. 5 a, b.
22, 23 figu-
m, n.*

*x Spectaid
in 20, 22,
23, 25 fi. li. 9
in renum ca-
uo.*


y .

*z a, a.
a 20 fi. li. 9
gab c. unde
etiam, uti et
ex 22, 23 fi-
guris huius
uenæ seriem
petes.*

*b 8 mus. ta.
e, 3.*

*c v. aut spe-
cta 22, 23
fi. lib. 5 ad
a. aut 23 fig-
N. O.*

nistrum renem exporrectæ principio enatum
asciscit: quæ nō procul ab exortu sinistrorū
decliuīs prorepēs, cum illa coit, unaq̃ semina-
lis uena ex ambabus consurgit. ^d Vena autem
dextrum accedēs testem, non à ^e uena in dex-
trum renem protensa originem sumit, at à ue-
næ caudice aliquanto inferiūs, quàm uenæ re-
nibus exporrectæ principium ducunt. Huius
seminalis uenæ exortus, non ut reliquarū ferè
propaginum in cauæ consistit latere, uerum
ex ipsius eminentiori seu anteriori sede, uersus
dextrum latus nonnihil hæc seminalis uena ex-
tuberanti ac ueluti rotunda origine enascitur.
Presenti uenæ ramulum quoque ex ea quæ in
dextrum renem procurrit accessisse, ac simul
cum ea coiuisse, Galenus sibi semel obseruatū
testatur. Ego quoque totam dextri testis uenā
à uena quæ reni offertur pronatam semel uidi.
Quòd uerò hæc uena dextrum testem ea se-
rie adeat, qua sinistram sinistro testi porrigi dicebam, uel me tacente, cuius obuium esse sat scio.



Quoniam in nuda inte-
graq̃ cauæ uenæ figu-
ra seminaliū uenarum
originem ita atq̃ fre-
quentius secātibus oc-
currit, expressimus:
præfeti figura quādam
differentiā, quæ hic de
scribitur pingere uisū
est. Notet itaq̃ ^A,
^A, ^a, ^v, ^b, ⁱ, ⁿ, ^u, ^f, ^o
et ^π, idem quod in nuda
cauæ figura. ^B uerò
ramū a cauæ caudice
ad sinistri lateris semi-
nalem uenā porrectū,
ac cum ipsa coeuntem.
^C ramulū significet à
uena pronatum, quæ
dextro reni offertur,
atq̃ is ramus dextræ
seminali uenæ commi-
scetur.

Lib. de Vena-
rum sectione.

In mulieribus alia ^f harum uenarum est distributio. Quamuis enim illis par cum uirorum uenis
sit exortus, ipsæ tamen magna ex peritonæi amplitudine haud elabuntur, neque ad pubis
ossa pertingunt. Verum ad mulierum ^g testes ^h pinguibus membranis suffultæ porrigun-
tur, non uniuersæ in seminaria uasa degenerantes, aut totæ in testes exhaustæ. Nam prius-
quam ad testes deueniunt, utriusque lateris ⁱ uena bipartitur, ac ^k una portio uenæ uirorum
testi implicitæ modo, seminarium uas efficitur. ^l Altera uerò in membranas quoque pingues
intertexta, in uteri latera digeritur, elatiorem ipsius fundi sedem potissimum implicans. Præ-
ter seminales uenas caua ubi lumborum uertebri ^m ipsi que magnæ arteriæ colligatur, ab ip-
sius inferiori sede quæ uertebas spectat, ⁿ uenas geniculatim diffundit, per ^o foramina neruis
in uertebRARUM lateribus exsculpta ad dorsalem medullam digestas, & ramos dein à se spargen-
tes in musculos uertebri adnatos, à quibus rursus alię soboles in abdominis musculos orbicu-
latim ad abdominis usque latera conscendentes, & illis quas perreptant sedibus alimentū sup-
peditantes. ^p Quum primum uerò caua ad sacri ossis usque ^q summum descendit, atque iam
magnæ arteriæ (quæ ipsi prius ad sinistrum subijciebatur) tanquam digniori organo cedit, ac
quo minus arteria ossis sacri duritia in dorsi motibus molestaretur, caua ipsi arteriæ se subster-
nit, in duos æquales partitur truncos, quorum hic dextro cruri, ille sinistro (ubi eas quas mo-
dò dicam deprompsere soboles) offeruntur. ^s Sinister enim truncus (quod & de dextro etiā si
non dicatur, per reliquam cauæ seriem intelliges) statim in ipsa partitione, aut potius ubi caua
in duos truncos supra os sacrum diuiditur, ab exteriori ipsius latere ^t uenam promit maiorem
ijs quas ad lumborum uertebas & abdominis musculos, & alios ibidem dorso connexos dif-
feminari diximus. Vena hæc interdum ante cauæ supra os sacrum partitionē principium du-
cens, transuersim lumborum ^u carnibus insternitur, ipsis & peritonæo abdominisq̃ muscu-
lis ramulos dispergens, & in canibus multo quàm in hominibus manifestior. Posteaquam
sinister truncus hanc deriuauit uenam, oblique deorsum uersus exteriora fertur, figuram cum
dextri lateris trunco ^v ^Λ literæ aut ^Y in hunc modum ^Λ inuersi non absimilem constituēs,
& aliquot ^x furculos superioribus sacri ossis foraminibus offerens. Deinde mox in progres-
su in ^y duos impares ramos finditur, interior nanque gracilior est exteriore: ac mox duas edit
propagines, quarum alteram ^z interiorem, alteram ^a exteriorem manifestioris doctrinæ gra-
tia, dum Anatomen ostendo, appellare consueui. Exterior itaque propago tota quodammo-
do ^b inter sacrum & coxendicis os, quā ^c maximus neruorum crus petentium ducitur, in exte-
riora transuersim fertur, & numerosa ramorum serie in omnes musculos ab ilium ossis externa
sede pronatos, femorisq̃ motibus famulantes dispensatur, ramulos etiam deorsum in muscu-
los diffundens, qui ab inferiori coxendicis ossis sede principium ducunt. atq̃ ita articuli coxen-
dicis ossis cum femore posterior sedes, et clunium cutis hac exteriori propagine uenas mutuan-
tur. ^d Interior autem propago ab interiori ipsius latere exiguas soboles sacri ossis quoq̃ fora-
minibus dispēsat, & alias his maiores in recti intestini ^e musculos, cutemq̃ orbiculari sedis mu-
sculo obnatam digerit, quæ faculentum sanguinem per anum expurgant, si quando is per ue-
k 3 nam

Mulieris se-
minalium ue-
narum series.

Cauæ rami
lumborum uer-
tebris carnis
busq̃ oblatis.

Qui caua ar-
teriæ magnæ
supra sacri
ossis initium
subijcatur, ip-
siusq̃ hinc se-
ries.

nam cauam huc decumbat, eodemque colligatur. Deinceps hæc interior propago notatu dignum diffundit ramum, qui in uiris dextrum uesicæ latus amplectitur, & in plures scissus furculos, uesicæ ceruicem seu penem adit, in eumque numerosè digeritur, ea semper serie ut ceruici crassiores amplioresque furculi, quam uesicæ fundo exporrigantur. In mulieribus uero præsens ramus ab interna diductus propagine pingui membrana suffulcitur, ac quibusdam furculis uesicam quidem adit, uerum frequentioribus inferiorem fundi uteri sedem intercurrit, ramulos quoque spectabiles in uteri ceruicem dispergens. per quos uirginibus & nonnullis mulieribus, quæ primis mensibus utero gerunt, menstruæ purgationes colari dissectionum professoribus uisum est: quanquam & in reliquis mulieribus ab harum propaginum oris non minimum eius sanguinis profluere adhuc existimem. Arabum nonnulli quinque numero uenulas in medium longitudinis uteri ceruicis diffundi astruunt, & dextrarum uenarum ora cum sinistrarum oris connuere committique, ac ab illis puellarum hymen constitui docent, uenarum huc pertinentium copiam (ut in Arabum interpretum libris legitur) centonem nuncupantes. Quod uero interioris rami sinistri trunci eius supra os sacrum factæ diuisionis adhuc reliquum est, ad pubis os contendit, & ab externo ramo trunci uenæ cauæ sobolem assumit, quæ cum eo interioris rami reliquo congressa, unam cum ipso uenam efformat, quæ primum peritonæum, ac dein decimum femur mouentium perforat musculum, & ossis pubis foramen permeans in crus emergitur, proprium sinum in elatiori eius foraminis sede sibi uendicans, quo simul cum sua coniuge arteria ac item neruo fertur, ac foraminis eius membranam, & nonum femoris motus autorem musculum transiens, illis quos perreptat musculis ramos porrigit. Quando autem in crus pertendit, in musculos à pubis osse principium ducentes digeritur, in elatiorem uidelicet secundi tibiam mouentis musculi sedem, qui à pubis ossium commissura enascitur. Humilior enim eius musculi pars à maiori crus petenti uena ramos sibi asciscit. Dein ab hac pubis ossis foramen transeunte uena, rami in quinti femur mouentis musculi partem à pubis osse pronatam, ac postmodum in octauum femur mouentem musculum & penis etiam musculos digeruntur, à quibus furculi nimis quam exiles in femoris internæ sedis cutem in inguinum regione prodeunt. Præter ramos autem illis musculis & cuti exporrectos, unus etiam articulum coxendicis accedit, proprio sinu coxendicis ossis acetabulum priuatim subiens. Et utcunque multifariam hæc crus petens uena digeritur, rarius medium longitudinis femoris superat, sed interdum præcipuus ipsius ramus quinto femur mouenti musculo dispensatus, propagini commiscetur, quæ huc pertinet à maiori uena in crus deducta. Exterior uenæ cauæ trunci ramus, quum oblique crus accedit, priusquam peritonæum perforat, ab elatiori ipsius sede uenam mediocri magnitudine expromit, quæ sursum ad abdominis anteriora per peritonæum ducta, ipsi ramulos quosdam utrobique communicat. Vbi hæc ad istum modum peritonæo connexa ad rectum abdominis musculum conscendit, peritonæum perforans in internam posteriorem uel recti abdominis musculi sedem inseritur, & utrinque uarias soboles in transuersum abdominis musculum, & ipsi incumbentes obliquos reliquasque proximas sedes distribuit, recto tramite sursum sub recto musculo protensus. Vbi uero ad abdominis medium paulo supra umbilici regionem prorepsit, ipsius extremum in plures furculos disseminatur, qui ramulos spectant, quos à uena sub pectoris osse ab elatiori thoracis sede delata, diffundi commemorauimus. Huius uenæ interuentu mamillis cum utero communionem esse credimus, eius quippe beneficio ex mamillarum uenis in uterum quum foetus enutritur, sanguinis retractionem: quum autem mulier lactat, ex uteri uenis in mamillarum uenas menstrui sanguinis reuulsionem perfici, medicis pariter concessum est omnibus. Venam enim deorsum ex alto procurrentem, ramos mamillarum corpori diffundere, nemo non scribit: etiam si id non adeo obiter concessum esse uelimus. Vena uero ab imo sursum conscendens, non ita procul ab uteri uenis originem ducit. Deinde alteram uenam in ortu quasi coniugem sortitur, ad pudendum excurrentem. Exterior enim uenæ cauæ sinistri trunci ramus, quando supra coxendicis os in femur procidens, peritonæum transiit, ab interiori ipsius regione aliam promit uenam, quæ ad pubis ossium medium quæ inuicem cartilaginis interuentu hæc uniuntur accedens, uiris in penis inuolucrum & scrotum, mulieribus autem in pudendi colliculos, & in coriaceas carunculas (quas *vvuqlw* uocant) uicinasque sedes numerosa ramorum serie digeritur. Porro uena sub recto abdominis musculo sursum exporrecta nullam parem adipiscitur, quæ in uterum (uti medicorum uulgus arbitrat) descendat: sed ut prius monebam, illa ab istis quæ in uterum digeruntur non ita multum distat. Quando quidem ipsius principium ab exteriori ramo sinistri trunci uenæ cauæ pendet, illis ab interioris eius trunci rami interna propagine originem ducentibus, atque in uteri ceruicem ipsiusque fundi humiliorem sedem diffusis.

*Vena è qui-
bus uirginibus
menstruæ pur-
gationes ma-
nare credun-
tur.*

*Vena per pu-
bis ossis fora-
men femur pe-
rens.*

*h 25 fig. lib.
1 y.*

*i f.
h à oritur
u.*

l a.

*m 16 mus.
ta E, G, H.
n 1, 2, 3 fig.
ca. 29 li 1 y,
o carundem*

fi. f.

*p figu. cap.
12 f.*

*q 2 fi. ca. 11
li. 4 chara.*

*66.
r 14 mus.
ta. b.*

s 8 mus. ta.

*y.
t 16 tab. Δ.*

u à x.

x 8 ta. φ, c.

y 6 ta. n.

z 12 fi. ca.

49 lib. 2 H.

K.

a n.

*b ad regio-
nem n.*

c 1, 2 fi. ca.

29 li. 1 h.

d ad x.

e cha. 2.

f c.

g r.

h 6 mus. ta.

i M.

k L.

*l r non pro-
cul à x, aut*

25 fi. li. 5 u

non procul

ab y.

m Δ.

n c.

o ulti. fi. lib.

1 c.

p 20 fi. li. 5.

r. f.

q 25 fi. lib.

s u.



PRÆTER cauæ^a propaginem, secundum posteriorem coxendicis ossis sedem in femur aliquousque propagatam, ad crus duæ descendunt uenæ, una quidem angustior, quam per pubis ossis foramen ad quosdam interiore femoris sedem amplexantes musculos perrepentem, supra femoris medium^c cessare, superiori Capite narrauimus.^d Altera uerò maior, cæterarumque uenarum in crus sinistrum (quod & de dextro intelliges) excurrentium caudex ab^e externo ramo sinistri trunci uenæ cauæ supra os sacrum partitionis pendet. Præsens uena simulatque^f peritonæo elabitur, elatiorem coxendicis ossis sedem ad internū latus^g sedis, qua sextus & septimus femur mouentium^h musculi descendunt, in inguina labitur, ac anteriorem (uersus interiora tamen magis) femoris regionem subit, & nullo occultata musculoⁱ sinui insidet, qui in inguine efficitur a^k longo gracilique musculo tibiā mouentium primo, unā cum^l octauo femoris motuum autore. Vena itaque huic sinui seu cavitati incumbens, in plures ramos discinditur, atque quo iniurijs minus redderetur obnoxia, primis suis distributionibus Natura^m frequentes glandulas (uti in axillis fit) hinc circumposuit, quæ firmam stabilemque uenæ propagationem redderent, & quem diximus sinum cum uena simul, & arteria^o neruoque hac descendentibus opplerent, propugnaculumque quoddā his uasis efficerentur.^p Prima huius uenæ crus petentis propago insignis est, ac ab interiori uenæ latere principium ducens, ad interiorē femoris cutem properat, atque in internam femoris sedem deorsum per genu quoque interiora, & hinc rursus per internam tibiæ regionem uersus^q malleolum interiorē sub cute exporrigitur. & deinde in pedis superiora descendens, uariè inibi digeritur, alijs huc pertinentibus uenarum furculis commixta. Hanc propaginem ita quidem sub cruris cute carnea suffultam membrana deorsum prorepere obseruaui, uerū quā interiori exporrigitur malleolo, uniuersim non eundem seruat ductum. Quandoquidem interdum ab interna tibiæ sede secundum anteriorem malleoli regionem ad pedis superiora excurrit, aliquando uerò (sed rariùs) sub malleolo contorquetur, illac pedis superiora conscendens. Deinde in ramorum ad pedis digitos & suprapedion serie, plurimum uariat.^s Aliquando enim alijs quibusdam ramis hinc commixta, ad minimum digitum ipsique proximum præcipue deducitur, aliquando uersus pollicem & indicem excurrit. Breuiter in eodem homine, uix parem unquam reperiās huius propaginis ramorum in utrisque pedibus seriem. Rami quoque quos in descensu profert, rarissimè inuicem aut numero, aut amplitudine correspondent, siquidem inordinate ad cutem permeant. ut plurimum autem in superiorem internæ femoris regionis cutem, non procul à suo ortu, utrobique unam emittit sobolem, ac interior quidem femoris interiora & inguina, ipsumque quasi perinæum seu interfoemineum accedit, quod sedes est inter anum & testes, aut muliebre pudendum consistens.^t Exterior autem soboles, quæ & crassior est, femoris anteriora & exteriora sub cute perreptans, similiter ac interior in furculos digeritur. Quum grandis hæc propago ad medium femoris longitudinis quasi deuenit, notatu dignos ramos hinc etiam in cutem dispergit, & inter cæteros^x unum^y gracili longoque musculo porrigit, quem tibiā mouentium primum recensuimus. Cæterum quando ad genu articulum uelut ad posteriora orbiculatim ea propago nonnihil conuoluitur,^z duas quoque emittit soboles mutuò quidem mole pares, sed exiguas. Vna in anterioris genu sedis cutem secundum patellā dispergitur; altera interioris genu sedis uersus genu flexum, cutem accedit. Hæc posterior soboles aliquando penitus deesse, aliquando impense gracilis reperitur: tunc scilicet cum^a propria genu flexus cutē accedens uena, solito amplior uisitur. Ad interioris sedis tibiæ cutem à^b magna hac propagine, & antrorsum & retrorsum ramuli diffunduntur, qui impari numero sparsi, rursus cum proximis uenis uariè coeunt, inuicemque rursus dirimuntur. Super elatiorem uerò pedis regionem, uena hæc quemadmodum cōmemorauimus, diuersimodè spargitur. Atque hæc propaginis per internam cruris cutem deductæ est distributio. Præter hanc maxima in crus subiens uena è regione nuper dictæ propaginis,^c uenam promit, quæ extrorsum ducta in anteriore articuli coxendicis cutem, & eius sedis musculos quoque distribuit. Postquā uerò maxima uena has edidit propagines, penitus inter musculos femoris os amplexantes immergitur, & insignem ramum^e septimo & nono tibiā mouentibus musculis communicat, à quo etiā tenues furculi in cutem deriuantur. Deinceps^g aliam magis in profundum distribuit uenam, nuper cōmemorata ampliorem, quæ per^h quintum femur mouentem musculum digeritur, ramosque inⁱ octauum tibiæ motuum autorem musculum dispensat. Ab

Quot uenarum radices feruntur petant.

Maiores femoris uenæ series.

hac etiam plures uenarum soboles in uniuersos propemodum femoris os ambientes musculos propagantur: inter cæteras autē præcipua finem eius^k uenæ, quam per pubis ossis foramen in femur delabi dictum est, ad se^l assumit, coq̃ ad aucta, deorsum magis ad genu usque quodam modo inter musculos occultata descendit. Cæterum maxima uena sensim ad femoris os uersus posteriora contorta, ramulos oppidò quàm exiles^m grandioribus femur petentibus neruis offert, qui in membranas neruis obductas digeruntur. Deinⁿ aliam emittit propaginem, quæ in posteriorem femoris cutem excurrrens, furculos etiam sursum cutem subeuntes deriuat. Huic propagini frequenter à^o ramo quem in maximum corporis musculum dispensari diximus, soboles quædam accedit, quæ unà cum ipsa commiscetur, & uena ex duabus confluens, sicuti relatum est, cutem adit. Crebrius tamen^p duæ à grandi uena enascuntur propagines, una humilior altera. Hæ in progressu inuicem unitæ eam constituunt uenam, quæ hîc in cutem promittitur, ac ubi^q ramulos sursum in posteriorem femoris cutem germinauit, recto tramite deorsum per mediam flexus genu sedem seu poplitem ad suræ cutem^r descendit, ipsi^s numerosam ramulorum seriem porrigens, quæ sibi in omnibus minime correspondet. Verùm ramulorum alij rectà, alij obliquè, alij transuersim in cutem excurrunt, & denuò nonnulli inuicē coeuntes permiscuntur ac uniuntur, & deniquè cum^t uenæ ramulis subinde coeunt, quam per cruris interiora decliuem sub cute ferri diximus. Atque, ut semel dicam, huiusmodi hîc uenarum implexus digestioq̃ conspicitur, ut cutem suræ uaricum affectu crebrius (perinde ac temporum & internæ cubiti sedis cutem) implicari non mirum sit. Præsens uena per genu flexus cutem in suram descendens, aliquando ad calcem usque prorepens inibi^u cessat, aliquando alijs ramulis per tibiæ exteriora huc pertinentibus cōmiscetur, & secundum^x exteriorē malleolū porrecta, pedis superiora adit, nonnunquā uerò & inferiora, nullibi interim in altum à cute demersa. Cæterum grandis uena femoris ossi quemadmodum scripsimus accumbēs, adeò ipsi aduoluitur, ut iuxta genu articulum^y mediam inter duo humiliora femoris capita sedem occupet. Hîc in duos impares ramos deducta^h interiorem (qui^k exteriori multo gracilior est) ad suræ musculos, præcipuè uerò ad pedem mouentiū^l primum & secundum, deorsum mittit, furculis quibusdam horum superficiem implicans, & subinde etiā furculos in progressu ad internæ tibiæ sedis cutem^m dispergens. Quum uerò interior hic ramus ad tibiæ humiliorem usque appendicemⁿ perrepsit, atque in dictam nuper cutem furculos diffudit, sub interiori malleolo reflexus, internum pedis latus ad pollicem usque accedit, inibi in cutem ut plurimum absumptus. Rarius nanque inter calcem & tibiæ os unà cum tendinibus hac pedis inferiora subeuntibus, ramus ille ad pedis digitos proficiscitur. Exterior ramus magnæ illius in poplite latitantis partitionis non procul ab exortu in binas rursus diducitur propagines, quarum^p maior eademq̃ interior penitus inter^q musculos posteriorem tibiæ sedem occupantes immergitur. Primum nanque inter capita primi secundiq̃ pedem mouentium musculorum rectà descendit, ac dein inter quartum & quintum pedis motores, & deinde inter musculos digitorum flexus opifices hinc à tibia pronatos fertur, interdum etiam^r ligamentum cōtingens, quod fibulam tibiæ ossi secundum tibiæ longitudinem colligat. In hoc descensu interior hæc propago illis quos perreptat musculis ramulos offert, à quibus nulli, aut profectò longè paucissimi in cutem subeunt. Iuxta medium ferè longitudinis tibiæ præsens interiorq̃ propago in duos^s partitur ramos, quorum interior tali cum tibia articulo^t ramulum offert, ac totus quodammodo unà cum tendinibus à posteriori tibiæ sede ad pedis inferiora reflexus inter calcem & tibiæ os pedis inferiora subit, & sub^u musculo secundos quatuor digitorum articulos flectente propagatus, duos furculos pollicis & item indici, medio autē digito unicum præbet, itaq̃ absumitur. Quanquam frequentissimè hic^x interioris illius propaginis ramus (quemadmodum & neruus pedis inferiora subiens) in omnes digitos digeritur, nullo ramo inter fibulam & calcem huc pedem^y accedente. Verùm alter ramus qui eius diuisionis exterior est, quam paulo antè ad medium longitudinis tibiæ fieri dicebā, fibulæ exporrigitur: & quum ad infimam tibiæ sedem pertingit, atque ligamento membraneo, quod tota tibiæ longitudine fibulam tibiæ ossi committit, proximusest, sobolem à se dispergit, quæ ligamentum perforans, unà cum tendinibus per tibiæ anteriora pedis superiora adeuntibus in pedem fertur, ac^z musculis pedis digitos in exteriora abducentibus furculos offert, quibusdam etiam ramulis in cutem sparsos. Quod autem alterius rami illius reliquum est, cum septimi & octauī pedem mouentium^a musculorum tendinibus in pedis humiliora proficiscitur, atque in minimos digitos dispēfatur: nisi fortè interior ramus inter tibiæ os calcemq̃ pedis inferiora petens, omnibus digitis furculos exhibeat. Varia enim hîc (si alicubi profectò) uenarum series occurrit, nam crebrò (quod etiam diligenter in sanguinis è uulneribus fluxu obseruandū est) conspicies^b interiorem illam propaginem, quam

in po

k a.

l x.

m 1. mus. 14.

s.

n cha. 3.

o cha. 2.

p cha. 3, 4.

q cha. 5.

r cha. 6.

s cha. 7.

t o, r.

u ad cha. 8.

x ult. fi. lib.

y x.

y cha. 9.

h 1. fi. ca. 30

li. 1. l.

i cha. 10.

k cha. 13.

l 12. mus. 14.

o, r.

m cha. 11.

n cha. 12.

o cha. 13.

p cha. 16.

q Seriatim

intuere tibi

am 12, 13.

14, 15 tabu-

larum mus.

r 15. ta. T.

s cha. 17.

t iuxta cha

ract. 8.

u 14. tab. o.

x cha. 16.

y Ad hanc

seriem picta

est ult. fig.

z cha. 18.

a 6. tab. o.

b 6. ta. o, r.

c cha. 16.

in posteriori tibiæ sede inter musculos altè recondi dicebam, ilico atq; posteriorem tibiæ sedem contingit, ^d sobolem inter tibiæ os & fibulam per membraneum ligamentum porrigere, quæ secundum tibiæ longitudinem anteriori eius ligamenti regioni attensa, ad pedis superiora fertur. Verùm tunc propago illa quæ in posteriori tibiæ sede deorsum properat, ad medium tibiæ non amplius ^e insigni diuisione dissecta, sed sola pedis inferiora, omnesq; digitos adeunte. Interdum rursus inter musculos, anteriorem tibiæ sedem occupantes ^f alia soboles reconditur, ab ea propagine quam nondum persecutus sum originem ducens. ^g Reliqua enim adhuc est exterior propago, ^h exterioris rami magnæ in poplite diuisionis, quæ ad superiorem fibulæ appendicem fertur: & quum à ⁱ propagine quam tibiæ posteriorem sedem occupare dictum est, in anteriores tibiæ musculos nulla soboles per membraneum ligamentum ducitur, ab hac exteriori propagine ramus inter septimum & sextum pedem mouentium musculos prorepit, frequenti sobole digestus, in musculos anteriorem tibiæ ossis sedem occupantes. Aliàs uerò hæc exterior propago in exterioris tibiæ sedis cutem potissimum frequentibus furculis dispergitur: & ^k præcipuo ipsius furculo nunc antrorsum, nunc retrorsum ad interiorem malleolum reflexo, pedis superiora accedit, & potissimum externum pedis latus perreptat, alijsq; huc pertinentibus uenis commiscetur, nusquam in altum mergens. Quum itaq; differens uariâq; adeò uenarum tibiæ & pedis cutem implicantium sit series, suaserim eam non secus quàm in manu faciendum præcepi, in uariorum hominum cruribus uinculo interceptis, aut calenti aquæ immersis contemplari, modò eam sobolem in superficie excurrentem, uenarum secundarum gratia expendendam duxeris. Ego enim parum superficiarias pedis uenas morari soleo, quum iuxta genu ipse eas exercitiij nomine non semel aperuerim: quodq; omnes pedis uenæ ab eodem trunco, qui scilicet per inguina crus subit, principium ducant, & arbitror Græcos uix alias secuisse, quàm ^m quæ internum genu regionem perreptat, & in obesis mulierculis uel ob continuâ cruris ligationem latet, & dein ⁿ quæ malleolos ambiunt. Adeò ut etiam nostræ ætatis medicos mirer, qui cum alicubi legerint quatuor uenas ad pedis superiora pertingere (uti & ego ^o uel sub cute enarraui) quatuor pedi adscribunt uenas, quas magno supercilio in sanguinis missione distinguunt, interim ignorantes ipsarum progressum & exortum, ac longè grauiori periculo in pedis superiori sede cum neruorum, tum tendinum occasione, uenas secari, quàm eam quæ sub genu, atque ad malleolos cõsistit. ut modò elegantem promptumq; sanguinis fluxum silentio præteream. Venarum autem quas illi statuunt, primâ Saphenam, & matricis uenam, & uirginalem nuncupant, atq; illam ad internum malleolum reponunt. Secundam exteriori malleolo ascribunt, illam Schiaticam nuncupantes. Quæ pollicis exporrigitur, illis hominibus Popletica dicitur, hancq; tertiam numerant. Quartam renalem constituunt, eam iuxta minimum digitum diuidentes. Quòd uerò ad totius uenæ cauæ administrationem spectat, sedulò in sequentibus libris persequar, ubi earum partium quas interreptant sectionem edocebo. Fiet autem id in fine quinti & sexti & septimi librorum accuratissime. Nam & in septimo communem uenarum, arteriarum & neruorum in manus ac crura pertinentium sectionis rationem instituemus.


Venarum cutem implicantium series quomodo discernenda.

Ad finem tractationis uenarum, in libro de Sectione uenarum & arteriarum.

Venarum pedis cutem subeuntium nomina.

DE VMBILICI VENA.

Caput XI.



NVDA umbilici uenæ delineatio, cuius nimirum partis quæ in natis obuia est. atq; hic *A* uenæ sedem notat quæ umbilicum spectat, *B* uerò sedem qua hæc iecori inseritur, *C* & *D* uerò ipsius in iecoris substantia seriem ruditer exprimit. Vnde etiam quinti libri figuræ huc maxime spectantes ueniunt examinandæ, trigesima uidelicet, quæ quatuor tabellis fœtus in uolucra cum ipso fœtu proponit. Dein secunda eius libri figura, quæ umbilici portionem ex sectionis serie relictam ostendit: ac insuper umbilici uenæ, & arteriarum, & urinarij meatus, qui fœtus urinâ peculiariter educit. Præter alias eiusdem libri figuras, quæ umbilici uenæ in iecur insertionem oculis subiiciunt, nimirum duodecima, & uigesima.



Qui umbilici
uena & arte-
ria confun-
gant.

Umbilici ue-
na ductus.

ad

Arteriarum du-
ctus.

Umbilici ue-
nae arteria-
rumque usus.

IN QUINTO libro organa foetui peculiaria persequuturus, illum^a tri-
bus tunicis seu inuolucris in utero inuolui contineri^b audies, quorum ex-
timum Graeci *χωελον*, Latini uero secundinam & secundas, interdum &
loculos, uti & ipsum uterum, appellat. In hoc quum infans utero geritur,
uenarum arteriarumque in uteri fundum pertinentium fines terminantur,
ac uelut in nouas uenas arteriasque cessant, quae numerosissima ramorum
serie in extimum illud inuolucrum digeruntur. Venae haec ac arteriae ex infi-
nita propemodum ramorum serie sensim in pauciores colliguntur, ac mutuo coeunt, uenae
quidem uenis, arteriae autem arterijs semper unitae. Ex his ramis rursus inuicem coeuntibus gran-
diores paucioresque tantisper constituntur, donec tandem omnes uenae in duas finiatur uenas, &
arteriae item in totidem arterias. Venae ac arteriae ad hunc modum ex secundina collectae, reli-
quas duas foetum inuoluentes tunicas penetrant, quae etiam a uenis ramulos per illarum mem-
braneum corpus excurrentes mutuuntur. Quum uero uenae ad umbilicum usque prorepser-
e, mox in^d unam coeunt uenam: imò subinde etiam una tantum uisitur uena, simulatque a secun-
dina abscedit. Haec umbilicum ingressa peritonæo adnectitur, & sursum conscendens patulae
iecoris scissurae^e inseritur, quae dextrum mucronatae cartilaginis latus, in anteriori iecoris sede
hominibus habetur, & foraminis cuiusdam aut meatus modo hanc umbilici assumit uenam,
eamque per iecoris substantiam^f uersus cauam iecoris sedem deducit, non procul a portae uenae
caudicis exortu. Atque id sedulo inter secandum uenit expendendum, ne si obiter primum ue-
nae in iecur ingressum spectes, illam inter gibbum cauumque iecoris medium inferi existimes, &
non accurate id iecoris foramen in homine (cui id priuatim obtigit) expendas. Nonnullis ani-
malibus, ut catulis, unus aliquando & alter ramus in mesenterij^h centrum, ab hacⁱ uena prius-
quam iecur contingit, porrigitur. Quod propter quaedam Galeni loca in libro de Foetus for-
matione, ubi is iecur ante cor, ex huius uenae ductu formari astruit, non segniter animaduerti
uelim. Arteriae autem umbilico insertae deorsum ad^k uesicae fundi latera porrectae, ramis ma-
gnae arteriae post praecipuam supra os sacrum arteriae diuisionem continuantur. Arteriae enim
umbilicum ingredientibus, illis magnae arteriae propaginibus uniuntur, quas per pubis ossium
foramina in crus descendere docebimus. Umbilici uenae beneficio foetus enutritur, & arte-
riarum munere ipsius insitus calor reficitur. Caeterum quando infans nascitur, haec uasa simul
cum^m meatu quo ex uesicaⁿ inter intimum & secundum foetus inuolucrum, illius urina effertur,
ab obstetricibus iuxta uentrem^p praescinduntur, bruta autem animalia dentibus abrumpunt
inuolucra foetus plerumque deglutiunt. Quod horum uasorum in corpore adhuc reliquum est,
temporis successu exarefcit, membraneumque prorsus redditum, instar funis suam cavitatem
deperdit. Qua autem sectionis ratione haec non modò in foetuum, sed & senum anatome ob-
serues, in quinto libro ubi nutritionis generationisque organorum sectionem persequar, proli-
xe audies. Ne uero uenam in absolutis hominibus a nobis praetermissam quis arbitraretur, hic
umbilici uenae quemadmodum in illis apparet, meminisse uolui. Ab umbilico igitur ad iecur
uena exporrigitur, quae iecori, quemadmodum diximus, inseritur. Atque haec omnia in ali-
quandiu natis arida ac ueluti neruea, multoque adipe obducta uisuntur, in foetibus uero ab alijs
uenis nihil uariant. Nunc itaque tempestiuum erit^q magnae arteriae distributionem aggredi. Venae
enim arterialis sermonem tantisper intermittam, donec simul^r arteriam uenalem pertractare, inte-
grum erit, quippe operae precium est, sermonem utriusque communem instituere.

a Seriatim
specta tabel-
las figurae
30 lib. 5.

b 25 fi. lib. 5
n. 7.

c fi. 30 lib. 5
N.

d 2 fi. lib. 5
F.

e 2 fi. lib. 5
12 fi. M. 20
D.

f 20 fi. lib. 5
D uersus G.
g eiusdem
fi. 1.

h 10 fi. lib. 5
L. L.
i 2 fi. lib. 5 F.

k fi. ca. 12 p.
2 fi. lib. 5 K.
L.

l 2 fig. lib. 5
N.

m fig. ca. 12
inter fig. 1.
n 2 fig. lib. 5
M.

o 3 ta. fi. 30
li. 5 inter O.
O & M.

p 4 ta. fig.
30 li. 5 S.

q figura 13
cap.
r 1 fi. ca. 15.
s 2 fi. ca. 15.


TOTIVS MAGNAE ARTERIAE DELINEATIO- NIS, QVAM SEQVENS PAGINA PROPONIT, characterum Index.

ARTERIAE magnae ex sinistro cordis sinu exortus, quam Aristoteles *ἀογρὺ*
uocauit, eo quod neruosam ipsius partem, uel in mortuis conspici posse diceret, instar uaginae
fortassis quam Macedones *ἀογρὺ* uocant. Verum Aristoteles hanc cum caua comparans,
ipsam minorem uenam nuncupauit. Alij Graecorum uocant eam *μαγίστη*, alij simpliciter *καρ-
διαική*, alij *ἀογρὺ*, nos magnam dicimus arteriam. Nonnulli rursus uenam uocarunt, quo san-
guis impetu per corpus diffusus ducitur. Quidam Arabum interpretes audacem uenam, alij
neruum pulsatilem uocant. Verum eorum uoces temporum iniuria omnes corruptae leguntur,
quemadmodum apud Haly interpretem, qui habet, eam Aristoteli aurithiam uocari. Quam-
uis interim in haebraicis Arabum interpretibus, omnia fere partium nomina ex Graecis ita cor-
rupta legantur, ut nostrae aetatis medici ea sonant.

B, B Duæ

INTEGRAE TO
ARTERIAE AB
tibus liberae delineatio, duobus
bus communis.

TIVS MAGNAE
OMNIBVS PAR
proxime sequentibus Capiti



- B, B** Duæ arteriæ cordis basim coronæ modo succingentes.
- C** Magnæ arteriæ caudicis in duos truncos bipartitio.
- D** Arteria obliquè ad primam sinistri lateris costam contendens.
- E** Ramus quatuor superiorum sinistri lateris costarum interualli soboles deriuans.
- F** Ramus per transuersos ceruicis uertebrae processus ad caluariam usque prorepens, & geniculatim dorsali medullæ uicinisq; musculis soboles offerens. ubi uerò is in sinistrum duræ cerebri membranæ sinum exhauritur, illum abscidimus. Præsentem enim tabula nullum eius membranæ sinum expressimus, sed tantum arteriarum, quas Galenus reticularem plexum suis boum cerebri delusus formare arbitratur, seriem mox explicandam. Verùm si horum sinuum delineationem expetis, præter figuram decimi quarti Capitis & plerasq; septimi libri, non mediocriter huc facit figura huius libri calci insuta.
- G** Sub sinistro pectoris ossis latere ad umbilici usque sedem excurrent ramus, à quo surculi digeruntur in uerarum costarum cartilaginum interualla, & hinc in musculos pectori instratos, insuper in sinistram, qua thoracis amplitudo intercipitur membranâ, & abdominis musculos.
- H** Ramus posteriores ceruicem occupantium musculos accedens.
- I** Arteria ad cauam scapulæ regionem ac in eius sedis musculos prorepens.
- K** Ramulus ad humeri cum scapula articulum & summi humeri inferiora propagatus, nusquam interim ad cutem excidens.
- L** Propago in musculos anteriorem thoracis sedem integentes sparsa.
- M** Propago secundum thoracis latera deorsum procidens, ac musculo brachium deorsum trahenti intertexta. Inter **L** & **M** ramulus unus occurrit, eorum qui in glandulas alæ cauitatem opplentes disseminantur.
- N** Arteria simul cum interiori axillaris uenæ trunco in manum excurrent, ac primi illi surculi sub **N** mox conspicui, in musculos humerum amplexantes propagantur.
- O** Arteria secundum posteriorem humeri sedem unâ cum quarto in brachium pertinente neruo, aliquousque in externam cubiti sedem reuolutus, ac undique in alto interim latitans.
- P, P** Hi ramuli articulo cubiti cum humero sunt peculiare.
- Q** Axillaris arteriæ ramus radio exporrectus.
- R** Surculus ab arteriæ ramo **Q** insignito uersus manus exteriora inter primum pollicis os & post brachialis os, quo index suffulcitur, deductus.
- S** Ramus ulnæ exporrectus, ac in internam quoque manus extremæ sedem digestus.
- * Ramulus musculis elargitus, qui externum latus postbrachialis ossis occupant, quo minimus digitus sustinetur.
- T** Arteriarum in extrema manu series.
- V** Amplior ascendens arteriæ trunci portio, quæ rectâ ad iugulum cõtendens, in duos impares ramos dirimitur.
- X** Sinister diuisionis in iugulo factæ ramus, qui & gracilior est, sinistriq; lateris soporalem constituit.
- Y, Z** Duobus his characteribus dexter ramus, qui sinistro longè amplior est, insignitur. Verùm **Y** priuatim propaginem indicat, quæ in dextro latere prorsus in easdem soboles digeritur, in quas arteriam **D** insignitam in sinistro latere disseminari conspicias. Cæterum **Z** dextram soporalem notat, quam uti & sinistram Arabum interpretes apoplecticâ, & somni, & letargicam, & subeteni, & decolationis uenam appellant, quæ nomina plerosque iugularibus uenis accommodare antea retulimus.
- a** Sinistræ soporalis arteriæ in faucium regionibus in duos ramos distributio, ac **b** quidem externum, **c** uerò & **d** internum indicât: quanquam duo posteriores hi characteres priuatim ali quid indicent.
- c** Arteriarum propagatio ad laryngem, fauces & linguam.
- d** Soporale arteriæ pars caluariâ petens, atque iuxta basim caluariæ in duos distributa ramos, quorum alter, qui sinistrum duræ membranæ sinum subit, hîc quâ in caluariam mergitur, abtruncatus est. quod præsentem figuram eius membranæ sinus non duxerim delineandos, eos postmodum cum integra cerebri uasorum serie ad frontem decimi quarti Capitis, peculiari figura exhibiturus.

turus. ex qua etiam alterius rami soporalis arteriæ caluariam ingredientis, distributionem petes, & si uisum fuerit huic delineationi ex illa characteres adijcies. qui ferè essent L, q, r, s, u, u, x, æ, ß, γ, δ: quos hic explicarem, nisi satius omnino foret studiosum à cerebri uasorum serie tantisper abstinere, donec ego illam decimo quarto Capite persequar.

b Soporalis arteriæ ramus, capitis exteriora implicans.

c Dicti modo & b insigniti rami propago, penitus inter faciei musculos excurrent.

f Rami b insigniti sub auris radice distributio, cuius anterior ramus g notatus, secundum tempo

g, h. ra fertur: posterior uerò, cui h inscripsi, secundum auris posteriora sub cute pariter atque ille spargitur.

i TRVNCVS magnæ arteriæ, deorsum ad dorsi uertebras explicatus.

k, k, k Propagines utrinque ad octo inferiorum costarum interualla protensæ, & dorsali quoque medullæ ac musculis dorso & thoraci adnatis ramulos offerentes.

l Septi transversæ arteriæ.

Veritus ne characterum copia integram magnæ arteriæ delineationem alioquin hic satis obscuram penitus corrumpet, priuata hac effigie modo utendum duxi, quæ superius ubi septo transverso arteriæ l indicatæ offeruntur, ueluti ex magnæ arteriæ caudice dissecta est: inferius uerò ad seminalium arteriarum, quas i & k indicabimus, exitum. In præsentī itaque figura iam enarrandis propaginibus duas radices pinxi, quum integra arteriæ delineatio unicam (ut frequenter etiam occurrit) tantum habeat. In-



m. dicet igitur m utriusque, aut unius duntaxat radice exortum. n dextrum ramum. o surculum in humiliorem omenti

p. membranam hic exporrectum. p propaginem in dextram uentriculi sedem, qua dorsum spectat,

q. atque inferius orificium educit, excurrentem. q ramum duodeno intestino & ieiuni initio expor-

r. rectum. r propaginem ad dextram fundi uentriculi sedem deductam, uentriculoque & superiori

s, t. membranæ omenti ramulos exhibentem. s bilis uesiculæ arteriolas. t arteriam iecori distribu-

u, x. tam. Cæterum u insignitur sinister ramus, qui potissimum lienem adit. x propago secundum po-

y. steriorem uentriculi sedem, ad ipsius usque elatius orificium progrediens. y eius propaginis ra-

z. muli in uentriculum quæ dorso innititur deriuati. z ramus orificium uentriculi superius, coronæ

æ. modo cingens. æ ramus secundum elatiorem uentriculi sedem inferius illius orificium accedens.

ß. ß grandis in demissiorem omenti membranam excurrent propago, quæ etiam colo intestino mul-

γ. tis surculis implicatur. γ surculus in humiliorem omenti membranam hic ad sinistram latum ex-

δ, ε. currens. δ & ε arteriæ lienis cauum subeuntes. ε arteria sinistram fundi uentriculi sedem pe-

z. tens, ac uentriculo ipsique superiori membranæ omenti soboles deriuans. z ramuli ab alijs lienem

accedentibus arterijs, in læuum uentriculi latus deprompti.

z. In integra delineatione, & ea quæ hic indici adhibuimus, aliud z occurrit, quo insignitur arte-

ria in superiorē ac propemodum uniuersam mesenterij sedem propagata, & suis propaginibus

in ieiunum intestinum & ilium & coli partem à iecore ad dextrum renem conspicuam sparsa.

n Dextrum renem accedens arteria. θ Arteria quæ in sinistram renem exporrigitur.

ι, ι Dextri lateris seminalis arteria. κ, κ Sinistri testis seminalis arteria.

λ Arteria humiliorem mesenterij sedem subiens, ac potissimum in colon intestinum, quæ id à lie-

nis regione ad rectum pertinet, ac dein in rectum intestinum discinditur.

μ, μ Propagines notantur, quæ geniculatim lumborum uertebras accedunt, & in peritonæum & musculos uertebris adnatos distribuuntur. Propago autem ad humilioris μ consistens cæteris grandior est, atque ad abdominis usque latera frequenti sobole excurrit.

ν, ν Magnæ arteriæ ad os sacrum in duos truncos distributio. Verum isti characteres etiam surculos notant, ab humiliori arteriæ regione in ossis sacri foramina deriuatos.

ξ Interior ramus sinistri trunci iam dictæ diuisionis.

ο Interioris rami exterior propago in musculos excurrent, qui externam ilium ossis sedem & coxendicis articulum integunt.

- π Interioris rami ζ notati interior propago in ossis sacri humiliorem sedem, uescicam & uescicæ ceruicem, ipsumq; penem: in mulieribus uero, in inferiorem uteri fundi regionem, & pariter in illius ceruicem surculos diffundens.
- ρ Hic etiam arterias appinximus, quarum sinistra ab umbilico hic inter ζ & ς ad interiorem prius commemoratum ramum perinde pertinet, ac si uersus umbilicum ab ipso deriuaretur.
- ς Interioris rami ζ insigniti reliquum, quod ab externo ramo trunci diuisionis quæ supra os sacrum fit, portionem asciscens, per pubis ossis foramen in crus delabitur, inibi in musculos pubis os occupantes digestum, & suo termino cum alia arteria, quæ in quintum femur mouentem musculum præcipue digeritur, ac ↓ mox signabitur, coit, ea sede qua ω ascriptum cernis.
- τ Propago exterioris rami sursum ad rectum abdominis sui lateris musculum conscendens, atque præcipua ipsius sobole umbilici regionem petens, reliquos autem surculos transuersim in humilior rem abdominis sedem dispensans.
- υ Surculus transuersim secundum pubis os ad pudenda prorepens.
- φ Sedes exterioris rami, quæ is modo in crus delabitur, ac in uniuersum crus disseminari incipit.
- χ Ramus maioris crus petentis arteriæ in musculos propagatus, qui anteriorem femoris sedem si bi uendicant.
- ↓ Ramus ad quintum femur mouentem musculum, & eos qui internam femoris sedem occupant digestus, unoq; ipsius surculo cum illius arteriæ coiens sine, quam per pubis ossis foramen prociderediximus, ac ω insiguiimus.
- Γ Ramus in musculos posteriorem femoris sedem obtinentes deriuatus.
- Δ, Δ Ramuli genu articuli peculiare. Hicq; grandis arteria in poplite reconditur.
- Θ Grandis cruris arteria posteriorem tibiæ sedem petens.
- Ξ Ramus fibulæ amplexatibus musculis, præcipue autem septimo et octauo pedē mouētū oblatus.
- Σ Arteria inter calcem & interiorem malleolum pedis inferiora subiens.
- Π Arteria ad pedis humiliora accedens, inter calcem & exteriorē malleolū nonnunquā reflexa.
- Φ Ramuli tibiæ cum calcis articulo proprii.
- Υ Propago pedis elatiora accedens.
- Ω Arteriarum in pedis humiliori sede distributio. Subsequentibus modò duobus Capitibus non solum hæc cuius indicem absoluimus, figura conuenit, sed etiam huc attinet præter crebras quinti libri & sexti & septimi figuras, ea quam huius libri fini subiungam, cuius characteribus perinde atque hætenus fecimus, in interiori margine utemur.

V N D E A R T E R I A M A G N A P R I N -

cipium ducat, & in quos ramos ipsius ascendens pars digeratur.

Caput XII.

Q V A N D O in interiori margine alicubi, præterquam in duobus proximis Capitibus scribitur fig. cap. 12. ea subaudienda est, qua integram arteriæ magnæ imaginem, ante præsens Caput proposuimus.

Non prolixā
de arteriæ ma-
gnæ ortu esse
disceptatio-
nem.



Arterias neq;
à cerebro neq;
extremis cor-
poris partibus
nasci.

LONGÈ minor inter medicorum ac philosophorū procures de² grandis arteriæ, quàm de uenarum neruorumq; principis est dissensio. Hippocrates nanq; Plato, Aristoteles ac Galenus pariter cor arteriarum fontem ac originem (uti sanè est) statuunt. Quippe erronea prorsus est Pelopis Galeni præceptoris sententia, arterias docens simul & uenas cum neruis è cerebro nasci: non minus sanè quàm à ueritate simul abhorret eius autoris placitum, qui spurium tractatulum de uenis, Hippocratis libro de Natura humana interiecit. Quandoquidem, ut cætera taceam, cerebrum uitalis spiritus & sanguinis feruidi ac impetu per corpus ruentis, quemadmodum cor, non est principium, ac arteria nullibi quàm^d ubi è corde pronascitur, amplior occurrit. Dein hæc quoque illorū dogma improbant, qui arterias ab extremis summisq; corporis partibus nō secus passim oriri arbitrantur, quàm si quis ab extremis arborū uirgulis illarum initiū recenseret. Verum etiam si non philosophiæ modò, sed & medicinæ principes cor arteriarū fontem statuerint, nihilominus tamen de cordis sinu, à quo arteria pronasceretur, nonnihil inter se dissentiant, quum hi quidem

a Tota figura huius cap. præposita.

b A, et fi. 10 li. 6 A.

quidem ex cordis medio sinu, illi autem ex sinistro, arteriam oriri contendunt. Cæterum hæc
dissensio de cordis uentriculis sinibus ue potius, quam de arteriarum origine est. ac proinde
nos tantum duos cordis uentriculos enumeraturi, postposita omni controuersia ex elatiori se-
de^c sinistri sinus cordis, propter ipsius basis centrum, magnā arteriā^d originem ducere attesta-
bimur, ubi tertiū uentriculū^e (post dextrā uidelicet membranā arteriæ uenalis orificio præfe-
ctā) Aristoteles enumerauit, etsi alia Galeni in libro de Dissectione uenarum sit sententia, nisi
fortè perperā Dexterioris pro Sinisterioris inibi in Galeni libro legatur. Magna igitur arteria
in hoc ortu^f orbicularis est, ac hîc ipsius amplissima sedes & durior & cartilaginosa cōsistit.
Ipsa autem arteria simulatque enascitur,^g duos graciles promit furculos, qui coronæ prorsus
modo cordis basim unā cum coronali uena amplectentes, cordi secundum ipsius longitudi-
nem^h ramulos transfundunt, quorum plures amplioresq; inibi se offerunt, ubi cordis substan-
tia crassior uisitur. est autē id potissimum in ea cordis sede, ubi sinistrum ipsius sinum continet,
& quā septum utrisque sinibus cōmune porrigitur. Coronalium arteriarum ortus post mem-
branulas consistit, quas resumptionem spiritus sanguinisq; ex ipsa arteria in sinistrum cordis
sinum prohibere, in sexto libro ostendam. Verū & si coronalium arteriarum par quodam-
modo sit amplitudo, ea tamen amplior longiorq; cernitur, quæ ex dextro magnæ arteriæ ori-
ficij latere originem ducit, una nanq; hinc à tergo dextræ mēbranæ pronascitur, altera autē à
posteriori eius orificij sede principiū sibi uendicat, à tergo posterioris mēbranæ à sinistræ inte-
rim mēbranæ tergo nulla pronascēte. Postq; uerò magna arteria coronales deprōpsit, à cordis
basis centro sursum quodāmodoⁱ sub uenæ arterialis caudice conscendit, ac cordis inuolu-
crū^k perforās bipartitō scinditur, ac^l unam ipsius partē, quæ grandior est, deorsum ad quintā
thoracis uertebra, & deinde per reliquā dorsi sedem detorquet, in omnes quæ cordi subsunt
regiones ramos exhibituram. At minor pars supra cor repositis sedibus distribuenda sursum
properat, ac statim in progressu asperæ arteriæ^m innitens, ac uenæ cauæ inter membranas tho-
racem intersepientes substrata, ex sinistro ipsius latereⁿ ramum distribuit oblique sursum ad
primam sinistri lateris costam exporrectum, qui quidem quā pulmonī accumbit atque sinistræ
thoracem intersepienti membranæ alligatur, nullas deriuat propagines: uerū simulatq; pri-
mam thoracis attingit costam, ab humiliori ipsius sede^p propaginem deorsum diffundit, quæ co-
starum radicibus attensa, in tria quatuor superiorum costarum sinistri lateris interualla singu-
las soboles spargit: à quibus rursus furculi in dorsalem medullam, & musculos thoraci uerte-
brisq; hîc instratos excurrunt. Cæterum ab elatiori sede^q eius obliquæ ad primam costam con-
scendentis ramī, alia enascitur propago nuper commemorata multo amplior, quæ ad septimæ
cervicis uetræ latus oblique repens, in huius lateris transuersi processus foramen se inserit,
ac deinde per transuersorum reliquarum uetrarum processuū^r foramina conscendens, per-
inde atque hac^s excurrentis uena digeritur. Nam in progressu dorsali medullæ furculos deriuat
ea subingredientes foramina, quæ neruis emittendis rerum Opifex exculpit. Deinde & mu-
sculis cervicem hîc occupantibus ab illa propagine ramuli quoque sparguntur. Quod uerò
eius reliquum est, simul cum comite uena per^t foramen in posteriori sede sinistri capituli occi-
pitis ossis insculptum, caluariam subit, atque in^x sinistrum duræ cerebri membranæ sinum ex-
hauritur. Præter hanc propaginem uetræ exporrectam,^y arteria quam oblique ad primam
sinistri lateris costam contendere diximus,^z alia ab anteriori ipsius sede pullulat propago, obli-
quiori ductu pariter superiora anteriora que petens. Hæc etenim pectoris ossis summum acce-
dens, ac sinistræ thoracem intersepientis membranæ adhærens, decliuis perfertur secundum pe-
ctoris ossis sinistrum latus, quā ipsi costarū coarctantur cartilagines. Hæc propago in eosdem
omnino ramos digeritur, in quos^a uenam hac repentem dispensari retulimus, præterquam
quod nullæ soboles à præsentī propagine cutē accedant, nisi forsitan obscurissimæ in mamille
corpus pertingant. Quā enim hæc arteriæ propago pectoris ossi exporrigitur, uerarum co-
starum cartilaginum interuallis ramos offert, à quibus alij ramuli in musculos assurgunt carti-
laginibus incumbentes. Deinde & ab hac propagine in sui lateris membranam quæ thoracis
amplitudinem intersepit, & in^c glandium in iugulo repositum, furculi mittuntur. Quod autem
ipsius^d reliquum est, secundum sinistrum mucronatæ cartilaginis latus thoracis cauitatem in-
greditur, & recto hîc abdominis musculo subnatum, ad umbilici quodāmodo regionem pro-
cedit, in progressu utrinq; ad partes abdominis ramulos offerens, & iuxta umbilicum in plu-
res dissectum soboles^e alterius arteriæ terminos respicit, quam huc ab imo sursum contendere
docebimus. Vbi^f arteria oblique ad primam protensa costam, hæcenus cōmemoratas edidit
propagines, sinistram aditura axillam, &^g musculum perforatura dorsi motorum secundi pa-
ris sinistrū, ab ipsius elatiori parte priusquam^h thorace penitus labitur, notatu etiā dignæ ma-
gnitudo.

Arteria or-
tus sedes.Coronales ar-
teria.Caudicis arte-
ria bipartitio.Ascendentis
partis series,
ac primum ar-
teria ad sini-
stri lateris pri-
mam costā ob-
lique tenden-
tis.

c Patet in u
fi. li. 6. quā
conferes cū
9 figura.
d 4 fi. lib. 6
H. 6 fi. O.
e 9 fig. li. 6
L ponitur
post E, &
arteria A
quoq; in si-
gnitur.
f A. aut 10
fi. li. 6 S. S.
g B. B. 10 fi.
lib. 6 E. E
post B. C.
h 6 fi. lib. 6
E. E, 4 D.

i 6 fi. lib. 6
O sub I.
k 4 fi. lib. 6
H per A.

l i.
m 6 fi. lib. 6
R super Y.
aut specta-
sedulo uli.
fi. præsentis
libri.
o D.
p E.

s 2 fi. ca. 15
lib. 1 T. 7 fi.
x. 8 fig. α.
t fi. 6 ca. N.
u 2 fi. ca. 12
li. 1 f.

x 7 fi. li. 7
Q. Q. 9 fi.
T. T.
y D.
z G. & 2
fi. li. 6 D.

a fi. ca. 6 L.
b 25 fig. lib.
s. C. D. D.

c 2 fi. lib. 6
F.
d 6 mus. ta.
a. & dein in
musculo f
notato.

e 7.
f D.
g 8 mus. ta.
C.

*Sinistra axil-
lam petentis
portionis se-
ries.*

gnitudinisⁿ ramum deriuat, qui in posteriores ceruicem occupantes musculos ad occipitium^h H.
usque discinditur, nullibi interim cutem subiens. At quum primum illa arteria thoracis cauita-
tem, & primam costam euicit, iamq; uicinor axillae redditur, ex posteriori ipsius sedeⁱ ramumⁱ I.
utrunque insignem spargit in cauam scapulae regionem, & eius sedis musculos absumendum.
Post hunc ex superiori ipsius regione^k aliam, sed non adeo crassam, depromit sobolem, quae ad^k K.
humeri cum scapula articulum iuxta summum humerum & scapulae gibbum in ramulos dige-
ritur, quorū unus cum^l humerali uena ubi adhuc in alto reconditur aliquousq; prorepit. Huic^l fig. cap. 6
soboli^m alius succedit ramus, nonnihil demissiū ab axillam petente arteria enatus, ac in mu-^{a, d.}
sculos anteriori thoracis sedi instratos numerosa propaginum sobole digestus. Dehinc^m L.
li in glandes axillae cauitatem opplentes ab hac arteria admodum rari sparguntur. Quinetiamⁿ inter L et
priusquam tota arteria in manū absumenda feratur, ° propago quaedam thoracis lateri expor-^{M.}
rigitur, potissimum in^o musculum excurrēs, cuius beneficio brachium quodammodo decliue^o M.
dorso adigitur. ° Quod praesentis arteriae iam superest, ° axillari uena concomitatum, ac in bra-
chium procedens penitus occultitur, & primum^p graciles ramos internae musculorum hume-
rum amplexantium sedi, & membranis neruos continentibus distribuit. Insuper deorsum sen-
sim adhuc prorepens, & continuo^q interiori axillaris trunco attensa, ° aliam emittit propaginē,
quae secundum^x posteriorem humeri sedem, quā ipsi cubitum extendentes muscoli adnascun-
tur, oblique prorepit ad externum humeri tuberculum contendens. Haec enim propago unā
cum^y uena quam hac duci retulimus, & dein cum^z quarto brachium petente neruo ad exter-
nam cubiti sedem pertingit, & sub musculorum capitibus aliquousq; deductus cessat, qui hīc
ab humeri externo tuberculo principiū ducunt, & partim radij, partim autem brachialis, par-
tim uerō digitorum motibus famulatur. Vbi autem sinistrae manus^a arteria has soboles diges-
sit, inter^b duos cubitum flectentes musculos recondita, ipsisq; ramulos praebens, ad medium
cubiti articuli flexus prorepit, hīc utrinque^c ramulum ipsi articulo exhibens, & muscoli cubi-
tum flectentis posterioris^d insertioni innitens, hīcq; subinde pulsum euidentem edens. Hinc
arteria inter^e musculum secundos quatuor digitorū articulos flectentem, & ° illum qui tertio
eorundem digitorum articulos flectit, mergitur, ac ubi nonnihil per cubiti internā sedem prore-
psit, bipartito scissus^f unum ramum radio, ° alterum ulnae exporrigit. Qui secundum radium
fertur, cuiusq; pulsum indies in aegris exploramus, nō procul à brachialis radiceⁱ sobolem de-
riuat, quae sub^k tendinibus pollicem extendentibus ad summā manus externam sedem pro cur-
rit in^l musculos digesta, qui inter primum pollicis os & postbrachialis os indicem sustinens
collocantur. Quando ramus radio exporrectus illam emisit sobolem, unā cum tendinibus di-
gitos flectentibus^m transuersum brachialis ligamentum transgreditur, & subⁿ dilatescente in
summa manu tendine, similiter ac ° uena huc pertinens, & ° neruus quoque illi attensus in tres
ramos discinditur, quorum unus in duas diremptus propagines internam pollicis regionem
accedit. Secundus uerō duplici ramo internā indicis sedem implicat. Tertius autem indiuisus
internum latus interioris medij digiti sedis conscendit. ° Ramus arteriae qui ulnae exporrigitur,
similiter per transuersum brachialis ligamentum manus uolam subit, ° & duos ramulos mini-
mo digito & totidem anulari, unum autem medio offert, sed interim nullam sobolem in exter-
nam summā manus sedem dispēsat. quamuis interim^s unam^t illis musculis porrigit, qui exter-
num latus postbrachialis ossis occupant, quo minimus digitus suffulcitur. Rami ulnae exporre-
cti motum haud manifestò percipimus, nisi homo admodū gracilis ac macilentus, aut magno
pulsu praeditus fuerit. Quippe Natura ut omnes propemodum arterias, hunc quoq; ramum
retinet, tendinibus magis quā is qui radio exporrigitur, occultatum, atque ita nusquam ea-
rum portionem Natura in cutem conspicuē emittit, quemadmodum soboles à uenis passim &
frequenter perferri prius commemoratum est. Merito igitur nullam in extremis manibus à fo-
ris aliam à nuper dicta, quam pollicis ac indici ascripsimus reperiēs arteriam, quia ne musculus
quidem unus inibi cōsistit. At interna regio quoniam pluribus est septa musculis, ideo multas
quoque arterias sibi uendicat. Ad hunc sanē modum^u primus arteriae magnae partis superio-
ra petentis ramus diuarcatur, qui ad primā sinistri lateris costam contendit. ° Maior autē am-
pliorq; ascendētis arteriae partis portio asperae arteriae^v innitens, rectā sursum ad ° glandium
in iugulo repositū properat. id enim arteriae huic similiter ac uenae lectuli modo substernitur,
ac ipsius beneficio ramorum scissio iniurijs innoxie ferendis promptior efficitur. Quum uerō
in hunc modum arteria sursum tendit, priusquā elatiorē pectoris ossis sedem superat, adhuc in
thoracis amplitudine in^a duos impares ramos finditur. ° Sinister, qui gracilior est (amplius ta-
men & ipse) nonnihil oblique in laeuū deflexus, sursum cum^b interiori iugulari secundum aspe-
rae arterie sinistrū latus per ceruicem exporrigitur, ipsaq; soporalis eius lateris arteria censetur.
At

*Arteria ra-
mus, cuius pul-
sum ante bra-
chiale explo-
ramus.*

*Naturam ar-
terius reconde-
re.*

*Series maio-
ris portionis
magna arte-
riae partis,
quae superiora
corporis pe-
tit.
Sinistra sopo-
ralis.*

h H.
i I.
k K.
l fig. cap. 6
a, d.
m L.
n inter L et
M.
o M.
p 10 muscu-
ta. 6.
q N.
r fi. ca. 6 m.
s paulo sub
N.
t fi. 6 ca. q.
q.
u O.
x 2 fi. cap.
z li. 1 per Y
uersus P.
y fi. ca. 6 p.
z 2, 3 fi. ca.
u lib. 4 p.
a N.
b 6 mus. ta.
c, r, r.
c P, P.
d 8 mus. ta.
N musculi
r.
e 6 ta. z.
f 5 ta. 6.
g Q.
h S.
i R.
k 1 i musc.
ta. u, q, r.
l 11 ta. f. 6
8 ta. Y.
m 4 mus.
ta. 6.
n 3 mus. ta.
l musculi r.
o à q. fi. ca.
6.
p fi. cap. 12
lib. 4 cha.
44.
q S.
r Spectan-
tur haec iux-
ta T.
s *.
t 4 mus. ta.
25.
u D.
x V.
y 6 fi. lib. 6
R super Y.
z 2 fi. li. 6
F.
a 6 fi. lib. 6
in X & S.
b X.
c fi. ca. 6 S.
aut specta-
potius ulti-
mam fi. hu-
ius li. hac in
sede.

At dexter ramus sinistro crassior, similiter sursum tendit: & simulatq; primam thoracis costam contigit, ex dextro ipsius latere^d arteriā promit in easdem prorsus soboles discissam, quas à^e ramo, qui sinistrae manui offertur, pullulare scripsimus: ad superiorū uidelicet costarū interualla, ad transuersos ceruicis uertebrae processus, ad pectoris os, ad posteriores in collo locatos musculos: & ut rem in pauca contraham, in eosdem omnino ramos digeritur, in quos sinistrae manus arteriam desinere commemorauimus. Quod uerò maioris dextriq; rami adhuc superest, crassitie illi congruit^e ramo, quem secundum asperae arteriae sinistram latum prorepere paulo antè diximus. atque is hac porrigitur, ita ut ille dexter, secundum asperae arteriae dextrum latum sursum conscendit, ac huius lateris soporalem constituit arteriam, quae uti & sinistra *negotio* nuncupatur. Quum autem sinistri lateris soporalis arteria (perinde ac dextri etiam) ad fauces usque^h pertingit, in duos discinditur ramos, quorū grandior idemq; interior fauces subit, ac mox laryngi & linguaeⁱ propagines deriuans, ad caluariæ basim^k properat: priusquam uerò in caluariam mergitur, in duos impares deducitur ramos. Maior per^m peculiare foramen nulla concomitatus uena, caluariam inibi ingreditur, ubiⁿ glandula cerebri pituitā excipiens in quodam ossis cuneum referentis^o sinu ponitur. Hic ramus mox in ipso ingressu utrinque singulas emittit propagines, ac^p unam per^q proprium foramen ad narium amplitudinē dispensat, quae suo extremo inter nasi cartilagine, adeoq; ad nasi usque extremū ita cum aliquot faciei arteriis^{lis} deperditur, ut tactu etiam ipsius motum inibi percipiamus. Altera propago in latum sinistram durae cerebri membranæ^s multipliciter discinditur, ipsum autem arteriae corpus duas illas diffundens propagines bipartitur, & caluariæ basi suffultum, itaq; diuisum in anteriora nonnihil tantisper repit, donec denuò ipsum colligatur. Subinde uerò huc usque nō diuisa, neque collecta rursus, sed simplex prorsus fertur. Vtuncq; autē sit, siue simplex huc pertingat, siue prius in duas partes diuisa hīc se rursus colligat, inibi^u insignem utuncq; ramum per^x secundi neruorum cerebri paris^v foramen ad oculum & interiorē^z temporalis musculi sedem distribuit. Quod uerò ipsius^z reliquū est, durā cerebri membranā^b perforat, ac^c partim in tenuem cerebri membranā, partim ad sinistrū cerebri uentriculū conscendit, plexū inibi faciens quem secundinis seu extimo foetus inuolucro tum comparabimus, quando cerebri uasorum seriem secūdo ab hoc Capite persequemur. Vbi etiam paulo diffusius quae iam postremo loco commemorauī repetam. Alter ramus arteriae partis, uti dicebam, ad caluariam ductae, cum^f coniuge uena in posteriora secundum caluariæ basim fertur, &^s ramulumⁿ musculis ceruicis uertebrae anteriorem sedem occupantibus, iuxta primae secundaeq; uertebrae interuallum offert. ac dein caluariam ingreditur: & commune foramen cum^k sexto cerebri neruorum parī nactus, simul cum uena inⁱ sinistram seu secundum durae cerebri membranæ sinum exhaurit. Porro sinistrae soporalis ad fauces^m diuisionisⁿ exterior graciliorq; ramus, genis seu buccis^o ramulum offert, penitus latitantem. P^p Insuper in duas propagines sectus, ^q unam sinistro temporī, alteram secundum sinistrae auris posteriorem sedem digerit, pulsum etiam edentes sensibilem. Atq; in hunc sanē modum ascendens arteriae pars in ramos finitur.

Dextrū brachium petens arteria.

Dextra soporalis.


Soporalis ad caluariam series.

AMPLIORIS DESCENDENTISQVE MAGNAE ARTERIAE TRUNCI IN SUOS RAMOS SERIES. Caput XIII.



RVNCVS magnae arteriae deorsum ad thoracis uertebrae^s explicatus, ab infima ipsius sede qua uertebri incumbit, non autem lateribus, utrinque^b propagines in octo inferiora thoracis interualla deriuat, quae similiter ac^c uenae coniuge carentis rami secundum interualli ductum ad costarum usque cartilagine in ueris costis prorepunt, spuriarum uerò costarum interualla excedūt, in abdominis latera magis quam ipsae costae pertinentes. Ab his propaginibus ramuli in dorsalem medullam per^d foramina neruorum gratia in uertebri sculpta, ac dein ad musculos uertebrae thoraciq; adnatos sparguntur, pari omnino serie qua uenam coniugis expertem disseminari superius proditum est. Ipse autem arteriae truncus uertebrae corporū sinistrae sedi quodammo do innitens, deorsum^f sub septo transuerso quā id undecimae thoracis uertebrae corpus respicit, extra thoracis amplitudinē labitur, ac mox utrobique septo transuerso^s unam offert propaginem, quae in plures secta furculos, in humilio rem septi iuxta uertebrae sedem praecipue deperditur, soboles sursum ad septi elatiora adeoq; ⁱ ipsum

Ad inferiora costarū interualla arteriae.



HAC figura portione arteriae à tergo finimus, ut aliquo pacto series proponeretur, quae haec ramos costarū interuallis ex posteriori ipsius sede digerit.

Ad septum transuersum arteriae.

1 3 ipsum

*Arteria magna ramio-
metum, iecur,
bilis uesiculā,
uentriculum,
lienem, duode-
nū et coli par-
tem acceden-
tes.*

ipsum cordis^h inuolucrum quā id septo adnascitur spargens. Post commemoratas propagi-
nes magna arteria, ex elatiori sui corporis sede,ⁱ unum promit truncum, ramos in uentriculum,
iecur, bilis uesiculam, lienem, omentum, & duodenum intestinum, & colon quoque ubi uen-
triculo id exporrigitur, ad hunc modum offerentem. Præfens truncus simulatq^k prodiit, ela-
tiori sedē inferioris membranæ omenti suffulcitur, ac in duos magnitudine propemodum æ-
quales ramos diremptus, hūc^l qui gracilior paulò est dextrorsum,^m illum uerò qui modicè am-
plior uisitur sinistrorsum mittit. Dexter ramus uenæ portæ inⁿ glandoso corpore, quod sub
uentriculi posteriori sede huic omenti membranæ intertextum cernitur, adnexus, sursum ad
iecoris cauum contendit, in medio ductu ex humiliori ipsius sede^o furculum inferiori omen-
ti membranæ, ipsiq^p adeò colo intestino hīc deriuans. Post hunc ab elatiori parte^p sobolem
uentriculo exporrigit, quæ in posteriorem ipsius sedem qua is dorsum spectat, pauculis ramu-
lis digeritur. Ex humiliori rursus sede, dexter arteriæ ramus ad iecoris cauum tendens, duas de-
nuò profert soboles.^q Vnum cum uenæ portæ ramo intestino diffundit, quod duodenum ap-
pellamus, secundum cuius mediam longitudinem & aliquousque ad ieiuni intestini initium ea
soboles porrigitur.^r Altera nuper commemorata paulo amplior, ad dextram fundi uentriculi
sedem retorquetur, & superiori omenti membranæ innexa, ex elatiori sede in anteriora & po-
steriora fundi uentriculi ramulos frequenti sobole spargit, perinde ac ab inferiori sua sede alias
in omenti superiorem membranam ducit.^s Atque hæc arteriæ cum portæ uenæ ramo hæc ex-
porrecto ad medium fundi uentriculi cessat. Quod uerò dextræ arteriæ rami adhuc superest,
postquam ab eminentiori^t duos insigniter exiles furculos bilis uesiculæ transmisit, in^u ramu-
los aliquot sectum ad iecoris cauum terminatur, non admodum altè in iecoris substantiam dif-
feminatum.^x Sinister ramus ab arteriæ caudice prodiens, quem^y dextro modicè crassiorē
esse dicebamus, inferiori quoque omenti membranæ ipsiusq^z glandoso corpori committitur,
coniungens se uenæ portæ ramo, in tot quot ille soboles digerendus. Mox enim præfens arte-
riæ ramus ab eminentiori sede^z propaginem uentriculo qua dorso innititur offert, quæ pri-
mū^a sobolem unam utrinque in mediam uentriculi sedem eius quæ dorso incumbit regio-
nis exporrigit. deinde sursum ascendens, uenæ portæ^b modo superius uentriculi orificium co-
ronæ instar appositissime^c cingit, ramulos uentriculi corpori & graciles furculos stomachi
termino, quo is uentriculo continuatur, distribuens. Inter reliquos autem ramos^d unus secun-
dum uentriculi superiora dextrorsum exporrectus, uentriculi humilioris adit orificium, furcu-
los quoque in progressu anteriori & posteriori sedibus uentriculi depromens.^e Sinister arte-
riæ ramus lienem potissimum accedens, ab humiliori ipsius sede^f propaginem in inferiorem
omenti membranam diffundit, quæ paulo post exortum in duos ramos inuicem ualde didu-
ctos discinditur, numerosam arteriarum sobolem deorsum in nunc dictam omenti membra-
nam & colon intestinum propagantes. Hac edita propagine,^g sinister ille arteriæ ramus sini-
strorsum magis ducitur, & uenæ ipsi attentæ ritu in duas diffunditur arterias: & hæc rursus in
alias tantisper dirimuntur, donec^h frequenti ramorum serie lienis cauo secundum rectam line-
am implātentur. Priusquam uerò omnes arteriæ in lienem cessent, ab humiliore parte eius quæ
demissiorem lienis sedem adit, plerunqueⁱ ramulus inferiori membranæ omenti offertur.
Deinceps ab illa arteria, quæ infimæ lienis arteriæ proxima est, priusquam hæc in lienem de-
perditur,^k propago pullulat, quæ superiori membrana omenti suffulta, dextrorsum ad uentri-
culi fundum contorquetur, sinistramq^l uentriculi fundi sedem perreptans, geniculatim ramu-
los anteriori & posteriori sedibus, ac dein superiori membranæ omenti soboles spargit. Item
ab alijs lienem adeuntibus arterijs^m ramuli enascuntur, qui sinistrum uentriculi latus illo pror-
sus modo adeunt, quo à uenis lienem petentibus propagines eodem pertinere, superius com-
memoratum est. Cæterum à magnæ arteriæ corpore, paulo inferius quāⁿ truncus cuius
iam seriem absoluiamus, principium ducit, ab elatiori quoq^o corporis parte^p alia promitur ar-
teria, quæ in superiorē mesenterij sedē in plurimas soboles diffusa, uenæ portæ modo excurrit
in ieiunum, & ilium & coli intestini partē, quæ à iecoris cauo ad dextrum renem usq^q pertinet.
Post hanc inferius paululum ab utroque magnæ arteriæ latere,^r ampla educitur arteria in sui
lateris renem,^s queadmodum & uena, transuersim prorepens. Hæc arteriæ in renes integræ ab-
sumuntur, uixq^t uenarum modo ramulos notatu dignos in^u pinguem renem tunicam disse-
minant. Insuper ab arteria sinistrū renem accedente, ac demissiū plerunq^x, quā ea quæ sini-
stro reni offertur, principium sumente,^y seminalis arteria nō enascitur, sed frequentissime (ut &
dextri testis^z arteria) ab arteriæ magnæ corpore originem ducit. Aliquantulo enim humilius
quā dextræ seminalis uenæ^a initium à caua exurgit, ab anteriori arteriæ magnæ sede semina-
lium arteriarum^b exortus pendet, quæ ipso ortu inuicem sunt conterminæ: ac dextra quidem
cauæ

*Præcipuamē
senterij ac-
cedens arte-
ria.*

*Renum arte-
ria.*

*Seminales ar-
teria.*

b, fi. lib. 6.
C, D, E, F, G.
i Specta si-
mul cum in-
tegra deli-
neatione fi-
guram illius
indici inser-
tam m.
k 3 & 4 fi.
lib. 5. s. unde
etiam huius
arteriæ se-
riem petes
uenæ portæ
ramus ex-
porrectam.
l n.
m u.
n 3, 4 fi. lib.
5, 2, 1.
o o.
p p.
q q.
r r.
s 2 fig. lib. 5.
Rad T. aut
14, 15 fi. lib.
5 c. uerū si
hæc in quā-
to libro spe-
ctare uisum
est, recurri-
to ad margi-
nem portæ
descriptio-
nis. ne hic ni-
mius in no-
tando sim.
t f.
u t.
x u.
y n.
z r.
a y.
b 14, 15 fi.
li. 5. d.
c z.
d a.
e u.
f s.
g u.
h s, s.
i y.
k u.
l f.
m m.
n s in inte-
gra arteriæ
delineatiōe.
dein cōsules
3, 4, 6, 7, 8,
aliquotq^z se-
quentes lib.
5 figuras.
o u, s.
p 22, 23 fi. li.
5 m, n.
q 20 fi. lib. 5
T, V.
r u, n.
s 1, 1.
t 22, 23 fi. li.
5 u.
u earundem
fig. n.

cauæ uenæ corpus^{*} transcendens, dextræ seminali uenæ attenditur, quousq; pubis os superās, ac ex magna peritonæi cavitare excidēs, ipsi uenæ permisceatur, atq; cum illa anfractus gyrosq; efformet, quorum basis humilior uē sedes superiori testis regioni implantatur, ac testis substantiæ & hanc proximē inuoluenti tunicæ ramos præbet. Ad hunc quoq; modum sinistra seminalis arteria sinistrae congruitur uenæ, & in mulieribus quoq; arteriarum series^z earundem uenarum distributioni penitus congruit. Vt scilicet^a media arteriarum pars in testes adeat, semina liaq; uasa constituat, altera autem fundum uteri implicet. Enarratis hætenus propaginibus, alia succedit, inferiūs quàm seminales arteriæ, ab anteriori etiam magnæ arteriæ sede principiū ducens, & in humiliorem mesenterij sedem distributa. Quandoquidem hæc in colum intestinum, quā à liene ad rectum usq; intestinum prorepat, ac dein in ipsum quoq; rectum imprimis digeritur. A posteriori autem seu inferiori magnæ arteriæ sede, qua hæc uertebis committitur, geniculatim^a ramuli utrinq; ad singulas lumborum uertebas promuntur, qui in dorsalem medullam & musculos uertebis hîc adnatos excurrunt. Atque huiusmodi ramuli inuicem ferē amplitudinis ductusq; specie conueniunt, si modò^c unicam utrobicq; propaginē exceperis, quæ quum cæteris insignior multoq; crassior sit, ac iuxta sacri ossis summum præcipuē prodeat, nō solum musculos uertebis attensos accedit, uerū transuersim per peritonæum abdominisq; musculos ad latera usq; abdominis exporrigitur. Hætenus magna arteria in lumborum regione uenæ cauæ sinistro lateri succubuit, quum uerò sacri ossis principium attingit, uenamq; conscendens, in^b duos grandes truncos instar Y ad hunc modum X inuersi bipartitur. Fit uerò situs huius permutatio propter arteriæ dignitatem. Quum enim hæc dignior nobiliorq; censeatur, non immeritò ipsam magis quàm uenam recondi, occultari, & in alto corporis ferri, ac demum iniurijs ferendis pertinacem effici, sagax rerū Opifex uoluit. Ne uerò hîc ab excarni ossis sacri initio in dorsi motibus arteria promptè lædatur, superpositā prius arteriam inibi uenā superiorem esse, illamq; hanc conscendere uoluit, ut uenā instar sub sterniculi cuiusdam arteriæ subderetur. Cæterum priusquam uenæ cum arterijs in crus delabantur, quum iam sacrum os uasa superarūt, uenæ arterijs superiores uehuntur: arteriæq; quoniā digniores sunt, sub uenis reconduntur. Rami uerò qui à magnæ arteriæ supra sacri ossis initium diuisione prodeunt, uenarum ramis exactissimè correspondent. Siⁱ exiguos fortè surculos secluseris, qui ab humiliori arteriæ sede, quā hæc primū bipartitò scinditur deorsum ducti, ac osse sacro suffulti, ipsius^k foramina lubeunt, hac dorsalem medullā posterioremq; sacri ossis sedem petentes. Atq; hæc interdū adeo insignes occurrerūt, ut sectionū rudes has uenas esse arbitrarent, quæ in recti intestini finē, seu anum desinentes, sæculentū sanguinem nonnunquā expurgarent. Sinister itaq; quemadmodum & dexter huius supra os sacrum factæ diuisionis truncus, nō procul à diuisione in duos grandes partitur ramos, quorū^m interiorⁿ exteriori gracilior est: ac ilico duas à se diffundit propagines, quarū^o unam rursus interiorē^p alterā uerò exteriorē doctrinæ studio nō ineptè appellabis. Exterior simul cum^q uenā inter sacrum os & ilium os, quā hæc inuicem dehiscunt, in exteriora transuersim exporrigitur, & frequenti utcunq; sobole musculos ilium os amplexantes, ipsumq; adeo coxendicis articulū implicat. Anterior autē in uiris uesicę fundo, & ceruici ipsius seu peni, & paucas admodū etiam podici soboles dispensat. In mulieribus uerò, quibus hæc^r propago grandior uisitur, in humiliorem fundi uteri regionem numerosa serie distribuitur. Neq; is uteri duntaxat insitū calorē refocillat, sed & foetus quoq; quando is utero geritur. Dein hæc propago præter uterū, etiā muliebrē uesicā, & uteri ceruicē ramulis quibusdā intertextit. Quod interioris rami qui binas nunc explicatas eduxit propagines^s reliquū est, deorsum repit, sui lateris arteriam, quæ in umbilicū fertur, admittēs. Arteriæ etenim ab umbilico secundum fundi uesicæ latera deorsum ductæ, ac in natis hominibus coriaceæ inanesq; reddite, in sui lateris ramum inferuntur, ipsi uē continuātur, quem modò ab interiori illo ramo reliquū esse deorsumq; ferri dicebā. Is nanq; nō minus quàm uenā ipsi attensa pubis ossis^v foramen petit. Priusquā uerò id transit, propaginē assumit ab externo trunci ramo, ubi is iam in crus est prolapsurus. Præfens itaq; ramus ea propagine adauctus, per pubis ossis foramen ducitur, & in musculos foramen id occupantes, & illos qui à pubis osse principiū sumunt dispergitur, perinde ac^a uenā pubis ossis foramen transiens. Ac quemadmodū hæc iuxta mediū longitudinis femoris extremo quodam ipsius surculo alteri uenæ in^b quintū femur mouentiū musculum dispensatæ^c cōmiscetur, ita sane & præfens arteriæ ramus suo fine cum alia^d coit^e arteria, quam illi musculo à maxīmā crus petente arteria distribui non ita multo post subiiciam. Exterior nanq; ramus sinistri trunci eius^f diuisionis, quam supra os sacrum fieri dicebā, per inguina in læuum crus^g descendit: anteaquā uerò peritonæum permeat, propaginem sursum peritonæo exporrigit, quæ ad rectum abdominis sui lateris musculum accedens, surculos in conterminas sedes transuersim utrinq; digerit.

Ad humiliorē
mesenterij se-
dem arteria.

Ad lumborū
uertebas &
carnes.

Arteria ma-
gnæ supra sa-
crum os diui-
sio, arteriæq;
supercauam
ascensus.

Truncorum
diuisionis su-
pra os sacrum
facta series.

Arteria pu-
bis ossis fora-
men transiens.


*Arteria in
crure series.*

ipse autem sursum ad umbilici usque regionem properans, in ramulos diffinditur, ^k qui arteriæ eodem à pectoris regionibus tendentis ramulos spectant, ac mamillarum cum utero cōmunionem (si modò arteriarum beneficio aliqua sit) præbent. Quum uerò grandis arteria in crus descendens peritonæum superauit, ^l ramulum ad pubis ossiū commissuram mittit, qui exiguus est, neq̃ ut eò tendēs^m uena in multas soboles dispergitur, quarū ne una quidē cutē subit, nisi fortē exilis quæpiam in penisⁿ inuolucrū diffundatur. In crure autē, ^o arteria modò uenæ subiecta, ipsa^p uena ueluti propugnaculo munita, ^p ramū in anteriores femoris os amplexantes musculos digerit, qui etiam si in frequētes scinditur soboles, nullam tamen cuti exporrigit. Deinde à grandi arteria ^q alius educitur ramus, in quintum femur mouentē musculum, & eos qui internam femoris sedem occupant musculos, ad genu usq̃ quodammodo in propagines sparsam, & quædam ipsius sobole illius^r arteriæ extremo^s commixtam unitamq̃, quam per pubis ossis foramen in crus pertingere scripsimus. Cæterum ipsa grandis arteria sensim deorsum prorepens, secundum femoris os ita conuoluitur, ut ab anteriori inguinum sede^t inter duo inferiora femoris capita in poplite consistat, nusquā non^u uena grandiori quæ crus accedit concomitata. In hoc per femoris posteriora descensu, arteria^x propaginem educit, quæ in musculos posteriorem femoris sedem occupantes excurrit, & aliquousq̃ cum illis uenarum^y propaginibus deducitur, quas uenam efformare docui, quæ per genu flexū seu posteriorem ipsius sedem in suræ cutem sparsa sobole pertingit, arteriæ interim nulla propagine ad cutē emergēte. At grandis arteria in ipso poplite, uti diximus, recōdita, ^z utrinq̃ propaginē emittit in alto quoq̃ occultatam, & in genu articuli latus penitiūs digestam. Vbi uerò arteria tibiā subire incipit, ab externo ipsius latere^a ramum diffundit, qui fibulæ exporrectus inter septimum & octauum pedis motus autorum^b musculos reconditur, atq̃ in reliquos qui anteriorem tibiæ sedem sibi uendicant, soboles ultra medium longitudinis tibiæ digerit, ipse autem arteriæ^c truncus inter capita^d duorum primorū pedem mouentiū musculorū repens, inter^e quartū pedis motuū opificem musculum, et duos quorum beneficio ultimi digitorū flectuntur articuli, ac^f quintū pedē mouentium occultatur, neq̃ multum à^g ligamento membraneo fibulam tibiæ ossi secundum totam fibulæ longitudinē colliganti distat, & sub medio longitudinis tibiæ in duos^h ramos dirimitur, quorum interior inter calcem & tibiæ os pedis inferiora subit, unā cum musculorum tendinibus humiliora pedis hæc petentibus. In descensu interior ille ramusⁱ furculum tali cum tibiā articulo offert. In pedis uerò planta inter^j musculum secundos quatuor digitorum articulos flectentem, &^k tendines qui tertios articulos flectunt^l repositus, in duas primū partitur soboles, quarum una duplici ramo inferiorem pollicis adit sedem: altera uerò in progressu in duos furculos digesta, unum ad indicem deriuat, in duos tamen prius deriuatum ramulos: alterum uerò furculum interno lateri inferioris mediū digiti sedis, indiuisum offert. ^m Exterior ramus illius quæ ad medium longitudinis tibiæ fit diuisionis, inter fibulam & calcem pedis inferiora accedit, unā cum tendinibus septimi & octauī pedem mouentium musculorum, atque hic in duos minimos digitos & externum latus mediū digiti disseminatur: in ipso autem ad pedis inferiora progressu, tali cum tibiā articuloⁿ propaginem præbet, &^o aliam hac longē grandiore digerit, ^p sub interiori malleolo ad principium illorum musculorum qui pollicem & tres digitos ipsi proximos in externum latus abducūt. Hæc propago in superiori pedis sede motum etiam edit tactu sensibilem. Verum ut uenarum pedem subeuntium seriem uariari suo loco relatum est, ita sanē & arteriæ distributio inibi discrepat: quippe interdum, neq̃ id infrequenter^q obseruabis omnibus digitis furculos offerri, ab illo ramo quem pedis inferiora inter calcem & tibiā petere diximus, illo qui fibulæ exporrigitur plantam non accedente. at tunc ab arteria in posteriori tibiæ sede recondita, grandis ramus per^r membraneum ligamentum tibiæ ossi fibulam, quā hæc ossa inuicem dehiscunt colligans, in anteriorem tibiæ sedem pertinet: atque inter eius sedis musculos occultatus, unā cum eorundem tendinibus per^s transuersum ligamentum in anteriore tibiæ sede conspicuum, in superiorem pedis regionem deriuatur, musculis illis qui digitos in externum latus abducūt, quodammodo reconditus. Atq̃ hic ramus interdum ligamentū id membraneum transit, mox sub genu articulo, ubi tibiæ os à fibula primū dehiscere incipit, interdum uerò iuxta inferiorem tibiæ sedem, prout nimirum^t ramus quem arteria tibiā subiens, uersus octauum & septimum pedem mouentes musculos digerit, aut demissiūs fertur, aut elatiūs in ramos dissectus cessat, aut etiam prorsus deest. utrumq̃ enim accidere reperi, quum summo studio non arteriarum solum, sed & uenarum neruorumq̃ seriem primū discere, ac subinde tum priuatim, tum publice ostendere, ac demum hīc uerius quā elegantius describere sum conatus.

l. v.
m fig. ca. 6.
Δ.
n 20 si. lib.
5 r.
o p. uerūm
specta inte-
rim sedulo
universum
crus ultimæ
fig.
p x.
q y.
r z.
s u.
t 1 fi. ca. 30
li. 1. l.
u fi. ca. 6. in
ter. 2. 3. 4.
x r.
y fig. ca. 6.
charact. 3.
4. de m. cha-
ract. 6.
z Δ, Δ.
a z.
b 6. mus. ta.
c, r.
c o.
d 12 mus. ta.
bul. o. r.
e 13 ta. r.
f 14 ta. Δ.
z.
g 15 tab. D.
E.
h 15 tab. T.
i z, 2. n.
k o.
l 14. musc.
tab. o.
m 14. tab.
Δ, d. 2. 3.
n Δ.
o n.
p o.
q y.
r 6 muscul.
tabul. sub o.
ad Δ.
s Vti hic
scribitur, ut
rimam deli-
neauit figu-
ram.
t 15 mus. ta.
T.
u 1 tab. Δ.

x z.

DECIMIQUARTI CAPITIS FIGVRA.



DECIMIQUARTI CAPITIS FIGVRAE
eiusdemq; characterum Index.

PRÆSENTI figura nuda uasorum cerebri delineatio proponitur, à uenis arterijsq; incepta, priusquã illæ penitus in caluariã merguntur. Cæterum si fortè hæc tabula singula cerebri uasa nō ad amussim ostendat, eã nihilominus quò res alioquin difficilima minori negotio oculis subiiciatur, ac à studiosis in dissectionibus pròptiùs obseruetur, nō mediocriter accōmodaturã mihi persuadeo. Ne autem ramorū frequentia pleraq; obscurarentur, unius duntaxat lateris uasorum seriem (nisi quandoque res secus exigat) delineatam conspicias, haud præteriens omnes propemodum septimi libri figuras huc quoq; spectare, ac ab interiori margine ad illas lectorem ablegandum, perinde atq; ad figuram huius libri calci insuendam.

- | | |
|--|-----------------------------|
| <i>A</i> Interior iugularis, quã iam caluariæ proxima est. | <i>B</i> Soporalis arteria. |
| <i>D</i> Prima caluariam petens uena. | <i>C</i> Secunda uena. |
| <i>E</i> Quarta uena. | <i>F</i> Tertia uena. |
| <i>K</i> Prima caluariam ingrediens arteria. | <i>G</i> Quinta uena. |
| <i>I</i> Secunda arteria. | <i>H</i> Sexta uena. |
| <i>L</i> Tertia arteria. | |
| <i>M</i> Dexter, seu primus duræ cerebri membranæ sinus. | |
| <i>N</i> Sinister duræ cerebri membranæ sinus, quem secundum nuncupamus. | |
| <i>O</i> Primi & secundi sinuum congressus. | |
| <i>P, P</i> Tertius duræ membranæ sinus. | |
| <i>Q</i> Tertij sinus finis osseo commissus septo, quo olfactus organorum sedes interdiuiduntur. | |
| <i>R</i> Quartus duræ membranæ sinus. | |
| <i>S, S</i> Ductus à dextro sinu pullulantes, ac in duræ tenuisq; membranarum sedes, quæ illis proximæ sunt, excurrentes. | |
| <i>T, T</i> Ductus ex tertij sinus latere in tenuē diffusi membranã, quos solim abtrūcatos depingere licuit. | |
| <i>V, V</i> Ramuli ab infimo tertij sinus angulo in eam duræ membranæ partem deriuati, quæ dextram cerebri partem à sinistra seiungit. | |
| <i>X, X</i> Tertij sinus surculi cum illis commissi uasculis, quæ per uerticem caluariam subingrediuntur. | |
| <i>Y, Y</i> Exiguæ | |

- Y, Y** Exiguæ propagines ab elatissimo quarti sinus angulo, in duræ membranæ sedem aliquousq; excurrentes, quæ dextram cerebri partem à sinistra hic supra cerebellum interdiuidit.
- a, a** Ductus à dextro quarti sinus angulo deprompti, qui in duram cerebri membranā, quæ cerebello hic incumbit, ac dein in tenuem & cerebelli & cerebri membranam diffunduntur.
- b** Ductus à quarto pendens sinu, ac secundum totam longitudinem, humilioremq; sedem eius duræ membranæ partis propagatus, quæ dextram cerebri partem à sinistra dirimit.
- c, c, c** Surculi sursum à commemorato iam ductu in dictam quoq; duræ membranæ partem deriuati.
- d, e** A quarto sinu propagati ductus, qui uenarum prorsus modo tenui membrana suffulti, secundum cerebri longitudinem supra callosum cerebri corpus ducuntur. Ac unus quidem qui d insignitur, parti dextræ cerebri attenditur. Alter uero e notatus, sinistræ parti exporrigitur.
- f** Ductus à quarti sinus humiliori sede in tenuem cerebelli membranam propagatus.
- g** Ductus f notati propago per cerebri anfractus gyrosq; in humillimam dextri cerebri uentri- culi sedem pertingens, ac cum hac ascendente arteria, quam y notabimus, coiens.
- h** Ductus f notati propago retrorsum repens, ac multifariam in tenuem cerebelli membranam dissectus.
- i** Præcipua quarti sinus propago, sub cerebri corpore fornicis cameræue modo extructo, ad in- teriorem usq; sedem tertij uentriculi cerebri procurrens.
- k** Propaginis i notatæ in duas partes dissectio, in qua l partem indicat dextro exporrectam ce- rebri uentriculo, m uero eam quæ sinistrum adit, hicq; abtruncata cernitur.
- n** Tertiæ caluariam ingredientis uenæ surculus, ad auditus organum exporrectus.
- o, o, o** Series sinus duræ membranæ, in quem tertia uena exhauritur, cui perpetuo sinus attenditur, in quem tertiæ arteriæ ramus r notandus absimitur.
- p, p** Propagines eorū quos iam ultimo cōmemorauimus sinuum, in tenuem cerebri membranā sparsæ.
- q** Diuisio tertiæ & maximæ caluariam ingredientis arteriæ, simulatque in caluariæ amplitudi- nem mergitur.
- r** Ramulus tertiæ arteriæ, qui in duræ membranæ sinum absimitur, atq; secundum cerebri latera excurrit, o, o, o notata.
- s** Ramulus per proprium foramen in narium amplitudinem digestus, & quodam surculo t insigni- to nasi extremum accedens.
- u, u** Duo grandes rami eius diuisionis, cui q inscribitur.
- x** Propago ex grandium illorum ramorum, quos u & u notauimus, coitu per secundi paris neruo- rum cerebri foramen ad oculos potissimum excidens.
- a** Propago crassior dicti modo congressus, quæ duram cerebri membranam perforat, ac mox in duos ramos bipartitur β & γ insignitos.
- β** Ramus propaginis α notatæ, in tenuem cerebri membranam frequenti sobole hic dispersus.
- γ** Ramus propaginis α insignitæ, dextrum accedens cerebri uentriculum, & plexum efformans,
- δ** qui extimo foetus inuolucro confertur, quiq; hic δ notatus conspicitur.

Sex uenæ cal-
uariam ex alte-
ro latere in-
gredientes.




D V M superius uenæ ramos caluariæ basim ingredientem recenserem, utrin- que sex eos obseruari relatum est. Arteriarum uero seriem persequens, utrobique etiam tres arteriarum propagines caluariam subeuntes enumera- ui. Ac^a prima quidem illius enarrationis uena, propago ea censebatur, quæ per transuersos cervicis uertebra- rum processus conscendens, calua- riam petebat. Secunda ac tertia internæ iugularis uenæ^b rami erant, c u- nus qui cæteris caluariæ immixtis uenarum propaginibus crassior am- pliorq; uilitur; ac per^d grande foramen, quod etiam^e sexto cerebri neruorū pariparatum est, caluariam ingreditur, prius^f propaginem in anteriorem uertebra- rum sedem uersus primam et secundam cervicis uertebra^g diffundens. ^h Alterⁱ peculiari foramine iuxta tertij quarti- que^j pa- rium cerebri neruorum inciso utens, caluariam citra arteriæ consortium subit. ^k Quartam ue- rò uenam externæ iugularis sobolem esse scripsi, quæ^l priuato foramine caluariam petit, ^m ubi Δimitans futura postremæ parti temporis commissuræ iungitur. ⁿ Quinta demum illa est, quam per^o foramen^p secundo cerebri neruorum pari in caluariam porrigi dicebam. ^q Sexta autem & ultima caluariam subintrat per foramen in octauo capitis osse exsculptum, quod eo- rum

a D. fi. cap.
16 N. uli.
fi. f.
b uli. fi. a. d
educti.
c C.
d 2, 3 fi. ca.
12 li. 1 c.
e 14 fi. li. 7
N.
f. a.
g F.
h 2, 3 fi. ca.
12 li. 1 R
iuxta Q.
i 14 fi. li. 7
l, K.
k E. uli. fi.
l.
l 2, 3 fi. ca.
12 li. 1 g
m 4, 5 fig.
ca. 6 li. 1 C.
n G. ult. fi.
alter ramus
u.
o 1, 2 fi. ca.
12 li. 1 G.
p 14 fi. li. 7
G.
q H. uli. fi.
alter ramus
u.

rum^r foraminum quæ odoris gratia cælari putamus, maximè anticum & grandius quoque cernitur.^s Prima arteria quum magnæ arteriæ seriem persequeretur, illa occurrit, quæ unâ cum prima caluariam subeunte uena, per transversos ceruicis uertebRARUM processus sursum attolitur, atque simul per idem foramen cum iam dicta uena in caluariam mergitur. Cæterum secunda & tertia, ramis soporalis arteriæ censebantur.^u Vnus, quem uenæ coniunctum per foramen nerui sextiparis cerebri caluariam ingredi, atque^x propaginem ad anteriorem ceruicis uertebRARUM sedem deriuare dictum est.^y Alter uerò, qui commemorato nuper ramo amplior apparens, absque uena comite per^z proprium sibi foramen caluariam petit. Atque huiusmodi ferè arteriarum uenarum que in altero tantum latere caluariam subeuntium est numerus: qua autem ratione & serie inuicem committantur & coeant, rursus que dirimantur, ac uariè in cerebri membranas excurrant, hîc enitar persequi, id ante omnia monens, nullam prorsus uenam aut arteriam in cerebri^a substantiam ad eum modum intexi, quo pulmonibus, lienî, iecori, & plerisque etiam musculis eiusmodi uasa implicari nouimus. Nam uasa cerebri membranis duntaxat contenta, passim cerebro accumbunt, uix que ullibi ipsius substantiæ adnascuntur, quemadmodum in sermonis progressu audietur diffusius.^c Dura igitur cerebri membrana ubi quadam ipsius^d portione inter dextram et sinistram cerebri partem consistit, ac deinde ubi inter cerebrum & cerebellum implicatur, penitusque uelut septum quoddam subintrat, si nus quosdam exigit uenarum modo oblongos, & uenis caluariam petentibus capaciores: sed interim uenarum modo neutiquam teretes existunt. Verùm horum sinuum cavitates secundum ipsorum ductus longitudinè insinuata, trianguli speciem exprimit: non quidem cuiusuis, sed quibus costis longitudine paribus, & instar quartæ partis circuli incuruatis constat. Neque rursus trianguli costarum obliquitas seu incuruatio, in omnibus sinibus eadem existit. nam hæc (uti postea audieturus es latius) alicubi trianguli imaginem refert, cuius una costa extrorsum obliquatur, reliquis duabus introrsum flexis: alicubi uerò trianguli formæ cavitates hæc accedit, cuius tres costæ æqualiter introrsum obliquantur. Præsentibus sinus non solum uenarum usum, sed & arteriarum quoque præstant, quanquam id à Galeno cæteris que dissectionum professoribus haud animaduersum fuerit, quum illi hos sinus uenarum munere tantum fungi arbitrentur: neque sinus eos arteriarum ritu pulsare è uiuorum sectione, aut uulneratorum inspectione obseruauerint. Quinetiam ipsis non uidetur perspectum fuisse, in istos sinus & uenas & arterias pariter exhauriri, suamque quam amplexantur & continent materiam infundere: uenas quidem sanguinem crassorem, arterias uerò uitalem spiritum simul cum sanguine impetu per corpus diffusum. Præter istos sinus, in duræ membranæ implicationibus sinuatos, hæc^e alios quam plurimos obtinet: ex quibus (quemadmodum & nuper commemoratis)^h frequentes ductus in tenuem cerebri membranam, ac cum hac quoque in cerebri uentriculos excurrunt, qui omnes exactè teretes uenis similiter, cavitates exigunt. non tamen uniuersi parem animanti usum præbent, quum nonnulli uenarum pariter arteriarumque munere fungantur, alij uenarum duntaxat, alij arteriarum. Atque hæc ambo, cerebri membranæ inter reliquas corporis partes peculiaria, rara, & priuata sortiuntur, eandem nimirum cavitatē ductumue arteriæ & uenæ pariter munus obire, & interim ipsos in membranarum corporibus ductus seu sinus neque uenam, neque arteriam propriè censerî posse, uerum proprias quasdam implicationes, ac tales omnino fistulas sinusue, quales quis formaret, quando stylos crassiori cuiuspiam corio secundum ipsius crassitiem in longum, quasi uenarum sinus, extructurus impingeret. Quapropter horum sinuum, aut fistularum, aut cavitatum, aut uenarum, aut arteriarum si mauis seriem enarratu- ro, uariè nunc hac, nunc illa uoce, prout negotio accommodum uidebitur, uti, quid prohibebit? In uno itaque latere (par enim utriusque est ratio) sex caluariam subingredi diximus uenas, & tres arterias. acⁱ prima uena simul cum^k prima arteria, quæ per transversos ceruicis uertebRARUM ducuntur processus, deinde^l secunda uena, &^m secunda arteria omnes simul in unius duræ cerebri membranæⁿ sinus initium confluunt, qui ad earum quas modò retulimus uenarum & arteriarum in caluariam ingressum^o incipit: ad latus nimirum maximi in occipitis osse foraminis, quo dorsali medullæ uia præbetur: deinde & ad eminentiorem foraminis sedem, quod sexti paris neruorum cerebri gratia insculpitur. Sinus hic occipitis ossi semper attentus, secundum^p cerebelli descriptionem ex^q prioribus uersus exteriora oblique retrorsum sursumque conscendit, & ilico in progressu^r quartam assumit uenam, quam ab

Tres arteriæ ex altero latere caluariam subeuntes.

Cerebri substantiæ uenas non innasci, sed ipsius membranis implicari, ipsasque uenarum modo cauari.



UTERQUE triangulus tam superior quam inferior tribus costis quartæ circuli partis modo incuruatis constat 1, 2, 3 insignitis. Verum superior duo latera 1, 2 introrsum obliquata gerit, tertium autem 3 insignitum extrorsum. Inferior triangulus tria latera 1, 2, 3 notata introrsum incuruata exhibet.

Dura cerebri membranae sinuum usus. Lib. 9 de Admi. sectio.

Cuiusmodi cerebri membranarum sint sinus.

Venæ et arteriæ in primum duræ membranæ sinus exhaustæ, ipsiusque sinus series.

Primi & secundi sinus congressus.

Tertius sinus.

Quartus sinus.

quas


Cuiusmodi quatuor sinuum sint cauitates.

externa iugulari proprio foramine caluariam ingredi recensuimus. Præsens sinus hinc rursus retrorsum modicè que sursum instar quartæ circuli partis protenditur, quousque elatissimam cerebelli partem occipitis ossi contiguam attigerit. ⁵ Ibidem enim dextri lateris sinus cum sinistro coit, atque ex ambobus una communis cauitas efficitur. Iste amborum sinuum congressus occipitis ossi, quemadmodum & sinus ipsi contiguus est, non quidem ad amussim sub elatissima parte eius futuræ quam Δ assimilamus, uerùm multo ⁶ humilius, & propemodum in media regione consistit, quæ inter postremam foraminis, quo dorsalis medulla ducitur sedem, & dictæ modò futuræ uerticem habetur. Ex mutuo hoc amborum sinuum ⁷ congressu, alij duo exoriuntur sinus longitudine & cauitatis forma inuicem uariantes, quippe ⁸ unus longior est, & caluariæ semper quemadmodum prædicti duo contiguus, secundum capitis longitudinem antrorsum procedit. Ex eminentissima enim sede congressus dextri sinus & sinistri principium ducens, ⁹ sub elatissima futuræ Δ imitantis parte, & sub ea quæ secundum capitis longitudinē fertur, & deinde sub frontis ossis medio ille sinus protenditur usque ad ¹⁰ ossiū septum ab octauo capitis osse in caluariæ amplitudinem deducto. Quemadmodum uerò dexter & sinister sinus (nisi mauis illum primum, hunc uerò secundum nuncupare) inter cerebrum & cerebellum quæ hæc ossi proxima sunt, in dura cerebri membrana feruntur: ita quoque tertius sinus, quem priorem ex duorum primorum mutuo congressu enatum recensui, in ¹¹ ea duræ membranæ consistit sede, quæ dextram cerebri partem à sinistra dirimens, secundum totius capitis longitudinem est eminentissima, & caluariæ semper contermina. ¹² Alter uerò sinus ex communi duorum primorum sinuum congressu pronatus, & qui opportunè quartus constituetur, dissectionum professores, quantum coniector, latuit. Porrigitur autem ab anteriori sede communis primi secundique sinuum congressus recto tramite uersus priora cerebri, nusquam deorsum neque sursum uergens. Consistit enim in dura cerebri membrana, ¹³ ubi secundum cerebelli longitudinem id & cerebrum ad eas usque cerebri sedes ¹⁴ intercedit, quæ testium & clunium imaginī assimilamus. Quartus itaque sinus suo ductu cerebelli longitudinem, & duræ cerebri membranæ inter cerebellum & cerebrum implicationem haud excedit, dextræ & sinistræ cerebri partibus & cerebello æquè attiguus: ac proinde id sibi priuatum uendicat, quod sit breuissimus, & nusquam caluariæ contiguus. Præterea ipsius cauitas correspondet triangulo trium æqualium costarum, quæ omnes ex æquo introrsum curuantur. Infimam enim costam imprimit ¹⁵ extuberantior, ac (ut sic dicam) teres in cerebelli longitudine promi-

TRIANGULI species, cauitati quarti sinus correspondens.



TRIANGVLVS cauitati respondens primi, secundi, & tertij duræ membranæ sinuum.



duræ membranæ sinibus, & reliquis ipsius uasis seu ductibus, qui passim per alias membranæ sedes excurrunt, Natura caluariam insculpsit, ¹⁶ sinus quosdam efformans secundum semicirculi cauum incisos, qui duræ membranæ sinus ea parte qua caluariam spectant, ¹⁷ conuexos gibbosque excipiunt, ac admittunt, atque demum in causa sunt, quo minus membranæ sinus à caluaria comprimantur, ipsorum uel motus qui arteriarum modo fit impediatur. Verùm reliquæ duræ trium primorum sinuum costæ introrsum curuantur, in primo quidem sinu & secundo à cerebello & cerebro, in tertio autem sinu à dextra & sinistra cerebri partibus. Hæ enim perinde ac cerebellum quæ ipsis sinus accumbunt, obtusos & ueluti in quartam circuli partem extuberantes angulos efficiunt. Hactenus itaque quatuor in dura cerebri membrana sinus enumerati sunt, in quos primæ & secundæ & quartæ exhauriuntur uenæ, & primæ secundæque arteriæ. Quas uerò propagines, sinus hi deinceps in duram cerebri membranam & tenuem, ac demum ad cerebri uentriculos diffundant, subsequens modò sermo enarrabit. A primo & secundo duræ membranæ sinibus, in ¹⁸ uniuersam eius membranæ partem, qua cerebellum operitur, ¹⁹ uarij furculi deriuantur instar uenarum sinuati & sparsi. Ab his deinde furculis, & ipsis dextro inquam sinistroque sinibus, extra duram cerebri membranam ²⁰ ductus plurimi uenarum corpore donati propagantur, in tenuem quæ cerebellum ambit membranam, & eam quæ cerebrum quæ id cerebello innititur, implicat excurrentes. Porro à tertio sinu ²¹ permulti idemque ampli ductus utrinque ex lateribus propagantur, non quidem ulterius in duram cerebri membranam, uerùm in tenuem, quæ hæc dextram sinistramque cerebri partes secundum elatorem cerebri sedem amplexatur & continet. Præsentibus ductus, quemadmodum & alij paulo

Propagines à 1 & 2 sinibus enatæ.

Propagines à tertio.

antè

s M, N co-
eunt ad O,
aut 7 fi. lib.
7 ad R coit
sinus P, P
cum Q, Q;
t 3 fi. cap. 6
lib. 1 D.
u 3 fi. ca. 12
li. 1. k.
x O. 7 fi. li.
7. R.
y P, P. 1 fi.
lib. 7 C, C
2 fi. B, B. 7
fi. S.
z secun-
dum l, l, l fi.
4 ca. 12. li. 1
43 fi. ca. 12
lib. 1 n.
b 3 fi. lib. 7.
D, D.
c R. 7. fi. li.
7 T ab R.

d 7 fig. li. 7
O, O, O.
e eiusdem
fi. M, N.

f 8 fig. li. 7
medium R.
9 fi. C.

g 3 fig. li. 7.
A, A, & B,
B.

h 3 fi. ca. 12
li. 1 i, k. et
4 fi. l, l.
i 1 fig. lib. 7
C, C, C.

k 7 fig. li. 7
O, O. & 8
fig. V, V. 9
fi. P, Q, R.
l S, S.

m 8 fi. lib. 7
X, X.

n T, T. et fi.
2 li. 7. C, C.
D, D. fig. 3
E, E. unde
etiā tenuis
membrane
& cerebri
anfractuū
naturam pe-
tes.

antè commemorati, simulatq; tenuem membranam contingunt, numerosa admodum serie uarijs anfractibus per eam excurrunt dispergunturq;. Quauero id fiat ratione, quisq; ductuum sit numerus (quia multiplex is uisitur, raroq; eandem retinet seriem) hinc non enitar prolixius commemorare, quum id etiam ex cerebri anfractuuum instar tenuium intestinorum inuolutorum forma numeroq; pendeat. Præter hos ductus à tertio sinu numerosa profectò serie, in tenuem membranam dispersos, ° graciles aliquot surculi ex demissiori cauitatis tertij sinu sede, in eam duræ membranæ partem decliues propagantur, quæ dextram cerebri partem à sinistra interdiuidit. Deinde ex elatissima tertij sinu sede, ° tenues admodum portiunculae illis committuntur uenis, quæ ex uerticis cute in caluariam per ° exigua ipsis insculpta foramina procidunt. Verum quartus duræ membranæ sinus frequentes etiam educit propagines, pari quodammodo serie perpetuò pullulantes. Quum primùm enim hic sinus ad eas cerebri ° particulas, quas clunibus & testibus comparamus, pertingit, atq; iam ° ramulos quosdam exiles ex elatissima ipsius sede in eam quoq; duræ membranæ partem, quæ dextram sedem cerebri à sinistra determinat, ac dein ex lateribus in eam duræ membranæ sedem quæ cerebellū integit, in progressu obtulit, ex superiori ipsius regione ° propaginem educit cauitate uenis similimam, & quæ in humillimā dictæ iam duræ membranæ partis sedem secundum capitis longitudinem usque ad ° septum sinuum olfactus organorum perfertur, & in itinere ° surculos ex elatiori sua sede sursum in eandem duræ membranæ partem diffundit. Præter hanc notatu dignam propaginem, quartus sinus ex eadem sede qua illam deprompsit, utrinque secundum dextram & sinistram cerebri partem, ° unum edit ductum uenarum corpori similimum, qui ° calloso cerebri nobis uocando corpori proximè secundum capitis longitudinem propagatus, tenuiq; membrana suffultus, in progressu tenui membranæ ramulos aliquot communicat: ac dexter quidem ductus dextræ cerebri parti, sinister uero sinistræ exporrigitur. Quemadmodum uero quartus sinus ad utramq; cerebri partem nuper dictas deprompsit soboles, sic quoq; ab infima ipsius sede propter ipsius iuxta cerebri testes terminum, ° propagines distribuit in tenuem membranam quæ cerebellum amplectitur. Atq; earum propaginum nonnullæ retrorsum tensæ, superiorem cerebelli sedem perambulant. ° Nonnullæ uero per humiles cerebri anfractus, qui iuxta cerebri testes consistunt, etiam ad anteriores cerebri uentriculos repunt, plexui quem illic haberi docebimus cōmiscendæ. Cæterum præter has quarti sinus propagines ductus ue, is ° aliā insignem & amplam educit propaginem, quæ ex ipsius ad cerebri testes extremo recto tramite antrorsum uersus cerebri uentriculos excurrit, ° plexum efformatura quem à secundarum seu extimi fetus inuolucris forma, Græci χοροειδῆ nuncupant. Hæc namq; propago simulatq; è quarto sinu prodit, aut ubi ipse sinus in hanc propaginem degenerat, illa præter proprium ipsius corpus à tenui membrana processus quosdam seu membranulas exigat, quæ ipsi obuolutæ tutò illius ramos atq; implexus colligant, ac suspensos aptè suffulciunt. Simplex namq; & absque coniuge ex quarto sinu enascitur, ° testium medio supertensa: quod ubi attingit, uelut in ° multos discinditur surculos, qui unius retis instar inuicem dirimuntur & coeunt. Hæc propago ° glan dulam cerebri testibus innixam, quæ à nucis pineæ seu turbinis forma κωνοειδῆς & κωνοειδὸς Græcis uocatur, transcendit, ac sub ° ea cerebri particula prorepit, quæ à cameræ aut testudinis specie κελυφοειδῆς Græcis nuncupatur. Quum uero propago, sub illa cerebri prorepens particula, ad anteriorem usq; communis dextri & sinistri uentriculorum cerebri cauitatis, anteriorem ue tertij cerebri uentriculi sedem ° pertingit, bipartitò scinditur, ° unam partem dextro offerens uentriculo, ° alteram sinistro. Cæterum quo nam modo partes hæ retis semper forma quasi contextæ, & membranulis ipsis adnatis contentæ, ° arterijs eodem pertinentibus commisceantur, opportunè subiungā, ubi arterias sermone in illos quoq; uentriculos deduxero. At arbitrabitur fortassis quispiam, in hac duræ membranæ sinuum enarratione aliquid à me prætermisum, quod mentio nulla adhuc illius regionis inciderit, quam procul dubio à torculari κινῶν Græci uocauere. Hanc sanè non præterissem, si modo certò quæ nam pars ita appellata fuerit, mihi constitisset. quippe aliquam sinuum sedem ita nuncupatam fuisse non ambigo: sed apud Galenum non constat, an ° communem primi secundiq; duræ membranæ sinuum congressum, à quo & tertius & quartus prodeunt, ita primùm Græci appellauerint: num uero quarti duræ membranæ sinus ° terminum cerebri testes respicientem, atque in uentriculos exporrectum, uidetur namque Galenus modò huic, modò illi parti torcularis nomen accommodare: uti sanè utramque torcular dici nihil obstat. Concurfus enim ille in quartum & tertium sinum, sanguinem tanquam uinum è torculari promit. perinde ac terminus quarti sinus in omnes quas emittit propagines sanguinem dispensat: adeò per me licebit, quamuis sinuum sedem torcular appellare, ac in illis regionem constituere in qua Arabes sanguinem extra uenas consistere

Propagines
à quarto.

Processus à
quarto sinu
cerebri petēs uē
triculos.

Quid cerebri
torcular.

m puta-

o V, V. 3. fi.
lib. 7 H, H.
p X, X. 1. fi.
lib. 7 F, F.
q 4. fi. cap.
12 lib. 1. fi.
r 7 fi. lib. 7
M, N.
s X, X. dein
4, 4.
tb. 3 fig. lib.
7 F.
u 12 fig. lib.
7 G.
x c, c, c. 3. fi.
lib. 7 G, G.
y d, e. 3. fig.
lib. 7 I, I.
z 3 fig. lib.
7 L, L.

af.
b h. 8 fi. li. 7
S, S.

c g commi-
scendū cum
7. 8 fig. li. 7.
T cōmiscen-
dum cū G.
d 1, 3 fi. li. 7
K, 6 fi. G. 7
fig. V.

e A.
f 7 fig. lib. 7
M, M. 10 fi.
E, G.

gi uersus h
6 fi. lib. 7 H
uersus I.
h 7 fig. lib.
7 L.

i 6 fi. li. 7 A.
A, A. atq; e-
ius figuræ
ex 5 fi. cha-
racterū in-
dicē expen-
dito.

kk. 6 fi. lib.
7 I.

ll. 6 fig. lib.
7 K.

m m. 6 fig.
lib. 7 L.

n y oblique
uersus a fer-
tur. 6, 7, 8
fi. li. 7 F, G.

o O. 7 figu.
lib. 7 R.

p ante i. 7
fig. lib. 7 an-
te V.

*Tertia calua-
ria petentis ue-
nae series.*

*Quinta ac
sexta uenarū
series.*

*Tertia arte-
riae series.*

*Plexus in pri-
oribus cerebri
uentriculis co-
stituitur.*

*Quis Galeni
reticularis sit
plexus.*

putarunt, modò sinuum ac cerebri uasorum seriem non perturbes: quorum quia iam primæ, secundæ & quartæ uenarum, & item duarum primarum arteriarum distributionem exequutus sum, modò proximum est, tertiæ uenæ & arteriæ diuarcationem subnectere.^a Tertia igitur uena, quæ minor est internæ iugularis portio, simulatq; ramulum per foramen ipsi & neruulo cuidam quinti paris commune ad auditus organū transmissit, caluariam ingreditur, ac duram contingens cerebri membranam, in sinum uenæ prorsus modo cauatam & prorepentem cessat, qui nullam arteriæ sobolem in suis ipsius cauitatem admittit, sed passim alium sinum sibi comitem asciscit, in quem arteriæ ramum exhauriri mox dicam.^v Præsens sinus in quem tertia absumitur uena, uarias soboles in totâ duræ membranæ sedem cerebri basi substratam diffundit, à quibus denuò ductus aliquot in tenuem cerebri membranam (ut à quatuor illis grãdioribus duræ membranæ sinibus) deducuntur. Inter cæteras autem huius sinus propagines per duram membranam excurrentes, una secundum cerebri latus sursum ad uerticem usq; cõtendit, uenæ modo in multam sobolem deriuata. Ad hanc quoq; speciem^a quinta uena per foramen secundi neruorum cerebri paris ingressa, dein & sexta per maius octaui ossis capitis foramē, quæ illi olfactus organa incumbunt, caluariam petens, in proximam sibi duræ membranæ sedem exhauriuntur. Harum utrarumq; & tertiæ uenarum sinibus (quia illi caluariæ perpetuò attenduntur) caluaria aptis^d cauitatibus cedit, quas ipsi elegantissimè insculptos primo libro recensuimus.

Tertia arteria peculiari transuersoq; foramine in caluariā ingressa, in duos graciles & totidem crassios dirimitur ramos.ⁱ Vnus gracilium, qui exterior est, tertiæ uenæ mox attenditur, & in duræ membranæ sinum exhauritur, illi undiq; attensum & commissum, in quem tertiam uenā absumi diximus.^s Alter gracilium ramus, qui interior humiliorq; uisitur, per proprium & sibi duntaxat exsculptum foramen rectâ ductus, in narium amplitudinem procurrat, atq; in plures dissectus ramulos, unū nasi extremo offert. Verum^k duo grandes rami in dextro latere (quod nisi aliud subiunxero, de sinistro quoq; intelligendum est) non nihil inuicē deducti, & adhuc caluariæ instrati antrorsum prorepunt, & mox in unum denuò coeunt, & statim à congressu in duos impares ramos diuiduntur.^m Minor commune cum secundo neruorum pari foramē sibi uendicans, tandem cum uisorio neruo ad oculos prorepit, atq; internæ temporalium musculorum sedi surculos cōmunicat.^a Grandior autem ramus sursum conscendens, duram perforat membranā ad latus glandulæ cerebri pituitæ excipiētis. Quum primū uerò in duræ cerebri membranæ amplitudinē contendit, in duos denuò ramos partitur, ac horum^s unus multiplici sobole in tenuem membranā hīc cerebro obductam spargitur: alter uerò tenuis mēbranæ portiuncula concomitatus, in uarios surculos inuicē complicatos diffunditur, ac in cerebri anfractus tantisper ascendit, dum in humilimam dextri uentriculi sedem pertingat. Hinc in posteriora primū sursum ad postremam usq; eius uentriculi sedem fertur, in ascensuⁿ portiunculā propaginis cuiusdam assumens, quæ à quarto duræ membranæ sinu cerebri anfractibus inibi offertur. Quum uerò hic arteriæ ramus retis quasi modo implexus, posteriorem dextri uentriculi cerebri sedem superauit, secundum eius uentriculi ductum in anteriora porrigitur, donec ipsi altera pars eius propaginis misceatur, quam sub cerebri corpore fornicis aut camere modo extructo, à quarto duræ membranæ sinu huc pertingere dictum est. Ab hac itaq; arteria, & dextera eius propaginis parte plexus ille in dextro cerebri uentriculo constituitur, quem ab^z extimi factus inuolucris forma *χοροειδής* nuncupari scimus, id nomen etiam subinde tenui membranæ cerebri accommodantes. In sinistro cerebri uentriculo plexus ille constituitur, à sinistra soporariæ ramo, & eodem tendente altera parte eius propaginis, quam ad cerebri uentriculos à quarto sinu pertinere, superius scriptum reliquimus. De reticulari uerò Galeni plexu nihil hīc mentiedum duxi, quod iam cerebri uasorum seriem mihi perspectam esse haud dubitem. atq; ideo minus modò aliquid confingendum est, quod nouimus Galenum boum cerebri dissectione delusum, non hominis cerebrum, uti neq; ipsius uasa, sed boum recensuisse.^a Si enim tertiæ caluariæ petentis arteriæ seriem in homine examinaueris, illam, uti ego nunc enarraui, comperies: interdum tamen unicū obseruabis esse ramum, duos illos, quos aliquousq; protensos inuicem coire dixi. Cæterum si bouis arteriam indagaueris, duramq; cerebri membranam iuxta glandis pituitæ cerebri excipientis latera diuiseris, aliquid Galeni reticulari plexui simile comperies, neque amplius hæc mea paradoxa admiraberis, quum ea homini, ut Galeni descriptio aliqua ex parte boui, cōueniat. Verum hæc ad septimum spectant librum, qui principis animæ sedi consecrandus, horum uasorum dissecandi rationem lucidissimè persequetur.

7 K. eductum ab H & I re-
pentibus sub A, A. 730 fi.
lib. 5 F, K, Q. a Examina-
bis hīc 16 figuram libri 7.

PRIMA DECIMIQUINTI
CAPITIS FIGURA.



PRIMAE DECIMIQUINTI CAPITIS FIGURAE
eiusdemq; characterum Index.

PRIMA figura exhibetur nudæ & ab omnibus partibus liberæ uenæ arteriosæ delineatio: cuius orificium apertum finxi, ut tres membranæ sanguinem è pulmonibus dilatato corde
1, 2, 3. in dextrum ipsius sinum regurgitare prohibentes, in conspectum uenirent. notantur autem illæ
notis 1, 2, 3.

A Sedes, qua arterialis uena ex cordis dextro sinu originem ducit.

B Interior arterialis uenæ tunica, quintuplo propria uenæ tunica crassior.


C Exterior uenæ arterialis tunica, peculiari respondens uenarum tunica.

D Arterialis uenæ caudicis in duos truncos diuisio. ac *E* quidem dextrum truncum indicat, mul-

E, F. triplici sobole dextris pulmonum sedibus distributum. *F* uero dextrum indicat truncum. *G* &

G, G. *G* autem insignitur arterialis uenæ per pulmonum substantiam series.

SECUNDA DECIMIQUINTI
CAPITIS FIGURA.



SECUNDAE PRÆSENTIS CAPITIS FIGURAE,
eiusdemq; characterum Index.

HÆC figura nudæ omnibusq; partibus liberæ uenalis arteriæ delineationem proponit, ipsiusq; characteres ita se habent.

m 2 H Venalis

H Vēnalis arteriæ à corde pronascens initium. Huius uasis orificij membranæ quia in corde consistunt, hic simul cum uase, ut in arteriali uena, exprimi nequierunt.

I Indicatur crassities simplicis arteriæ uenalis tunica.

K, L Prima uenalis arteriæ diuissio, simul cum ipsius ortu facta.

M, M &c. Series uenalis arteriæ per pulmonum substantiam innumeris propaginibus facta.

*V*as in arteriarum uenarumq; sermone adhuc reliqua.



ELIQUA adhuc in uenarum arteriarumq; sermone sunt duo uasa, quæ singula duabus uocibus à dissectionum proceribus explicantur: ac unū quidem uenam arterialem, alterum uerò arteriā uenalem appellant, nomen nimirum ab usu, & appendicem à corporea substantia indentes. Vena itaq; arteriosa uas dicitur, ex elatiori sede dextri cordis uentriculi in pulmones numerosissima ramorum serie digestum, sanguinemque in eo cordis uentriculo elaboratum pulmonibus subministrans. Atq; hoc uas

non uenæ, sed arteriæ constat corpore: unde etiam quia sanguinem uenarum modo defert, uenæ nomen obtinuit. quod uerò arteriarum tunicis conformetur appendix iste, arteriosa illi adijcitur. Porro alterum uas à sinistro latere basis sinistri cordis uentriculi egressum, sparsa etiā sobole in pulmones diffunditur, ac aërem ex pulmonibus in sinistrum cordis uentriculum deferendo potissimum famulatur, & interim uenarum corpore constituitur. Vnde quia aëris deductui subministrat, spiritaleq; organum est, arteria appellatur, à substantia autem & conformatione uenalis dicitur. Atq; ita secundum corpoream substantiam, uas quod ex dextro cordis sinu pronascitur, arteria est: quod autem ex sinistro, uena. Contrà usus ratione, uas ex sinistro sinu prodiens, arteria censetur: ex dextro autem, uena. Cæterum quæ uenarū arteriarumq; corporea sit substantia, duobus primis huius libri Capitibus perstrinxi. Quamobrē uerò hæc uasa & ortu & usu ac substantiæ conformatione à uena arteriaq; discrepent, deinde cuiusmodi membranæ ipsorum orificijs præficiantur, in sexto libro qui uitalis animæ partibus dedicabitur, exequar. Nobis uerò præsentī libro finem imponentibus, nemini mirum uideri debet, prolixum Caput hīc nō subnecti, quod uenas citra arteriæ consortium in corpus diffusas, item arterias citra uenæ consortium recenseret. Quandoquidem si quis earum desideret (uti sanè debent omnes) enumerationem, ilico hanc ex uenarum & arteriarum tabulis, cum has mutuò conferet, spectabit. Integræ enim magnæ arteriæ delineationi, nuda uenæ cauæ effigies proportionē respondet, ambasq; in eandem circumferentiā digestissimus. Cæterum quo minus hac in parte meam operam quis requirat, ad præsentis Capituli adeo que totius libri finem, meæ Epitomes tabulam impono, qua uenas & item arterias meo Marte sum conatus exprimere. Hæc enim quum & arterias simul cum uenis complectatur, etiam lucidissimè commonstrat, quæ nā uena citra arteriæ consortium, & quæ rursus arteria absq; uena coniuge per corpus digerantur. Verum quum uenæ cauæ ramorum seriem in præsentis libri contextu prosequer, non semel sanè ad uenæ sectionis tractationem sermo lubens prorupisset, modò uenam huic illiue parti uicinior, modò remotior, eamq; aut grandem aut exilē, & secundum rectitudinē undecunq; hæc petatur, fibrarumq; consensum huic aut illi parti correspondentē, enarraturus: & non uulgariter admoniturus, sanguinem ē secta uena fluentem, in totius uenæ corpore complecti: ideoq; non partium uenis accumbentium situm, sed uenarum ductum atq; distributionem in illa quæ omnibus in ore est, rectitudine animaduertendam: itaq; de uenæ sectione agendum, atq; de utero quopiam, qui hinc inde uarios processus educeret, & interim unicus continuusq; esset. At semper quantumuis inuitus sermonē cohibui, quum ex uenæ distributionis enarratione, adeoq; ex uenarum effigie cuius (qui modò tres euacuationis species, & præsentis, aut eminentis affectus naturam minimè ignoret) futurum sit longè facillimum, dignoscere quæ nā uena huic illiue membro propinquior sit, quæq; amplior aut gracilior: deinde quæ leui aut difficili opera diuidi possit: postremo, quæ fibras & rectitudinem cum laborantis membri uenis participet.

- iori figura portione, notauimus.
- h* Portiuncula exterioris rami dictae antea diuisionis ad reliquum accedens interioris rami.
- i* Reliquum interioris rami per pubis ossis foramen in musculos anteriorem femoris sedem occupantes distributum.
- k* Sedes qua soboles dicti reliqui alteri uenae commiscetur. Verum hic ex tabula promptè animaduertis, quando & arteriae subaudiendum est, quum scilicet uenae arteriam attendi cernis.
- l* Exterioris rami propago, abdominis inferiorem sedem ad umbilicum usque perrepens.
- m, m* Vena per femoris & tibiae interiora sub cute ad digitos usque pedis distributa, & in progressu uarios edens furculos.
- n* Coxendicis anteriora petens, sub cute tamen.
- o* Musculos et cutem femoris exteriorem sedem occupantes intertextens.
- p* Musculis anteriorem sedem femoris occupantibus digesta.
- q* Dicta modo uenae congressus cum ea quae per pubis ossis foramen femur adit.

- r* Haec praecipua femur petens uena secundum femoris os reflectitur.
- s, t* Propagines musculos posteriorem femoris sedem occupantes, & cutem huius sedis ad suram usque accedentes.
- u* Diuisio in poplite, atque adeò rami in musculos à femoris capitibus hic pronascentes distributi.
- x* Maioris dictae diuisionis trunci uena, externam tibiae cutem ad summum usque pedem implicans.
- y* Vena & arteria, quauquam id non additum oportuit, sibi uel ex porrecta, ac inter musculos latitas.
- a* Maioris dictae diuisionis trunci ramus, cutem internam tibiae sedem integrentem, ad digitos usque uariè subiens.
- β* Ramus dicti trunci suram ad calcem usque petens.
- γ* Propago grandioris trunci inter musculos tibiae anteriorem sedem occupantes, ad pedis usque superiora & digitos digesta.
- δ* Trunci grandioris reliquum inter musculos posterioriorem tibiae sedem sibi uendicantes deorsum repens, & inter tibiae & calcem pedem subiens, ramulos digitorum inferiori sedi communicans.



QVONIAM magna figura cum ipsi an-
nexis partibus uiri uenas ac arterias omnes propo-
nit, lectori me non incommodaturum duxi, si mulie-
brium uasorum tantam seriem proponerem, quanta
à uirilibus uasis illa differt. Quod duntaxat in se-
minalium uasorum ad testes ductu perficitur, &

- uenis arterijsque uterum implicantibus, quae omnia
praesenti figura simul cum muliebri uesica propo-
nuntur: ipseque characterum index est eiusmodi.
- θ* Ramuli a uena & arteria in membranam excurren-
tes, quae peritonaeo committuntur.
- ι* Portio uenae & arteriae testem aduentum, superio-
riorem fundi uteri sedem petens.
- κ* Commixtio uenae & arteriae seminalium, quae in-
stat pyramidis est, & uaricibus a sinulatur.
- λ* Testis sinister.
- μ, μ* Vas semen à testis in uterum deferens.
- ν* Obusus uteri fundi angulus, in quem uas semen de-
ferens insertionem molitur.
- ξ* Hac sede fundus uteri in ceruicem terminatur,
hacque regione ipsius consistit orificium.
- ο, ο* Uteri ceruix.
- ς* Hic uesicae ceruix in uteri ceruicem produciuntur
ac desinit.
- ς* Vasa sunt inferiorem uteri fundi sedem & cerui-
cem implicantia.
- τ, τ* Ceruicis uteri oris colliculi.
- υ, υ* Meatus urinam è renibus in uesicam deducentes.

CHARTA PARVAS ALIQVOT FIGVRAS COM
PLECTENS, QVÆ FIGVRÆ AD COMMONSTRANDAM VE
narum arteriarumq; simul commissarum seriem paratæ, ac in pagina m 3, aut numero 313 insignita obuia,
ueniunt agglutinandæ.

PRIMA.

TERTIA.

SEXTA.

VT figuras hac
charta impressas commo
dè suis sedibus glutines,
illæq; validiores reddan
tur, primum præsentem
chartæ membranam sub
glutinabis, singulasq; fi
guras à superflua papy
ro rescabis. PRI
MA, quæ uenæ pa
ri carentis distributio
nem proponit, magnæ fi
guræ tergo illic uenit cõ
mittenda, ubi caua cau
dex eam uenam promit.

ac o in utrisque figuris
scripti spectatur. SE
CVNDA, ubi à
redundanti papyro cir
cuncisa erit, duas partes
constituet, quarum supe
rior uenam arteriam que
dextri lateris exprimit,
sub pectoris osse superio
rem abdominis sedem pe
tentes. Huius itaq; par
tis q ad magnæ figuræ
q figetur, & * ad ra
mum qui ad dextrum la
tus & m in magna
figura occurrit. Cate
rum humilior pars uenæ
arteriamq; exprimens,
quæ inferiorem abdomi
nis sedem implicant, illic
est iungenda, ubi earum
radices iuxta l in dex
tro latere spectantur.


TERTIA
cæteris dignior, uenæ
portæ distributionem si
mul cū arterijs illam con
comitantibus, magnæ que
inferioris membranæ o
menti portione & liene
pariter exprimens, ad ca
uam iecoris sedem maiori
figuræ neclitur, ubi
p, s, & contermini ali
quot characteres in utris
que figuris spectantur.

QVARTA
portionem gibbæ sedis ie
coris proponens, nō inu
tiliter uelut ex puncto il
lic glutinabitur, ubi A
inter s & F maioris
figuræ consistit.

QVINTA
præter testes ipsorumq;
inuolucra, & urinarios
meatus, uenas arteriasq;
seminales ostendens, illic
est committenda, ubi n in
ambabus figuris obuium
est, aut ubi uena seminalis arteriæ primū iungitur, meatusq; urinarij illis subiiciuntur.

SEXTA primum sub SEPTIMA uenit glutinanda. Septima enim uesicæ & penis anteriorem sedem proponit, unā cum ua
sis quæ umbilico ascribimus. Sexta autem humiliorem penis superficiem in hoc expressimus, ut tota figura ex ambabus illis consurgēs, caractere φ
super quintæ figuræ φ necliqueat, ac postmodum penis instar S implicari.


OCTAVA figura mulieris uesicam & umbilici uasa, urinariorumq; meatuum portionem continens, maiori non est committenda, sed illi fi
guræ quæ in chartæ tergo ubi maior impressa est, utrum ipsius, uenas & arterias seminariaq; uasa commonstrat. Iungetur itaq; octaua ad paruam
illum figuram ubi n occurrit, uenæq; seminalis arteriæ committitur: nexus uerò fiet urinarijs tantum meatibus, proportionē a uesicæ situ sumpta.



SECUNDA.



QVARTA.

SEPTIMA.



QVINTA.

OCTAVA



ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO- RIS FABRICA LIBER QVARTVS, NERVIS PROPRIVS,

4
315

ac peculiare ipsi figuras in Capiti quibus conue-
niunt fronte exhibens.

QVIBVS CORPORIS PARTIBVS NER

ui nomen tribuatur, ac quis proprie nervus uocetur, & demum quid is sit,
unâ cum ipsius differentia & usu. Caput I.



a fi. ca. 1. li.
2.

b 1. fi. cap. 2
lib. 2 F. &
passum in
musculorū
tabulis.
c passum in
1, 2 fi. ca. 2.
et 2, 3 fi. ca.
pit. 11.

d 6 fi. lib. 6.
h ad disse-
ctum.

e eiusd. fig.
f. g.
f. eiusd. fig. 1.

ERTIO libro uenarum, sanguinem à iecore in uni-
uersum corpus deferentium, & arteriarum quæ uita-
lem spiritum simul cum sanguine impetu diffuso à cor-
de corporis partibus subministrant, distributionis se-
riem complexus sum. nunc uerò proximum est, neruo-
rum à cerebro animalem spiritum membris, qui illo
ad ipsorum munia indigent, deducendum propagatio-
nem persequi, à generali neruorum differentia sum-
pto sermonis exordio. Dissectionis enim proceres
triplicem neruorum differentiam (uti & antea alicubi
monuimus) statuunt, quandoquidem^a ligamenti ossa
mutuò colligantibus, et non minimam musculorū por-
tionem constituentibus, nerui nomen, perinde ac uul-
gus, accommodant. Dein^b tendines, & uniuersas mu-

Ligamenta,
tendines et pro-
cessus cerebri
dorsalisq; me-
dullæ, nervos
generatim uo-
cari.

Organū mer-
ui nomine pri-
uatim nuncu-
patum.

Neruorū or-
tus à cerebro.

Nō à corde.

sculorum eneruationes, sub neruorum nomine, uulgi quoque ritu, complectuntur. Tertium
autem neruorum genus enumerant, quod nos in præsentia aggrediendum duximus. ^c organa
uidelicet longa, teretia, nullamq; intus cauitatem, quæ sensu dignosci queat, in sui medio forti-
ta, & caluariam uel dorsi uertebras elabentia, ac demum animalem spiritum à cerebro anima-
lis facultatis fomite ad corporis partes deferentia. Atque hæc organa dissectionum professores
nerui nomine citra appendicem præcipue dignantur. Quod à Græcis ad nos demanauit, qui à
functione seu munere unicum instrumentum duobus nominibus nuncuparunt, ^d *ὀστέον* id est *ὀστέον*,
& *τόνον* à *τένειν* appellantes, quod uidelicet musculi neruorum potissimum ope & nutare & ten-
dere ualeant, quippe quod nulla corporis particula neque motum arbitrarium, & qui è nostra
pendet uoluntate, neque sensum sine neruo nanciscatur, ac quod neruo præciso, aut laqueis in-
tercepto, aut alioquin corrupto compresso ue immobilis confestim insensibilisq; pars euadat,
omnibus concessum est Anatomes professoribus. Quod autem cerebrum neruorum, sicut
& dorsalis medullæ, origo ac principium sit, quod que nerui partim ex cerebro, partim à
dorsali medulla oriantur, minime omnibus notum exploratumq; fuit. Alij enim cor neruorum
posuerunt principium, nonnulli duram quæ cerebrum inuestit membranam, nullus interim ie-
cur, aut aliud eius generis uiscus. Verum Hippocrates, & quū iam senio conficeretur Erasistra-
tus, Lycus, Andreas, Marinus, Herophilus, & Galenus dissectionis procerum facile prima-
rius, cæteri q; Anatomicorum præcipui, ex his quæ in corporum resectione conspiciuntur, ue-
rissimè asserunt, cerebrum neruorum esse initium: & præterea nervos ab illo spiritum anima-
lem assumere, atque ad eas partes quæ illo aut ad sensum aliquem, aut motum arbitrarium in-
digent, deriuare, est quoque fatendum. A corde enim nervos (ut Aristoteli potissimum, &
alijs nō paucis uisum est) neutiquam principiū ducere, uel hinc liquidò colligitur, quod in cor-
poris dissectione nullus neruus ab illo pronasci uideatur. Quandoquidem nullus omnino ner-
uulus cordi committitur, præter^e unum impensè gracilem, ac uix tandem post multas sectiones
à me inuentum, quem sinister sexti paris neruorum cerebri neruus distribuere suo loco docebi-
tur. Quà enim neruus ille secundum sinistrum cordis latus decliuis fertur, atque sinistra pul-
monis parti, ac item cordis inuolucro ramusculos prætenues offert, ^f neruumq; recurrentem
sinistrum cōstituit, à se neruulum deducit, qui illic cordis inuolucrum penetrat, ubi ^g sinistra ar-
terialis uenæ sedi adnascitur. Neruulus hic arteriali uenæ adnatus, in cordis basim fertur, inibi
absumptus, ubi sinistra posteriorq; arterialis uenæ sedes consistit. Quum itaq; huiusmodi ner-

m 4 uulus

uulus perinde cordi à sexto cerebri neruorum pari exhibeatur, quemadmodum reliquis uisceribus uniuersis offerri docebimus: ac deinde quum cordis neruulus maximè gracilis sit, promptè colligitur, cor ne sinistro quidem sexti paris neruorum cerebri neruo principium dare. tantum abest, quòd cæterorum neruorum origo neruulus ille iudicari possit. Præterea fibræ quas cordis substantiæ intertextas nouimus, non magis nerui sunt, quàm aliorum organorum, puta uentriculi, intestinorum, uenarum ac arteriarum fibræ. Ad hæc, ⁸ fibræ in cordis sinibus uentriculis ue conspicuæ excarnes que, quia duntaxat membranarum processus sunt, in neruorum numero etiam minimè ueniunt reponendæ. Nam fibræ in dextro cordis uentriculo se offerentes, trium membranarum processus censentur, uenæ cauæ orificio præfectarum. Fibræ autem in sinistro cordis uentriculo apparentes, processuli sunt duarum membranarum, quas arteriæ uenalis orificium sibi peculiare uendicat. Præterea eiusmodi fibræ nō magis nerui existunt, quàm omnium generatim membranarū partes, quas quidem nerui nomine uulgi more donari nihil prohibet, si modò id ad ligamenta, tendines, membranas & neruos, de quibus iam sermonem instituimus, deducitur. Verum quum eiusmodi cordis fibræ neutiquam in eorum neruorum classē referendæ sint, qui animalem spiritum tanquam riuuli quidam ad corporis partes perferunt, annuendum quoque est, fibrarum illarum gratia in corde neruos recenseri haud posse, potissimum quando ab illis membranarum processibus extra cordis substantiam nihil prorsus aliò educatur. Cæterum qui ex ^h dura crassâ ue cerebri membrana neruorum originem pendere affirmarunt (in quorum choro ad extremum usque senium fuit Erasistratus) exteriorem nerui partem duntaxat conspexere à dura cerebri membrana enatam. Vniuscuiusque enim nerui natura ⁱ triplici constat substantia, nimirum media quadam & intima arborum medullæ quàm similima, quæ haud dubiè à cerebro initium ducit, constipata & coagulata indurata que cerebri substantiæ omnino respondens. exterioribus duabus, una eadem que intima substantiæ propinquiore, quàm à ^k tenui membrana cerebri: altera, quam à dura oriri compertum habemus. Dura enim crassâ ue cerebri mebrana operiendi potissimum occasione facta censetur: mollis autem, ut eodem etiam fungeretur munere, sed magis tamen ut omnia quæ cerebro continentur uascula & receptacula, arterias scilicet & uenas tutò colligaret. Quemadmodum itaque cerebrum his induitur, sic quoque processus à cerebro propagati (ipsi nimirum nerui) illis integuntur, atque ita per corporis partes prorepunt. Adeò sanè ut nemo suis oculis fidem non derogans, inficiari possit, neruorum principium à cerebro pendere: ac proinde etiam uix ambigere licet, num neruis à cerebro, an uerò à corde animalis spiritus, quem partibus deducunt, influat. Quandoquidem nonnulli (ut inter cæteros Chrysippus) etiam si cerebrum neruorum darent esse principium, non tamen id neruis sensus motusq; arbitrarij principium statuebant. Quos profectò uiua sectio plus satis redarguit, in qua omnia à corde ad cerebrum pertinentia colliduntur, aut laqueis intercipiuntur, aut etiam præsecantur. Hæc nanque si debite administraretur, uti in publicis sectionibus non semel à me tentatum est, edocebit sanè quantum cordis munere, hoc est uitali spiritu, cerebrum indigeat: non minus scilicet quàm cor illum quem inspiramus aërem, & iecoris sanguinem ad sua officia exigit. Deinde ea sectio ostendet cor neruis nō magis animalē spiritum porrigere, quàm uitalē spiritū cordi à iecore deduci cognoscimus. Verum quia huiusmodi disceptatio ad cordis cerebriq; historiā potius quàm ad neruorum naturam spectat, hac modò postposita, neruorum propriè dictorum differentias aggrediemur. Quemadmodum igitur cerebri & ex ipso pronascentis medullæ dorsalis substantia, omni ex parte non eandem seruat duritiem, neque formam: ita quoque nerui ab his originem sumentes, inuicem substantia non correspondent, sed duritiæ ac mollietis plurimum uariant. Atque id accidit aut occasione substantiæ sui, à quo nerui prodeunt, principij. Huius enim gratia ^m uisoriij nerui, perinde ac ⁿ linguæ insigniter molles censentur: qui autem à dorsali medulla, ^o ubi hæc in sacro ossē consistit, originem sortiuntur, durissimi sunt. Deinde aut propter longiorem uel succinctiorem progressum, nerui aut molliores aut duriores comperiuntur. uisus nanque, gustus, & auditus ^p nerui molles sunt, quòd breuissimo prorepant interuallo. Gratia itineris uerò, uia que anfractuū occasione tertij neruorum cerebri paris ^q ramus uitis, aut cucurbitæ capreoli instar inuolutus durior euadit. Præterea nerui per durum aut molle, aut siccum corpus transitus, eius ue corporis contactus, illum molliorem uel duriorē efficit. Visorius etenim neruus breuissimo ductu per ^r foramen in ossē cælatum fertur, quemadmodum & ^s præcipua quoque tertij neruorum cerebri paris portio, quæ idcirco ex ossium contactu minimū induratur. At quinti neruorum paris ^t surculus, qui ^u cæcum illud tortuosum que foramen perreptat, & ^x unus tertij paris neruorum cerebri ramulus

Neruos non
ē dura cerebri
membrana ori
ri.
Quibus parti
bus neruus
constet.

Vnde neruis
spiritus anima
lis præbeatur.

Neruorum
differentia, à
mollietie & du
ritie, quarum
gratia multa
oriuntur ner
uorū differen
tia.

87 fi. lib. 6
sub K, K,
M. & 9 fig.
G, G sub E,
F.

h1 fig. lib. 7
A, A, B, B.
2 fi. H, H.

i 17 fi. cap.
14 lib. 7 &
A, &

k2 fig. lib. 7
E, E, 3 fi. O,
O.

illa simul
omnia pul
chre osten
dit ult. fig. 3
lib. in collo.

mi, 2 fi. ca.
2 G.

n eandem
fi. M.

o 1 fi. ca. 12
ab F ad G.

p 1, 2 fi. ca.
2 G, M, a.

q 2 fig. cap.
2 R.

r 1, 3 fi. cap.
12. lib. 1. E.

s 1, 2 fi. cap.
2 M.

t 1, 2 fi. cap.
2 C.

u 2 fi. ca. 12
lib. 1 b.

x 2 fig. cap.
2 O.

ab ocu

yeius. fig. V
à T pronat-
tum.

2. fi. cap. 2
G. de in ab
M. Y.
2. fi. cap. 2
K. de in a r.

b Specta
manus 2 fi.
cap. 11.
c 14, 15 fi. li.
5 V, T.

d 2 fig. cap.
2 q.
e 2 fig. c ap.
2 X.
f 2 fi. ca. 2 n.
g 1, 2 fi. ca. 2
G, K.
h 1, 2 fi. ca.
2. M, Z, a.
i 2 fi. ca. 2 e.
v. atq; ita e-
tiam hic spe-
ctabis 9
14 fi. lib. 7
k Vide 1 fi.
cap. 11.

l 1, 2 fi. ca. 2
G. fi. 14. li.
7 B, B. 13 fi
gu. cap. 14.
lib. 7 k.

ab oculorum sede ad genas, ac^v alius item ad humiliter labrum procidentes, quia longo itinere per os incedunt, ossis contactus beneficio magis quam ipsorum principia indurefcunt. Pari quoque causa ob itineris lōgitudinem, & durarum membranarum contactum, omnes prope- modum nerui musculis exporrecti duriores fieri conspiciuntur, quam ubi primum à princi- pio prodeunt. Cuiusmodi omnia mirabili industria à rerum Opifice sunt excogitata. Sensus namq; organum neruo indiget molli: neruo quidem, quia sensus est instrumentum, quodq; ad suum munus obeundum multo animali spiritu indigeat: molli autem, quoniam affici & dispo- ni quodammodo oporteat, & pati aliquid ab extrinsecus occurrente sensibili. Est enim ad pa- tiendum quidem aptius molle, ad agendum uerò & ad robur (quo neruus in longo ductu in- diget) durum. Propterea igitur sensus organa mollibus, cæteræ partes quas moueri necessum est durioribus neruis donantur. Vnde etiam sensus instrumenta, quæ motu aguntur arbitra- rio, ut oculus & lingua, duplex neruorum genus sibi uendicant, ¹ unum quidem sensui, ² alte- rum uerò motui præfectum. Merito itaque neruorum ex cerebro & dorsali medulla proces- sus, non eandem exortus sedem nanciscuntur, neq; ijdem ductus meatusq; mollibus ac duris neruis exculpantur. Illi enim ex mollibus & anterioribus cerebri basis sedibus, hi uerò ex poste- rioribus ipsaq; dorsali medulla principium ducunt. Rursus illi quidem recta, hi autem tortuo- se longoq; itinere prorepunt. Cæterum Naturæ triplex fuit in neruosi generis distributione scopus. Primus gratia sensus in sensorijs organis: Secundus occasione motus ad partes, quas moueri operæ precium fuit: Tertius autem in cæteris partibus uniuersis ad tristantium digno- tionem, nisi fortè cuiusdam magis uisum sit, & tertium hunc scopum, quia ad sensum pertinet, eundem cum primo constituere. Sensus igitur nomine, oculis, linguæ, auribus maximi offe- runtur nerui, uti etiamⁿ internæ extremæ manus sedi, & elatiori orificio uentriculi, quæ uelut propria præcipuaq; tactus, sicut oculi uisus, & lingua gustus, organa non ineptè censerentur. Per manus enim magis exacta, quam per aliam partem, quamuis plures sentiant, est tactus ip- sius dignotio. In ore autem uentriculi sensus est penuriæ eorum quibus animal nutriendum est, quem famem nuncupamus. In omnibus enim ijs tanquam sensus instrumentis, maximi in- feruntur nerui. Motus uerò causa nerui ad musculos arbitrarij motus instrumenta dispensan- tur. Qui propterea quod corporis partib. mouendis extructi sunt, grandes neruos admittūt, aut saltem circumtenso habent. At quoniam ex necessitate tactus sensus omni adest neruo, propter hoc musculos & sensus organa uirtus amplior, quam egebant ad tactilium dignotio- nem, subsecuta est. Reliquis aut partibus tactus sensu tātum indigentibus ex proportionem ner- ui offeruntur. Visceribus enim, ut^d pulmonis, ^e iecori, ^f lienis, quia in alto latitant, graciles tantum neruorum surculi offeruntur. in cutem uerò, quod prima extrinsecus occurrantib. obuiam eat, complures soboles passim digeruntur. Porro neruorum originis species, non eadem undi- que uisitur. ^g aliqui enim, & præcipue molliores, continuo neque quasi in plures surculos dedu- cto corpore exoriuntur, proceduntq; in quorum numero uisoriij nerui, & secundum quoque cerebri neruorum par, habentur. ^h Alij tanquam plures funiculi inuicem connexi ex cerebro prodeunt, quales sunt tertij & quarti et quinti paris nerui. ⁱ Alij etiam in ipso ortu surculos hos ueluti funiculos inuicem distantes, ac singulos propria tenuis mēbranæ portione circumdatos habent: qui quū caluariam egrediuntur, omnes surculi inuicem commissi unica membrana in- duuntur, atq; id potissimum in^k pluribus dorsalis medullæ neruis obseruatur, ut & in sexto pa- ri, & septimo neruorum cerebri. Vnde etiam in multorum neruorum distributionis in ramos enarratione, nihil interesse uidetur, siue prædictorum funiculorum frequentiam solui dicas, an totum neruum in ramos ad diuersas partes exporrectos discindi. At nescio qua fronte qui- dam Anatomicorum principes asserere ausi fuerint, ex huiusmodi surculis seu funiculis, alios quidem motui, alios autem sensui seruire: haud secus sanè, quam si quosdam neruorum surcu- los tactus sensu Natura destituisset. Atque huiusmodi surculorum finiumq; imaginem for- mam ue discas, si inter edendum alicuius animalis ex axilla, aut inguine dissecta caro mensæ ap- ponatur, atque in illa nerui aliquam portiunculam uena & arteria plærunque concomitatam spectaueris. Cernes enim nerui extremum alicui chordæ crassiori respondere, quæ ex pluri- bus torta funiculis, transuersim obtusiori cultro diuisa sit. Cæterum à neruorum cauitate uix ullam ausim petere differentiam, quum ne^l uisoriū quidem neruum unquam cauum per- foratumq; uiderim. etiam si neruos non minus quam uenas & arterias, uasa uocari, haud dubitem, soli q; uisoriij nerui à dissectionum professoribus forati dicantur. Ab ipsa autem serie hunc in modum differentiam sumere licet, quod alij integri in aliquam partem absumantur, ut uisoriij nerui in oculos: alij in plures dirempti surculos, quosdā musculis offerunt, quosdam cu- ti,

Cur alij rē-
ui alijs mollio-
res, aut durio-
res reddantur

Natura in
neruis digerē-
dis scopus.

Differentia
ab originis
forma.

Neruum om-
nem tactus sen-
su præditū.

Differentia a
neruorum ca-
uitate.


A' serie.

ti, quosdam ossibus, quosdam sensus organo. Vt tertium neruorum par, quod quum lingua quodammodo sit proprium, etiam musculis quibusdam ut inter ceteros temporali motus gratia, & cuti sensus nomine, ad labra nimirum, & dentibus quoque dirigitur. Alij rursus incommixti, neque cum alijs neruis coeūtes uniti ue feruntur: ut secundum cerebri par nulli neruo commiscetur, & uerè congregitur, licet ipsi minor tertij paris radix in progressu attendatur. Alij uerò inter se commiscuntur, ut primi paris neruus dexter sinistro permiscetur. Alij alijs commiscuntur, ut qui brachium adeunt nerui, simulatq; e uertebis prosilierunt, non secus uniuntur, quàm pictores galerorum funiculos delineare solent. Verum quum hæc in priuatius neruorū descriptionibus abundè sim persequuturus, iam tempestiuū fuerit singulorum neruorum seriem oratione complecti. ac primū paria quæ à cerebro exoriuntur, deinceps quæ dorsalis medulla educit recensere. siquidem nullus neruus neq; à cerebro, neque à dorsali medulla inconiugatus prodit, sed perpetuò alter ad dextram, alter ad sinistram eadem prorsus distributionis serie, situm obtinet.

Neruos coniugatos enascis

m 2 fig. ca.
2. M.
n eius. fi. Y.
o eius. fi. R.
p 4. m. j. cu.
ta. r.
q 2. fi. ca. 2.
T, V, X.
r 1. 2. fi. ca.
2 K.
s 1, 2. fi. ca.
2 L.
t 1 fig. cap.
2 H.
u Vide hos
in 2, 3. fi. ca.
11. et ult. fi.
huius libri.


PRIOR DVARVM FIGVRA NOVEM SVBSEQUENTIBVS CAPITIBVS COMMVNIVM, QVA TOTIUS cerebri & cerebelli à membranis ipsa inuoluentibus liberorum basis exprimitur, ut neruorum cerebri exortus opportunè oculis subijceretur. Hic enim simul cum primis neruorum exortibus tota ea dorsalis medullæ pars delineata est, quæ ab eius medullæ principio ad eam usque sedem pertinet, quæ hæc in primam ceruicis uertebam labitur, ac ubi dorsalis medulla primum uerè nuncupatur.



DVARVM FIGV-

RARVM QVÆ NOVE
modo subsequentibus Capitibus
communes censentur, altera, quæ
dextrum latus proponit integri ce-
rebrum ac cerebelli, et dictæ in prio-
ri figura dorsalis medullæ partis,
dura interim tenuiq; hæc omnia
inuestiētibus membranis, nusquam
apparentibus. Adhæc præsens fi-
gura nudam septem cerebri ner-
uorum pariū seriem in dextro tan-
tum latere commonstrat. quan-
quam & ubi necessum fuit, neruo-
rum quorundam seriem etiam in si-
nistro latere hic delineauerimus.
Figuræ huius proportio in ea de-
picta est magnitudine, in qua cor-
pus circumscriberes, cuius uesica
in infima præsentis figuræ sede
consisteret, & cuius thorax &
abdomen ex anteriori parte con-
spicerentur, facies uerò uersus si-
nistrum humerum conuersa pror-
sus ex dextro latere spe-
claretur.

CHARA.



CHARACTERVM DVARVM NOVEN SVB

SEQUENTIBVS CAPITIBVS COMMVNIVM FIGV

rarum Index.

CHARACTERES hoc Indice exprimendi, partim utrisque figuris communes sunt, partim uerò nunc huic, nunc illi peculiare. quemadmodum his notis 1, 2, quas characteribus subiiciemus, significabitur.

- A, A_{1,2}* Cerebrum notatur. *B, B_{1,2}* Cerebellum.
- C_{1,2}* Processus ac ueluti substantiæ cerebri tubera, quæ mamillares processus uulgo nuncupantur. Ego in altero tantum latere prioris figuræ characterem adhibui, quod parem utriusque lateris rationem esse nemo ambigat.
- D₁* Dorsalis medullæ principium ex cerebri pendens basi.
- E_{1,2}* Dorsalis medullæ pars iam caluariæ amplitudinem egressura, & in utrisque figuris inibi ab truncata, ubi hæc elatissimam subit uertebam.
- F_{1,2}* Olfactus organo subseruientes processus neruis similes, at caluariæ amplitudinem qua cerebrum continetur, notatu digna portione non egredientes.
- G_{1,2}* Visorij nerui, seu primum cerebri neruorum par. Cæterum in prima figura sinistri nerui principium *G* insignitur, in altera autem dextri nerui in oculorum sede ductus.
- H₁* Visoriorum neruorum coitus.
- I_{1,2}* Oculi tunica, in quam uisorius neruus expanditur & degenerat.
- K_{1,2}* Secundum neruorum cerebri par.
- L_{1,2}* Tertij neruorum paris minor & gracilior duriorq; radix.
- M_{1,2}* Tertij paris maior crassiorue radix.
- N₂* Minoris radices propago ad superiorem maxillam procidens.
- P₂* Propago minoris tertij paris radices in narium degenerans tunicam, quæ humiliori *P* priuatim indicatur.
- Q₂* Minoris radices propago in temporalem musculum digesta.
- R₂* Maioris tertij paris radices ramus capreoli uitis instar conuolutus, qui in temporalem inseritur musculum, ac duos à quinto neruorum pari *a* signando, ramos *b* & *c* notandos admittens, in masseterem seu mansorium musculum, & buccarum musculos, & cutem quoque diffunditur.
- S₂* Maioris tertij paris radices ramus superiorum molarium dentium gingiuis, ipsiq; adeo dentibus soboles seriatim distribuens.
- T₂* Maioris radices tertij paris propago in maxillæ inferioris os prorepens.
- V₂* Propaginis *T* insignitæ ramus inferiori labro multiplici sobole oblatus.
- X, X₂* Surculi a propagine *T* notata ordinatim in dentium inferiorum radices diffusi.
- Y, Y₂* Maxima maioris tertij paris radices portio in tunicam linguæ soluta.
- Z_{1,2}* Quartum neruorum cerebri par. Verum humiliter *Z* in secunda figura palati tunicæ exprimit.
- a_{1,2}* Quintum neruorum par auditui dicatum. *Φ* autem in utraque figura priuatim huius paris portionem indicat, in concauitatem temporis ossis delatam.
- b_{1,2}* Ramulus quinti paris ex ipsius anteriori parte enatus.
- c_{1,2}* Quinti paris ramulus per cæcum repens foramen, ac tandem, ut & ramulus *b* insignitus, cum tertij paris propagine capreoli modo intorta, ac cum ramo *R* in secunda figura notato, coiens.
- d_{1,2}* Neruus non procul à quinti paris principio enatus, qui ab alijs Anatomes professoribus præteritus, in musculos maxillam inferiorem mouentes exporrigitur.
- e_{1,2}* Sextum neruorum cerebri par, cuius utrorumque neruorum series in secunda figura indicatur. est autem sinister neruus, qui umbrosus sub quinto pari quodammodo ducitur. Dexter autem magis candicat, & ipsi aliquot subsequentes characteres priuatim (quum utriusque lateris nerui eadem sit ratio) adhibitos cernis.
- f₂* Sexti paris ramus musculos posteriorem ceruicis sedem occupantes accedens.
- g₂* Sexti paris ramuli in quosdam laryngis musculos hic in descensu transuersim propagati.
- h₂* Sexti paris ramus costarum dextri lateris radicibus exporrectus.
- i, i₂* Portiuncula intercostalium neruorum, sexti paris ramum hæc descendente adaugentes.

k, k₂ Rami

- k, k 2 Rami neruorum sexti paris in muscutorum deprompti capita, quæ à superiori pectoris ossis sede, & claviculis principium ducentia sursum feruntur.
- l 2 Dextri nerui sexti paris ramuli, recurrentem dextri lateris neruum efficientes.
- m 2 Dexter neruus recurrens, seu reuersiuus.
- n 2 Soboles dextri recurrentis nerui, laryngis dispensatæ musculis.
- o 2 Sinistri sexti paris nerui soboles, recurrentem sinistri lateris neruum constituentes.
- p 2 Sinister neruus recurrens, qui perinde ac dexter, uocis neruus uulgò nuncupatur.
- q 2 Sexti paris ramuli in pulmonum tunicam excurrentes.
- r 2 Ramuli sexti paris, membraneo cordis inuolucro impliciti. Ab illis uerò sinistri nerui surculis, qui ijs quos r indicauimus correspondent, cordis neruulus principium ducit.
- s 2 Sexti paris neruorum portio, quæ stomacho committitur, & series quoque qua uterque neruus bipartitò scinditur. ac dexter sinistram superioris uentriculi oris sedem adit, sinister uerò eius orificij dextræ parti implicatur.
- t 2 Series sexti paris neruorum, in superius uentriculi orificium & proximas uentriculi sedes disseminata.
- u 2 Ramus sexti paris neruorū dextram orificij uentriculi sedem adeuntium: qui secundum elatiorē uentriculi regionē ductus, tandem in iecoris cauum absumitur, ubi x ascriptum cōspicies.
- y 2 Prima propago rami neruorum sexti paris, qui dextri lateris costarū radicibus exporrigitur.
- z 2 Ramulus primæ illius propaginis y notatæ, qui in dextram sedem inferioris omenti membrana, & colon intestinum hic digeritur.
- α 2 Soboles primæ illius propaginis duodenum accedens intestinum, & ieiuni initium.
- β 2 Soboles dextram fundi uentriculi sedem perreptans, ac frequentes surculos uentriculo & superiori omenti membranæ dispergens. Vbi uerò * ponitur, præsentis propaginis in iecur & bilis uesiculam series in conspectum uenit.
- γ 2 Propago dextrum accedens renem.
- δ 2 Propago in dextram mesenterij regionem, & huius sedis intestina frequenti ramulorum serie diffusa.
- ε 2 Neruorum series dextram uesicæ regionem implicans.
- ζ 2 Prima propago nerui sexti paris, sinistri lateris costarum radicibus exporrecti.
- θ, i 2 Duæ notantur soboles propaginis ζ insignitæ, quæ inferiori membranæ omenti, & colo intestino quæ sub uentriculo repit, offeruntur.
- η 2 Series neruorum, qui lieni inseruntur.
- † 2 Hac cruce ramum propaginis ζ notatæ insigniui, qui sinistram fundi uentriculi sedem perreptat, uentriculo & superiori membranæ omenti surculos deriuans.
- κ 2 Propago in sinistram mesenterij & eius sedis intestina excurrentes.
- λ 2 Sinistram renem accedens propago.
- μ 2 Series ramulorum sinistram uesicæ latus admodum obscure implicantium.
- ν, i, 2 Septimum cerebri neruorum par: atq; in secunda figura utriusq; lateris neruus quoq; delineatus est, ac ν insignitus.
- ξ 2 Septimi paris propago musculis dispensata, à stylum imitante temporum ossis processu principium ducentibus.
- ο 2 Septimi paris cum sexto coitus.
- ω 2 Septimi paris series, compluribus linguæ ac ossis ν imaginem referentis, & laryngis musculis intertexta.
- υ, 2, 3 Numeri characteres in priori figura ad dorsalis medullæ principium conspiciui, tria indicant foramina, quorum duo lateralia 1 & 3 insignita illa demū sunt, per quæ arteriarum soporalium rami ad dextrum et sinistram cerebri accedunt uētriculos. Medium uerò foramen 2 indicatum, illud est quo pituita ex tertio cerebri uentriculo ad peluim ducitur, quæ pituitam excipit, ac dein instar infundibuli super glandem transmittit, quæ huic cerebri regioni subijcitur. Verū hæc ad septimum librum imprimis spectant, ad cuius figuras ex interiori subsequentium nouem Capitem margine remittēris: quemadmodum & sexti paris occasione, ad quinti & sexti librorum figuras.

QUOT NERVORVM PARIA A CERE

bro & dorsalis medullae parte adhuc in caluaria consistente, originem sumant. Cap. I I.

S I quando in interiori margine scripsimus fig. cap. 2. lib. 4. duas, aut illarum alteram indicauimus, quas praesenti capiti ad primi capitis finem praepositas cernis.

Qui cerebri
sedes & par-
tes in 7 lib. di-
stinguuntur.



Qui uentricu-
li seu sinus ce-
rebri.

Vnde neruo-
rum cerebri ini-
tium.

Dorsalis ini-
tium.

Quot cerebri
neruorum pa-
ria.

I B R O septimo quum cerebri pertractabitur constructio, duplex id esse docebimus, unum anterius superiusque quod cerebrum dicitur, uniuersam propemodum implens caluariam: alterum posterius ac humilior, & cerebellum nobis appellatum, ipsoque cerebro etiam decuplo minus. Deinde anterius tota superiori ipsius sede geminum esse, dextrum uidelicet & sinistram asseremus. inferiori autem parte, quae caluariae innititur basi, unicum indiuisumque esse, & dorsalem medullam ab hac, non autem (ut Anatomicorum praecipui scribunt) a cerebello enasci, & cerebellum potius dorsali medullae inniti & tenuis membranae, parum uero ipsius substantiae interuentu, medullae uniri, quam dorsalis principium esse ostendemus. Adhuc, addetur praeter alios quosdam cerebri sinus meatusque, duos cerebri existere uentriculos, unum quidem dextrum, alterum uero sinistram, qui ambo in unam communem coeunt cavitatem sinumue, qui tertius in cerebro uentriculus recensetur, qui meatu quodam ad sinum inter cerebellum & dorsalem medullam ubi inuicem committuntur conspicuum, & tam cerebello quam dorsali medullae communem, pertingit. Caeterum neruae propagines ex caluaria procidentis, aut ab ipso anterioris cerebri enascuntur basi, aut a dorsali medulla priusquam uertebrarum sinus ingrediatur, non autem a cerebello. Vt uero eam dorsalis medullae partem, quae a cerebri basi sub cerebello ad foramen usque, quo est caluaria labitur, procidit, dorsalis medullae principium nuncupare liceat, mihi concessum uelim: cum quid illo intelligam principio, satis iam explicauerim, ac item in septimo libro diffusius id sim enarraturus. Per me enim licebit illi principio, seu parti cerebri, quod uis nomen indere: modo non ignoret, qui illa a cerebello distinguenda ueniat. Porro nerui omnes a cerebro, illoque dorsalis medullae initio pronati, quia geniculatim in caluariae amplitudine, qua cerebrum continetur, originem ducunt, Latinis neruorum paria, seu coniugia, Graecis autem *συνυγία* nuncupantur. quae Marini, ac demum Galeni etiam suffragijs septenae enumerantur. quauis si accuratè singula expendimus, plura etiam censi possint. Neque enim hic olfactus organa nerui appellantur, quod dictam nuper caluariae amplitudinem non excidant. Item par, quod nobis ex aliorum Anatomicorum sententia tertium constituetur, uerius duplex quam unicum enumeraretur. Dein iuxta quinti paris radicem aliud omnibus incognitum dissectionum studiosis par enasci, diligens sectio me docuit. Verum a ueteri neruorum cerebri enumeratione haudquaquam recessurus, ordine septem paria septenis capitibus explicare contendam: prius tamen quaedam de olfactus organis subnexurus, quum non uulgares etiam dissectionis professores illis primum neruorum coniugium ascribant, illaue ita nuncupent.

DE OLFACTVS ORGANO

nonnulla. Cap. III.



Multiplices
de olfactus or-
gano senten-
tiae.

A R I A profecto de odoratus organo nostrae tempestatis, medicis pariter ac philosophis est sententia, magnaque inter ipsos, ex Anatomes imperitia, dissensio oboritur. Quosdam namque reperias odoratus organum in illa cavitare constitutere, quam in frontis osse ad superciliorum regionem inter duas eius ossis squamas conspici, in primo libro recensuimus. qui si duos etiam insignes sinus, quos in ossis cuneum imitantis medio tanquam antra inter ipsius squamas subinde obseruamus, adinuenissent, ac substantiam illam quodammodo medullarem in illis cauernis repositam, summoque studio hic expendendam, obseruassent, proculdubio & inibi quoque in osse cuneum referente olfactus organum collocassent. Alij uero quosdam cerebri anfractuorum reuolutionumque apices, ac ad frontis ossis sedem uersus superciliorum medium protuberantia cerebri tubercula, olfactus organa statuunt, & tubercula illa quod promineant, carnisque quasi modo rubeant, mamillares cerebri processus uocant, utrinque unum (uti etiam est) enumerantes. Alij rursus ex aliquot Galeni locis, praecipue aut octauo de Partium usu, simpliciter anteriores cerebri uentriculos olfactus organa esse astruunt, perinde ac si anteriores uentriculi praesentis duntaxat sensus essent principia. Alij quidem duos anteriores cerebri enumerant uentriculos: uerum deinde alios duos confingunt, quos

a1, 2 fig. A, A. aut quic-
quid cere-
bri in 7 lib.
figuris oc-
currit, prae-
ter cerebel-
lum 7 figu.
insignium
XX. 8 fig.
R, R, R. 9
fig. B, C, D.
& tota u
fig.
b1 2 fig. B.
c3 fig. lib. 7
A, A, & B,
B.
d ut in 1 fi.
spectatur.
c1, 2 fi. D,
E.
f 4, 5 fi. lib.
7. L, L.
g 4, 5 fi. lib.
7 M, M.
h 6 fi. lib. 7
ubi consistit
H, I sub A,
A. 7 fi. H.
i 7, 8 fi. lib.
7. K.
k 11 fi. lib. 7
E.
l 9 fi. lib. 7.
1. 10 fig. M,
N, N, O.
m Specta se-
dulo 1 fig.
cap. 2.
n 1 fi. a Dad
E.
o 1, 2 fig. F.
p 1, 2 fig. L,
M.
q 1, 2 figu. d
iuxta a.
a3, 4 fi. ca.
12 lib. 1 K.
b 8 fi. cap. 6
lib. 1 C, D.
c1, 2 fig. C.
12 fi. li. 7 I.
1. 13 fi. C, C.
d 4, 5 fi. lib.
7 L, L, M,
M.

quos olfactus organa esse asserunt. Cæterum quàm probè hi sentiant, ex dissectione discas licet, dextri sinistriq; cerebri uentriculorum constructionem formamue prius inspiciens, quam meherculè multò aliam esse in septimo libro intelliges, quàm hactenus dissectionum periti tradiderunt. Quandoquidem uentriculi in posteriori sede neutiquam lati conspiciuntur, & in priora procedentes paulatim in angustum coguntur, inibiq; olfactus organa educunt. neque etiam ad olfactus organorum sedem pituitam excernunt, multoq; minus ipsa olfactus organa

Anteriorū cerebri uentriculorū ductus.

Lib. 8. de V. su part.


*Hic sectio nis serie spe-
ctabit 5, 6,
7, 8. li. 7.*

*f. 1. cha. 1,
2, 3. aut 13
fi. li. 7. iux-
ta M, P, Q,
g. 16. fi. li. 7
A. dein
E, F.*

*h. 1, 2. fig. F.
12. fig. lib. 7
C, D. 13. fi.
L, L.
i. 1, 2. fig. G.
13. fig. lib. 7
M.
h. 13. fig. li. 7
D, D.
18. fig. ca. 6
li. 1 A, B, A.*

*m. 13. fi. li. 7
L, L.*

*n. 14. fi. lib.
7 C, C, D.
15. fig. F. &
16. B ad A.*



H V I V S M O D I ferè dextri sinistriq; uentriculorum ductus uis. tur. et A & B superiorem uentriculi indicant sedem, A quidem anteriorem, B uero posteriorem. C regionem notat, quæ decliuis antrosum ducitur ad D, quod uentriculi extremum terminumq; indicat. At hæc in cerebrum exprimentibus septimi libri tabulis sunt longè euidentiora, potissimum autem in quarta, & quatuor illam seriatim subsequentibus. Quod uero in hac figura uentriculū ex latere è directo conspiciamus, neminem latere arbitror.

li. extremum terminumq; indicat. At hæc in cerebrum exprimentibus septimi libri tabulis sunt longè euidentiora, potissimum autem in quarta, & quatuor illam seriatim subsequentibus. Quod uero in hac figura uentriculū ex latere è directo conspiciamus, neminem latere arbitror.

Processuum qui aut olfactus organum sunt, aut ibi præcipue subministrant, ortus.

Lib. 8. de V. su part.

tingant^f sedem, quæ^g glandulæ pituitam cerebri excipiētis regioni incumbit, ac sub qua grandiores soporalis arteriæ rami duram cerebri membranam perforant, in cerebriq; uentriculos conscendere incipiunt. Illi namq; arteriarum rami in hos uentriculorū angustos conscendunt terminos, quos modò ad cerebri basim definere dicebam. Atq; eiusmodi dextri & sinistri uentriculorum cerebri ductus uisuntur. A sede uerò ubi uentriculorum angustos terminos definere dicebam, olfactus organa, aut saltem cerebri processus animalem spiritum præcipuo olfactus instrumento deferentes, ac ipsi etiam uisorij nerui enascuntur. Hinc enim utrinq; à cerebro alba mollisq; pro-
dit substantia, quæ in progressu etiam cerebro tenuis membranæ interuentu colligatur, quousq; ad^k sinus octauæ capitis ossis pertingat, qui olfactus organis priuatim parantur. Ad posteriorem enim horum sinuum sedem albicantes cerebri processus, à cerebro abscedunt, neque amplius tenui membranæ connati, in suum singuli porriguntur sinum: & adhuc antrosum magis protensi ad sinuum finem, seu anteriorem ipsorum sedem definunt, sinibus suffulti, ac cerebro interim proximè accumbentes. Nam etsi cerebro in sinuum regione non amplius adnascantur, nihilominus ipsi perpetuò attenduntur, illiq; sunt contermini. Hi processus cerebri ductu, colore, formaq; neruis correspondent. quamuis interim longè neruis ipsis molliores sint, pauloq; (quod ad teretem spectat formam) latiores, quàm profundiores. Verum quia hi reliquorum neruorum ritu extra caluariæ, ut neque etiam extra magnam duræ membranæ amplitudinem, non procidunt, nerui nomine eos Herophilus haud dignatus est: ut neque etiam Marinus, neque Galenus. licet Anatomicorum nonnulli hos in neruorum habuerint numero, ipsos primum neruorum par recēntes. Porro in horum processuum natura non negligenter considerandum est, quoniam pacto illi duræ membranæ suis sinibus adnascantur, & quæ foramina hinc à duræ membrana, & ossium sinibus quibus præsentibus innituntur processus, ad nuper commemoratas frontis ossis & cuneiformis cavitates pertingant. Ac demum expendendum quoque uenit, quod nam uerum sit olfactus organum, similitudine quadam sumpta ab auditus instrumento, dissectionum ac philosophiæ professoribus nimis perfunctoriè cognito. Verum de auditus instrumento, & olfactus quoq; & aliorum sensuum, in septimo libro abunde pertractabimus. Modò autē sat fuisse uidetur, processus illos cerebri commemorasse, quos aliqui etiam mamillares et papillares nuncupasse colliguntur: qui sectionem paulo diligentius aggressi, illa cerebri^m tubera mamillarum imagine prominentia, nihil ad olfactus organi constructionem auxiliari cognouerunt. Cæterum quando huiusmodi processuum naturam examinabis, atque illos longè grandiores in cane item & oue quàm in homine adinuenies, etiam sedulo perquirendum est, quàm anatomicè Galenus per illos cerebri processus pituitam ad nares ab ipsis anterioribus cerebri uentriculis deduci scripserit, haud animaduertens eos processus non perforatos esse, & ipsos uentriculos inⁿ peluim definere, quæ cerebri pituitam excipiens, eam infundibuli modo ad glandem deducit, hinc in cerebri basi repositam. quamuis de pituitæ ductibus suo dicemus loco. Nunc enim neruorum duntaxat series opportunè pertractabitur.

Primi paris
ortus.



Primi paris
neruorum in-
gressus.

In oculum in-
gressus, & in
tunicam quam
reti compara-
mus dilatatio.

Num uisorij
sint perforati.

NIBI unde^a processus albos, et neruorum modo progredientes, à cere-
bri basi initium sumere scripsimus, utrinq^b unus exoritur neruus, om-
nium corporis neruorum facile mollissimus, & circumferentia cæteris
(dummodo illi ex uarijs non permisceantur neruis) crassior. In crure nã
que, & item in brachio^c neruos quidem hoc primo pari crassiores repe-
rias, sed qui ex pluribus conflentur neruis inuicem coeuntibus. Vterq^d
primi paris neruis sub cerebri basi quã^d sinui innititur, cui glandula in-
det cerebri pituitam excipiens, antrorsum non nihil oblique fertur, dextro quidem neruo sini-
strorsum, sinistro autem dextrorsum protenso. In progressu, moxq^e ab ipso ortu ambo inuicẽ
coeunt, atq^e in eum permiscuntur modum, ut dextrum à sinistro nulla prorsus ratione queas
discernere, adeò sanè, ut uana penitus sit quæstio, num dexter neruus in hoc congressu dextrã
obtineat sedem, an uerò sinistrorsum continuo ductu feratur. Quandoquidem ille neruo-
rum coalitus non aliud est, quàm commune corpus à quo utrique nerui dicerentur prona-
sci, modò istius corporis ex cerebri substantia origo non indagaretur, atq^e illic initia neruorum
diffusa appareret. Nerui à congressu è caluaria ducendi inuicem mox dirimuntur, & per^e fo-
ramina ipsorum nomine insculpta, in oculorũ sedes extra caluarię cavitatem procidunt. Quip-
pe &^h integri in oculos absumentur, non quidem accuratè in posterioris oculi sedis centrum
implantati, sed neruus dextrum petens oculum ad dextrum magis latus posterioris eius sedis
implantatur: qui uerò sinistro oculo proprius est, ad latus sinistrum centri posterioris sedis o-
culi ingreditur, ac (quemadmodum & dextri oculi neruus) quãdo oculum subiit, in latam de-
generat expanditur ueⁱ tunicam uitreo humori proximam, & mediam oculi sedem duntaxat
ambientem, & dilatata cerebri substantiæ admodum similem: ac proinde mollem, nihilqⁱ mi-
nus quàm membraneam: unde etiam Anatomicorum nonnulli hanc tunicam, quæ à retis qua-
dam imagine ἀμυδρῶς ποδῶς dicitur, Tunicam appellare haudquaquã dignati sunt. Quòd ue-
rò hæc tunica (aut quomodocunque ipsam appellare uisum sit) præcipuum uisus organum à
multis habeatur, in oculi constructionis enarratione persequar. In præsentia enim neruos hos
aut oculos prolixius aggredi omnino præter institutum foret. quum suffecerit dixisse, uisorios
neruos illum quem recensuimus ductum citra omnem ramorum propagationem obseruare.
hoc enim (quemadmodum & dextri nerui cum sinistro mox ab exortu coitum) peculiare ra-
rumqⁱ uisorij nerui sibi uendicant. Quinetiam inter reliquos corporis neruos, hi duntaxat me-
atu qui sensu dijudicari possit, perforati dicuntur: quapropter Græcis (præcipue autem He-
rophilo & Eudemo, πόροι δ' ὀφθαλμοῦ nuncupabantur. Cæterum ego eiusmodi meatum mihi aliquã
do occurrisse neutiquam queo asserere, quantumuis etiam canum adhuc uiuentium & alio-
rum grandium animalium uisorios neruos, uel hac solùm occasione aggressus sim, et hominis
cuius caput adhuc à decollatione calebat, uixq^e quarta horæ parte quum neruos intuerer ab-
truncatum fuerat, ipsos non oscitanter spectauerim, ac calente aqua sedulo fouerim. At-
que ut eiusmodi meatus toto neruorum progressu me penitus latuit, ita sanè in mutuo ner-
uorum coitu is neutiquam se obtulit. utcunque tamen hunc inibi oportebat esse insignem,
si modò nerui ob hoc ex Galeni sententia congredierentur, quo minus simplicia nobis ge-
mina perperam uiderentur. Porro ijs qui de congressu hoc meatu que acriter citra partium
inspectionem indies altercantur, non grauabor duo quæ in congressu animaduerti, hinc adijce-
re, quò & hinc suarum nugarum argumenta petant. Patauij itaque adolescens suspendio ne-
catus publicæ sectioni adhibitus fuit, cui ante annum dexter oculus à carnifice erutus fuerat:
deinde mulier, eodem supplicio affecta, cui dexter quoque oculus ab ineunte ætate emarcue-
rat, sinistro interim integerrimo. Mulieri dexter uisorius neruus toto progressu longè te-
nuior sinistro uisebatur, non solum in ea sede qua iam oculo inferebatur, uerùm in exortu
quoque & in dextra sede congressus neruorum. ac præterquam quòd dexter tenuis erat, du-
rior quoque & rubicundior cernebatur, uti sanè & in adolescente: sed dexter non admo-
dum neque crassitie, neque mollitie adhuc sinistro cedebat. His ille accessit, cuius neruos
uisorios in illo congressu inuicem non connasci, neq^e sese contingere uidimus. sed dexter non-
nihil ea sede qua caluariam egressurus fuerat, sinistrorsum reflectebatur: quasi non coalitus
occasione nerui congredierentur, uerùm ut commodè per suum foramen è caluaria procide-
rent, potissimũ quum etiam hoc ductu ingredienti in oculi posterioris sedis medium nõ in-
rantur.

a 1, 2 fi. F.

b 1, 2 fig. G.

c 2 fi. ca. 11

d, et cha. 71

d 3 fig. ca. 12

lib. 1. M.

e 1 fig. H. 13

fig. li. 7. M.

f 13 fi. lib. 7

N. O.

g 1, 3 fig. ca.

12 lib. 1. E.

h 13 fig. ca.

14. lib. 7 k.

aut simul

cum mem.

branis in 18

1. in 17 a, b,


i 1, 2 fig. I.

aut 1 fi. cap.

14. lib. 7 E

ad C.

rantur. Hunc ductum sinister nervus etiam referebat, non tamen ita quin notatu digno interuallo dexter à sinistro dehisceret. Quàm sedulò autem ac sollicitè eius uiri familiares interrogauerimus, num illi omnia gemina perpetuò oculis obuersarentur, neminè Naturæ operum cognitione flagrantem ambigere sat scio. at nihil aliud resciscere licuit, quàm ipsum de uisu nunquam conquestum fuisse, uisusq; præstanti semper ualuisse, familiaresq; de uisorum duplicatione nihil unquam intellexisse. Quòd uero Cassius, et alij nonnulli, quum causam rimatur, quamobrem dextra cerebri sede uulnerata, aut alioquin læsa, corporis sinistra pars neruorum resolutione infestetur, integra parte dextra, neruos omnes in ortu decussatim ferri: seu neruos à dextra cerebri & dorsalis medullæ sede pronatos, in sinistram corporis regionem distribui, & è contra asserant, apud me elegantissimum, & inter somniantum ab illis problematum interrogatoribus excogitatum figmētum habetur. quum^k secundi paris neruorum ac dein^l tertij &^m quarti parium, dextri exortus à sinistris aliquot digitorum amplitudine inuicem distent, ut modò de alijs neruis nihil dicam: idq; pariter fileam quì uisorios porcorum neruos subinde nō continuos, sed perinde ac crurū neruos, quasi è multis funiculis conflatos spectarim, ne in aliam quampiam prolixiorē disceptationem sermo deflectat, præcipuè cum illis dissectionum professoribus, qui dextrum cerebrum penitus à sinistro diremptum posteris tradiderunt.



P R AE
fenti figurat
uorū quos hic
describimus du
ctus. exprimi
tur. ac A cere
bri porriuncu
lam indicat.

DE SECUNDO PARI NERVORVM

cerebri. Caput V.

a 1,2 fi. K.
14, 15 fi. li.
7 G.
b 1 fi. G.



c 1,3 fi. ca.
12 lib. 1 G.
e figure ca.
11. li. 2

ONIVGII^a secundi exortus, nequaquam ex infima mediaq;^b quodam modo (quod ad latera spectat) basis cerebri sede, ut^b uisiorum pendet. Dein præsentis coniugij nerui plurimū uisorijs crassitie cedunt, quamuis interim duritia eos superent, usuq; ab illis multum uariant. Paulò posterius enim quàm uisorijs, ex cerebri basis lateribus principium ducunt, quòd hæc cerebri regio nonnihil durior illa sit, à qua uisiorum origo sumitur. Atq; id merito accidit, siquidem secundi paris neruos musculis inferēdos, duriores ipsis uisorijs esse oportuit. Proreperit enim nervus dexter (quòd et de sinistro, nisi peculiariter sermoni quid addatur, in neruorum serie semper subaudiendum est) sub cerebri basis latere ad^c foramen in oculorum sedis radice sibi cum alijs aliquot uasis commune. Quamprimum autem è caluariæ excidit amplitudine, in ramos dissectus septem^e musculis oculo proprijs ramulos offert, illorum motibus præfectus.

DE TERTIO PARI NERVORVM

cerebri. Caput VI.

a 1,2 fi. M.
14 fi. li. 7 I.
b 1, 2 fi. L.
14 fig. li. 7 H.



c 1 fi. D.
d 1,2 fi. K.
e 1,3 fi. ca.
12 li. 1 G.

f 2 fi. N. 4
mus. tab. H.
g 1 fi. ca. 12
li. 1 A.

h 3 mus. ta.
A.

i 2 fi. O. 4
mus. ta. I.

k 1 fig. ca. 12
li. 1 B.

l 3 mus. ta.
H, F.

m 2 fi. P.

n 1 fi. ca. 12
li. 1 C.

o 19 fi. ca.
14 li. 7 A.

p 3 mus. ta.
K

TERTIVM par duplici radice utrinq; principium sumit,^a una quidē crassiori, cui opportunè tertij paris nomen accommodaueris, altera autem lōge tenuiori & duriori, et neq; in ipso exortu, neq; etiam in progressu, crassiori radice commissa. Huius enim initium nō modico in posteriora interuallo, ab illius exortu distat: adeò sanè, ut uerius graciliorem hanc radicem peculiare par, quàm tertij paris portionem, quis esse assereret. At quū omnes Anatomicorum procures hanc tertio pari ascripserint, nihil sanè obstiterit manifestioris doctrinæ studio, & me etiam cum tertio pari tenuem illam posterioremq; radicē aggredi: prius tamen studiosos admonentem, in libro de Neruorum sectione (quem Galeni libri uix fragmentum censuerim) parum rectè tertium par secūdo mollius esse, tradi. Exoritur itaq; gracilior hæc tertij paris radix à latere basis cerebri, ubi dorsalis medulla ab ipsaⁱ initium ducere auspicatur. Hinc recto tramite sub cerebri basi antrosum progrediens, duram cerebri mēbranam perforat, & secundo neruorum pari attensa cum ipso per^e commune foramen in oculi sedem procidit, ilico in quatuor dissecta propagines. quarum^f prima sursum in adipe oculorum musculis obducto excurrent, per^g peculiare foramen ad frontis cutem &^h musculosam huius sedis substantiam digeritur, frontis cutis & palpebræ superioris motibus præfecta. Secunda propago deorsum ducta, mox in^k foramen sibi priuatim exculptum fertur, quousq; in anteriorem superioris maxillæ sedem prolabatur, ac multiplici serie dispensetur in^l musculos superius labrum et nasi alam extrorsum in suo latere mouentes, ac demum in ipsum labrum & incisiorum dentium gingiuas.^m Tertia propagoⁿ foramine etiam priuato utens, post^o carūculam in interiori angulo oculi conspicuam, narium adit amplitudinem, inibi in narium dege

Duplex utrinque tertij paris radix.

Tenuioris radice ortus & series.

*Crassioris ra-
dicis origo &
distributionis
series.*

nerans tunicā, & ramulum exporrigens^p tenui & membraneo musculo introrsum nasi alam contrahenti.^q Quarta propago iam dictis crassitie non inferior, per^r foramen seu scissuram potius, quæ inter primum maxillæ superioris os, & cuneum imitans in extimo latere sedis oculi conspicitur, ad internam sedem^s temporalis musculi contendit, tota in eum musculum absu-
menda. ^rCrassior tertij paris radix à latere basis cerebri, anteriùs tamen, et penitiùs seu iuxta dextri & sinistri medium magis quàm enarrata modò radix, principiū sumens, rectà deorsum tendit, ^uforamē, quod ipsi & ^uquarto neruorum pari huic radici proximo cælatur, perlabens. Hæc statim ab egressu^v propaginem diffundit, quæ uitis, aut cucurbitæ capreoli instar inuoluitur, duriorq; paulatim efficitur, ac^z binos tandem quinti paris neruorum cerebri ramulos (quorum seriem postea recensebo) in consortium admittēs, ipsisq; unitus in temporalem musculum inseritur, ac in^z illum quoq; qui à iugali osse enatus priuatim ^zseu manforius nobis dicitur, ramulos porrigit, deinde et^z musculis buccas mouentibus, ipsiq; demum faciei cuti in buccis etiam furculos offert. Postquam uerò crassior tertij paris radix propaginem hanc capreoli modò intortam exprompsit, nonnihil deorsum magis descendens, ^cfurculum deriuat, qui antrorsum ductus gingiuæ molarium dentium, ipsisq; adeò dentibus seriatim soboles distribuit. Dein priusquam maior hæc tertij paris radix decliuis ducta linguam contingat, ^dramum posteriori ex parte germinat utcunq; insignem, qui^e musculo in ore delitescenti & maxillam inferiorem attollenti insertus, inferioris maxillæ ^fforamen adit, hîc ubi is musculus ipsi inseritur conspicuum. Ramus ille in foramen delapsus tantisper antrorsum fertur, quousque sui lateris dentium inferioris maxillæ radicibus ^gsingulas soboles offerat, quorum beneficio dentes inter cætera hominis ossa, euidentius tristantium occursum sentire credimus. Neque uerò ramus hic uniuersus in dentes absumitur, imò non minima ipsius^h portio perⁱ foramen in anteriori maxillæ sede insculptum excidit, dextræ sedi inferioris labri cōplures furculos deriuās. At^k maior portio crassioris tertij paris neruorum radicis, quando lingue basi committitur, cū alterius lateris neruo lingue tunicam efformat, aptum saporibus dignoscēdis instrumentum. Deinde & exiguos quoq; furculos penitiùs in lingue substantiam dispensat. Horum enim & tunicæ lingue producendorum gratia, tertium par potissimū à rerum Opifice creatum arbitramur, atq; ut^l primum par uisus, ^mquintum uerò auditus, sic hoc tertium gustus censetur instrumentum, gustatoriusq; neruus meritò nuncupatur.

DE QUARTO PARI NERVORVM cerebri. Caput VII.



HOC^a par tertio pari nonnihil gracilius duriusq; est. exoritur enim à dorsalis medullæ^b principio posterius paulò quàm tertium par, sed antrorsum modicè tensum posteriori tertij paris sedi committitur, atq; unà cum illo per^c commune ipsis foramen ex capitis amplitudine, seu cerebri sede, ad palatum elabitur: quò simul atq; peruenit, in furculos quosdam partitiū, in palati^d tunicam degenerat: quæ quum lingue tunica aliquantulo sit durior, iure etiam quartum par posterius tertio pari originem ducit, ac proinde etiam palati tunica sensu hebetiori quàm lingue^e tunica donatur.

QUINTI NERVORVM CEREBRI PARIS series. Caput VIII.



QUINTVM^a par nōnihil quarto crassius, ac ueluti pluribus enatū furculis inuicem mox ab ortu connexis principiū ducit, ex media propemodū dorsalis medullæ sede, ^beius partis quæ à medullæ exortu usq; ad eam regionē pertinet, quæ hæc ē caluaria in uertebras labitur. Hoc quintum par uniuersum per^c foramē fertur impensē tortuosum, & priuatim ipsi incisum, quo usq; in cavitatem pertingat, auditus organo preparatam: ubi quintum par uariè discinditur, & propagines quasdam membranæ modo^d dilatatas huius cavitatis sedibus offert, auditus organi non infimam partem constituens. Præter has uerò propagines duos educit neruulos, qui seorsum per proprium foramen elabuntur. ^eunus quidem per^f transuersum ducitur foramen, quod etiam admittit^g uenulam in auditus organum excurrentem. Hic neruulus non procul ab egressu tertij paris^h ramo commiscetur, instar uitis capreoli inuoluto. ⁱAlter uerò neruulus per^j foramen repit impensē arcū, & insigniter quoque tortuosum, & immissam ipsi setam aut plumbeum filum non admittens, ob idq; etiam

Anato-

q 2 fi. Q.
r 1, 2 fi. ca.
12 li. 1 D.
s 4 mus. ta.
r.
t 1, 2 fi. M.
u 2, 3 fi. ca.
12 li. 1 Q.
x 1, 2 fi. Z.
y 1, 2 fi. R.
z 1, 2 figu.
b, c.
a 4 mus. cu.
tab. A.
b 3 mus. ta.
r. 4. ta. M.
c 2 fi. S.
d 2 fi. T.
e 6 mus. ta.
D.
f 2 fi. ca. 10
lib. 1. F.
g 2 figu. X.
X.
h 2 fig. V.
i 1 fig. ca. 10
libri 1. & 5
mus. ta. G.
k 2 fi. Y, Y.
l 1, 2 fi. G.
m 1, 2 fig. A.
41, 2 fig. Z.
14 fi. lib. 7
K.
b 1 fi. inter
D, E.
c 2, 3 fi. ca.
12 li. 1 Q.
d 2 fig. inse-
rius Z.
e 2 fi. Y.
a 1, 2 figura
a crassius
quàm Z. 9,
14 fi. lib. 7
M ac fi. ca.
8. li. 1. D.
b 1 fi. D, E.
c 3 fi. ca. 12
li. 1. A.
d 1, 2 fig. p.
sed potius
specta figu.
ca. 8. lib. 1.
e 1, 2 fi. b.
f 2 fi. ca. 12
lib. 1. V.
g fig. ca. 14
lib 3. n.
h 2 fig. R.
i 1, 2 fi. c.
k 2 fig. cap.
12 lib. 1. b.

l. 4. muscul. tab. Δ. m. 2. fig. R. Anatomīcis cæcum appellatum. Neruulus iste transuersim supra^l musculum ducitur, qui à iugali osse pronatus, inferiorē maxillā mouet: ubi uerò ad anteriū usq; eius musculi latus antrosum prorepit,^m dicto tertij paris ramo commiscetur, in genarum cutem & musculos buccæ motuum autores digerendus. Atque illi demum duo sunt ramuli, quos tertij paris ramo capreoli ritu inflexo commisceri superius dicebam. Porro quemadmodumⁿ iuxta tertij paris præcipuam radicem, alia quædam radix enascitur tertio pari ascripta, simili etiam ratione iuxta quintum neruorum par interius paululum^o alia exoritur radix, quinti paris radici multo gracilior, sed quodammodo durior. Hæc fursum uersus priora sub cerebri basi aliquandiu protensa, duram cerebri membranam perforat, ac per^p proprium foramen sub secundi paris foramine exculptum, è caluaria procidens in^q temporalem musculum, illumq; digeritur qui in ore delitescens, inferioris maxillæ ad superiora motus autor censetur. Hanc radicem cum sua coniuge liceret peculiaris coniugij loco censere. Quo minus tamen aliorum Anatomīcorum (qui has radices prorsus ignorarunt) numerum perturbem, hos neruulos quinto pari ascribam, ad eum uidelicet modum, quo minorem tenuiorem uē tertij paris radicem tertio pari superius adnumeratam reliqui. In temporalem itaque musculum^r quinque neruorum pertinent propagines, prima quidem à graciliori tertij paris radice, secunda à maiori radice, tertia autem & quarta à quinti paris primario educuntur neruo. quinta autem is demum neruus est, quem iam quinto pari connumerabam. Neque sanè frustra, atque ut fors fert, tot neruorum soboles temporali musculo Natura exporrexerit. Sciebat enim hunc musculum pro sua mole omnium corporis musculorum ualidissimam functionem obiturum. Item quum haud ignoraret, quam molles illi essent nerui quos à cerebro eduxit, summa mehercule prouidentia illos quantum licuit ex ossium contactu, itinerisq; longitudine uoluit indurescere. Nulli enim non obuium est, quàm callidè furculum instar capreoli inuolutum duriores effecit. quod is solus ossi minimo spacio contiguus sit: alios autem non inuoluit, quod longo intervallo ossibus attendantur, ipsorumq; nonnulli per tortuosos & inuolutos ossium meatus etiā porrigantur.

Neruus iuxta quinti paris radicē principium ducēs.

Quot neruorum propagines temporali musculo offerantur.

DE SEXTO PARI NERVORVM CEREBRI. Caput IX.



a. 1, 2. fi. c. 9. fi. lib. 7. N. 14. fig. N. b. 2. 3. fi. ca. 12. li. 1. c. c. fig. ca. 14. li. 3. 1. et C. d. 2. fig. f. f. 9. muscul. tab. r. g. ult. fi. lib. 3. 1. et v. h. 2. fi. v. i. 2. fig. o. k. 2. fig. g. l. 2. 3. fig. ca. 21. lib. 2. l. m. 7. 8. fi. ca. 21. li. 2. v. n. 4. fi. eiusdem ca. N. o. ut in ulti. fi. l. 3. 4. 5. p. 2. fi. h. q. Spectantur 2 figur. cap. 11. ubi furculi 2, 3 notantur. r. 2. fi. i. i. 3. ad q. sub Δ. 7. muscul. tab. t. 2. fi. k. 2. u. 4. muscul. tab. o. x. 4. ta. S. y. 5. ta. P. RELIQUORVM parium, quæ in caluariæ amplitudine principium ducunt, nullum æquè sparsam ramorum edit sobolem, neque in tam multas easdemq; uarias inseritur partes, atque^a sextum cerebri neruorum cōiugium, quod paulò inferius quinto pari aliquot distinctis ac à se inuicē diremptis furculis initium sumit, qui mutuò mox ab initio cōmissi, unum efformant neruum, qui per^b foramen caluariam egreditur, quod arteriæ soporalis^c minorem ramum, & grandiore internæ iugularis uenæ ramum, simul admittit. Neruus hic non procul ab egressu in musculos posteriorem ceruicis sedem occupantes^d ramum diffundit, numerosa utcunq; serie in soboles digestum: quarum præcipuæ^e musculo exporriguntur, scapulam mouentium secundo. Ipse autem sexti paris truncus, ^fsoporariæ arteriæ ac^h septimo pari cohaeret, & simul cum ipsis membranae interuentu connexus, ad laryngis usque latera protenditur, inibi portionem à septimo pariⁱ assumens, illaq; se augens. Deinde sextum par quum hanc afficiuit portionem, laryngis musculis^k ramulos transuersim exhibet. Sunt autem illi musculi^l duo scutum imitanti laryngis cartilagini duntaxat proprii, qui ex stomacho gulæ uē posteriori sede pronati, eius cartilaginis lateribus inseruntur. deinde^m duo tertiæ cartilaginis basim occupantes, &ⁿ duo ex illis qui primam cartilaginem secundæ committunt. Hinc uerò sextum par soporali arteria & interna iugulari^o cōcomitatum, ad thoracis usque elatiorem descendit sedem, ac mox^p insignem utcunque propaginem ad primæ thoracis uertebrae latus, seu potius ad anteriorem primæ thoracis costæ radicis sedē deriuat, quæ sub membrana costas succingente, secundum costarum radices prorepens, à^q neruis in costarum interualla à dorsali medulla exporrectis, furculos quosdam assumit. Quum uerò hæc propago eiusmodi adaucta furculis, septum transuersum prætergressa^s est, in cibi potusq; organa, uti postea dicemus, dispensatur. Præter hanc propaginem sexti paris neruus iuxta superiorem thoracis sedem^t ramulos^u musculo offert, à pectoris osse & clauicula ad mamillarem capitis processum deducto, & capitis motibus subseruienti. Deinde &^x musculo qui os^v referens hinc à pectore accedit. Præterea &^y illi qui hinc ad infimam primæ cartilaginis laryngis sedem perfertur. Huiusmodi sanè utrorumq; sexti paris neruorum priusquam thoracis cauitatem subeant, series uisitur. quæ autem adhuc enarranda superest, mox atq; hinc figuram contextui interiecero, describetur.

QVAMVIS nuda septem neruorum cerebri pariū delineatio ad finem primi Capitis posita, omnem sexti paris seriem ostendat, atque ita pariter neruos recurrentes (qui Græcis ἐπισπορῶντες uocantur) exprimit, non abs re me factum arbitror, si peculiarem eorum tabulam unā cum arteriæ magnæ & asperæ partibus, quātum scilicet ad ipsorum seriei attinet ostensionem, hic contextui Capitis interijciam. quum horum neruorum adeo frequens medicis sit mentio, & intuitus pariter ob summum Naturæ miraculum nulli non sit longè iucundissimus.

A Arteriæ magnæ ex sinistro cordis uentriculo exortus, ubi hæc duas coronales arterias promit.

B Arteriæ magnæ truncus deorsum ad spinam reflexus.

C Arteriæ magnæ ramus oblique sursum ad primam sinistri lateris costam tendens, ac in sinistram postea manum excurrent.

D Arteriæ magnæ portio iugulum petens.

E Arteria transuersim in dextram manum procedens. Quas uerò hæc & illa quam *D* insigniuimus soboles diffundant, ex nuda arteriæ magnæ figura, decimo Capiti tertij libri subiuncta, petas licebit.

F, F Soporalis dextri lateris arteria.

G, G Sinistra soporalis arteria. *H* Asperæ arteriæ caudex.

I, K Duo asperæ arteriæ trunci, in quos hæc primum ad pulmones finditur.

L Larynx, cuius musculorum, ut & linguae & ossis u referentis figuras, ex tabulis secundi libri dudum didicisti.

M Glandula laryngis radici utrinque ad latus connata.

N Dexter sexti neruorum cerebri paris caudex.


O Sinister sexti paris caudex.

P Dexter nerui ramuli ad arteriam quæ dextræ exporrigitur axillæ, reuoluti, & in unum coeuntes neruum, qui interdum unico constat ramulo.

Q, Q Dexter neruus recurrens.

R Sinistri sexti paris caudicis surculi, qui ad arteriæ magnæ truncum uersus spinam detortum reflectuntur.

S, S Sinister neruus recurrens, qui etiam nonnunquam unico incipit surculo. Reliquæ sexti paris neruorum propagines in nuda cerebri neruorum tabula spectandæ sunt.



Dexter neruus recurrens.

Quum itaque dexter sexti paris neruus thoracis cauitatem ingressus est, atque inter arterias & uenas in iugulo repit, ab interiori ipsius latere^a modo tres,^b modo duos inuicem mox succedentes diffundit ramulos^c reuersiuū dextri lateris neruum constituent. Ramuli enim isti ad^d arteriam quæ in dextrā alam exporrigitur, ueluti ad trochlei rotulam reuoluti, simul coeunt, neruumque unum efformant, ad dextrum asperæ arteriæ latus sursum excurrentem. Quum primum enim ex illis ramulis (quorum loco interdum simplex uisitur) unus cōfiatur neruus, qui dextrum asperæ arteriæ latus petit, & membranæ interuentu ipsi adnexus ad dextrum usque laryngis latus properat^e glandulæ incumbens, quæ alijs glandulis neque colore, neque substantia respondens laryngis radici hinc in dextro latere (uti in sinistro altera) adnascitur. Illico autem atque neruus laryngem contingit, in plures partitur soboles, in sui lateris musculos digerendas. Qui uerò illi sint, posteaquam sinistram recurrentem neruum sermone ad sinistram laryngis latus deduxero, subiungam. Sinister itaque sexti paris neruus iam in thoracis cauitatem ingressus,^f arteriæ in sinistram manum propagatæ ramulos, qui sursum reflecterentur, exporrigere nequit, quod ea oblique sursum, non autem dextræ arteriæ modo, transuersim, in alam contendat. Haudquaquam enim æquè tuta ad obliquum atque transuersum, chordæ aliquis reflexus perficitur. imò hæc si ad obliquum baculum reuoluitur, sensim sursum conscendit,

Sinister neruus recurrens.

^a P. et 2 fig. u. l.

^b 6 fig. lib. 6 b.

^c Q. Q. 2 fig. m.

^d E. fi. cap. 12 lib. 3 Y.

^e M.

^f C. fi. ca. 12 lib. 3 D.

dit, eandem reflexus sedem nunquam seruans: ac proinde sinister neruus tantisper uersus cordis basim descendit, quousque extra cordis inuolucrum arteriæ magnæ contingat^s truncum, qui deorsum ad spinam explicatur. Atque hîc moxⁿ tres, aut etiamⁱ pauciores à neruo educuntur furculi, qui ad arteriæ truncum, quâ is ad spinam deflectitur reuoluti, inuicem uniuntur, ^k sinistrumq; recurrentem neruum constituunt. qui sursum properans, membranæ beneficio asperæ arteriæ sinistro lateri attenditur: ac cùm primùm laryngem contingit, non minus quàm dexter neruus in ramos deriuatur, qui omnes in sui lateris musculos deorsum capitâ habentes cessant. Sunt autem hi, si utriusque lateris musculos iunxeris, quatuor, secundæ cartilagini tertiam neçtentes, quorum beneficio tertia cartilago retrorsum atque in latera ducitur, & laryngis^m lingula adaperitur. Prætereaⁿ duo tertiam cartilaginem primæ iungentes, qui laryngis rimulam, seu lingulam claudunt, ac soli propemodum tunc expirationi obstant, quum egerentes uî spiritum retinemus, ac interim quantum possumus, cæteris musculis expirationem molimur. His præter alios nonnullos accedunt linguæ^o musculi, ab ossis^v referentis medio ut linguam moueant pronati. Quum enim præsentis musculi inferiùs sua sortiuntur capita, atq; deorsum necessariò mouendû corpus attracturi erât, necessum quoq; esse credimus, ut animalis spiritus ab inferioribus partibus sursum quodâmodo ipsis duceretur. Quod quanta industria immêsus corporis nostri Opifex in horum neruorû conuolutione molitus fuerit, & si ex ipsa dissectione, & succincta hac neruorum distributionis narratione, & illa quâ antea exhibuimus tabula dignoscere possis: nihilo minus Galenum, qui hos neruorum inflexus omnium primùm ab ipso inuentos meritò gloriatur, adeundum hortor. Qui in septimo de Partium usu, ueros Deo celebrat hymnos, magisq; attentam requirit mentem, quàm si Eleusinia & Samothracia, uel aliam quancûq; celebrationē diuinâ, æquis auribus astans, intentusq; ijs quæ fiunt dicuntur que à sacerdotibus, audias. Iure enim Galenus sibi persuadet, celebrationē inibi traditam his nulla parte inferiorem esse, neque minus ostendere incredibilem sapientiam & prouidentiam uirtutemque omnium conditoris Dei.

Porro sexti paris nerui postquam reuersiuos exprompsere, ac iam cordis basim spectant, ramulos notatu dignæ crassitudinis^p in pulmonû tunicam ^q & membraneum cordis inuolucrum dispergunt. Item à ramulis sinistram cordis inuolucris sedem implicantibus, atque à sinistro sexti paris neruo depromptis, ^r furculus quidam cordis inuolucrum inibi permeat, ubi id sinistro lateri^s arterialis uenæ unitur. Atque hîc furculus oppidò quàm tenuis, & non nisi accuratissimè sectionem administrantibus obuius, ipsi arteriali uenæ adnascitur, et ad sinistrum ipsius latus uersus posteriora tamen magis exporrectus, in cordis basim fertur, inibi mox in soboles capillorum modo gracillimas consumptus, ac cordis basis superficiei uix proprius. Qua autem ratione illum nimis quàm tenuem neruulum adinuenias, ad sexti libri calcem sedulo exequar, ibidem cordis ipsiq; subministrantium organorum sectionem pertractaturus. Cæterum quod ex neruis sexti paris^t reliquum est, deorsum ad stomachum deferitur: ac dexter quidem dextro ipsius attenditur lateri, sinister autem sinistro. Mox uerò atque hi nerui stomacho membranæ interuentu laxè adnectuntur, singuli in binos partiuntur ramos, adeò obliquè secundum stomachum conuolutos, ut dextri nerui rami sinistram ipsius sedem in progressu obtineant, sinistri autem rami dextram sedem amplexentur. Atque ita quatuor præsentis rami septum transuersum unâ cum^u stomacho permeant, nullos prorsus in transgressu septo furculos offerentes. Verùm sparsa admodum serie superius uentriculi os ^x ambiunt, contexuntq; ramos in priora & posteriora corporis uentriculi spargentes. Ab ijs ramis qui dextrum huius orificij latus implicant, ^y propago utcunque insignis depromitur, quæ per uentriculi superiora secundum ipsius latitudinem inferius uentriculi orificium accedit, in progressu anteriori posterioriq; uentriculi sedibus soboles quasdam diffundens.

Quum uerò illa propago inferius orificium superauit, uenæ portæ instrata in iecoris cauumi ^z properat, ibidem in iecoris membranam tunicam^z ueabsumenda. Dextri nerui sexti paris ^a ramus, quem ante recurrentium neruorum principia costarum radicibus sub tunica costas succingente exporrigi, aliorumq; neruorum per costarum interualla excurrentium^b cōgressu

n 4 augeri



QVONIAM Galenus in horum neruorum descriptione, quemadmodum & nonnunquam a libi, mentionem facit instrumenti glosicomi, nos lectori non incommodaturos diximus, si hunc characterem F, in quo id instrumenti obiter exprimitur, hic interijceremus: unâ cū E, quo instrumentum delineatur brachij, sed potissimum femoris luxationibus restituendis idoneum. Licet hæc alio libro ac argumento tractanda putemus.

Reuersui
nerui cur
sa
cti.

Reliqua
sex
ti paris in tho
racis amplitu
dine series.

Sexti paris
series in nutri
tionis organa.

g B. fi. cap.
12 lib. 3. i.
h R. 2 fi. o.
i 6 figu. lib.
6 c.
k S. S. 2 fig.
p 6 fi. lib. 6
g. g.
l fi. 7 ca. 21
lib. 2. P. R.
m In fig. 11,
12, 13. ca. 21
lib. 2.
n 8, 9 fig. c.
i iij. ca. a, b.
o 1, 2 fi. ca.
19 lib. 1 D.
D.

p 2 fig. q.
q 2 fig. r.

r 6 figu. lib.
6 h.
s euf. fig. 1.

t 2 fig. f. &
14, 15 fig. li.
5 T. V.

u 7 muscul.
tab. 2.

x 2 fig. t.
y 2 fi. u. &
15 fi. li. 5 X.

z 2 fi. x. &
12 fi. li. 5 T.
a 15 fi. Y.
a 2 fi. h.
b 2 fi. i, i.

augeri docuimus, simulatq; septum transfuersum unà cum grãdi arteria prætergressus est, propagines diffundere incipit, ac primam quidem inferiori membranæ omenti offert tranluer-
sim iecoris cauum adeuntem. Propago hæc in ipso ductu inferiori membranæ omenti^d ra-
mum exhibet, qui deorsum tensus, atque in furculos dissectus, tum ipsi membranæ omenti in
dextra parte implicatur, tum etiam colo intestino, ubi id huic membranæ tanquam ad mesen-
terium committitur. Deinde^e alius ramus ab illa propagine duodeno intestino, & ieiuni ini-
tio deducitur adeò gracilis, ut interdum conspici nequeat. Post hunc longè^f crassior superiori
membranæ omenti depromitur, qui dextram sedem fundi uentriculi perreptans, multas sobo-
les uentriculo & ipsi omento communicat. Quod autem primæ illius propaginis adhuc^g su-
perest, iecoris cauo & bilis uesiculæ furculos præbet. Secundam uerò^h propaginem sexti pa-
ris ramus dextrilateris costarum radicibus attensus, in dextrum renem & pinguem membra-
nam ipsi obductam digerit.^k Tertiam porrò dictis iam grandiore diffundit ad dextram me-
senterij sedem, & in intestina mesenterio hîc connata spargendam. Quod autem eius rami^l re-
liquum est, subinde in uesicam, & mulieribus in uteri fundum dextra ex parte cessat. Vesica e-
nim & uterus quoque suos nervos à dorsali medulla in sacro osse deducta mutuuntur. Ad
eundem ferè modum sinistri sexti paris nerui ramus costarum exporrectus radicibus digerit-
ur.^m Propaginem enim inferiori membranæ omenti largitur transfuersim in lienis cauum por-
rectā, quæ in progressu anteaquam lienem contingit, duos diffundit furculos in humiliorem
omenti membranā, & colum intestinum quā uentriculo hîc adtenditur, dispersos. Deinde
° aliam sobolem emittit illis furculis crassiorē, quæ sinistram fundi uentriculi sedem perre-
ptans, uentriculo ipsiq; superiori membranæ omenti (qua etiam soboles ipsa suffulcitur) per
multa germina deriuat. Mox quoque à^p propaginibus lienis cauo se inserentibus, exiles ra-
mulī sinistram uentriculi latus accedunt, illis concomitati uenis ac arterijs, quas à lienem pe-
tentibus uasis huc reflecti, antea diximus.^r Secundam propaginem ramus ille sinistris expor-
rectus costis, mesenterio & sui lateris intestinis offert, & post hanc^s tertiam sinistro reni exhi-
bet, ac demum ipsius^t reliquo sinistram uesicæ ac fundi uteri sedem interdum amplectitur.
A^u propaginibus in mesenterium sparsis, interdum cum^v feminalibus uenis & arterijs furcu-
los ad testes usq; deductos animaduerti. atq; hæc sexti paris neruorum cerebri est series.

DE SEPTIMO PARI NERVORVM

cerebri. Caput X.



ERVORVM cerebri^a septimum ac ultimum par, uti cæteris paribus
durius est, sic quoq; ex duriori enascitur principio. incipit enim aliquot
inuicem distantibus furculis, à dorsali medulla, ubi modò caluariam est
egressura. Hinc in anteriora modicè tensum, & ipsius furculis in unum
coëuntibus, per^c foramen procidit, sibi priuatim exculptum. Simulat-
que uerò septimum id par caluariam superauit, ^d sexto cohaeret pari, &
propagines aliquot dispensat^e musculis qui à processibus stylum imi-
tantibus principium ducunt. ex quorum numero est alter tertij paris musculorum ossi v re-
ferenti peculiariū, isq; qui inferiorem maxillam deorsum trahit, & alius linguæ proprius.
Septimum par hinc ad linguæ usque radicem descendens, in plures diducitur^f soboles, quæ
in linguæ musculos, & ossis v referentis, & in omnes laryngis musculos superiūs non con-
numeratos implicantur, eorumque musculorum motibus præsent. Verum præter illas so-
boles, septimum par non minimam ipsius portionem sexto pari neruorum cerebri ad linguæ
radicem inibi^h offert, sextum par illa portione adaugens.

PRIMA

c 2 fi. y. De
in specta se
riatim 3 &
4 fi. li. 5. u.
bi cū uena
& arteria
horū neruo
rum occur-
rit series.
d 2 fi. z.
e 2 fig. a.
f 2 fig. b.
g 2 fi. *.
h 2 fig. 13
lib. 5.
i 2 fig. 7.
j 20 fig. lib.
5 T.
k 2 fig. 1.
l 2 fig. 1.
m 2 fi. f. &
huius pro-
paginis se-
riem petes
ex 3, 4 &
14, 15 figu.
lib. 5.
n 2 fig. 6, 1.
o 2 fig. t.
p 2 fi. u.
q 15 fi. lib. 5
8. 8.
r 2 fig. u.
s 1.
t u.
u 22, 23 fig.
lib. 5 x, 5
a, 7.

a 1, 2 fi. v, et
9, 14 fi. li.
7 O.
b 1, 2 fig. E.
c 3 fi. ca. 12
lib. 1 d.
d 1, 2 fig. e.
e 2 fi. f.
f 4 mus. ta.
Q. & 5 ta.
H. I. & 1 2
fi. ca. 19 li.
2 F.
g 2 fig. w.

h 2 fig. o.

4
331

DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER IIII.
PRIMA TRIVM FIGVRARVM QVAE
SVBSEQUENTIBVS CAPITIBVS
communes habentur.

P R A E S E N S figura duabus modo consequentibus tabulis, quæ neruorum à dorsali medulla prodeuntium nudam seriem ostendunt, potissimum subseruit. Hac namque sola dorsalis medulla, quam uulgo nucham dicimus, ab ea sede qua è cerebri basi principium sumit, ad extremum ipsius usque finem, ex humiliori sacri ossis sede procidentem delineatur.

A Dorsalis medullæ initium è cerebri basi pronatum.

B Hac sede dorsalis medulla non amplius simplex deorsum ducitur, uerum imaginem refert multorum funiculorum, qui simul commissi rectà tenduntur.

3, 4, 5, 6, 7 His characteribus neruorum radices notantur, à dorsali medulla priusquam è caluaria labatur prodeuntium. Sunt autem radices hæ eorum cerebri parium, quæ singulis characteribus indicantur.


D, 7 **A B** ad **D** in sinistro latere, & ad **7** in dextro latere dorsalis medullæ pars ceruicis uertebri contenta, et septem quoque eius partis parium radices insigniuntur.

E, 19 **A D** ad **E** in sinistro latere, & à **7** ad **19** in dextro, dorsalis medullæ pars ostenditur, thoracis uertebri complexa. Deinde eius quoque partis duodecim parium radices indicantur.

F, 14 **A b E** ad **F** in sinistro latere, & à **19** ad **23** in dextro usque dorsalis medullæ pars notatur, lumborum occupans uertebri, à qua quinque parium radices principium ducunt.

G, 30 **A b F** ad **G** in sinistro latere, & à **24** ad **30**, in dextro dorsalis medullæ pars indicatur, senis sacri ossis ossibus contenta, & sex parium eius partis radices, adeo ut **7**, & **19**, & **24**, & **30** sua serie dorsalis medullæ neruorum triginta paria proponantur.


H Dorsalis medullæ extremum inconiugatum ab ossis sacri fine procidens.




TRIGINTA

TRIGINTA PARI-
 QVAE A DORSALI ME-
 contenta originem ducunt, nuda delineatio
 na cauae & magnae arteriae delineationes
 Capitibus communium figura-

VM NERVORVM
 DVLLA DORSI OSSIBVS
 ea proportione expressa, qua superius ue-
 exhibuimus. Haec trium subsequentibus
 rum secunda numeratur.



**TERTIA TRIVM FIGVRARVM SVBSEQUENTI
BVS CAPITIBVS COMMVNIVM, QVÆ OSSIVM DORSI**
*cōtextum posteriori facie ita commonstrat, atq; modo præcedens eundem anteriori facie oculis
 subijcit. Dein uniuerſa dorfalis medullæ neruorum ſeries hac figura depingitur, quæ ſuperiori
 figura minus oculis ſubiacet, et cui characteres nō ſatis cōmodè illic aſcribi potuere. Cæterum
 in utriſq; figuris dorſalem medullam adhuc in dorſi oſibus repositā finximus, ut neruo-
 rum parium numerus & egreſſus in procinctu ocyus eſſet, quodq; iam dor-
 ſalis medullæ oſibus liberæ effigiem propoſuimus.*



CHARACTERVM DVARVM QVIBVS DORSALIS MEDVLLAE NERVORVM SERIES EXPRIMITUR figurarum Index.

QVONIAM praesens characterum index duabus figuris habetur communis, & nonnulli characteres utrisque communes, alij peculiare sunt, non inopportune has notas 1, 2 pro characterum ratione illis subscribam. et licet numeri characteres in figuris sint obuij, illis subiungendis notis parum obscuritatis accessurum arbitror.

- A** 1, 2 Dorsalis medullae sedes, qua primum uertebrae ingreditur.
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 Septem ceruicis uertebrae. His quoque characteribus dorsalis medullae neruorum paria designantur, quae ad elatiorem sedem eius cui numerus inscribitur uertebrae spectant.
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1 Duodecim thoracis uertebrae.
 20, 21, 22, 23, 24, 1 Quinque lumborum uertebrae.
 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 Sex sacri ossis ossa. os autem quod coccyx dicitur, hic non appinximus, quia spinalem medullam non continet, nullusque neruus ab ipso elabatur. **B** 2 Prima ceruicis uertebra.
C 2 Prima thoracis uertebra. atque ita a **B** ad **C** septem ceruicis notantur uertebrae.
D 2 Prima lumborum uertebra. a **C** uero ad **D** duodecim thoracis uertebrae indicantur.
E 2 Principium ossis sacri. unde etiam a **D** ad **F** quinque lumborum uertebrae in conspectum ueniunt.
F 2 Primi paris neruorum dorsalis medullae iam in uertebrae positae posterior propago.
G 1, 2 Posterioris primi paris propaginis series. notatur autem praecipue ramus ipsius transuersum primae uertebrae processum accedens, inibi in musculos aliquot diggerendus, quos in Capitulum contextus serie explicabimus, ne forte neruorum dorsalis medullae characterum explicatio alioquin prolixa, in immensum excrescat. **H** 1 Anterior primi paris propago.
I 2 Secundi paris posterior propago, atque hoc etiam characterem eius propaginis minor ramus insignit.
K 2 Posterioris secundi paris propaginis crassior ramus.
L 2 Commixtio coitus uel tertij paris rami, **S** in prima figura notandi, cum secundi paris ramo **K** iam indicato.
M, **M** 1, 2 Crassioris secundi paris series ad uerticis & occipitij cutem.
N 1 Anterior secundi paris propago.
 3, 1 Tertium par. **O** 1, 2 Posterior tertij paris ramus retrorsum ad spinam secundae ceruicis uertebrae reflexus, ac inter musculos uertebrae hac sede adnatos latitans. Quando uero spinam contingit, extrorsum fertur per mutuum congressum dextri lateris musculorum ceruicis posteriora occupantium cum musculis sinistri lateris. atque hinc rursus oblique in latera ducitur. Hunc sane ductum omnium parium a tertio hoc, ad uigesimum quartum usque, posteriores rami imitantur.
P 1 Anterior tertij paris ramus, qui in quatuor dirimitur propagines. ac **Q** in priori figura primam indicat musculus ceruicem flectentibus insertam. **R** in utraque secundam propaginem, quae cum quarti paris propagine **Y** notanda coegreditur. **S** in priori tertiam, quae posterioris secundi paris propaginis grandiori ramo **K** notato inibi commiscetur, ubi **L** in secunda figura scripsimus. **T** in utrisque quartam anterioris tertij paris rami insinuat propaginem musculus inserta, qui transuersis uertebrae committuntur processibus.
 4, 1 Quartum par. Veritus ne characterum copia praesentes neruorum tabulas nequiquam profecto casu partas, nec alijs plagio suffuratas oblitteraret, quarti paris characteres in sinistram latem reieci, ut dextrum latem alioquin pluribus oneratum characteribus, hac saltem sede liberum esset, ipsique quinti paris & subsequentium parium indices opportuni accommodarentur.
V 1, 2 Posterior quarti paris ramus.
X 1, 2 Anterior quarti paris ramus in ternas diremptus propagines. **Y** in priori figura indicatur, prima propago, tertij paris propaginem **R** insignitam admittens. **a** in eadem secunda propago in musculos dispersa, transuersos uertebrae processus occupantes. **b** similiter in priori tertia propago, quinti paris portionem e notandam, ad septi transuersi nerui constitutionem accedens.
 5, 1 Quintum par. **c** 1, 2 Quinti paris posterior ramus.
d 1, 2 Quinti paris anterior ramus, ab ipsius interno latere ramulum musculus ceruicem flectentibus exporrigenens, qui inter **d** & characterem **6** est conspicuus.
e 1 Propago anterioris quinti paris rami, maximam constituens portionem septi transuersi nerui.
f 1, 2 Anterioris

*f*_{1,2} Anterioris quinti paris rami propago, quæ inter musculos occultata ad summum perrepat humerum. Characteres illi in secunda hoc modo *r*, *r* conspicui, huius propaginis soboles notant, musculis scapulam attollentibus oblatas.

*g*_{1,2} Propaginis *f* notatæ ramus in cutem exporrectus, quæ summum integit humerum, & musculum quo brachium attollitur.

*h*_{1,2} Propaginis *f* notatæ ramus musculi brachium attollentis parti insertus, quæ à clavicula & summo humero, quæ is claviculæ articulatur, principium ducit.

*i*_{1,2} Propaginis quam *f* insigniuius ramus, brachiū attollentis musculi parti insertus, quæ à scapulæ spina exorditur: soboles autem rami *i* notati quæ in brachij cutem exporrigitur, cum brachij neruorum notis *π* & *π* in utraque figura indicabitur.

6.1 Sextum par.

*k*₂ Posterior sexti paris ramus.

l, m Nescio qua incuria *l* & *m* in prima figura omiserim, num scilicet in apponendis characteribus eos præterierim, quum in sinistro latere fortassis illos adhibitos arbitrarer: an uero appositos sculptor non expenderit. Vtunque sit, ad sinistrum latus e, tuo Marte adscribes *l*, ut sexti paris anteriorem indices ramum. *m* uero accommodabitur illi surculo, quem à sexto pari uersus *n*, hoc est septi neruum, deduci conspicias. Atque id figura hic inserta monitus, multo præstiteris facilius, quam ego, delineationem forte uitiaturus, & nihil interim promoturus, iam sculpta ac prælo subiicienda tabula *l* & *m* cæteris characteribus adijcere possem.



n, n1, 2 Septi transuersi neruus ex tribus surculis *b, e* & *m* conflatus. Quod uero utriusque lateris neruus & in priori figura & in posteriori obliquo ductu incedat, hinc fit, quod intersepientes thoracem membranæ propter cordis inuolucrum quod inibi amplexantur, hac sede extuberant.

o, o1 Septi transuersi nerui in septum series.

*p*₂ Sexti paris ramus cauam scapulæ sedem petens, & uarijs oblatus musculis.

*q*_{1,2} Anterioris sexti paris rami cum proximorū pariū ramis implexus, portioq; brachiū accedens.

7.1 Septimum par.

*r*₂ Posterior septimi paris ramus, similiter atque alij huius sedis rami sparsus.

*s*₁ Congressus septimi paris cum proximis paribus, qui neruos in brachium deducit.

t, t, t2 Propagines sunt septimi paris, seu potius nerui brachium petentis tertij, ac *r* notandi, quæ in huius sedis musculos scapulam & brachium mouentes accedunt.

8.1 Octauum par, seu parium dorsalis medullæ in thoracis uertebriis repositæ primum.

*u*₂ Posterior octauī paris ramus.

*x*_{1,2} Octauī paris congressus cum septimo pari, à quo in brachium aliqui exporriguntur nerui.

*y*₁ Octauī paris propago secundum superiorem primæ thoracis costæ sedem ad pectoris usque summum prorepens.

α, α2 Surculi octauī paris, seu potius quarti brachium adeuntis nerui, qui in huius sedis musculos diffunduntur.

9.1 Nonum par.

*β*₂ Posterior noni paris ramus.

*Δ*₁ Ne *γ* uicinum ipsi *γ* offenderet, anteriorem noni paris ramum *Δ* insigniuius, hic quoque notantes eius rami propaginem primæ costæ exporrectam.

*ζ*₁ Propaginis *Δ* insignitæ surculi, in musculos thoraci hic instratos protensi. Verum huiusmodi surculi in subsequentibus paribus exprimentur dilucidius.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.1 Paria neruorum à nono pari ad uigesimum usque notantur, quibus eadem penè propaginum, & potissimum ad costarum interualla est series.

u, u1 Surculi intercostalium neruorum sexti paris neruorum cerebri ramum augentes, qui sub tunica costas succingente costarum radicibus exporrigitur.

θ, θ, θ1 In dextro prioris figuræ latere rami notantur, ab intercostalibus neruis in musculos uaria serie excurrentes, qui thoraci insternuntur. Verum in sinistro latere paulo expressius eiusmodi ramos insigniui. Nam *ι* & *ι* ramos indicant in elatiorem partem exporrectos musculi brachium

κ, κ. pectori adducentis, cuius fibræ deorsum oblique, ut & præsentis rami, porriguntur. *κ* uero &

λ, λ. *κ* rami indicantur in humiliorem eius musculi sedem excurrētes, ac oblique sursum reflexi. Por

μ, μ. *ρ* & *λ* rami ostenduntur, oblique descendenti abdominis musculo exporrecti. *μ* & *μ* rami insinuantur in musculum propagati, cuius ope brachium uersus dorso humiliora ducitur. At

o eiusmodi

eiusmodi uarij spectatuq; iucundissimi ramulorum ductus & inflexus ex ipsa potius sectione, quàm hinc ubi omnes delineari nequeunt, obseruandi ueniunt.

- v 1 In dextro latere v ponitur, indicaturum nerui sobolem papillæ elargitam.
- o, o 1 Ramuli à decimo octauo pari & decimonono, principium accedentes musculi femur mouētium sexti.
- π, π 1 Primus neruus brachium accedēs, qui in externæ brachij sedis cutē digeritur. Verùm in utraq; figura p secundus brachium subingrediens neruus erit, τ tertius, Φ quartus, * quintus, & sextus.
- ρ 1, 2 Secundus brachium petens neruus, quem Galeno plus satis tribuens, graciliorem quàm oportuit expressi, secus quàm in figura huius libri calci insuta.
- ς, ς 1 Secundi nerui propagines, quæ capitibus anterioris cubitum flectentium musculi digeruntur.
- τ 1, 2 Tertius brachium accedens neruus. Quòd uerò secundus & tertius neruus paulò magis quàm natura se habent in brachij exteriora delineati sint, in hoc factum putato, ut nerui inuicē in pictura magis quàm natura distantes, omnia ad amussim oculis subijciant.
- υ 1 Tertij nerui propago in cutem excidens, inter musculum pectori brachium adducentem, & eum qui brachium sursum ducit.
- φ 1 Tertij nerui ramulus capiti oblati, musculi cubitum flectentium posterioris.
- χ 1 Tertij nerui propago, in cutem anterioris brachij sedis diffusa.
- ψ 1 Hic congressus tertij nerui portionis cum secundo notatur. uerùm iam sæpius obseruauimus tertium neruum à secundo augeri, uti in figura etiam pinxi, quæ huius libri calci adhibetur.
- ω 1 Secundus neruus post congressum ipsius portionis cum tertio neruo deorsum prorepens.
- Γ 1 Secundi nerui surculus capiti exporrectus oblongi, & radium in prouum ducentis musculi.
- Δ 1 Nerui secundi ramus secundum radium ad brachiale usq; properans, ac externam primi pollicis internodij sedem sub cute inibi ascendens, ubi humiliter Δ reponitur.
- Θ 1 Nerui secundi ramus, iam dicto ac Δ insignito crassior: qui mox in duas propagines, Λ nimirum & Ξ diuiditur.
- Λ 1 Rami quem Θ insigniui elatior propago, sub cute secundum internum latus repens musculi oblongi, & radium in prouum ducentis.
- Ξ 1 Rami Θ insigniti inferior propago.
- Π, Σ 1 Inferioris illius propaginis Ξ notatæ duo præcipui rami, secundum internam cubiti sedem ad uolam usq; frequenter exporrecti, quemadmodum & in dextra delineatum est manu.
- Φ 1, 2 Quartus brachium subiens neruus. Huius nerui propagines etiam si accuratè in utraque delineatæ sint figura, posteriori tamen duntaxat characteres adhibiturus sum, ne prior figura plus satis hic obfuscetur.
- Ψ 2 Quarti nerui propagines musculis interdum extendentibus diffusæ.
- Ω 2 Quarti nerui ramus in cutem posterioris brachij & cubiti articuli sedis exporrectus.
- 32.2 Quarti nerui propago cutem accedens humiliori sedi externi lateris brachij obductam.
- 33.2 Quarti nerui soboles in exterioris cubiti regionis cutem ad brachiale usq; protensa.
- 34.2 Diuisio quarti nerui, quæ iam externo humeri tuberculo insidet.
- 35.2 Elatior dictæ modò diuisionis ramus.
- 36.2 Elatioris rami 35 notati, in exteriorem pollicis, indicis & medij sedem propaginum series.
- 37.2 Demissior ramus diuisionis 34 indicatæ, qui ulnæ exporrigitur.
- 38.2 Propagines commonstrantur demissioris rami 27 insigniti, quæ musculis inseruntur, ab externo humeri tuberculo initium ducentibus.
- 39, 40, 41. 2 His notis propagines notatur demissioris illius rami qui ulnæ exporrigitur, quas offert triū musculorum initijs, ab externa ulnæ regione secundum ipsius longitudinem pronatis.
- 42.2 Rami illius ulnæ exporrecti, ac 37 insigniti finis, ac surculi, quos articulo brachialis cum cubito præbet.
- * 1, 2 Quintus brachium ingrediens neruus.
- 43.1 Tertij & quinti brachij accedentium neruorum series, in musculos internam cubiti sedem occupantes.
- 44.1 Tertij nerui ramus radio exporrectus, ac postmodum in internam sedem pollicis, indicis & medij digestus.
- 45.1 Quinti nerui ramus ulnæ attensus, & propagines deriuans internæ sedi minimi digiti, & annularis, & medij.

Rami illius qui ulnæ attenditur, ac 45 insignitur, propago externæ sedi minimi digiti, & anu-

46.1 laris, & mediæ oblata.

81.2 Sextus in brachium pertinens neruus.

47.1 Sexti nerui finis, non procul à brachialis cum cubito connexu desinens.

48, 48.1 Surculi passim à sexto neruo in cutem, cui is exporrigitur, excurrentes.

20, 21, 22, 23, 24.1 Quinq; paria neruorum è lumborum uertebis egredientium.

49, 49.1 A uigesimo pari principium ducens ramus, cum seminali arteria ad testem exporrectus.

50, 50.1 Series neruorum per abdominis musculos.

51.1 Rami à neruis qui abdominis musculis offeruntur, in musculum excurrentes, quo brachium uer-

sus dorsi humiliora ducitur.

52, 52.2 Posteriores rami neruorum è lumborum uertebis procedentium. Porro ramuli qui in priori fi-
gura hos characteres 20, 21, 22, spectant, illi sunt qui ramum augent sexti paris neruorum cere-
bri costarum radicibus exporrectum, ac etiam ramuli sunt digesti in principium sexti femur mo-
uentium musculi. Ramuli autem 23 & 24 spectantes, illi sunt qui musculis hanc dorsi partem fle-
ctentibus offeruntur.

25, 26, 27, 28, 29, 30.1 Sex sacri ossis neruorum paria. Ramuli illi qui numero proximi sunt, illi censen-
tur, qui uesicæ & uteri quoq; ceruicibus implicantur, aniq; musculos pariter accedunt.

53.1 Primi paris ossis sacri, seu uigesimi quinti paris propago, internæ ilium ossis sedi, ipsisq; adeo
abdominis musculis hinc ab ilium osse prodeuntibus exporrecta.

54.2 Vigesimi quinti paris propago, gibbum ossis ilium accedens, & musculis inibi cluniumq; cuti ra-
mos offerens. Huc & à subsequentibus paribus ramuli pertinent.

55.2 Ramus est propaginis 54 insignitæ, qui hic musculis offertur.

56.1, 2 Dorsalis medullæ terminus absq; coniuge, indiuisusq; procidens.

57.1 Primus femur subiens neruus.

58.1 Primi femoris cruris ue nerui ramus cutem accedens.

59.1 Primi cruris nerui portio musculis implicita.

60.1 Secundus in crus prorepens neruus.

61.1 Secundi cruris nerui ramus, secundum internam femoris & tibiæ sedem ad summum usq; pedem
sub cute prorepens.

62.1 Rami 61 insigniti, in pedis summum distributio.

63.1 Rami 61 insigniti, notatu dignæ soboles cuti anteriorem genu sedem ambiendi digestæ.

64.1 Secundi crus petentis nerui portio, femoris profundiora subintrans.

65.1 Portionis illius quam 64 notauimus ramus facile primarius, ac quinto femur moueti insertus
musculo.

66.1 Tertius in femur pertinens neruus.

67.1 Tertij crus petentis nerui soboles, in musculos digestæ, pubis ossis foramen occupantes.

68.1 Tertij femoris nerui ramus in cutem exporrectus.

69.1 Tertij femoris nerui portio in alto permanens, & musculis implicita.

70.1 Præcipua modo dictæ portionis soboles musculo distributa tibiam mouentium secundo.

71.1, 2 Quartus, idemq; crassissimus in femur procedentium neruus.

72.1, 2 Quarti nerui propago in posterioris femoris sedis cutem magna ex parte diffusa.

73.1 Quarti nerui soboles in musculorum capita depromptæ, quorum origo à coxendicis ossis appen-
dice pendet.

74.1 Quarti nerui ramus, primum quarti tibiam mouentis musculi portioni à femoris osse principium
ducenti oblatus, ac mox in cutem excurrent, quæ inferiori sedi obducitur, posterioris regionis
femoris & genu articuli.

75.1 Rami quarti crus petentis nerui, qui capitibus offeruntur musculorū, ab inferioribus femoris ca-
pitibus principium ducentium.

76.1 Quarti nerui in duos crassitie impares ramos diuisio, quam inter humiliora femoris molitur
capita.

77.1 Gracilior ac exterior dictæ modo diuisionis truncus.

- 78,78.1 Exterioris trunci propago, cutem subiens externæ tibiæ sedi obductam.
 79.1 Exterioris trunci propago cuti subtenfa, anteriorem tibiæ sedem ambiens.
 80.1 Interior crassiorq; truncus magnæ quarti nerui diuisionis.
 81,81.1 Interioris trunci propago cuti tibiæ postèrius integenti substrata.
 82.1 Propago exterioris trunci, interiori trunco commixta.
 83.1 Interioris trunci in pedis humiliori sede distributio.
 84.1 Portio rami 78 notati, pedis superiora accedens.
 85.1 Portio interioris trunci, quæ cuti exporrigitur anteriori sedi articuli obductæ, quo talus tibiæ articulatur.
 86.1 Interioris trunci ramus, pedis superiora accedens, sed interim in alto latitans. Qua autem ratione interioris exteriorisq; truncorum series subinde uariet, in ipso decimiseptimi Capitis contextu sum explicaturus. Præter figuras, quarum modò indices expressi, subsequentibus Capitibus mirè ea confert, qua præsentì libro colophonem additurus sum. Quamuis enim illa non ad hunc librum, sed ad Epitome sit parata, quia tamen postremam & forte etiam ueriores ipsam delineauì, non ab re me facturum duxi, eius notas aliquando in margine subsequentium Capitum ponere.

DE DORSALI MEDULLA ET NERVO-
 rum ab ipsa prodeuntium numero. Caput XI.

Dorsalis me-
 dullæ ab ossi-
 medulla diffe-
 rentia.



Dorsalem me-
 dullam procre-
 andi neces-
 sitas.

Dorsalis qui
 munienda.

Ossibus.

Membranæ
 inuolucris.

DORSALIS^a medulla neruorum modo substantiæ cerebri^a qua originē^{a1 figura.} sumit correspondens, quanto magis à cerebro recedit protenditurq; tan-
 to (neruorum etiam ritu) compactior duriorq; efficitur. Variat enim plu-
 rimum ab aliorum ossium medulla impense humida, propemodumq; flu-
 xili, siquidem hanc, & præcipue ipsius substantiam molliorem pingue-
 dini, uel adipi assimilēs licet in ossium sinibus nutriendi humectandiq; gra-
 tia asseruato. Quapropter ex hac nullum prorsus neruum neq; durum ne-
 que mollem exoriri reperiēs. Quinetiam præsens medulla nec cerebri, aut dorsalis medullæ in
 uolucris obtegatur, nec præterea ipsi adeò dignæ notatu arteriæ ac uenæ obtenduntur. Quapro-
 pter etiam nulla ratione cerebro & dorsali medullæ similis est, neq; ulla illi cum sensus organis
 aut musculis communio existit. Quum interim dorsalis medulla non paruam cum musculis
 communionem sibi uendicet. Quippe si rerum Opifex hanc non produxisset, duorum al-
 terum subsequeretur. aut enim omnes corporis partes capite inferiores, ac à^b neruis sextipa-
 ris neruorum cerebri propagines nullas admittentes, motu destituerentur arbitrario, tri-
 stantiumque sensu priuarentur; aut neruum in singulas partes à cerebro deriuari necessum
 esset. Verum si motu carerent, tunc homo non amplius animal, sed lapideæ luteæ ue cor-
 responderet statuæ. A cerebro autem in singulas partes exiguum & grandem neruum por-
 rigere, artificis esset neruorum securitatem nihili pendentis. Nam non solum gracilem ner-
 uum, ut qui rumpi confringique possit, longo progressu deduci non erat tutum, uerum ne
 aliud quoddam ualidorum etiam organorum, & minus adhuc uenam aut arteriam. Hæ
 enim ut dorsalis medulla à propria origine grandes amplæq; enascentes instar caudicis in pro-
 gressu uariè diffcinduntur, & quum corporis partibus appropinquant, furculos singulis par-
 tibus offerunt, qui materiam ipsis à principio oblatam communicent. Vnde etiam satius fuit
 dorsalem medullam uelut fluuium aliquem, ex fonte nimirum cerebro effluentem, per eam se-
 dem qua transit geniculatim neruos tanquam sensus & motus arbitrarij uectores germinare,
 uti modò rerum Opifex probè est molitus. Cæterum quando dorsalis medulla instar alterius
 cerebri omnibus propemodum partibus sub capite positis censetur, hanc quoq; oportebat si-
 militer ac cerebrum^d duro & ferendis iniurijs pertinaci munimēto, ac uelut propugnaculo cin-
 gi. Cuiusmodi uerò id sit, in primo libro, dum dorsi uertebrae structurā prosequer, abun-
 de dictum est. Præterea duræ etiam membranæ dorsalem medullam amplexantur, ijs omnino
 specie respondentes, quibus cerebrum obuoluitur, etiam si distantia inuicem non congruant.
 Crassam enim seu duram cerebri membranā à tenui in caluaria distare, gratia distentionis con-
 tractionisq; uasorum tenuis membranæ, & ipsius adeò cerebri, in septimo libro declarabitur.
 In uertebrae autem sinibus, ubi membranæ dorsalem medullam ambiunt, dura tenuem con-
 tingit. Atque hoc uno inuicem membranæ pugnant; ac eo præterea, quod tertium quoddam
 inuo-

b1, 2 fi. ca.
 2 e.

c fig. cap. 2
 lib. 3 B. fig.
 ca. 6. B, D,
 f. fig. ca. 12
 A.
 d figu. cap.
 14 lib. 1.
 e In priori.
 bus fi. li. 7.

inuolucrum egregie ualidum nerueum que duabus illis quæ dorsali obducuntur membranis, extrinsecus circunducatur. Neque profectò incassum hæc molitur Natura: quippe quum dorsalis medulla quædam cum cerebro obtineat communia, quædam peculiaria: in communibus quidem communis est fabrica, in peculiaribus autem propria ac differens. Sunt porrò communia, substantiam corporis similem habere, & neruorum esse principium. Peculiaria uerò, moueri quidem cerebrum, ac pulsare naturali quodam motu, non secus atque cor: & cerebrum interrim immobili ossè comprehendi, non moueri uerò dorsalem medullam uertebri quæ mouentur inclusam. Meritò itaque ipsis pari ratione, duæ membranæ, dura nimirum & tenuis, circumuoluuntur: una quidem præcipuè, ut colliget simul uasa quæ in eis excurrunt, & totam eorum substantiam utcunque mollem constringat: alia, ut inuolucrum efficiatur, & à circumdati ossibus muniatur, ipsa que etiam ossa & cerebrum & dorsalem medullam ambient, uelut propugnaculum quoddam & murus, sufficiens citra noxam excipere impetum eorum quæ aut secare, aut frangere, aut aliter nocere possunt. Cæterum quoniam cerebrum tenuisq; membranæ uasa pulsant crassam membranā, tanto interuallo à tenui mēbrana in caluaria priuatim distat, quantum ipsis dum dilatantur, suscipiendis sat sit. Quoniam uerò dorsalis medulla non pulsatur, neque distenditur, utraque membranæ simul coeunt coalescuntq; ne minimum quidem mutuo distat. Porro quod nullus qui sensu dignosci queat, motus capitis ossibus adsit, in uertebri uerò motus sit uariis, dorsali medullæ tertium id inuolucrum, cuius paulo antè meminimus, obductum uisitur. Nam nobis dorsum inclinantibus, ob id quæ etiam dorsali medulla necessario flexa tensa que, hæc promptè nullo eiusmodi inuolucro succincta frangeretur. At dorsalem medullam unicam (uti & cerebri sedes, à qua principium ducit, unica simplex que est) iuste à Natura factam esse, neminem latere arbitror, quum homini duo dorsa procreari fuisset planè ridiculum, atque ad plurimas actiones ineptum, quod quæ dorsalis medulla ualidior per uertebbras simplex, quàm gemina prorepat. Quàm uerò sit Galeni ratio uana, quæ cerebellum simplex esse docet, ut unica fieret dorsalis medulla, in septimo libro explicabimus. Quanquā sane & hoc loco hominis medulla dorsalis ueniat expendenda, si quidem per totam ceruicem & ad thoracis usque medium aliquando & inferius nonnihil, simplex ac indiuisa mollis que ad huc deorsum fertur, neruos duntaxat geniculatim à se diffundens. Quum uerò thoracis medullæ perrepsit, ut duris ac motui potissimum seruientibus propagandis neruis idonea redderet, non simplex amplius, sed in innumeras secta soboles descendit, non aliter profectò quàm si frequentes multas que tenuissimas chordulas simul recta tensas membranæ cuiuspiam illigares, ac deinde per singula foramina per quæ nerui prosiliunt, unam atq; alteram chordulam ex mutuo illo connexu tantisper distribuere, quousque unica tantum superesset chordula, dorsalis medullæ fini respondens. Ad eum nanque modum dorsalis medulla in neruos absumitur, qui per foramina in uertebri exsculpta elabuntur. Quanto autem artificio hæc concinnata sint, partim in primo libro exequutus sum, partim uerò in sequentibus Capitibus recensere conabor. Cæterum nerui, quos dorsalis medulla per uertebbras ducta, ac paulatim in progressu gracilescens distribuit, resectionis professoribus sexaginta, & interdum quinquaginta octo enumerantur, modò triginta, modò uiginti noue complexi paribus. A dorsalis enim medullæ sede septem ceruicis contenta uertebri, septena exiliunt paria. A medullæ autem sede per thoracis uertebbras, duodena dependent paria: à quinis autem lumborum uertebri, quina: ab ossè sacro sena. quamuis interim quinque inferiora ossis sacri neruorum paria, si quando id sex efformetur ossibus, quodammodo gemina dici possint, quum nerui utrinque antrosum & retrorsum ducantur ab una radice uix enati. Dorsalis uerò medullæ terminus ex ossè sacro procidens, neruus non censetur, neque in ramulos qui neruorum nomen merentur cessat: quanquam aliquando illum iam ex sacro ossè decidentem in tres impensè breues furculos diffundi uiderim, tunc sacro ossè quinque solum ossibus conformato. In canibus autem & alijs animalibus, pro dorsi ossium numero neruorum dorsalis medullæ parium frequentia quæque differt. Vt nihil de Galeni libris de Partium usu sententia dicam, quando os sacrum quatuor tantum ossibus formari arbitratus est, nullum que aliud os illis subijci scriptum reliquit. Ex illa enim sententia colligere promptissimum est, quàm aliorum Anatomicorum placitis, dum illos libros nobis tradidit, anxie institerit, quàm que inuicem consona nobis scripta reliquerit.

Quæ dorsalis
cum cerebro
habeat cōmunia,
& quæ sibi
peculiaris.

Dorsalis er
unica.

Li. 8. de Vsu
partium.

Vbi dorsalis
ueluti è multis
funiculis com
pingitur.

Quot neruo
rum paria à
dorsali discin
dantur.



Quam uiam
Natura pri-
mo parauerit
pari.

Secundi pa-
ris egressus et
series.

MOD O' haecenus^a memoriae non exciderit primae ceruicis uertebrae cum occipitis osse, & secundae item uertebrae cum prima superius traditae articulationis species, merito in praesentia Naturae prouidentiam sedulo admiraberis, quae primo ceruicis pari, & secundo, non caeterorum ceruicis aut thoracis neruorum ritu, sed peculiari quodam, duarum primarum uertebrae articulationibus impedita, uia inculpsit, ac duos, utriusque paris, quemadmodum & in sacro osse utrinque machinata sit exortus: unum quidem anteriori corporis sedi, alterum uero posteriori exporrigens. Quippe ut * posteriori primi paris propagini concinne uia prae pararetur, Natura in primae uertebrae eminentiori sede ad radicem posterioremque regionem ipsius cum capite articulationis sinum caelauit, atque hinc etiam occipitis ossi sinum inculpens foramen effecit primae ceruicis uertebrae, ipsi quoque occipitis ossi commune. Ne si fortasse integrum foramen tenui illi uertebrae (uti in canibus, quibus gravior est uertebra, euenit) inculpsisset, ipsa quum alioquin magno indigeat robore, multis perforationibus inualida redderetur. Quinetiam quo foramen id arctius esse possit, Natura posteriorem primi paris exortum gracilem effecit, eumque in musculos duntaxat distribuit, qui a prima ceruicis uertebra in occipitis os inseruntur, & eos qui ab occipitis osse in transversos eius uertebrae processus implantantur: aut, ut clarius dicam, in quarti & quinti musculorum caput mouentium parium musculos, praesens propago spargitur. ac dextra quidem propago in dextrilateris deperditur musculos, sinistra autem in sinistris: quod etiam tota neruorum serie semper, nisi aliud addidero, subaudiri uelim. Caeterum ab hoc posteriori primi paris exortu seu propagine furculus etiam deducitur in principium musculi a transuerso primae ceruicis uertebrae, & aliquot subsequantium uertebrae principium sumentis ac scapulam sursum attrahentis. Altera primi paris propago non semper conspicua, nimis quam gracilis est, atque ab anteriori dorsalis medullae regione enata, excidit inter primam ceruicis uertebrae & occipitis os, iuxta latus teretis ligamenti secundae uertebrae processum (quem denti assimilamus) occipitis colligantis. Haec propago uti gracillima est, ita etiam mox in musculos absumitur, qui anteriori uertebrae sedi obnati, dorsum mouentium primum par recedunt. Secundum neruorum par, quando prorsus ex lateribus subsequantium parium modo pronasci nequiuit, utpote ab articulatione duarum superiorum uertebrae offendendum, aut quod si foramen inibi uertebrae esset insinuatum, articulationis robur omnino infirmaretur, Natura uertebrae noxam fugiens, secundum par ut frequentius, binis exortibus seu propaginibus exoriri operae precium putauit. ac posteriorem propaginem, quae anteriori longe est crassior (quanquam & ipsa gracilis uisitur) per latera posterioris secundae uertebrae processum, quem spinam uocamus, eduxit, ibidem opportunissimum tutissimumque iter (uti in primo docuimus libro) machinata. Praesens propago quum utrisque primi paris propaginibus crassior sit, in plures quoque diuiditur ramos. Simulatque enim prodijt, in duos crassitie impares discinditur, ac crassior a prioribus quodammodo ad posteriora sursum transuersim tendit, ex spinae nimirum secundae uertebrae lateribus, uersus spinam medium, ubi mutuus est utriusque lateris musculorum posteriorem ceruicis regionem occupantium congressus. Ramus iste tertij paris sobole huc exporrecta coauctatus, ac ex dictorum iam musculorum medio in exteriora prolapsus, contrario penitus ductu ex posterioribus sursum in priora ad caput contendit, atque inibi in uniuersam capitis cutem tam quae circa aures, quam quae post aures ad uerticis usque summum habetur, furculos spargit. Huius rami progressus accurate propter subsequantium parium seriem uenit perpendendus. Ab illis enim paribus rami a uertebrae lateribus ad ipsarum spinas pertingunt, & hinc recta extrorsum per mutuum musculorum utriusque lateris congressum, & rursus hinc a spinarum seu posteriorum processuum apicibus, dorsum medio antrorsum seu uersus corporis latera ascendant, & in musculos digeruntur a spinarum apicibus principium ducentes, uti subsequens neruorum series ordine doctura est. Caeterum posterioris secundae paris propaginis minor ramus in proximorum musculorum principia diuarcatur. sunt autem illi tertij & sexti paris musculi, eorum quos capitis motibus praesse diximus. Anterior secundae paris propago admodum gracilis, ab anteriori dorsalis medullae sede originem mutuatur, atque inter secundam & primam elabitur uertebrae ad latus radicis, eius secundae uertebrae processus, quem denti comparamus. Digeritur autem haec propago mox in musculos anteriori ceruicis uertebrae sedi adnatos, qui primum par musculorum dorsum motus autorum constituunt. Tertium

^a Hanc si o-
pus erit, ex
figuris ca.
15 li. 1 repa-
rabis.

³ fig. F.
^b 3, 11 fi. ca.
15 li. 1 v.
^c 1 fi. eiusd.
cap. H.

^d 14. musc.
ta. G, F.
^e 14 tabula
H, L.

^f 3, 3 fig. G.
^g 13 muscu.
ta. Q.
^h 2 fi. H.

ⁱ fi. ca. 30 li.
2 l.
^k 8 musc. ta.
A, B.

^l 3 fi. I.
^m 2 fi. N.

ⁿ 10, 11 fig.
ca. 15 li. 1 r.
sinus autem
4 fig. q. &
6 fig. p.
o ad 13 fig.
p 3 fig. K.
q 2 fig. S.
r 3 fig. L.

^s 2, 3 fi. M.
M.

^t Petes haec
ex 3 figurae
medio.
^u 3 fi. super
et ad fini-
stram I.
^x 14. musc.
tabu. A, B.
K, L.

^y N.
^z 11 fi. cap.
15 li. 1 m ad
latus r.
^a 8 ta. A, B.
^b 2 fi. cha. 3.

neruorum à dorsali medulla prodeuntium par ex^c communi foramine secundæ ceruicis uer-
tebræ & tertiæ procidit, mox ab egressu in duos discissum ramos.^d Posterior retrorsum flec-
tur, ac inter musculos ceruicē extēdentes, qui dorsum mouentiū septimus & octauus enumerā
tur, ac deinde inter caput mouentium^f secundum par occultatus, ad secundæ uertebræ spinam
contendit, atque hinc ex mutuo musculorum posteriorem ceruicis sedem occupantium con-
cursu in posteriora excidens ad ceruicis properat latera,^g musculo suffultus, qui ex carnea con-
stitutus membrana buccarum motus opifex censetur.^h Anterior aut tertijs paris ramus, in qua-
tuor spargitur propagines, acⁱ prima musculos dorsum mouentium primum ac secundum im-
plicat.^k Secunda propago decliuis ducta, quartum adit neruorum par, cuidam ipsius furculo
commiscenda, in dictos nuper musculos absumpto.^l Tertia autem sursum contendit, ac po-
sterioris secundi paris propaginis ramo in uerticis cutem excurrenti congreditur, unā cum illo
(uti prius dictum est) dispergenda.^m Quarta autem tertijs paris anterioris ramī propago inⁿ mu-
sculos digeritur, qui transuersis uertebrarum processibus connati, ceruicem in latera mouent:
& eum pariter qui à transuersis uertebrarum ceruicis processibus principium ducens, scapu-
lam sursum uellit.^p Quartum ceruicis neruorum par ē communi tertiæ & quartæ uertebræ
foramine excidens, tertio pari similiter in duos partitur ramos.^q Posterior aliorum qui re-
trorsum ad spinam inter musculos occultati reflectuntur modo, uersus tertiæ ceruicis uertebræ
spinam contendit, in progressu illis quibus intertextitur musculis, furculos diffundens. Quādo
aut spinam contingit, per mutuum elabitur congressum, musculorum posteriorem ceruicis re-
gionem occupantium, atq; hinc in latū membranēq; digeritur musculus buccarū motus au-
torē præcipuū.^r Anterior aut quarti paris ramus, ternas educit propagines, ac^s unā promit, cui
tertijs paris^t propago commiscetur, quæq; in musculos deperditur stomacho substratos, ac cer-
uicem flectentes.^u Secundam uerò propaginem in musculos distribuit uertebrarum lateribus
adnatos: cuiusmodi sunt quorum beneficio ceruix in latera ducitur, ac is qui à transuersis colli
uertebrarum processibus principium ducēs, scapulam sursum allicit.^x Tertia propago duabus
nuper dictis gracilior, decliuis fertur, cum quinti paris^y sobole congressura, ac simul cum illa et
sexti paris^z propagine septi transuersi^a neruū constitutura.^b Quinto pari, quod prædictis qua-
tuor succedit, quinta uertebræ cum quarta uiam præbet: ipsum uerò similiter atq; quartum in
duos discinditur ramos, ac^c posteriorem ad spinarum apices retorquet, eodem prorsus modo
digerendum, quo posteriorem quarti paris ramum digeri diximus. At^d prior anterior ue quin-
ti paris ramus, primum^e sobolem spargit musculis ceruicem flectentibus, dein^f grandiorē de-
promit, qui deorsum repens ramulos utriusq; uicini paris, quarti nimirum & sexti excipit, & il-
lis adauctus,^g neruum^h septi transuersi efformat, qui præcipua quinti paris constat propagine,
& exigua sobole quarti paris, & item exigua sobole sexti. Interdum uerò & septimi paris furcu-
lus septi transuersi neruo accedit, at tunc quarti paris soboles ipsi nulla offertur. Atq; hæc sanè
regio admodum industriè septo trāuerso neruos elargitur. Variat enim id à cæteris musculis
non figura solum, uerum & functione. Orbicularis enim formæ (uti in secundo recensui-
mus libro) uisitur, & situ obliquo donatur. Mox caput ipsius à quo fibræ dependent, non ut
quispiā arbitraretur, ex pectoris osse, aut costarū cartilaginibus, aut uertebrarum corporibus
educitur, sed in mediā totius septi regione, quæ neruosa est, id consistere nobis persuasum ha-
bemus. Ac proinde neruos fibris illis motum largituros, eò prorepere ab alto operæ precium
fuit, ut in uniuersam ipsius sedem suam uim ex æquo diffunderent. Si uerò Natura neruos se-
pti partibus, quæ pectoris ossi, costis & uertebris connascuntur, inseruisset, septi finis in ipsius
medio haberetur: quū neruos in musculorum initia potius quàm fines exporrigi, Anatomes
professoribus axioma sit. Atque hac ratione septum duntaxat neruos à ceruicis uertebris mu-
tuatur, longo enim progressu eos ducere, quum possent ex proximis sedibus emitti, Opificis
esset ignorantis, quid magis in fabrica conduceret. Hac igitur occasione septo sublimes trans-
mittuntur nerui, uniuersum thoracem perreptantes. Ne uerò in progressu periclitarentur, eos
intersepientibus thoracem membranīs adnexuit, unum neruum singulis membranīs exteriùs
firmans. Neq; profectò minorem cōditoris industriam arguit, id quod adhuc anterioris quin-
ti paris neruorum ceruicis est reliquum, atq; in^k musculū præcipue inseritur, cuius auxilio bra-
chiū attollimus. Hic enim quia ingens graueq; membrū impenitē sursum attollere debebat, for-
ti ualidoq; indigebat neruo, quem Natura ipsi securissimè à commemorata quinti paris portio-
ne deduxit. Natura enim ab hac portione ramulos quosdam porrigēs^m musculis scapulam at-
tollentibus, primum ab externo huius portionis latereⁿ neruū deriuat, qui foras emergens, atq;
in multas scissus soboles cutem implicat, qua attollens brachium musculus integitur. Deinde
reliqua portio in profundo recondita, simulatque scapulæ ceruici appropinquat, in duos ma-
gnitudine

Tertij paris
series.Quarti paris
series.Quinti paris
series.Septi trans-
uersi neruorū
constitutio.Reliquum an-
terioris rami
quinti paris.

gnitudine impares partitur ramos. ° Anterior, qui & gracilior est, sub summi humeri cum clauicula^p connexu porrigitur, & musculi brachium attollentis parti soboles spargit, quæ à summo humero & clauicula inibi principium ducit. Atque hic ramus cuti nullum exporrigit furculum, nisi interdum extremè gracilem, aliquousque^q humeraria uena concomitatum. ° Posterior uerò eius quinti paris portionis, quam in profundo reconditā decliuem ferri diximus, ramus qui anteriori crassior est, postquā gracilem exprompsit ramulum^s musculo hinc à scapula sursum ad os^v referens proficiscenti, insidet^t foramini instar semicirculi in scapulæ elatiori costa exsculpto. In hoc foramine posterior hic ramus uena quoque & tenui anterio concommitatus, mox propaginem diffundit^u musculo sinum occupanti, quem inter scapulæ spinam & elatiorem ipsius costam haberi scripsimus. Insuper in musculi brachium attollentis sedem digeritur, à scapulæ spina & summo humero pronatam. Verum hic ramus in præsentem musculum non totus exhauritur, sed^x furculo quopiam cutem brachij externæ sedî obductam adit, quem secundum exterius latus^y insertionis ramus ille ab alto transmittit, quam musculus is brachium attollens in humerum molitur. Eadem sanè industria & à succedentibus neruorum paribus seu neruis in brachium progredientibus ad musculos scapulam mouentes, ° nerui transmittuntur, qui omnes intimis musculorū sedibus potissimum inferuntur. Cæterum nunc tempestiuū est, sexti & septimi pariū seriē sermoni subiungere. ° Sextū par sub quinta uertebra excidens, eadē cū cæteris paribus serie ad ceruicis musculos^b posteriorem ramū dispensat, tū eos qui ceruicis & capitis præsunt motibus, tū illorū capita^c qui respirationis opifices ex ceruice thoracē accedūt. quancūq; & hi potissimum ipsorum neruos à septimo pari & octauo quoq; seu primo thoracis pari mutantur. ° Anterior autem sexti paris portio, postquam^e neruum exprompsit, qui quinti paris portioni ad neruum septi transuersi constituendum permiscetur, cum contiguis paribus, septimo nimirum & octauo^f coit, & uariè rursus diffcinditur, neruos unā cum proximis partibus efformatura, qui in manum contendunt. Priuatim uerò præter cætera ceruicis paria, sextum par^s portionem notatu dignam deorsum ad scapulæ cauum transmittit, & rami quoque tum ab hoc, tum & à cæteris coniugijs ad musculos digeruntur, qui scapulam sursum ducunt. Validis enim & magnam molem attollentibus musculis uarias quoque ac frequētes neruorum propagines inferi, quā maximè rationi est consonum. ° Septimi etiam paris ex communi sextæ et septimæ ceruicis uertebrearum foramine prolabentis, magnus cum duabus proximis coniugationibus sexta uidelicet & septimaⁱ congressus perficitur, atque huius potissima portio in manum fertur. Ab hoc enim pari & quinto & sexto ceruicis, & primo & secundo thoracis uertebrearum omnes manus nerui propagantur. Qua autem serie illi digerantur, peculiari Capite persequar, modò interim adhuc addens, septimum par interdum ramulum septi transuersi neruo offerre, & perpetuū^k ramum in posteriora ad spinam ducere, qui præter ceteras propagines in musculos posteriori ceruicis sedi instratos digestas, aliquot etiam offert^l lato membrancoq; musculo, qui buccas mouet, atq; ex carnea membrana constituitur. In hunc enim musculum à quinti paris neruorum cerebri^m propagine perⁿ cæcum foramen excidente, ac dein ab omnibus paribus uertebrearum ceruicis (si primum excipias) soboles pertingūt, uniuersæ secundum musculi fibrarum ductum exporrecte, ac proinde etiam ad uenas & ligamenta multifariam (ut ductum illum seruent) reflexe, ac cuti etiam communicatæ.

Sexti paris
series.

Septimi paris
series.

SERIES DVODECIM PARIVM NERVO- rum dorsalis medullæ, thoracis complexæ uertebri. Cap. XIII.

Primi paris
thoracis, seu
dorsalis me-
dullæ neruo-
rum octa-
ui series.



PRIMUM thoracis neruorum^a par, inter septimam ceruicis uertebrearum et thoracis primam, quinque humiliorum ceruicis parium modo exiliens, superioribus dorsalis medullæ neruorum paribus comparatum, opportunè octauum nuncupabitur. Hoc itaque simulatque excidit, in duos impares diductum ramos, ° posteriorem, qui & gracilior est, retrorsum ad spinam inter musculos uertebri hinc adnatos reconditū detorquet, à quo in progressu furculos accipit radix^c musculi à prima thoracis costa in trās uersos ceruicis uertebrearum processus inserti, ac ceruicem in latus (uersus anteriora tamen magis) inclinantis. Dein & qui ceruicis capitis que in posteriora motibus præficiuntur musculi, ab hoc ramo octauui paris furculos adipiscuntur. Quod autem eius rami septimæ ceruicis uertebre spinam contingit, extrorsum ducitur: & rursus transuersim à spina abscedens, propagines offert humiliori sedi eius^d musculi qui scapulam mouentium secundus ac maior enumeratur. Insuper & ° musculo scapulæ basi inserto, scapulamq; ad dorsum trahenti, ac demum illi

02, 3 fig. h.
p ult. h. lib.
1 Q ad 7.
q fi. ca. 6 li.
3 a, d.
r 2, 3 fi. i.
s 5 mus. ta.
R, S.
t 1, 3 fi. cap.
21 lib. 1 a.
u 12 tab. H.
H.

x 2, 3 fi. n.
y 10 musc.
tab. inter P
c d.
z 3 fig. t, t.
a, n.
a 2 fig. cha.
6.
b 3 fig. h.
c 11 tab. F.
d 2 fig. l.
e 2 fi. m ad
e ad consti-
tutionē n.

f 2, 3 fi. q.
g 3 fig. p.

h 2 fig. cha.
7.
i 2 fi. f. aut
potius spe-
ctati. ca. 14.
aut ult. fig.

k 3 fig. r.

l 3 mus. tab.
r.
m 1, 2 fi. ca.
2 c.

n 2 fig. ca.
12 lib. 1 b.

a 2 fig. cha.
8.

b 3 fi. u.

c 8 mus. ta.
C. 14 ta. N.

d 9 mus. ta.
r, d.
e 10 ta. r.

illi quem hominis thoracē mouentiū tertium recēsumus. At anterior octauī paris ramus, posteriori longē insignior, septimi, sed magis adhuc interdū noni paris nō minimā portionē cum ipso congregientem^s suscipit, totusq; uariē uicinis paribus commixtus, si^h unicam ipsius dempseris propaginem, in manus fertur. Ex demissiori nanq; ipsius sede ubi iam proximis paribus se commiscuit, propaginem antrorsum emittit, quæ secundum primæ thoracis costæ ductum ad pectoris ossis usq; summum perlata, in progressu furculos dispensat thoracis musculo à clauicula in primam inserto costam. Præterea huius propaginis terminus in illos digeritur musculos, qui à pectoris ossis summo principiū ducentes, sursum exporriguntur, tum ad mamillarem capitis processum, tum ad os uⁱ imagini comparatū, &^m ad laryngis cartilaginem scuto non absimilem. quanquam interim & his musculis à sexto pari neruorum cerebriⁿ soboles offerantur, ut & à primo intercostali neruo, quem mox noni paris^o propaginē esse dicam. Quæ autem octauī paris in manum sit series, cum reliqua manus neruorum explicatione persequar, id & hoc loco subiungens, ab octauo pari, seu potius quarto manum petente neruo, quum is alam accedit ex posteriori ipsius regione etiam^p ramos pullularē, in cauam scapulæ regionem digestos.^q Nonum par inter primam & secundam thoracis uertebras originem ducens, octauī quoque paris ritu^r ramum in posteriora ablegat, simili quodammodo ratione atque posterior octauī paris ramus digerendum. Deinde non minimam sui partem octauo porrigens, uti suo dicam loco, in manum fertur.^s reliquam uerò ipsius portionem primo costarum interuallo offert, quæ secundum primæ costæ ductum ad pectus usque fertur in progressu, ut & reliqui costarum interuallis exporrekti nerui, soboles diffundens in musculos thoraci incumbentes. Porro^t decimum, undecimum, duodecimum, & reliqua ad primum usque lumborum, seu uigesimum par, subsequētia, eadem quodammodo serie digeruntur. Quippe omnia mox atque ē uertebrarum lateribus exiliere, bipartitō scinduntur, ac minor graciliorq; ramus retrorsum ad uertebrarum spinas detorquetur, inter musculos uertebræ adnatos latitans. Sunt uerò illi, quos dorſi & thoracis motibus hīc præesse retulimus. Videlicet humani thoracis motorū^u quartus, in canibus uerò & simijs sextus; deinde dorsum mouentium sexti paris^x alter, mox et^y alter octauī paris, & circa superiores thoracis uertebras alter^z primī, &^a secūdi paris caput mouentium, &^b alter tertij paris, &^c alter quoq; quarti paris musculorum dorsum priuatim mouentium. In hos enim musculos thoracis neruorum posteriores rami sparguntur: uerū tamē in illos tantum non absumentur, ac quum iam spinarum attigere apices, extrorsum properāt, inter mutuum dextri sinistriq; lateris musculorum congressum procidentes, atque in musculos postmodum digesti, qui ab illarum quas contingunt spinarum apicibus principium mutuantur: ē quorum classe (præter aliquot nuper commemoratos, præcipuē autem alterum primī paris musculorū caput mouentium) sunt, ^q musculus scapulam ad dorsum trahens, totiūq; scapulæ basi insertus: &^c humilior pars eius musculi, quem secundum scapulā mouentiū enumeramus, ac monachorū cucullis cōferimus, qui hac parte scapulā deorsum uellit, mox humani thoracis motus opificum^f quintus, &^s is etiam qui brachium deorsum dorſo adducit. Et præterquam quod à posterioribus horum parium ramis furculi in musculos digerātur, etiam aliquot in cutem dorſo intratam contendunt, at minus frequentes quā nerui in manus, aut pectoris, aut colli cutem pertingentes. Cæterum anteriores præsentium parium rami^h furculos offerunt sexti paris neruorum cerebriⁱ ramo sub tunica costas succingente costarum radicibus exporrecto, illisq; furculis adaucto. Dein præsentēs rami costarū exporriguntur interuallis, ^k uena item quæ^l arteria concomitati, & proprio^m sinu costarum interiori inferioriq; sedi insculpto uecti, secundum costarum ductum in anteriora properant. Rami enim ueris exporrekti costis, ad pectoris usque os pertingunt: rami autem secundum spurias delati costas, haud unā cum illis cessant, uerū in abdominis usq; anteriora super peritonæum repunt. Ab his ramis in progressuⁿ sparsa admodum propaginum series in musculos thoraci adstratos diffunditur, ē quorum numero^o secundus est thoracem mouentium, &^p qui brachium pectori admouet, &^q qui scapulam pectori adducit, &^r qui brachium deorsum uellit, &^s obliquē descendens abdominis musculus. In hos enim musculos propagines ab intercostalibus neruis offeruntur, singule tanta industria ad costas, & uenas, ac arterias, & ligamenta reflexæ, ut ad amissim musculorum quibus porriguntur, fibrarum incessus retineant. Atque ut his musculis thoraci intratis ab intercostalibus neruis propagines exhibentur, sic à neruis spurias costas superantibus, soboles quoq; abdominis musculis communicantur, fibrarum etiam illorū quibus attenduntur musculorum^o obseruantes. Porro à propaginibus musculos implicantibus, neruuli etiam thoracis cuti offeruntur, non quidem certa neq; nunquam aberrante serie, sed sparsim, eoq; prorsus modo quo errantes uasorum rami, *αγγεῖα* Græcis nuncupati, digeruntur. Vtuncq; uerò uaria, neq; sibi constans

Noni paris series.

Reliquorum parium ē thoracis uertebris profiliētium series.

series

*Nervi papil-
lam petentes.*


fit eiusmodi neruorum cutem petentium series, Natura tamen uerita, ne tenero adhuc infanti lac familiare illius alimentum, à matre exigenti papilla nonnunquam atrocius denegaretur, exactum papillis sensum impartiri uoluit, quo tenerorū infantuli labrorum mollisq; linguae contactus, papillam uoluptate afficeret, qua homines illecti, hanc promptius sugendam contrectandamq; offerant. Ac proinde à neruis ferè qui quartum costarum perreptant interuallum, propagines diffunduntur in musculum, cuius beneficio brachium pectori adducimus: atq; ab illis propaginibus furculi in papillam pertingūt, simili¹ qua penis efformatur substantia constantem. Caeterum ut praesentes furculi duodecimo neruorum pari quodammodo peculiare censebuntur, ita sanè decimo octauo & decimonono paribus id priuatim ascribendum uenit, quod^x furculos offerant principio^v sexti femur mouentium musculi, quod hinc è uertebrarum lateribus pronasce iam multo antè commemorauimus.

t 2 fig. 7.

u 3 fig. tabula
la cap. 49
lib. 2 E, E.

x ad latus
characterū
18, 19.
y 8 muscul.
tab. 6.

NERVORVM IN VNIVERSAM manum series. Caput XIII.



PRÆSENTI figura plexum, de quo in Capitis contextu mox in initio agetur, & qui supra primam thoracis costam anteriori in facie consistit, nudum exprimere ita conatus sum, quemadmodum in postrema Anatomie mihi Patauij occurrit. Vt uero delineatio esset conspectior, omnes ramos à quinto, sexto, septimo, octauo & nono paribus aliò quàm in brachium deductos, resectos finxi, quemadmodum etiam à cadauere ex quo hanc tabel-

lam desumpsi, eos absecueram. Non est tamen, cur quis in omnibus hominibus huiusmodi prorsus plexum se obseruaturum arbitretur, quum is mihi admodum uariis inter secundum occurrerit. Characteres autem quibus hæc figura insignitur, ita se habent.

5, 6, 7, Radices sunt parium neruos constituentium, qui brachium subeunt, illic resectæ, quæ à uertebris iam procidere. Nervi uero brachij illic sunt abtruncati, ubi iam in brachium prolabuntur.

A Portio est quinti paris, à qua tandè neruus deducitur, qui brachiū subeuntium primus numeratur.

B Secundus neruus. C Tertius neruus.

D Quartus neruus, qui hic ex posteriori sede prodit congressus quinti paris & sexti, portionemq; assumit ex posteriori sede congressus septimi paris, ac deinde sub octauo paris noniq; congressu prorepens, etiam ramum E insignitum ab illo progressu ita atque hic expressimus assumit. A quibus uero commixtionibus congressibus uel reliqui nerui prodeant, etiam absque characterum opera notum est, modò illis quæ brachium petunt, unum adhibeam characterem.

F Quintus brachium petens neruus.

G Sextus brachium petens neruus. Verum ut hunc plexum adhuc accuratius obserues, non pigeat figuram intueri, quam huius quarti libri calci insuendam duximus.

*A quibus
partibus ner-
ui in brachium
ducantur.*



*Implexus ner-
uorum brachi-
um aditum.*

D brachium à quinto, sexto, septimo ceruicis neruorum^a paribus, ac dein à primo secundoq; thoracis seu totius dorsalis medullæ uertebris contentæ octauo & nono^b paribus^c sex nerui digeruntur, quorum seriem prosequar mox atq; Naturæ operum studiosos admonuero, ut accuratè neruorum in brachium porrigendorum originem contemplantur: ita enim nerui brachium adituri, statim ab ortu ad uertebrarum latera permiscuntur coeuntq; & rursus inuicem dirimuntur, ac denuò congregiuntur: ac postremo separantur, ut neutiquam dicere queas, quis nam brachij neruus ab hoc illo uependeat pari. At uerius quodammodo sex præcipuos neruos ab illa commixtione neruorumq; congerie ac cōtextu reticulari principium ducere astrues. atq; hic implexus tam elegans est, ut ab illius effigie chordulas Cardinalium galeris appensas, artifices primùm miscere committereq; didicerint. Quòd autem Natura artificio hoc peculiari & incredibili spectatuq; iucundissimo utatur, quo neruos longissimo progressu deducendos, duriores ac iniurijs ferendis pertinaciores reddat, neminem ambigere existimo, potissimùm si^d implexum neruorum crus petentium prius spectauerit, neque nimium interim Galeno in primo Affectorum locorum libro acquieuerit.

Cate.

a 2 fig. cha.
5, 6, 7.

b 2 fig. cha.
8, 9.

c 2, 3 fig. 7.
p, 7, 8, 9, 10.

d circa ossis
sacri regio-
nem in 2 fl.
& huius li.
ulti.

e 2, 3 fi. π. #. ult. fi. R. f 2, 3 fig. i. g 10 muscu. tab. Δ. h 3 fig. cha. 32. ult. fi. g. i 2, 3 fig. φ. ult. fig. e.

Cæterum^e primus brachium subiens nervus, eius quintiparis nervorum cervicis^f rami so-
 boles est, qui in^g musculi brachium attollentis sedem à scapulæ spina pronatam digeritur.
 Atque hæc soboles tantum in externæ brachij regionis cutem paulo sub medio longitudinis
 brachij diffunditur, inibiq; cessat. Quippe inferiorem huius regionis cutem^h alia exilis pro-
 pago implicat, quæ prædictæ nuper sobolis modo ex alto emergens ab eo editur nervo, qui
 nervorum brachijⁱ quartus erit. Atque hæc propago non solum dictæ iam cuti furculos of-
 fert, sed & illi cuti soboles deriuat, quæ sedem externam posterioremq; cubiti ad humerum
 articuli amplexatur. Præsentes nervi, ut & omnes quoque cutem accedentes, membrana sus-
 fulciuntur, quam cum multis alijs dissectionum professoribus carnosam uocare libuit, atque
 inter hanc & cutem prorepunt in homine multo adipe etiam immerfi, membranamq; illam
 cuti pertinaciter committentes, ac pilorum modo interim graciles. Deinde non eandem per-
 petuò in situ, numero & crassitie retinent seriem, sicut in maioribus uasis: neque parem nume-
 rum, neque situm, neque magnitudinem accuratè obseruari, iam antea relatum est. Porro cæ-
 teri quinque nervi per axillam brachium subeunt, atque in plures ramos quàm primus spargun-
 tur, singuli maiores crassiores uè spectantur.^k Secundus itaque brachium petens nervus, ab im-
 plexu quem nervos brachium subituros ad uertebrae latera efformare dixi, principium du-
 cit, atq; ita nemo hunc nervum alicui pari uerè ascribet, quod non uno, sed pluribus nervorum
 paribus textus ille constituatur. Cæterum præsens nervus brachium sub^l musculo cubitum fle-
 ctentium anteriori ingreditur. Vbi enim duo illius musculi capita inuicè sunt coitura, nervus
 ille primùm in brachium fertur, quo etiam loco^m musculus brachium pectori adducens inser-
 tionem secundùm humeri longitudinè molitur, uti etiamⁿ musculus brachium attollens trans-
 uersim inibi humero implantatur, præter insertionem quam hac propemodum regione^o mu-
 sculus tentat, qui ab humiliori scapulæ costa pronatus brachiū in posteriora allicit, ac demum
 eius quoque^p musculi, cuius beneficio deorsum uersus dorsi humilia brachium agitur, inser-
 tio secantibus inibi occurrit. Secundus igitur brachium petens nervus, priori cubitum flec-
 tentium subditur musculo, & sub^q interiori eius capite quod à scapulæ processu anchoræ speciem
 referente originem ducit, occultatus, utrisque eius musculi capitibus^r furculum offert, ac decli-
 uis prorepens sub posteriori nuper commemorati musculi sede reconditur. Quas uerò propa-
 gines dein diffundat, ubi & tertium nervum huc sermone deduxero, subiiciam.^s Tertius ner-
 uus secundo humilior, ex illo quoque prodit complexu retiue, quod iam prius à nervorum ra-
 dicibus brachium aduentibus confici diximus. Nervus iste quum alam perreptat,^t ramum
 promit^u inter musculum brachium pectori adducentem, & illum quo brachium attollitur,
 cuti exporrectum, quæ illorum musculorum obducitur lateribus, quæ illi se mutuò contin-
 gunt. Simulatq; uerò tertius nervus humero appropinquat, mox etiam cubitum flectentium
 anteriori musculo cooperitur, atque simul cum secundo nervo deorsum properans^x ramu-
 lum capiti præbet^y musculi cubitum flectentium posterioris, quod etiam interdum & à se-
 cundo nervo propagine quadam donatur. Cæterum Galenus asserit, à tertio præpositi no-
 bis numeri nervo, postquam is ramulum hunc in caput musculi cubitum flectentium poste-
 rioris diduxit,^z tantam propaginem diffundi, illamq; secundo nervo cōmisceri, quanta secun-
 dinervi portio est, hæc sub anteriori cubitum flectentium musculo prorepens. Deinde sub-
 dit, se semel obseruasse, à tertio nervo ad secundum nullam communicari propaginem. Nos
 sanè aliquoties utrunque animaduertimus, sed multo sæpius & perpetuò quasi in homine,
 à secundo nervo^a propaginem notatu dignæ crassitudinis ad tertium nervum depromptam
 spectauimus, qua tertius nervus crassior ualidiorq; reddebatur. Vtcunque uerò sit, siue ter-
 tius secundo propaginem impartiat, siue à secundo (quod uerius duco) ad tertium propa-
 go pertineat, siue etiam nullus secundi cum tertio congressus fiat,^b secundus nervus perpe-
 tuò deorsum ad anteriorem articuli cubiti sedem contendit, musculo cubitum flectentium an-
 teriori tectus, & in progressu ab externo ipsius latere^c ramulum spargens in caput^d musculi ab
 humeri osse principium ducentis, & radio ad brachialis radicem inserti, radiumq; in pronum
 mouentis. Quum primùm uerò secundus nervus ad anteriorem usque cubiti articuli sedem
 cubitiue flexum pertingit, secundum externum latus^e tendinis musculi cubitum flectentium
 anterioris ad carneam^f ducitur membranam, in cutem dissipandus. mox enim atque ab alto
 emerfit, in duos crassitie impares secatur ramos, quorum^g unus qui gracilior ac superior est,
 aliquousque cum humeralis uenæ^h ramo secundum radium ad mediam usque cubiti longitu-
 dinem exporrecto, ac dein uersus ulnæ appendicem tendenti deducitur, uniuersam cutem radio
 incumbentem prætenuibus furculis intertexens, quorumⁱ præcipuus inferiorem radij appen-
 dicem superans, ad secundum usque pollicis pertingit internodium hîc, uti & toto progressu,
 inter

Primus nervus.

Nervos cutem subeunt: non eandem semper proponere seriem.

Secundi nervi ingressus.

Tertij ingres- sus.

Secundi cum tertio congressus.

Li. 3. de Admi. dissect.

Reliqua secti di series.

inter carneam membranam & cutem repens, sobolesq; tenuissimas diffundens. Huic furculo pollicis exporrecto interdum ramuli accedunt, permisceturq; ab ijs secundi nerui propaginibus, quas modò internæ summæ manus cutem adire scribam. ^k Humilior enim crassiorq; ramus eius secundi nerui diuisionis, quæ iuxta cubiti flexum perficitur, statim in duas quoque dirimitur propagines, sub ^l media prorepentes uena ab humerali ad communis uenæ constitutio nem proficiscente. ^m Vna harum propaginum quam elatiorem appellare nihil prohibet, postquam dictæ iam uenæ succumbens, ad ⁿ uenæ communis usque originem obliquo ductu accessit, relicta uena cuti subtenditur, & in descensu elatiùs ad radij sedem nonnihil oblique conscendens, secundum internum latus ^o musculi oblongi & radio proprij ad brachialis usque radicem perfertur. ^p Altera propago, quam memoriæ doctrinæq; gratia in scholis humiliorem nuncupo, magis oblique quàm medium cubiti flexus aut uenæ communis origo consistat, deorsum fertur, ac tandem uenæ maioris cubiti sedis cuti potissimum oblatae attensa, ad brachiale usque ^q prorepat, in multos exiles furculos in progressu absumpta. Nam priusquam longo ductu in cubiti regionem feratur, in duos præcipuos partitur ramos, quorum ^r unus quodammodo radij regioni exporrigitur, ^s alter uerò ulnæ, ac uterque crebrò brachiale superat, ramulos in cutem internæ summæ manus sedi dispargens. Dein ab illis ramulis qui Veneris monticulum conscendunt, interdum soboles in externam manus sedem excurrunt, neruulis ^t commiscendæ cutem primi pollicis internodij externæ regioni obductam implicantibus. atque in hunc modum secundus absumitur neruus. Tertius autem neruus simulatque secundi nerui ^u propagine adaugetur, frequenter ^x ramulum in cutem dispensat, anteriori brachij sedi hîc obnatam. Hinc uti ab initio in alto repositus, cubiti flexum accedit, æquali propemodum interuallo in progressu à secundo distans, ac interiorē sedem sibi uendicans. Tertius enim neruus nō adamussim per mediam cubiti flexus sedem in cubitum delabitur: uerum anteriori sedi insidet ^y tuberculi interioris humeri, ac super internum latus quodammodo uehitur insertionis ^z musculi cubitum flectentium posterioris. Quum uerò hanc transcendit insertionem, in multas ^a dirimitur propagines, seriatim tunc recensendas, ubi ^b quintum neruum ad cubitum usque sermonis serie deduxero, qui unà cum tertio in musculos digeritur, sedem cubiti interiorē occupantes. ^c Quartus neruus à reticulari illo neruorum iuxta uertebularum latera implexu principium quoque ducens, omnium neruorum qui in brachiū porriguntur longè crassissimus est, & similiter atq; tertius occultatus cum ipso in brachium properat, ^d axillari uenæ & magnæ manus arteriæ attensus, moxq; ^e insignes utcunque soboles ^f musculis distribuens, quorum ministerio cubitum extendimus. Priusquam uerò præsens neruus ad medium usque longitudinis brachij pertingat, oblique retrorsum ^g ad humeri os contorquetur, hoc & musculos cubitum extendentes intercedens. Verum anteaq; penitiùs reflectatur, ab interno ipsius latere ^h propaginem emittit, quæ ⁱ inter musculos cubitum extendentes & posteriorem cubitum flectentium in internam brachij sedem procidit, uniuersa in huius sedis cutem absumenda, furculosq; partim sursum partim deorsum multiplici serie sparsura. Porro ipse quarti nerui truncus, ad eum modum secundum humeri posteriora reflexus, sensim ad externā brachij sedem properat, ac ab externo latere ^k propaginem edit, quæ ^l inter exteriorem cubitum extendentium musculum & caput oblongi musculi radium in prouum ducentis ex alto emergens, in cutem dispensatur externæ brachij & cubiti articuli sedi obductam. Quum primum autem quartus neruus in alto semper latitans, ^m exterius humeri contingit tuberculum, posteriori ipsius sedi innititur, in qua huius nerui nomine ⁿ sinum à Natura priuatim exculptum diximus, quò neruus musculis occultatus, atque hîc in frequentem sobolem spargendus, tutò ueheretur. Mox enim atque neruus ille in cubitum ducitur, ^o ramum promit, qui ex alto emergens, errabundo ductu sub cute ad brachiale usque prorepat, frequentes furculos in progressu educens, à quibus cutis externam cubiti sedem obtegens intertextitur. Deinde quartus neruus in duos ^p discinditur truncos, in profundo, ut & ipsorum radix, reconditos. Horum ^q alter altero elatior est, ac radio exporrigitur: ^r alter autem qui humiliùs consistit, secundum ulnam deorsum fertur. Elatior penitiùs inter superius latus musculi bifido tendine brachiale extendentis, & exterius inferius ue latus musculi longi radium in prouum ducentis ad brachiale contendit, in progressu graciles ramulos utrisq; quibus attenditur occultaturq; musculis cōmunicans. Vbi uerò elatior hic ramus brachiale accedit, per ^s transuersum properat ligamentum, in externa radij sede bifido tendine brachiale extendenti obductum. Cæterum mox atque præsens quarti nerui ramus externam brachialis sedem ^t cōtingit, in duas dirimitur propagines, quarum altera duplici furculo externæ pollicis regioni offertur, altera uerò in duas secta soboles, unam indici porrigit in ipsius externam sedem duplici quoque furculo absumendam. alteram autem medio largitur digito, eam simpli

*Tertij nerui
ad cubiti usque
flexum pro
gressus.*

*Quarti ner
ui in brachium
ingressus, ip
siusq; series.*

*h 2 fi. o. ult.
b.*

*l fig. ca. 6. li.
3 h.*

*m 2 fig. a.
n fi. ca. 6 li.
3 a.*

*o 1 mus. tab.
a.*

p 2 fig. z.

*q Quasi se
cundū met*

*q ult. fi. li. 3.
r 2 fi. n.*

s 2 fig. s.

*t Quæ ad mo
dū uenæ ad*

*cha. q. fig.
ca. 6 li. 3.*

u ult. fi. x.

x 2 fig. x.

*y 1 fi. ca. 23
lib. 1. S.*

*z 8 mus. ta
bul. r.*

*a 2 fig. cha.
43. ult. fi. c.*

*b ult. fig. m
ad n.*

*c 2, 3 fig. o.
ult. fi. e.*

d ult. fi. lib. 3

Z uersus b.

e 3 fig. y.

*f u. mus. ta.
o, a, f.*

g Ad Y fi. 2

ca. 23 lib. 1.

*h 3 fi. o. ult.
ti. fig. f.*

i Inter P & R

*N 7 muscu.
tab.*

*k 3 fig. cha.
32. ult. fi. g.*

l Inter S & T

*Y 9 mus. ta.
m 2 fi. ca. 23*

li. 1 P.

n eius. fi. V.

*o 3 fig. cha.
33. ult. fi. h.*

*p 3 fig. cha.
34. ult. fi. i.*

*q 3 fig. cha.
35. ult. fi. k.*

k.

*r 3 fig. cha.
37. ult. fi. g.*

l. l.

s Inter Y et

*X 9 ta. mu
scul.*

*t 1, 2 musc.
ta. cha. 3.*

*u 3 fig. cha.
36.*

x3 fig. cha. simplicem indiuisamq; interno lateri exterioris sedis eius digiti applicans. * Demissior ramus
 37. quarti nerui iam cubitum ingredientis in duos ramos^y sectionis, qui ulnæ exporrigitur ilico
 y3 fig. cha. = frequentes educit soboles, ac primam donat capiti^a musculi indicem, medium & anularem
 34. extendentis, secundam capiti^b musculi cuius auxilio minimus extēditur digitus, tertiam autem
 x3 fig. cha. offert^c musculo brachiale simplici tendine extendēti. In ipso autem secundum ulnam processu
 38. a 9 muscul. præsens ramus^d tribus musculorum principijs ab ulna originē ducentibus^e propagines exhi
 tab. Z. bet. ac eorum quidem principiorum primus musculus est, qui radium in pronum ducentium
 b9 tabu. o. breuior uisitur: mox ille qui triplicem diffundit tendinem, ac unum brachialis ossi primum pol
 c9 tab. A. licis os sustinenti innectit, secundum primo pollicis ossi, tertium secundo pollicis ossi & ter
 d10 tabula A, B, C. tio. Dein musculus, qui tribus pollicis ossibus insertus, pollicem extendendo uersus indicem
 e3 fig. cha. ducit. Mox musculus, cuius beneficio index, ac interdum quoque medius à pollice extrorsum
 39, 40, 41. obliquè aguntur. Horum nanque musculorum principijs seriatim ab ulna pronascentibus, à
 f3 fig. cha. præsentis quarti nerui ramo soboles offeruntur, accuratè fibrarum eorum musculorum ductum
 42. obseruantes, qui obliquè ab ulna uersus radium pertinet. Quod uerò huius rami^f reliquū est,
 g2,3 fig. *. sanè modum quartus neruus in ramos spargitur. Porrò^g quintus neruus à cōmemorato iam
 ult fig. m. sæpius nobis plexu inferius quàm quatuor hætenus descripti, principium nanciscitur, ac quarto
 h7 muscul. attensus per axillam in brachium fertur, nullas omnino soboles cuiquam brachij parti distri
 tab. P, N. buens. Nam indiuisus^h inter musculos cubitum extendentiū interiorem, & cubitum flectentiū
 i2 fig. ca. 23 posteriorem secundum internā brachij sedem occultatus tantisper porrigitur, dumⁱ internum
 lib. 1 S. humeri contingat tuberculum, ad cuius posteriorem reflectitur sedem, hīc priuatim exigens
 h eius. fi. V. * sinum, quo aptè in cubitū uehitur. Quemadmodum enim tertius neruus anteriorem humeri
 l2 fi. iuxta tuberculi sedē occupare dictus est, ita sanè & quintus hīc neruus in posteriori sede eius tubercu
 cha. 43. ul. li consistit, pariq; quodammodo serie cum tertio digeritur. A duobus nanq; præsentibus ner
 ti. fig. c, n. uis^j propagines omnibus offeruntur musculis internam cubiti sedem occupantibus, qui & ab
 m5 muscul. interiori tuberculo humeri, & ab ipsa ulna radioq; principium mutuantur. Ac à tertio quidem
 tab. o. neruo potissimum soboles sparguntur in^m musculum secundos quatuor digitorum articulos
 n6 tabu. z. flectentem, &ⁿ illum qui tertios eorundem digitorum flectit articulos, mox^o illum qui tertij
 o6 tab. n. pollicis ossis flexus est autor, deinde propago quoque à tertio neruo^p illi porrigitur musculo,
 p1 tab. X. qui ab interno humeri prodiens tuberculo, ac postbrachialis ossi indicē sustinenti insertus, bra
 q1 tabu. Y. chialis flexus opifex habetur. Verum is musculus etiam à quinto neruo surculum subinde ascis
 r1 tab. Z. cit, ut & omnes ab interno humeri tuberculo pronati. ex quorum classe præter nuper comme
 si ta. V, aut moratum^q is censetur, qui tēdine lato summæ manūs internæ cuti subnascitur, dein^r qui quar
 7 ta. Q. to brachialis ossi insertus brachiale flectit, mox^s qui radium in supinum ducentium superior
 t3 fig. cha. describitur. Porrò quintus & tertius nerui etiam si sparsam hanc propaginum deriuent seriem,
 44. ult. fi. penitus hic non absumentur, uerum utrorumque singuli adhuc supersunt rami, insignes sanè,
 gu. d. & in plures surculos diffundendi. Ac tertij quidem nerui^t ramus inter musculum quatuor di
 uult. fig. li. gitorum secundos flectentem articulos, & illum qui tertium pollicis os flectit, radio exporrigi
 38. tur, unā cum^u uena ac arteria hac deductis ad brachiale properans, &^x transuersum permeans
 x4 muscul. ligamentum in brachialis interna sede tendinibus obductum. Iste tertij nerui ramus surculos,
 tab. d. sed nimis quàm obscuros, quibusdā musculis exhibere dicitur: qui in extrema manu repositi,
 y3 muscul. digitorum motibus quoque præfunt. cuiusmodi^y is est quo pollex ab indice maximè abduci
 tab. p. tur, dein^z quo pollex indici proximè adigitur, &^a duo pollicis primū flectentes internodiū, &
 z11 tabu. f. b tres secundi ipsius internodij flexus opifices, mox^c qui indicem ac medium pollici adducunt,
 a6 ta. n. 7. ac^d duo qui indicis primum flectunt articulum, ac interior denique primum medij digiti os
 b7 ta. cha. flectentium. Verum his musculis, ut &^e illi qui radium in supinum ducentium inferior est, ner
 1, 2, 3. ui potius attenduntur, quàm inferantur, aut etiam superficietenus adnascantur. Ipse tamen
 c6 ta. f. f. tertij nerui ramus in uola tres notatu dignas & insignes quoque emittit propagines, quarum
 d Ad alterū prima pollicis internam accedit sedem, in duos prius dissecta surculos: secunda etiam binis sur
 latus 8 ta culis internæ indicis sedi implicatur, tertia uerò simplex interno tantum lateri interioris medij
 e7 ta. X. digiti sedis exporrigitur. Porrò quinti nerui^f ramus ulnæ attensus inter musculum secundos
 f2 fig. cha. quatuor digitorum articulos flectentem, & illum qui eorundem digitorum tertios articulos
 45. ultima flectit, ad brachiale ducitur, ^g uena etiam & arteria cōcomitatus, quæ ulnæ exporriguntur, atq;
 fig. o. o. ad uolam per transuersum brachialis ligamentū tendunt. Hic ramus simulatque ligamentum
 gult. fi. lib. id superauit, unam propaginē in duos diuisam surculos minimi digiti internæ sedi cōmunicat,
 3 i. ac unam similiter in duos surculos diremptam internæ sedi anularis digiti offert, mox unam
 p quoque

Quinti nerui
 in brachium in
 gressus, ipsius
 que series cum
 tertio.

quoque medio digito communicat, quæ indiuisa externo applātatur lateri, internæ mediij digiti sedis. Nisi fortè uti non infrequenter accidit, à tertio neruo duæ soboles indici offerantur. Præter has quinti nerui propagines nullas in extremæ manus musculos spargi animaduerto, in^h illos dico qui anularem & minimum ad pollicem ducunt; qui primum os minimi & anularis flectunt, cum externo musculo primum mediij digiti os flectentium, & illo qui minimum à cæteris digitis in latus remouet. Nam, uti prius monui, his musculis nerui potius attenduntur, quàm adnascuntur. Porro quinti nerui præsens ramus ad hunc modum nō totus absumitur, uerum nō perfunctoriè expendendam promit^k propaginem, paulo inferiùs quàm mediū ulnæ longitudinis consistit. quum enim ramus hic ulnæ medium emensus est, ab externo ipsius lateris propaginem illam deducit^l inter musculum brachiale flectentium inferiorem, & inferiorem brachiale extendentium. Propago hinc ex profundo elabens secundum ulnam in externam sedem cubiti porrigitur, & quum externam brachialis sedem contingit, in externam regionem illorum digitorū ramulos spargit, in quam^m quartus neruus nullas soboles prompsit. Diuiditur itaq; ea quinti nerui propago in tres ramos, quorum primus duplici furculo externam minimi digiti sedem adit, secundus duplici quoque furculo externæ anularis sedi exporrigitur, tertius autem indiuisus externo implicatur lateri exterioris mediij digiti regionis. Quoniam uerò quintus neruus, hanc externæ manus sedi exporrectam diffundit propaginem, subinde uidimus quintum neruum tot atque dixi furculos in internam manus sedem non digerere. Haud semel enim obseruaui, à tertio neruo etiam externū latus interioris sedis mediij digiti, & internum latus anularis furculos assumere, quinto tunc duas tantū propagines internæ minimi digiti sedi

Qui citra sensationem neruorum in manus series experiri possit.

Sensum seruari motu perire, & contrari.

Lib. 1. de Affectionum locorum cognitione. Sexti nerui in brachium ingressus ac series.

& unam anularis interiori sedi porrigente. Atque dictam sanè neruorum in extremam manum seriem non iniucundè in te ipso obseruabis, modò ad amussim neruos pollice alterius manus, aut cubiti innixu, ad os ita compresseris, ut animalis spiritus transitū compressione cohibeas, ac pars cui nerui inseruntur stupefcat. Fit uerò id iuxta cubiti articulum nō multis interiectum uetustibus, aut (ut in obesis mulieribus) multa adipe inuestitum cōmodissimè. nam si pollice quartum neruum aliquandiu compresseris, senties externam pollicis & indicis sedem & internum quoque latus exterioris sedis mediij stupefcere. Quod autem quartum neruum compressurus uel pollicem inter posteriorem ulnæ processum externum humeri tuberculum impingere oporteat, neminè latet, qui modò furda aure quarti nerui seriem non obaudiuerit. Si uerò pollicem ad superiorem interioris tuberculi humeri sedem quintum neruum compressurus, uel ad moueris, mox interna externaq; sedes minimi digiti & anularis & inferior mediij stuporem experientur. At si maiori conatu anteriorem interioris humeri tuberculi sedem compresseris, atque ita tertium neruum obstruxeris, ilico interna sedes pollicis & indicis & pars mediij stupore laborabunt. Quum uerò hæc exploras, perpende pariter, quàm leue sit nonnunquam motum integro adhuc sensu perire, & sensum quoq; motu adhuc integro aboleri. Nam ut cæteros taceam neruos (& ne à reconditis magis exempla petam) da uulnere aut alio affectu quartum neruum, quæ is secundum humeri posteriora reflectitur, aut etiam quæ à reticulari plexu ad uertebra- rum latera consistenti exorditur, præscindi, aut aliàs ex humoris affluxu eiusq; generis malo quopiam ita uiciari, ut animalis spiritus cum ipso non deducatur, & quintus neruus interim illæsus (uti factu est facillimum) ac integer sit, non ne minimi digiti & anularis extensio perdetur: illorum sensu integro? Nam quintus neruus sensum suppeditans illæsus est, at propter quarti uicium musculorum digitos extendentium munus intercidit. Quid si casu quintus neruus, integro interim quarto, cōtusus, aut alioqui oblæsus fuerit: non ne paruus digitus & anularis stupefcet, ipsorum interim motu haud corrupto? Atque ut hæc de quarto neruo & quinto exempli gratia proposui, ita sanè illi quem neruorum series & musculorum natura non fugiunt, expendere confingereq; promptissimum est, quæ sensus illæso motu aliquando aboleatur: aliquando autem seruato sensu, motus corrumpatur. Neque necessum est eò deflecti, quod maior uis animalis ad motū, quàm ad sensum requiratur: & multo magis irridenda est Anatomi corum principis ratio, qua is confingit quosdam neruorum furculos motui tantum, alios autem sensui præesse. quasi uerò quis neruorum furculus sensu tactus destitueretur. Cæterum quum hæc aliò spectent, sexti nerui (qui adhuc enarrandus superest) seriem quoque perstringamus.ⁿ Istius principium ab infima retis iam sæpius dicti sede enascitur, & inconiugatus per axillam in brachium properat, nullibi in alto reconditus, sed cuti internæ brachij sedis substratus, ad internum humeri accedit tuberculum, in progressu conterminis eius quam perreptat cutis partibus^o frequentem depromens sobolem. Ad interius uerò humeri tuberculum, in plures partitur ramos uenæ axillaris^p propaginibus partim incumbentes, partim quoque substratos. Hi deorsum numerosa propaginum serie secundum ulnam digeruntur, inter cutem

h Ex nuper scriptis peruntur tabulis.

i 3 tab. v. k 2 fig. ch. 4. 46. ult. fig. p. l 9 mus. ta. inter = & Δ.

m 3 fig. & 6. ducebat cha. 36.

n 2, 3 fig. s. illi. fi. q.

o fig. 2 cha. 48. 48. p fi. ca. 6 li. 3 u. x.

& car.

q Confer in
ter se ner-
uos in 2, 3
figuris, sed
magis in ul-
tima.

& carneam membranam deducti, & priusquam brachiale contingāt cessantes, perpetuoq; secundum inferiorem cubiti regionem seu ulnam exporrecti.⁹ Præsens nervus crassitie secundo respondet, ubi is cubitum accedit. Quintus autem nervus tertio congruit, uti etiam secundus, qui priusquam sui portionem tertio offert, crassius uisitur. Atque hi sexto ferè quintuplo crassiores sunt: omnium autem plenissimus est, quem quartum enumeravi; quemadmodum summè etiam gracilis occurrit, qui primus recensebatur.

Nervorum
crassities.

QUINQUE PARIVM NERVORVM

è lumborum uertebriis prodeuntium series.

Caput XV.

a 2 fi. et ult.
fig. cha. 20,
21, 22, 23,
24.
b 3 fig. cha.
52, 52.
c 12 tabula
mus. Δ.
* 13 ta. r.
d 14 ta. T.



e 10 tab. Θ.
f 2 fig. cha.
50, 50. dein
51.
g 8 mus. ta.
52.
h 2 fig. cha.
49, 49.
i 2 fig. cap.
2 h.
k Ad latius
cha. 20, 21,
22 fig. 2.

DORSALIS medullæ lumborum uertebriis complexæ² nerui, in hoc thoracis uertebRARUM neruis magna ex parte conueniunt, quòd à singulis^h rami retrorsum ducantur in musculos uertebriis adnatos sparsi. Committitur autem hic uertebriis^c musculus humani thoracis motorum quartus, dein dorsum mouentium^{*} undecimus, ac demum^d qui huic subternitur decimustertius. Atque his musculis propagines à posterioribus ramis offeruntur, quum illi adhuc reconditi ad uertebRARUM spinas ducuntur. Quando autem rami ex mutuo utriusque lateris musculorum connexu, atque ab ipsis spinarum apicibus procidunt, ad latera denuò excurrunt, cuti & musculo præcipuè intexti, cuius ope brachium uersus dorsum humiliora agimus.^f Anteriores autem horum parium rami in abdominis musculos, ac illum qui brachium uersus dorsum humiliora detrahit, ipsamq; adeò cutem disseminantur, ut & in^g musculum dorsum motus autorum nonum, & cum qui femur mouentium sextus mihi numeratur. Dein à uigesimo primo pari, seu secundo lumborum, una cum seminaria sui lateris arteria perquam^h exiguus surculus ad testem ducitur, si modò à sexti paris nervorum cerebriⁱ ramis costarum radicibus exporrectis, atque in intestina propagatis nullæ soboles ad testes pertingant. nam & ab illis ramis interdum surculos testibus exporrigi animaduertimus. Quinetiam ab anterioribus ramis trium primorum parium ex lumborum uertebriis prosilientium,^k surculi etiam diffunduntur, qui nuper dictos sexti paris ramos costarum radicibus exporrectos accedunt, illosq; adaugent. A tribus uerò humilioribus è lumborum uertebriis elabentium paribus, non minimi crus accedunt: qua autem serie in illo digerantur, secundo ab hoc Capite exequar.

NERVORVM E SACRO OSSE PRO-

silientium series. Caput XVI.

a Spectatur
hæc fig. ca.
18 lib. 1.



b 2 fi. et ult.
cha. 25.

c 3 fig. cha.
54.
d 9 muscul.
tab. π.

e 2 fig. cha.
53.

f 8 tabu. Δ.
g Confer se-
cundā figu-
ram tertie.

QUAM concinnè Galeni ossis sacri descriptiones inuicem, ac demum^a hominis ossi congruant, primo explicuimus libro, addentes quoque inter sex hominis sacri ossis ossa anteriori & posteriori sede bina exculpi foramina, adeò sanè ut hominis nervorum series à canum & caudatarum simiarum serie plurimū discrepet. Ac^b primum quidem par tam in hominibus quàm quadrupedibus inter os sacri ossis primum, & infimam lumborum uertebRAM ea prorsus ratione qua nervorū paria è lumborū uertebriis egredientia procidit, ac mox ab egressu ramum in posteriora non secus atque superiora paria diffundit, qui etiam similiter atq; posteriores illorum parium rami, digeritur. Priuatim uerò à posteriori regione primi paris sacri ossis^c propago utcunq; insignis in musculos spargitur, ab ilium osse principium ducentes, potissimum autem in^d primum femur mouentium. Dein eius propaginis soboles non pœnitendæ in cutem clunibus obductam deriuantur. Anterioris uerò præsentis^e paris portio, neruis in crus deducendis permiscetur. Non enim tota in crus absumitur, quū ab illa^e ramus secundum internam ilium ossis sedem exporrigatur, surculos offerens abdominis musculis & illi pariter^f musculo, quem ab interna ilium ossis sede pronatum femur mouentium septimum recensui.^g Cæterum quinque humiliora paria peculiari procidunt ratione. nam priusquam ex ipso osse elabantur, gemina ab utroque latere sunt, & unus nervus utrobique à singulis paribus in anteriora procidit, & unus item utrobique retrorsum: atque hæc series in hominibus uisitur. In simijs uerò & canibus secus quàm in cuniculis, uti tria tantum in illis sacri ossis nervorum sunt paria, sic etiam duo solum inferiora antè postè excidunt. Dein reliqua paria (quæ in canibus & caudatis simijs cernuntur numerosa) ab ossis coccygis lateri-

p 2 bus

bus in eum modum prodeunt, quo ex thoracis & lumborū uertebriis nerui egrediuntur, quum interim ab hominis osse coccyge, ne unus quidem exiliat neruus. Adeo sanè ut minimè mirandum sit, si ego à Galeni sententia in libro de Ossibus, & in horum neruorum paribus recensendis procul declinem, quum is suis sectionibus fidens simiarum potius quàm hominum neruos prosequatur: secus ferè atque in libris de Vsu partium, quos ex aliorum sententia multis locis illum cōscripsisse nulli non constat, qui sedulo ipsius loca, ac demum simiæ sectionem hominis sectioni confert. Quinque igitur sacri ossis inferiora paria neruos in posteriora excidentes ad musculos potissimum digerunt, qui ilium ossis & sacri ossis posteriorē occupant sedem, ex quorum classe in dextro latere est musculus dorsum mouentium^h undecimus, ac deinⁱ decimus tertius, præter membraneum initium^k musculi brachium ad dorsum humiliora agentis, & quartum humani thoracis motorum. Item^l quatuor primi femur mouentium, ac cutis denique clunibus obducta, quæ ipsa quoque propaginibus aliquot ab illis neruis donatur. Anteriores uerò nerui uariè magis digeruntur. siquidem tres superiores, primi paris modo in crus (uti subsequenti narrabo Capite) properant. Duo autem humiliores nerui, qui sexti septimiq; parium propagines sunt, in ani musculos digeruntur. ad hæc, in uteri ceruicem frequenti sobole, uti etiam in uirorum uesicæ ceruicem penem ue, pertinent. Nam uesicæ ac uteri item fundus plerunque^m neruulos ab illis mutuatur ramis, qui à sexto pari neruorum cerebri costarum radicibus sub tunica costas succingente exporriguntur. Terminus uerò dorsalis medullæ ex sexto sacri ossis osse procidens, nerui ritu mihi haudquaquē digeri uisus est, etiam si à quibusdam hunc neruum coniuge carentem uocari nō ignorem. In homine tamen, cuius sacrum os quinque tantū efformari uidebatur ossibus, medullæ dorsalis terminus ab osse procidens unum utrinque diffundebat furculum, hac ratione sexti paris sacri ossis uices supplens.

*NERVORVM FEMVR, TIBIAM ET
pedem adeuntium distributionis ratio. Caput XVII.*

Quatuor nerui
uos crus petere.



Primi nerui
series.

Secundi nerui
series.

R V R I iuxta femoris initium à dorsum medullæ lumborum uertebriis & osse sacro complexæ neruorum paribus, quatuor nerui offeruntur, à reticulari quodammodo plexu perinde procidentes, atq; præcipuos brachium petentes neruos pronasci iam antea relatum est: quanquam magis uariis in ceruice, quàm hîc ad lumbos sacrumq; os implexus uisitur. His neruis non eadem obtigit crassities, multoq; minus par series & ductus. qui enim primus ac tertius recensentur, graciles sunt. Secundus autem duobus illis crassior subinde reperitur, licet interea tenuis quoque sit, quartus uerò illorum trium unà complexorum crassitiem uincit. Primus à suprema parte implexus neruorum in crus pertinentium originem ducit, ubi scilicet tertij lumborū paris (quod ordine uigesimū secundum est) anterior ramus uigesimo tertio pari commiscetur. Neruus hic lumborum incumbens^c carnibus, ac peritonæo substratus, in femur procidet secundum exterius latus tendinis^d sexti femur mouentium musculi, qui unà cum septimo femoris motuum autore musculo hac supra coxendicis os ad^e minorē femoris processum contendit. Simulatq; uerò neruus ille femur contingit, ramum depromit cuti paulo minus quàm ad genu usque exporrectū, quæ anteriori femoris sedi uersus externū ipsius latus obducitur. Porro^f maior præsentis nerui portio in alto latitās, aliquot propagines deriuat^g primo tibiā mouenti musculo, qui ab antica sede appendicis ilium ossis principium ducit, dein & septimo tibiā mouenti musculo, qui à maioris femoris processus radice enascitur, mox quoq; in^h manū tibiæ motuū autorem, atq; cum illis duobus musculis primi huius nerui grādiōr portio decliuīs ducta, elatius quàm genu cōsistat articulus terminatur. Secundus neruus suum principium inferius quàm primus adipiscitur, è regione uidelicet uigesimi secundi paris neruorū dorsalis medullæ, seu è regione articulationis terciæ lumborū uertebrae cum quarta. Hic neruus peritonæi etiā posteriori regioni subtenso, simul cum^m uena & arteria per inguina femur petentibus in crus porrigitur, ac mox ab interno ipsius latereⁿ ramum deriuat, * uenæ ad pedes usq; pollicem^o attensum, quam ab inguine per internā femoris sedem, ac per genu articulū internamq; tibiæ regionem sub cute ad summū usq; pedem protendi commemorauimus. Atq; ut illa uena uarias soboles in progressu ad cutem illi cōterminā diffundit, ita sanè & hîc secundi crus petentis nerui ramus anteriori uenæ illius sedi toto ductu cōtiguus, soboles passim in cutem spargit: inter quas^p illa est præcipua, quam anteriori genu regioni offert, in eius sedis cutem frequenti ramorum serie disseminatam. Neque sanè oscitanter obaudiendum est, præsentem ramum anteriori uenæ parti exporrigi, ut in eius uenæ sectione, quam mox sub genu aut iuxta interiorem malleolum molimur, scalpellum retrorsum atq; in postero

ra

h13 muscu.
ta. r.
i 14 tab. T.
h9 ta. o.
l9. ta. n. 10
2. u. et o.

m 2 fi. ca. 2
1, 4.
n 2, 3 figu.
cha. 56.

a2 fig. cha.
57, 60, 66,
71. ult. fig.
o, 7, 1, 1.

b2 fig. cha.
57. ult. fig.
o.

c8 mus. ta.
o, 2.
d8 ta. o. cū
A.

e1, 2 fi. ca.
30 li. 1 d.
f2 fig. cha.
58. ult. fi. a.
g2 fig. cha.
59. ult. fi. b.
h3 muscul.
tab. 2.

i5 tabul. A.
ab o.
k4 ta. o.
l2 fig. cha.
60. ult. fi. y.
m ult. fi. li.

3 d.
n2 fig. cha.
61. ult. fig.
o, o.
* ult. fi. li.
3 m.
o2 fig. cha.
62.
p2 fig. cha.
63.

q 2 fig. cha. 64. ult. fi. v. r 8 mus. ta. 5 6 tabul. n. t 4 tabu. o. u 2 fig. cha. 66. ult. fi. f. x 8 tab. A. y 1, 2, 3 fig. c 1, 29 li. r. z 16 ta. F. G. H. a 8 ta. r. b 1, 2 fi. c 1. 49 li. 2 K. L. c 2 fig. cha. 68. ult. fi. n. d 2 fig. cha. 68. ult. fi. o. e 16 muscu. tab. A. f 8 tab. o, c. g 2, 3 fi. cha. 71. ult. fig. i. ac etiam 10 mus. ta. f. h 2, 3 fi. cap. 29 lib. 1 c. i 2, 3 fi. cha. 72. ult. fi. v. k 9 tab. n. l 2 fig. cha. 74. m 2 fig. cha. 73. ult. fi. u. n 10 muscu. ta. v, p. et 11 tab. n, u, v. o 2 fig. cha. 74. ult. fi. f. p 11 tabu. p. q 2 fig. cha. 75. ult. figu. r 12 tab. w. s 1 fi. ca. 30 lib. 1 l. t 2 fig. cha. 76. n 10 muscu. tab. o. n. x 2 fig. cha. 61. y 2 fig. cha. 76. z 2 fig. cha. 77. ult. fi. g 11. w. a 2 fig. cha. 78, 78 ult. fig. c. b ult. fi. r. c 6 ta. inter o & r. d 1 ta. Z. e 2 fig. cha. 79. ult. fi. v.

ra impingamus, ne is casu antrorsum actus neruum præsecet. Cæterum^q grandior secundi nerui portio simul cum uena ac arteria reconditur, & in musculos anteriorem femoris sedem occupantes quoque digeritur, præcipue autem in^r quintum femur mouentium, & in^s octauum tibiam mouentium, cum quo etiam secundum internum latus^t noni tibiam mouentium musculi deorsum fertur supra genu articulū, non minus quàm primus neruus cessans, & in progressu membranulis uasa colligantibus exiguas porrigens soboles.^u Tertius neruus secundo succedit, illic enatus, ubi quarta lumborum uertebra quinte articulatur, hinc peritonæo quoque succumbens, &^x musculo femur mouentium septimo uectus, ad pubis ossis^v foramen contendit, hæc in femur prorepens. Verum priusquam foramen id superat,^z nono &^a decimo femur mouentibus musculis ramulos porrigit: mox uero &^b illis musculis, qui à pubis osse pronati penis peculiare censentur. At ubi paulo demissius prorepit, duorum neruorum, quos iam descripsimus, ritu, ramum emittit cuti oblatum, quæ internam femoris sedem iuxta inguina occupat. Dein eius neruiⁱ reliquum ramum offert^t secundo tibiam mouenti musculo, ac dein^f quinti femur mouentis musculi portioni à pubis osse pronatæ ramum deriuat, supraque medium longitudinis femoris terminatur.^s Quartus cruris neruus tertio quidem ortu subsequitur, at sextuplo etiam crassior est, atque ex uigesimali quinti ac triumi succedentium parium anterioribus ramis potissimum constituitur: non solum omnium neruorum crassissimus, uerum etiam quum hinc à dorsalis medullæ termino principium obtineat, durissimus, pariterque ualidissimus. Hic neruus peritonæo quoque subditus inter sacri ossis latus & ilium os, quæ hæc ossa inuicem dehiscunt, tanquam perⁿ sinum ipsi peculiariter paratum ducitur, & moxⁱ ramum ex posteriori ipsius sede deriuat, qui aliquousque sub^k primo femoris motorum latitans, tandem ad cutem procidit, soboles distributurus cuti inferiori clunium sedi obtensæ, & illi pariter cuti quæ posteriorem femoris sedem ultra medium longitudinis femoris integit. Cutis enim supra genu in posteriori femoris sede reposita, ab^l alia quarti nerui propagine ramulos obtinere mox docebitur. Postquæ uero quartus neruus hunc ad cutem deprompsit ramum,^m alias utcumque grandes distribuit soboles in musculorumⁿ capita digerendas, quæ à coxendicis ossis appendice principium ducunt, quorum tria tibiæ motibus famulantur, ac tertium, quartum & quintum tibiam mouentes constituunt musculos. Quartum uero caput femoris motibus peculiare censetur, quintumque femur mouentem efformat musculum. Quartus neruus hinc inter musculos posteriorem femoris sedem sibi uendicantes reconditus, deorsum fertur, ac paulo sub medio longitudinis femoris^o ramum educit in quarti tibiam mouentis musculi^p partem à femoris osse, ac si peculiaris esset musculus, enatam. Ab hoc ramo propagine in cutem excurrunt humiliori sedi posterioris femoris regionis iuxta genu obductam. Simulatque quartus neruus inferiorum femoris capitum radicem spectat,^q utrinque unam edit propaginem, in^r capita musculorum disseminandam, qui ab inferioribus femoris capitibus enati, tres primi pedis motores enumerantur. Quando autem quartus neruus in^s sinu consistit, quem duo inferiora femoris capita mutuò dirempta efficiunt, in^u duos crassitie inæquales truncos partitur, à quibus uniuersæ propemodum tibiæ & pedi item nerui offeruntur. Nullus enim in tibiam neruus procidit à quarto non diductus, præter^x ramum secundi crus petentis nerui interiori femoris & tibiæ & pedis quoque sedi exporrectum. Necque sanè quenquam mirari uelim, quod quartum neruum non secus quàm si unicus esset, non autem (ut Galenus docet) geminus, secundum totam femoris longitudinem sermone deduxerim: quum uniuersus in homine unicam obtineat circumscriptionem, & si quis ipsius qua inuestitur membrana unguibus dirempta hunc uelut in duos neruos dirimere proposuerit (quod leui etiā sit negotio, si manū ab ea^v sede, qua prope femoris inferiora capita bipartitò scinditur, sursum ad mediam usque femoris longitudinem duxeris) etiam licebit in quamplurimos neruos ipsum hac ratione diuidere: quum is aliud nihil sit, quàm plures nerui instar plurium rectorum funiculorum protensi, & membranis circumdati. Ac proinde ea ratione qua quis quartum neruum geminum esse contendet, ego illum decem & octo neruis cōflari astruam, quum aliquando tot ipsius portiuncule seu funiculi mihi illos studiose numerāti occurrerint. Quotcumque uero quartus neruus constet partibus, in poplite, uti prius dicebam, in duos impares dirimitur truncos.^z Exterior, qui & gracilior est, ad fibulæ cum tibiæ osse iuxta genu articulum prorepit, inibi musculis offerendus. Priusquæ autem penitus inter musculos truncus ille reconditur,^a propaginem diffundit externe cuti tibiæ propriam, ac per exteriorē malleolum pedis externum latus aduenit, atque in progressu frequentes soboles spargentem. Ipse autem exterior truncus postquæ nuper commemoratam^b edidit propaginem, inter^c septimum & octauum pedem mouentes musculos primum occultatur, etiam^d sexto pedem mouentium musculo attensus. Atque inibi rursus mox in progressu^e ramum educit, qui errabundo ductu in cutem dispensatur, anteriori tibiæ re-

Tertij nerui series.

Quarti nerui series.

Qui quartus neruus ueluti pluribus funiculis constare uideatur. Lib. de Admi. dissect.

gioni obtensam. Quod uerò exterioris huius trunci reliquum est, ad hunc modum inter musculos anteriorem tibiæ sedem sibi uendicantes prorepens, illisq; musculis ramulos offerens, ^f ligamento incumbit, fibulam tibiæ ossi secundum totam tibiæ longitudinem colliganti, ac unà tandem cum tendinibus digitos extendentibus sub ^s transuerso huius regionis ligamēto in pedis superiora ducitur, & penitiùs sub tendinibus latitans, digitorum superiori sedi ramos exporrigit. Anteaquam tamen transuersum id ligamentum subit, ^h ramulum deriuat cuti intertextum, qua ipsum ligamentum integitur. At præter eum ramulum ⁱ magnam sui portionem sub medio longitudinis tibiæ per membranē transmittit ligamentum, fibulam tibiæ ossi colligās, atq; hæc portio ^k interiori trunco quarti nerui permiscetur, quem pedis inferiora accedere mox dicam. Interior itaq; quarti nerui truncus, qui exteriori multo grandior est, inter capita primi ac secundi pedem mouentium musculorum in tibiā subiens, mox ⁱ ramum diffundit multiplici sobole in cutem digestum, quæ posteriori tibiæ sedi ad calcem usq; obducitur. Quanquam interim ramus ille non uniuersus in cutem absorbetur, uerum ipsius etiam portio ^m inter quartum pedem mouentium musculus, & primum quoq; & secundum tantisper fertur, quousq; tres illi musculi uniantur. nam & hîc quoq; portio illa cutem adit. Ipse uerò interior truncus in posteriorem tibiæ sedem penitiùs prorepens, fertur inter quartum pedem mouentiū musculus, & quintum pedem mouentium, duosq; qui à tibiā procedentes digitorum flexui præsumt. Hæc itaq; deorsum tendens, exterioris trunci ⁿ propaginem assumit, huc per membranē ligamentum transmissam. Quum uerò hoc interioris trunci reliquum ad tibiæ usq; humiliora contendit, unà cum huius sedis tendinibus per ^o transuersum ligamentum inter calcem & interiorem malleolum pedis inferiora petit, musculis inibi repositis distribuendū, ac singulorum digitorū inferiori sedi duos furculos oblaturum. Quot autem hîc reponantur ^p musculi, in secundo libro dilucidè commemorauimus. Quando hîc collocari dicebatur, qui quatuor digitorū secundos flectit articulos, & qui quatuor digitos pollicis adducunt, & qui primos quinque digitorum flectunt articulos, & qui pollicem maximè ab indice abducit, & musculus minimum digitum à ceteris remouens. Verum uti in manu quoq; dictum est, nerui his musculis potius attenduntur, quàm innascantur, aut inserantur. Porro præter hanc quarti nerui seriem, etiam subinde ^q inuenies ^r exteriorem truncum priusquā pedem contingat cessare, multoq; minus per membranē ligamentum fibulam tibiæ ossi colligans, sui portionem interiori offerre. Imò ab interiori trunco, quum posteriori sedi eius ligamenti exporrigitur, ^s ramum educi animaduertes, qui ligamentum id perforās deorsum fertur, inter musculos in anteriori tibiæ sede positos, ac hîc per transuersum ligamentum in tibiæ anteriori sede conspicuum prorepens, superiori digitorū sedi ramulos communicat. Qua autem administrandi ratione hanc seriem obserues, ad finem septimi libri recensebo: ubi non hanc modò persequar, uerum omnem uenarum, arteriarum, ac neruorum sectionem, quæ ad manus cruraq; potissimū spectant. nam eorum uasorum quæ uisceribus sunt propria, sectionem in trium subsequentium librorum calce priuatim perstringam: quando earum partium, quibus uasa illa committuntur, administrandi rationem pertractabo: præsentī libro iam colophonem, neruorum non ineleganti delineatione hîc insuta, addens.

NERVORVM DELINEATIO, QVAE SEPTEM PARIVM NERVORVM QVI A CEREBRO ET DORSALIS MEDULLAE INITIO PRONASCVNTVR, ORTVS PROPOSIT, ET DISTRIBUTIONEM SERIEMQ; OMNIUM QVAE A DORSALI MEDULLA IN DORSO COMPLEXA ORIGINEM DUCUNT, PULCHERRIME REFERT, UTI HUIUS FIGURAE CHARACTERVM INDEX DOCEBIT.



PRÆSENTI figura cerebrum unâ cum cerebello cerebriq; exortibus eum in modum delineauimus, quasi à caluaria enudatum in ipsius basi ita conspiceretur, ut apparet si quis erectus caput in posteriora quam maximè flecteret, sursum retrorsumq; oculos aduersus. Vt uero characterum Index huic chartæ pulchrè adhiberi posset, figuram ac si altero careret brachio ac crure delineauimus, præcipue quum eadem utriusq; sit ratio.

- A, B, Cerebri ex altero latere basis notatur, ac A indicat partem ipsius ad narium summum prominulam, nonnullisq; mamillarem processum nuncupatam. B uero cerebri partem insinuat, amplum caluariæ sinum subeuntem, qui ad latus sinus consistit, quo glans cerebri pituitam excipiens reponitur. C autem maxime posticam cerebri fidem notat.
- D, D Cerebellum.
- E Sinister cerebri processus, organo olfactus subministrans.
- F Nervi uisoriij sinistri ortus.
- G Nervorum uisorijs coitus.
- H Tunica, in quam uisorijs nervus exoluitur, degenerat uel.
- I Secundum nervorum cerebri par.
- K, K Minor radix tertij paris.
- L Crassior radix tertij paris.
- M Quartum par.
- N Quinti paris gracilior radix.
- O Quinti paris insignior radix.
- P Membrana, in quam quintum par in auditus organo præcipue exoluitur.
- Q, R Maioris quinti paris radices propagines, quorum hæc per caluam elabitur foramen, illa uero per aliud sibi proprium.
- S Sextum nervorum par.
- T Septimum nervorum cerebri par. atq; horum nervorum progressus hic non delineari potuerit, uti elegantissimè proponuntur secunda figura huius libri secundo Capiti præposita.
- V Dorsalis medullæ ex cerebri basis medio initium.
- O Dorsalis medullæ sedes qua caluariam egreditur.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

- x, x Propagines nervorum ex lumborum uertebra exilientium, quæ ab dominis & huius sedis musculis & cuti dispensantur.
- y Nervulus testem frequenter petens, hicq; resectus.
- z Propagines sextum femur mouentium aduenies musculum.
- σ Primus femur petens nervus.
- α Primi nervi propago cuti oblata.
- β Primi nervi propago altius inter musculos assumpta.
- γ Secundus femur petens nervus.
- α, α Secundi nervi soboles per internam femoris et tibiae sedem ad pedis usq; superiora sub cute excurrentes.
- ε Secundi nervi propago musculis anteriorem femoris sedem occupantibus deprompta.
- ζ Tertius femoris nervus.
- η Tertij propago, internam femoris cutem implicans.
- θ Tertij propago musculos adiens.
- ι, ι Quartus femoris nervus, cuius exortus æquè atq; trium superiorum est conspicuus.
- κ, κ Series anteriorum propaginum inferiorum parium è sacro osse prodeuntium.
- λ Dorsalis medulla extremum.
- μ Quarti femur petentis nervi propagines ad capitula musculorum à coxendicis ossis appendice prodeuntium sparsæ.
- ν Quarti nervi soboles in posteriorem femoris cutem ad medium usq; longitudinis femoris excurrentes.
- ξ Propago præcipue in quartum tibiae mouentium musculum, ac dein in reliquam posteriorem femoris cutem iuxta genu digesta.
- ο Soboles in musculos ab inferioribus femoris capitibus pronatos.
- π, π Quarti nervi in duos truncos distributio, ac quidem minorem, & uero insigniorem notat.
- ρ Minoris trunci propago, externa tibiae cuti ad parui digiti usq; extremum diffusa.
- τ Propago fibulae inter musculos exporrecta.
- υ Ramulus anteriorem tibiae cutem implicans.
- φ, φ Grandioris trunci ramus interna tibiae ad pollicem usque digestus.
- χ Grandioris trunci ramus, posteriori tibiae seu suræ cuti exporrectus.
- ψ Grandioris trunci ramus, ligamentum peronei fibulam tibiae quæ hæc ossa inuicem dehiscent committens, ac dein ad digitorum usq; superiora excurrentes.
- ω Præcipua grandioris trunci portio, inter tibiae os & calcem pedis inferiora petens, singulisq; digitis surculos offerens.

LIBRI QVARTI
FINIS.

p 4

ANDREAE VESALII⁴₃₅₅

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPORIS
FABRICA LIBER QUINTVS, ORGANIS NVTRI-
tioni quæ cibo potuque fit, & dein propter partium connexum, ac viciniam instrumentis
generationi famulantibus dedicatus, & omnes sibi peculiâres figuras seriatim simulq; mox in
initio ostendens, quo minus eadem figuræ plerisq; Capitibus
passim præponendæ ueniant.

PRIMA QVINTI LIBRI FIGVRA.



PRIMAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHARACTERVM INDEX.

PRÆSENTI figura tanta humani corporis portio delineatur, quanta ad pe-
ritonæi sedes ostendendas sufficit: exprimitur itaq; hac figura anterior peritonæi sedes, sectio-
nis serie ab octo abdominis musculis libera, nullaq; ex parte dissecta.

A, A, B, C, D His characteribus peritonæum insignitur, quodammodoq; hac figura terminatur.

E, E Linea à mucronata pectoris ossis cartilagine ad pubis usq; ossium commissuram procedens, cui
obliquè descendantium & ascendentium, & transuersim procedentium abdominis musculorum
neruosæ tenuitates pertinacissimè connascuntur.

F Umbilicus, quem inter disseccandum etiâ ademptis abdominis musculis, gratia opportuna umbi-
lici uasorum demonstrationis, reseruare solemus.

G Seminaria sinistri lateris uasa suis membranis, quas à peritonæo mutuuntur, adhuc obuoluta.

H Seminaria dextri lateris uasa.

I Vena ac arteria, quæ potissimum inferiori sedi rectorum abdominis musculorum exporrigun-
tur, quorum & hic quoq; propendet portio.

K Vena & arteria, quæ sub osse pectoris exporrectæ, in anteriorem abdominis sedem prolabun-
tur, præcipuè rectis abdominis oblatae musculis, ac superiorè abdominis sedem uniuersam quoq;
implicantes: quemadmodum illæ quas I insigniuimus, humiliorè & pubis ossibus uiciniorè implicat.

L Venarum

L Venarum soboles in peritonæi latera excurrentium, ac ab illis uenis deductarū, quæ aut à coniuge carente uena, aut geniculatim à caua pronascuntur, quæ ipsius caudex lumborum uertebri colligatur.

M Transuersi abdominis musculi portio à peritonæo diuulsa, retrorsumq; flexa.

N Ilium ossis sedes hic nuda conspicitur, cui obliqui transuersiq; abdominis committuntur musculi. Verum quum præsentī figura, uti etiam subsequētib; omnib; ea duntaxat organa explicare uisum sit, quæ hoc pertractabuntur libro, non est quod illas quoq; indicem partes, quæ figuris ob hoc adduntur, ut describendæ partis sedes in conspectu promptior esset: cuiusmodi in hac figura est, thoracis inferior sedes abdominis musculis libera, & femorū initia cute duntaxat denudata.

SECUNDA QVINTI LIBRI FIGVRA.



SECUNDÆ FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERVM INDEX.

H A E C figura primam sectionis serie subsequitur. hic nanque peritonæum recta linea à pectoris ossis mucronata cartilagine ad pubis usque os ita diuisum est, ut umbilici uasorum nulum uitiauerim: dein transuersa sectione à sinistro ilio ad dextrum ducta, quatuor peritonæi anguli ab anteriori corporis sede in posteriora reflexi conspiciuntur. Præterea umbilici quoque una pars cū ipsius uasis, quæ peritonæo prius connectebantur, oculis subiacet. Ad hæc præsens figura iecoris portionē, & uentriculi sedem, ac omenti intestinis obducti sitū indicat, quem omentum obtinet, quum manibus ipsum uersus pubis os inter dissecandum trahitur, si quando sursum uersus sinistrum latus (uti plerunq; accidit, ac sequenti figura occurret) retractū adinuenitur.

A, B, C, D Quatuor peritonæi partes dissectæ, atq; in posteriora reflexæ, adeo ut interna anterioris

ris

ris peritonæi sedis regio hic ex sectionis serie in conspectum uenerit.

F. Vena ab umbilico in iecur porrecta.

G Venæ umbilici in iecoris rimā ingressus.

H, H Portio iecoris ex gibba ipsius sede apparens.

I Præcipuum ligamentum iecur septo transuerso cōnectentium, quod uersus dextrum latus mucronatæ cartilaginis consistit. Scutum enim id ad sinistrum **I** latus conspicuum, mucronata est pettoris ossis cartilago.

K Dextra arteria ab umbilico secundum dextrum uesticæ fundi latus ad magnā prorepens arteriā.

L Sinistri lateris arteria ab umbilico secundū uesticæ sinistræ sedē, ad magnā exporrecta arteriā.

M Meatus, quo à vesicæ fundo fortis urina in secundam fortum inuoluentem tunicam expurgatur.

O Peritonæi ad vesicæ fundum nexus.

P *Ventriculi anterior pars, quæ neq; iecore, neq; omento obtegitur. Hæc sedes ob hoc amplior apparet, quod uenter quem hic depinximus impensè inflatus fuerat: quemadmodum & huius cadaveris uesica paulo quoq; elatiùs solito, supra pubis ossa elatiori sua parte efferebatur.*

Q, Q, Q, Q Omentum.

R Vena & arteria simul cum nervo dextræ sedi inferioris partis ventriculi exporrectæ.

S Sinistri lateris uasa, quæ sinistram fundi uentriculi sedem amplexantur.

T Hac sede dextri lateris uasa sinistris committuntur, ac proinde etiam R, T & S suturam indicāt, cuius Aristoteles tertio Historiæ de animalibus libro, ut & quarto de Animalium partibus meminit, quum à medio uentre omentum oriri dependereq; asserit.

X. X Venarū arteriarūq; propagines superiori omenti membranæ exporrectæ, adipeq; cinctæ.

TERTIA QVINTI LIBRI FIGVRA.



TERTIA figura secundam administrationis ordine subsequitur, ac humiliorem omenti membranam à superiori diuulsam laceratamq; gerit, ac superior quidem super thoracis anteriora & uentriculum quoque extensa est. Dein uentriculus etiam ui sursum ad pectus ex sua sede tractus uisitur, ut humilioris omenti membranæ natura in conspectum per opportunè ueniret: quam eousq; intestinis adhuc obducta cernis, quousq; omentum subinde sursum sinistrorsumq; collectum dissecantibus occurrit. Præterea in præsentī figura intestinorum situs inturbatus iacet, uti & lien quoq; cuius pars hic etiam oculis subiicitur.

K. L. M. N & O eadem hic atq; in secunda figura notantur. nam **K** indicat umbilici arteriam dextram, **L** uero sinistram. **M** meatum, quo fœtus urina in secundum ipsius inuolucrum excernitur, quiq; hic, ut & arteriæ, abtruncatus conspicitur. Cæterum **N** uesicam notat: **O** autem peritonæi cum anteriori uesicæ sede connexum. Atq; in hac figura peritonæi angulos, qui secunda figura **A, B, C & D** insigniti erant, rescuimus.

a, a Superioris membranæ omenti, quam & alam superiorem nonnulli appellant, posterior sedes, qua inferiorem membranam integro adhuc omento spectat.

b, b Extuberans hæc sedes uentriculus est, superiori membrana omenti tectus.

c, c Omenti humilior mēbrana, quæ nonnullis humilior ala nuncupatur. Cæterum extuberans pars, cui duo superiora **c & c** inscribuntur, colum est intestinum, quæ uentriculi exporrigitur fundo, ac inferiori membrana omenti, uice mesenterij utitur.

d Hic lien etsi omento obducitur, protuberans sese ostendit, ad quod etiam pellucida omenti inuat substantia.

Inferior omenti membrana hic modò quæ uentriculo subiicitur, quàm pluribus notanda erat characteribus: uerùm quò minus illam characterum copia oblitterarem, eos in subsequenti figura ponendos duxi. præcipuè quum leui opera lector eosdem characteres utrisq; figuris inibi adhibitos fingere possit, ubi ambæ idem exprimunt.

QVARTA QVINTI LIBRI
FIGURA.



HAC figura omentum suis quibus adnascitur, aut potius à quibus initium ducit, membris liberum, & nulla interim parte diuulsum delineatur, integraque ipsius constructio & praecipue uenarum, arteriarum & neruorum per ipsum series, & glandulosa corpora ipsi innata com-
 monstrantur. Quàm concinnè uerò omentum sacculo, aut perae, aut minoribus piscatorum reti-
 bus assimiletur, hac quoque figura discitur.

e, e Omenti circulus, seu orificium, quo initium ducit.

f, f, f Omenti superioris membranae anterior facies.

g, g Inferioris omenti membranae anterior facies. at haec non integra ut superioris membranae anterior facies hic conspicitur, quum inferioris membranae sedes tantum in conspectu sit, quae uentriculo substernitur, atque ad colon usque intestinum, quae id uentriculo exporrigitur, pertinet. Reliqua enim inferioris membranae pars superiori membrana occultitur.

h, i, k Tribus his characteribus ad sinistrum latus inferioris membranae omenti positus, omenti constructio insignitur. Nam **h** omenti partem notat membranam, uenis arterijsque & adipe quoque caren-
 tem. uerò uasa indicat, **k** autem adeps uasis attensus adnatus ue exprimitur. Atque ut hos chara-
 cteres hac omenti parte reposui, ita etià quauis ipsius sede eas potuisse collocari, nemo ambigit.

l Venae portae caudex quae ex iecore prodiens inferiori membrana omenti continetur ac suffulcitur.

m Arteria iecoris cauum & bilis uesiculam petens, neruoque concomitata qui à dextri lateris se-
 xti neruorum cerebri paris nerui ramo, dextri lateris costarum radicibus exporrecto depromi-
 tur, ac iecoris cauum bilisque uesiculam adit.

n Principium uenae inferioris uentriculi orificij posteriorem sedem potissimum accedentis, & ar-
 teriam habentis coniugem.

o, o Arteria & uena & neruus, secundum superioris omenti membranae principium, dextrae fundi
 uentriculi sedi exporrecti.

p, p Illorum uasorum quae dextrae fundi uentriculi sedi exporriguntur surculi, corpus uentriculi implicantes.

q, q Dictorum iam uasorum quae fundi uentriculi dextrae sedi exporriguntur propagines, in superio-
 rem omenti membranam sparsae.

r Vena arteriaque duodeno intestino & ieiuni intestini principio exporrectae, neruulumque socium
 frequenter admittentes.

s Portae uenae in duos truncos bipartitio, quod uero uenas **r** & **o** indicatas hic elatius quam in ni-
 da portae uenae figura tertij libri quinto capiti dedicata, delineauerimus, in hoc factum putato,
 quod earum uenarum ortus in hunc modum subinde uariet.

t Dexter seu grandior uenae portae truncus, in mesenterium adeoque intestina excurrens.

u Vena in posteriorem uentriculi sedem citra arteriae consortium excurrens.

x Vena cum arteria et neruo in dextram inferioris membranae omenti sedem sparsa, ac colon quod
 que intestinum hac parte accedens.

y Vena simul cum arteria in uentriculi posteriora excurrens, & tandem coronae ritu superius uen-
 triculi orificium amplectens, uerum huius uenae arteriaque tanta duntaxat delineatur portio, quan-
 ta inferiori membrana omenti sustinetur.

α Hic nonnihil grandior mesenterij arteria se offert, etiam si minimo interuallo inferiori membra-
 na omenti suffulciatur.

β Truncus est arteriae, quae inferiori omenti membranae intertextus, uentriculo, iecori, bilis uesiculae, colo-
 quae id uentriculo exporrigit, ac dein lienem ramos depromit, neruosque has partes adiuuantes comitat.

γ Vena simul cum arteria et neruo mediam potissimum sedem subiens inferioris membranae omenti,
 & ramos quoque offerens colo intestino quae ad uentriculi prorepat fundum.

δ Vena coniugis arteriae expers, quae sinistrae sedi inferioris omenti membranae pauculas soboles,
 ut & ipsa gracilis est, diffundit.


ε Venarum, arteriarum & neruorum in lienem series.

ζ Vena pariter cum arteria neruoque uentriculi fundi sinistrae sedi exporrecta.

η, η Glandulosum corpus inferiori membranae omenti innatum, quod uulgo uocant Brisauolo, Dul-
 cem morsum seu bolum, Buccam saporitam, Rodol.

θ Glandulosi corporis portio, quod duodeno intestino subnascitur.

superioris




SEXTAE FIGVRAE INDEX.

*I*N sexta quinti libri figura sectionis serie tertiam subsequente, iecur uentriculus & intestina proprias seruant sedes, omento interim quâ à uentriculo enascebatur, coloq; intestino continuum erat, prorsus resecto, ne forte id relictum alicuius organi sedem obliteraret. Præterea, ut singula opportunius oculis subijcerentur, costarum aliquot fines (uti inter pingendum factum est) effregimus, ipsas unâ cum peritonæo septoq; transuerso illis connato in posteriora reflectentes.


*V*esica autem hic respondet tertiæ ac secundæ figurarum uesicæ. Cæterum quia præsentis figuræ characteres magna ex parte cum duabus nunc succedentibus communes sunt, non abs re erit ante illius indicum explicationem, quid his designetur, sermoni adijcere.

HAC figura tenuium intestinorum ductum duntaxat delineauimus, aliqua etiam uētriculi et coli intestini simul cum cæco asseruata portione, ut facile præsens figura iam subsequenti adaptetur. Quod autem coli intestini initium paulo magis quam par sit, ab ipsis tenuibus intestinis abductum uideatur, in hoc factū arbitrator, ut sola gracilia in conspectum accuratè uenirent. potissimum quum coli intestini circum tenuia situm ingressumq; sexta figura pulchrè proponat.



OCTAVA QVINTI LIBRI FIGVRA.

PRÆSENTI figura cæci intestini & coli & recti imago ductusq; demonstratur, unà cum ilei intestini extremo, & musculis recto intestino proprijs.



CHARACTERVM SEXTAE, SEPTIMAE ET OCTAVAE
figurarum Index.

SVBSEQUENS modo characterum Index sextæ, septimæ & octauæ figuris cõmunis est. si quis uero interim character harum alicui peculiaris sit, illum pro figuræ numero aut 6 aut 7 aut 8 insigniturus sum: characteres autem, quibus huiusmodi nulla subiungetur notula, tribus figuris communes censebis.


- A* 6 Mucronata pectoris ossis cartilago.
- B, B* 6 Peritonæum unà cum disruptis costis, illisq; adnato septo retrorsum atq; in latera flexum.
- C* 6 Primarium ligamentum, quo iecur humanum septo colligatur.
- D, D* 6 Iecoris gibbi magna sedes.
- E* 6 Portiuncula uenæ ab umbilico iecori insertæ.
- F, F* 6 Vētriculi anterior sedes.
- G* 6 Lienis sinistrum latus, seu ipsius pars in corporis anteriora uergens.
- H* 7 Vētriculi portio, quæ inferius uentriuli cõstituit orificium, seu intestinorum principium quod hic chordula ligatum finximus.

- I, K* 7 Pars intestinorum ab *I* ad *K* protensa, uulgato nomine nunc duodenum intestinum, nunc intestinum duodenum digitorum longitudine, mihi uocatur.
- L* 7 Ieiuni intestini initium, graciliumque intestinorum sedes, ubi primum in anfractus conuolui atque antrosum assurgere incipiunt.
- M* 7, 8 Ilei intestini terminus, & gracilium intestinorum finis. uerum quamnam sede ieiuni intestini terminus, aut ilei intestini principium sit ponendum, augurari nequeo, quum toto ductu qui ab *L* in septima figura in eadem & octaua ad *M* usque pertinet, nullibi discrimen commonstret, quo ieiunum ab ileo liceret interstinguere.
- N* Extuberans crassorum intestinorum initium.
- O* Hoc intestinum mihi caecum nuncupatur, non admodum contendenti an quis eo nomine aliam crassorum intestinorum partem donari uelit: modo is non adeo nominum sit studiosus, ut illorum occasione ea in intestinorum fabrica spectare negligat, quae in partium aliarum constructione sedulo inquirimus.
- N, P, Q, R, S, T, 6, 8* Colum intestinum his characteribus insignitur, uerum singuli priuatim aliquid notant. *N* enim ad *P* usque coli intestini ductum notat, à dextri renis sede ad iecoris usque cauum pertinentem. *A* P uero ad *Q* coli ductus notatur, secundum uentriculi fundum à iecoris cauo ad lienis usque regionem protensus. *A* *Q* autem ad *R* ductus coli insinuatur, à lienis regione ad pubis os, secundum sinistrum ile procedens. Ceterum ab *R* ad *S* (quod in 8 priuatim uisitur) coli indicatur ascensus anfractusque, quem sursum ad umbilici usque regionem molitur. At *S* ad *T* usque progressum notat, dicti nunc ascensus ad recti intestini initium.
- V, V* 6, 8 Depressa coli intestini sedes.
- X, X* 6, 8 Coli intestini utrinque extuberantes semiglobuli, quos cellulas uulgus uocat.
- Y* 6, 8 Recti intestini initium. Quicquid uero sub *Y* consistit, rectum est intestinum.
- Z* 7 Portio meatus bilem in intestina perferentis.
- a* 8 Musculus recti intestini finem orbiculatim amplectens, faciumque excretioni praefectus.
- b, c* 8 Duo musculi rectum intestinum post facium excretionem sursum alacriter contrahentes.
- d* 8 Hac sede rectum intestinum uirorum peni & mulierum uteri ceruici interuentu musculosa substantiae connascitur.
- e, f* 6 Duae arteriae foetui peculiares.
- g* 6 Hoc caractere uesticae fundus indicatur, uti & meatus quo foetus urina expellitur, quemque hic ut & nuper commemoratas arterias ab truncatum finximus.

NONA QUINTI LIBRI FIGURA, CUIVS
VTI ET EIVSDEM CHARACTERVM INDICEM
hic lateri adhibuimus.

- HAC* figura recti intestini & coli quoque quae id recto continuatur, partem expressimus, intestinorum tunicas demonstraturam.
- b* Prima intestinorum tunica, quae & intima est, ac solis transversis circularibusue confirmatur fibris.
- i, i* Secunda intestinorum tunica, quae transversis quoque efformatur fibris. attamen rectis quoque eo donatur pluribus, quo recto intestino uicinior est.
- k, k* Mesenterij est portio, quae rectum intestinum ossi sacro committit, ac tertiam ipsi exporrigit tunicam.
- L, L* Tertia intestinorum tunica, à mesenterij pronata membranis.





DECIMAE FIGVRAE EIVSDEM QVE CHA-
racterum Index.

V T præsens figura mesenterij situm quàm appositissimè oculis subijceret, gracilia intestina un-
decunq; ad latera sursum deorsumq; inuicem manibus diducta continet, ac proinde mesenterij cō-
monstrat centrum, et rationem qua mesenterium intestinis uasa porrigit, intestinaq; dorso conne-
ctit. Ad hæc, eius quoque mesenterij partem ostendit, quæ coli finem & rectum quoq; intestinū
dorso alligat. Succedit uerò hæc figura sectionis serie illi quam sextam locauimus.

A, B, C, D Portiones peritonæi, aperto iam abdomine in latera extrorsum flexæ.

E, E, E Tenuia intestina.

F Cæcum intestinum.

G, G, G Colon intestinum.

H Recti intestini initium.

I Vesica, cui peritonæum ea potissimum sede connascitur, ubi alteram ipsi offert tunicam.

K Mesenterij centrum, eaq; dorsi pars qua id à peritonæi membranis initium ducit. quæ magnam
arteriam & cauam uenam hic uertebrearum corporibus adnectunt.

L, L Corpus glandulosum, mox in ipsa uasorum distributione positum, quæ mesenterij centro in-
seruntur.

M, M Glandulae uasorum distributionibus interiectae, quae uasa in ipso per mesenterium ad intestina moluntur progressu.

VNDECIMA QVINTI LIBRI


FIGVRA.




VNDECIMAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHARACTERUM INDEX.

- H I C* duntaxat ipsum delineatur mesenterium e corpore exemptum, omnibusque partibus ipsi connatis liberum, praeterquam ab inferioris membranae omenti portione, qua colon dorso inibi colligatur, ubi secundum inferiorem uentriculi sedem id procedit.
- K* Character *K*, ut & in decima figura, mesenterij indicat centrum.
- L, L* Hi quoque characteres similiter atque in decima, glandulosum corpus notant, totius mesenterij maximum.
- M, M* Glandulae notantur illis interpositae uasorum dissectionibus, quae iam intestinis appropinquant.
- N, O* His characteribus mesenterij circumscribitur pars tenuia intestina dorso alligans.
- P* *P* ad *Q* usque mesenterij indicat portionem, colon intestinum dorso affirmantem, qua id a dextri renis sede ad cauum usque iecoris protenditur.
- Q* *Q* ad *R* usque inferioris omenti membranae partem notat, qua colon tota illa sede dorso committitur, qua id secundum uentriculi exporrigitur fundum.
- R* *R* ad *S* usque mesenterij insinuat portionem colo intestino tota ea sede propriam, qua id a lienis regione ad rectum usque intestinum pertinet.
- S, T* Quod *S* & *T* intercluditur, mesenterij pars est rectum intestinum dorso neclens.
- V* Hac sede mesenterij naturam exprimere conati sumus, quandoquidem unam mesenterij membranam ab altera unguibus diuulsam pinximus: ut *X* nimirum una sit, altera uero *Y* inscribatur. Atque in harum membranarum medio mesenterij uasa excurrunt, & ipsius adeps, ut & glandulae etiam continentur, quemadmodum quoque in uigesima quarta huius libri figura est cernere.

DVODECIMA QVINTI LIBRI FIGVRA, QVAE
IAM PRAEPOSITIS INTEGRIS FIGVRIS SECTIO-
nis serie succedit. Habet enim dissectū peritonæum, & omentum quoq; in hac ablatū est, & hic
costas aliquot etiā effregimus, quò iecoris cauū opportunius delineari posset. Hic namq; conspi-
citur uniuersum iecoris cauū, ipsiusq; iecoris forma. Dein uētriculi quoq; apparēt orificia. Inte-
stina autē perinde ac uentriculū in sinistrū latus depressimus, ut in cōspectu esset mesenterij pars,
ac uenæ portæ in ipsum series: dein bilis meatus in intestinū insertio, et si quæ sint reliqua quæ cha-
racteribus seriatim adnotabimus, mox atq; quid decima tertia ostendat figura, expresserimus.



DECIMATERTIA QVINTI LIBRI FIGVRA,
NVDAM BILIS VESICVLÆ EIVSDEMQUE
meatum delineationem exprimens.



P R A E S E N S characterum Index duodecimae & decimae tertiae figurae; ideo habetur communis, quod cauum iecoris sedem plerisque characteribus quibus decimae tertia occupatur insigniri licuisset, nisi characterum copia delineationem fuisset uitiatum. Quum itaque character occurreret duodecimae figurae peculiaris, illi 1 subiungemus, illis qui decimae tertiae priuatim inscribuntur 2 adiecturi. Si uero quis utrisque figuris simul communis erit, illi 1 & 2 addetur.

- H, H₁** Peritonaei una cum costis euersti portio. **I, K₁** Cauum iecoris.
L₁ Portiuncula gibbi sedis iecoris. **M₁** Iecoris sectio, cui foetum alia uena primum inseritur.
N₁ Rimae ac impressiones & tubercula in iecoris cauo iuxta uenae portae exortum conspiciuntur. **N** uero superius, seu sinistrum, seu ipso **T** uicinius, sedem indicat, qua ab umbilico procedens uena iecoris cauo ubi portae caudex prodit, inseritur. Ab **M** enim ad **N** usque foramen notatur, quod liberè quodammodo umbilici transmittit uenam ad sedem **N** insignitam. (colligas.
O₁ Ligamentum sinistram iecoris partem (quae in angulum quodammodo acutum desinit) septo transverso hic
Φ₁ Sinus iecori hic incisus, ac stomacho cedens, ubi is superiori uentriculi orificio continuatur.
P, Q₁ Venterculus.
R₁ Ventriculi superius orificium, seu stomachi finis, una cum uenis, arterijs, & neruis id orificium amplexantibus.
S_{1,2} Humilius uentriculi orificium, ipsiusque duodeni intestini initium, quod in duodecima figura secus atque secundum naturam se habet, ad interiora refleximus, ut in conspectum ueniret bilis uesiculae meatus in ipsum insertus, ac mox c notandus.
T₁ Nerus a neruis elatus uentriculi orificium implicantibus eductus, iecorisque cauo insertus.
V₂ Bilis uesicula. Haec in utrisque praesentibus figuris est conspicienda. uerum priuatim illam duntaxat in decimae tertia characterem notauimus, ac proinde primum decimae tertiae, ac dein duodecimae mentem hic & in subsequentibus aliquot characteribus accommoda.
X, X₂ Meatus bilis uesiculae per iecoris corpus exporrecti, inter portae uenae et cauae ite uenae ramos.
Y₂ Venae portae propago in iecoris substantiam diffusa.
Z₂ Venae cauae propago in iecoris substantiam digesta. **V**olui enim hic exprimere uasorum in iecoris substantia situm, qui scilicet portae uenae rami propaginibus cauae subijciuntur, et quoniam pacto in horum medio bilis uesiculae meatus excurrant.
a₂ Concursum meatuum bilis uesiculae, qui in iecoris corpus digeruntur.
b₂ Uesiculae bilis ceruix, cui meatus ex iecore ductus ac a notatus inseritur, communisque efficitur.
c_{1,2} Bilis uesiculae meatus in duodenum intestinum insertus, ac **S** ad **d** usque in decimae tertia figura duodenum denuo indicat intestinum, quod humiliori sede apertum finximus, ne meatus illius c notati insertio lateret.
e₂ Arteria in iecoris cauum & bilis uesiculam digesta.
f₂ Neruulus iecori & bilis uesiculae communis, & a sexti paris neruorum cerebri propagine depromptus, quae dextri lateris costarum exporrigitur radicibus.
g₂ Tenuis portae uenae propagines, in bilis uesiculam excurrentes.
h₁ Portae uenae caudex. (stinet.
i, i₁ Glandulosum corpus, quod duodeno intestino adnascitur, uasaque ipsi exporrecta opportune subiunguntur.
k, l, m, 1 Mesenterium. **V**erum singuli characteres priuatim quid indicant. **k** enim uenae portae dextri seu grandioris trunci distributionem in mesenterium notat. **l** uero, glandulosum corpus in mesenterio primis uasorum distributionibus praefectum. **m** autem, mesenterij insinuat partem, cui colon intestinum tota illa sede committitur, qua a dextri renis sede ad iecoris usque cauum pertinet. Hic namque colon intestinum a mesenterio diuulsum est, quo mesenterij centrum aptius delinearetur.
n₁ Vena quae sub posteriori recti intestini sede deorsum protenditur, ipsique recto intestino uenas
o₁ Uesicae fundi superior pars etiam hic est conspicienda. (porrigit.
p₁ Quod hic extruberat dexter est ren, sua pingui membrana adhuc obiectus.
q₁ Meatus urinarius, a dextro rene urinam in uesicam deducens.
r₁ Vena ac arteria seminales dextri lateris.
s₁ Vas semen a dextro teste uersus ceruicis uesicae initium perferens.

DECIMAQVARTA QVIN

TI LIBRI FIGVRA, AN


terio rem integri uentriculi & stomachi
faciem exprimens, unà cum uenis, ar
terijs & neruis uentri
culo insertis.



DECIMAQVINTA QVIN

TI LIBRI FIGVRA, IN

te gri uentriculi & stomachi postero
rem exhibens faciem.



CHARACTERVM DECIMAEQVARTAE ET DECI
mae quintae figurarum Index.

CHARACTERES hoc Indice explicandi partim utriq; figuræ communes sunt, partim nunc huic, nunc illi peculiares: ac proinde communes 1 & 2 indicabimus. peculiari- bus uero decimæ quintæ figuræ characteribus, hæc 1 subiicietur, decimæ sextæ autem hæc 2.

A_{1,2} Stomachi pars in fauces orisq; adeo amplitudinem pertinens, hic à faucibus præsecta cernitur.
A₃, B_{1,2} Ab A ad B usque ductus stomachi notatur, recta per mediam uertebra- rum ceruicis & quatuor superiorum thoracis sedem descendens.

AB

- B, C_{1,2} A B ad C usq; ductus stomachi in dextrum latus super quintam & aliquot sequentes thoracis uertebras modicè declinans.
- C, D_{1,2} A C ad D usq; stomachi ductus insignitur ex dextra sede uersus sinistram, supra magnam cõscendens arteriã, & per septum transuersum in uentriculi superius orificiũ G notandũ pertinēs.
- E, E₁ Duæ tonsillæ, quæ non procul à stomachi sede in oris cavitatem pertingente distant.
- F, F_{1,2} Glandulosum corpus stomacho frequēter adnatũ, qua quintæ thoracis uertebræ corpori insidet.
- G_{1,2} Superius uentriculi orificium. H_{1,2} Inferius uentriculi orificium.
- I_{1,2} Superior uentriculi pars. K, K_{1,2} Ventriculi demissior pars, seu fundus.
- L, L₁ Anterior uentriculi sedes.
- M, N, O₂ Posterior sedes uentriculi. Verũ singuli characteres aliquid priuatim indicant. O enim impressiõnem notat quam uentriculus ea sede exigit, qua uertebis innititur. M quidem prominentiorem sinistri lateris partem, N uero partem dextri lateris prominentiorem.
- P_{1,2} Duodenum intestinum, quod hic ad ieiuni intestini principium resectum finximus.
- Q₂ Bilis uesiculæ meatus, in duodenum intestinum insertionem tentans.
- R₂ Hic character in interna dicti nuper intestini sede uisitur, insertionem meatus illius notans, quem modò Q insigniui.
- S₂ Glandulosum corpus duodeno intestino subnatum, uasaq; illi intestino exporrecta suffulciens.
- T_{1,2} Dextri nerui sexti paris neruorum cerebri propago, ad stomachũ exporrecta, multipliciq; serie in ipsius orificium elatius distributa. V_{1,2} Sinister neruus.
- X₂ Sinistri nerui propago, secundum elatiorem uentriculi sedem ad iecur usq; excurrens, hicq; quæ Y. iecori proxima est, Y insignita.
- a₂ Prima (uti doctrinæ studio nuncupare eam solemus) uentriculi uena & arteria.
- b₂ Secunda uentriculum accedens uena, quæ coniuge caret arteria.
- c_{1,2} Tertia uentriculi uena cum coniuge arteria & neruo quoq; secundum dextram uentriculi fundi regionem exporrecta. (tu amplectens.
- d_{1,2} Quarta uentriculi uena coniugem obtinens arteriam, & elatius uentriculi orificium coronæ ricæ
- e₁ Rami iam dictæ uenæ & arteriæ, qui secundum uentriculi elatiorem sedem ad inferius usque ipsius orificium contendunt.
- f_{1,2} Quinta uena simul cum coniuge arteria & neruo, sinistram sedem fundi uentriculi perreptans.
- g, g_{1,2} Aliæ uenæ ac arteriæ, ab illis pronatæ uasis quæ lieni inseruntur.

DECIMASEXTA QVINTI LIBRI FIGVRA.

H A C figura uentriculum à stomacho ac intestinis liberauimus, ac dein inuertimus, ut interior uentriculi sedes seu superficies cibos & potus amplectens, in conspectum ueniret.

b Circulare uentriculi tuber ea sede conspicuum, ubi stomachus uentriculo continuatur, aut ubi elatius ipsius consistit orificium.

i Tuber orbiculatum quoq; in humiliori orificio uentriculi apparens.




DECIMASEPTIMA QVINTI LIBRI FIGVRA.

P R A E S E N S figura uentriculi tunicarum seriem numerumq; et naturam, quantum pictura assequi potuimus, docet.

k Tertia uentriculi tunica, à peritoneo pronata, atq; hic à uentriculo magna ex parte diuulsa.

l Secunda uentriculi tunica, minus quàm tertia à uentriculo diuulsa.

m Prima intimaq; uentriculi tunica, hac in parte à duabus exterioribus tunicis libera.



DE HVMANI CORPORIS FABRICA LIBER V.
DECIMAOCTAVA QVINTI LIBRI
FIGVRA.

4
369

P R A E S E N S figura iecoris gib-
bam posterioremq; sedem unā cum cauae uenae
caudicis portione exprimit.

A, A Iecoris gibbi superior pars.

B, B Iecoris gibbi posteriorisq; sedis infima regio.

C Cauae uenae sedes, qua septum permeat, ipsiq;
soboles exporrigit.


D, E Hoc interuallo sedes notatur, qua cauae cau-
dex posteriori iecoris sedi innascitur.

F Portio praecipui iecur septo alligantis uinculi.

G Ligamentum iecoris partem in sinistra maxime exporrectam septo connectens.

H Venae portae portio.

I Sinus quo iecur stomacho cedit, qua sinistro uentriculi orificio continuatur.



DECIMANONA QVINTI LIBRI FIGVRA, QVAE
LIENEM OMNI EX FACIE COMMONSTRAT, CV-

ius situm & ex proportionem magnitudinem, uigesima quae mox subijcietur figura literis

O, O, P explicabit: praesens uero quatuor quodammodo peculiaribus constans
effigiebus, seu tabulis, in hunc habet modum.

PRIMA. SECUNDA. TERTIA. QVARTA.



QVATVOR DECIMANONAE FIGVRAE TABELLARVM
earundemq; characterum Index.

P R I M A lienem anteriori facie exprimit, unā cum omenti portione, seu inferioris superioris

A risq; omenti membranarum partibus. *A* namq; lienis sinistrum indicat latus, dextrum autem

B, B ac media ipsius sedes omento integuntur. *B, B* & *B* enim inferioris omenti membranae portio-

C, C nem indicant, lienis uasa deducentem. *C* uero & *C* superioris omenti membranae portione signi-
ficant, qua ad uentriculum uasa perferuntur, ab illis uasis pronata quae in lienem iamiam inseren-
da ueniunt.

Secunda effigie decimae nonae quinti libri figurae lienis caua regio exprimitur, ab omnibus quae

D, E illi committuntur partibus libera. ac hic *D* notat superiorem lienis sedem, *E* inferiorem, *F* sini-

F, G stram, *G* dextram. *H* uero & *H* lineam indicant in caua lienis regione conspicuam, cui lienis


H uasa inseruntur.

Tertia effigies lienis gibbum commonstrat.

Quarta lienis quoque cauam sedem delineatā continet. At huic duas indidit sectiones, ut lienis

I, K substantia conformatioque oculis subijcerentur. Atque hic *I* & *K* sectiones modo di-
ctas indicant.

VIGESIMA



VIGESIMAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHA-
racterum Index.

P R A E S E N S figura sectionis serie duodecimæ succedit. ab hac enim omnia intestina
execuimus, relicta duntaxat uentriculi portione superioris orificij uentriculi sedem common-
strante. atq; ita hæc figura pleraq; indicat, quæ nunc opportunius cum characterum indicibus se-
riatim insinuabuntur.

- A, A* Septi transuersi portio peritonæo succincta, atq; unâ cum costis aliquot sursum reflexa.
- B, B* Caua iecoris sedes.
- C* Iecoris ligamentum, quo ipsius sinistra pars septo alligatur.
- D* Venæ per umbilicum iecori exporrectæ portio, ubi & sinus ille indicatur primum hanc admit-
tens uenam, quæ per priuatum ipsi in iecore humano incisum foramen ad iecoris usque sedem per-
reptat, ubi hic *G* non procul à *K* adhibitum conspicis, ubiq; uena hæc in iecoris substantiam pri-
mùm uerè digeritur.
- E* Hac sede iecur sinum obtinet, quo cedit stomacho per septum transuersum ad elatius uentriculi
orificium contendenti.
- F* Superius uentriculi orificium, uentriculiq; portio.
- G, G* Lineæ impressiones uel tuberaq; in iecoris cauo ubi partem uenam promit conspicua.
- H* Bilis uesicula.

- I Portæ uenæ caudex hic abscissus. Verū I quoq; duas indicat uenulas bilis uesiculæ exporrectas.
 K Iecoris neruus ab illis propagatus, qui elatiori uentriculi implicantur orificio.
 L Arteria iecori & bilis uesiculæ communis.
 M Neruus à sexti neruorum cerebri paris propagine initium ducens, quæ dextri lateris costarum exporrigitur radicibus. atq; hic neruus iecori pariter & bilis uesiculæ communis censetur.
 N Bilis uesiculæ meatus hic abtruncatus uisitur, qui ad intestina pertinet.
 O, O Lienis anterior cauaq; regio. P Lienis linea, cui uasa ipsius implantantur.
 Q Vena caua. R Magna arteria.
 S Radices arteriarum in uentriculum, iecur, lienem, omentum, mesenterium, ipsaq; demum intestina excurrentium.
 T Dexter ren, pingui sua obductus tunica.
 V Sinister ren, similiter pingui ipsius inuolutus tunica.
 X Vena in sinistri renis pinguem diffusa tunicam.
 Y Vena dextri renis pinguem tunicam accedens.
 a Vena arteriaq; dextro reni serosum sanguinem deducentes.
 b Vena arteriaq; in sinistram protensa renem, emulgentesq; uulgo non secus appellata, quam illæ quæ dextro reni sunt propriæ.
 c, c Meatus ex dextro rene urinam in uesicam deferens.
 d Meatus quo sinistri renis urina in uesicam ducitur.
 e Seminalis uena sinistram accedens testem. f Seminalis uena, dextri testis.
 g, g Surculi à seminalibus uenis qua peritonæo committuntur, in ipsoq; adeo uersus testes progressu, ad peritonæum deriuati.
 h Seminalis arteria dextrum testem petens.
 i Arteria seminalis quæ sinistro testis est propria.
 k Arteriæ in humiliorem mesenterij sedem ad colon intestinum et rectum excurrentis radix.
 l Arteriæ magnæ super cauam uenam ascensus, ac ipsius magnæ arteriæ & cauæ supra ossis sacri initium in duos truncos diuisio.
 m, m Præcipuæ uenæ ac arteriæ earum quæ geniculatim à magnis uasis lumborum carnibus ipsiq; peritonæo offeruntur.
 n Arteriæ magnæ soboles sacri ossis foramina accedentes.
 o Recti intestini pars à colo libera, atq; ut inter disseccandum fit, uinculo intercepta.
 p Vesica urinæ receptaculum.
 q Semen à teste ad penem deferentis uasis portio, qua secundum pubis os deorsum ad uesicæ ceruicis initium retorquetur.
 r Cutis quæ penem inuestiebat. s Scortum.
 t Carnosæ membranæ pars, quæ haud secus atq; scortum, utrunq; ambiebat testem.
 u Tunica à peritonæo inibi pronata, ubi seminarijs uasis iter præbet. estq; hæc exterior testis tunica, earum quas testibus singulis proprias peculiareq; numeramus.
 x Denudati penis portio.

VIGESIMA PRIMA QVINTI LIBRI FIGVRA,
 QUÆ TRES PROPRIAS CONTINET TABEL.

las sectionis serie inuicem subsequentes, ac appositissimè renū sinus meatuumq;
 urinariorum principia ostendentes.

PRIMA. SECUNDA. TERTIA.



P R I M A tabella sectionem secundum renis longitudinem per gibbum ipsius inductam habet adeo profundam, ut in secundum renis pertingat sinum, interim nulla renis substantiae abla-
 α. β. ta portione. Significet igitur α dextri renis anteriorem partem, β uero posteriorem. γ & γ ori-
 γ. γ. ficia sunt ramorum primi sinus renis, seu ipsius membranei corporis, qua inuicē illi rami coeunt. Hic
 α. α. enim rami necessario per sectionem in mutuo coitu diuiduntur. δ, δ primi sinus corpus, seu mem-
 braneum corpus in quod uena & arteria renis terminantur.


ε Foraminulum hoc urinarij meatus est initium.

λ Urinarij meatus pars. Super membraneum hoc corpus δ & δ insignitum, secundus renis consti-
 tit sinus, cuius interius & corpori illi membraneo proximum latus in hac sectione tantum appa-
 ret. Eius enim partes quae in exteriora ad utrumq; septi ex renis substantia conformati latus pro-
 ζ. u. ducuntur, ipsumq; sinum uelut bipartitum efficiunt, nisi specillo in circuitu sub ζ hic & u deducto
 intueri nequis. Septum namq; illud praesenti sectione in duas partes, anteriorem scilicet & poste-
 riorē diuisum cernitur, ac u quidem partem ipsius notat anteriorem, ζ uero posteriorem.

Secundae effigiei omnia cum nuper commemorata sunt communia, nisi quod uniuersa propemodū
 renis substantia septum illud constituens, cultello orbiculatim adempta sit, neque aliter sanē sep-
 ti illius figuram ob oculos ponere licuit. Conspicitur hic itaq; secundus renis sinus uniuersus, at
 non quemadmodum est bipartitus, eo quod septum abstulerim sinum hunc in exteriori ipsius late-
 re dirimentem. α igitur & β & γ & λ eadem hic quae in prima tabella notant. Circulus autem
 θ. inter α & β ductus, secundum renis indicat sinum. δ uero anteriorem partem primi sinus, seu mem-
 branei corporis, qua haec in ramos discinditur. ι corporis membranei posteriorem partem indi-
 cat. adeo ut θ & ι simul membraneum notent corpus, seu primū renis sinum: κ autem urinarij mea-
 tus insignitur origo.

Tertia tabella primi sinus seu membranei corporis ra-
 mos omnes insinuat. renis enim substantia, quae summis eius sinus ramis adnascitur, penitus dera-
 est. Atq; haec citra characterum operam sunt obuia.


VIGESIMASECVNDA QVINTI LIBRI FIGVRA.



- P R A E S E N S** figura sectionis serie uigesimae succedit. in hac namque costarum aliquot fines effracti, & extrorsum sursumq; retorti occurrunt, ut iecoris gibbum ita hic spectare tur, ut ipsius cauum in uigesima figura in conspicuo erat. Renes hic etiam pingui illorum tunica denudati sese offerunt. In hac figura uenarum arteriarumq; seminalium exortus ductusq; etiam ostendēte, priuatim à cauae uenae caudice ramulum pronasci effinximus, qui sinistrae seminali cō miscetur uenae. Præterea peritonæum quā uasis seminarijs iter præbet, unā cū tunica à peritō neo pronata, testemq; & sui lateris uasa seminaria amplectente, dissectum est, & cum seminarijs uasis testes cum suis musculis obuij sunt. Insuper pubis ossa inuicē ita dirempta atq; adeo reflexa uidētur, ut inuicē insigniter dehiscant, & uesica, & glandosum corpus uesicæ ceruici propriū, unā cū ipsius musculo & penis corporib. eorundēq; progressu oculis subiiciatur. Quod autē à dextro femore cutē prorsus & à sinistro aliqua ex parte ademimus, neminē ambigere reor.
- a, a Peritonæi pars cum septi transuersi portione, & effractis costis sursum extrorsumq; reflexa.
b, b Iecoris gibbum. c, c Caua iecoris sedes.
d Præcipuum iecoris ligamentum, ad dextrum latus mucronatæ cartilaginis consistens, & hic à iecoris anteriori sede magna ex parte diuulsum.
e Ligamentum iecoris partem in sinistrum protensam septo committens.
f Venæ portæ portio, unā cum arteria & neruis iecur petentibus, et bilis uesiculæ meatu intestinali petente, hic uinculo est intercepta, & dein præsecta.
g Venæ cauae caudex. h Arteriæ magnæ truncus deorsum spinæ exporrectus.
i Principium uenæ pinguem sinistri renis tunicam adeuntis.
k Radices arteriarum in intestina excurrentium, & uentriculo, iecori, bilis uesiculæ, lieni, et ipsi demum omento ramos offerentium.
l Initium uenæ dextri renis pingue inuolucrum petentis.
m Vena ac arteria dextrum accedentes renem.
n Vena ac item arteria sinistro reni serosum sanguinem deducentes.
o, o Dextri renis pingue inuolucrum, ab anteriori sede renis liberatum.
p, p Sinistri renis pingue inuolucrum, ab anteriori etiam sede sui renis diuulsum, et peritonæo unde principium ducit, adhuc connexum.
q, q Et dexter & sinister meatus, quo urina è renibus in uesicam fertur, q insignitus est.
r Seminalis uena dextrum accedens testem.
u Principium seminalis uenæ dextrum testem adeuntis, quod instar rotundi tuberis prominet.
x Seminalis uena sinistro testis exporrecta.
y Venula à uenæ cauae caudice pronata, ac uenæ seminali sinistrae commixta unita ue. Quamuis enim hæc uenula rariùs occurrat, tamen quum in alijs figuris sinistra uena absque hac delineatur, illaq; hic nihil obscuret, ipsam exprimere uisum est.
æ Seminalium arteriarum origo.
ß Surculi, quos uenæ seminariæ peritonæo inibi depromunt, quā ipsi connexæ deorsum ad pubis ossa contendunt.
γ Dextræ seminalis uenæ, & item arteriæ, per peritonæum supra pubis ossis coxendicisq; regionem descensus, ac ascensus pariter semen à teste deferentis uasis, quod u, & x mox notabitur.
δ Venæ seminalis & arteriæ commixtio, & corporis quod uaricum imagini conferam, initium.
ε Varicosi corporis in testem insertio. ζ Testis intimo ipsius inuolucro obiectus.
η Principium semen à teste deferentis uasis.
ι Sedes qua deferens semen uas sursum secundum testis humillimam sedem reflectitur, & à teste ipsi non amplius connatum, abscedere incipit.
κ Hic semen deferens uas nullam amplius conuolutionum ostendit speciem, at sursum instar nerui teres porrigitur.
ν Vesica urinæ receptaculum.
ξ Glandulosum corpus uesicæ ceruicis initio adnatum, & semen deferentium uasorum insertionem excipiens.

- g Circularis uesticae ceruicem ambiens musculus.
- z, r Duo penem constituentia corpora, quorum sinistrum à suo principio quod à sinistro pubis osse ducitur, liberatum est: dextrum autem corpus suo principio adhuc pubis dextro osse firmatur. Præterea hic S nostri figura in cōspicuo est, quā penis flaccidus lāguidusq; cū uestica effingit.
- v Venarum & arteriarum neruorumq; penem adeuntium series, tam aptè ac in huiusmodi figuris id moliri datur expressa.
- φ, χ Primum exterius ue testis peculiare inuolucrum à peritonæo inibi pronatū, ubi φ ascripsimus. ubi uerò χ locatur, ea eius inuolucris sedes notatur, qua hæc infimæ testis parti connascitur.
- ψ Testis musculus iam dicto inuolucro innatus.
- ω Musculus femur mouentium septimus hic se spectandum offert, quā super coxendicis os deorsum ducitur.
- * Recti intestini portio, quæ in corpore dum intestina reliqua auferuntur, relinqui consuevit. Supra hanc recti intestini portionem eleganter quoque uenæ cauæ & arteriæ magnæ distributio circa ossis sacri regionem uisitur.

VIGESIMATERTIA QVINTI LIBRI
FIGURA.



VIGESIMATERTIAE FIGURAE, IPSIVSQVE PARTIVM
& characterum Index.

VIGESIMA tertia figura multas peculiareffigies, tabellasue, simul cum illa quæ mox præcessit, ac ordine uigesimasecunda fuit, potissimum ad uirilium organorum generationis inspectionem facit, & ambas quum primum characteribus insignirentur, decimotertio huius libri Capiti præponendas ducebam. unde etiam in utrisq; eadem prorsus est characterum ratio. Verum quod iam satius fore arbitrer omnes præsentis libri figuras hic seriatim col-

loca

locari, priuatum indicem huic uigesimatertiae figuræ dedicabo, characteres quæ huic & uigesimæ secundæ communes sunt, denuo non grauate explicaturus. Porro in hac uigesimatertia figuræ duæ sunt præcipuæ effigies, quarum unam non inopportune dextram, alteram uero sinistram appellabimus. ac in utrisque quidem effigiebus renes, uesicæ & seminaria organa cum uenæ cauæ et arteriæ portionibus execta è corpore finximus. Atque hæc quidem in dextra anteriori facie, in sinistra autem posteriore delineantur. & in dextra adhuc priuatim uesicam, & ipsius ceruicem seu meatum semini urinæque communem aperuimus, quum hæc in sinistra adhuc sint integra: quem admodum in characterum explanatione dicturus sum diffusius, simulatque effigies expressero, quæ sinistrum latus & inferiorem præsentis uigesimatertiae figuræ sedem occupant, ac maiusculis Latinorum literis in hunc modum notantur.

- A, B.* Duabus his tabellis dextrum testem anteriori facie, at magis secundum sinistrum latus ostendentibus, idem exprimitur. uerum superior *A* insignita ab inferiori *B* indicata in hoc differt, quod ipsa semen deferentis uasis situm inturbatum ostendat: quum interim inferior *B* notata deferentis semen uasis partem, quæ secundum testis anteriora sursum fertur, neque amplius testis adnascitur, ex sua sede sinistrorsum habeat reflexam, detrusam uel, ut insertio applicatioque uenæ & arteriæ seminalium ad testem in conspectum ueniret. At hæc characterum utrisque effigiebus *A* & *B* insignitis communium opera reddentur dilucidiora.
- C* Vena & arteria seminales illic abtruncatæ, ubi iam ex magna peritonæi amplitudine excidentibus inuicem implicantur, commiscunturque, ac corpus quod uaricosum mihi appellabitur efformare incipiunt, seu huius uaricosi corporis quod pyramidi assimilabitur conus.
- D* Basis uaricosi corporis, seu sedes qua uena & arteria seminalis testis inseruntur, & ramulos in testis intimum inuolucrum & testis substantiam spargunt.
- E* Vasis semen à teste deferentis initium.
- F* Reflexus uasis semen deferentis secundum testis humiliorem sedem.
- G* Sursum conscendens deferentis semen uasis portio, & ipsius regio in qua amplius testis connasci desinit.
- H* Præsens effigies deferentis semen uasis portionem ostendit, quæ testis intimo connata erat inuolucro: & foraminula illa asperitatesque cernuntur, quæ in eius uasis sede post sectionem conspiciuntur, quæ inuolucro illi connascebatur.
- I* Hac effigie eadem uasis semen deferentis portio, quæ et mox præcedenti delineatur. uerum hæc sedem eius portionis ostendit, quæ gibba est, testisque inuolucro non connascitur.
- L* Testis à quo semen deferens uas absectum est, ipseque adhuc testis cum intimo ipsius inuolucro et uaricoso corpore remansit.
- M* Hac eadem cum effigie *L* notata indicat. uerum ut illa anteriorem testis faciem exprimebat, ita hæc posteriorem: & duæ subsequentes notæ utrique sunt communes.
- N* Prima uenæ & arteriæ seminalium commixtio, seu uaricosi corporis conus.
- O* Uaricosi corporis basis, & in testis substantiam ipsiusque intimum inuolucrum insertio.
- P* Testis suo intimo adhuc obductus inuolucro, sed à uaricoso liberatus corpore, & superiorem ipsius regionem ostendens, in qua uaricosum illud corpus inseritur. Apparent namque hic foramina ramulorum uaricosi corporis, qui (uti dicebam) testis implantantur.
- Q* In hac effigie intimam testis tunicam inuolucrum uel nouacula dissectui, & ex altero latere à testis substantia eius inuolucris partem *R* notatam diremi, in posterioraque reflexi, ut ductus in conspectum uenirent, qui à ramis inuolucrum intertextentibus in testis substantiam pertinent.
- S.* Teram uero huius inuolucris partem *S* insignitam, testis adhuc connatam reliqui.
- T* Hic testis per medium dissectus iacet, uasorum per ipsius substantiam diffusorum, ac *V* & *V* naturam distributionisque seriem monstrans. Qui uero modo subsequuntur characteres, duabus grandioribus & magis præcipuis uigesimatertiae figuræ effigiebus proprii habentur.
- 1* Hac numeri nota indicatur anterior renis regio.
- 2* Posterior renis regio.
- 3* Superior renis regio.
- 4* Inferior renis regio.
- 5* Externum renis latus.
- 6* Internum renis latus: in quo *6*, *7*, & *8* sinum eius lateris indicant. uerum *6* priuatim notat eius sinus tuber. *7* autem & *8* sinum eius angulos impressionesque.
- g* Venæ cauæ caudex, inibi abscissus, quæ deorsum tendens iecur superauit.

- b* Arteriæ magnæ truncus inibi resectus, ubi primum sub septo transuerso in peritonei amplitudinem fertur.
k Radices arteriarum quæ mesenterio & inferiori membranæ omenti digeruntur.
l Venæ pinguem dextri renis tunicam petentis principium.
m Venæ & arteria dextro reni serosum sanguinem deducentes.
n Venæ & arteria sinistro reni in serosi sanguinis ductu famulantes.
o Venæ in pinguem sinistro renis tunicam excurrentis origo.
q, q Meatus urinam è renibus in uesticæ amplitudinem deportantes.
r Meatum urinam uesticæ deducentium in uesticam insertio, ac in dextra quidem effigie orificia indicantur, quæ hi meatus in uesticam pertinent, & membranei processus quoq; his orificijs præfecti, in sinistra autem effigie sedes indicatur, qua illi meatus primum uesticæ applantantur.
t Seminalis uena dextra.
u Tuberculum, seu protuberans seminalis uenæ dextri lateris principium.
x Venæ seminalis sinistrum petens testem.
α Seminalium arteriarum ex magnæ arteriæ caudice initia.
β Surculorum radices quos uenæ seminales peritonæo offerunt, quæ illi secundum lumborum regionem committuntur.
δ Venæ arteriæq; seminalium coitus commixtio ue, & uaricosi corporis initium.
ε Venæ & arteriæ seminalium ad testem insertio, seu uaricosi corporis basis.
ζ Testis intimo ipsius inuolucro adhuc obtectus.
η Principium uasis semen à teste deferentis.
θ Descensus uasis semen deferentis secundum posteriorem testis regionem.
ι Locus quo deferens semen uas rursum secundum testis humiliora sursum fertur, neq; amplius testi connascitur, uti faciebat ab η per θ ad ι.
κ Sedes deferentis semen uasis, ubi primum nerui modo citra omnem reuolutionem spiram ue sursum properat.
λ Hac sede semen deferens uas ad posteriorem regionem uenæ ac arteriæ seminalium reflexum, in peritonæi amplitudinem contendit.
μ Dextri semen deferentis uasis cum sinistro coitus, propter uesticæ ceruicis initium.
ν Vescica, quæ in dextra effigie priuatim ad aperta est, ipsius commonstrans cavitatem.
ξ Glandulosum corpus uasorum semen deferentium insertionem excipiens, ac in dextra effigie longa sectione ad meatus usq; urinarij amplitudinem dissectum.
ο Amplitudo cavitatisq; ceruicis uesticæ, in quam uasa semen deferentia insertionem moluntur.
ρ Musculus uesticæ ceruicem ambiens, ac urinæ excretioni præfectus.
σ & τ Duo penem potissimum constituentia organa.
υ Venæ ac item arteriæ penem ceruicemq; uesticæ accedentes.
φ Sedes notatur meatus urinæ seminiq; communis, quæ reliquo ipsius ductu amplior in penis glande uisitur.

VIGESIMAE QVARTAE FIGURAE, EIVSDEM QVE
characterum Index.

FIGURA sequentem paginam occupante muliebris corporis truncus humi stratus exprimitur, cuius peritonæum unâ cum abdominis musculis ad apertum est, ac in latera (uti inter secundum fit) reflexum. Deinde intestina omnia à mesenterio præsecuimus, recto intestino adhuc in corpore relicto, simul cum integro mesenterio, cuius membranas hic aliqua ex parte inuicem diremimus, ut mesenterij natura oculis subijceretur. Verum præsens figura in hoc potissimum delineata est, ut uteri & uesticæ positum ita ostenderet, quemadmodum in hac muliere utero nobis nulla ex parte moto, is occurrit. Nulla enim hic ab utero diuulsa est membrana, sed omnia integra ita hic uisuntur, quemadmodum in mediocriter obesâ mulieribus iam amotis intestinis secanti obuiam ueniunt. Mulieres namque adeo pingues sunt, ut longo etiam morbo enecatæ & macilentissimæ, nullam uasorum seriem (nisi membranâ mutuo diremptis) ostendant.




- A, B, C, D* Peritonæi anterioris sedis interior superficies.
E, E Mesenterij pars tenuia intestina dorso connectens.
F, F Altera mesenterij membrana notatur, ab altera quam *G, G* insigniui diuulsa. *V*traq; autem membrana uasorum per mesenterium seriem, et glandularum uasorum distributionibus interpositarum naturam indicat.
H, H Hac mesenterij parte colon intestinum, quæ recto erat proximum, committebatur.
I Hac mesenterij parte, coli intestini initium, seu ipsius cum tenuibus intestinis continuïtas, deinceps quoq; intestinum consistebant.
K Rectum intestinum inibi præsectum ubi colon desinit, quæ sedes est è regione connexus sacri ossis cum infima lumborum uertebra.
L Anterior uteri fundi sedes, à qua nihil prorsus auulsum cernitur.
M Dexter mulieris testis.
N Mulieris sinister testis. atq; huius anterior pars hic tota oculis subijcitur, quum interim dextri testis modica uideatur portio: idq; ideo accidit, quod dextrum testem ita delineauerimus, quem admodum uterque testis membrana tegitur seminaria mulieris uasa deducente, atque à peritonæo nata: sinistrum uerò testem illa membrana deteximus, quòd solius manus, nullo adhibito cultro, fit beneficio. Hac namque membrana anteriori testis sedi nulla ex parte adnascitur, sed incumbit solum.
O, O Membrana à peritonæi dextra sede pronata, & testem dextrum unà cum huius lateris seminariis uasis, ac illis quæ uteri elatiorem sedem implicant uasis, dorso committens, utrumq; pariter continens, & deniq; cum alterius lateris membrana secundam uteri tunicam constituens.
P Hæc in nuper dicta membrana carneæ excurrunt fibræ, dextrum uteri constituentes musculū.

His

- Q Q His characteribus sinistrae lateris membrana notatur, quæ illi correspondet, quam nuper O, O indicarunt.
- R, S Uteri cervicis anterior pars, inter R & S ea adhuc obducta tunica, quam peritonæi partes illi offerunt, quæ ipsi uasa exporrigunt, deducuntq; ac illum peritonæo adnectunt. Cæterum interuallum inter R & S consistens, uteri cervicis amplitudinem quodammodo significat. Rugæ uero hic conspicuæ, illæ sunt quas uteri ceruix in se collapsa, neq; aliàs distenta, inter secundum commonstrat.
- T Vesica, cuius posterior facies hic potissimum spectatur. ita enim in figuræ huius delineatione oculum direximus, ac si in corpore prostrato, posteriorem uesicæ sedem quæ uterum spectat, potissimum cernere uoluissimus. Si enim præsens muliebre corpus ita uti id quod modo subsequetur, erectum arbitrareris, etiam secus atq; res se habet, uteri fundum multo elatius ipsa uesica delineatum esse tibi persuaderes.
- V Umbilici est portio, à peritonæo inter secundum liberata, & unà cum uasis foetui peculiaribus hic deorsum reflexa. X Portio uenæ ab umbilico iecur petentis.
- Y Meatus à uesicæ fundi elatissima sede ad umbilicum pertinens, ac foetus urinam inter secundum & intimum ipsius inuolucrum deducens.
- Z, et & Duæ arteriæ ab umbilico huc secundum uesicæ latera prorepentes, atq; hac sede magnæ arteriæ ramis pubis ossium foramina potissimum aduentibus insertæ, seu continuæ.

VIGESIMA QUINTA QVINTI LIBRI FIGVRA.



A praesentis figurae dextra mamilla cutem abstulimus, ut quam fieri posset proximè mamilla-
rū natura hic oculis subijceretur. Deinde uentriculum, & cum intestinis mesenterium et lienē re-
secuimus, recto interim intestino non secus quam in mox praecedente figura relicto. Ad haec, ute-
rum suo extimo quod peritoneum ipsi porrigit inuolucro quodammodo spoliauimus, omnes mem-
branas quam licuit accuratissimè passim, ideo amputantes, ut seminis materiam testibus deferen-
tia & rursum semen ab his utero deducenda uasa in conspectum uenirent. Vesicam uerò deor-
sum in sinistrum latus refleximus, unà meatum à dextro rene ipsi urinam deferentem abrumpen-
tes, ut urinam uesicae deferentium meatum insertio appareret, ipsa quoque uesica uteri inspectionem
non occuparet. Postremo pubis ossium portionem ab hac figura exsecuimus, quo uteri ceruix ac
uesicae etiam collum appositè uiderentur.

- A, A*, Venae ad mamillas subinde excurrentes ab illis quae cuti summo humero obductae offeruntur.
B Venae ab illis pronatae quae per axillam in manum porriguntur.
C Praecipuum mamillae corpus.
D, D Glandulae ac adeps undecumque corpori illi glandoso ac C insignito adstratae.
E, F G, H Peritonaei anterioris sedis interior superficies, est enim hic anterior peritonaei regio,
ad latus, & sursum deorsumque flexa.
I, K Venarum ac item arteriarum sub pectoris osse deorsum à iugulo prorepentium portiones.
L Iecoris gibba sedes.
M Iecoris cauum hic quoque aliqua ex parte conspicuum.
N Venae ab umbilico iecur petentis portiuncula.
O Venae portae caudex hic simul cum uasis ipsi attensis praeseclus.
P Venae caua.
Q Arteria magna.
R Arteriarum uentriculum, iecur, lienem, omentum ac intestina petentium radices.
S Principium uenae pinguem sinistri renis tunicam implicantis.
T Vena ac arteria dextro reni serosum humorem deducentes.
V Vena ac arteria sinistro reni serosum humorem deferentes.
X Principium uenae pinguem dextri renis tunicam adeuntis.
Y Dextri renis anterior sedes.
Z Sinistri renis anterior facies.
a, a Meatus à dextro rene urinam in uesicam deducens, & ad humiliora effractus, portio autem hu-
b. ius meatus reliqua, ac uesicae adhuc continua, b insignitur.
c, c Meatus urinam à sinistro rene in uesicam deferens.
d, d Dextra seminalis uena, cuius initium elatius d indicat.
e Seminalis uena sinistrum petens testem.
f Seminalium arteriarum ortus.
g Seminalis arteria dextra.
h Seminalis arteria sinistra.
i, k, l Anterior uteri fundi pars, ac i dextrum fundi obtusum indicat angulum, k autem sinistrum, lue-
rò regionem uteri ubi ipsius fundi consistit orificium, ipsiusque ceruix inchoatur.
m Rectum intestinum, quo minus utrumque figurae latus inibi ubi par utrinque est ratio onerem, uni-
duntaxat lateri iam characteres opportune adhibebo.
n Venae ac arteriae seminalis portio, uteri fundi superiorem accedens sedem.
o Venae ac item arteriae seminalis portiones testem adeuntes, et inuicem coeuntes, corpusque instar
p. pyramidis constituentes, ac p huius corporis basim notat, testi commissam.
q Anuper dicto corpore eiusmodi uascula in membranas excurrunt, testem peritonaeo committentes.
r Testis anterior facies.
s Vasis semen à teste in uterum deferentis initium.
t, t Vasis semen deferentis reflexus, quos id circum testis latera conficit.

- u Vasis semen deferentis ad uterum progressus.
 x, x Vteri ceruix.
 y Vasa inferiorem uteri fundi sedem ac uteri ceruicem implicantia.
 a Vena uesticam ab illis uasis accedens, quæ uteri ceruicem intertexunt. atque hic etiam character urinariorum meatuum insertionem notat.
 α, β Vescicæ fundi posterior sedes.
 γ Vescicæ ceruicis musculus.
 δ Hac sede uesticæ ceruix uteri ceruici implantatur.
 ε Cuticulares ceruicis uteri orificij carunculæ. atq; hic uteri colles & ceruicis ipsius orificium, citra characterum operam neminem latent.
 ζ Arteriæ humillimam mesenterij partem accedentis radix.
 η Vasa ab illis quæ crus adeunt uenis ac arterijs sursum ad abdominis musculos ascendentia.

VIGESIMASEXTA QVINTI LIBRI
 FIGVRA.



VIGESIMASEXTAE FIGVRAE EIVSDEMQUE CHARACTERUM INDEX.

- PRÆSENS figura uterum unâ cum illum peritonæo alligantibus membranis à corpore exsectum commonstrat. atque ipsius ceruix adeo hic sursum est conuoluta eversa q; ut fundi uteri orificium in conspectu sit. Vescicæ uerò fundum & ceruicem quoq; aperuimus, ut uesticæ cavitates meatuumq; urinariorum insertio in propatulo essent.
- A Vteri fundi anterior facies, nulla membrana prorsus detecta.
 B, B Vteri ceruix.
 C Fundi uteri pars glandis modo in superiorem uteri ceruicis sedem protuberans.
 D Orificium fundi uteri.
 E, E Membrana uterum peritonæo connectens, ipsiusq; uasa continens.
 F Sinister uteri testis.
 G Vena & arteria seminalis.
 H Portio uenæ ac arteriæ seminalium, uteri fundi superiorem sedem accedens.
 I Portio arteriæ & uenæ seminalium testem accedens.
 K Vas semen à teste in uterum deducens.
 L Vescicæ cavitates.
 M Urinariorum meatuum insertio.
 N Urinariorum meatuum frustula hic propendent.

PRÆSENS figura uterum à corpore exectum ea magnitudine refert, qua postremo Patavij dissectæ mulieris uterus nobis occurrit. atq; ut uteri circumscriptionem hic expressimus, ita etiam ipsius fundum per mediū dissecuimus, ut illius sinus in conspectum ueniret, unā cum ambarum uteri tunicarū in non prægnantibus substantiæ crassitie.

- A, A. B, B. Vteri fundi sinus.
C, D. Linea quodāmodo instar suturæ, qua scortum donatur, in uteri fundi sinum leuiter protuberans.
E, E. Interioris ac propriæ fundi uteri tunicæ crassities.
F, F. Interioris fundi uteri portio, ex elatiori uteri sede deorsum in fundi sinū protuberans.
G, G. Fundi uteri orificium.
H, H. Secundum exteriusq; fundi uteri inuolucrum, à peritonæo pronatum.
I, I et c. Membranarum à peritonæo pronatarum, & uterum continentium portionem utrinq; hic asseruauimus.
K. Vteri ceruicis substantia hic quoque conspicitur, quod sectio qua uteri fundum diuisimus, inibi incipiebatur.
L. Vesicæ ceruicis pars, uteri ceruici inserta, ac urinam in illam proijciens.
Vteri colles, & si quid hic spectādum sit reliqui, etiam nullis apposis characterebus, nulli non patent.


S VIGES.



VIGESIMAOCTAVA QVINTI LIBRI FIGVRA.


HÆC figura canum non prægnantē exprimit uterum, quem propter ueterum descriptiones hic humano utero adijcere uisum est, uti magis adhuc uaccinum, quem modò subiungemus.

- A* Vena & arteria seminalis.
B, B Venæ et arteriæ seminaliū portiones, uteri superiori sedi uasa porrigētes.
C Testis, ac uas semen à teste deferens.
D, D Membranae uterum peritonæo committentes, & secundum ipsius inuolucrum efformantes.
E Vena ac arteria uteri ceruicem & humiliorem fundi partem implicantes.
F Dextra fundi uteri pars, secunda ipsius tunica adhuc uniuersim obducta.
G Sinistra fundi uteri pars, quam media ex parte, exteriorē ipsius liberaui.
H mus inuolucro. *G* enim exterius, *H* uerò interius notant.
I Sinistri lateris uas semen deferens, hic à teste liberatum, ac in ipsius sede seruatum.
K Regio, qua fundi uteri orificium consistit.
L Uteri ceruix etiam sinistra ex parte exteriori inuolucro detecta.
M Portio ceruicis uesticæ.
N Cutis ad pudendum adhuc reliqua.

VIGESIMANONA QVINTI
LIBRI FIGVRA.

PRÆSENTI figura uaccini uteri fundum, & ipsius ceruicis portionem ita delineauī, ut magna fundi ceruicisq; sedes exteriori inuolucro sit detecta, interiorq; tunica oculis subijciatur.

- A* Testis sinister.
B Vas semen deferens à teste in uterum.
C Sedes orificij fundi uteri.
D Sedes ubi uterus geminus sit, adhuc tamen utraq; parte simul exteriori uteri inuolucro obiecta.
E Hac sede prorsus duæ uteri partes inuicem, arietum cornuum modo dirimuntur.
F, F Externum uteri inuolucrum his sedibus adhuc seruatum.
G Interius uteri inuolucrum innumeris ac uermium implexu non abstergilibus uasis intextum.
H Membranae hic adhuc uisitur portio, uterum sinistra in sede peritonæo committentis.

TRIGESIMA QVINTI LIBRI FIGVRA,
QVATVOR PECVLIARIBVS COMPLEXA TABVLIS.

PRIMA. SECUNDA. TERTIA. QVARTA.



TRIGE-

PRIMA tabula uterum masculino foetu turgidum, in anteriori ipsius sede una longa & altera transversa sectione diuisus, uteri fundi tunicarum partes in latera, atque adeò ab extimo foetus inuolucro diducentes.

A, B, C, D Interna superficies uteri, quæ ante sectionem foetus inuolucris obducebatur.

E, E Exterior uteri superficies, atque elatius *E* uteri apicem seu angulum dextrum notat, sursum dextrorsumq; magis quam sinister, quod hic masculus utero geratur, ex porrectum.

F Primum extimum ue foetus inuolucrum.

G, G Secundum foetus inuolucrum hic quoq; magna ex parte uisitur.

H Uteri ceruicis pars, cui in altero latere uenam & arteriam adnatam reliquimus, quæ in humiliorum uteri fundi sedem potissimum dispensatur.

I Dexter uteri testis hic quoq; ut ipsius in grauidis situs uideretur, adhuc relictus.

SECUNDA tabula foetus inuolucra illacera ex utero dempta commonstrat.

K Extimum foetus inuolucrum.

L, L Secundum foetus inuolucrum: quod quum pellucidum membranæ modo sit, in ipso complexu cum tertio inuolucro foetum nonnihil conspici sinit.

TERCIA tabula extimum foetus inuolucrum, & secundum longa sectione diuisus, ac utraque à tertio inuolucro seducta, hic una cum tertio inuolucro adhuc integro expressus.

M, M Tertium intimum ue foetus inuolucrum: quod quia egregie pellucidum est, foetum nonnihil eo situ ostendit, quo is in ipso iacet.

N, N Venarum arteriarumq; series ex primo foetus inuolucro umbilicum petens.

O, P, O, P Secundum foetus inuolucrum: atque *O* & *O* internam ipsius indicat superficiem, Puerò & *P* externam.

Q, R Primum foetus inuolucrum: atque *Q* externam notat superficiem, *R* autem internam. Vasorum autem per tertium & secundum inuolucrum series, etiam citra notarum opem promptè dignoscitur.

QUARTA tabula foetum omnibus suis tunicis liberum, itaq; iacentem exprimit, quemadmodum in utero magna Naturæ providentia secus quam Anatomicorum uulgus arbitratur, in omni media figura locatur. Falsissimum nanque est, quod ita conglobatus, aut (ut sic dicam) sphaericus iaceat, ut genibus faciem contingat, itaq; in extrema prorsus figura reperiatur. imò si hunc uerum ipsius situm obseruaueris, nullius prorsus articuli motum magis inuenies medium minus ue laboriosum, atq; is est quem modo singuli obtinēt articuli. Cæterum in hac figura *M, M, N, O, P, O, P, & Q, ac R* idē notāt quod tertia tabula: nisi quod *M* & *M* internam superficiem insinuant tertij seu intimi inuolucris, *S* autem hic priuatim indicatur uasorum umbilici progressus, qui inter umbilicum & uasorum cum tertio inuolucro connexum habetur, quiq; longo ducitur interuallo, nodis aliquot interdum, aut, ut uerius dicam, uaricosis tuberculis donatus, è quorum numero obstetrices ridiculè futuram adhuc proliū copiam præsagiunt, etiam quum hunc progressum (uti interdum fit) collo obductum cernunt: addentes illam quam suscipiunt prolem, suspendio necandam. Eiusmodi nanq; permulta, si unquam alibi mulieres, quum parturientibus adstant, & non nisi magnis precibus nos admittunt in medium, & potissimum apud Italas bene peritas, effutiunt.

HOMINEM NECESSARIO CORRUPTIONI

obnoxium mortalemue esse: quo autem diutius uiueret augeteturq; instrumentis ipsum eguisse multifariam nutritioni famulantibus, ac demum quæ instrumenta nutritioni circa cibos potusq; uersanti priuatim sint extructa. Caput I.

Generationis
nostræ princi-
pia.



VANDO QUIDEM corporis humani generatio-
nis primordia, & eorum quibus id constituitur mate-
ria, hominem fieri immortalem prohibuerūt, rerum
autor Deus, ut ille quàm diutissime uiuat, neq; aliquā-
do species ipsius deficiat, sed semper immortalis perse-
ueret, sollicitè machinatus est. Sanguis enim mēstruus
semenq; genitale generationis nostræ sunt principia:
ille ceu materia quædam apta concinnaq;, & semini
ad quiduis sequax: hoc opificis rationem obtinens.
Constat autem horum utrumq; ex iisdem genere ele-
mentis, aqua, terra, igni, & aëre, quamuis interim mu-
tuò temperamenti mensura uariant. siquidem in semi-
ne plus est igneæ substantiæ atq; aëreæ, in sanguine a-
queæ terreæq;. quanquam præpolleat in hoc quoq;

& candidum frigidum, & humidum siccum. Eoq; fit, ut non siccus instar pili, aut ossis, sed humidus
merito dicatur. At semen sanguine quidem siccius est, ceterum ipsum etiam humidum fluxileq;
sentitur. Atq; ita nobis utrinque ex humida substantia genituræ origo succedit. quam tamen
humidam seruari non licebat, si modò ex ea uenæ, arteriæ, nerui, membranæ, ligamenta, carti-
lagines, ossa, & id genus alia fieri debebant. Ergo mox in generationis initio coniunctum
copiosius oportuit elementum, quod siccandi facultate polleret: est uerò id natura quidem ma-
ximè ignis, sed tamen & terra. Verum huius plus misceri principiis nō oportebat, si modò hæc
humida erant futura. Ignis igitur in utroq; principio tantum admixtum est, quantum non tor-
rens abundè siccet. Ab hoc itaq; primùm cogitur, paulumq; concrefcit quod in utero conce-
ptum est: mox siccius redditum, ueluti lineamenta quædam & rudimenta cuiusque membri
adipiscitur. Vtteriùs uerò etiam siccescens, non lineamenta rudimenta ue solùm, sed & cuiusq;
memברי exactam speciem exprimit. Iam uerò in lucem editum, magnitudine proficit, & siccus
ualentiusq; tantisper efficitur, donec ad summum pertingat incrementum. Tum uerò & incre-
mentum omne sistitur, ossibus nimirum ipsis per siccitatem non ultrà sequacibus, & uasa san-
guinis ac spiritus amplissima sunt: cuncta denique membra non solùm robusta euadunt, sed
etiam uires suas summas obtinent. Subsequenti autem tempore, omnibus iam partibus supra
iustum siccescentibus, non solum cuiusque officium minus probè administratur, sed etiam cor-
pus ipsum macilentius graciliusq; quàm erat antea, redditur: ac proinde ultra siccitū, non ma-
cilentius modò, sed & rugosum euadit. Siccitatis itaq; excessus homini, ut omni genito corpo-

Corruptelæ
homini conna-
ta necessita-
tes.

Nutritionis
necessitas.

Instrumento-
rū tripliciū nu-
tritioni subser-
uiendum ne-
cessitas.

ri, corruptelæ interitusq; connata est necessitas. Cui altera accedit, quæ etiam in animalibus præ-
cipuè obseruatur, totius nimirum substantiæ fluor, ab insito calore excitatus. Quum igitur to-
ta hominis moles in perpetuo fluore sit, quumq; nisi altera similis substantia in defluxæ locum
accederet, uniuerſa ilico euaporata dissiparetur, summus rerum Opifex non homini duntaxat
cæterisq; animalibus, uerum etiam stirpibus insitas quasdam uires deficientes ac desideratum sem-
per appetentes, ab initio statim indidit. Non enim fugere, uesci, bibere, aut respirare à quoquā
discimus usquam, sed statim à principio facultates in nobis habemus, quæ hæc omnia citra do-
centem perficiant: & cibo quicquid siccioris substantiæ effluxit restituimus, potionem quicquid
humidius, atq; ita ad pristinam commensurationē ambo reducimus. Sic uerò & aëreæ igneæq;
substantiæ modum, respiratu arteriarumq; pulsu tuemur. Cæterum quum id quod singulis
partibus defluit, tale natura sit, qualis ipsa est particula, nihil autem eorum quæ bibuntur edun-
tur ue, aut inspirantur, eiusmodi prorsus occurrat, necessum fuit animanti, ea primùm assume-
re, dein emutare & concoquere, ac quàm maximè licet, corpori alendo restituendoq; similia ef-
ficere, ac demum recrementa quæ necessario has emutationes subsequuntur expellere. Atque
hac potissimum occasione Natura nutritionis instrumenta in corpore triplicia instituit: quæ-
dam prima ratione ad id quod assumitur concipiendum elaborandumq;, & in totum corpus
deferendum. alia secunda, quæ excrementorum sunt receptacula. Reliquas partes ratione ter-
tia, quæ horum excretionibus mittendis, & ne intempestiue profluant cohibendis, suoq; tem-
pore

pore expellendis subseruiant. Porro partes aëri assumendo, conficiendo, deferendo, ipsiusque recrementis ex cōcoctione succedentibus expellendis, à Natura conditas, sequens liber persequetur, cordi omnibusque respirationis organis dedicandus. Præsens uero cibi ac potus instrumentis, & demum generationi subministrantibus organis propter sedis uiciniam nexumque consecrabitur. Ex ore itaque per stomachum cibus & potus in^a uentriculum, uelut in communem quandam officinam seu promptuarium assumitur, quod omnia quæ amplectitur cogit, confundit, & concoquit, concoctum in^b intestina protrudit, ex quibus quod cocti illius succi melius est, sanguinique efficiendo conueniēs, unā cum humidiori huius concoctionis recremento^c uenæ portæ rami exugunt, id iecoris cauo deferentes. Recrementum uero siccus ac suctio-
 ni ineptum, intestina postmodum depellunt, & hominis arbitratu laxante se^d orbiculari podi-
 cis musculo, ac^e abdominis musculis, simul accedente etiam^f septi transuersi officio compressis, excernunt. Ipsum autem iecur postquam id nutrimentum admisit, ei extremū adijcit ornamen-
 tum ad sanguinis perfecti generationem necessariū, duplici (quod in omni fit concoctione) re-
 cremento id expurgans: flaua scilicet bile, ceu recremento tenuiori & leuiori: deinde atro bilio-
 so succo ceu luto, terrestri & crassiori. Illud quidem in bilis uesiculæ^g meatu transmissum, in ipsam uesiculam refluit, à qua rursus in intestina excretum cum durioribus faecibus egeritur. At hoc, uti arbitramur, per portæ uenæ^h ramos adⁱ lienis nutritionem transmittitur: quicquid uero is conficere ac in familiare nutrimentum sibi adaptare nequit, id in uentriculum eructat, postmodum cum intestinorum excrementis subducendum. Ergo qui in iecore ad hominis nu-
 tritionem præparatur succus, illa duo recrementa deponens, & eam iecoris substantiæ insiti ca-
 loris beneficio concoctionem acquirens, ruber iam ac purus ex^k arctissimis maximeque frequen-
 tibus uenæ portæ ramis per iecoris substantiam diffusis, ad gibbam iecoris partem in^l cauæ ue-
 næ^m propagines similiter innumeras angustissimasque conscendit, tenui adhuc aquosoque recre-
 mento, quod ex intestinis cum optima succi in uentriculo confecti portione exugebatur, conco-
 mitatus, atque eius aquosi recrementi tanquam uehiculari cuiusdam auxilio arctissimas uias mino-
 ri opera perreptans. Quum uero sanguis eos superauit angustias, ⁿrenes recrementum hoc ad se sedulo alliciunt, illoque sanguinem purgant, id per^o urinarios meatus in uesicam huius con-
 ceptaculum depellentes, à qua rursus opportuno tempore relaxato uesicæ ceruicis^p musculo, excrementum illud seu urina^q corpore redditur. Sanguis autem per uenam cauam copiosissi-
 ma ramorum serie propagatam, ad omnes corporis partes deducitur, & quod in ipso singulis partibus familiare ac idoneum est, illæ sibi attrahunt, assimilant, & apponunt: duplexque quod in illa concoctione confurgit recrementum, à se per proprios ductus excludunt. Ista quidem obiter de cibi potusque instrumentis dicta sufficiant. Quanta uero sapientia hæc rerum Opifex creauerit, eo ordine persequar, quo ipsa nutritioni famulari commemoratum est. A^r peritongo autem opportunè sermonis statuatur initium, quod id horum organorum commune sit in-
 uolucrum.

Quid præsen-
 ti libro docen-
 dum, ac partiū
 nutritioni ex
 cibo potuque fa-
 ctæ functionū
 breuis enume-
 ratio.

DE PERITONÆO. Caput II.

PERITONÆO ostendendo pleræque conducunt figuræ, & potissimum prima, id integrū anteriore externaque facie proponens. Secunda autem anteriorem ipsius partem inte-
 riori sede ostendit. Posteriores uero illæ figuræ imprimis intus referunt, quæ ex ipso plura or-
 gana gerunt dissecta, ut ex integrioribus figuris posteriores.



ATINI peritonæi (quod abdominis membranam aliqui nuncupant) uocem à Græcis mutuuntur. illis namque quod circuntendatur *περιτόναιον*, *περιτόναιον*, *περιτόνιον* appellatur. Neque ita absolute tantum, uerum à nonnullis hæc tota appellatio inditur, *περιτόναιον ὕμνω*, nomine uidelicet à sub-
 stantia ipsius ducto. à nonnullis hæc *περιτόναιον χιτῶν*. sunt etiam qui *περιτόναιον σκέπησμα* ipsum pari ratione appellent, ab usu scilicet quo inuolucris modo omnibus propemodum quæ hoc quinto libro prosequemur, or-
 ganis obducitur. Arabes communi membranarum nomine *ziphac* & *zimphac* & *chamel* pe-
 culiariter id nominant. Verum in illorum interpretum libris, & apud nostræ ætatis manuales medicos, quum de abdomine suendo, & aqua in ijs qui hydrope laborant educenda, & rami-
 cum curationibus pertractant, nominum occurrunt myriades: panniculus rotundus, alberite-
 ren, alberitiron. Deinde absque articulo *al*, quem suis nominibus Arabes secundum loci exi-
 gentiam non mutato nominis significato præponunt, Beriteron, Berbetinen, eiusque generis

Peritonæo
 mina

Peritonæum
in similarium
partium nume-
ro.

Peritonæi ma-
gnitudo & si-
tus.

Connexus or-
tus.

Forma.

Ipsius super-
ficies cuius-
modi.

Processus à
peritonæo e-
nati.

Peritonæū nō
undiq; pariter
crassum.

Quibus parti-
bus peritonæū
peruium sit.

Vasa & ner-
ui quibus peri-
tonæum impli-
catur.

permulta. Peritonæum itaq; ex simplicium & primorum corporum, quæ similia etiam nun-
cupare solemus, numero censetur. Membrana enim tenuis substantiæ est, nullis omnino fibris:
secus ac uenarum arteriarumq; tunica, aut tenues ac membranæ musculorum eneruationes
intertexta. estq; inter cæteras corporis simplices membranas amplissima & maxima. Carnosa
nanq; nobis uocatur mēbrana, & si amplior ipso peritonæo sit, ac uniuerso corpori cutis modo
obducatur, tamen accuratè simplex non est, quū quibusdā carneis donetur fibris, & musculo-
sa in ipso collo & fronte efficiatur. Porro peritonæū uniuersam cavitatē, quæ sub septo transuer-
so, ad os usq; coccygis, totius corporis facile capacissima habetur, succingit, ac omnibus quæ illa
continent organis obtenditur, eaq; conceptaculi ritu amplectitur: uentriculū scilicet, intestina,
omentum, mesenterium, iecur, lienē, renes, utramq; uesicā, uterum, & uasa demū quæcunq; inter se-
ptum transuersum & crura sitū habent. Atq; hæc quidē peritonæū interna ipsius sede cōtinet,
externa uerò undecunq; musculis cōnascitur. Ex ligamētis enim, quæ lumborū uertebras cōne-
ctunt, & quæ sacrum os iliū ossibus cōmittunt, peritonæū utrinq; principiū ducit, mēbranae latæ
modo ab illis enascens. Mox ab utroq; latere ascendens, lumborū musculis, & ijs qui internā
ossis iliū sedem occupātes, femorū præsumt motibus, obducitur: & fibris quibus inuicē muscu-
los cōmitti uidemus, illis adhærescit. At ubi musculos, qui ternario numero utrinq; cōplectun-
tur, peritonæū superauit, internæ transuersorū ab dominis musculorū, & uniuersæ inferiori
septi transuersi sedi subtendit, pertinacissimè ipsis, potissimum uerò neruosis illorū tenuitatibus
connatū, & quodāmodo propriæ musculorū membranæ uicē gerens. Refert itaq; peritonæū
oblongum oui instar utrē, seu sphaerā aliquā, cuius longitudo pertinet à septo transuerso ad hu-
millimā amplitudinis sedem, quā sacrum os cum ossibus ipsius lateribus commissis efformat. &
quemadmodū utres ex tergoribus parati, exterius hirti asperiq; intus plani ac læues admodum
esse solēt: ita quoq; peritonæū externa parte, ut aptius musculis undiquaq; hæreat, asperū fibro-
sumq; ad eum prorsus modū uisit, quo membranas mutuò cōnatas, inæquales esse dicimus. In-
terna autē peritonæi sedes, uiscera quæ cōplectitur spectās, impense leuis & tersa, ac ueluti aqueo
humore oblita, secātibus occurrit, adipis interdū copiā sibi (ut in suis quasi perpetuò) adna-
tam obtinens. Verum hunc nō omni ex parte æquē copiosum reperies. Anterior nanq; supe-
rior uel internæ huius peritonæi sedis regio qua uentriculū contingit, ac dein posterior quoq;
regio ad lumbos & sacrum os pertinēs, copiosiori abundāt adipe, q̄ sedis eius internæ latera,
parsq; umbilico contermina. Præterea interna hæc peritonæi sedes portiones quasdā seu pro-
cessus ijs quæ cōtinet organis porrigit, illisq; processibus ea organa inuicē colligat, et sibi quoq;
adnectit, ac singulis præter peculiare ipsorū tunicas (si modò quas habeant) aliud etiā inuolu-
crum obducit. Atq; hinc etiā fit, ut ijs organis quæ duas peculiare sortiuntur tunicas, quemad-
modum uentriculus & intestina, ternæ attribuantur: quæ autem unicā duntaxat peculiarē tu-
nicam exigunt, e quorum numero sunt uterus & utraq; uesica, binas obtineant. Verum orga-
na nulla peculiari donata tunica, ut iecur & lien, eā quæ ipsis obducitur à peritonæo adipiscun-
tur. Quoniam pacto autem, quibusq; ex locis hosce processus in eiusmodi tunica degenerātes,
peritonæū educat, & quo modo illi inuicem crassitie differāt, in cuiusq; organi enarratione op-
portunius quàm hīc recensetur. Quemadmodū uerò interna peritonæi sedes ab externa ua-
riat, sic neq; omni ex parte peritonæū sibi crassitie & robore correspondet. Quā enim ex uerte-
brarū ligamentis pronascitur, crassissimū est: deinde quā lumborū incumbit musculis, crassum
quoq; cernit. Anteriori uerò parte, quæ à mucronata pectoris ossis cartilagine ad pubē usq; per-
tinet, peritonæū tenuius graciliusq; & inualidius reperitur, q̄ in lateribus & lumborū regione.
Ad hæc uiris peritonæū crassius ualidiusq; est iuxta mucronatā cartilaginē, quàm iuxta pubis
sedem: in mulieribus uerò ad pubem crassius ualidiusq; neq; his, uti uiris, peritonæū hīc ad in-
guina utrobique seminarijs uasis uia præbent. Est enim peritonæū peculiariter in uiris inibi fo-
raminibus, ut ita dicam, peruium, & tunicam utriq; testis priuatim offert, quo is & ipsius semina-
ria uasa tutò obuoluuntur, ac dein in uiris pariter atq; in mulieribus, peritonæū quā septo sub-
ducitur, tria cum septo quoque communia exigit foramina: primum quo uenam cauiam, se-
cundum quo stomachum cum ipsi cohererentibus neruis, tertium quo magnam arteriam uena
coniuge experti, & aliquot sexti paris neruorum cerebri ramis concomitatam deducit. Præte-
rea umbilici quoque uasorum gratia, & in mulieribus finis uteri ceruicis, in uiro autem cer-
uicis uesicæ, in utrisque uerò podicis nomine, peritonæum perforatur, ac demum multis
uenis, arterijs & neruis crus petentibus, deinde illis quæ maxima portione in rectos abdo-
minis musculos sursum tendunt, & alijs nonnullis quæ dorsi & abdominis musculis, & cu-
ti à uasis lumborum uertebris incumbentibus, peritonæum iter præbet, ab iisdem uasis surcu-
los sibi assumens. Quā enim septo subductum est, septi uasis ad nutritionem utitur, in la-
teribus

a. fi. ca. 1. li.
3 inserta, et
fi. ca. 2.
b in abdo-
mine 3, 4,
5, 6, muscu-
tab.
c 3 muscul.
tab. r.
d 3 tab. A.
e 7 tab. a 4
multo sub
y, aut pas-
sim in inte-
rioribus 9
li. fig.
f 7 ta. t. u.
dein x.
g 6 tabu. d.
h quæ 7 ta.
spectatur,
ac 4 insi-
gnitur.
i. fi. ultima
rum 1 M
cum o.
li 2 fi. A, B,
quibus an-
te sectionē
committe-
batur F, G,
supra P.
l ad latera
g, h. 22 fi. et
P, Q. fi. 25.
m 24 fi. C,
D.
n 2 fi. C, D.
o Vide 9 fi.
et 17.
p Specta E,
E, H, H. 27
fig.
q Educitur
ab F, G. 18
fig. dein B,
B, C, C. 1 ta.
figu. 19.
r 1 fi. G, H.
et 22 figu.
s, q, trans-
mittit y, et
educit x. et
20 fig. u.
5 7 mus. ta.
s, r, q.
t 2 figu. M.
30 fi. S.
u 25 figu. x.
x 1, 2, 3 fig.
ca. 49 libri
2 G.
y 1, 2 fig. c.
ius. ca. M.
z In ulti. fi.
lib. 3, et ult.
fig. lib. 4.
a 1 fig. 1. 25
fig. x. aut 6
mus. tab. c.
b fi. ca. 6 li.
3, 5, 7, fi. ca.
12 14, 16.

teribus autem ab ijs ramis qui in lumborum regione geniculatim à magna uena & arteria porriguntur, plurimas soboles quoque peritonæum mutuatur. In anteriori uerò regione, elatius quidem qua mucronatam spectat cartilagine, à uasis sub pectoris osse ad rectos abdominis musculos excurrentibus peritonæum soboles exigit: in humiliori autem regione ad pubis ossa consistente propagines asciscit ab illis uasis, quæ sursum sub rectis exporriguntur musculis. Cæterum quod peritonæo medici tactus sensum adimant, ridendum potius quàm refellendum est, quum unà cum illis quæ transmittit organis, frequentibus quoq; neruis uiam offerat, à quibus surculos etiam adipiscitur, idq; ab ijs potissimum qui abdominis exporriguntur musculis. Porro peritonæi usus complures enumerari solent. primus quidem, ut ea omnia quæ diximus contegat: ex quibus quum pleraque tendi remittiq; debeant, peritonæum quo aptius fieri id possit, nerueum & membraneum meritò factum cernitur, ualidum quidem, ut opportunè contineret: sed tenue, quo minùs pondere molestum esset. Secundus, quo omnia quæ amplectitur ab extrinsecus ambientibus musculis interstinguit, ne quando tenuium intestinorum aliqua in media ipsorum spacia incidant, & dum musculos premunt, aut ab illis premuntur, arctant aut arctantur, dolore afficiunt aut afficiuntur, intestina motum eorum impedian, ac recrementa intestinis complexa difficillimè deorsum transmittantur: id quod nunc neutiquam accidit. Verum hæc intestina inter media musculorū abdominis spacia, dum integri adhuc essent transuersi, minimè interciderent, & si Galenus id præcipuè innuit, quando quidem hi uelut aliterum peritonæum ijs quibus id obducitur inuolucrum constituunt, omniq; ex parte ab alijs abdominis musculis hæc organa interstinguunt, neque ex situ etiam inter lumborum musculos & transuersos fortassis inuolui intestina potuissent. Sunt autem illi lumborum musculi dorsum mouentium nonus, & femoris motus autorum sextus. Tertium peritonæi usum Galenus cum cæteris Anatomes professoribus recenset, quo id sicci alimenti superflua septi transuersi accedente opera propellit: quasi uerò idem officium quod abdominis musculos unà cum septo ad faciæ excretionem subire suo loco cōmemorauimus, peritonæum præstet, & arbitrario motu quo se contrahat distendatq; præditum sit, ac non transuersorum abdominis musculorum, & septi quibus connascitur motum necessariò sequatur. Dein ac si peritonæum magis quàm cutis, aut abdominis adeps, ipsumq; adeò omentum illi usui subseruiat. Miror membranam costas succingentem, quæ peritonæo substantia usu & conformatione penitus correspondet, in thoracem arctantium organorum numero habitam non fuisse, quum illa nō minus thoraci comprimēdo, quàm hoc faciæ eijciendis auxiliari deberet. His quartus peritonæi usus succedit, omnibus quæ peritonæum ambiunt, & potissimum abdominis musculis cōmunis, quo is ceu inuolucrum exactè circumdatum, stringat omnia, ne leui occasione laxior uentriculus, aut intestina etiam flatibus infestentur. At postremus præcipuusq; peritonæi usus est, quo omnia quibus circumdatū est, ab eo cōtinentur, & ueluti à pelle quadam singula seorsum tecta, turò colligantur, suisq; sedibus fixa hærent.

Peritonæi
usus.Lib. 4 de V.
su parte.

DE STOMACHO ET VENTRICULO.

Caput III.

Stomachum perinde ac uentriculum præcipuè ostendunt decima quarta & decima quinta figuræ, quibus in uentriculo monstrando succedit decima sexta, quæ hunc inuersum refert, & decima septima ipsius tunicas uti fieri licuit semel exprimit. Dein uentriculum sua sede repositum proponit secunda figura simul cum sexta. Sua sede autem nonnihil motum refert duodecima. Postremo ipsius elatius orificium non ineleganter in uigesima figura spectatur, quod Græcorum nonnulli λαγδιαν, ut & Latini scriptores plerique cor & præcordium, permulti etiam (ut Galenus) stomachum appellant. Arabum interpretes Alfud, Alphaed, Fued, Alfaud, Fubed. Inferius uerò Polux, Hasoher.



VENTRICULVS, qui promptuarij modo esculenta poculentaq; suscipere, eaq; primo labore (sine quo hæc inutilia & homini ad nihil cōmoda essent) concoquere ac mutare debuit, non statim post os collocatus est, quanquam is situs ad cibi dentibus attriti assumptionem fuisset aptior. Thoracem nanque & illo contenta uiscera rerum Opifex uentriculo prælocauit, ut is in demissioribus sedibus excrementorum haberet efluxus, illaq; (ut in ædificijs architecti ab oculis & naribus dominorum ea quæ propuentia necessariò tetri essent aliquid habitura, auertunt) procul à sensibus, qui in capite se-

Ventriculus
sub thorace locatus.

*Via cibum po-
rumq; uentricu-
lo deferētis no-
mine.
Initium.*

*Substantia et
forma ac tui-
ca.*

Incessus.

*Lib. 3. de Ad-
mi. sectio.
Stomachum
non eodē cum
arteria ma-
gna uti fora-
mine septi.*

*Lib. 4. de V.
su part.*

dem exigunt, deducerentur. Thoracem uerò aërem per os & narium foramina attracturum, ac rursus eundem emissurum, ut uocis respirationisq; autor efficeretur, elatius collocari de-
cuit. Porro ne nimium uentriculus ab ore remoueretur, quumq; longus ab ipso ad recremento-
rum expulsionis locum ductus sit, Natura illum quam potuit proximè ori subiunxit. Sub tho-
race enim & septo transuerso inter iecur & lienem medius statim^b ponitur, uiamq; ab ore ci-
bos ad se deferentē obtinet, quæ ab usu *οισοφάγος* nuncupatur, & etiam illis communi nomine
quo omnem angustum ductum, seu collum isthmi modo alicui ampliori uentri præpositū uo-
citant, *σώμα* dicitur: qua uoce nos Celsum & Ciceronem imitati potius utemur, quam gula
alijs (uti & meri & uescet) non infrequenti dictione. Hæc nanque uia linguam ad radicem eius
hærens excipit, ac utraque parte^c tonsillas attingens, à palati extremo principium fortitur, ac
agitatione motibusq; linguæ depulsum, & quasi detrusum cibum suscipiens, illum deorsum,
pellit partibus ipsius quæ sunt infra id quod deuoratur dilatatis, quæ uerò supra contractis.
Neruoſa enim membranae ue, ut facile dilatetur, prompteq; rursus cōcidat, effecta est: & fibris
suo muneri famulantibus intertextitur, ac reliquorum denique corporis ductuum modo teres
& intus accuratè læuis lubricaq; cernitur.^d Duabus etenim proprijs cōstat tunicis, substantia,
duritie, crassitie, & fibrarum specie uariantibus. Harum interior quidem neruosior, durior, &
paulo tenuior, ac totius oris palatiq; tunica continua est, & rectis fibris manuū instar ciborum
attractioni subseruientibus donatur. Exterior uerò crassior, mollior, propemodumq; muscu-
lorum natura participans carnosior uisitur, unde etiam cibi conficiendi uim plerique ipsi ascri-
bunt: dein transuersis duntaxat circularibus ue abundat fibris, quæ ciborum interiores tunicae
fibræ beneficio attractorū scilicet, magisq; subitam in uentriculum propulsionē efficiant:
& si quando uomentibus uentriculus quippiā protrudit, ad eius educationē summopere etiam
auxiliantur. Duabus his solum fibrarum differentijs stomachus indiguit, ut rectæ quidem at-
traherent, transuersæ autem arciantes pellerēt. Nam si obliquæ accessissent, cibus in stomacho
longiori mora hæreret: quod nō solum homini inutile, sed & importunum ac molestum esset,
quando stomachus cibo plenus, ita prolixius distēderetur, asperæq; arteriæ ac pulmonibus &
magnæ itidem arteriæ, dum ea dilatantur, diutius obstaculo esset. Natura enim stomachū tutò,
& illa quæ modò comprehendere organa minùs molestaturū, per ceruicem thoracemq; ad uen-
triculum porrigens,^e exactè supra mediam ceruicis uertebrae & quatuor primarum thora-
cis sedem, in neutram partem inclinantem asperæq; arteriæ subtensum^f deducit. Ad principiū
uerò quintæ thoracis uertebrae^g stomachus ut ampliori magnæ arteriæ trunco secundum dor-
si uertebrae inferiora corporis petenti cedat, nō nihil in dextrum latus à media uertebrae re-
gione abscedit, arteriæ illi proximus ad nonā usque thoracis uertebrae repens:^h quò simulatq;
pertingit, ab eius uertebrae eleuatus corpore arteriam elatius (ne illa fortè à deuorato cibo com-
primatur) ascendit, neruosam septi transuersi partem uersus sinistrum latusⁱ penetrans. Non
equidem ut cum Hippocrate Galenus censuit, arteriæ hīc ad inferiora corporis prolabentis
foramine utens, uerū peculiari, quod ipsi neruisq; cum illo descenditibus (dum septum de-
scriberetur) præparatum esse diximus. Neque uerò administratio tantum, sed & ratio quoque
id commonstrabit, dummodo^k superius uentriculi orificium ad amussim perpendere non gra-
ueris. Hoc nanq; uentriculi mediæ sedi quod ad^m prioraⁿ posterioraq; spectat, neque inferius
quàm ipsius elatior^o pars habetur, inferi debuit: quod certè accideret, si communi arteriæ fora-
mini stomachus in septo uteretur, atque (ut Galenus reliquosq; Anatomicorū chorus asserit)
ad duodecimam usque thoracis uertebrae stomachus arteriæ iunctus uertebrae neceretur, ac
iuxta primam demum lumborū uertebrae, aut paulò infra, arteriam conscendere, & à dextris
in sinistrum prorepere inciperet. Quandoquidem arteriæ per septum transitus, qui supra un-
decimam thoracis uertebrae, uel Galeni suffragio, consistit, sub posteriori uentriculi sede in
medio ipsius elatioris partis & dimissioris occurrit, non autem ubi elatissima ipsius est regio.
Deinde si ad duodecimā usque thoracis uertebrae, secundum arteriæ latus stomachus descen-
deret ex thorace, & sub septo primū arteriam à dorso eleuatus conscenderet, sursumq; denuò
ad uentriculi superius orificium necessariò conuolueretur, pluresq; quàm nunc habeat, anfra-
ctus, eosq; acutis præditos angulis adipisceretur. Ad nonā itaq; thoracis uertebrae initium sto-
machus uertebrae corporibus interuentu membranularū ex ligamentis uertebrae origi-
nem ducentium cōmittitur, atque ab illis membranulis tertiam tunicam nullis omnino fibris
interstinctam, & uelut secundæ ipsius inuolucrum possidet. Quod uerò iuxta quintam thora-
cis uertebrae ad dextra potius arteriæ quàm ad sinistra stomachus explicetur, in causa ipsa est
arteria, non adeò tyranni ritu (quamuis multò sit dignior) dorsi mediam sedem occupans, sed
quum à^q sinistro cordis sinu ortum ducat, & per reliquum ipsius ductum uersus sinistrum ca-
uæ

a 7 muscul.
tab. Δ.
b 6 fig. F, F
inter D, D
& G.

c 6 muscul. ta.
F. 14. fi. E,
E.

d Harū de-
lineationē
pete ex si-
militudine
9 aut 17 fi-
gurarum.

e 7 muscul. ta.
E super B
ac sub F.
f 15, 14. fig.
ab A ad B.
g eius. fi. B
uersus C, ut
cederet 1 fi.
ca. 12 lib. 3.
h 15, 14. fig.
C uersus D,
G.

i 7 muscul.
tab. r.
k 7 muscul.
tab. q.

l 12 figu. Re
20 F.
m 14 fig. L,
L.

n 15 fig. M,
O, N.

o 14, 15. fi. I.
p ad regio-
nem O 15 fi.
non ad G
aut I.

q Spectato
tam 10 fig.
lib. 6. ac O,
P, 6 fig.

12 fi. h. ad 8. uæ uenæ^{*} subiiciatur, sinistrorsum maiore sui parte necessario uergens, ac proinde aliquan-
 tulum stomacho cedens, communicatorem, ac uelut socium sedis uertebrarum admittit, adeo
 ut stomachus & minus obliquetur, & firmiorem adhuc sedem quam in sinistro latere repe-
 riri posset, obtineat. Porro stomachus non dextram septi perforat sedem, recta^q in uentricu-
 lum ex dextro dorsi latere porrigitur, sed arteriæ superuectus^s obtuso^q obliquatus angulo
 14, 15 fig. d. u. f. g. sinistram petit, ne stomachus uentriculum adeundo iecur uniuersam dextram sedem inferior-
 ris regionis septi occupans, perforare cogatur, sed eam septi partem adinueniat, qua minor
 iecoris pars ipsi facilem aditum præbitura consistit.¹ Talis sanè est tenuior totius iecoris por-
 tio sinistræ septi sedi hîc subtenfa, cui in posteriori regione quâ stomachus septum permeat,
 12 fig. ad 9, R. 20 fi. ad E. F. "sinus instar semicirculi insculpitur, stomacho (cuius anteriorem sedem inibi amplectitur)
 118 fig. I. proportionem congruens. Neque est ut quispiam alijs credat dissectionis professoribus, qui
 septum, id^q potissimum quod diximus foramen, ne cibus è uentriculo superiora repetat ob-
 staculo esse arbitrantur, quum idem quoque tunc in uentriculum cibi descensum potius pro-
 hiberet. Quemadmodum & mera quoque est fabula, qua angustior stomachum hic quâ
 uentriculo continuatur, quàm in ceruice esse contendunt, atra bile in uentriculi superius os
 à liene eructata eum colligi constringi^q falsò existimantes. Cæterum obliquus ille ductus quo
 14, 15 fig. T. V. stomachus arteriam conscendens in sinistram fertur,^{*} neruis etiam commodus est, quos pau-
 lo post uentriculo inferi audies. Neque profectò sufficit Naturæ, stomacho in eum modum
 obliquo ad uelocem ciborum transitum eas quas innuebam tribuisse fibras. uerum ut ipsius
 14 figura E. E. 14, 15 fig. F. F. * fi. cap. 6 lib. 4 infer tæ K. I. a 22, 23 fi- guræ f. concauitas semper humecta ac uelut uncta esset, glandulas adiunxit,^v alias quidem ad fauces,
 stomacho & laryngi communes, quæ saliuam humorem^q illis organis ne exiccentur, præpa-
 rantes, Latinis tonsillæ appellantur.² In medio itidem propemodum stomachi ductu, quâ is
 asperæ arteriæ in * duos truncos ad pulmones diuisæ subiicitur, binas alias sæpe stomacho
 non apponit modo, sed & in posteriori ipsius sede & ad latera adnectit,^a illis planè respōden-
 tes, quas uesicæ ceruicis initio in uiris Natura circumdedit. & quemadmodum has urinæ se-
 minis^q genitalis meatum irrigare humectare^q suo loco commemorabimus, sic etiam glan-
 dulæ stomacho adnatæ illius amplitudinem irrorant, ac ne ob siccitatem difficilius in uen-
 triculum cibus prolabatur, saliuam quodam humore imbuunt. Cæterum si quid de stomacho
 adhuc dicendum supersit, in uentriculi descriptione id persequemur. Ventriculum qui in-
 12 fig. R. 20 fig. F. ter reliquos corporis uentres sinus^{ue} non minimam cauitatem obtinet, unde etiam γαστήρ &
 14 figura E. E. 14, 15 fig. F. F. * fi. cap. 6 lib. 4 infer tæ K. I. a 22, 23 fi- guræ f. στήν Græcis, ut nobis uenter & uentriculus potissimum dicitur, mox sub thorace colloca-
 tum, iam obiter diximus. Nunc uerò exquisitè ipsius situm, formam, quantitatem, substantiā,
 tunicas, uenas, arterias, neruos, ac demum ipsius uires, quæ^q ad eas auxilij quicquam præ-
 stant organa recensēbimus. Galenus itaque uentriculum in medio corporis collocatum asse-
 rit, quod plerique dissectionum professores ab ipso mutuati non simpliciter enunciant, uerum
 hunc secundum omnes positionis differentias ad amussim mediam sedem instar communis
 omnium partiū officinæ adeptum asserunt, perfunctoriè admodum in hominis proportionem
 66 fig. A. metienda uersati. Sedes enim^b mucronatæ cartilagini proxima, aut ut Galenus alibi etiam
 astruit, umbilicus, haudquaquam erecti corporis medium est, uerum elatissima pubis ossium
 regio. At si crura simul cum ceruice illi negligenter, solo uidelicet corporis trunco (quem thora-
 cem Aristoteles uocat) intellecto, fortasse regio mucronatæ cartilagini subiecta in corporis me-
 dio cōsisteret, uti umbilicus ferè in homine medius est, cui circulus obducitur, qui & manuum
 & pedum & uerticis summum æqualibus ferè interuallis complectitur. Neque etiam æqualis
 uentriculi portio dextrum & sinistram occupat, neque uentriculus in posteriora adeo atque
 12 fig. R. 20 fig. F. in priora corporis exporrigitur, quamuis fortè^c elatius ipsius orificium id sibi non immerito
 uendicare posset. Statim enim ac stomachus septum in sinistra neruosa ipsius partis sede pene-
 trat, continuū cum uentriculo corpus^d efficitur, quod in sinistro latere amplā septi sedem con-
 tingens, totam regionē inter iecur & lienem uacuam complectitur. In dextro autem latere uen-
 tricus nusquam septum attingit, sed iecoris duntaxat concauo subtenfus, tota ipsius parte su-
 periori, & dextro item latere à iecore occultatur, tantum^q à dextra septi sede passim abscedit,
 12, et 20 ex pendito. quanta iecoris est crassities, quum interim magnam septi sedem (uti modò dicebam) sinistro
 suo latere contingat. Neque id sanè admodum lien impedit, qui non ita uentriculi sinistro late-
 ri attenditur, adeo^q in corporis anteriora, ut medicorum uulgus arbitratur, pertingit, sed po-
 tius in posteriora humiliora^q (tamen & ad latus nonnihil) substernitur. Dein profectò non
 solum in sinistram ad septum usque scilicet, quàm in dextrum, utpote sub iecoris tantum cauo
 uentriculus magis pertinet: uerum ipsius forma in homine (nulla enim nunc mihi cum Gale-
 no, neque canum, neque simiarum est consideratio) talis cernitur, ut maxima ipsius quoque
 portio

Glandula sto-
machi crebro
adnata.

Ventriculi bi-
storia.

Lib. 4 de V.
su part.
Ventriculi si-
tus.

Ventriculi
forma.

Duo ventri-
culi orificia.

Orificiorum
non par am-
pliuo.

Lib. de Na-
turalibus fa-
cultatibus.

portio in sinistro collocetur, haud secus quam si inibi maiorem qua aptè contineri possit sedem adinuenisset, idque illius functionibus uideretur accommodum. Ventriculus enim forma perquam uariis est: at si quis illum obiter examinet, rotundus, & à dextro in sinistrum oblongus, aut secundum latitudinem quodammodo teres primum occurrit: rotundus quidem, quod rotunda omnia sint capacissima, & interim minimum noxijs exposita: oblongus uero, quod id sedes qua continetur, & deinde bina ipsius orificia, alterum quo cibos admittit, alterum quo iam confectos in intestina protrudit, exigere uideatur. Cæterum si deinceps uentriculi forma accuratius expendatur, in sinistro latere multò amplior rotundiorque, & ad inferiora prominulus cernitur, ac dein hinc uersus dextra uergens, paulatim in angustum cogitur, & superiori quidem sui parte descendere, inferiori autem ascendere conspicitur, adeò ut in dextro latere multò quam in sinistro gracilior euadat. Sic quoque superiori sua sede, quæ ab uno orificio ad alterum pertinet, strictior angustiorque est, inferiori latior ampliorque. Anteriori parte æqualiter undique gibbus occurrit, nulla ex parte deformatus. Posteriori sede duos quodammodo gibbos commonstrat, unum sinistrum, eundemque magnum, proceriusque extuberantem: alterum dextrum, minorem, ac depressum magis. Atque hos gibbos sinus quidam impressio ue parat, secundum corporis longitudinem posteriori uentriculi sedi impressa. Quæ enim uentriculi dorsi uenter, ipsisque exporrectos uenæ cauæ & arteriæ magnæ descendentes truncos respicit, ac sedi quam sortitur sese utcunque adaptat, posterior ipsius regio introrsum quasi ad eius amplitudinem nonnihil imprimitur: quamuis uentriculus corpore auulsus inflatusque, eiusmodi sinum non ostendat, & perinde totus inibi gibbus atque anteriori regione occurrat. Porro ad uentriculi quoque formam duo ipsius faciunt orificia, è quibus unum quo cibus & potus assumi dicebatur, in elatissima sinistrae uentriculi partis sede ob hoc consistit, quod stomachus inibi septum commodè perforans, illic primum uentriculo connasci, commune ue cum ipso corpus fieri potuit. Et quanquam superius uentriculi os in sinistra eius parte haberi dicimus, propinquius tamen mediæ ipsius sedi quam sinistro lateri accedit: quod tanto apparet manifestius, quanto uentriculus turgidior occurrit. Alterum uentriculi orificium cibos in cremorem emutatos ad intestina transmittens (unde etiam *πύλωρος* Græcis, nobis autem ianitor & inferius os appellatur) in dextra eius sede consistit, non quidem, ut totus Anatomicorum chorus arbitratur, in dextræ sedis inferiori regione, sed in elatissima, dextroque uentriculi lateri proxima. Non enim fat erat mutuo è directoque hæc orificia inuicem (ne ocys cibus adhuc immutatus è uentriculo laberetur) non opponi: uerum inferius à superiori remotius abduci oportuit, & ex elatiori quoque uentriculi sede explantari, quo minus sua grauitate cibus uentriculum præterfugeret: sed tunc primum quum confectus, & in cremorem exquisitè mutatus est, uentriculi potius excernendi robore, quam suo pondere, in intestina propelleretur. Atque horum intestinorum principium, uentriculi orificium constituit, explantatque: quare etiam primum intestinorum, quod duodecim digitorum est longitudine, exortum plerique nominarunt. Neque profectò iniuria alterum hoc orificium dextram uentriculi sedem occupat, quum hæc medio cauæ iecoris sedi contermina sit, in quam iecur suarum uenarum beneficio, ex intestinis ipsoque adeò uentriculo quicquid succulentum ab illo confectum est, arripit ac depascitur. quod eo iecur præstat facilius, quo partes confectum à uentriculo cremorem primum excipientes illi uicinius allocantur. Præterea uentriculi orificia non situ duntaxat inuicem uariant, sed inferius quoque superiori arctius est, quod rudes, non tritas, duras, magnasque moles homo subinde deuoret, ad quarum ingressum amplam uentriculi uiam esse oportuit. Infrà è contrario, rariùs magnū, durum, non conuersum in succum crudumque transit: quanquā sanè non adeò angustum sit inferius uentriculi os, ut solum cremorem transmittere queat. quandoquidē non pauci quamplurima fructuum ossa impense etiam magna, crebrò deuorata innoxie excernunt, & Galenus à quodam anulum aureum qui ore tenebatur, imprudenter deglutitum, eundemque promptè excretum narrat. Neque orificij huius amplitudinem se ignorasse callidus ille Hispanus docuit, qui superiori anno Clinianæ cuiusdam Bacchidi quadraginta uniones, ex illis quas hinc nobiles matronæ collo gestant, unā cum aurea cruce quinque gemmis instructissima, & fide pariter qua hæc continebantur, suffuratus est. Illa nanque quum huic noctem se daturam nisi prius numeratis quinquaginta aureis negaret, atque is tandem annuisset, ipsa à patricio Veneto patricio suo, ut comptior ornatioque, & magis placida esset, elegantissimum uxoris suæ monile (quod hinc non minima dotis solet esse portio) obtinuit, ac id in lecto adhuc collo appensum, ne fortè subduceretur, seruauit. Huic monili Hispanus quo meretriculæ uices reponeret, inhians, eamque quam potuit salacissime, ut suauius tandem obdormiret, exercuit, ac postmodum soluto monili singulos uniones, & crucem, ac postmodum fidem (ne quid suo furto obstaret) deuorauit. Constat igitur inferius

e 14, 15 fig.
G, H.

f 14 figura
L, L.

g 15 figura
M.

h 15 fig. N.
i 15 fig. O.
k 22 fig. g, h.
25 fig. P, Q.

l 14, 15 fig.
ra G.

m 14, 15 fig.
H. 12 fig. S.

n 14, 15 fig.
P. 7 fig. ab
I ad K.

rius quoque uentriculi orificium etiam si superiori angustius sit, amplum tamen esse, & inter-
 dum grandiora quoque transmittere. Cæterum Galenus & omnes eius asseclæⁿ glandosam
 carnem inferiori orificio priuatim tribuunt, hanc ad eius orificij constrictionem auxiliari, ac in
 quibusdam animalibus manifestiorem esse affirmantes. Istam sanè in canibus primum, qui illa
 donantur maxima, & quum carnis colorem obtineat, manifestiore, deinde in homine exami-
 nes uelim. Eam siquidem hanc esse arbitror, quæ duodeno intestino adnascitur, qua portæ ue-
 næ^o ramus illi subtenditur. Verum hæc nō in hoc ut intestinum illud, aut inferius uentriculi
 orificiū claudat arctet ue, procreata est, sed ut uasa illi intestino exporrecta suffulciat, ac parem
 cum glandio^p iuguli & mesenterij, & humilioris membranæ omenti usum præstet. Deinde
 si quæ constringendi uis huic glandoso corpori indita esset, ipsum necessario orificium aut
 intestinum ambiret, & fibrarum natura participaret, aut transuersarum musculi uesicæ cerui-
 cis modo, aut obliquarum uesicæ & uteri corporis modo. Quinetiam multum abest, ut intesti-
 num illo glandio orbiculatim circunducatur, quum ad intestini longitudinem recta duntaxat
 linea id adnascatur. Quanquam nō desint, qui solis libris edocti, suoq; arbitrati Naturæ opera
 fingentes, glandosum id corpus musculum esse scribāt, eo inferius uentriculi orificium orbicu-
 latim amplecti nugaciter affirmātes, atque hinc etiam corpus id *πύλωρον* ianitoremq; appellan-
 tes. Porro (quod nullos animaduertisse plurimū admiror)^s non solum in inferiori uentriculi
 orificio, sed & in superiori substantia uentriculi crassior spissiorq; est, ac orificia uelut in interio-
 ra extuberantiorem instar circuli partem exigunt, uentriculi substantiæ penitus respōdentem:
 quæ quidem inter dissecandum integro adhuc uentriculo tactu percipitur, aperto autem inuer-
 soq; in conspectum uenit, ac manifeste uentriculi initium stomachi ue finem & duodeni in-
 testini originem commōstrat. Videtur enim tunc stomachus, idq; intestinum ex ipso uentri-
 culo quodammodo enasci, aliæq; omnino quàm uentriculus ipse, partes esse, quum tamen exte-
 rius nihil tale appareat, neque ulla crassior uentriculi portio emineat. Atque hæc crassior uen-
 triculi portio in hoc potissimum facta est, ut ora ipsius robustiora densioraq; quàm reliquum
 eius corpus euadant, ne fortè à transeuntium impetu diuellantur, rumpanturq; & dein fortas-
 sis, ut quū ora cōstringuntur huius extuberantis partis particulæ introrsum cōniuentis occasio-
 ne citius arctentur occludanturq;. Et sanè quemadmodum^t exterior uentriculi superficies læ-
 uis & plana undique est, sic & magis adhuc^u interior ipsius concauitas: si modò duo, quæ iam
 diximus, tubera circulatim prominentia exceperis. Venterculus enim inibi nihil præter rugas
 quasdam si uehementer constrictus reperiatur, ostendit, intestinorū & uesicæ cavitati respon-
 dens, quamuis interim obfuscum & quasi nubeculis intente rubentibus interstinctū colorem
 exprimat, quum tamen exterius omnino penè albicet. Cæterum ut in obesorum intestinis, ita
 quoque interdum adipem fundo uentriculi intus adnatum, atque hunc copiosum quandoq;
 inuenies. Quod uerò plerique dissectionis professores internam uentriculi sedem cellulis qui-
 busdam asperitatibusq; abundare scripserint, uanissimum putato, ac ipsos ruminantiū anima-
 lium omasis defusos, idq; quum bouum pingua deuorant exta effinxisse arbitrator. Quan-
 titas itidem uentriculi uaria admodum est. nam si uesicæ modo infletur, haudquaquam mira-
 beris tantam ciborum uim uiniq; copiam uno tempore posse absumi. Neque in homine æquè
 semper est turgidus, sed quum pro sua natura se habet, cōstrictoriaq; ui utitur, quamlibet exi-
 guum multum ue sit quod continet, totum id undique complectitur, nullam uacuum sedem
 relinquens. ac proinde pro assumptorum se habet ratione, ut & multa (ne perpetuò edere co-
 gatur homo) assumere amplectiq; possit: & rursus si modica offerantur, ea undiq; amplexetur
 ac concoquat. Huic actioni ipsius congruit substantia nimirum membranæ, quæ commodè
 usu exigente ampliari dilatariq; queat: & rursus quum opus est, colligi ac constringi.^y Constat
 enim uenterculus duabus latis tenuibusq; tunicis seu plexibus sibi inuicem iunctis, perinde ac
 stomachus, sed nonnihil dissimilibus. Quandoquidem interna uentriculi similiter, atq; interna
 stomachi, neruosa membranæq; est, & totius stomachi, oris & labrorum, uti sanè & intestino-
 rum interiori tunice continua, duritie tamen ab oris stomachiq; tunica modicè differt. quod
 duriores asperioresq; cibos, priusquam in uentriculū decendant, ore conficiamus: à quibus oris
 amplitudo contunderetur & raderetur, nisi dura densaq; eiusmodi tunica euassisset. atque idcir-
 co tunica ori, & stomacho, & uentriculo communis, sensim ad uentriculi fundum accedens,
 mollior efficitur. Fibris hæc duplicibus intertexta est, quo etiam ab interna stomachi uariat.
 Interior enim tunice pars uentriculi cavitatem respiciens, rectis isdemq; plurimis donatur fi-
 bris. Attrahat nanque uenterculus cibos & potus per stomachum oportet, huiusmodi fibris
 ceu manibus alliciens: quæ quum contrahuntur, stomachum uentriculumq; breuiant, adeò ut
 inter deglutiendum^z larynx descendente stomachi initio, sursum conscendat, quod mutuus
 stomachi

*Glandulosa ca-
 ro non procul
 ab inferiori o-
 rificio distas.*

*Protuberans
 uentriculi in
 orificijs sub-
 stantia.*

*Ventriculi su-
 perficies.*

*Ventriculi
 quantitas.*

*Ventriculi sub-
 stantia quibus
 formetur tuni-
 cis.*

n 12 fig. i. i.
 15 fig. S.

o 12 fig. h.

p 2 fig. F.
 q 10, u fig.
 L, L, M, M.
 r 3, 4 fig. u, u.

s Intuere i 6
 fig. ad h. l.

t 14 fig.
 u 16 fig.

x 23 fig. v in
 dextra fig.

y Quodd
 fieri licuit,
 uentriculi tu-
 nicas i 7 fig.
 gura ex-
 pressimus.

z Laryngē
 simul cum
 stomacho
 ostendunt
 2, 3, 5 fig. ca.
 u lib. 2. ubi
 stomachus
 H notatur.

*Exteriorem
uentriculi tu-
nicam in fun-
do impenſe nō
eſſe carno-
ſam.*

*Ventriculum
petentes uenæ
ac arteriæ.
Lib. 6. de Ad-
miſſio.*

ſtomachi & laryngis ſit connexus, & interior utriuſque tunica cōtinua cernatur. At ſecundum
fibrarum huius interioris uentriculi tunicæ genus obliquarum eſt, in externa tunicæ ſede, qua
ſecunda illam amplectitur, ſitum. Quemadmodum enim cibi potuſq; attractio, eorundem ne-
ceſſariō præcedit retentionem, ita rectas fibras interiùs obliquis Natura coordinauit. Deinde
ut retentionem, ciborum iam confectorum ſuccedit expulſio, ita quoque ſecunda exterior ue-
uentriculi tunica trāſuerſas fibras obliquis exteriores meritō nanciſcitur, nōnullis interim obli-
quis fibris etiam implicita. Exterior enim tunica, quæ interiore craſſior & mollior minusq;
compacta eſt, tranſuerſis fibris abundat, ſecundæ ſtomachi tunicæ reſpondens, niſi quòd illa
paulo minus quàm hæc carnoſior ſit, & aliquot etiā obliquis intertextitur fibris. Cur autē uen-
triculum, aut hanc exteriorē ipſius tunicæ adeò impenſe carnoſam ſecundū uentriculi fundū
humiliorem ue ipſius ſedem eſſe plerique ſcribant, non ſatis aſſequor. Videntur enim ſuis ſom-
nijs conſiſi, ^a fundum uentriculi inſigniter carneū ſtatuerē, quum interim uentriculus illic neq;
carnoſior, neq; craſſior ſit, quàm ad elatiōrē ipſius ſedē: imò ſi uerūm fateri licet, ^b ſuperior uen-
triculi pars carnoſior eſt inferiori fundo ue: ut nunc taceā neuorū ſuperioris ſedis frequentia,
tunicarū eius ſedis craſſitiem inſigniter adaugentem. Cæterū duabus hiſ uentriculi tunicis
^c tertia accedit, inſtar operimenti & propugnaculi cuiuſdam tunicæ exteriori circumdata, & à
peritonæo, ^d quā id ſepti partem ſtomacho iter præbentem integit, pronata. Huic enim peri-
tonæi portio primū elatiōri uentriculi oriſicio, deinde uniuerſo ipſius corpori ad duodeni
uſque inteſtini originem obducitur, atq; hæc à peritonæo procedens tunica, omnium quas id
reliquis organis exporrigit, facile craſſiſſima cernitur, ac ut poſtea dicturus ſum, ^e ſuperiori
membranæ omenti principium præbet. Hæc tunica primū omnes uentriculum petentes ue-
nas, arterias & neruos excipit firmatq;. Ac iſtæ quidē uenæ omnes à ſola portæ ^f uena originē
petunt, nulla enim uel quantumuis exilis à ^g caua uentriculo ſubſtrata (quanquam id Galeni
ſit dogma) uentriculum adit. Arteriæ autem uniuerſæ ab illis ortum ducunt, ^h quæ à magna
arteria in humiliorē omenti membranā primū digerūtur, ac in id & iecur & bilis ueſiculam,
& lienem, & in uentriculum deniq; ipſum deriuātur. Ac ⁱ prima quidem uentriculi uena à por-
tæ uena priuſquam in duos grandes ipſius truncos diſcindatur, principium habet, ad inferius
uentriculi oriſicium conterminaq; ipſi ad poſterioreſ eius ſedem loca excurrunt. ^k Arteria au-
tem huic uenæ coniunx, propago eius arteriæ cenſetur, quæ ſecundū portæ ductum iecoris
cauum adit. ^l Secunda uena coniugem undecunque habens arteriam toti dimidiæ inferiori
uentriculi parti ſubtēditur, ſuperiori membrana omenti ſuffulta, à qua & anterior & poſterior
fundū uentriculi dextra ſedes ſurculos mutuatur. præſens uena frequenter ortum ducit ex dex-
tra uenæ portæ regione, quā in duos grandiores ipſius truncos ſinditur. ^m Arteria uerò ab
illa pronaiſcitur, quam in iecur deriuari diximus. ⁿ Tertia uentriculi uena impenſe gracilis eſt,
comite arteria carens, & à uenæ portæ graciliori ſiniſtro ue trunco enata, in poſterioreſ uen-
triculi ſedem (qua dextrum ipſius gibbum inibi prominet) pauca ramulorū ſerie diſpergitur.
^o Quarta uena ab eodem quo nuper dicta trunco prodiens, toto progreſſu arteriam ſibi coniu-
gem aſciſcit, omniumq; uentriculum aſcendentium uenarum, ut & arteria arteriarum, facile
præcipua, atque in numeroſiores ramos diuiſa. Procedit enim ſurſum ad mediū poſterioris
ſedis uentriculi, ac primū utrinque ramum ſpargit in plures ſurculos per poſterioreſ uentri-
culi ſedem diuaricatum. Dehinc ſurſum ad dextrum ſuperioris uentriculi oriſis latuſ ſenſim con-
ſcendit, illudq; coronæ modo amplectens, ramulos complures deorſum in uentriculi corpus
digerit, paucos, eoſdemq; graciles in ſtomachi finem, quo iſ uentriculo committitur, ſurſum of-
ferens. Ab hac uena dextrum oriſis uentriculi latuſ ambiente ^p propago editur, ſecundū elatio-
rem uentriculi ſedem ad ipſius uſque humiliuſ oriſicium pertingens, ac in progreſſu deorſum
quoque ſoboles diſfundens. Porro ^q arteria præſentis uenæ coniunx ab ea depromitur, quæ
per inferioreſ omenti membranā in lienem contendit. ^r Quinta uena comite arteria non
priuata, ſiniſtram uentriculi fundi ſedem ambit, & ſuperiori membrana omenti ſuffulta ramos
elatiōri ſua ſede in uentriculi anteriora poſterioraq; emittit. Huius principiuſ dependet ab am-
pliori uenæ portæ ramo, lienis inſimæ ſedi inferendo: & ^s arteria, uenam eam concomitans, ab
arteriæ ramo pululat, lienem hūc accedente. Sexta uentriculi uena, ea demū eſſet, quæ ſola Ana-
tomicis in ore uerſatur, quanquam à liene in ſuperiuſ uentriculi oriſicium perferri omnes aſtru-
unt. Ego uerò ut uerum fatear, non unicam, ſed ^t plures, eaſq; non ſemper parū numero ab illis
quæ lienī exporrigūtur uenas pronaiſci, præter quintam antè enumeratā obſeruo, ſiniſtri uen-
triculi lateriſ ſedem lienī proximam accedentes: inter quas ea ſolet eſſe præcipua, quæ à maiori
uenæ portæ ramo altiōri lienis parti inſerto, principium ducere conſueuit, à qua minus quàm
raro ſurculi pilorum modo graciles, quaſi ad ſuperiuſ uentriculi oriſicium pertingunt. Hiſ ue-
nis

a Secundum
K, K. 14, 15
fig.

b 14, 15 fig.
iuxta G.

c 17 fig. k, k.

d 7 muscul.
tab. r.

e 2 figu. Q.
Q. 3 fig.

f 2, 4, 4.
figu. cap. 3
lib. 3.

g 22 figu. g.
h fig. indici
fi. ca. 12 li. 3
inſertam.

i hic uero 4
fig. β.

k fi. ca. 5 li. 3
D. fig. 15 a
uerſus H.

l k fi. cap. 12
lib. 3 p.

m l fi. ca. 5 li. 3
H. 2 fig. R.

n 14, 15 fi. c.
m fig. ca. 12
lib. 3 r.

o n fi. ca. 5 li. 3
K. 15 fig. b.

p o fi. ca. 5 li. 3
N. 14, 15 fig.
gu. d.

q p 14 figu. c
uerſus H.

r q fi. cap. 12
lib. 3 x.

s r fi. ca. 5 li.
3 Z. 14, 15
fi. f. 2 fi. S.

t s fi. ca. 12 li.
3 u.

u t fi. ca. 5 li.
3 X, Y. 14,
15 fig. g.

nis sinistrum uentriculi latus adeuntibus comites perpetuò iunguntur arteriæ. Commune omnium uentriculi uenarum officium est, ut & alimentum ipsi adferant, & succulentioris ab illo confecti cremoris ad iecoris cauum non aliter ac intestinorum uenæ, deducant. Proprium uerò earum quas sexto loco enumeraui uenarum, & potissimum quintæ munus cum alijs dissectionum professoribus esse (at timide interim) annuam, ut si quid in uentriculum lien eructet, illæ eius sint uehiculum, idq; in uentriculum fundant. Cæterum frequentes uentriculi arteriæ innatum ipsius calorem recreant, & succulenti etiam aliquid ex uentriculo sugere uidentur. Præter has uenas & arterias uentriculo nullum aliud uas implantatur, & si forte meatuum bilem deducantium aliquis in uentriculi fundum pertineat, id sanè sit quàm rarissimè: & mihi semel hætenus duntaxat eius generis meatulus occurrit in biliosissimo homine, quem ex longis pontificijs nauibus sectioni adhibuimus. Porro nerui uentriculi in hunc habent modum, præcipue sexti neruorum cerebri paris portiones: postquam^x recurrentes diffuderunt neruos, ramulosq; cordis in uolucro & pulmonibus communicauere, deorsum ad stomachum properant, dextra quidem ad dextrum latus, sinistra autem ad læuum. Simulatq; uerò aliquantisper nerui cum stomacho descenderunt, fibrarum duntaxat interuentu illi commissi, uterque neruus bipartitò scinditur, & dexter quidem suis ramis oblique in sinistrum fertur, sinister autem in dextrum, atque ita ambo nerui stomachum concomitati septum transuersum permeant, nullam interim (ut dissectionis rudibus uisum fuit) septo sobolem offerentes. Vbi autem quatuor duorum neruorum rami^y elatius uentriculi orificium contingunt, multiplici propaginum serie id amplexantur, furculos notatu digno interuallo rectà deorsum promentes. A sinistro sexti paris neruo dextram uentriculi oris regionem implicante, ^z insignis utcunque ramus secundum elatiorē uentriculi sedem ad ipsius usque inferius orificium deducitur, qui & si in progressu aliquot diffundat propaggines, uentriculiq; inferius orificium furculis quibusdam implicet, nō tamen inibi absumitur, sed in iecoris cauum^a prorepit. Cæterum humiliorem uentriculi partem^b alijs duo accedunt nerui, à sexti neruorum cerebri paris^c propaginibus, secundum costarum radices deorsum deductis principium obtinentes, ^d ac illarum arteriarum coniuges, quæ superiori membrana omenti suffultæ, in uentriculi fundum digeruntur. Quinetiam interdum sinistro uentriculi lateri^e quædam neruorum offeruntur soboles, à^f neruis pronatæ, qui cum arterijs lienem accedunt. Inter hos tam uarios neruorum quos uentriculus exigit furculos, nulli profecto tantam Naturæ ostendunt prouidentiam, atque superiori ipsius orificio^g inserti, non enim duntaxat id ut noxam à bilioso eius ue generis humore aliquo induciam sentiat, adeò frequentibus scatet neruis, sed ut per illos ueluti riuos & ductus, animalis uis ipsi imprimis dispensaretur, ac cibi potusq; indigentiam uentriculus sentiret, ad sumendaq; cibaria excitaretur. Cum enim totius corporis particulæ, plantarum modo quatuor donentur facultatibus nutritioni seruientibus, neque illis eorum quæ defunt sensus sit inditus, atque omnes prope modum à cauæ ramis nutrimentum alliciant: aliæ autem ex cauæ per iecur distributis propagginibus, hæ iterum ex ijs quæ per iecoris portas feruntur uenis, & hæ rursus ex intestinis & uentriculo: quumq; adhuc nulla iam supersit pars, ex quo uentriculus aliquid assumere possit, necessum erat, ut foris ingesto cibo repleretur, atque in hoc à plantis differimus. Hæ nanque & si uim propriæ qualitatis attractricem, & attractorum retentricem, ac rursus superfluum excretricem, atque ante has omnes alteratricem perinde ac homo habeant, sensu tamen eorum quæ defunt priuantur. Neque etiam per os plantas nutriri oportebat, promptuarium copiosi nutrimenti submissum habentes terram, cui complantatæ coniunctæq; copia eorum quibus nutriri debent nunquam destituuntur. Verum humana substantia, præterquam quod longè à terra seiungitur, à qualitate quoque terrea plurimum discrepat, motuq; arbitrario ex loco in locum subinde permutari debuit, adeò ut impossibile fuerit homini plantæ ritu ex terra humorem sugere. Oportuit itaque secundum propriam eius naturam, herbis, fructibus, seminibus, aliorumq; animalium carnibus hominem ali, eaq; illo adferri tempore, quo uentriculus sentit indigentiam, at quum nulla pars ex se ipsa innatum sensum possideat, in uentriculum, uti prius dicebamus, eiusmodi uim à sensitiuo principio influere oportuit. Et huius sanè gratia^h sexti neruorum cerebri paris præcipue soboles uentriculi os, conterminasq; ipsi partes potissimum implicant & intexunt, atque ij demum illi nerui sunt, quibus obliquum stomachi ductum conferre prius retuli. Molles enim quum sint, & graciles, si longa uia recto tramite tenderentur, & uentriculum cibis recipiendis destinatum à se suspensum haberent, ab eius mole perpetuò tensi, leui occasione rumperentur, nisi eiusmodi implexibus & tortuosis ductibus Natura illis sedulo prospexisset. Porro uentriculus, ut iam ipsius uires aggrediar, octo habet facultates, ac quatuor quidem omnibus uniuersi corporis partibus, quæ nutriuntur, communes: quatuor

Ventrū uen-
triculi munus.

Arteriarum.

Vesiculæ bi-
lis meatus in
uentriculum.Ventriculi
nerui.Neruorum
uentriculi
usus.Ventriculi to-
tius munus.

t autem

u2 fi. cap. 2
lib. 4. f. 14.
15 fig. T, V.
x2 fig. ca. 2
lib. 4. m. p.y14, 15 fig.
G.z2 fi. cap. 2
li. 4. u. ad x.
15 fig. X.a15 fi. X. 20
fig. K.b2 fi. cap. 2
lib. 4. B. T.c2 fig. ca. 2
lib. 4. h.d14, 15 fig.
c. f.e15 fi. 8. 8.
f2 fig. ca. 2
lib. 4. u.g14, 15 fi.
T, V.h1, 2 fi. ca.
2 lib. 4. c.

Qui uentricu-
li munijs sub-
seruiant par-
tes ipsi accum-
bentes, atq; ita
illius ad alias
partes contra-
ctus.

Nulla omen-
ti partem ante-
riori uentricu-
li sedi obduci.

autem sibi peculiares, quibus uniuerso corpori uentriculus famulatur. Verum hæc nimium obiter perpendunt, integros libros hac quaestione, An uentriculus suo quem iecori conficit succo, aut sanguine seorsum, an simul ambobus enutriatur, commaculantes. Quandoquidem beneficio illarum facultatum, quas uentriculus cum reliquis partibus communes adipiscitur, proprium sibi nutrimentum ex uenis allicit, retinet, elaborat, & si quid superfluum ipsi fuerit, à se abigit. At munijs, quibus toti corpori uentriculus famulatur, quarumq; gratia plerisque Rex corporis uocitatur, is esculenta quidem poculentaq; rectis fibris per stomachum ex ore assumit, mox obliquis fibris assumptum retinet, totumq; tantisper amplectitur, donec id ingenuita sibi altrice facultate, in succum cremoremq; colore substantiæ suæ similem reddat. ac demum quod confecit intestinis exhibiturus, inferius orificium suum laxat, transuersisq; fibris quod amplexabatur deorsum protrudit. Cæterum uim ipsius alteratricem, unde quaque eum circundantia organa, ac uelut lebetem ingentes foci solent, excalefacientia, non parum adiuuant. totam enim superiorem eius sedem uersus anteriora & dextrum ipsius latus, & in posteriori sua sede dextrum gibbum, iecur complectitur. elatior uero pars ipsius ad superioris sui orificij posteriorem sedem consistens, & sinistrum eius latus uniuersum, septo ambitur, excepta solum ea regione quam lien ad sinistrum uentriculi latus humiliori posterioriq; parte occupat. In posteriori autem sede uentriculus inferiorem omenti membranam, & quæ in illam excurrunt uasa proximè subtensa obtinet. Dein sub hac septi transuersi pars, & uena caua, & magna arteriæ truncus præter dorsum, ipsiusq; musculos consistunt. Porro uniuersæ inferiori uentriculi sedi omentum ipsi partim attenditur, partimq; connascitur. præterea & huic sedi sub omento colum intestinum elatius, tenuia uero intestina demissiùs, adtenduntur. At alij anteriorem uentriculi sedem omento integri somniant, quum tamen elatior omenti membrana recta duntaxat linea inferiori ipsius parti secundum anteriora adnascatur, nulla interim omenti parte uentriculi anteriori sedi obducta. Vacat itaque magna anterioris uentriculi sedis regio, neque iecore, neque septo transuerso, neque omento, neque liene obducta, sed omenti uice aliud uentriculus hinc obtinet subsidiū, in calefaciendo huic non absimile. Præter peritonæum enim & octo abdominis musculosⁱ uena ab umbilico iecori deducitur, qua foetus nutrimentum accipit, quæq; post partum exanguis inutilisq; efficitur. Huic uenæ quæ peritonæo nexa uentriculo insertitur, in circuitu adeps multus non tamen omnibus æquè copiosus adnascitur, qui ut & uentriculus suo in concoquendo munere alacrius laboret, aliquid auxiliij præbet. Impensius enim conducit iecur, lien, & quæ posteriori uentriculi sedi subtenduntur uenæ ac arteriæ, ut & ipsum quoque septum indefesso suo motu uentriculum minime negligit. Quinetiam cordis septo incumbentis calor, ad perfectiorem uentriculi functionem non inutilis censendus est.

DE OMENTO. CAPUT IIII.

OMENTI delineationem imprimis proponit quarta figura, ac secunda, & tertia, uti in illarum figurarum indice commemoratum est. hoc Arabum interpretibus & nostræ ætatis chirurgis dicitur Zirbus, sine appendice: aut cum appendice, Zirbus adipinus, Tirbus, Glypeus, Ventris mappa. & ut Græcis, Eflos, Epiplex.

Omenti sermo-
nem nunc insti-
tuendum.

Omenti situs.



PROXIMUM nunc erat intestinorū, ut quæ confectum à uentriculo succum excipiant, enarrationē subiungi. sed quia illis omentum incumbit, & uelut innatat (unde & à Græcis ἐπίπλοον & ἐπίπλοον dicitur) & dissecantibus prius quam intestina occurrat, ac demum non minus quam intestina uentriculo continuum magna ex parte est, non admodum inopportuno id hoc loco aggrediemur.^a Omentum itaque in peritonæi amplitudine positum, mox anteriori illius sedi subijcitur, & super^b intestina extensum, ad lienem quoque & iecoris cauum, ac posteriorem uentriculi sedem propemodum uniuersum, eiusq; fundum exporrigitur: atque ab his etiam sedibus omentum originem ducere, non multo post audies. quare etiam in dissectionibus perpetuò illis sedibus attentum proximumq; reperitur. At non ita omnibus obductū intestinis ad pubis usq; os (ut in canibus propemodum semper) in homine reperitur. Nam ipsius, quæ intestinis obuolui debeat, portio, raro ultra umbilicū descendere cōspicitur, sed maxima sui parte sinistrorsum lienem uersus retrahi & conuolui. Quod quū in hominibus laqueo suffocatis primū obseruari, ex cōcussu mortuq; corporis hoc euenisse arbitrabar: sed postea id ipsum in aqua suffocatis, & capite truncatis, item laterali morbo, aut phrenitide, eiusue generis affectu alio quopiā mortuis, & in ijs etiam quibus

Hec petes
ē 2, 3, 6, 12,
20 figuris,
uti quū uen-
triculi sitū
narrare,
mus colli-
gere prom-
ptum fuit.

i 2 figura F,
dein G.

a In 2 figu-
ræ Q, Q,
mox in ac
sub A, B, C,
D.
b Conser 2
figurā sex-
tæ, & sedu-
lō spectā 3
figu. & 4.
c Quemad-
modū c, c, c
3 fig.

quibus uiuentibus thorax abdomenq; aperiebatur, animaduerti: atque, ut semel dicam, in sano quod ad omentū attinet homine, ad pubis usq; os id descendere raro cōperi. Quin etiā quum idem obseruasset in dissectionibus obeundis uir diligens IOANNES DRYANDER, medicinæ mathematicesq; professor, quid de Hippocratis aphorismo sentirem, in quo ille mulieres præter naturam obesas concipere negat, quia os uteri illis omento comprimitur, prolixè & eruditè literis à me percunctatus est, ac præter cætera quæ de ramicum differentiis symptomatibusq; mecum egit, sibi omentum ad scortum deuolui, & inibi ramicem (quem ab omenti descensu, Græci *ὠντοκίλλω* appellāt) haud posse fieri arbitrabatur. Verū retractus ille omenti sinistrorsum sursumq; fundi uteri os omento comprimi, & ad scortum deuolui posse omentum non impedit. Nam si dissecans humiliorem omenti partem sursum reuolutam leuiter deorsum traxeris, citra aliquam omnino diuulsionē in omnibus hominibus facile ad pubis usq; os intestinis ipsum obtendi posse deprehendes, eiusq; finem^d inter posteriorem uesicæ sedem, & uteri anteriorem leui occasione colligi, ibidemq; uteri ceruicem (si omentū præpingue sit) utcunque comprimere doceberis, dummodo in muliere id inter uesicam & uterum, ut in sua sede poneretur, extenderis. Quanquam eiusmodi compressum uix tantum esse autumem, ut ingressum uirilis seminis in uteri fundi^e orificiū inhiaberet, nisi penis breuitas hīc simul obesset, ac procul ab uteri fundi orificio semen redderet, cuius dein ad fundum ingressum concidens compressaq; ceruicis uteri ante fundi orificium sedes remoraretur, quæ simul obeso comprimeretur omento, ac parum foeliciter à pene distenta, semen sibi adhærens seruaret. Similiter etiam omentum ad scortum decumbere, in ramicum sectionibus interdū animaduerti, quum in ijs quibus intestina in magnam peritonæi amplitudinem detruerentur, & cum seminarijs uasis ipsa amplectens tunica præscinderetur, portionem omenti quæ in scortum deciderat, auferri uiderim. Neq; istud solum manu tales affectus curantibus interdum accidit, uerū etiam intestini portiūcula ab imprudentibus artificibus amputata, præsentem ægro mortem parat. Præterea in latomi cuiusdam, quem ex casu ab alto mortuum Patauij dissecuimus, ramicis uitium, id quoq; luculentissimè ostēdit. Huic nanq; dexter testis cum seminarijs uasis, quum à ramicem semel curaretur absēctus^f fuerat, & rursus in sinistro latere idem affectus inuaserat, quem ex intestinorū & omenti in scortū descensu cōtigisse, dissecando comperi, adeo ut is certam mihi coniecturam faceret, ad pubis usque os, ipsumq; scortum etiam omentum deuolui posse, licet id sursum in latus sinistrum dissecantibus plerunq; retractum obseruatur. Magnum enim (nollem nanque cum Galeno maximum dicere) inter animantia hoc homines fortiuntur, ut & inde nonnulli *ὠντοκίλλωται*, quasi dicas omenti gestores appellentur. Porro omenti^g figura proximè marsupij, aut sacculi, aut peræ imaginī conuenit: ac in primis aucupum peris, quæ orbiculatum habet orificium, posteriori sua parte elatius quàm anteriori ascendens. Huiusmodi nanq; pera omenti figuræ ad amussim cōgrueret, si uno constaret corio, aut ex lana texeretur, ac unde quaq; inconfutilis, & unum duntaxat corpus esset. cuiusmodi profectò est omentum, quod substantia est membrana nullis fibris implicita, simplexq; sed multis abundans uenis, arterijs, neruis, & aliqua sui regione glandosum sibi innatum habens corpus, & multum quoq; adipem. Vnde uerò hæc omnia ortum ducant, intelliges promptissimè, si talem peram qualem antea proposui, animo cōcœperis. in qua unam partem anteriorem superioremq; alteram posteriorem inferioremq; appelles. Ad eum nanque modum unam omenti partem^h superiorem anteriorem uel membranam, & alteram rursusⁱ inferiorem seu posteriorem dicimus. etiam si omentum re uera duntaxat^k unica (atq; id potissimū in canibus) sit membrana, anteriorq; pars posteriori, ut in dicta nuper pera, incumbat, & cōtinua sit, & omentum quoque sacculi modo cavitatem quæ repleri posset, constituat. Inferioris itaq; membranæ omenti origo à peritoneo pendet ea sede qua^l primū sub septo magna arteria descendit, ac primū uenam cauam ibidē contingit. Peritonæum enim quā à uerteburarum ligamentis principium ducit, ac utrinque tanquam à uerteburarum corporibus abscedit, membranulas magnæ arteriæ & uenæ cauæ offert, quibus illæ dorso affirmantur. Ab his membranis iuxta eam septi^m partem, quæ undecimæ thoracis uertebrae corpus respicit, aliæ propagines membranæ exurgunt, omento originem præbentes, illudq; dorso hīc alligantes. Inferior hæc omenti membrana dextrorsum ad iecoris cauum unde portæ uena prodit, perfertur: ac iecoris portioni aliās aliq; aliquādo adnascitur, ut & alicui septi transuersi sedi spurij costis hīc obductæ. ac id rarius accidit, neque ex eiusdem costæ id semper fit regione. Præsens omenti membrana à iecoris cauo ad dextrum uentriculi latus, cui etiam connascitur, procedit, & ad duodeni intestini exortum, cui propemodum ad ieiunum usque intestinum etiam subnascitur, hīcⁿ orbiculatim semper ad infimam uentriculi partem cōscendit: quam simulatque attigit, ac ex dextro uentriculi latere uersus anteriora repit, ea

Omenti figura.

Omenti substantiæ breui enumeratio.

Omenti ortus ac dein nexus.

omenti pars quam superiorem ipsius membranā dicimus, à uentriculo exoritur.^o Tertia enim uentriculi tunica à peritonæo pronata, secundum totius uentriculi latitudinem^p recta linea, & ut Aristoteles dicebat, suturæ modo ex humili sede uentriculi uersus anteriora superiorē omenti membranā ex se deducit. Superior hæc membrana ex dextris uersus sinistra secundum uentriculi fundum procedens, cauæ lienis sedī recta linea * implantatur, quò etiam inferioris omenti membranæ sinistra pars protendit, ambæq; superior uidelicet & inferior membranæ lienis cauo simul commissæ innascuntur. ita sanè, ut cōmemoratus iam omenti ductus, orbicularem efficiat circulum à dorsi medio ad iecoris portas, & hinc secundum uentriculi fundum ad lienis cauum, & inde ad dorsi medium procedentem. Totum igitur semicirculum inferiorem à lienis cauo per dorsum ad uentriculi usque dextrum latus pertinentem, inferiori omenti membranæ attribuimus. superiori uerò membranæ (quam cum multis Anatomicis solū nouisse uidetur Aristoteles) eam circuli partem ascribimus, quæ à uentriculi dextro latere per ipsius fundum ad cauam lienis sedem ducitur. Porro inferior membrana toti posteriori uentriculi sedī^q subtenfa, decliuīs, ac uersus anteriora fertur, atque ad humilimam uentriculi sedem secundum corporis latitudinem omenti membranā superiorem contingit. hinc ambæ mutuò sibi incumbentes, deorsum super intestina subq; peritonæo ducuntur, & si in hoc super intestina ductu membranæ non implicentur, ea anteriori parte ac in lateribus obtegūt, & ad pubis usque os humiliori suo extremo pertingunt. Si uerò intestinorum sedem duntaxat operiant, quæ supra umbilicum consistit, atque quod frequenter euenit in sinistrum latus cōtractæ iaceant, illæ sese uisui offerunt reuolutæ admodum, & uelut in spiras collectæ. Membranæ hæ nullis nexibus intestinis connascuntur, præter inferiorem membranā, quæ in hominibus colo intestino pertinacissimè continuatur per totam eius intestini^r sedem, quæ secundum uentriculi fundum prorepat. Neque id segniter in homine obseruandum uenit, quum inferior omenti membrana mesenterij loco ipsi colo intestino sit, qua id uentriculo exporrigitur. Colum enim toto illo ductu nullam exigit mesenterij partem, secus multo quàm in canibus & simijs, quibus omentum uix colo connascitur, atque uti prius relatum est habet. In homine uerò inferior omenti membrana mesenterij uicem gerit: imò si omnem fidem libris (uti profectò in dissectione decet) derogans, accuratè singula examinaueris, membranæ inferioris omenti portionem intestinis exporrectam quodammodo ex tertia coli intestini tunica pronasci fateberis. Atq; id eo te expendere uelim diligentius, quo id minus à Galeno, qui simijs nimium tribuit, animaduersum est: uti sanè Herophilo & Aristoteli id uidetur fuisse perspectissimum, qui omenti partem colon dorso colligantem, omenti loco non habuere, sed eam tantum partem quæ à uentriculi fundo & colo intestino enascitur, intestinisq; obducitur. Quanquam satius fore arbitror, si eam quoque omenti partē quæ uentriculo subtenditur, columq; continet, omento attribuamus, quum ea omenti reliquæ portioni cōtinuetur, & eosdem usus cum inferiori canum omēti membranā suppeditet: quamuis interim ex abundanti hominis colo mesenterij uice sit. Cæterum ad hæc, superior omenti membrana in homine inferiori membranæ ad coli regionem connata reperitur, quā id uentriculo exporrigitur. adeò ut quispiam nonnullis nexibus superiorem omenti membranā colo quoque intestino secundum uentriculi fundum connecti, haud absurde dicere possit. Quod autem Galenus omentum modicis, & ipsdem laxis nexibus, idq; ad dextrum duntaxat latus colo intestino committi prodiderit, in causā fuere simiæ mediā inter canes & homines naturam sortitæ. Omentum nanque canibus nulla ex parte colo alicuiue alteri intestino adnascitur. Simijs autem medio se habet modo, licet illæ adhuc ad canis constructionem potius quàm hominis accedāt. Venæ omento implicitæ solius uenæ portæ sunt soboles, nulla nanque à caua in omentum, uel ubi id principium sub uentriculo ducit (& si aliter Galenus senserit) pertinet. Venas enim inferiori membranæ omenti dispensatas, si ad amussim singulas examinaueris, ab eo portæ^s trunco dispergi inuenies, cuius præcipua portio in lienem exhauritur, quemq; doctrinæ studio graciliorem & sinistrū portæ truncum suprā uocaui. Primum itaq; omentum portæ^t caudicem ex iecore proficiscentem excipit, sibi iam commemorandas in ipso ductu propagines assumens. Ac inferior quidem omenti membrana^u tres uenarum radices admittit, ex humiliori sede eius portæ trunci, qui ad lienem fertur, depromptas. Vna notatu satis dignæ magnitudinis in dextram potissimum eius membranæ partem multiplici serie dispergitur, quibusdam furculis in colon quoque pertingēs. Secunda iam commemorata amplior aliquantulum post originem in duos mutuò multum abscedētes ramos diducitur, à quibus postmodum in mediā inferioris membranæ omenti sedem, uersus sinistrum tamen magis, frequentes admodum soboles diffunduntur, quæ homini in colum intestinū ca^x serie pertinent, qua uenas mesenterio intertextas alijs intestinis deriuari nouimus, ac proinde etiam frequentior

Omenti cum
colo nexus.

Venæ omentū
implicantes.
Lib. 6. de Ad
min. dissect.

017 fig. h.
k, l.
p secundum
R, T, S. 2 fig.
* Intuere 1
tab. 19 fig.

q Ut cerne-
re est in 3 fig.

r 6, 8 fig. à P
ad Q.

s fig. ca. 5 li. 3
F. 4 fig. ad si-
nistrum la-
tus f.
t fig. ca. 5 li. 3
B. 4 fig. l.
u fig. ca. 5 li. 3
L. S. V. fig.
4 x. y. d.

x 10, 11 fig.

quentior multo ramorum series in hac membranæ parte colum dorso alligante uisitur, quàm in reliqua eius parte, quæ à colo deorsum ducta, intestinis obtenditur. Deinde etiam radices hæ hominis omento insigniores obtingunt, quàm canis, quòd illi nulla uenula omentum accedens colo committatur. Tertia radix, non semper apparens, in sinistram humilioris membranæ partem aliquousq̃, perinde ac in ipsum colum quoque, deducitur. Porro superior omenti membrana uenas mutuatur à^z duabus ad inferiorem uentriculi sedem in ipsa membrana exporrectis. Ab his enim innumeræ soboles deorsum in eam omenti membranam excurrunt, non quidem recto prorsus tramite, sed obliquo quodammodo & errabundo, uti retium funiculos implicari cernimus. Ac proinde etiam omentum Græcis γαγγαμὸν & σπερμῶν, ut & uulgò rete & reticulum dicitur. Quanquam fortè non à uario uasorum ductu, omentum ita fuerit appellatum, sed quod ab ijs quibus cōmittitur partibus^a liberatum, & deinde distentum, rete piscatorium uni accommodatum baculo referat. ^b Arteriæ omenti ab illis pendēt, quæ uentriculo, lienī, iecori, & bilis uesiculæ distribuuntur. has nanque omnes non secus ac uenas omentum tutò deducit, ac ab illis suarum peculiariū uenarū coniuges adeò numerosas adipiscitur, ut quàm paucissimi uenarū surculi, citrà arteriæ cōsortium, ipsum perreptent. Item præter cōmemoratas modò arterias, inferior omēti membrana aliquousq̃^c grandiorē in intestina porrectā deducit arteriam. Sic^d neruis quoque illis omentum intertextitur, qui à sexti paris cerebri neruorum portionibus secundum costarum radices exporrectis iecori, lienī & uentriculo implantantur. Cæterum^e adeps quo omentum abundat, in obesīs præpinguibusq̃ hominibus plurimus, in macilentis modicus, in extremè siccatis & marasmo mortuis, etiam aliquis reperitur: isq̃ perpetuò uenis & arterijs omenti attensus, ad uasorum quidem latera duntaxat mediocris est, superius uerò ac inferius quoque, quibus multus accidit: adeò ut illis etiā uasa alioquin gracilia pinguedine prorsus occultentur. At in^f intermedijs uasorum spacijs, nullus adeps asseruatur, ut nec in alijs membranīs quibus adeps innasci consueuit. unde etiam promptius colligitur, hunc ab exudante ē uenis sanguine & membranarū frigore in crassato, mutantisq̃ corporis (membranæ nimirum) colorem mutante progigni. Præter adipem qui ambabus omenti membranīs communis est, inferior ipsius membrana posteriori uentriculi sedi substrata, priuatim^g glandosum quoddam corpus impenſe magnum exigit: quod quia in canibus rubet, simplicisq̃ carnis speciem quodāmodo exprimit, Græcis *καλίνεας* & *πάγνεας* appellatur. In homine autem hoc corpus magis album quàm rubrum cernitur, uenæ portæ, arteriarum & neruorum ramis inibi attensum, ut illorum diuaticatio inferiori membrana omenti duntaxat suffulta, reddatur securior, utq̃ uentriculo etiam instar substerniculi ac puluinaris subiiciatur. Huiusmodi planè^h corpus substantiaq̃ est, quæ duodeno intestino subtenditur, quæq̃ hactenus falso uentriculi humilioris orificium (ne quid inconcoctum efflueret) occludere credita est. Atque is profectò præcipuus maximusq̃ omenti usus mihi censetur, ut securè ramos portæ in lienem, uentriculum & duodenum intestinum, ac coli non infimam partem exporrectos suffulciat, ac ipsi implexos deducat, neque uerò hos duntaxat, uerum etiam ut arterias quoque & neruos illis quas modò dicebam partibus inferendos sustentet ac tueatur, & demum usui potissimum respondeat, in utero quidemⁱ secundarum, in capitis autem amplitudine^k tenuis quæ cerebrum inuoluitur membranæ. Deinde quod haudquaquam minimum est, omentum dorso uentriculum colligat, & rursus iecur lienemq̃ uentriculo unā cum uasorum neruorumq̃ interuentu connectit: ut iam taceam quantum homini firmando colo officium separatim subministraret. ex accidente uerò uelut quoddam intestinorum inuolucrum tegumētumq̃ efficitur, ipsorum calorem instar penicilli cuiusdam fouens ac continens. His sanè usibus omenti fabrica respondet, membraneum nanque est, ut fortius uenas, arterias, neruosq̃ ipsi implexos colliget, meliusq̃ intestinorum calorem reflectat, ac promptè cum intestinis subsidere extendiq̃ queat. Tenue autem, & potissimum qua intestinis innititur, ne pondere grauet. Vnde etiā Bruxellensi nostro idiomate plumæ nomen meretur. Quòd uerò omentum sanguine & spiritu frequentibus illis uenis arterijsq̃ asseruato, intestinorum & uentriculi qua parte ipsi attenditur, fouendo calori accommodum sit, etiam si non dicatur, manifestum esse arbitror. Cæterum num adeps insita ac peculiari natura calefaciēdo proſit, an tantum penicilli carnis ue aut membranæ potius ritu iuuat, non æquè ab omnibus conceditur, alijs quidem frigidum adipem, alijs uerò calidum pronunciantibus.

DE INTESTINIS. CAPVT V.

Intestinorum imaginem potissimum sexta figura & septima & octaua & nona exprimere conati sumus. quanquam huc etiam faciat tertia figura, simul cum decima & duodecima.

z fi. ca. 5 li.
3 H. Z. 2 fi.
gu. R. S. dein
X. X. 4 fi.
gu. o. o. l. de
in q. q.

a Quemad-
modū 4 fi.
b In 2, 3, 4
figuris, ue-
nis attēdun-
tur. & fig.
cap. 12 lib. 3
m, ac ferè
tota illius
trunci se-
ries.

c 4 fi. 4 fig.
ca. 12 li. 3 l.
d Venis quo-
q̃ & arte-
rijs in 2, 3, 4
fi. adtēdun-
tur. & 2 fi.
ca. 2 li. 4 y,
z, a, b, l, l,
t.

e 4 figura k
ad i.
f 4 fig. h.
g 4 fig. i, i.

h 4 fig. l. 12
i, i.

i fi. 30 P. K.
Q. R.
k cōspicitur
pulchrè 2 fi.
gu. li. 7.

Omenti ar-
teria.

Nerui omēti.

Adeps.

Glandulosum
omēti corpus.

Omenti usus.

Omenti fabri-
cam suis usi-
bus respōdet.



Quæ hic inte-
stinorum nomi-
ne comp. ectan-
tur.

Intestina cõ-
nũ quidem es-
se corpus, sed
pluralitatis
numero ua-
rijsq; nomini-
bus, diuersas
ob causas do-
nari.

Breuis intesti-
norũ historiæ
enumeratio.

Intestinorum
a uentriculo e-
xortus, et gra-
cilis ductus seu
situs.

Gracilis inte-
stini in tria di-
uisio.
Primum.

INTESTINORVM constructionem ipsorum officio & usui cõuenire
tum demum opportunè narrabo, simulatq; eorum situm, formã, substan-
tiam, connexum, quæq; ipsis implantantur uenas, arterias & neruos, ac si-
quid aliud ad eorum fabricæ enarrationẽ reliquum erit explicuero. Intesti-
norum igitur, quæ Græcis *ἄντρα* dicuntur nomina, nō omnia in præsentī
complectimur uiscera, uel quæ costas succingẽte membrana & peritonæo
amplectuntur^a organa: aut etiam uel stomachum & uentriculum, ijs quæ
nunc intestina uocabuntur, non ascribam. Quandoquidem^b ductum ab inferiori orificio uen-
triculi ad podicem usque pertinentem, qui ulnas Italicas ut plurimum quatuordecim & dimi-
diam longitudine æquat, peculiariter nũc intestinorũ nomine comprehendam. Quæ etsi con-
tinuum idemq; sint corpus, quum tamen in uarios & multiplices & figura differẽtes anfractus
spirasq; circunducantur, neque omni ex parte eandem situs, substantiæ, & formæ naturam for-
tiantur, ac denique alia alijs hominis parti contigua efficiantur, neq; præcipuus omnium eorum
usus par uideatur esse, ac si plura intestina essent, dissectionũ peritis hæc enumerantur, primum
in^c crassiora & ^d graciliora ipsa diuidentibus, atq; ex his rursus singulis ternariũ numerũ, ut sex
sint uniuerſa cõstituentibus, ad eum quasi modum, quo idem cõtinuumq; perpetuò iter plura
uarias ob causas nomina sortiri cõstat. Quemadmodũ Lutetiæ à diui Iacobi porta ad eam usq;
quæ Martini dicitur, iter, etiã si rectum sit, neq; per uarios giros procedat, nihilominus tamen
sexies (si recte memini) nomen euariat. Primum à diuo Iacobo, inde à paruo ponte, mox à tem-
plo Virginis, & nō multo pòst ab eius ponte, inde ab ænopolio quodam, & postremũ ab æde
Martini appellationem mutuans. Idem multo magis in fluminibus nō regijs, & quæ per mul-
tos giros procedunt uis fieri cernimus. Cæterum utcunq; intestina inter sese uariant, omnia ta-
men inter uentriculum, & qua excrementa egerimus sedem collocantur, forma tereti donata,
sed nō omni ex parte æquè capaci & orbiculata. Substantiam habet membraneam, uerũ un-
dique non pariter aut crassam, aut tenuem: deinde duas peculiareſ tunicas orbicularibus, &
alicubi etiam rectis fibris intertextas sortiuntur, tertiã ad has tunicam à peritonæo obtinentiã.
Venarum præterea, & arteriarũ, & neruorum surculos suscipiunt, sed non ubique similiter nu-
merosos, quemadmodũ nunc persequi enitar, ab ipso intestinorũ exortu sumpto initio. Ex^e hu-
miliori orificio uentriculi, quod in elatiori sua sede & dextro ipsius lateri proxima cõsistit, ^f prin-
cipium intestinorũ exoritur, illi uel orificio continuatur, quod simulatq; e uentriculo prodit, in
posteriora retortũ, sub sede uentriculi posteriore secundũ dorsi dextrũ latus rectã deorsum
^g proficiscitur, in nullos omnino anfractus reuolutum. Quũ primũ uerò ad inferiorẽ usq; uen-
triculi sedem intestinũ istud sic occultatũ, rectaq; descẽdens^h pertingit, sub colo intestino (quod
paulo pòst hæcⁱ porrigi audies) latitans, statim ex dextra sede in sinistrũ retorquetur, ac uelut ex
alto sursum antrorsum uel assurgẽs, in frequẽtes innumerosq; giros & anfractus^k reuoluitur, ac
nullis omnino intestinīs obtectũ, sedem uniuerſam quæ sub uentriculo ad pubis usq; ossa, & ad
ilia utrinq; habetur, occupat, ea demum excepta, qua huic intestino colum instar orbis ad late-
ra^l circumduci, postea dicã. Horum sanẽ anfractuũ seu reuolutionũ nullus omnino neq; nume-
rus, neq; idem penitus ordo habetur, neq; illẽ magis dextrã quàm sinistrã uentris sedẽ implent,
præter quàm quod ad dextrũ ilium seu ile, ubi sedem longẽ maiorem supra ilium os ad pubem
usq; opplent in sinistro latere, coli intestini^m anfractu quo piã eam sedem sibi priuatim uendi-
cante. Utcunq; uerò multiplices, uarijsq; huius intestini conspiciantur anfractus, perpetuò ta-
menⁿ è directo mediæ sedis dextri illi formam, ipsiusq; amplitudinem, & pleraq; alia (uti pòst
subiungã) euariat, eandemq; crassitiem amplitudinemq; ab orificio uentriculi inferiori ad hanc
usque sedem obseruat, nisi aliquãdo huius intestini^o pars sub uentriculi fundo ad dorsum pro-
ximè affirmata, inter disseccandum capacior, ampliorq; reliquo intestini ductu (quemadmodũ
subinde fit) occurrat, atque huiusmodi gracilis intestini ductus uisitur, quod ter nomen, ac si
tria essent intestina, uariat. Primum quidem constituitur tota ea intestini pars, quæ uentriculo
substrata, ab inferiori ipsius orificio rectã quodammodo eousq; descendit, ubi intestinũ in an-
fractus orbescq; primum cõuolui incipit, ac de huius intestini nomine aniles admodum conten-
tiones apud illos reperies, qui partis reſectione neglecta, futiliter de uoce altercantur. Sunt qui
totam hanc partem quæ duodenum digitorũ longitudinem in uiro ut plurimum æquat, non
intestinum, sed *ἐκφυσις* & exortum, seu processum, seu ut eorum uertunt nonnulli appendicem
uocandum cõtendant. Alij etiam si ipsius principium è uentriculo nascatur, intestinum tamen
esse, ipsiusq; orificium *ἐκφυσις*, reliquum uerò ipsius ductum, intestinũ uocari affirmant, inte-
gros commentarios nugaci disceptatione implentes, parte interim quam in controuersiam uo-
cant, prorsus ignorata. Vocetur itaq; nobis uulgato nomine tanquã succinctiori, duodenum,
aut

^a Huius or-
6 libri figu-
ris sunt ob-
uia.
^b 7 fig. I ab
H. ad 8 fi. d.

^c 8 fig.
^d 7 fig.

^e 14, 15 fig.
H. 16 fig. a.
^f 7 figura I
ex H.

^g 7 fig. ab I
ad K. 14, 15
fig. P.
^h 7 fi. K, L.
ⁱ 6, 8 fig. P
uersus Q.
^k 7 fi. ab L
ad M conti-
nuo ductu.
^l 6, 8 fi. N,
P, Q, R, S,
T.
^m ab R, S
ad T.
ⁿ ad 7, 8 fi.
gura M.
^o Effet iux-
ta L et K 7
figura.

^p 7 figu. ab
I ad K.

aut intestinum longitudinem duodecim digitorum æquans, siquidem id Græcis, & imprimis Herophilo *δωδεκάδωλον* appellabatur. Secundum intestinum⁴ illic incipit, ubi iam commemoratū in anfractus gyros ue primū conuoluitur: & *ἰεῦν*, seu ieiunum appellāt, quod inter dissecandum reliquis intestinis inanius & magis uacūū reperiatur. Huius nomen alij explicare conantes, tanquam nihil unquam in se contineat, ac per ipsum à uentriculo confectus cremor nunquam transeat, aut momento tantū in eo hæreret, scribere uidentur. Tertium intestinum ileon, seu uoluulus Latinis, ut & Græcis *ἰλεον*, à frequentibus fortassis quibus inuoluitur anfractibus dicitur: ac etiam loco in quo ad abdominis latera continetur, nomen indidit. Hoc in crassi intestini principium definit. ubi uerò principium suum obtineat, nō satis mihi constat. Equidem ignoro quantam gracilis intestini portionem ieiuni nomine, grauiter de nominibus litigantes, comprehendere uelint: neq̃ sanē⁵ à ieiuni intestini initio, ad ilei usq̃ finem manifestum aliquod indicium obseruo, quo ieiuni finem ac ilei initium inter noscere queam. Vbi enim duodenum intestinum in ieiunum finire, ieiunumq̃ intestinum incipere credimus, copiosiores uenæ ac arteriæ, quàm propter ilei ad crassiora intestina terminum, uisuntur: uerū media medio sese habent modo. Deinde ieiuni initium rubicundius est, ilei finis magis albicans. Ad hæc, inter secandum ieiuni initium fortē magis inane ilei termino offenditur, ac in medio ductu, uti & antea dixi, omnia sunt media. Quapropter quis ieiuni habendus sit finis, aut quod ilei principium, non statuo: id intrepidē affirmans, nihil minus ieiunum ab ileo quàm inanitione, ut cæteri dissectionis profectores obseruari asserunt, dirimi posse, neque profectō minus duodenum, quàm id quod ieiunum uocant, inane reperitur: & maiores (ut dicam postea) ob causas. Ac tales gracilis intestini ter nomen emutantis, ductus situsq̃ sunt. Forma autem undecunque constat simili, ad amissim uidelicet tereti, & omni ex parte æquē ampla, nisi interdum (ut prius quoque innuebam) quā dorso proximē committitur, ieiunum que incipit, ac ad insertionem uasis bilem ad intestina deferentis, amplius obseruetur. Substantia quoque toti intestino gracili eadem est, membranæ scilicet, modicæ que admodum carnea. Constat enim⁶ tunicis duabus, quarum interna durior membranaq̃ est, uerū interiori uentriculi tunica mollior: externa tenuior, magisq̃ carnea: utraq̃ tamē, tam exterior inquam quàm interior tenuis est, & transuersis orbicularibus ue fibris tantum intertextitur: nisi fortassis externa, idq̃ potissimū ad ilei in crassiora intestina terminum, rectas quoque aliquot nanciscatur fibras, quæ tamē sunt quàm paucissimæ. Duodeni intestini pars elatior, utpote quæ uentriculo uicinior est, tunicas suas crassiores obtinet, cum uentriculi⁷ tunicis aliquid sibi commune adhuc uendicantes. Tertia præter duas peculiare tunica à peritonæi membranæ uasa ad intestina securē deferentibus originem ducit. Hæ namque unā cum uasis ad⁸ cauam intestinorum sedem pertingentes dilatantur, tertio que inuolucro intestina induunt. Caua autem intestinorum pars Anatomicis doctrinæ gratia nuncupatur, quam uasa primū attingunt, seu quæ intestina respicit, gibba uerò huic contraria. Ac duodeno quidem intestino tertiam tunicam ea omenti⁹ pars exporrigit, cuius beneficio intestinum id dorso colligatur. Ieiunum uerò ac ileum tertiam tunicam à mesenterio, quod ea dorso firmat, accipiunt. Sic duodenum quoque & ieiuni initium¹⁰ uenæ nam¹¹ arteriam que habent peculiare, secundum ipsorum longitudinem rectā deorsum ductas, multosq̃ surculos in progressu illis diffundentes. Ac uena quidem à portæ uena priusquam mesenterio inseratur, principium obtinet: arteria autem, ab ea quæ iecori offertur, ieiunum ac ileum frequentes uenas arterias que suas nanciscuntur ab illis quæ mesenterio à portæ uena, & ab arteriæ radice supra renum arterias à magna originem ducēte exporriguntur. pauci enim rami in graciliora intestina ab arteriæ¹² propagine diffunduntur, quæ à magna arteria post seminalium arteriarum ortum originem sumit. Neq̃ etiam uasa, quemadmodum in duodeno, secundum ieiuni & ilei longitudinem sub ipsis deducuntur, sed¹³ uelut ex mesenterij cetro ex alto sursum tendunt, rectaq̃ antrorsum in intestina pertingunt, in quæ numerosa sobole arboris radicum modo, in cauam præcipuē ipsorum partem implantantur, osculis suis in internam intestinorum sedem hiantia. Ileum & ieiunum¹⁴ neruos quoq̃ exigunt deriuatos à ramis sexti neruorū cerebri paris, qui costarū radicibus exporriguntur. duæ enim ab illis propagines utrinq̃ singulæ, ad mesenterium, & dehinc ad intestina frequēti utcūq̃ sobole discindunt. Duodenum uerò¹⁵ neruos si quos habet, ab illis exigit, qui inferius uentriculi orificiū, & dextrā fundi sedem adeunt. Dein duodenum priuatim id sibi uendicat, quod¹⁶ meatus bilē flauā ad intestina deferens, illi implantetur. Idem intestinum in hominibus, & adhuc magis in canibus¹⁷ glandosum illud corpus, cuius antea uentriculum describendo memini, peculiariter substratū possidet, ad suffulciēda uasa ei intestino propria, ac quarūdā corporis glandularū modo amplitudinē eius lento humore irrigandā. Quancūq̃ nō duodenum solum, sed et reliqua intestina omnia lento quo-

Secundum.

Tertium.

Vbi ieiuni intestini finis et ilei initium debet constitui.

Gracilis intestini forma.

Substantia.

Caua intestinorum pars, quæ Anatomicis dicitur.

Gracilium intestinorum uenæ et arteriæ.

Nerui.

Intestinorum glandes.

*Crassorum in
testinorum hi-
storia.*

*Cæcum inte-
stinum cuius
modi.*

*Crassi intesti-
ni ductus si-
tusq.*

dam & lubrico humore interna sede imbuantur, atque ut Rhazes non ineptè dicebat, ficulium uasorum more inuitrentur instanneatur ue. At quum huiusmodi pleraque crassis etiam intestinis sint communia, illa quoque recensenda nunc ueniunt. Ileum intestinum sub dextri renis regione à quodam crasso intestino multis modis ipso gracili intestino amplioriⁿ excipitur, non quidem ac si quis diceret exactè in crassi eius intestini initium, sed in ipsius propter initium latus sinistrum. Hoc enim crassioris intestini initium instar globi cuiusdam præmagni extuberat, in sinistro suo latere duo obtinens orificia. ^o unum quidem ileo intestino continuum, & magis ab initio distans: ^p alterum uerò humilior, & ipsi initio propinquius. Huic continuum est in hominibus intestinum, quod *τυφλόν*, seu cæcum ueteribus dissectionum professoribus uocatum esse certissimò noui, non ignarus interim, quid hodie plerique de cæco intestino commententur: decepti profectò, quod inter crassiora intestina id à Galeno alicubi recensetur, neq; aliter quàm amplius quispiam saccus, ac ueluti alter quidam esset uentriculus, ab ipso cæterisq; qui illum subsequuti sunt Anatomicis describatur. quum tamen in homine ^q id quod cæcum appellandum duco, cæteris omnibus intestinis sit breuius, atque arctissima omnium intestinorum parte multo angustius strictiusq;, & crassiori lumbrico in orbes conuoluto potius quàm intestino simile: adeò ut cæcum uix intestinorum appendicis loco, ac proinde minus longè in crassorum intestinorum numero habendum esse uideatur. Atque hinc fit, ut Æsculapij nostri, scilicet quando hanc gracilem portiunculam in homine cæci intestini loco me commonstrare uident, Galeni descriptione nobis obstrepere, ac aliq; quidem ex saccosis illis cæcisq; Rabinis contendat, ^r amplum illud coli intestini initium saccum, aut ut ipsi loquuntur, orbem & monoculum esse: aliq; uerò asserant, cæcum intestinum ob secādi imperitiam à nobis minimè obseruari. Neq; uerò in cathedra hæc boasse contenti sunt, quum non desint qui de cæco intestino paradoxa conscribere, integrosq; libros, ut de duodeno intestino, commaculantes, magnum operæ precium se fecisse gloriètur, si nō unum cum ueteribus Græcis in cæco orificium esse, sed duo sibi proxima esse in mediū adferant. Quæ si uiderint, aut imaginati rectè fuerint, ea demum sunt ^s quæ in coli initio extuberantiōri uisuntur, ac unū quidem foramē ilei intestini terminus est, alterum uerò eius quod cæcum esse dico initium. Neq; est profectò cur minus credamus, gracilem illam intestini portiunculam mesenterio nō annexam, sed sibi ipsi in orbes cōuolutam, & fibrarum beneficio hærentem, in homine cæcum esse intestinum: quantumuis eam amplitudinem usumq; Galenus ipsi tribuat, quæ huic minimè adesse uisuntur, suas potius caudatas simias hac appendice destitutas, quàm homines describens: quos tamen ueteres illi aggredientes, appendicem hunc intestini cæci nomine procul dubio donabant. Deinde Galeni descriptio cani fortassis accommodari hinc posset, cui cæcum intestinum multo quàm homini cōtigit amplius, neque in illo, ut in homine, inane propemodum reperitur. Quin etiam ueras glires & sciuros cæcum hoc intestinum adeò amplum nactos scimus, ut amplitudini ipsorum uentriculi facile respondeat, fæcibusq; turgidū in sectione obseruetur: atq; hinc constat gracilem hunc appendicem in homine cæcum esse, quum uidelicet ductu ac situ & forma pariter (licet nō amplitudine) illorū animalium cæco intestino his congruat, unumq; (unde etiā cæcum primò dictū est) nascatur orificiū. Insuper summus profectò Naturæ admirator Galenus, si hominis intestina unquā ita ut canū intuitus fuisset, hunc appendicē, & extuberās illud in homine coli initium, ileiq; cum ipso unitatē, & coli formā, longè secus descripsisset. quippe si aliud homo cæcū nascere, eum appendicē minimè præterisset Galenus, quanq; ortu nō nihil in homine & cane uariet. nā etiā si utrisq; in dextro ileo collocet, hominis tamē cæcū ex sinistra magis coli initij sede q; dextra, ut in canibus, ut & Galenus attestatur, principiū ducit. Porro si cū nōnullis, qui secāti mihi astiterunt, in homine quidem ad eū usum quem Galenus ei tribuit, appendicē hunc à Natura primū formari dicerem, & ob nimiam hominum ingluuiē ex ileo intestino à uentriculo confectum succum absq; eo ut is totus cæcum subintret protrudi, atq; hinc appendicē in nobis tanq; inutile & marcidū, aliter fortè q; in temperatis Galeni hominibus, pendere affirmarē, ad nugacem illam tergiuersationē deueniendū foret, qua alios tum fuisse homines fateremur, præcipuè quum amplum hoc coli intestini initium in homine cæci intestini usum abundè suppleat, & notæ duntaxat gratia cæcum in homine haberi uideatur. In dextro itaq; ileo ad humiliores^r renis dextri sedem extuberans illudⁿ amplum & rotundum coli principiū habetur, quod hinc sensim rectā ad iecur sursum^x contendit, iecoris^s que cauæ parti nonnihil substernitur, ac^y bilis uesiculam in homine contingit, cuius etiam contactu flauo colore hinc intestinum quandoq; tingitur, ^z inde ex dextro latere secundū inferiorem uentriculi sedem in sinistrū fertur, uentriculi fundo attensum: haud tamen, ut alijs uisum est, eum conscendens: aut ut uulgò dicitur, uentriculi fundo superequitās. Quum primum uerò ad sinistri uentriculi latus pertingit, super de-

ⁿ 7, 8 fig. M
in N.

^o 7, 8 fi. M.
^p 7, 8 fi. O.

^q 6, 7, 8 fi.
O. 10 fi. F.

^r 6, 7, 8 fi.
gu. N.

^s Sunt O et
Mad N fig.
7, 8.

^t 20 fig. T.
^u 6, 7, 8 fi.
gu. N.

^x 6, 8 fi. ab
N ad P.

^y 20 fig. H.
^z 6, 8 fig. à

P ad Q. in
sexta secun-
dum F, F.

missiorem^a lienis partem anfractus quosdam leuiter inflexos obtinet, ac paulatim supra^b finistrum renem per ilium sinistrum decliue fertur, secundum peritonæi latus ad pubis usque os^c descendens.^d Hinc rursus ad sinistrum latus quasi ad umbilici sedem ac anfractum (quem à medicis propter suos clysteres, quos ad graciliter usque intestina sese infundere arbitrantur, colicosque cruciatus perpendi melius optarim) hinc constituens, super ossis sacri initium tenditur, ^e à quo recta deorsum ad podicem usque descendit, in^f uiris quidem sub uesica, in^g mulieribus uero sub utero ossi sacro & coccygis instratum, huic intestino, ab ilei intestini fine ad podicem usque pertinenti: & si par undique propemodum, præterquam in initio, ubi multo capacius apparet, sit amplitudo, figura tamen ductuque uariat, ac proinde tanquam in duo intestinalia subdiuiditur, ut^h quicquid à dextro ilio super dextrum renem sub iecoris cauo, deinde secundum uentriculi fundum ad lienem properat, & hinc rursus super sinistrum renem uersus pubem fertur, ac alium anfractum supra internam ossis ilium sedem faciens, ad sacri usque ossis initium proripit, Latinis pariter ac Græcis colum intestinum appelletur. ⁱ quod uero ab osse sacro ad anum usque pertinet, Græcis ἀπὸ θυροκόλου & ἀρχῆς dicitur, Latinis longaon, rectum, & princeps. Colum enim in hominibus, aliter quam in canibus, non ad amussim teres est, uerum per uniuersum ipsius ductum superius inferiusque^k depressum uisitur, ad latera utrinque quadam serie, uelut in medios globos cellulasque extuberans. Atque hæc figura eo minus conspicua sit, quo colon recto intestino uicinius accedit, quod exacte teres, non autem coli modo depressum extuberansque cernitur. Ambo itidem ut cæcum quoque tunica extruuntur^m duplici: quarum, ut in gracilibus intestinis, interna exteriori neruosiorem membranam ue magis & durior est, uerum colon utramque tenuiorem gracilioremque quam rectum obtinet: & quanto colon recto magis conterminum est, tanto quoque ipsius tunicae crassiores meliusque nutritæ conspiciuntur. Interna utriusque intestini tunica transuersis circularibusque fibris, ipsdemque frequentissimis solum abundat: externa uero in colo intestino transuersas quidem nanciscitur, sed & rectas quoque quamplurimas exigit, non quidem secundum uniuersam intestini superficiem protensas, sed duntaxat inferius & superius ubi colonⁿ depressum esse diximus. Secundum enim eas coli impressiones rectæ fibræ protenduntur, & coli tunicae ibidem sunt robustissimæ, admodumque spissæ, & ut Galenus in quarto de Partium usu, de pluribus animalibus innuebat, colon fortibus ligamentis utrinque singulis constringitur, secundum longitudinem desuper ad inferna porrectis. quod me Hercule & homini Galenus ascripisset, nisi ipsius intestina canum intestinis eiusmodi ligamentis carentibus respondere putasset. Porro exterior intestini recti tunica per totum intestini ambitum rectis fibris admodum frequentibus passim abundat, adeo ut hæc plures rectas quam orbiculares fortiatur. Cæterum tertia^o crassorum intestinum tunica, quemadmodum & gracilium tunica tertia, à mesenterio ipsis uasa porrigente pendet. hoc enim caue intestinum ledi applantatum, in tertiam ipsorum tunicam degenerat. quanquam coli intestini pars, uentriculi fundo attensa, priuatim in hominibus ab^p inferiori membrana omenti tertiam asciscat tunicam, quod hæc coli sedes eius membranæ beneficio dorso ita affirmetur, atque reliqua intestina mesenterij interuentu dorso colligari nouimus. Coli itidem & recti intestinum uenæ & arteriæ, quas pauciores hæc quam intestina gracilia exigunt, à portæ & magnæ arteriæ ramis pendent. Colo quidem intestino toto progressu, qui à dextro ilio ad sinistrum ferè renem pertinet, arteriæ uenæque, quemadmodum ieiuno & ileo, implantantur, ex alto scilicet sursum seriatim conscendentes, ac parti ipsius inferiori à sinistro rene ad rectum usque intestinum ductæ, & ipsi quoque recto uenæ arteriæque, quemadmodum^q duodeno porriguntur. ^r Vna enim insignis uena à portæ ramis in mesenterium excurrentibus, & arteria etiam ab^s illa principium ducens, quæ ab arteria magna ad mesenterium seu uasorum terminalium exortu depromitur, secundum dictam coli partem & rectum intestinum mesenterio suffultæ, recta protenduntur, ac in progressu furculos seriatim unoque ordine intestinalis offerunt. Verum de uenis ac arterijs in mesenterij descriptione rursus pertractabitur. Nervos autem crassiora hæc intestina cum gracilibus communes habent, & utraque lento uiscidoque humore intus oblinuntur: ac uti obesorum uentriculi adipem, aliquando satis etiam copiosum intus adnatum exigunt. quemadmodum & exteriori superficiem coli intestini, quæ id recto proximum est, & ipsi quoque recto, pingues quidam appendices adnascuntur. Intestinum rectum^t musculos uoluntariæ faciunt excretioni præfectos sibi priuatim uendicat, quos quum in secundo libro persequutus sim, non est necesse hinc quoque eosdem recensere. Sed admirabilis potius Naturæ industria hinc consideranda uenit, quæ ea omnia adeo diuine machinata est, nec quicquam nisi ad summum usum in intestinis extruxit, primum & potissimum

Crassum intestinum in colo & rectum diuidi.

Coli à recto differentia.

Crassorum intestinum tunica.

Coli & recti uenæ ac arteriæ.

Nervi.

Ades intestinis obnatus.

Recti intestini musculi.

Intestinum munus, ac deinceps eorum constructio ratio.

ca

ea efformans, ut horum beneficio quicquid esset succulenti in cibo uentriculi opera elaborato, id ad iecur sanguinis officinam duceretur. Deinde ut faeces & quæ suctui inepta essent, debite excernerentur. Postremum etiam coquendi alterandiq; uim modica non nihil intestina prodesse, Natura uoluit, ut à uētriculo scilicet prius confecta absolutius paulum emutarentur. Atque ad hos sanè scopos illa respiciens, intestina artificiosissimè fabrefecit. quod enim præcipuè neq; gratia educationis excrementorum, neque concoctionis, sed ut id quod in cremorem uersum est, per uenas assumptum in iecur totum deferatur, intestina ad eum quem diximus modum, fabricata sint, coniectare licet permultis. Primò quidem, quod in nullo animali constructus sit uentriculus illis organis contiguus, quibus egerendo idem expurgatur. quamuis non impossibile esset, uentriculum ad anum usque extendi. Deinde, quod plurimis animalibus intestina in multos frequentesq; gyros & anfractus inuoluuntur. Postremò, quod constet uentriculum cibum non antea demittere, quàm perfectè illum confecerit. Venter igitur sedi non esse contiguum, aut illi recto saltem meatu ductu ue iunctum, liquidò demonstrat, aliud concoctionis esculentorum, aliud uerò redditionis digestionisq; aut ut Græci dicunt, *ἀναδωρεῖ* organum fieri oportuisse. Quippe si idem omnino existeret, metuendū esset, ne frequenter uenæ crudum in cōcoctumq; assumeret cibum: qui postmodum à iecore malè confectus, homini inutilis noxiusq; foret. Sed & redditionis instrumentum, quod non rectà à uentriculo ad anum extenditur, sed quàm plurimis orbibus & anfractibus spirisq; (ne ocyus hominis nutrimentum non exuctum elabatur) inuolutum uisitur, nunc dicta confirmat. Si enim alius uenter uētriculo succederet, essetq; ille redditionis, sicut hic concoctionis est, promptuarium, nequaquam exiguo tempore & plurimum alimenti per uenas frequentes in iecur susciperetur. Nunc autem per innumeras uenarum soboles, ex uarijs illis copiosisq; intestinorum anfractibus, quicquid succulenti à uentriculo confectum est, in iecur promptè transsumitur. Aliàs uerò si raris uenarum orificijs parum cibi in cremorem uersi, continuo incideret, tarda & diuturna succederet digestio: quum necessarium sit, ora uasorum elaboratum succum tangere. Si uerò alter magnus uenter priori subtenderetur, cibus omnino modicam eius uentris sedem tangeret, solam nimirum eam cui proximus attiguusq; suis parietibus esset. Plurima uerò cibi portio, quantacumq; scilicet esset in profundo, seu medio eius uentris spacio, uenarum apprehensiones suctusq; effugeret. Sed nunc demū transitus angustia cibum in exiguas cōminuens particulas, cogit ut is propemodum totus tangat intestinorum tunicam, ad quam uenæ suis osculis hiant. Et si quid in transitu primianfractus, uasorum ora in internam intestinorum sedem hiantia effugerit, per secundum quidem tangit: & si hunc præterlabatur, tum omnino per tertium, aut quartum, uel alium eorum anfractuum qui frequentes numerosiq; subsequuntur, ut tandem nullus effugiat, aut lateat, aut excidat cibus ad nutritionem utilis, quando lege Naturæ & morbo liberum corpus dispensatur. Intestinorum itaq; anfractus, ut quicquid succulenti humidisq; in confecto à uentriculo cremore esset, uniuersum distribuatur, comparati sunt. Et id præcipuè tenuium intestinorū munus est. Crassa enim, & si ipsa quoq; ad succorum distributionem conducant, peculiariter tamen eò conferunt, ne continuo, sed per longa interualla egeramus. Hæc enim tanquam uenter aliquis siccis excrementis, uti uesica urinæ, subiiciuntur: unde etiam inferiorem uentrem ea nonnulli appellarunt. In his namq; excrementa ita colliguntur, ut repente uniuersa simul educi queant: ita tamē, ut & hinc aliquis homini usus accedat. quippe si gracilium intestinorum suctum aliquid præterfugerit, quum longiori mora excrementa in crassis intestinis resideant, ipsorum uasa id exugunt. Ad hæc, quo maior adhuc esset cōmoditas moræ ciborum per eos anfractus delabentium, quandam alterandi concoquendiq; uim totī intestinorum generi Natura indidit. Quamuis quum prorsus impossibile sit, non adesse unicuique animalis particulæ uirtutem quampiam alteratricem, & non absit longè, parumque à uentriculo intestinorum substantia: necessarium sanè est, & uirtutem alteratricem ijs inesse, & uentriculi uiribus consimilem, & proinde in ipsis quoque intestinis cibum concoctionem aliquam suscipere est quàm manifestissimum. Quod autem commemoratis iam uisibus, quæ de intestinorum constructione suprà scripsi, omnia competant, obiter quoque nunc subnectam. Hæc itaque ad uentriculum statim, à quo cibum accipiant, opportunè locantur. * Duedenum uerò etiam si id fuisset utile, in nullos tamen anfractus ducitur, quod sub uentriculo, quæ fertur, nullam omnino uacuam sedem obtineat, in qua aptè in gyros flecti queat: deinde quod^y portæ uenæ à iecoris cauo prodeunti cedere oportuerit. ^zleium uerò & ilium mediam uentris sedem iustissimè occupant, quod inibi mesenterij^a centro sint proxima, breuissimòque ductu & uenæ portæ ramī, & arteriæ magnæ propagines illis hinc diffundi possint. Porro de^b coli situ nimis quàm miserè se torquent dissectionum professores, quod id quum

Situs intestinorum ratio.

x 7 fig. ab I ad K.

y 12 fig. h.

z 7 fig. à K

per uarios

anfractus,

tādē ad M.

a 10, u fig.

L, L.

b 6, 8 fi. N,

P, Q, R, T.

excre-

excrementorum uelut quoddam sit promptuarium, ad uentriculi fundum iecoris que cauum porrigi conspiciant. ac alius quidem quia id faeces continet, innatoque calore destituitur, ad uentriculum ferri uult, ut illius uicinarumque partium contactu maiorem concoquendi uim assumat. Alius sub iecoris cauo colon deduci contendit, ut ex bilis uesicula in illud refudans bilis, incitando excrementorum egerendi uim feliciorem reddat. Alius aliud comminiscitur, & interea nemo animaduertit, colon mesenterij centro non admodum debere uicinum esse, neque id uenae portae ramos cauo iecoris proximos oportuisse assumere, quum parum quod exugideceat amplexetur. Ut itaque^c grandior dexterue uenae portae truncus breuiori ductu gracilibus intestinis infereretur, ac succinctiori uia cibum ad iecur transferret, colon intestinum gracilibus cedit, ac ueluti per distantia maximè à mesenterij centro loca procedit, atque hac etiam occasione id praecipua sua portione sinistram corporis sedem occupat. Rectum autem intestinum illic commodissimè reponitur, quò opportunè paulatim asseruata egerere tandem queat. Forma autem tereti in hoc intestina creantur, ut sint capaciora, minusque iniurijs occurrentibus exposita. At angusta sunt gracilia intestina, ut minima cibi portio ab ipsorum tunicis, adeoque ipsorum uasis tangatur. Crassorum intestinum magna est amplitudo, ut multa colligere possint, ac ne frequentius egeramus opitulentur. Substantia constant, facile quae continet amplectente, & rursus à contentis distendi apta. ^d Duplicem uerò exigunt tunicam, ut iniurijs innoxie ferendis magis sint idonea, nam interior aliquando in intestinum difficultatibus, alijsque diuturnis affectibus putrescit, exterior salua: unde & aegri nonnulli euadunt. Porro interior gracilium musculorum tunica^e interiori uentriculi tunica mollior est, quòd nulla aspera intritaue illa, sicut hic, recipiant. Exterior uerò intestinum tunica interiori uentriculi minus carnosae est, quoniam digestionis potius quam concoctionis organa sint. Caeterum tunica crassorum intestinum tanto gracilium intestinum tunica interiori durior est, quanto illa materiam continent durior, & à succo magis liberam. Quandoquidem quae gracilibus continentur intestinis, liquida, fluida, aquea que adhuc sunt: quae autem crassis, dura. Intestinum tunica utraque transuersas fortitur fibras, ut ocyus quod in illa defluit propellant, itaque cito uniuersus succus ad iecur exugatur. At externa recti intestini & coli tunica, praecipue quoque rectas fibras obtinuit, ut hae uelut uinculum circularium fibrarum efficerentur, ne forte quum illae dura excrementa crebrius protrudunt, inuicem abscedant diuellanturque. atque hac potissimum occasione recto intestino, ut quod sicciora excrementa amplectitur, eius generis tribuuntur quamplurimae. Quamquam fortassis non ob id solum ut transuersas colligent, rectae fibrae huic offerantur, sed etiam ut recrementa alioquin non admodum sequacia illae attrahant. Tertia intestinum tunica secundae uelut propugnaculum est, & copula, cuius beneficio intestina^f mesenterij interuentu dorso colligentur. Caeterum uenae arteriaeque (nam & hae ex intestinis aliquid elicere creduntur) non omnibus pari numero ac frequentia distributae sunt, quod non in omnibus intestinis eadem exugenda succorum copia sit. Quo enim intestina uentriculo in continuitate uiciniora sunt, eo plus optimi cremoris continent, ac proinde frequentiora uasa gracilibus intestinis deferuntur, pauciora crassis. & pari hac ratione pauciores uenae uentriculo, quam tenuibus intestinis inferuntur: quoniam qui in ipso continetur cibus, non semper plenè confectus mutatusque est. Neruis autem intestina donantur, ut infestantes humores dignoscant: quandoquidem si sensus penitus essent expertia, nihil obstaret, quin ex flaua bile, aut alio mordaci succo intestinum penitus subinde corroderetur, priusquam homo sentiret. iam uerò bilis^g meatus in duodenum insertus, intestina bilis influxu stimulans, eorum actionem uehementer adiuuat, ac pituitam ipsis incidentem expellit. Atque haec praecipua, praeter succi tenuitatem, causa est, cur ieiunum intestinum suum quem continet cremorem ocyus quam reliqua transmittat. nam dum bilis adhuc cremori non mixta, intestini lateribus adfluit, sua acrimonia id magis stimulans, ad ea quae continentur uelocius propellenda inuitat. Reliquae enim inanitatis ieiuni causae, ut succorum optimorum copia, frequētes uenae, proximus iecori situs, & ante haec omnia deorsum recta tendens intestini ductus, & liquidissimus adhuc succus, duodenum magis ieiunum esse, uti sanè etiā reperitur, documento sunt. Quanquā bilis in ipsum influens, & illud quoque ad subita excretionē irritat impellitque. Sed de bilis natura, ipsius meatibus, suo postea loco accuratius pertractabitur.

*Intestinorum
formae ratio.*

*Substantiae
Tunicarum.*

*Fibrarum
ratio.*

*Venarum ar-
teriarumque ra-
tio.*

*Neruorum
ratio.*

*Vesiculae bi-
lis meatus in-
sertionis ra-
tio.
Quamobrem iei-
unum intesti-
num cremore
ocyus trans-
mittat.*

*c. fi. ca. 5 lib.
3 G.*

*d. 9 fi. h. &
i. quibus ob-
ducitur po-
stea L. à
h. h.
e. 17 fig. m.*

*f. Spectatur
id fi. 10.*

*g. 13 fig. c
add.*

MESENTERIUM inter ceteras figuras ostendit undecima, mox decima & duodecima, & non perfunctorie uigesimaquarta. uti ex illarum figurarum Indicibus colligere promptum est.

*Mesenterij
nomenclatura.*



Ipsius situs.

Substantia.

Forma de

ortus.

*In li. de Secti
one uenarum
& arteriarum.*

*Substantia me
senterij ratio
ac usus.*

*Lib. 6. de Ad
min. dissectio.*

ORPVS Græcis *μεσεντεριον*, & *μεσολαριον* nuncupatum, Gaza in Aristotelis historia de Animalibus lactes appellauit. Cicero autem in tertio de Natura Deorum intestinum aliquod ita uocari arbitratus, medium intestinum uertit: quod quum falsum sit, neque lactes idem omnibus significant, & medianum recepta parum uox uideatur, à Græcis non inopportunè uocem mutuabor. Mesenterium itaque ad posteriorem intestinorum sedem locatum est, uinculum, cuius beneficio intestina inuicem ut ad dorsum colligarentur, tutum. Ut uerò id tantum homini usum securius præstet, dura membranaeque constat

substantia. Ex^h duabus enim mutuò attensis & accumbentibus membranarum à peritonæo originem ducentibus, mesenterium conformatur. Non quidem ex una eademque peritonæi sede his membranarum origo est, uerum ex uaria, pro mesenterij ipsius nimirum forma, quam ferè intestina fingunt, à mesenterio colligata. Nam ut non intestinorum omnium par anfractuū ductus est, ita quoque non eadem undecumque mesenterij effigies. Quam forsitan Galenus animaduertens, etiam si omnino continuū mesenterium sit, nihilo minus tria mesenteria quodammodo recensuit. ^c unum quidem dextrum, ^d alterum uerò sinistrum, ^e tertium autem medium innuens. Ac Galenum quidem medium mesenterium appellare arbitror mesenterij partem, ieiunum ileumque intestina dorso colligantem: quæ angusto orta principio, in miram amplitudinē latitudinemque ducitur, ut omnibus ieiuni ileique intestini connasceretur anfractibus. Dextrum uerò & sinistrum appellare potuit, quod colon intestinum, & rectum dorso alligat, dextrum quidem in dextri illius regione, sinistrum uerò in sinistri collocans. Mesenterij itaque pars gracilibus intestinis peculiaris, simile omnino cum inferiori membrana omni sortitur exortum. Ex^g magnæ enim arteriæ & uenæ caue tunicis, quas ea uasa secundum uniuersum suum per lumborum uertebras ductum à peritonæo obtinent, membranae fibrae admodum frequentes exurgunt, statim in duas degenerantes membranas, dextræ quidem in dextram, sinistræ autem in sinistram. Hisce membranarum mutuò adnexis, mesenterij pars gracilia intestina dorso colligans efformatur: partes autem colon & rectum dorso connectentes, ab illis peritonæi regionibus principium ducunt, secundum quas hæc intestina exporriguntur, peritonæo semper fibras quasdam quæ in mesenterij membranas degenerent, illic emittente.

Neque profecto mesenterij substantia in hoc solum quo ualidius intestina dorso adnecteret, membrana est, uerum etiam alterius magni cuiusdam usus gratia, quo^h uenas omnes ex iecoris porta, & arteriæ propagines à magna arteria ad intestina excurrentes tuto colligaret, ac ne illæ dum homo salit aut cadit, contundantur & disrumpantur, tuto secureque admodum suffulciret. Grandior enim uenæ portæ truncus, quæ mesenterium iuxta renum regionem à dorso pronascitur, inter duas mesenterij membranas ducitur, arteriam habens comitem, quæ à magna arteria priusquam hæc ad renes ramos dispergat, in hoc ut in intestina diffundatur, originem ducit. Huc quoque pertingunt^k duo nerui, utrinque nimirum singuli, ab illis pronati ramis, qui à sexto neruorum cerebri pari costarum radicibus exporriguntur. Adeo ut ingens is uenæ portæ truncus, & dicta nuper arteria cum duobus illis neruis simul mesenterij^l centrum subeant, atque inter duas ipsius mesenterij mutuò coherentes membranas ingrediantur, ac tuto postmodum per uniuersam mesenterij sedem numerosa sobole ad intestina perferantur. At præter commemoratam arteriam, alia quædam magnæ arteriæ propago eam mesenterij partem ingreditur, quæ sub renum regione à dorso principium obtinet. atque huius propaginis^m exortus paulo sub seminalium arteriarum principio à magna pendet arteria. Venas autem nullas præter dictum nuper uenæ portæ truncum, mesenterium admittit. Neque satis assequor, quid Gale-

nus sibi uelit, quando intestinorum, ipsique adeo mesenterio uenas offerri testatur in iecur non terminatas: & dum alibi, à caua intestinorum ramos quosdam propagari commemorat, quod sanè falsissimum esse uel sectio ipsa luce clarius tibi demonstrabit; etsi nulla alia, saltem illa in qua portæ uena, & quos dixi, arteriæ ramis uinculo interceptis ac resectis, intestina simul cum mesenterio in uiuente adhuc animali à dorso auelluntur. Hæc enim si quis esset uel capillaris ramusculi à caua uena ad intestina exortus, sanguinem tibi ex illo profluentem ostenderet. Porro in canibus duplicem mesenterij membranam adinuenire non adeo promptum est, quod illis macilentius obtigerit mesenterium, cuius membranae inuicem omni ex parte (nisi quæ uasa admittunt) perinde ac si simplici membrana mesenterium constaret, connatae uidentur.

^a Vti uide-
re est in 10
fig. & 12.

^b 24. fi. F, F
una, altera
G, G. sic &
11. fi. X, Y.

^c 11. fig. N,
N, O, O.
^d 11. fig. P
uers. Q. 12
fig. m.
^e 11. fig. R,
S, T.

^f 4. fi. c, c, e.
^g 25. figura
P, Q.

^h fi. ca. 5. li.
3. G, b, b, b.
ⁱ 12. fi. k.
^j fi. ca. 12. li.
3. li.

^k 2. fig. ca. 2
lib. 4. 1. a.
^l 10, 11. fi. L,
L. 12. fig. h.

^m 25. figura
1. sub f.

suntur. At in homine binæ mesenterij membranæ inuentu sunt perquàm faciles, ac multà intercedente pinguedine inter se distāt. Vt enim homo copiosa undecunq; abundat pinguedine, sic mesenterij quoq; præpingue adipiscitur, sanguine hîc ex uasis resudante, membranarumq; uî in adipem mutato, ita ut præter uasa & neruos multum adipem mesenterij membranæ in sui medio contineant. Sed præter adipem aliud quoque mesenterio accedit. neq; enim sat esse uisum est Naturæ sagaci, frequentem illam uasorum sobolem mesenterij membranis cōtineri, quin glandosum corpus, Græcis *παχυγαστρός* & *λεπιδώδης* dictum, singulis uasorū scissionibus, ita undequaq; substruxit simul & circumposuit, ut nulla ipsarū inualida fieri, aut per motum quassari posset: nō ignorans, quiduis suscipiendis noxis opportunissimum esse, ubi in ramos ducitur. Ac proinde ad mesenterij quidem "centrum, ubi prima uasorum fit distributio, grande corpus glandosum extruitur, insigniores ac primos uasorum ramos securè admodum deducens. Per reliquam uerò mesenterij sedem, singulis propè uasorum diductibus Natura° glandulam quoque aliquam interiecit, diuisionis robur simul ac firmamentum futuram. Adeò ut simul glandulis illis accedentibus, mesenterij membranæ uasa uersus intestina tutissimè deferrant, intestinaq; omnia dorso quamaptissimè colligent, ac demum^p tertiā intestinorū tunicam efformēt. Quum enim mesenterij membranæ uasa ad cauam intestinorum partem deducunt, ipsi intestinis simul cum uasis adnascuntur, atque hîc inuicem abscedentes singulæ per suum in intestina latus ascendunt, ac in tertiā intestini tunicam degenerant, hac occasione fortius intestina ligantes, & ualidius uasorum propugnaculum constitutæ.

Mesenterij
adepts.

Glandes.

DE IECORE. CAPVT VII.

IECUR pleraq; ostendunt figuræ, uerum inter cæteras duodecima & uigesima cauam ipsius sedem imprimis spectandam offerunt. Gibbam uerò proponit decima octaua, & aliqua etiam ex parte secunda, sexta, ac uigesima secunda, & uigesima quinta, quæ & caue regionis nonnihil exprimunt: quum in his iecur ita collapsum sit, ut extra naturalem situm id anteriore ipsius sede sursum in duodecima & uigesima protrusimus, quò caua ipsius sedes integra in conspectum ueniret.



IECUR nutritionis organorum facile præcipuum, & sanguinis crassioris officina, animæq; cibos ac potus quæque corporis naturæ necessaria sunt, appetentis fomes, elatissimam ei ministrantium partium regionem obtinuit. Sub irascibilis enim & iam dictæ concupiscibilis animæ^a septo iecur statim^b collocatur, maximam inferioris septi sedis regionem occupans. Etenim totam dextram septi partem contingit, parum admodum illius partis intactum relinquens, quā septum undecimæ duodecimæq; costis adnascitur, suaq; ligamenta quibus uertebis colligatur porrigit. Mediæ autem septi parti uniuersæ iecur subtenditur. Sinistræ uerò parti non itidem, quanquam huius magnam quoque sedem teneat, totam uidelicet anteriorem ad eam usque partem, qua sinistrum septi latus costarum medio (quod ab ipsarum radicibus ad finem usque eorundem metior) incumbere incipit. Et profectò longè magis quàm nostris uisum est medicis, in sinistrum latus iecur^d pertingit. Neque uerò septi transuersi latitudinem ullibi excedit, nisi quod paulo demissiùs, quàm^e mucronata consistit cartilago plerunque, & potissimùm arctato thorace pertingit. Porro humanum iecur maiorem sui portionem in dextro latere extensam habet, propter^f lienem, qui ipso dignitate multò inferior, sinistram sedem erat occupaturus. Vt igitur corpus redderetur æquilibre, sagax Natura minorem iecoris partem in sinistra deduxit. quod aues manifestò attestantur, quibus iecur propemodum æqualiter in utrumque latus consistit, ut & canibus. His enim quia gracilis, neque ponderosus admodum lien contigit, magna iecoris portio in sinistram fertur. Vt cunque tamen deducatur iecur, etiam si sub septo locetur, eam sedem perpetuò exigit, quæ costis succingitur, adeò ut cibi organorum situs magnam rursus Naturæ ostendat providentiam. Quum enim abdomen propter ea quæ extendi subsidereq; crebrò debent organa, ossibus destituatur, Natura eas partes quarum gratia illud ossibus carere uoluit, ab iniurijs minus textit: reliquas uerò hac extensione non indigentes, tutissimè condidit. ^g Atque ita peritonæo inter dissecandum aperto, primùm occurrunt, uenterculus, intestina, uesica, & uterus. Verum iecur, lien, renes, uena caua, & arteria magna tutiùs reconduntur. Iecoris forma uaria est, & suis quibus accumbit organis respondens, non aliter quàm si id nullam peculiarem exigeret formam, & sibi à uicinis partibus, instar fictilis terræ, quamuis effigiem

Iecoris situs.

Situs ratio.

Iecur maxi-
ma ex parte co-
stis succingi-
muniq;.Iecoris for-
ma.

u indi

n 10, 11 fig.
L, L. 12 fi. l.o 10, 11 fig.
M. sed ma-
ximè in 24
fig. ad F, F.G, G.
p 9 fig. h, h
sostituit L.a 7 muscul.
tab. Δ.
b Videtur
id 2, 6, 12,
20, 22, 25 fi-
guris, & ul-
tima quoq;
fig. lib. 3.
c 7 muscul.
tab. o, p.d Ad O fig.
22, & ad C
fig. 20.
e 6 fig. sub
A habetur
D, D.
f 20 fig. O,
O, P.g confer 2,
6 figur. 20,
22, & 25.

indi sineret. Nam & supra, & retro omni ex parte qua septum^h spectat, gibbum læueq; admodum uisitur, nullis omnino extuberans processibus: & cavitati septi, quæ in inferiori ipsius sede necessarioⁱ constituitur, ad amissim congruens. Videtur enim iecur uelut gleba illi inferiori septi sedi impressum fuisse, ac ab ipsa hîc formatum.^k Ne uerò uenæ cauæ caudex secundum posteriorem iecoris sedem protensus, aut huius grauitate, aut septi transuersi motu comprimeretur, tantus sinus in posteriori iecoris sede exsculptus est, quantus amplectendo innascendoq; cauæ caudici sufficiat. Cæterum^l inferiori sede iecur admodum amicè uentriculo cedit, ac ab illo (quem rotundum secundumq; corporis latitudinem oblongum necessario procreatum esse diximus) cauum efficitur: & læue quidem hîc existit, sed non undecunque processibus^m tuberculisue & sinibus liberum. Quemadmodum enim organa quibus iecur caua sui parte incumbit, simplici quadam superficie neutiquam gibba sunt, ita quoque iecur unica superficie haud sinuatum est, sed rupis præcipitio aliqua ex parte accedit. Quà nanqueⁿ duodenum exporrigitur intestinum, & uena^o portæ à iecore prodit, iecur quodam^p tubere prominet, sedem quam hîc uacuam reperit adimpleturum. Præterea ubi biliis^q uesicula cauæ iecoris regioni innascitur, sinus in illa exculpitur, medium eius uesiculæ corpus eleganter excipiens. Ad hæc, iecur quoque ea parte^r sinum adipiscitur, qua stomachum tangit, ipsiq; septum transeunti, & superiori orificio uentriculi continuando, locum præbet. Adeo sanè ut iecur nullam peculiarem formam obtineat, sed eam quæ à conterminis partibus ipsi imprimitur. Velut canum sectio pulchrè attestatur, in quibus iecur sinu suo superiorem dextri renis sedem concinnè admodum excipere cernitur. Atque hoc rectè à Natura factum est, quum iecoris munus nullam separatam propriamue exigat figuram, uti uentriculus, intestina, uesicæ, & eius generis per multa, quæ amplam cavitatem eamq; unicam necessario obtinentia, opportunissimè rotunda effinguntur, & septum quoque transuersum ob suam functionem dilatando thoraci imprimis præfectam necessario, quam nunc sortitur formam, obtinuit. Iecoris enim substantia & uenarum per ipsum reptantiū series, facile tibi documento erunt, ad ipsius usum quo sanguificationis est officina, magnum id & crassum oportuisse fieri organum, ac interesse, utrum rotundum an oblongum, gibbumue an cauum extrueretur. Iecur itaque superius posteriusq; quæ septum spectat, præter sinum uenæ cauæ caudici paratū, exactè gibbum & læue, sed quæ uentriculum amplectitur, omni propemodum ex parte cauum cernitur. Rursus ubi posteriori uentriculi sedi & dextro ipsius lateri attenditur, crassissimum est: quæ uerò superiori orificio uentriculi eiusq; sedi superiori uersus sinistrum incumbit, tenue apparet, & sensim hominibus illic in acutum fertur^s angulum. In dextra uerò parte rotundum quodammodo & orbiculare obseruatur, & nusquam tenuius est, quàm in ambitu, & præcipue in anteriori ipsius sede, ubi sanè tenuissimum uisitur, interdum inibi impressiones quasdam obtinens, sed omnes exiguas præter^t unam patulæ sectionis modo anteriori ipsius parti inductam, ac à mucronata pectoris ossis cartilagine parum in dextrum iecoris latus uergentem, & ueluti^u foramine quodam ad eam iecoris sedem penitus pertinentem, à qua portæ uenæ^x caudex principium ducit. Atque hæc sectio seu foramen est, quo umbilici^y uena humano iecori implantatur. Cæterum nos neque porcini, neque canini, sed humani iecoris formam nunc persequimur. Quæ enim dissectionum professores de eius forma ac penulis seu fibris (quas λόβος Græci uocant) commentantur, è canum potius & simiarum sectionibus, quàm hominum didicerūt. Humanum enim iecur in fibras, porcini iecoris modo nō discinditur, & multo adhuc minus ut caninum. Nam unicum cōtinuumq; præcipua ipsius substantia corpus hominis iecur est: canum uerò in quinque, nonnunquam in sex aut quatuor tantum partes est disiunctum, solarum uenarum interuentu inuicem continuatas. Porcis uerò in pauciores, uenis duntaxat hærentes: aut etiam in plures, si sectiones quoque impense altas fibrarum uice numerare lubeat. Atque hinc natum est illud medicorum ac Anatomes peritorum commentum, quo uentriculum à iecore quinque fibris manus apprehendentis modo, amplecti asserunt. Quin Græcorū nonnulli, nescio à quibus ut testantur mathematicis medicis nomina mutuantes, illis fibris priuata (uti apud Theophilum illum parum Anatomicum uidere est) imponūt nomina. Quatuor enim quum sint, inquiunt, iecoris fibræ, prima focus dicitur: maximè nanq; ad succi concoctionem facit, quemadmodum concoquendis cibarijs focus. Secunda mensæ nomen sortitur, quod mensæ uices gerat: nam membrorū alimenta in ipsa apponuntur. Tertia culter nuncupatur: diuidit enim, segregatq; inter se humores, aut si quid crassius distribuendū sit, id secatur atq; commutat. Quarta aurigæ nomine appellatur: nam naturales uires iam excoctos humores bene regunt, atque in melius rectà ducunt. Huiusmodi profectio eorum qui humanam fabricam imaginationibus,

Iecur nulla peculiari eguisse formam.

Humani iecoris formam à canū & porcorum iecoribusuariare.

h fig. 18. et 22 præcipue.

i 7 muscul. tab. Δ.

k Id totum pete ex 18 figura.

l 12 fig. I, K cedit P, Q.

m 12 fi. N, N. 20 fi. G, G.

n 15 fi. P. 0 12 fi. h.

p 12 fi. inter N, N.

q 20 fi. H.

r 12 fi. & c. dit R. 20 fi.

E spectat F.

s 20 figura iuxta C.

t Inter H, H 2 figura.

u ad E 6 fig. & ad D 20 fig.

x 20 fi. quasi à D ad G.

y 20 fi. I.

z 2 figuræ ad G.

tionibus, non sectionibus, aut brutorum potius quàm hominum administrationibus discere conantur, nugæ figmenta^q sunt. Ac proinde exuto affectu omnes qui mihi unquam secanti astitere testor, me iecur in fibras aliquo pacto diuisum nunquam inspexisse. Neque est cur quispiam iecur duplici fibra constare astruat, propter^z scissionem seu foramen potius, quo uena ex umbilico proficiscens excipitur, aut ob eius iecoris^a portiunculam, sub ortu uenæ portæ extuberantem, fibris aliquot constare affirmet: si modò unquam uel per somnium animalia quibus iecur in fibras uti canis diuisum est, contemplatus fuerit, non autem hæc solùm læui negotio obseruabit, sed & animaduertet, quotquot hætenus uenæ cauæ exortum, & ad iecoris gibbum in duos truncos distributionē literis prodiderūt, ridiculè nugaciter^q admodum delirasse. De magnitudine uerò iecoris, quòd scilicet timidis gulosis^q maius obtigerit, & quòd iuxta proportionem homini, ut & cerebrum, inter reliqua animantia, grandius iecur datum sit, non præter rationem à quibusdam Anatomicis dictum est: quanquam nōnulli nostratium medicorum iisdem crapula absumi iecur, seriò adeo^q cōtentiose affirmant, ut rerum omnium imperiti, & uulgo & sibi ipsis persuadeant, insignibus illis uini gurgitibus iecur ad nucis duntaxat molem reduci consueuisse. Porro de iecoris substantia, uenis, arterijs, tunica, & ligamentis plerique rectè sentiunt. Per uniuersum enim iecoris corpus ad humiliorem eius sedem uenæ portæ^b propagines innumeræ diffunduntur, in superiorem uerò ipsius sedem uenæ cauæ^c soboles numerosè sparguntur: quas & ab earum ortu, initijs^q, aut ab ea parte qua caudices uenarum constituunt, describere integrum est. Orbiculatim nanque (uti in tertio libro complexus sum diligentius) ex omnibus extremis iecoris partibus infiniti uenarum furculi, capillorum modo tenues prodeunt, ex quibus alijs in elatiori uisceris parte, alijs in demissiori habentur. Inferiores furculi paulatim inter se in alios paulò crassiores colliguntur, & hi rursus in alios. Atq; ita deinceps sensim ac tantisper coeunt, donec tandem omnes in iecoris cauo in^d unam uenam congregiantur: non equidem ut quispiam dissectionū fidens professoribus putauerit, in cauæ sedis centro, sed in humiliori eius parte, qua dextro dorsi lateri iecur proximū est. Hinc prodiens uena eos quos sæpe recensui ramos in bilis uesiculam, uentriculū, omentum, lienem, & intestina digerit. Sic ramorū qui superiorem iecoris sedem occupant, tenuissimæ soboles in grandiores paulatim, & hæc rursus in maiores, ampliores^e ue tantisper colliguntur, donec omnes in^e duos maximos ramos coeant, qui in anteriorem uenæ cauæ sedem, quā hæc iecori in nascitur, pertinent. præter aliquot etiam^f graciles furculos eidem uenæ cauæ sedi insertos. Neque rursus hoc in gibbæ iecoris sedis medio sit, sed^g in posteriori ipsius sede, qua septo incumbit potius quàm adhæret, dum resupinatum hominem intelligimus.^h In dictorum ramorum medio aliquibus in locis tenues graciles^q admodum deducuntur furculi, qui caui sunt, & uenarum corpore donati, in unum quoque caudicem mutuò collecti desinunt, in bilis uesiculam (uti post dicemus) deducendum. Quin & in humiliori iecoris sede, uti portæ rami in suum caudicem coaceruantur, ⁱ exiles arteriæ in corpus iecoris excurrunt, ab ea diffusæ, quæ dextræ sedi inferioris membranæ omenti à magna arteria offertur. His omnibus uasis rubra mollis^q adnascitur substantia, nuper concreto sanguini quàm similima, nisi quòd durior, & potissimum in iecoris gibbo cernatur. Hanc Erasistratus, quod uasis his & propaginibus circumfundatur, *πρόγλυμα* nuncupauit. Præsens substantia iecoris uasa continet, & amplectendo suffulcit, totam propemodum iecoris molem constituens. quæ perquam tenui obuoluitur tunica, à ligamentis pronata, quibus iecur peritonæo, quā id septo subditum est, affirmatur. Sunt autem hæc duo præcipua: ^k unum quidem densum & insigniter ualidum, sed membranæ modo tenue, quod peritonæi pars inferiorem septi sedem succingens, paululum à latere dextro mucronatæ cartilaginis educit, rectā ex anterioribus in posteriora protensum.^l Alterum uerò, quā iecoris sinistra pars in acutum desinit angulum, à peritonæo nascitur. hîc enim fortissimo & quodammodo tereti ligamento iecur peritonæo alligatur. Dein^m quā cauæ uenæ caudex septum permeat, & dein secundum cauæ per iecoris posteriora deductum, peritonæum iecori adnascitur, ipsum^q peritonæum iecur colligat. Quinetiā cauæ iecoris sedi ubi portæ est principiū, omenti quo^q portio adnascitur. Præterea iecur anteriori peritonæi sedi (quod alijs animaduertendum fuerat Anatomicis) cōnectitur, beneficioⁿ uenæ ab umbilico in ipsum iecur pertinentis. Hæc enim foetu è matre excluso arefcit, ac instar ualidi efficit uinculi, ipsum, uti iam dixi, peritonæo colligātis. Porro ex his omnibus uinculis quibus iecur peritonæo adnectitur, tenuem suā & sibi peculiarē sortitur tunicam, in quam duo quo^q inseruntur nerui: ^o unus quidem à sexti paris cerebri neruorū ramis, elatiori orificio uentriculi implātatis: ^p alter uerò ab alijs Anatomicis ignoratus, à sexti eius cōiugij propaginibus discinditur,

Iecoris substantia.

Venarum series.

Bilis uesiculæ meatus in iecore.

Arteriæ.

Substantia uasis circumfusa.

Iecoris ligamenta ac ex illis pronascens tunica.

Nerui.

Iecoris officium, ipsiusque structurae ratio.

Lib. 4. de V. su partium.

Qui iecoris perficiatur sanguificatio.

Primum sanguificationis organum.

Venarum seriei ratio.

Bilis meatuum situs ratio.

Arteriae.

Nervorum.

Tunica.

ditur, quæ costarum exporriguntur radicibus. Hic in iecoris tunicam raris modicisque furculis dispergitur, priori in iecoris quoque substantiam pertinente. Et talis quidem visceris huius fabrica est. quod autem ad usum ipsius partium attinet, sic sese ordine habent singula. Iecori quicquid humidum succulentumque à ventriculo conficitur, uenæ portæ ramus ex ipso ventriculo & intestinis id depascentes, adferunt. Quod uero idem ramus priusquam iecori succulentum id porrigant, rudem aliquam sanguinis formam cremorem seu succulento illi conferant, & ut Gale nus attestatur, modo iecori similimo istud præparent, non facile concessero. Nam si uenis, non his solum, sed & omnibus cauæ uenæ propaginibus præter proprii nutrimenti alterationem, alia quæ toti subseruiret corpori alteratrix uis, quemadmodum ventriculo inesset, ea sanè non in rubrum, at in album quod à uenis amplecteretur, emutarent. siquidem alteratum in nutritione, alteratis colorem ut assumat, necessum est. Iecur itaque in omnes portæ ramos per substantiam ipsius digestos, quicquid humidum succulentumque ventriculus confecit, in se admittit, & substantiæ suæ ingenua uis alteratrice id emutans, sibi quàm similitimum reddens, sanguinem generat. Verum ut in omni concoctione, ita quoque in hac iecoris sanguificatione duplex sit recrementum. Alterum quidem tenuius, alterum uero crassius. At satius fuerit ad similitudinem actionis & conuenientem euentiam humido liquori iam quidem præcocto, & prius elaborato, indigenti tamen absolutiori adhuc concoctione succum assimilare, quem ex ventriculo & intestinis uenæ in iecoris cauum deducunt. Sit itaque uinum nuper ex uuis pressum, ac in dolia infusum, & quod ab infuso innatoque calore adhuc elaboretur, secernatur, concoquatur & ferueat, eiusque excrementorum quod quidem est graue & terrestre (fecem uocant) in fundum uasorum subsidat, alterum uero quod est leue & æereum supernatet, hoc autem flos uocatur tenuioribus uinis innatans copiosum, sicut crassioribus faex residet plurima. Ergo iuxta exempli huius similitudinem, succus à ventriculo & intestinis in iecoris uenas allatus, à temperie alteratriceque uis concoquitur, ac instar musti feruens ad sanguinis benigni generationem alteratur. In hac autem ebullitione, recrementum quantumcunque lutosum crassumque est, subsidet, & in lienem depellitur. Quod leue ac tenue est, spumæ modo sanguini innatat, & à bilis uesiculæ meatibus supra uenæ portæ ramos in iecoris substantia stratis affugitur. At humidum illud quod uelut uentriculi elaborationis aqueum existit recrementum, in iecur per uenas cum benigno ad sanguinis generationem succo assumptum, à sanguine nondum in iecoris cauo repurgatur, sed sui iam maximè præstans usum, nutrimenti uehiculum, ut Hippocrates ipsum uocabat, se esse eleganter ostendit. Sanguis enim in iecoris cauo confectus, exilibus è portæ uenæ furculis ad cauæ uenæ ramulos uersus iecoris gibbum procedit, ad cuius per angustissimos ductus transitum aquosus ille liquor uehiculari ritu plurimum auxiliatur. Caro igitur iecoris, quæ proprium ipsius est corpus, primum sanguificationis est organum. Venæ autem per uniuersum eius corpus dispersæ sinus loco censentur, in quibus quod ab illa confici debebat appositè continetur, & hi postmodum sanguinem præparatum, alijs partibus tanquam proprii iecoris riuuli perferunt. Est autem uenarum, quæ in iecoris substantiam digeruntur, tunica longè tenuior, quàm earum quæ per uniuersum corpus distribuuntur, ne scilicet uim substantiæ iecoris, cuius beneficio contentus in uenis succus elaboratur, sua crassitie retundant: quo fit, ut iecur etiam crassiori sanguine nutritur, quem tenuis uenarum tunica à iecoris facultate allectum transmittit. Porro ut sanguis diutius in iecore moram traheret, ac perfectam elaborationem experiretur, utque totus iecoris substantiæ appropinquaret, non unum uentrem illi uelut lagenam quandam rerum Opifex indidit, uerum uenas illas omnes infinita ramorum serie, & in arctissimos ductus digessit. Meatus autem bilis inter utrasque uenas locum obtinent, ut commodo ipsorum situ prius expurgatus sanguis in uenæ cauæ ramos absumeretur. Arteriam autem cauæ duntaxat iecoris sedi creditur exporrigi, ut huius tantummodo calorem euentilaret, temperaretque, superiore iecoris parte, quæ septum contingit, ab eodem motu adipisciente continuum. Ne uero iecur sensus plantæ modo expers esset, & à ui rationali concupiscibilis animæ pars minus moueri cohiberi que possit, Natura iecori neruos exprompsit, quibus ceu freno illa pro imperio uteretur. Tunica iecoris inuolucrum quoddam & tegumentum est: uincula uero, ne uiscus quum graue sit, aliquando decidat, plura, eademque ualida iecori committuntur.

q. fig. cap. 2. lib. 3.

HANC pulchre liberam ostendit decimatertia figura, iecoris uero cauo adhuc innoxam refert duodecima & uigesima.



ESICA bilis flauæ conceptaculum in caua iecoris parte sedem obtinet: iecori enim quæ dextrum uentriculi latus amplectitur, sinum in sculpi antea diximus, mediæ bilis uesiculæ portioni exquisitè cōgruentem. Illi namque sinui mediæ superior eius uesiculæ portio secundum ipsius longitudinem innascitur, inferior autem extra iecoris substantiam deorsum prominet, à nullo cui innititur corpore grauius pressa. Nam uacuo penè interstitio, ad dextrum uentriculi latus colonq; huc^a prorepens intestinum con-

Bilis uesiculæ
situs.

46 fig. P.

spicuo incumbit, & sedem qua commodè flauum tenuè que iecoris recrementum fuscipere; idemq; ad intestina depellere posset, opportunam adipiscitur. Forma huius uesiculæ oblonga rotundaq; est, sensim ad ipsius fundi usque apicem longioris cuiusdam pyri modo dilatescens:

Forma.

b 20 fig. ab I.

Quo enim à caua iecoris sede, ubi portæ^b caudex educitur, ipsiusq; uesiculæ ceruix consistit, hæc antrorsum magis fertur, eo illa sensim magis ac magis senæ folliculi instar ampliatur. Cum enim, ut reliqua corporis receptacula, capax esse debuerit, neque tum globi modo adamussim rotunda fieri potuerit, ipsius cauitas sua longitudine adaucta fuit, ita nullo à uentriculo affecta incommodo, ipsoq; iecore non nimis insinuato. Vt autem inanita bilis uesicula appositè sub-

Substantia.

dere, ac impleta uicissim extendi possit, membranea nerueaq; constituitur substantia: quippe simplici & unica peculiari constat tunica, tenui quidem, sed densa & forti, ac triplici fibrarum genere intertexta. & rectas quidem fibras intimas habet, quibus succedunt obliquæ, sed rectas multo pauciores, extimæ uerò orbiculares sunt trāsuersæ ue. Huic tunicæ alia à iecoris tunica obtenditur, non toti uesiculæ, sed illius duntaxat parti, quæ extra iecoris corpus propendet, solaq; propugnaculo & inuolucro indiguit. Vesicula etiam si iecori sanguificationis officinæ

Venæ arte-
riæ & nerui.

c 13 fig. et

figu. cap. 5

lib. 3 C.

b 18 fig. ca.

14 libri 7

n. n.

i 13 fig. ab c.

fi. ca. 12 lib.

3 f.

k 13 fig. ab f.

et 2 fig. ca.

2 li. 4 ab *

l 13 fig. b.

m 13 fig. a.

n 13 fig. c.

innascatur, à portæ uenæ tamen caudice, duas graciles admodum assumit uenulas, ea serie in ipsius tunicam diffusas, qua in adhærentemⁿ albam ue oculi tunicam uenulas digeri conspici mus. Ab arteria quoque cauo iecoris exporrectaⁱ ramus admodum gracilis uesiculæ illi offer- tur, ad ipsius usque fundi extremum excurrrens. Et neque^k neruulis destituitur, ne sensus sit ex- pers. nam iecoris neruus per humiliorem omēti membranam à dextra sexti neruorum cerebri

Meatus exci-
pienda & e,
mittenda bili
parati.

paris propagine costarum radicibus exporrecta, diductus, etiam huic uesiculæ furculum pro- mit, in macilentis uix minus quam ipsius arteria conspicuum. At meatus quibus uesicula bi- lem allicit, rursusq; aliò depellit, ita se habent. Ceruix uesiculæ, fundo ipsius multo durior pau- latim in angustum desinit meatum, ad eam iecoris partem protensum, unde uena portæ prin- cipium ducit. quò quum peruenit, in duos diducitur processus, hunc quidem sursum, il- lum autem deorsum porrigens. Qui sursum fertur, anteriori uenæ portæ sedi innitens, in ie- cur conscendit, & in duas primùm dissectus propagines, unam dextrorsum, alteram sinistror- sum in iecur porrigit. Hæ propagines singulæ in ipso iecore rursus in^o alios furculos, & hi in alios rursus tantisper digeruntur, donec innumeram ramorum constituent seriem, per ieco- ris corpus inter portæ uenæ ramos & cauæ propagines diffusam. Atque hi furculi, n sunt, quorum ope bilis in uesiculam defertur. At^p processus, dicti nuper uesiculæ meatus, qui deor- sum porrigitur, inferiori membrana omenti suffultus, parumper obliquè deorsum properat;

ac duodeno intestino non procul à ieiuni principio^q implantatur. Hic processus depulsam ex uesicula bilem in intestina defert, interim nihil ab illis neque cremoris, neque flatus, neque ipsius denique quam deduxit bilis regurgitantis, quippiam admittens. Quod non solum tor- tuosi in intestinum ingressus, sed & duarum membranularum beneficio fit, quæ utrinque ad orificij latus laxè propendent, influentis bilis ponderi facile cedentes, & ne quid in meatum re- gurgitare possit, iter præpedientes, quòd scilicet collectæ ac primùm meatus os subeuntes id occludant. Non autem una aliqua est membrana ori huic præfecta, uti unus in folliis asser;

aut simplex in pilis quas inflamus lingula uisitur. Præsentis meatus in intestina implantatio longiùs à uentriculi orificio inferiori, quam Anatomicorū uulgus existimat, remouetur. An uerò is intestino insertus simplex omnino sit, aut in progressu bipartitò scindatur, ita ut una parte intestina, altera uentriculi fundum adeat: hoc loco me dicturum animaduertis opinor, cùm hac de re in scholis indies & in libris medicorum plenissimè contendatur. alijs affirmanti- bus, hunc bilis uesiculæ meatum intestinis, frequentius tamen interdum uentriculi fundo in-

Bilis uesiculæ
meatus duode-
no insertus an
propaginem
uentriculo of-
ferat.

feri; alijs asserentibus, eum quandoq; bipartiri, atque altera portione in uentriculum, altera in

ti 3 intestina

r 15 fig. Q. di

stat ab H.

intestina tendere, alijs uerò semper hunc bifurcantibus, ac perpetuò alterum ramorum, nunc tamen ampliorem, nunc angustiore in uentriculum distribuentibus. Interea omnes quotquot sunt autoritatum congerie tantum, nò rerum ipsarum inspectione, sese tuètur. Equidem ut semel dicam, quid hîc mihi inter secandum contingere soleat, uerè affirmare possum, quod in uniuerso corpore neq; molestior, neq; difficilior mihiq; grauior sectio sit, quàm dum inferior omenti membrana, & caua iecoris regio, organaq; contermina nobis sunt aggredièda, maximè uerò in homine, aut animali quopiam præpingui. ad cò sanè ut quemuis artificem, licet industrium, facile hîc hallucinari existimem. Atq; hoc ideo dico, quòd certi nihil, sed id duntaxat quod mihi uidetur asserere statuerim. Nullam igitur uel minimam bilis uesiculæ meatus portionem in uentriculum porrigi animaduerti, præterquam in uno pontificis triremium remige. Hic enim, ut alijs quibusdam organis, & præcipuè circa thoracis costas & musculos, ab aliorum hominum fabrica uariabat: ita & meatum hunc in duas dissectum propagines obtinuit, quarum minor gracilior uè uentriculi fundo, quà primùm uena dextram inferioris ipsius sedis regionem ambiens, uentriculo committitur, inferebatur. Is quidem calidi sicciq; temperamenti fuisse uidebatur: ut autem resciscerem num uomitu bilioso, quem huiusmodi hominibus frequentem Galenus esse testatur, uexari consueuisset, ab eius familiaribus diligentissimè quæsiui, ecquid eiusmodi in illo obseruassent. Asserebant itaq; se nunquam illū uomentem, aut in maximis etiā procellis nauseabundū uidisse: uerū ut erat robustissimus, ab omnibus eum prædicari affirmabant, quod longissimo spiritu subinde cornu inflaret, omnesq; commilitones graui uoce, & uno spiritu recensendis numeris longè superaret. Verū non semper meatus huius de quo in præsentia agimus, portionem in uentriculum deduci, hinc mihi abunde persuadeo, quod inter dissecandum, hoc à conterminis uasis membranisque liberato, nullum foramen appareat, ex quo ad uentriculum propago eius meatus deducatur. quòd sese offerret, si modò uel minima quæpiam propago à præcipuo meatu diducta, per incuriam præscinderetur. Nam si uel acu meatum pertundas, ac bilis uesiculam digitis comprimas, bilis ex meatu defluit, quæ citius ex propaginis eius (si quam Natura condidisset) orificio promanaret. Ad stipulatur itidem ratio. nam si diligenter expendaris, eum meatum bilem intestinis offerentem non in quamcunq; siue uentriculi, siue intestinorum sedem decenter inferi potuisse, sed in quā & meatus ipse tutò implantandus, uentriculoq; & intestinis minus incōmodaturus biliosum istud recrementū expurgare posset, nò debuisse ad uentriculum ne meatulum quidem inferi, uel citra sectionem fatebere. Tutò enim ducuntur, quæ neque procul, neque alijs organis inconcomitata procedunt: quod huic meatui usu uenit, qui nulla succinctiori uia, aut in uentriculum, aut in aliam intestinorum partem inferi potuit, quàm ea qua nunc implantatur, & interim tutò portæ uenæ caudice & inferiori membrana omenti deorsum modicè prorepens suffulcitur. Quòd si uentriculo inferendus fuisset, non ad cò commodè atque nunc omenti mēbranis sustineretur, & obliquos anfractus faciens etiā longiùs abduceretur. Eodem modo, si biliosam hanc superfluitatem oblongo meatu ad sedem usque, ut in intestina primū illic defluens, unā cum fæcibus excerneretur, Natura perduxisset, periculum erat ne tenuis meatus quauis occasione ocyus rumperetur. Quòd autem materia hæc nutritioni inepta, duodeno intestino aptissima, non itidem uentriculi fundo innoxie immitti potuerit, primū ex bilis natura, dein ex uentriculi & intestinorum muneribus, postremū pituitæ, quæ in utrisque necessariò in illorum obeundis functionibus asseruatur, examine, & curatione quam huic exuberanti pituitæ adhibemus, discere licebit. Nam bilis flauæ naturam tenuem fluxilemque, & dein incidentem detergentemque ac expurgantem dum abundat nimium curationem adhiberi, medicorum præcipuis concessum est. Deinde cibum quousque concoctus sit retinendum, ocyssimè uerò cremorem confectum per gracilia intestina deducendum, nemo ambigit. Ventriculo itaque pituitæ istius incidendæ expurgandæque gratia bilem deferens meatus utilis fuisset: uerū quia ui retentrice uentriculo utendum maximè fuit, summo malo Natura nonnihil boni nequaquam prætulit. Nam si uentriculo bilis influeret, tum ille (uti Galenus rectè affirmat) huius mordacitate perpetuò ad excernendum irritaretur: neque tantisper dum cibus probè confectus esset, retentrice sua facultate fungeretur: & bilem illam respuens, eiusque occasione nauseabundus, quod sibi offerretur, minus quàm decet, ambiret amplectereturq;. At quo minus in intestina bilis influeret, nihil omnino obstitit. Hæc namque pituitam, quæ in gracilibus illis ductibus ex intestinorum munere coaceruatur plurima, incidit, detergit, atq; expurgat. dein intestina iritās & mordēs, ad fæces excernēdas inuitat, & stimulat, & ipsa quoq; unā cū excrementis nullā (quū lege Naturæ omnia in homine dispensantur) noxam, sed uti liquet summū usum præstās, è corpore tandem propel-

Ex bilis uesicula meatum in uentriculum non semper pertinere.

Vbi bilem expurgare conduxerit.

Bilis in intestina fluxus utilitas.

*s circa cet
K fig. 14.
C 15.*

propellitur. Merito igitur intestinis, non autem uentriculo, meatus ille bilem deferens implan-
tatur, neque obiter cuius intestinorum sedi, sed ferè duodeni termino, quod id primum in-
testinorum sit, quodq; in eo bilis citius suum quem intestinis præstat usum conferat. Duode-
ni autem terminus tantum à uentriculo remouetur, ut rarius bilem in uentriculum ex intesti-
nis sursum conscendere contingat. Quanquam & id biliosis naturis familiare sit, quoties his
ieiunus uenter paulo diutius (ut ipse quoq; nonnunquam experior) torquetur. At homines
qui bilis uesicula carerent, quos Aristoteles enarrat, et post hunc cum alijs permultis Plinius,
hos uita firmissimos esse affirmans, hætenus nondum comperi. Quanquam facile fieri posse
arbitrer, ut ex iecore ad intestina meatus aliquis bilem deferat, ita ut ea in uesiculam quam-
piam prius non colligatur. Et haud mediocriter inter disseccandum mirari solitus sum, quam-
obrem bilis recto ductu ex iecore in intestina non pellatur. non ignarus interim subtilis eius
Anatomicorum commenti, qui bilem in suam uesiculam afferuari docent, ut iecur à putredi-
ne uindict: non expendentes quàm innumeros bilis folliculos & cerebro, & lieni, & pulmonibus,
et plerisque alijs corporis partibus, ne ipsæ quoque putredinem contraherent, Naturam
adhibere oportuisset.

DE LIENE. CAPVT IX.

non a-

L I E N potissimum quatuor tabellis decimæ figuræ exprimitur. earum namq; prima lienis
cauum cum omenti portione illi connata exprimit, secunda cauum omento liberum, tertia lienis
gibbum, quarta eiusdem substantiæ ut cunq; proponit. Quanquam etiã lien in corpore adhuc ser-
uatus, in secunda figura ad characterē d, & in sexta ad G, & in uigesima ad O, O, P occurrat.
tertia

a 6 fi. G. 20
fi. O, O, P.



b 7 muscul.
tab. Δ.
c Specta fi-
guram 19.

d 19 fig. E.
e 19 fig. D.

f 19 figura
H, H

L I E N E M ad sinistram uentriculi sedem secundum inferiora magis ac po-
steriora^a locatum, iam antea recensuimus. Non enim is, ut medicorum
turba arbitratur, sanis alioquin hominibus extra costas, quasi ad abdo-
minis medium anterioraq; non adamussim costis, ceu tutissimis uallis se-
ptus, prominet, neq; etiam tactu admodum depræhendi potest: quamuis
medici illū an mollis, aut durus sit, in omnibus sese equè contingere per-
suasum habeāt. Innititur itaq; lien sinistræ parti^b septi transuersi, medius
ferè inter sinistram uertebrarum corporum sedem, & spuriarum costarum cartilagine^c. For-
mam adipiscitur sedi suæ proportionem respondentem, ac iecoris modo à uicinis partibus sibi
impressam. Quà enim septum contingit, ut id leuiter inibi cauum est, ita etiam lien leuiter gib-
bus cernitur. Quà uentriculus lieni quodammodo innititur, ut amplius ille & instar grandio-
ris globi hinc extuberat, sic quoq; lien humanus modicè ac in superficie duntaxat, cauus occur-
rit. Nam porcis canibus ac bubus, quum longior, sed arctior lien obtigerit, ac uentriculi gib-
bo longiori interuallo in ijs obtendatur, magis quoq; cauus magisq; quartæ circuli partis mo-
do uentriculum complectitur. Homo quidem crassum & magnum & latum, sed breuiorem
quàm illius generis animalia lienem exigit, non tamen exactè, ut quispiam forte à spleniorum
forma monitus arbitraretur, quadratum. Longitudo namq; latitudinem ipsius impen-
sat, deinde superior pars inferiori paulo elatior uisitur, ut linguæ ad incisorios dentes tantum
protensæ imagini proximè accedat, unde etiam lien linguosum uiscus appellatur.^d Humilior
enim ipsius pars ad corporis anteriora magis protensa, in obtusum definit angulum: superior
autem in obtusorem adhuc angulum adeo comprimitur, ut hæc pars utrinq; unum obtusum
exprimat angulum. Sinistrum latus leuiter gibbum est, dextrum uerò duabus quodammodo
leuib; impressionibus modicè sinum. Porro lienis non mediocris, & omni ex parte prope-
modum æqualis crassities, ab ipsius latitudine ac multo adhuc magis à longitudine uincitur,
Lienis cauū profundiori^e linea secundum eius longitudinem ducta abundat, quæ recta qui-
dem ducitur, & inæqualiter extuberans, sinuataq; lienis uasa (ut mox audies) admittit. At reli-
qua ipsius superficies nō ita ut iecoris, aut renū, leuis est, sed obscuris quibusdam et leuiter pro-
minentibus tuberibus, ad eam ferè formā qua elephantiasi morbo insigniter laborantium cutis
inæqualiter extumescere cōsueuit. Neq; illi solū inæquali cutis superficie respondet lien, ue-
rū etiam colorem quoq; illius affatim exprimit. Parisijs enim in diui Lazari monasterio, & in
plerisq; superioris Germaniæ agris, & alibi quoq; elephantiasi morbo affectos uidi, nigricantē
lienem humani colorē superficiemq; exactè referentes, nō secus quàm si quis ex liene eos confin-
xisset. In homine nāq; hoc uiscus atro quodam & perquam obscuro colore nigricat, in cane
autem splendidius plerūq; ipso iecore rubet. Sues albicantem magis lienem exigunt. Neque

Lienis situs.

Forma

Lienis super-
ficies ac color

Hominis uiscera ad ipsorum fabricam discenda haud inutiliter conueniunt.
Vasorum per lienis corpus series.

Lienis substantia.

Vnde lienis uena, arteria & nervi ducuntur.

Lienis tunica.

Ipsius nexus.

uerò in externa tantum superficie, uerum etiam intus, siue coctum siue crudum lienem secueris, hic color sese offert. Neque inutiliter hominis uiscera in aqua nonnunquam elixantur, aut saltem ut magis cōcrescat sanguis, in calidam submerguntur. Solet enim fluxilis adhuc sanguis in iecore, & liene, & pulmonibus etiam, quo minus aptè spectari singula queant, impedimento esse. Potissimum autem in liene tentandum hoc duxi, quòd de ipsius usu uehementer ambigerem, uenasque & arterias longè aliter quàm in iecore, pulmonibus & renibus dispersas intuerer, etenim lienis substantia crasso nigroque admodum, sed solidioris spongiæ, aut leuioris pumicis modo, raro concretoque sanguine constare mihi uidetur, frequentibus fibris filamentisque non insigniter ualidis duntaxat implicita. Per huius enim corpus, & si per multas uenas & arterias inferi certo cognoscamus, nullè tamen quemadmodum in iecoris & pulmonum corpore, per substantiam ipsius dispersæ animaduertuntur, nisi perquam rare, eademque admodum graciles, non aliter quàm si simulatque lienis sinum uasa ingrediuntur, in innumeramque ramorum sobolem diffunderentur, adeò tenuium, ut cavitare carentes fibræ potius quàm uasa nūcupandi essent. Hisce ramis seu fibris undecunque implexis, sæculentus crassusque admodum sanguis obducitur, quem Erasistratus, ut opinor (quod uasis circumfundatur) *παρεγχυμα*, quemadmodum & in iecore, appellat. Neque profectò tenuis sanguis quo lienem enutriridamus, raritatis substantiæ lienis sola causa esse uidetur, sed innumerus ille fibrarum (uix ausim enim arteriarum dicere, et uenarum) implexus. Talis mihi lienis in sanis hominibus apparuit substantia. In quodam laborante elephantiasi, quæ nondum penitus radices egerat, turgidiorē maioremque lienem reperimus: in reliquis autem, sano similem. In ciue Patauino, qui annis tribus carcere detentus, tandem nigro arquato defunctus, sectioni publicæ adhibitus fuit, lienem præter cætera minus crassum latumque & exiguum omnino reperimus, & gibba eius parte adipem adnatum, instar candidissimi durissimique lapidis concretum. Substantia uisceris huic erat arida, et impenso dura. Qui Montisselis suspensus, ad publicam sectionem Patauium aduectus fuit, adeò grandem ostendebat lienem, ut modicè admodum iecoris moliceaderet, & anteriori iecoris parti adnatus, anteriori quoque uentriculi sedi exporrigeretur. Lienis eius substantia, sanorum uisceris substantiæ penitus respondebat. Adolescens hic fuerat candidissima & glabra cute, minimeque natura melancholicus, adeò enim ob Diogenicos mores plebi gratus extiterat, ut ter laqueum euaserit. Nam primum Venetijs loris cæsus, Patauium uenit, ubi dextro oculo & manu itidè dextra mulctatus, Montisselis iterum apprehensus (nam è carceribus illic semel eruperat) extremū suæ tragœdiæ actum egit, & mori potissimum occasione à studiosis sectioni fuit adhibitus. Galli sacerdotis Bononiæ in xenodochio aqua subter cutem mortui, lienem albidum, sed exiguum adinueni. Hæc idcirco recenseo, ut huius uisceris substantia & usus (si modò de eo quem Galenus ipsi tribuit, dubitare fas sit) à studiosis sedulo indagaretur. Porro^h uenæ, arteriæque & nervi lienis in hunc habent modum.ⁱ Minor seu sinister uenæ portæ truncus, inferiori membrana omenti suffultus, transuersim ad lienem tendit, posteriori primum uentriculi sedi, eiusque elatiori orificio & humiliori membranæ omenti, adeoque ipsi colo, quæ uentriculo exporrigitur, ramos offerēs: quos ubi deprompsit, reliqua ipsius portio in duos primum ramos, deinde hi rursus in alios disseminantur, ut tandem multiplici serie per humiliorem omenti membranam medio cauæ lienis sedi secundum rectam lineam illi implantentur. Porro priusquam hiramini in lienis substantiam deperdantur, ab insigniori ramo uisceris humiliora petente^k uena pronascitur, sinistram fundi uentriculi sedem amplectēs. ab alijs uerò lienem adeuntibus ramis modò^l tres, modo etiam plures rami enascuntur, in sinistram uentriculi latus, uti sæpe prius relatum est, excurrentes, nequaquam autem ad superius usque uentriculi orificium conscendentes. Quemadmodum uerò lienem accedentes uenæ inferiore omenti membrana suffulciuntur, sic quoque ab illis uentriculum petentes superiori membrana omenti^m sustinentur, cuius ut & uasorum interuentu lien uentriculo connascitur.ⁿ Arteriæ itidem frequenti serie lienī implicitæ, ortum ab illa ducunt arteria, quæ à magna arteria supra renum regionem pronata, inferiori membranæ omenti innascitur, ac sinistrorsum lienī potissimum offertur, pari prorsus serie cum uenis in lienem pertinentibus.^o Nervi lienis à sexto neruorum cerebri paris sobole pendent, quæ sinistri lateris costarum exporrigitur radicibus, & furculum humiliori membranæ omenti mittit in lienis potius tunicā, quàm substantiam spargendum. Lien enim non minus quàm iecur tenui quadam & simplici obducitur tunica, ab omenti^p membranis, quæ lienis rectæ lineæ innascuntur, orta. Hæ namque membranæ lienis cauo insertæ, in ipsius degenerant tunicam. Et quia à peritonæo originem ducunt, earundem beneficio interuentuque peritonæū ipsum lienī tunicam offerre meritò dicimus. Sed præter lienis ad dorsum & ad uentriculum omenti auxilio nexum, à peritonæo quæ

8 fig. ca. 5 li.
34, 4, 4.

^h Ostendit harum seriem 4 fig. ut & 3, ac insuper 1 tab. fig. 19.
ⁱ fi. ca. 5 li.
^k F. diffundens primū K, L, M, N, S, diuiditur in T, T.
^l fi. cap. 5 li. 3 Z.
^m fi. ca. 5 li. 3 X, X, Y. et 15 fig. 8, 8.
ⁿ Ostendit id 3 fig. et 1 tab. fig. 19.
^o fi. cap. 13 lib. 3 A, d.
^p 2 fi. cap. 2 li. 4.
^q 19 fi. B, B, C, C.

q 20 fig. V
subijcitur
O, P, O.

Lienis usus ac
functio.

quā septum succingit, tenues interdum fibræ impari numero lienis gibbo adnectuntur, ipsi quoque septo lienem ita colligantes. Verum ut in hominibus huiusmodi fibræ quandoque non reperiuntur, ita in canibus nunquam. Est etiam aliquando cernere, lienis gibbum exteriori renis sinistri inuolucro, quod multa abundat adipe, fibrarum quarundam medio firmari, potissimum si reni lienem (ut non infrequenter fit) magna ex parte subternatur. Atque hæc est lienis situs, formæ, & partium enumeratio. Quam iuste uerò corporis nostri architectus illa dispensauerit, singulorum edocebit usus, & functio: de qua non medicorum modò procures, uerum & philosophorum præcipui dissenserunt. Erasistratus uulgi opinione (quod cursoribus lienem eximi stultè credit) persuasus, lienem frustra factum esse quodammodo attestatur, dum ait, Naturam timentem necubi artis suæ obliuisceretur, quum foetui uix dum cōcepto iecur in dextris conformaret, in sinistro quoque latere aliquid molitam esse, & consistentem in eo splenem iecori opposuisse: perinde ac si ipsa uentriculo paululum in sinistram producto, creationem superuacuum uitare non ualuisse. Aristoteles communem usum, quem omnibus tribuit uisceribus, lienem quoque primū ascribit, uidelicet quo uenæ, utpote pensiles, sustineri, & copia uiscerum stabili ad corpus possint: Quasi enim (inquit) anchoræ partibus appensæ, uiscera ad corpus iaciuntur. Deinde iecoris lienisq; usum priuatim docēs, subiungit: iecur & lienem ad ciborum concoctionem auxiliari, & lienem uapores uagantes diuertere, & ex uentriculo attrahere, eosq; posse concoquere, ut qui sanguineus sit, atque ut semel dicam, Aristoteles lienem adulterati iecoris loco recenset. Eodem modo autor libri de Respirationis usu, quem Galeno falso tribuunt, præter alia quædam de uenis, quæ gibbo lienis inferi arbitratur, nugamenta, lienem ex uentriculo & intestinis confectum cremorem per uenas uentriculi & intestinorum assumere, ac sanguificationis organum esse contendit. Huius sententiæ nonnulli etiam medicorum subscribunt, lienem iecore malè affecto nomine iecoris sanguinem elaborare affirmantes. At qui cæteris dissectionis professoribus probabilior esse uidetur lienis usus, in hoc illum à Natura fabricatum esse docet, ut lutosi sæculentiq; in iecore confecti sanguinis sit receptaculum: & quem admodum tenuiori leuiori q; recremento bilis uesicula reficitur, ita lienem crassiori & grauiori suscipiendo extructū esse, quod lien ad se per portæ uenæ truncū, multiplici sobole eum aduentem, tanquam familiare sibi alliciat exugatq; attractum autem conficiat, elaboret, ac suæ nutritioni aptum reddat, sanguinē illum, & si crassus sæculentusq; sit, rarum spongiosumq; efficiens. Ad quod præcipuè opitulantur frequentes in lienē insertæ arteriæ, suo calore ad exactam sanguinis illius elaborationem strenuè auxiliantes. Sed quod primarius præcipuusq; huius actionis autor, lienis sit caro, etiam si nō dicatur, manifestum esse neutiquam ambigo. Atq; ita etiam omnibus concessum est, lienem non uniuersum sanguinem quem à iecore admittit, suaq; insita ui allicit, conficere, ac in sui nutrimentum reponere: uerum quicquid nutritioni ineptum continet, suæq; substantiæ adaptari nequit, in uentriculum magni cuiusdam usus gratia reuomi. Primū enim omnes affirmant, succum melancholicum à liene in uentriculum eructari, alij quidem per uenam à liene in uentriculum pertinentem, alij per proprium quendam meatum, atq; inde à uentriculo in intestina, & hinc unā cum sæcibus è corpore expurgari. Porro uenā illam, aut ut alij arridet, meatum nonnulli simpliciter in uentriculum à liene duci scribunt: alij insertionis locum intrepidè exprimentes, illum in superius uentriculi orificium implantari adiungunt. Par etiam in eius excrementi usu assignando, inter dissectionis procures occurrit dissensio. nam alij per quā utile & amicum uentriculi functionibus hoc esse, sicut bilem flauam inimicum & hostem perniciosissimum astruunt. sed alij quidem contenti sunt, si doceant, atram hanc bilem sua saporis qualitate, quam acerbam & acidam esse fatentur, omnes uentriculi functiones, quæ in amplexu quodam consistunt, astringendo & colligendo corroborare, ac proinde ne in confectus à uentriculo cibus elabatur, prohibere. Alij autem huic tantum usui non acquiescentes, iam dictis utilitatibus addunt, uim uentriculi appetitricem hoc excremento adeo incitari, ut eius præcipuè usus gratia uenam aut porū à liene in superius uentriculi orificiū inferi statuunt: imaginatione solū, non sectionibus ita edocti. Ego sanè de hoc recrementum lienis in uentriculum eructatione, & eius usu nihil affirmare audeo: neque etiam sectio ista luculenter, quæ tamen citra ulla controuersiam Anatomes professores audacissime asserunt, mihi com-mo-nstrat. Primum enim nullum meatū illi quo bilis in intestina repurgatur, similem esse haud ambigo: uenæ autem quæ sinistro uentriculi lateri implantantur, non à lienis prodeunt corpore, sed ab illis quæ iam lienem inferuntur. Neque alia penitus harum uenarum per uentriculum series uisitur, quā reliquarum omnium corpus uentriculi petentium. dein nulla hinc prorsus est uena, coniuge carens arteria. Postremò, si quid in uentriculum à liene defertur, id potius uentriculi fundum petit, quā superius illius orificium. Vena namque sinistram fundi uentriculi sedem

Quid lien in
uentriculum e-
ructet, & quo
meatu.

r Videre id
est in figu.
ca. 5. li. 3. &
3 si. et 1 ta.
fig. 19.
si. ca. 5. lib.
3 Z.

dem perreptans, atq; ab ijs quæ humiliori lienis sedi inferuntur, principium ducens, omnium uenarum uentriculo ab illis quæ lienī exporriguntur oblatarū, facile maxima occurrit. Quamquam neque hæc uena, uti nec alia, prorsus finistram uentriculi adiens latus, ullo alio turgat sanguine, quàm reliquæ uentriculū implicantes ueng. At hac de re paulo prolixius in ea Epistola egi, quæ in laterali morbo nihil interesse docet, dextrine an finistri cubiti uenā seces: aut si quid intersit, dextram cubiti uenam potius quàm finistram aperiendam. Cæterum lienem suo calore innato, ac frequentibus qui illum intertexunt arteriis, uentriculi concoctionem fouere, iam antea proditum est. Quod autem uulgo lienem risus authorem esse dicimus, hinc fortassis sumptū esse conijcio, quod crassum, fæculentū, & lutosum sanguinem ad se lien alliciens, reliquum sanguinem agiliorem, ac ut ita dicam, hilariorem reddere, omnibus creditum est. Porro lienis beneficio cor refrigerari (quod Arabum præcipuis affirmatur) non autumo: neque enim is cor contingit, & si quod illi innatum esset frigus, lienis arteriæ id ad cor haud deducerent.

DE RENIBVS. CAPVT X.

RENES pingui ipsorum membrana indutos, ac characteribus T, V insignitos, uigesima commonstrat figura. uigesima autem secunda, & uigesima tertia, ac uigesima quinta figurae, eosdem ea membrana liberos proponunt. Vigesima uero prima renem tribus tabulis dissectum continet, ipsius harmoniam concinne spectandam offerens.



Renū numerus & situs.

REGANA bili flauæ & fæculento lutoſoq; sanguini expurgando ſacrata, ſermo præcedens iam pertractauit. Hic uero illis dedicabitur, quæ ſanguinem in cauam uenam ex iecore miſſum ſeroſa aqueaq; humiditate colant, quam cremoris ex inteſtinis in uenæ portæ ſurculos ſumendi, & elaborati ſanguinis ex iecoris cauo in gibbum eiſdem ducēdi, uehiculum, ex Diui Hippocratis ſentētia eſſe dicebamus. Hunc enim humorem poſtquam proprium opus expleuit, neq; ſanguis per plures atque ita anguſtos meatus ducendus eſt, non decet amplius in corpore omnem aſſeruari, uenis alienum onus futurū. Huius igitur uſus occasione^a renes, quod id recrementum & bilem ipſam & fæculentum ſanguinem copia ſuperet, bini ſunt facti, ſitum, formam, totamq; conſtructionem huic muneri conuenientem obtinentes. Quò ocyus enim humorem ſeroſum, quem urinā & lotium uocamus, ſanguini adimant, quàm fieri potuit proximè ambo iecori allocantur. Dexter enim^b ſuperiori ſua parte humillimam iecoris portionem^c contingit, in canibus ſinum quoque in iecore ſibi, ut altius collocaretur inſculptum, appoſitè conſcendens. Sinifter uero^d adeò altam ſedem occupat, ut & lienī aliqua ex parte ſubſternatur. Vterque uero iuxta uertebrarum corporum latera, humiliori^e ſepti ſedi incumbit, qua id decimæ & undecimæ & duodecimæ coſtis obducitur, ea potiſſimum parte, qua coſtæ in poſteriora impenſius obliquantur. Is enim coſtarum in poſteriora flexus, opportuna renibus ſedem offerre uiſitur, ut & tutò uallentur, & ne in anteriora uel minimum prominentes, cæterorum nutritionis organorum ſedem occupent. Quæ niſi reſpexiſſet Natura, unum ſemper, eundemq; maximum (ut interdum in habentibus uentrem impenſe prominulum, & uitiatum coſtarum ductum, moliri Naturam uidimus)^f ſuper uenæ cauæ & arteriæ magnæ corpora renem collocaret, breuiori ſuccinctiori^gque compendio ſeroſum ſanguinem attracturum. Non enim renes, ut alijs ſcribitur Anatomicis, lumborum^h muſculis, qui dorſi & femoris famulantur motibus, prorsus inſternuntur, & etiam non multo humilior quàm coſtæ ſunt, uelⁱ inſima ſui parte uerſus ilia descendunt, etiam ſi alter altero ſemper ſit elatior, neque ad amuſſim^j è directo mutuò opponantur. Quum enim lien demiffius quàm iecur ſcendat, uterque autem ren uenæ cauæ, quā ſub iecoris corpore ducitur, uicinus eſſe contendat, merito dextrum ſiniſtro elatiorem eſſe plerunque cernimus. quippe non rarò etiam ſiniſter dextro elatior obſeruatur, in ijs præcipue quibus lien minor & iecur maius obtingit: perinde ac ſi id dextrum renem deorſum deprimeret, ille autem ſiniſtrum altius aſcendere, ſibiq; ſubiici ſineret. Porro contrarium hunc ſitum renibus non tam loci, quo aptè locari poſſent, occasione, quàm ne è directo utriq; ſeroſum ſanguinem attrahant, ac alter in contrarium reuellens alterius munus prohibeat, accidiſſe conſtat. Neque etiam in renum ſitu Galeni ratio probāda eſt, qua dextrū ſiniſtro editiorē eſſe docet, ut ſecundū rectitudinē magis trahat, quū ea quæ dextro uenæ lateri aſſcribit, nō magis illi quàm ſiniſtro lateri propria ſint. Nemo enim ſanæ mentis ex iecore in uenæ cauæ latus dextrū plures uenas quàm in ſiniſtrū pertinere fatebitur, ſi ad amuſſim^k eius uenæ ſecundū iecoris poſteriora ductū contemplatus fuerit. Cæterum utcuq;

Lib. 5. de Vſu part.

a 20 fig. T. V. 25 Y. Z.

b 23 figura cha. 3. c 25 figu. X uicinum eſt L. aut 22 ſi. o ad c. d 20 fig. V ſub O. O. e 7 muſcul. tab. Δ.

f ſuper P. Q 25 fig.

g 7 muſcul. tab. t. u.

h 23 ſi. cha. 4.

l. 23 figura à
cha. 3 ad 4.
h. 23 figura
cha. 1.
l. 23 figura
cha. 2.
m. 23 figura
cha. 5.
n. 23 fi. cha.
6, 7, 8. qui
characteres
singuli ali-
quid priua-
tim indicat.

o. 22 fi. g. h.
p. 20 fi. a. b.
o. 22, 23 fi.
m. n.

q. 23 fi. cha.
7, 8.

r. 20 figu. e.
s. 20 figu. Y
ad T.

t. Hic ne in
notandoni-
mus sim, se-
riatim spe-
ctabis tabu-
las 21 fig.

ut cunque renes situ inter se discrepent, neuter tamen alterius altitudinem, quanta media est illo-
rum longitudo, superat unquam. Sunt enim humani renes oblongi, & minus lati, omni que
ex parte æqualiter crassi. Anteriùs nanque & posteriùs comprimuntur renes, & in latere
exteriori ad amussim orbiculares & gibbi: in interiori autē, quod exteriori breuius est, partim
gibbi, partim caui. In media enim interioris lateris sede sinū profundius sibi impressum exigūt,
superius inferius que uelut in acutū angulum desinentem, in medio autem extuberantē. Supe-
riori parte paulo quàm inferiori latiores sunt renes, & parū admodum exteriùs quàm interiùs
crassiores. Magnitudine ea donantur, qua probè quantum sanguini ex usu est, seroso humore
illum emundant. Superficiem iecoris gibbo similiter impense leuem & lubricam sortiuntur, ut
& colorem intense rubrum & resplendentem. Substantia nanque constant carnea, densa, ad-
modumque solida & dura, parumque à cordis substantia uariante, præterquam quod nullis om-
nino fibris intertextitur. Renum enim substantia fibrarum, ut & iecoris pulmonumque substan-
tia, expers est: uasorum per ipsam diffusorum fibris ad attractionem, retentionem & expulsio-
nem famulantibus. Quum enim sanguinis serum renes excolare oporteret, neque commodè ue-
næ cauæ magnæque arteriæ corporibus, uti iecur, ad uenam cauam adnasci potuerint, insignis
rami à uena ac arteria in ipsos deducti sunt. Ac à caua quidem duo grādes rami, utrinque nimi-
rum singuli, ad singulos renes enascuntur, qui non è directo inuicem prodeunt, sed pro renum
situ, origine uariant, dexterque ramus elatius sinistro principium possidet, si quidem ren dexter
altius collocetur. si uerò sinister superiorem dextro sedem sibi uendicet, sinister quoque ramus ela-
tius dextro à caua pronascitur. Ac par sanè arteriarum est ratio, quæ sub uenis protensæ unā
cum illis transuersim ad renum sinus, quos in interno ipsorum latere gerunt, perferun-
tur. Quum primum in hominibus ad illum alterius renis sinum uena ac arteria peruene-
rint, in duos ramos priusquam renem subeant, ambæ diuiduntur, unum ramum superio-
ri eius sinus angulo, alterum inferiori offerentes. In ipso autem uasorum ad renes progressu, ad-
modum rarò à se ramulos arteriæ diffundunt, sed totæ in renes absumuntur. quum interim à
sinistri renis uena, feminalis uena sinistram petens testem depromatur: ab ea autem quæ dex-
trum renem adit, ramus in pinguem membraneamque renis tunicam numerosa sobole spargi-
tur: quod & sinistra uena interdum imitatur, dum ren sinister elatiorem dextro sedem occu-
pat. Cuiusmodi uerò sit hæc pinguis renum tunica, paulo post exequar: nunc enim uasorum
ductus, ac per renis corpus distributionem unā cum renis sinibus, & meatuum urinam è reni-
bus in uesicam deducentium ortu, propter continuum de uasis sermonem perscribere aggre-
diar. atque utinam ita hæc tibi ob oculos ponere, quemadmodum si præfens essem, leuique admo-
dum opera in renis sectione commonstrare possem: maxime quum tot fabulæ de renum offi-
cijs, sinibus, membranis, & quæ in renibus distribuuntur uasis, antehac cæteris dissectionis
professoribus effectæ sint. Galenus inquit simpliciter, uenas ac arterias per renis corpus distri-
bui, & per spissam duramque renum substantiam, retento sanguine, urinam cum bilis quæ san-
guini adest portione transmitti, inque urinarium meatum effluere. Nostorum medicorum, &
qui Galenum sequuti sunt omnium, hæc exprimere studentium, alij perperam oscitanterque re-
nis fabricam aggredientes, & quæ hæc uasorum sit distributio & situs non obseruantes, nescio
quas colatorias membranas ementiuntur. Alij sectionem auersati, & in altis cathedris seden-
tes, sibi que ipsis mirifice placentes Promethei, abundè suo munere se perfunctos esse arbitran-
tur, si discipulis imaginatione hominem cōfingant. Atque hinc illud est, quod præcipuos nostræ
ætatis medicos & docuisse & scripsisse scio, nobis triplicem, quo urina à sanguine in renibus di-

Renis forma.


Magnitudo.

Substantia.

Vena ac arte-
ria renibus ob-
lata.Renum in in-
ternis sedibus
conformatio.

DE VASIS præsentibus figuris medicorum de urinae
excolatione commentum exprimere conatus sum, ac superiori
figura renem ab ipsius gibbo uersus sinum cauum uel dissectum
fixi, inferiori autem renis dumtaxat media spectatur portio.
Ceterum quid singulis indicetur, ipse characterum Index in
hunc modum docebit.

- A Vena & arteria serosum sanguinem reni offerentes.
B, B Sinus, in quem medici uenam & arteriam nuper dictas sero-
sum sanguinem profundere docent.
C, C Sinus, in quem urina ex iam dicto sinu colaretur.
D Renis substantia orbiculatim sinus hos amplectens.
E Beatum & nugacissimum renis colatorium, seu membrana cri-
bri modo peruiā, & urinam ex sinu B indicato in sinum C in-
signitum unā cum bile promanare sinens.
F Urinam è rene ad uesicam deferens meatus.



scernitur modum excogitari
posse: non addentes interim,
quid in ipsa hominis sectione
appareat, sed sibi sinus & du-
ctus suo arbitratu effingunt.
Adeò sanè ut nunc omnibus
recepta probataque sit opinio,
duos in renibus esse sinus, se-
cundū uisceris longitudinem
sitos, elatiore scilicet unum,
demissiore alterū, qui trans-
uersa quadam membrana in-
terdiuidantur, superior dico
fundere,

ab inferiori. In superiorem renis uenam arteriamque finire, easque serosum sanguinem in illum in-

fundere, deinde membranam sinus intercipientem, tam arctis angustisq; foraminulis peruiam esse, ut & aqueum illud ac tenue recrementum & bilem quoq; transmittat, sanguine interim propter sui crassitiem non penetrante. Addunt præterea illi humanæ fabricæ stupentes architecti, ut tanto scilicet elegantius Naturæ opus confingant, ex inferiori sinu meatum urinarium explantari, illumq; urinam iam colatam excipere. Profectò sagacissimus ille rerum Opifex tatum munus uni membranulæ cribri modo perforatæ non tribuerit, neq; in renibus eandem extruxerit. Quin renum substantia facultate sibi innata, ac propria ad iustitiâ temperiæ, ex uenis ac arterijs per ipsius corpus deductis, serosum illud recrementum excolat, ac in sinum qui urinario meatu excipitur, diffundit. Quod incredibile artificium ut uideas, caninum renem utpote macilentum, & nulla, quemadmodum humanus est, pinguedine oppletum, ad manum tibi esse uelim, illumq; uti renis administrationem ad præsentis libri calcem subiungam, te primum aggredi. Post aliquot enim obitas sectiones (dummodo prima non suffecerit) duos in renibus sinus adinuenies, secus multo ac nostri arbitrantur medici, à Natura formatos. " Vena enim & arte-

ria in renis corpus subeuntes, in unum degenerant corpus, arteriarum tunicis duritia crassitiq; respondens. Hoc cauum & uenæ arteriæ uero modo per renis corpus distributum cernitur. Primum enim paulatim latefcēs, in duas quodammodo partes diducitur: quarum unam quidem anteriorem, alteram uerò posteriorem (renum figuræ perpetuò memores) doctrinæ studio uocabimus. Anterior una serie unoq; ductu, modò sex, modò septem, modò plures etiam, æquè crassos producit ramos, in quos etiam anterior hæc membranei corporis pars finitur. Præsentibus rami per anteriorem renis partem æqualiter à se inuicem secundum renis formam abscedentes, uersus exterius renis latus properant, nō quidem ad externam usq; lateris eius superficiem, sed interius multo in renis corpore permanent. Hic in aliquot propagines rursus dissecti, corporis membranei posterioribus ramis, quos nunc prosequar, commiscuntur. Posterior enim corporis eius pars eodem modo quo & anterior in ramos digeritur, ad externū renis latus tendentes. Quum uerò hi eousq; quo anteriores deuenierint, mutuò posteriores rami cum anterioribus coeunt, ac singuli singulis, ac si unum idemq; corpus essent, uniuntur, mutuamq; cavitatem constituunt. Elegans iste ramorum coitus instar semicirculi ad exterioris renum lateris formam perficitur. Porro membraneum cauumq; istud cum suis ramis corpus non undecunq; renum adnatam habet substantiam. Corpori enim ipsi priusquam in ramos digeratur, antèrius posteriusq;, & ad internum ipsius latus, nō autem ad externum, renis substantia adnascitur. Ramis uerò anterioribus duntaxat antèrius, posterioribus uerò posterius renis substantia adnascitur, quousq; ad mutuū coitum rami ducantur. Hic enim ubi in plures ramos singuli diuiduntur, ac anteriores cum posterioribus coeunt, renis substantiam adnatam undiq; habent. quanquam inter ramos ipsos, quā nihil adnascitur ad renis interiora, uelut septum quoddam procedit, ramis non connatum, & ab illa renis substantia prodiens, quæ ramis dum coeunt cōnascitur. Adeò ut hic inter anteriores posterioresq; corporis illius membranei ramos alter quidam renis sinus exurgat, quodammodo bipartitus. Qua enim is exterius membranei corporis latus, ubi primum ramos germinat, respicit, unicus esse apparet: quum autem secundum septū ex renis substantia pronatu, uelut ad exteriora fertur, geminus conspicitur. Vna enim eius pars inter septum & ramos anteriores, altera inter idem septum & posteriores ramos porrigitur. Sinus hic inter disseccandum subhumidus exanguisq; omnino occurrit, corpus autem illud membraneum cum suis ramis omnibus, aut primus sinus (si ita corpus id appellare uisum sit) sanguine plenus semper inuenitur. Homines ut passim pinguetudine, quemadmodum & porci, scatent, secundum sinum quoque adipe duriusculo, & quasi seroso humore enutrito oppletum habent: qui non solum humanorum renum speculationem disseccantibus obscurauit, sed quibusdam accuratè sectionem aggredientibus ita imposuit, ut hunc adipem * urinarij meatus operculum quoddam esse, & urinæ in renibus excretioni seu colationi præfici, & quoddam uelut colatorium esse, scriptum reliquerint. Qui enim suis imaginationibus & somnijs non contenti, plenam operam unā cum ratione sectioni quoq; impenderunt, si nihil aliud, saltem meatus urinarij^y initium uiderunt, quod sanè ex altero renis sinu pendet, non quidem ex humiliori ipsius sede, sed ex interni lateris secundi istius sinus medio. Incipit enim meatus ille ab externo latere membranei corporis, ubi primum in ramos scinditur. deinde per eius corporis medium procedens, ex renum medio in internum renis latus uenæ cuiusdam instar procidit. Hæc mehercule demum renum conformatio est, quæ in membraneum illud corpus ipsiusq; ramos serosum sanguinem renis substantiæ ui, & fibrarum eius corporis rectorum beneficio attrahi commonstrat: quo sanguis quantum sufficit seroso illo humore ita liberetur, ut sanguinē à portæ uenæ surculis in cauæ soboles assumi transmittiq; nouimus. Quippe non uniuersum

Renum mu-
nus.

u Vti supe-
rius monui
sedulo hic
inspicias ta-
bulas 21 fi-
guræ.

x 22, 23 fig.
t, q.

y 21 fig. a.

renes

2 per t, q
in 1 figuræ
22, 23.
a 20 fig. T.
V. 22 o, p.

b 20 fig. Y.
c 20 fig. X.

d 2 fi. cap. 2
lib. 4, 7, 8.

renes alliciunt. Imò ut sanguis ad fluxum per uenarum cauitates aptior sit, eius humoris portio unà cum eo per reliquū adhuc corpus ducitur, quem extracto iamq̃ cōcreto sanguini innatare conspicimus. Quinetiam manifestum quoque euadit, renum substantiam à sanguine nō solum in uena caua, sed & in arteria magna contento, aqueum illum humorem, & si quid biliosi excrementi adhuc ipsi sit admixtum, colare, atq̃ in alterum illum sinum protrudere, eumq̃ inde per ^rurinarium meatum ad uesicam huic humori instar lagenæ subditam sensim defluere. Quæ uerò horum meatuum conformatio sit, ubi renum tunicarum explicationem præcedentibus addidero, statim audies. Renibus binæ sunt tunicae, ortu substantiaq̃ uariantes. ^a Prima, quæ exterior est, renum corpori pertinaciter non adnascitur, nihilominus ipsi instar inuolucris circumquaque obducitur, & hinc etiā renis fascia uulgò nuncupatur. Hæc à peritonæo humiliorē septi transuersi sedem succingente principium ducit. Quæ enim ipsi renes incumbunt, membranas quasdam fibras producit, in membranam tunicam, quæ renes ipsi colliget, degenerantes. Præsens tunica frequentibus uenis instar omenti intertextitur, multa pinguedine (ut & illud) abundans, renumq̃ actionem penicilli cuiusdam ritu fouens. Dextri quidem renis tunica à uena ad ipsum renem pertingente ^bpropaginem exigit, in membranam frequentī ramorum serie excurrentem. Sinistri autem renis tunica ^cuenam adipiscitur à sinistro uenæ cauæ latere, elatius quàm renis uena enatam: aliquando etiam contraria est in eiusmodi tunicas implantium uenarum exortus ratio. Porro altera renum tunica tenuior est, & nullis uenis neq̃ etiā pinguetudine obsita, & ut iecoris & lienis tunica renum substantiæ connata. Hanc procreat tertia renē petentis arteriæ tunica, & uenę item altera, nam dum hæc uasa reni implantantur, hæc tunicae ab eis abscedentes, in præsentis renis tunicā dilatantur. Cæterum renis ^dneruus, quem quasi præterieram, gracilis est, neq̃ uenæ, neq̃ arteriæ renis proportionē respondens. Illæ enim alterius usus quàm nutriendi calorisq̃ insiti recreandi gratia reni offeruntur, neruum autem sensum duntaxat obtusum præstare oportuit, ac proinde à sexti paris ramis qui costarū exporriguntur radicibus, Natura singulos ad utrumq̃ renem diffudit, in internam ipsorum tunicam potius quàm in corpus illos dispergens.

Renum tunica.

Reni nerui.

DE VESICA URINÆ RECEPTACULO, & meatibus urinam è renibus in uesicam deducuntibus. Cap. XI.

VIRILEM uesicam imprimis ostendunt uigesima secunda, & uigesima tertia figura, hanc simul cum urinarijs meatibus detectam prorsus exprimentes, uti & quarta figura Capituli quadragesimi noni, libri secundi. Superiorem uerò uesicæ fundi partem adhuc peritonæo nexam, proponit secunda figura, tertia, sexta, decima, duodecima, uigesima. Cæterum muliebrem uesicam pulchrè delineatam continet uigesima quarta, uigesima quinta, uigesima sexta, uti ex illarum figurarum Indicibus petere licet.

a 20 fig. p.
22, 23 r. &
24. T. 25 b.

b 1, 2 fig. ca.
49 li. 2 M.

c ult. figurarum
lib. 1 p.

d 24 fig. L,
25 fig. i, k, l.



ERINDE ac renes suis functionibus opportunam sedem sibi uendicant, tuto que locantur, ita quoque & uesica & urinarj meatus. ^a Vesica enim quum sit aqueæ superfluitatis receptaculum, in quo sensim à renibus id collatum (ne frequenter & perpetuò, sed raro & repente ac simul urina nobis reddenda sit) coaceruatur, eam sedem meritò obtinet, qua cōmodè dum urinae copia aut qualitate molestat, eam excernere possit: quem locum non decuit ab ^beo quo sicca excrementa emittuntur procul abesse. Deinde elatiorem tedē alia nutritionis organa, hac uesica longè nobiliora, altamq̃ sedem expetentia, sibi occuparunt, adeò ut iure quodā non minus uesica quàm intestinū rectum humiliorē locata sit. Ad posteriorem enim ^cpubis ossis sedem uesica reponitur, elatiori sui parte superiorem pubis ossis sedem modò plus, modò minus, prout urina distenditur, excedens. Est namq̃ oblongæ sphaeræ instar aliquantulum rotunda, & elatiori parte, quam fundum ipsius propriè uocamus, apparet amplior: id quod situs occasione accidit. Quanquam enim ut capacior iniurijsq̃ ferendis minus obnoxia redderetur, figura ad amussim globi modo rotunda, magis ipsi conuenisset, attamē oblongiorem suoq̃ fundo ampliorē Natura machinata est, non quod eiusmodi commoditatem negligeret, sed ne pubis os rectumq̃ intestinum posteriori uesicæ sedi in uiris, ut & ^duterus in mulieribus attensum, eius distensionem nimium arctarent. quod sanè necessario accidisset, si quam ex longitudine sortitur capacitas, etiam in latitudine inter pubis os & rectum intestinū adiecta fuisset. sed & fundum quoq̃ tanto est humiliore ipsius parte, quæ in cer-

Vesicæ situs.

Vesicæ forma.

*Vesica sub-
stantia.*

uicem angustum ue meatū definit, amplius, quanto cōmodius id pubis os excedēs propter ce-
dentes abdominis musculos distendi dilatariq̃ potest. Vesicā enim amplam & extendi prom-
ptam fieri oportuit, quo rarius, ut dictū est, urina nobis reddenda sit. ac proinde mēbraneo ner-
ueo ue constat corpore, quod dilatari possit cōmodē, & rursus quū nihil cōtinet, subsidere. Ete-
nim^e vesica læui, dura, ualida, mēbranea^e constat tunica, quæ modò crassior, modò tenuior ui-
situr, prout nimirū aut impensius distendit, aut arctatur: peculiariter hoc sibi uendicans, quod
in elatissima sui fundi parte, & qua in ceruicē definit, ob meatuū quorundā implantationes &
explatationes durior crassiorq̃ sit. Hanc triplici fibrarū genere intertextā, uel pueri nouere, un-
guibus dum uesicā inflant, ut prōptius distendatur, illam fricantes, ac eiusmodi fibras diuellen-
tes. Etenim nulla corporis tunica occurrit triplex hoc fibrarū genus exactius ostendēs, q̃ si ue-
sica inflatur: adeò ut ē uesicis, quas puer, uti nostratibus moris est, inflare, contundere, & ungui-
bus ac digitis terere solebā, quid sibi fibræ tunicarū uellent in Anatomicorū libris, ilico intel-
lerim. Cæterum uesicā implicantes fibræ eadem qua fibræ uētriculi & bilis uesiculæ colloca-
tur serie. Rectæ enim intīmæ sunt, extimæ transuersæ, mediæ uerò obliquæ, pro functionū or-
dine situs seriem adipiscētes. Expulsionem namq̃ præit retentio, & hanc rursus attractio. Du-
ram uerò & crassam uesicæ tunicam fieri oportuisse, præter cætera argumento sunt, quod in
magnam molem sæpe distendi eam oporteat, quodq̃ urinae acrimonia & ulceribus ac calculis
idq̃ generis malis alijs frequenter uexetur: quæ, nisi dura esset, eam facillè lacerarent, eroderent,
ac perforarent. Vt autem ualidiora adhuc efficiantur hæc, peritonæum illi densum robustumq̃
inuolucrum peculiariter circūdedit, quod secunda uesicæ tunica cēsetur. Hanc peritonæum
ipsi offert, quā supra pubis os uesicæ fundū anteriorq̃ ipsius sedes uniuersa peritonæo in ho-
minibus secus multo q̃ in canibus adnascitur. In canibus enim & alijs quadrupedibus procel-
sus tantū à peritonæo uesicæ offertur, neq̃ tota ipsius sedes anterior peritonæo ne laxè quidem
adnascit, sed ut & posterior uesicæ sedes leuis & lubrica cernit. In hominibus etiā sedes uesicæ
posterior rectū intestinū & uterū respiciēs, leuis & lubrica & aqueo humore oblita est. Cæterū
cū urina uesicæ (ut & biliosum recrementū suæ uesiculæ) ad nutritionē inepta sit, uenas, & qui-
bus ipsius calor refocillaret arterias Natura illi^s distribuit, ac primū utrinq̃ in ceruicis uesicæ la-
tera unā uenā & arteriā unā à caue uenę & arterię magnę ramis per pubis ossis foramē crus ac-
cedētibz deriuauit, quę hinc sursum per corporis uesicę longitudinē conscendētes, in tenuissi-
mos piliq̃ modo graciles furculos dissipant. Neq̃ neruis itidē, quibus ob tristantiū sensationē
maximè indiguit, uesica destituit. Quantūuis enim urina uesicæ ut bilis minori uesiculę tanq̃ fa-
miliare quippiā influat, neq̃ quū naturalis est ullā ab illa noxā patiat, ea tamē interdū tantū bilio-
si excrementi admixtū habet, mordaxq̃ & acris reddit adeò, ut nisi urinae qualitātē uesica perci-
peret, illā diutius continēs, grauiter plerunq̃ afficeret. Proinde inter cæteras corporis partes,
neruos nō minimos sensu tactus duntaxat gratia uesica obtinuit, eos à sexti paris ramis costa-
rum radicibus exporrectis, & ab^h infimis spinalis medullæ paribus exigēs. Præter hæc uasa &
neruos ex elatiore mediaq̃ fundi parte^l meatus exoritur, qui per umbilicū &^m intīmū foetus in-
uolucrū, quod à farciminis specie nomen inuenit, quū adhuc utero gerimur, urinam deducit.
Quinetiam uesicæ lateribusⁿ duæ attenduntur arteriæ, uitalem spiritum ex uteri arterijs foetui
deferentes, quæ in natis non minus q̃ meatus urinā deducens, exarescunt, inutilesq̃ redduntur,
nisi quod uesicæ ad peritonæum ligamentorum uicem abundē gerant, uesicamq̃ erectam con-
tineant. Porro in humiliorem uesicæ sedem præter suos neruos & uenas & arterias in cauita-
tem usq̃ ipsius, aliq̃ duo meatus inseruntur ex renibus urinam deducētes, ac iustissimè à Na-
tura formati. Quum enim renes quā proximè iecori necessariò allocentur, uesica autem hu-
mitem sedem sibi uendicet, meatus quosdam effingi oportuit, urinam ex renibus in uesicam de-
ducturos. Atq̃ hos uenarum corpori quā simillimos Natura efformauit. quippe simplici
constāt tunica, uenarū tunica paulo duriore, paucioribusq̃ q̃ illa fibris obliquis intertexta. ita
namq̃ meatus illi iniurijs ferendis redduntur aptiores, & tendi subsidereq̃ facillè possunt, & o-
bliquæ fibræ quo minus in uesicam urina ocys delabatur, nihil interim præpediunt. Verūm
quod his meatibus, quos Græci ab officio *ὀφειλόμενοι*, & *ὀφειλόμενοι*, & *πρότερον ὀφειλόμενοι* appellant, tanta cum
uenis sit similitudo, quod que illi secus quā uenæ sanguine turgentes, candicent, Celsō albæ
uenæ nuncupantur. ^p Explantantur uerò isti ex secundo renum sinu, eos per medium primi
sinus deducēte. Hinc peritonæo super^q lumborum musculos supertensi, securissimè deorsum
ad uesicam prorepunt. Adnascuntur enim in progressu peritonæo, & ab illo fibras quasdam
adepti, alteram assumunt tunicam, uenulis & arterijs ut peritonæum ipsum intertextam. Por-
rò ductus ipsorum quum itineris longitudo nihil commodi adferre hīc possit, quā minimè
anfractuosus est, ex renum enim sinu deorsum modicè uersus interiora, ut ad uesicam pertin-
gant,

*e Vesica dif-
secta habet
dextra figu-
ra figuræ
23, et fi. 26.*

*f 3 fi. O. 20
fig. p.*

*Vena et arte-
ria ac nerui
uesicæ.*

*g 22, 23 fig.
u. 25 figuræ.
h uli. figuræ
lib. 3. i.*

*Meatus foe-
tus urinā edu-
cens, et foetus
peculiares ar-
teriæ uesicæ
commisæ.*

*i 2 fi. ca. 2 li.
4^o, 1^o.
h 2 fi. ca. 12
lib. 4. char.
27, 28.
l 2 fi. M. ab
N. ad. E. 24.
fig. Y.*

*Meatum u-
rinæ renibus
in uesicam de-
ducētiū hu-
moris.*

*m 30 figura
M, M.
n 2 fi. K, L.
24 Z, O.
o 22, 23 fi. t.
q. 25 fi. 4, 6.*

*p 21 figuræ.
u. 2.*

*q 7 muscul.
tab. t. u.*

v. 2 fig. M.
s. 23 fi. r. 25
fi. non pro-
cul ab x. 27
fig. M.

13 figur. c
ad d.

u. 23 fig. d.
per o ad q.
25 fig. y. d.

x. 22, 23 fig.
p. 25 fig. 7.

y. 22, 23 fi. f.
z. 23 fig. u.
d. 25 fi. x. x.

b. 25 fi. A. 27
fig. L.
c. Pere hac
ex 1, 2 figu.
ca. 49 lib. 2
ad G, A, B.

d. 7 fig. cap.
49 fi. 2 N.
et eni. capi
ut figu. 1, 2
M.

e. 7 muscul.
tab. A.
f. 3 tab. O. 4
n. 5 A. 6 A.

gant, deducuntur. Ne uerò parum firmati, & omnino pensiles uesicæ infererentur, aut obliquū nimis ductū efficerent, nō elatissimæ parti uesicæ, ex qua^r meatus, urinā foetus extra umbilicū deferens pendet, implantātur, sed illi uesicæ sedī, quæ posteriori peritonæi regioni, ad quam meatus toto ductu securè adnascuntur, uicinior est. Est autem ea regio in posteriore uesicæ sede paulo anteaquam in ceruicem desinat, cui utriq; meatus primū adnascuntur, & obliquo anfractu uesicæ tunicam à peritonæo pronatam penetrantes, tandem in uesicæ cavitatem alteram quoq; tunicam penetrantes aperiuntur ingrediuntur^{ue}, modo sanè quā simillimo, quo bilis meatus in duodenum inferi relatum est: laxis nimirum membranulis utrinq; ad meatus foramen ex uesicæ corpore appendentibus, non aliter quā si uesicæ internæ tunicae tenues huiusmodi processus inibi adnascerentur. Horum usus, membraneorū processuum bilem deducendi meatui adnatorum usui respondet, ut scilicet urinæ quidem ex meatibus in uesicam defluenti cedant, & dum uesica distenta urinam rursus in eisdem meatibus regurgitare uolet, collecti illi meatumq; opplentes, urinæ transitum præpediant. Id quod adeò præstant commodè, ut uesica uel flatu plurimo repleta, nihil planè spiritus per hos meatus reddere queat. Verū quod & obliquus ille in meatuū insertione ductus, eidem usui famuletur, uesicæ dum inflantur, exactè cōmonstrant. Eadem in follibus indies experimur: nam per foramen quod à tergo illis adhiberi solet, aer quidem attrahitur, sed quum follis comprimitur, propter asserculum impetu aeris foramini appressum, nihil uenti exspirat. Idem quoq; in pilis obseruamus, quas flatu distendimus. Quanquā longè maiore industria, neq; ita pendulis operculis rerum Opifex in urinariorum meatuum implantatione utatur, q̃ nos ipsius artificium imitātes in follibus & pilis, aut etiam in admittendis quas postmodum egredi nolumus columbis molimur. Urinariorū itaq; meatuum implantatio ad inferiorem posterioremq; regionē uesicæ non procul ab ipsius ceruice consistit. Hic enim humillima uesicæ pars in angustum finitur^r meatus, quem ipsius ceruicem collum^{ue} nuncupamus: aliter in uiris quā in mulieribus protensum, & alijs quoq; in illis q̃ in his adnatum coagmentatumq; partibus, & usum deniq; ambobus diuersum præbentē. Commune est enim utrisq; huic ceruici seu meatui urinam ex uesica deferenti^r musculus orbiculatim circumduci, quo cauetur ne urina præter uoluntatem nostram effluat: cuius usum, situm, & formā in secūdo libro diffusè persequuti sumus. Deinde utrisq; & uiris & mulieribus per illum meatū urina excernitur, sed uiris ad seminis quoq; ei aculationē ille auxiliatur. Ea q; propter peculiariter hī glandosum illud corpus adnatū habent, semen deferentium uasorum^r insertionē suscipiens, quo corpore urinæ meatus humectante & irrigante mulieres destituūtur. Quinetiam mulieribus super uteri^r ceruicem meatus hic seu uesicæ ceruix fibris membraneis illi adnatus extenditur, ac ubi primū sub pubis osse cum uteri ceruice sursum inflecti ceperit, in illius cavitatem^r cessat. Uiris autem ultra^r porrigitur ac prominet. nam quamprimū humillimam pubis ossium commissuræ regionem superauit, penis corporibus subnatus ad elatiorem usq; pubis ossium commissuræ sedem sursum fertur, & hinc rursus prout rigidus flaccidus^{ue} est penis, sursum spectat aut propendet, nunc^r Græcorum, nunc^r S Latinorum elementū exprimes. At hæc opportuniū unā cum generationis organis pertractabuntur. Hactenus enim triplicia cibi organa utcunq; persequutus sum: prima quidem quæ concoquunt, & quæ alimentū utile propellunt ac transmittunt. Secunda autē quæ expurgant & deferūt, & suscipiunt recremēta. Tertia uerò, quæ excrementorū effluxui adhibentur. Atq; hæc in duplici erant differentia: alia enim intempestiuè effluere prohibent, ut orbicularis^r musculus uesicæ ceruici & podici adhibitus: alia autem tempestiuè excrementa propellunt, ut^r septum, & abdominis^r octo musculi.

Artificiosa
meatuū urinæ
deducentiū in-
sertio.

Vesica cer-
uix.

Quot nutritio-
nis organa ha-
ctenus comme-
morata sint.

NATURAM PROPAGANDÆ SPECIEI providisse. Caput XII.



IN præsentis libri initio nutritionis organorum necessitatem in humana fabrica adinuenientes, ex humani corporis primordijs, & qua id constat materia, hominem necessariò morti esse obnoxium colligebamus. Præterquam enim quod mixtum genitumq; sit corpus humanum, id ipsum immortale incorruptibileq; fieri nequaquam potuisse, arteriæ, uenæ, nerui, caro, & id genus partes reliquæ, è quibus conformatur, abundè commonstrant. Quando itaq; uel materiæ occasione hominem producere immortalem rerum Opifici negabatur, ipsi ad immortalitatem quod licuit auxilium machinatus est, instar boni ciuitatum conditoris, cui non præsens duntaxat cohabitatio cordi est, sed rationē quoq; prouidet, qua uel in æternū, uel ad quamplurimos annos ea duret. Sed ciuitas quidem quantumuis bene fortunata, quæ non unā cum seculis ætatibusq; quandoq; intercidat, nulla

x 2 uide.

Partiū gene-
rationi subser-
uientū brevis
enumeratio.

Utendi appe-
titus generati-
onis organo
adiectus.

hæc

uidetur unq̄ instituta fuisse. Prouidi uerò solertisq̄ rerum Opificis opera, quæ multis annorū millibus iam suffecerunt & perdurarūt, adhuc permanēt, mirabili quadam arte ab ipso inuēta, ut semper pro hominibus qui corrūpuntur noui succedant, perpetuaq̄ speciei conseruatio fiat. Homines namq̄ initio ita extruxit, ut unus quidem potissimū foetus principij rationē exporri- geret, alter autem id suscipiens foetū enutriet foueretq̄. Sic uiro organa, ^a testes scilicet ipsos in- didit, quæ præcipuum noui constituendi hominis principium efformarent, uasa illis adiungēs duplicia: ^b alia quidem materiā ex qua hi aptē semen cōficerent apportantia, ^c alia uerò iam confe- ctū in unū ^d meatū, qui opportunē id in ^e uterū proijciat, deducētia. Is enim mulieri dat, ut prin- cipiū hoc cōcipiat: deinde is quoq̄ ^f uasis cōseritur, quorū beneficio genitura temporis successu enutriatur, ac præcipuo Naturæ miraculo in nouum hominem prodeat. Interim & ^g testes ^h ua- saq̄ illorū functionibus seruientia uterus sibi uendicat, ut & mulier aliquā primarij principij ra- tionē foetui adijciat. Quinetiā his omnibus non hominū duntaxat, sed & cæterorū animalū ge- nerationi famulantibus organo meras cōmiscendorū corporū libidines, & peculiarē quandā delectationis uim ad generationē rerum Opifex copulauit, ipsi uerò animæ ea usuræ mirabilem quandam & indicibilē utendi appetitū quoq̄ elargiens. A quo usu animalia incitata & stimula- ta, etiā si stulta aut iuuenilia, aut ratione priuata prorsus fuerint, prouident tamē successione spe- ciei, haud secus q̄ si omnino essent prudentia. Quū enim Opifex haud ignoraret substantiā, ex qua instrumenta generationi subseruientia creauit, perfectam sapientiā neutiq̄ admittere illece- bram & uelut inelcationē, quam solam accipere poterāt, ad salutē conseruationemq̄ speciei ijs indidit, delectationē uehementissimā illarū partiū usui adijciens. Atq̄ hinc illa in Timæo Plato- nis de generationis amore à rerū Opifice nobis ingentia differentis est sententia: Quocirca pu- dendorū naturæ in uiris insita uis inobediens ac imperiosa, & quasi animal nō exaudiēs ratio- nem, furiosarū libidinū uiolentia, subiicere sibi cuncta conatur. Vulua quoq̄ & uterus in foemi- nis pari ratione animal auidū generandi, si intempestiuē diūq̄ à generando abstineat, ægrē fert morā, plurimumq̄ indignatur. Ut modò nihil dicā de amore, quo animalia suos prosequuntur foetus: & temperie à Natura mulieri priuatim cōcessa, ut nō solū utero adhuc cōtento foetui ali- mentū subministret, uerū natū quoq̄ suis mamillis tam sedulò & sollicitē enutriet. Quām uerò affabrē hasperinde ac reliqua generationi subministrantia organa extructa sint, iam paulatim auditurus es, quum cuiusq̄ organi situm, formam, substantiam, connexum, uasa, nervos, ortū, inuolucra, quibus integitur aut constat, ductus, actiones, usus, & eius generis reliqua, à uirorū organo statuens sermonis initium, prosequi pergam.

DE VIRO RVM ORGANIS GENERATIO- ni subseruientibus. Caput XIII.

PRÆSENTIA organa primū uigesima figura, mox uigesima secunda & ui- gesimatertia absolutissimē exprimuntur, quemadmodum earum Index manifestò edocuit.

Quæstiones
ac controuer-
sæ intracta-
tione de gene-
rationis orga-
nis obuiæ.



IRI semen primariū hominis effectiuū esse principij, medicis iuxta ac phi- losophis concessum est omnibus: mulierē uerò semen emittere, & effectiui principij partē præbere, Aristoteles & alij pleriq̄ inficiātur. Rursus nō mi- nus ambigitur, nunquid genitale semē duorū principiorū materialis et effe- ctui rationē subeat, ut cū Diuo Hippocrate et Polybo Galenus existimat: an effectiui tantū, ut Aristotelis est opinio, qui licet principij motionis mē- struo sanguini à semine inferri arbitrabatur, non tamē ex ipso, ueluti ex ma- teria, animal formari putabat. His præter alias de seminis materia, & ipsius ab animalis parti- bus sedibusq̄ decisione, ac uasorū seminaliū ductu, forma, ortu, numero, insertionē, præterea et acetabulorū in utero essentia, & sanguinis mēstrui natura, foetusq̄ enutritio, inter primarios medicos & philosophos innumeras atq̄ penitus ex diametro contrarias dissensiones, accedit, quæ testium sit conformatio, & nunquid semen illi, ut Galenus annuit, generent: num uerò tan- tum planarum, quæ Græcis λῆαι uocantur, quasq̄ textrices suis telis appendent, uicem ex Pe- ripateticorū sententia gerant. Ut interim præteream mille de foetus formatione, & quando masculus, quando foemina producat, de foetus ad parentes similitudine, ac signis, de optima animæ parte: num scilicet hæc calor semini innatus, alia ue substantia sit, aut alicunde missa, ac ali- quid prorsus incorporeū aut corporeū: & rursus si ita sit, num id cū homine, an prius cū omni- bus animis creet, unde id dimittatur, præterea mortale ne an immortale sit, eiusq̄ generis alias penē infinitas philosophorum medicorumq̄ differētias, & quæ cælum terræ miscēt nomina à uarijs usurpata autoribus, ac diuersis pugnantibusq̄ partibus diuersimodē imposita, & denuò ab

ab interpretibus miserè conuersa. Adeò sanè, ut ingentibus undequaq; opinionū dogmatumq; procellis fluctuans, uehementer ambigem, unde generationis in uiro organorū tractationē bono omine auspicer. Si enim meā cōmemoratorum dogmatū sententiā primū exposuero, præter hoc quod sanctissimæ religionis nostræ fides nōnulla sibi priuatim uendicat, & pleraq; meritò in dubiū uocari prohibet, hæc q; nostra ætas rerum capitibus potius q; proluxa enarratione oblectatur, qui de seminarijs instrumentis incideret sermo, illis nondum explicatis, obscuritatem nō leuem pararet. Rursus si postpositis aliorū controuersijs, organorū descriptionē aggrediar, pleraq; illorū placitis repugnantia occurrent: quæ si exactius cōprobare adnissus fuero, manca interceptaq; reddet oratio. At quum alicunde inchoandū sit, nuda organorū descriptio subiicietur: quam ubi ex dissectione uerā (qualem profectò descripturus sum) animaduertes, ilico in procinctu erit, quid de quamplurimis dogmatibus citra prolixam argumentorū confutationem sentiendum sit. In quibusdam autē quantumuis etiā sedulò Naturæ opera expendas, nihil quod tibi omni ex parte sanū uidebit, adinuenire poteris: nisi fortè in alicuius uerba secus atq; decet iurans, tuo sensui derogare lubeat, rationeq; prorsus careas. Atq; hīc adeò non iniuria miraberis; omnes qui huiusmodi tractationē aggressi sunt, subinde ignorata & neglecta organorū constructione, tot opinionū portēta inuexisse, omnesq; inter se quodāmodo dissentire, ac differētibus argumētis eosdē autores sua placita Andabatarū modo confirmasse. Quo autem ex his sententiarū fluctibus assequuta Anatome facilius euadas, generationis in uiro organorū fabricā ordine explicabo. Testium itaq; in uiris situs nulli nō cōspiciuus est, ut & binarius ipsorū numerus, unde *διδυμοι* & gemini appellātur: quamuis interdum unus tantū, & interdum tres simul reperiuntur. at id rariū q; nōnulli existimant, tertiū testem tuberculū præter Naturā ex meliceridum, aut steatomatum, aut atheoromatum numero in scorto reconditū enumerātes. Porro testium forma, substantia, tunica, & illorū functionibus subseruientia uasa, nō etiā in partibus singulis. Sunt igitur testes rotundi, sed paulo admodū oblongiores q; aut lati, aut profundi: dein humiliori parte nō nihil obtusiores amplioresq; q; superiori sede uiuantur. uerū & id admodū obscurè: etiā si testes ouorū nomē à plerisq; & præcipuè Arabibus inuenerint. In externa superficie nullū penitus sinū impressionem uel aut inæqualitatē obtinet. Substantia constant alba, lactea, molli, & sibi undecūq; simili ac cōtinua, nisi quòd uenulis frequētibus iisdemq; exiguis tenuissimisq; oppleta sit, ob idq; rara cauernosaq; quemadmodū lienis substantia esse uideat. Atq; id parū alijs animaduersum est dissectionis professoribus, meq; diu latuit, quòd inter disseccandum testē uehementius cōprimere soleā. Neq; uirorū testes ullum omnino sinū cavitatem uel exigūt, præter eā quæ secundariò ipsis eiusmodi uenularū gratia accedit. Vnde autē uenæ uascula uel, quæ testium substantię implicari dicebam, ortum ducant, sensim explicare contentam. Testes pluribus tunicis seu inuolucris integuntur: ac alijs quidem utriq; testi cōmunibus, alijs autē priuatim singulos testes inuoluentibus. Ambos enim testes unā cum ipsorū peculiari bus tunicis & seminarijs uasis, cutis ipsa & membrana, quā carnosam nō immeritò uocari diximus, perinde atq; uniuersum corpus, amplexant, & duo utrisq; testibus cōmunia statuūt inuolucra: cutis quidē unū, quod reliqua corporis cute tenuius est, et uelut futura quadā & rugis interstinguit, ac quibusdā scrotū, quibusdā uerò (qui se Latinius loqui existimāt) scortū, Græcis uerò *ὄρχος* dicitur. Alterū autē cōmune inuolucrū mēbrana carnosā efformat, hīc perinde ac cutis, longè q; in reliquo corpore tenuior, sed uenis frequētioribus intertexta. Præter hāc uerò tenuitatē cutis & mēbrana aliud peculiariter hīc, ut & in fronte ac pene sibi uendicāt, quādoquidem nullus inter ipsas interuenit adeps: nō aliter profectò q; si Natura uirorū testibus laxius tenuiusq; uoluisset à cute & ea mēbrana obduci inuolucrū, à uirorūq; testibus nō minus q; à cerebro omnē abesse pinguedinē. Nam & si membranarū quæ uenis arterijsq; frequentibus intertexunt circa testes adsit copia, nullus tamē, ut ferè in reliquo corpore esse solet, hīc cōspicitur adeps. Porro utrumq; testē priuatim inuoluentes tunica, amplitudine, conformatione, tenuitate inuicē admodū uariāt. Vna enim, quæ & exterior est, testē cū suis uasis ad eā usq; sedē, qua magnæ peritonæi amplitudini cōmittunt, induit, ualida quidē, sed tenuis, uenisq; abundās. Quā enim uenā arteriamq; seminales, ac dein uas semē à teste sursum ducens, ex peritonæi magna amplitudine in inguinū regionē ipsumq; scortū duci audies, illic peritonēū præsens educit inuolucrum, quod peritonæi pars processusq; meritò censeat, itaq; ab ipso peritonæo prodit, ut scortū à cute deduci pronasci q; cernimus. Hoc inuolucrū seu tunica exteriori superficie, qua hanc carnosā mēbrana cōtingit, fibris quibusdā mēbraneis illi cōnascit, adeò sanè frequētibus, ut interdū has aliā testium tunicā cōstituere arbitratus fuerim. uti etiā subinde in aquosis ramicibus accidere cōspicimus. Ab his nāq; mēbraneis fibris tunica interdū conflāt, quā inter secādū aqueo humore oppletā inuenimus. Ceterū quā dextri testis tunica sinistri testis cōtingit tunicā, ambę tunicę fi-

Testium situs ac numerus.

Testium forma.

Substantia.

Testium inuolucra, utrisq; testibus communia.

Priuate utriusq; testis inuolucra.

bris quoque mutuò cōmittuntur, ac ob id externā superficiē non admodū leuē habere uidentur, sed membranarū inuicē cōnatarū modo asperā ac fibrosā. Interior eius inuolucris superficies, quā testē ipsiusque uasa respicit, læuis & aqueo quodā humore obducta est, neque ulli penitus corpori cōnascitur, præterque quod elatiori sui parte, qua ex peritoneo procedit, illic peritoneo continuatur adnasciturque: quin & inferiori testis parti ualideⁿ applantatur, nō quidem testis corpori, sed humillimæ uasis semen à teste deferentis parti, quā id sursum secundū testis humiliora reuoluitur. Ad hæc, tenuissimæ membranæ interuentu præfens inuolucrum interna ipsius superficie uasorū membranæ adnascitur, quæ à peritonæo enata, uenæ quidē seminali alterā cōstituit tunicā, arteriæ autē tertiā. Atque is cōnexus nō orbiculatim ad uasa perficitur, sed secundum rectā duntaxat lineā, quæ ad posteriorem uasorū sedem ducitur. Hoc inuolucrum aliquid cum carnosa corporis mēbrana cōmune nanciscit. Vt enim hanc carnosam quibusdā fibrisⁱ aliqua sui parte augeri intertexti^q ac in musculi naturā degenerare dictū est, sic quoque hoc testis inuolucrum secundum totā ipsius longitudinē posteriori in sede, à peritonæo usque ad humillimā testis partē, carnosas fibras obtinet, & longi strictique cuiusdā musculi naturā refert, quem mēbranæ seu ipsi inuolucro innatum cernimus, nusque ab inuolucro abscedentem, sed unā cum illo à peritoneo incipientem, & etiā inferiori parti uasis à teste semen deferentis, simul cum inuolucro adnatū. Inuolucrum hoc præterque quod testem commodissimè integit, illumque suspensum continet, musculi etiam illius beneficio, quasi uoluntario motu testem sursum alligere sentitur. Porro & musculi huius occasione, quod scilicet ruber ut reliqua caro sit, id inuolucrum *ἐπὶ τοῦ σπέρματος* priuatim appellatum à Græcis arbitror. aut etiam ob uenarum gracilium quæ id adeunt frequentiam, quæ illi inuolucro etiam ruborem aliquē conciliat. Verum nō ignarus quosdā à uagina id Græcorum nomen deducere, nollem de nominibus quæ harum particularū innumera uariaque admodum (si modò alibi) occurrūt, uideri contentiosior. id enim mihi sat est, si uerè singula, uti inter discendum apparēt, descripsero, totius capitis ordinem ac nominū liberā impositionem lectori relinquēs. nihil enim in tractatione obstat, quodcumque primū libuerit prius et posterius hic perlegere, atque ex sententia singula nuncupare. Quod præcipue propter alterū priuatim testem amiciens^m inuolucrum addendum duxi. Quippe id præter testis corpus substantiamque nihil omnino amplectitur, testis figuræ ad amissim respondens, aut potius illam efformans. Quippe dura & crassa ac ualida admodum membrana est, testis substantiam utcumque mollem ac sequacem inuoluens. Atque is sanè præsentis inuolucris præcipuus usus censendus est. dein in hoc conducit, ut ipsius interuentu & medio, uasa testi cōmittenda ipsi adnascantur. Inuolucrum enim laxius, tenuius, molliusque inibi cernitur, quā uasa illi connascantur, quā per reliquam circumferentiam. Et elatiori quidem huius tunice parti uena ac arteria testi sanguinem spiritumque deferentesⁿ adnascuntur, ac quamplurimi ramuli eam tunicam hinc perforantes, in testis substantiam^o exporriguntur. Præter illos uerò, frequentes, sed perquam graciles surculi, deorsum in tunica illius corpus à uena arteriaque deriuantur, in tauris & arietibus instar uitis capreolorum elegantè deducti. In posteriori uerò sede tunica hæc per uniuersam ipsius longitudinem ualidissimè adnatos exigit omnes deferentis semen uasis^p anfractus testi obductos, inibi etiam undecunque tenuibus ac uisum fugientibus foraminibus pertusa. Cæterum per reliquam exteriorē ipsius superficiē, læuis & aqueo humore perfusa, nullique penitus parti cōnexa est. Interna uerò superficie, qua testis substantiam hæc tunica continet, undecunque illi substantiæ connascitur. Porro hanc tunicam seu inuolucrum à primis Anatomes professoribus, qui testem *σπέρματος* uocauere, *σπέρματος*, quasi supergeminalem dixeris, appellatum sat scio: quicquid alij de testis nugentur capite, qui quum inuolucrum hoc ignorarent, & apud ueteres Græcos *σπέρματος* legerent, præter elatiorem testis partem, Galeno testis caput procul dubio nuncupatam, aliam effinxerunt particulam, quæ parui testis instar, testi imposita, ipsius caput & *σπέρματος* uocaretur. Alij horum errore (quem & Græcorum interpretes mirificè auxerunt) elusi, sed in sectione interim diligentes, quum huiusmodi caput non reperirent, Arabes quosdam imitati, uas aliquod hoc nomine appellandum finxerunt, quod inter testem & uenam ac arteriam, quæ præsentī inuolucro primum adnascuntur, medium posuere, eam fortasse semē deferentis uasis particulā ita appellātes, quæ ipsius est principiū, & in posteriori testis sede elatiorem ipsius sedem orbiculatim aliqua ex parte cōplectitur. Sed quū ex relectione horū nugæ etiā leui opera obseruētur, postposita nominū cōtentione, hanc ex proprijs cuique testi tunicis alterā habeto, & *σπέρματος* ueteribus etiā Græcis appellatā scito, nūc uasorū ductui mentē alacriter accōmodans. Ad singulos enim testes singule pertingūt uenæ, ac itē arteriæ ortu differētes. Vena namque dextrū accedēs testē, à uenæ cauæ caudice demissiū quæ uenarū ad renes exporrectarū origines pendēt, principiū ducit: nō quidem à dextro caudicis latere, sed ex superiori anteriori uel ipsius sede

Testis musculus exteriori ipsius inuolucro innatus.

Intimū testis inuolucrum.

Vasorū testibus sanguinē ac spiritū deferentium numerus, mox ortus.

h 22 fi. x ap plantatur.

i 3 muscul. tab. A, r.

h 22 fig. r.

l 22 fi. x adnascitur.

m illo testis 22, 23 figurarū induitur, in uagina tamē ad Q à testis substantia modicè diuisum cernitur.

n 23 fig. N. o 23 figura B, V.

p 23 fi. x, b, l. et E, F, G.

q 22, 23 fig. x. et 23 fi. E.

r 22, 23 fig.

s 22, 23 fig. m, n.

t 22, 23 fi. u. sede ad dextrum modicè declinans, oblongo quasi & crassiusculo tubere exoritur, ac sensim
 u 20 fi. c. 23 obliquè uersus dextrum latus protensa, peritonæoq; suffulta deorsum fertur. Sinistri testis^u ue
 fi. x. na non à cauæ caudice principium mutuatur, at elatius multò quàm dextra enascens, ex ue
 na sinistro reni exporrectæ humiliori sede originem habet. Atque in hunc modum plerunque
 x 22 fig. y uenarum ortus cernitur. uerum quandoq; sed rarius, à sinistro cauæ caudicis latere^x ramulum
 fertur ad x. exporrigi conspicies, qui deorsum ad sinistra repens, sinistrae seminali uenæ commiscetur, ac
 y Spectatur cum illa coit. Galenus^y idem & dextræ seminali uenæ aliquando cōtigisse testatur, quod scili
 id fig. ca. 9 cet à dextri renis uena egrediens furculus, deorsum protenderetur, & uenæ commisceretur à
 li. tertij in- cauæ caudice principium exigenti. At nescio quid Prometheis in mentem uenerit, qui suis som
 ferta, ad C, nijs hominem in cathedra fingentes, dextram seminalem uenam à dextri renis uena, sinistram
 quod misce uerò ex cauæ caudice toties enasci docent, quoties sinister ren dextro elatiorem sedem occu
 tur u. pat: quasi uerò dextra uena non demissius multò, quàm renum uenæ, initium duceret: & quia
 plerunq; dextri renis uena nimis elata esset, testis dextri uena à cauæ caudice deriuaretur. Nos
 crebro eum renum obseruauimus situm, sed dextri testis uenæ aliud principium semel dunta
 xat, quamuis tunc utriusque lateris seminales uenæ à renum uenis principium ducebant. Por
 rò seminales uenæ, ad hunc modum deorsum protensæ peritonæo fibrosis nexibus qui in alte
 ram earum degenerant tunicam committuntur, coniuges arterias sortitæ. Vtræq; enim arteriæ
 humiliter quàm dextrum testem petentis uenæ principium consistit è directio, & sibi proximæ
 ex elatioris anterioris ue magnæ arteriæ sedis medio^z promuntur, ac dextra quidem cauæ ue
 næ caudicem (quod parum à Galeno animaduersum miror) conscendens, deorsum obliquè
 ad dextri testis uenam properat. Sinistra uerò sui lateris uenam accedens, non semel mihi defu
 isse uisa est, sinistri testis uena solito tunc longè ampliori. Ab arteria uerò sinistro reni commu
 nicata illam enasci, uix unquam occurrit: quanquā id interdum accidere posse, nō eo inficias,
 quod tamen crebrius par uenarum & arteriarum testes petentium (uti passim Galenus docet)
 obseruetur exortus, nequaquam cōcessero. Dextra uena & arteria (idem de lateris sinistri uasis
 subaudito) sese inuicem contingentes, peritonæo uti dicebā incumbunt, & ipsi fibrosis mem
 braneis ue nexibus alligatæ, decliuesq; in dextrum protensæ, super urinariū meatū ex dextro
 rene urinam uesicæ deferentē ducuntur, peritonæo in progressu^c tenues ac perquam graciles
 furculos diffundentes. Quum primum uerò uasa hæc ad pubis usque ossis sedem peruenerint,
 qua^d septimus femur mouentium musculus supra coxendicis os deorsum uersus minorem
 femoris processum fertur, illa peritonæum iuxta internum eius musculi latus^e permeant, & ex
 magna peritonæi amplitudine procidentia inⁱ exterius testi peculiariū inuolucrum quod hīc
 à peritonæo ducit principiū, pertingūt, unā cum neruulo ad testes usq; producto, qui interdū
 à lexti paris neruorū cerebri propagine costarū radicibus exporrecta^s diducit, interdū uerò
 à uigesimo primo spinalis medullæ neruorū pari. Porrò peritonæiⁱ foramen uasa cum neruo
 transmittens non ita patet, ac si quis ori pennam inderet, aut eadem chartā hanc pertunderet,
 sed peritonæum exactissimè uasorum lateribus, ipsarumq; tuniciæ, quam in progressu adhuc in
 magna ipsius cauitate uasis exporrigit, cōnascitur, tutò ipsa nō secus transmittēs, quàm septum
 & quibus id succingitur membranæ stomacho & uenæ cauæ^k uiam offerūt. Simulatq; uerò ua
 sa illud peritonæi foramen superarunt, ex dextro quodāmodo latere rursus obliquè deorsum
 in sinistra ad dextri testis elatiorem sedemⁱ ducuntur, arteria non amplius uenæ duntaxat, ut in
 reliquo processu, accumbit, fibrisq; membraneis tantum^m cōnectitur, sed uaria quadam pecu
 liariq; ratione uena cum arteriaⁿ coit, & ambæ inuicem cōmiscetur, corpusq; unum pyrami
 dis antèrius posteriusq; depressæ instar efformāt, cuius quidem conum uasa ubi primū inuicē
 permiscuntur efficiunt, basim uerò ea sede qua elatiori testis parti cōmittuntur. Per uniuersum
 hoc corpus ramorū myriades inuicē complexi obseruantur, non quidem omnes rectā deorsum
 procedētes, sed alij partim rectā, partim orbiculatim, partim trāuersim, alij alio modo inuicē
 implicari apparēt: impossibileq; est, unam ductus seriem unum uē ordinē inibi animaduertere.
 Neq; etiam, quod alijs traditum est refectionis professoribus, hīc expēdere ualeo, quo nam pa
 cto maiorē dextri lateris quàm sinistri uasorū implexum fieri nugentur, quū mihi hac ex parte
 uasorum nullum conspiciatur discrimen, & aliundē profectò quàm à maiori illo minori ue im
 plexu masculorum fceminarumq; pendet procreatio. Porrò quum tot ramorum in membra
 na illa quam peritonæū uasis inibi offert, quā illi fibrosis nexibus hærent, implexus fiant, cor
 pus id nidum crucis uidelicet aut lumbricis oppletum referre uidetur, aut etiam senioris rusti
 ci, aut baiuli suræ, temporum ue cutem uaricibus turgidam. Vtenim multifariam in illa uenæ
 inæqualiter extuberantes errabundo ductu feruntur, ita quoq; in hoc quod narramus corpo
 re, uenæ seminalis ac arteriæ innumeræ soboles oberrant. Perquam raro enim accidit, uarices

Ad testem
ductus.Vena cum ar
teria cōmixtio
& implexus.

capreolorum uitis imaginem exprimere, sed uti dicebam hic recta, illic transfuerim & oblique uarieq; admodum prominere. Atque ab hac similitudine reor parentes illos omni laude dignissimos, qui domi pueros ut lectione & scriptura, sic etiam in cadauerum confectionibus exercebāt, corpus hoc *λεγομένην ὡς ἀστέρην*, quasi uaricosum ad testes assistentē dices, appellasse. Quamquam Herophilus, Lycus, Marinus, & dissectionis procerū primarius Galenus, etiam id nomen^p alij parti, neque illi semper eidem, uti mox dicam, accommodent. Cæterum unicus mihi ex tot Galeni libris occurrit locus, ubi præsens corpus uariciformem plexum appellat, atque is est in nono de Partium usu, quo reticularē in caluaria plexum suis bobus delusus effingit. Vt cunque uero id corpus nuncupes,^q basi sua elatiori parti intimæ testis tunicæ, quam uerè primòq; *ἐνδεδυμένη* uocatam arbitror, adnascit, ac multos ramulos recta hanc tunicā perforantes elatiori quoque testis parti distribuit, multipliciter per testis substantiam perinde ac iecoris uenæ in ipsius substantiam disseminatos, & perquam tenui constantes tunica. Præter ramos, quos recta corpus id testis substantiæ offert, alias per ambitum dictæ nunc tunicæ frequētes, & uenis in oculi^r tunica adhærente sparsis, quàm similimas soboles diffundit, à quibus denuò germina in testis substantiā pertingunt. Hæc uenæ ac arteriæ seminaliū est series, quas siue ita, siue uasa testi sanguinē spiritumq; deferentia, aut præparantia nuncupes, nihil moror, modò hæc à iam recensendo^r uase prorsus distinguas. Ad externū enim uaricosi illius corporis latus quā testi applātatur,^r aliud corpus album & durioris nerui modò durum, intimæ testis tunicæ adnascitur, hincq; incipit. Hoc exterius quā testi nō cōmittitur gibbum, & quodāmodo teres est, nam latius nōnihil quàm crassum uisitur: qua uerò tunicæ illi connatū est, secundū conuexū testis id cauum^{*} existit. Secundū hoc corpus ab externo uaricosi corporis latere, ad ipsius posteriolem sedem fertur, & deorsum modicè uersus interiora prorepens, secundū posteriorem testis sedē intimæ testis tunicæ ualidissimè tantisper adnascitur, donec ad humiliorē testis^y descenderit sedem, à qua denuò sursum^z reflectitur intimæ testis tunicæ attensum, incumbensq; quidem, at nō amplius ipsi connatū, & nō eandem formam retinens. Per totum enim ductum, quo testis tunicæ corpus id necit, propemodū æqualiter crassum eiusdemq; figuræ est, quam compacto uitis, aut cucurbitæ capreolo assimilare queas. quanquā tamen nō in orbē, sed uelut in latera, huius corporis reuolutiones fiant, ad eum ferè modū quo angues & anguillas ocyus repere cernimus. Huius nanq; corporis anfractus & inuolutiones admodū inuicem cōtinuæ & connatæ cōspiciuntur, ut & lignorū uermibus eas assimilare integrum sit. Respōdent enim illis, & deinde etiā multum referunt cerebelli^a processus, quos in septimo libro à uermium imagine nomen inuenisse dicam. Atq; hinc etiā fortassis in Arabū interpretibus lumbricū nomen legitur: ita enim præsens corpus, quā testi connascitur, Arabū nōnulli uocauisse uidentur, nam eorum aliquis etiā^b implexum uenæ, arteriæq; supra sedem testis elatiorē, ita nuncupauere. Porro secundū hoc corpus quod uermi assimilabā, nihil prorsus uaricibus, qui inæqualiter neq; eadem serie extuberant, accedit. Quanquā si bene Galeni sententiam in libris de Semine percipiam, alibi has reuolutiones ex Herophili suffragio *λεγομένην ὡς ἀστέρην* appellari uelit: alibi autem eo nomine aliā eius quod iam tractamus corporis^c partem, quā id peni inseritur, ita uocet: quæ uerò ea sit, ubi corpus hoc, sermone ad penem usq; deduxero, audies. Ad hunc itaq; modū corpus id intimæ testis tunicæ cōnascitur, & exterius demptis reuolutionū impressionibus læue est, intus uerò quum ab intima testis tunica acutiori cultello adimitur, asperū, sed nullis quæ oculis subiiciuntur meatibus peruium est. Neque etiam aliter cauum esse uisitur, nō hīc solum quā testis tunicæ connascitur, sed neque quā ab illa abscedens sursum fertur. Quum primum nanque ad inferiorem testis partem descendit, recta^d sursum reflexum angustius, magisq; teres sensim efficitur, & non amplius inuolutum, in teretem quasi neruum desinit, atque id ipsi maxime euenit, ubi elatiorē testis partem sursum scandens superat. Quò quum pertigerit, anteriori eius^e corporis, quod nos uaricosum esse diximus, parti uersus interiora innititur, & ipsi tenuis membranulæ interuentu connexum, altius tantisper procedit, donec per idem peritonæi^f foramen, quod uenam ac arteriam seminales transeunt, in peritonæi amplitudinem pertingat. In quo transitu corpus id non amplius anteriori uenæ arteriæq; parti^g attenditur, sed in posteriora reflexum, sub illis in peritonæum transcendit.^h Hinc ex dextro latere (dextri enim testis enarrationem prosequor) ad posteriorem pubis ossis sedem reflectitur, & posteriori peritonæi parti connexum, superⁱ urinarium dextri lateris meatum sub^k uesica deducitur. Eodem parimino ratione à sinistro teste corpus simile perfertur, & ambo sub posteriori uesicæ sede super^l rectum intestinum ad uesicæ ceruicis initium protensa, sensim mutuò^m appropinquant, & latiora crassioraq; facta, inter se tandem cōeunt, unumq; corpus sub uesicæ ceruicis initio constituant, inⁿ glandulosa quæ nunc dicemus organa absumptū. Hoc fanè corpus à teste ad hunc

modum

Implexus uenæ ac arteriæ in testis substantiā, ipsiusq; proximum inuolucrum inferio.

Vasis semen à teste ad uesicæ ceruicē deferentis historia.

p 23 fig. mod. dō quidē n, θ, aut E, F, G, aut H, I. modò autem f.

q 22, 23 fig. 1. aut 23 fig. D. & O.

r Seriatim id pete ex 23 fig. P, Q, R, S & T.

s 18 fig. cap. 14. li. 7 n, n.

t dextræ figuræ fig. 23 n, θ, 1, 2, 3, f.

u 22, 23 fig. n ad 1. aut 23 fig. E ad D.

x 23 fig. H, I.

y 22, 23 fig. ab n ad 1. aut ab E ad F.

z 22, 23 fig. ab 1 ad n.

a 11 fig. lib. 7 C, c. et H, I.

b 23 fig. à C ad D. & ab N ad O.

c sinistra figuræ 23 in xia f.

d 22, 23 fig. ab 1 ad n.

e 22, 23 fig. 1. aut 23 fig. C, D.

f 22 fig. p, q. g ad 23 figuræ id spectatur.

h 23 figuræ à 1 ad f.

i 22, 23 fig. supra dextrum q.

k 22, 23 fig. sub v.

l 22 fig. *. m in sinistra figuræ 23 fig. ad f.

n 22, 23 fig. f.

modum ascendens, procul dubio id est quod Herophilus *σπέρματικὸν πόρου* appellauit, quodq̃ nos uas semen deferēs, ad illius imitationē, aliquādo & iactatorē dicimus. nam re uera corpus hoc à testis substantia semen assumens, ad penem id defert. Verū ut cauitas ipsius per uniuersum ductum perquam obscura est, raroq̃ admodum sectione deprehenditur: ita quoq̃ obscuriores

o 23 fig. H. ° meatus foraminaq̃ sunt, quæ à teste per intimā ipsius tunicā in eius corporis aut uasis semen

p 23 fig. u. deferentis reuolutiones pertinet. Præterea uasis huius in penem^p insertio conspectū quodammodo fugit, & coitus tantum aut excretionis seminis tempore aperitur. quod quidam Patauij dissectus facile edocuit, qui ante suspendium inuoluntario seminis fluxu laborans, hos meatus omnes apertos laxosq̃ habuit, eos potissimum qui ex testibus in deferentis semen uasis reuolutiones pertingunt, & quibus dextrū & sinistrū deferentia semen uasa in uesicæ ceruicem terminantur. Herophilus, & ex ipsius suffragio Galenus, ° hīc ubi dextrum uas sinistro permiscetur, amboq̃ paulò anteaquam coeant latiora crassioraq̃ reddi diximus, alijs quibusdā reuolutionibus hæc uasa circumagi inuoluiq̃ uidetur innuere, quū & in hac sede præsentia uasa subinde *ἡσπέρτω λισσοδόν* nomināt. Vasa hæc inibi nunquā nisi perq̃ obscure mihi inuolui uisa sunt: & si quæ sit reuolutio, ea penitus illi similis apparet, quam hæc uasa obtinent, ° quā primū ab intima testis tunica nō amplius illi tunicæ connata abscedūt. tale enim quid canes, & magis adhuc caudati simij & tauri indicant, parum cōspicuis reuolutionibus ea sede frequenter donati. Cæ

s 22, 23 fi. f. et fi. ca. 49 lib. 2 R. terum corpus ° glandosum, in quod deferētia semen uasa postquam coiere inseruntur, quodq̃ Herophilus *ἡσπέρτω λισσοδόν* appellat, ad humillimā uesicæ partem reponitur, mediū quodammodo inter uesicæ corpus & illius ceruicem. Est autem corpus id unicum, & subinde ipsis testibus grandius, at nō ad amissim rotundū, nam antierius & posterius depressum, à lateribus autem rotundum instar globi cernitur. per ipsius uerò mediū uesicæ ° canalis procedit, qui hic paulo quā in reliquo progressu latior, amplior ue existit: non tamen quod manifestē cōspici possit, à semen deferentibus uasis foratus, sed asper duntaxat ac inæqualis & rugosus: idq̃ potissimum in posteriori ipsius sede, ubi interdum deferentium uasorum ingressum accurato studio secantes, conspicuē deprehendimus. Deinde uesicæ ceruix, qua per glandosum corpus fertur, distincta ab illo corpore membrana neutiquā est. nam solus glandosi corporis sinus communem hic urinæ seminiq̃ meatum conficit, per reliquum autem processum canalis ille priuatum est corpus, ° orbiculari musculo statim à glandoso corpore circumdatum, & ° dein duobus quæ penem præcipuē constituunt corporibus adnatum. Quæ uerò hæc penis sint corpora, quum penis persequerbar musculos, obiter cōmemorauī. ubi autem singulorum quæ iam complexus sum usus succinctē ascripsero, rursus paulo diffusius ipsorū constructionem (quod ipsorum cognitio manuali artifice, propter crebros quibus homines uexantur morbos, nimis quā necessaria sit) recensebo. Quando itaq̃ hæcenus enumerata diligenti sectione aggressus

q in sinistra figura 23 fig. ad f. e in dextra figura 23 fi. à v per o ad p. u 22, 23 fi. p. x 1, 2 fi. ca. 49 lib. 2 G adnascitur A, B.

Partium quæ hoc Capite describuntur constructionis ratio.

Vasorū testis materiā deductium ortus ratio.

mas uel femina euadat. Rursus ut in iecore uenæ cauæ furculi ex portæ ramis sanguinem asumebant, atque in illis quoque is perfectius elaborabatur: sic etiam pori meatusq̃ innumeri, sed gracillimi, paratum à testibus semen in deferentis uasis anfractus testi connatos exporrigunt, ut hinc rursus ex utroque teste semen in eam sedem in uiris deducatur, qua commodè in uterum projici & eiaculari ualeat. Ad hanc functionem conducit, dextri testis uenam à ca-

uæ

Glandosum
corpus uasorū
semen deferentium
inferior
nem excipiens.

Partium quæ
hoc Capite de
scribuntur con
structionis
ratio.

Vasorū testis
materiā dedu
centium ortus
ratio.

uæ caudice sub renum uenis enasci, quo puriorem syncerioremque sanguinem testi offerat. Sic & utraque arterias à magna pariter oriri magnopere expedit, ut tenuioris, impetuque ruentis sanguinis & diuinam quæ semini inest animam, spiritumue infæcatum deducereut. Quippe neminem iam esse opinor, qui in arterijs sanguinem cum Erasistrato non contineri, & seminales arterias nihil præter spiritum testibus adferre autumet, quanquam etiam & hoc Aristotelis fuerit dogma, seminales arterias sanguine uacuas esse falso docentis. Cæterum à sinistro renis uena, eius lateris testem, ipsius uenam in hoc obtinere Galenus cum alijs Anatomicis omnibus attestatur, ut hæc serosum sanguinem semini communicaret, cuius acrimoniæ & mordicationis ui in seminis emissionem pruritus, titillatioque in organo multis nervis implicito, concitaretur. Eiusmodi enim hic delectatione Galenus fieri scribit, qualem ex falsis mordacibusque succis scabie laborantibus esse cognouimus, quando illi igne, aut lecti stragulis calefacti pruriunt, scalpendoque succis illis cutem stimulantibus locum dant. Hoc Galeni decretum, & si Anatomicorum uerear multitudinem, parum probabile duco, quum mingentes ex tanta serosi humoris copia pruritu non afficiantur, etiam si rigido excalefactoque pene crebro & præcipue ijs qui calculo uexantur, urinam reddi mouerimus. Quinetiam putridi seminis inuoluntario fluxu laborantes languido & flaccido pene pruritus etiam sentiunt, nulla præcedente penem excalefaciente causa. Ad hæc, qui ex ramicu uitio, aut alia occasione sinistro teste castrantur, coeuntes, neque pruritu, neque uoluptate afficerentur: quod falsum esse, indies ab his quibus ramex manu curatur, audimus. Quod uero alij halituosum seminis spiritum ad delectationis causam etiam concurrere testantur, non mihi satis arridet, quum ea pungendi stimulantique uis spiritui inesse nequeat. Vasis uero à teste semen deferentis ad testem applantatio, nisi tenuissimis & angustis^a foraminulis, idque intimæ testis tunicæ interuentu fit, quod uas id durum, ualidum, densum, iniurijsque ferendis pertinax fieri oportuerit, testis uero substantiam laxam, mollemque: adeo ut prudens Natura hæc, quemadmodum etiam nusquam, nulla essentis contraria in unum coegerit, nisi copulam aliquam amicitiae societatisque conciliatricem in medium conijciat. Quanto enim à uase semen deferente, b intima testis tunica densitate duritiaque uincitur, tanto ipsa testes superat, non quidem per uniuersam circumferentiam qua testibus obducitur, sed eo tantum loco, quo uasa seminaria habet adnata. hic enim quam per reliquum corpus mollior existit, & ut dixi, tenuibus foraminibus perforata. in hoc nanque potissimum creatur, ut testis substantiæ exquisitissimum sit inuolucrum. Vas autem deferens semen tot anfractibus, spirisque super testem obuoluitur, ut citius & copiosius à testibus semen assumat, & aliquam quoque elaborationem in ipso semen obtineat. Posteriori uero testis sedi, non autem anteriori uas illud conascitur, ut quum iam semen confectum porrigat, contineat ue, testis autem solum conficiat, tutiori loco uas reponatur, teste propugnaculi loco utens: atque eadem ratione quum uas peritonæum c ingreditur, sub uena & arteria merito occultatur, quod semen sanguine spirituque, ex quibus semen paratur, perfectius contineat. Dextrum uas cum sinistro coit, atque in uesicæ ceruicem ambo insinuantur, ut utriusque testis semen semel, eodemque tempore in uterum projiciatur. Glandulosum uero corpus (quod caudatæ simiæ obtinent maximum, & instar nubium exterius reuolutum) urinæ, seminisque in uesicæ ceruice meatum humectare certum est. Et deinde uelut meatuum quæ per ipsum à deferentibus uasis digeruntur, sicut & uenarum, & articularum, & neruorum uesicæ corpori & ceruici distributorum, fulcrum esse, & fortassis etiam semini quandam perfectionem indere, ad seminisque generationem conferre uidetur. Etenim in inuoluntario seminis fluxu laborante, quem Patauij dissecuimus, corpus hoc glandosum quum diuideretur, non minus quam testes ipsos, semine oppletum conspeximus: & si uerum fatendum est, inter dissecandum in nulla penitus corporis parte, tanta seminis uis usquam, atque in his glandulis adinuenitur, quantum uis illæ à testium substantia mollitie æqualitateque multum uariant. Cæterum de præsentī glandoso corpore Galeni demonstrationem ad calcem secundi de Semine positā admiror plurimum: qui quum hoc dissectionis imperitos ne prorsus quidem cognoscere, peritos uero uno ore omnes asserere semen illo contineri, dixisset, illorum opinionem improbaturus, hanc sæpius inculcatam ueramque & irrefutabilem ab ipso habitam demonstrationem subiecit. Si in glandulosis astitibus (ut interpretis uoce, *ἡσυχίας ἀδλωοειδής* ita uertentis, uoce utar) semen gigneretur (periti tamen, quibus glandulosum corpus cognitum fuit, contineri tantum dixerant) excretionem eius castrata animalia appeterent. at hanc non uidentur appetere: nullum igitur semen in his gigni perspicuum est. Profecto si Galeni libri de Demonstratione, eiusmodi crebris scatent demonstrationibus, quæ ipsi (si modò ausim proloqui) non infrequentes, ac potissimum in qua plurimum Galenus excelluit Anatome sunt, non est quod tantopere eos libros expetamus, illisque ipsos inuideamus apud quos à tineis & blattis nullum

Vasis semē de
ferentis stru-
ctura ratio.

a 23 fig. H.

b 23 figura
Q.R.

Glandosi cor-
poris uesicæ
collo adnati
usus.

c 23 fig. ad
sub d.

Galeni Ana-
tomica demon-
stratio, qua
glandosum cor-
pus semini pa-
rando non præ-
esse conficitur.

nullum sui usum præbentes, deuorandi asservantur. Præter hoc enim quod eiusmodi animalia subinde ut pueri incassum uenerem appetunt, quoniam passio quæcunque, etiam si tota seminis generandi uis glandosis corporibus inesset, testibus ademptis semen ea producent, quando resecti testes uasi ad glandosum corpus semen deferenti nihil exporrigent. Id enim ex sectione certo certius est, nullam omnino deferenti semen uasi cum uenis ac arterijs testium communionem esse, qua semen citra testium opus assumerent. etsi quid tale esset, quod aliquando mihi cum plurisque Anatomis professoribus persuasissimum fuit, ut scilicet uena & arteria in deferentis semen uasis naturam degeneraret, ex quo uena & arteria illud conformaretur, Galeni demonstratio duntaxat in illis animalibus locum haberet, in quibus industrius castrator testem illacis seminarijs uasis (quod factum est impossibile) ademisset. Quantumuis enim studueris deferentis semen uasis super testem circumactus, & spiras, gyrosque ab intima testis tunica rescindere, id non præstabis, quin uasis pars quæ testi adnascitur, aspera inæqualisque & rasa uideatur. Etsi forte in castrando animali huius experientiae studiosis intimam testis tunicam aliqua ex parte diuideres, & tunicam ad seminaria uasa adhuc connatam relinquens, solam testis substantiam ex tunica liberares, necessario adhuc pori meatusque seminalium uasorum disrumperentur, quæ certo per testis substantiam digeri nouimus. Hoc enim gratia expendendæ Aristotelis sententiæ, quæ testibus nullam seminis generandi uim tribuit, in cane expertus sum: qui bellè quidem conualuit, sed generationi, ut reliqui quibus testes eruti sunt, ineptus esse uidetur. nam hic, ut & illi quoque, obesus admodum & ingenerosior redditus est. Verum ut reliqua taceam, mirum est Galenum non animaduertisse, quum huiusmodi texeret demonstrationem, ab Aristotelis sectatoribus suam demonstrationem, ut testes ad seminis generationem nihil conducere persuaderent, in hunc modum retorquere posse: Si in testibus semen gigneretur, animalia quibus uasa seminaria quæ ex peritonæo elabuntur, uinculo ita essent intercepta, aut præsecta, ut testes in scorto adhuc relinquerentur, seminis excretionem appeterent. at hanc non uidentur appetere: nullum igitur semen in testibus gigni, est perspicuum. Sed ut glandosum corpus si semen generaret absiectis testibus suo munere, utpote deficiente materia, fungi nequiret: ita etiam testes suum non obirent munus, quum nullus sanguis & spiritus, ipsis iam præsectis uasis, deduci possit.

DE VIRILIS MEMBRI PENISVE

structura. Caput XIII.

PENIS fabricam imprimis ostendunt figuræ capitis quadragesimi noni, libri secundi ut & uigesima figura huius libri, & uigesima secunda, & uigesima tertia.



Quæ affabre Natura humanum penem exstruxerit, ipsius functiones abundè documēto suat. Quippe hæc quum satius fore duxisset, duos qui commodè generationi subseruirent homines procreare, huic quidem ad susceptionem, alteri potissimum ad seminis excretionem idoneas partes adaptauit. Viro igitur membrum semini in uterum fundendo aptissimum largitus est, quod concubitus tempore uarios ob usus tumidum, rigidum, & erectum prorsus esse oportuit. At si perpetuò tensum & prælongum quoque

Penis structura ratio.

seruaretur, per totam uitam præterquam congressus tempore, usui ineptum foret, ac promptè iniurijs non secus afficeretur, quàm si quis manum semper protensam circumferret. Quum itaque modò laxum, gracile & breue, modò uicissim tensum tumidumque fieri debuit, laudandus uenit rerum Opifex, qui membrum his usibus idoneum cōfinxerit. Penem enim potissimum è duobus corporibus nullam in uniuerso corpore partem (nisi fortè papillam) sibi similem nanciscens fabricauit, quæ spiritu repleta erigi, produci, & insigniter turgere possunt, & rursus eodem spiritu dissoluto arctari, concidere, flaccescere, breuioraque effici. Non enim aut uenæ, aut arteriæ, aut nerui existunt: quippe uti docebitur, ex ossibus originem ducunt. non tendines, quum musculorum non sint eneruationes. non ut canibus & mustelis ossa, aut cartilagine censeri queunt, quum laxata remissaque instar ligamenti facile inuoluantur, implicenturque. nec etiam hæc corpora ligamēta esse quis uerè asseret, quum sensu maximè participant, & forata, cauaque cernantur, & etiā uelut carnea molliaque in ipsorum medio (uti mox audies) euadant, sanguineque nigro secus multo ac ligamēta oppleantur. Quod uerò Galenus hæc corpora nunquam resecuerit, neque illorum naturam perspectam habuerit, ipsius in decimo quinto de Partium usu orationis series plus satis tibi argumento erit, si modò tauri aut arietis penem uirili cōtuleris, ac demum Galeni descriptionem illorum animalium peni propinquius, quàm hominis cōuenire animaduert

Potissima penis substantia.

Galeni humani penis fabricam nunquam spectasse.

teris.

41, 2, 3, 4 fi.
ca. 49 lib. 2
A, B. & huius libri 22,
23 fi. 1, 7.
b 2, 4 fi. ca.
49 libri 2
C, C.

c 3 fig. cap.
49 lib. 2
E, E.

*Penis situs
magis*

*Penis constru-
ctionem sub-
euntia.
Duo præci-
pua ipsius cor-
pora.*

*Meatus uri-
nae seminiq; co-
munis.*

Glans.

*Vena, arte-
ria & nervi.*

Cutis.

teris. quod tunc feceris ocyus, ubi uirilis membri fabricam subiunxero: cuius situm Galenus prolixissime & eleganter recenset, quod nimirum citra sectionem is illum non minus latuerit, quam hominis digiti, & ad inguina & poplitem inflexus, quibus locis duntaxat hominem à simia Galenus differre perspectu habuit. Atque ut situs in conspectu citra longiorem enarrationem est, ita quoque leui opera colligitur, quam is penis muneribus obeundis examussim quadret, neq; aptius aliquò reponi possit, ita sanè ut moles ipsius & conformatio nulli non pateant. Constructionem uerò ipsius subintrāt duo quæ illum præcipuè efformare docebimus corpora, meatus semini urinæq; communis quatuor muscoli ad penis radicem repositi, ac demum uenæ, arteriæ, nervi, cutis, & quæ huic substernitur carnosâ membrana, & uinculum cutem hanc cum carnea membrana peni connectens. Ex dextro itaque pubis osse, ^d ubi id crassius & quasi teres ad inferiorem commissuræ pubis ossa committentis sedem uisitur, ^e teres quoddam corpus ualidissime principiū ducit, ligamenti naturā prorsus referēs, quod ab osse nōnihil sursum recedens interio latere ^f aliud contingit corpus, similiter à sinistro pubis osse pronatum. Hæc corpora in eum modum inuicem cōmittuntur, ac si utrarumq; manuum indices internis partibus mutuò iungeres, unitosq; fingeres. Vt enim interna indicū sedes plana, nō autem gliba & teres, exterioris sedis modo est, ita etiam hæc corpora quæ inuicem connascuntur plana sunt, externis autem lateribus & superiori sede teretia inuicem iūctorum digitorum instar, qui simul commissi latius quàm profundius corpus ad penis modum efficiunt. Deinde ut inferior indicum, ita cōmissorum sedes modicè dehiscit, plana q; uisitur: sic & penis corporum inferior sedes dehiscit, ac ^g urinarium uesicæ meatum sub se ita porrectum exigit, ac si calamus quo scribitur, inferiori indicum sedi exporrigeres, & indices tibi penis corporum loco, calamus autem urinarij meatus uice essent. Mox enim à corporum exortu ipsis urinaris meatus seu uesicæ ceruix subtenditur, ac cum illis ad ^h glandis usque initium in eum modum porrigitur, ut corporum substantiam nusquam ingrediatur: uti in glandis sede, ubi meatum in corporum substantiam duci paulo post audies. Corpora hæc in hunc modum enata, simulq; cōmissa seorsum singula oblongum referunt corpus, ex neruea cōtextum substantia, instar coriaceæ fistulæ, cuius interior ⁱ substantia rubra prorsus, & nigricans, & fungosa, & atro sanguine oppleta cernitur, ad eum ferè modū, ac si ex innumeris arteriarū uenarumq; furculis quàm tenuissimis simulq; proximè implicatis retia quædā efformarētur, orbiculatim à neruea illa substantia tanq̃ in corio cōpræhensa. Atque hæc duo penis corpora ad glandem usque priuatim singula nerueum retinent inuolucrum, & fungosam hanc substantiā summa diligentia à naturæ operum studioso expendendam. Quum autem ad eam usque penis regionem perrepsere, in qua iam glandem efformatura sunt, in acutū feruntur, & carnosâ glandis substantia ipsis obnascitur, quæ meatum urinæ seminiq; communem nō subnatum duntaxat ut corpora illa exigit, uerū eum in se complectitur, meatumq; ambit, qui hic reliquo ipsius ductu ^k amplior efficitur: & rursus suo fine extremo ue arcatur, non secus quàm si Natura in cōcubitu seminis moram, ac proinde intensiorem pruritum in glande (quam affricus potissimum occasione adauxit) esse cupiuisset. Vnde etiam inuoluntario seminis fluxu laborātes, hac sede plurimum ulceribus infestantur, propter seminis in hac amplitudine asseruati acrimoniā, urinarium meatum impenſe exulcerantem: qui profluentis urinæ mordacitate, dum urina redditur, in glande insigniter infestatur, non minus sanè quàm rigido pene eiusdē meatus sedes inter anum & testes, ubi perinæum nobis uocatum habetur, cōsistens, grauiter eo malo affectis cruciatur: quod imprimis meatus obliquitatis ac reflexus, & deinde decliuus etiam sedis ratione accidit. Quum enim meatus hæc primum sub penis corporibus sursum reflectitur, hæc q; sedes humillima est, seminis copia à quo meatus exulceratur, non minus hic quàm in glande consistit, ac proinde magis quàm in reliqua meatus sede erodit, & deinde erosus meatus quando unā cum pene tenditur, solutionē unitatis uehementiūs inibi percipit. Porro ^l uenæ ac arteriæ ad horum penis corporū radicem accedentes, ab illis deriuantur, quæ humilioris illius diuisionis rami sunt, quam uasa os sacrum prætergressa tentare, in tertio libro prodidimus: & quanquam hæc uasa ad penis corpora pertingant, uix tamen sectione assequor, quo itinere in corporum illorum cavitatem inferantur, sanguinem illum nigricantē & crassum, quem fungosa corporū substantia plurimū possidet, deductura. Rami tamē ^m cuti hæc corpora induenti, etiā ante sectionem cōspicui offeruntur, illamq; intercurrunt. Nervi quoq; huc plures ab infimis sacri ossis paribus pertingunt, secundum corporum longitudinem diffusi: ac ⁿ duo tenues in humillima penis sede exporriguntur, unus utrinque ad meatus urinæ seminiq; communis latera. Quinetiam & alius subinde conspicuus est, superiori corporum sedi qua hæc inuicem connascuntur, ^o expansus. His neruis accedunt membranea uincula, superiorem corporū sedem, qua primum sursum ducuntur pubis ossium commissuræ

*d 1, 2, 3 fig.
ca. 29 li. 1. r.
e 2 fig. cap.
49 lib. 2 B
f de m illi
subditū C.
g euf. fig. A
h iū. jub.
d. tum C.*

*g 1, 2, 3 fig.
ca. 49 li. 2
G jub A, B.*

*h Figurariū
49 ca. lib.
2 D.*

*i 3 fig. cap.
49 li. 2 E,
E.*

k 23 fig. p.

*l 22, 23 fi. v.
e uleum
fi. li. 3 f.*

m 20 fig. r.

*n Ea sede u
bi u specia-
tur 22 figu.
o Inter c et
7 figu. 22.*

milluræ ad eam usq[ue] partem necessaria, qua primū peni orbiculatim cute obtegitur.^p Muscu-
 li quatuor penem ad eam, in secundo libro descripti sunt; dum duos meatui urinæ, seminisq[ue],
 & singulos singulis corporibus exporrigi recensuimus. Adeo ut nihil de penis fabrica modò
 dicendum super sit, nisi quis Naturam laudare uelit, quod nullum adipem^q inter carneam mem-
 branam & cutem peni obductas interiecerit, quo tenuius, & conuolui implicariq[ue] & extendi
 aptius inuolucrum peni adaptaretur. Si itaq[ue] humanū penem resecueris, non unum concavum
 reperiēs neruum, aut ligamentum à pubis ossē enatum, quemadmodum Galenus docuit, sed
 duo quæ descripti corpora: quæ nō uacua & sanguine indiga, ut Galenus boum pene delusus
 malè scribit, existunt, sed fungosa illa & ueluti carnea, uti Aristoteles rectè innuit, materia, &
 plurimo nigricante sanguine instar farciminum implētur. Deinde ad seminis urinæq[ue] meatum
 alijs non exporriguntur muscoli, quàm duo illi quos à recti intestini orbiculari musculo prona-
 sci ostendimus. At Arabes adhuc magis admiror, qui tres in pene finxere meatus, unū quidem
 urinæ dicatum, secundum semini, tertium autem illi uiscido humori, quem ab illo glanduloso
 corpore parari arbitramur, quod uesicæ ceruicis initio circumnascitur, quiq[ue] humectū penem
 subinde reddit uiro impensius cōcubitum appetēte, quū interim his omnibus unus extruatur
 meatus. Verum facile existimo hanc sententiā primū ab Arabe quopiā fuisse inuectā, qui pe-
 nis sectionem aggressus, eiusq[ue] fabricam Galeni placitis non conuenire animaduertens, tres ar-
 bitratus sit esse penis meatus, duo quæ dixi corpora, & meatum semini urinæq[ue], & dicto etiam
 nuper humori communem. Quandoquidem si transuersim penem resecas, neq[ue] nigricantem
 qui inter secundum promanat sanguinem abstergis, profecto singula corpora singuli meatus
 tibi apparēt, quibus tertius accedit qui uerè meatus est. At expresso absterfoq[ue] sanguine, fungo-
 sa corporum se offert substantia, leui negotio probans corpora illa meatus non esse. Vt cunq[ue]
 tamen sit, hīc Patauij adolescens iuris studiosus, ac è nobili Symionum apud Foroiulienfes fa-
 milia natus, mihi familiaris est, qui in glandis apice duos obtinet meatus, unum semini, alterum
 urinæ paratū. Verū quum quæ non nisi rarissimè accidunt, hīc nequaquam recensenda du-
 xerim, ea quæ præter naturam se habere comperi, nō lubens scribo. Quare etiam hermaphro-
 dytorum species, quas aliquot uidi, modò non recenseo, generationis non monstruosæ mulie-
 ris organa nunc persequuturus.

Lib. 15. de V.
su part.

Lib. 1. de Hi-
stor. cap. 13.

DE VTERO RELIQUISQVE MULIE-

bribus generationi famulantibus organis. Caput XV.

PRÆSENTIBVS organis ostendendis seriatim faciunt uigesimaquar-
 ta figura & uigesima quinta, duæq[ue] illas subsequentes, uti illarum Indices diffuse docuerunt.



N T E omnia uterum (nemox inter initia aliorum dissectionis professo-
 rum dogmatum turbis obruamur) in^a fundum & ^b ceruicem seu collum
 perinde ac uesicā meritò distinguimus: quandoquidē & si illis ambobus
 ceruice uidelicet & fundo uterus cōstituatur, unumq[ue] ex illis corpus con-
 surgat, ea tamen situ, forma, magnitudine, constructione, substantia, ua-
 sorum insertione, & exortibus, implantationibus, ligamētis, & id genus
 alijs, in uteri historia diligenter spectandis, admodum differunt. Ceruix
 igitur uteri à mulieris pudendo rectā sursum sub pubis^c ossibus, & secundū^d recti intestini
 ductum in peritonæi cavitatem tantisper ascendit, donec paulo demissiū quàm ē directo sedis
 pertingat, qua à pubis ossibus rectorum abdominis musculorum^e principia pendent. inibi
 enim ceruix in fundum uteri, aut fundus ipse in ceruicē definit, & rarissimè altius protenditur,
 ac proinde humilior fundi pars hīc habetur: superioris uerò ipsius partis, & laterum sedes pro
 magnitudine ipsius uariant. Quanto enim maior magisq[ue] distentus est uterus, tanto elatius ad
 umbilici regionē protenditur, atque ad ilia magis accedit. Adeo ut nullam peculiarē ipsi sedem
 circumscribere queam, nisi quod sub peritonæi anteriori parte elatius quàm pubis sunt ossa ple-
 runq[ue] conscendat. In nullis tamen omnino mulieribus utero non gerentibus, fundus sacri ossis
^g initium infimæ lumborum uertebrae coarticulatum superat, neq[ue] in illis fundus & ceruix po-
 steriori parte aliud præter rectum intestinū tangunt, uixq[ue] ipsius etiam uincunt amplitudinem,
 neque elatissima fundi pars tam altè atq[ue] recti intestini^h sedes, in coli anfractus ducta prorēpit.
 Anterior uteri pars uesicā habetⁱ prætensam, atque hac utero nō gerentibus uniuersus fundus
 obtegatur, uesica nimirum altius illo procedente. Nunquam enim in muliere uterum nō geren-
 te, hunc tam altè atq[ue] uesicam uel prorsus inanitam, conscendere animaduerti, nisi fortassis ute-
 rum manu apprehensum ipsius producta ceruice sursum traherem. Prout enim hanc in se laxa

Vterū in fun-
dum & cerui-
cem diuidi.

Vterū sitis,
partiumq[ue] uici-
narum conta-
ctus.

y tam

11. fig. 1.
49. lib. 2. H.
lib. 2.
12. fig. 1.
lib. 2. H.

13. fig. cap.
49. libri 2.
E, E, G

a 25. fi. i, k, l.
b 25. fi. x, x.
aut quic-
quid sub G,
K, K consi-
sit in 27. fi.

cult. fig. li.
1. g.
d 2. fig. m.
e 5. muscul.
ta. n. o mu-
sculi Δ.
f 24. fi. R, S
in L defi-
nunt.

g 1. ultima-
rum fig. li.
1. M.
h 8. fi. iuxta
T & Y.
i 24. fi. T su-
per L, et 25.
fi. 8. super i,
k, l.

tam sinis, aut uterò sursum tracto protendis, uteri situm plurimum uariabis. Si tamen ad aperto inter diffecandū peritonæo, uteri situm inquisueris, priusquam illum manu aut demissiùs, aut elatiùs moucas, conspiciere illum humiliùs multo quàm elatior uesicæ consistat pars, collocatum, & neuiquam ad sacri ossis initiū pertingere, itaq; positum, & ut mox dicā connexū, liberumq; ut sursum ac deorsum leui opera agi possit: quod in uiuentibus adhuc mulieribus indicatu est longè facillimū, si modo fundi uteri^k os inspicere conatus fueris. Nam leui quaq; occasione ad uteri ceruicis^l os, fundi os in quibusdā mulieribus, præcipuè autē ætate prouectioribus decidisse cernitur. subinde enim adeò deorsum procidit, ut uisum nō fugiat, ac mox in ceruicis ore reponatur. Alijs autem mulieribus altiùs reconditū prorsus latitat, quòd suis^m membranis uterus superius contineatur, illæq; non laxatæ hunc minus decubere sinant: secus quàm in illis quæ sæpius pepererūt, quibusq; uteri ligamēta laxiora euasere. Cuiusmodi uerò hæc uteri sint ligamenta, dicam postea, nunc reliquū de uteri situ sermonem absoluturus. Anterior itaq; uteri pars, uti dicebam, uesica obtegitur: hīc tamenⁿ humilima omenti parte in illis interueniēte, quibus id sursum uersus lienem non cōuolutum omnibus intestinis obducitur. Omenti enim moles longitudoq; tanta est, ut inter uterum uesicamq; facile implicari, atq; (quod Hippocrates de obesis dicebat mulieribus) uteri os ne aptè cōcipiant, leuiter comprimere possit. ° Anteriori autem uteri ceruicis parti, uesicæ quoq; fundum illic ubi uteri ceruix fundo ipsius est contermina, incumbit. per reliquā enim sedem quasi ad pudendū usq; collum uesicæ (quod breuissimū est) ipsi duntaxat exporrigitur. Verum quia uteri ceruix uesicæ collum lōgitudine ac latitudine plurimū superat, tota ceruicis uteri pars, uesica, ipsiusq; collo non operta, eam peritonæi sedem contingit, quæ internā pubis ossium regionē succingit. Porro ceruicis fundiq; uteri latera, uasa quæ uterum adeunt, & ^p membranas illum proximis partibus necientes spectant. Atq; ita uterus ferè in nō prægnantibus habet. In utero autē gerentibus super^q gracilia intestina sub omento & peritonæi anteriori parte ducitur, ilia quoq; quum partui uicinior est, impēsiusq; turget, insigniter opplens. Vnde etiam^r humilior fundi pars qua is in ceruicē desinit, his etiam altiùs quàm in nō prægnantibus ascendit, & uteri ceruix illis mulieribus sursum tracta, ac in longitudinem ducta, pressius quàm cæteris arcatur. Quinetiam uterus his non ad amussim (ut alias) mediā, quod ad dextrū & sinistrū attinet, sedem occupat, sed quasi apice elatiori in^s dextrū magis, aut sinistrū, quāuis interim modicè, uergit. Quod etsi plerunq; fortuū sexus ratione fiat, nō tamen perpetuū est. Nam mulieres dextram abdominis partem magis prominulam grauemq; habētes, foeminas peperisse cognoui: & etiā in sinistro latere facta tensione, masculos aliquādo progenitos. Cæterum^t canini uteri, ut & caprini & ^u uaccini, situs, quemadmodum etiam conformatio à muliebris uteri situ plurimum uariat. illis nanq; animalibus ceruix uteri ad elationem usq; uesicæ sedem protēditur, & uniuersum uteri fundum etiam non prægnantibus elatiùs quàm sacrum os locatur. Muliebris uteri formam uesicæ plerunq; ^x assimilamus, & potissimū prægnantium, quibus ad amussim propemodum uesicæ respondet: quippe illis uteri fundus, ut & uesicæ, amplius admodum magnusq; est: & ceruix, si hanc ad fundi contuleris amplitudinem, angusta. In nō prægnantibus autem ceruicis latitudinem fundi latitudo uix superat: & si ceruicem uel leuissimo conatu dilatare conaberis, iam eius latitudinem plurimum fundi latitudinem uincere spectabis, quū fundi substantia utcunq; protendenti haudquaquam sequax sit, ac proinde etiam iniqua uteri ad uesicam est comparatio. deinde uesica quod ad latitudinem attinet, exactè orbicularis est: uteri autem fundus non prægnantibus anteriori posterioriq; partibus (ut latior crassior ue euadat) comprimitur. Vesicæ etiam superior pars exacti globi instar paulò minus rotunda est. nam quā^y urinaris meatus urinam è foetu per umbilicum deducens ab ipsa pronascitur, uelut in acutum assurgit. Vterus autem^z hīc obtusus est, & quartam circuli partem etiam nonnihil erectam, aut nouilunij imaginem refert, non aliter quàm si superior fundi pars^a utrinque obtusum cōstitueret angulum: ut & Arabes insinuarunt, quum formam uteri quadratam dixerent. ^b Ab huius enim partis superioris lateribus, uteri fundus sensim, sed modicè interim, arctior redditus, deorsum ad ipsius ceruicis originē fertur: ita tamen, ut totus uterus nō multo fiat prolixior quàm latior, ceruice interim instar oblongi meatus longa & tereti.

^c Fundus uteri omni ex parte præterquam in lateribus, ubi uasorum membranarumq; sunt apertures, externa superficie læui & æquali & ueluti madente linteo absterfa subrubicātēq; constat. Ceruicis quoque exterior superficies in posteriori parte ab uteri fundo nonnihil ultra mediam ipsius longitudinem, & anteriori quoq; parte fundo propinquior, læuis & humecta, magis tamen quàm fundi superficies candicans conspicitur: per reliquam uerò externā sedem propter aliarum partium adnexus aspera, eorum quæ inuicem adnascuntur modo existit. At ^d interna fundi superficies non prægnantibus æqualis quoq; ac læuis, ut inanitarum uesicarum cavitatis

Vteri forma.

*Vteri super.
ficies cuiusmo
di.*

*Fundi uteri
sinus.*

k 27 fig. D.
l 25 fig. u.

m 24 fi. O.
P, Q, 27 E.
E.

n 2 fi. inferi
ora Q, Q.

o 25 fig. B, y
C & d insler
nūtur x, x.

p 24 fi. O.
P, Q, et 27
fig. 1. I.
q tota ferè
7 figura.
r 27 fig. G.
K, K.

s Vt 1 tabel
la figu. 30.

t 28 fig.
u 29 fig.

x 25 fi. con
fer & cum i,
k, l. aut 24.
fi. T cum L.

y 2 fig. Me
ducitur ab
N.

z 25 fi. ab i
ad k.

a 25 figur. i
C k.

b 25 fi. ab i
C k ad l.

c 26 fi. fun
dus læuis
est ad A, a
ffer ad E.
proximum
A.

d Spectatur
in 27 figu.

27 figura
C, D.

cauitas apparet. Sed harum sinus maioribus profundioribusq̃ rugis oppletur, illius autē pluribus quidem, at minus profundis, & uisum quodammodo propter continuitatē compressio- nemq̃ fugientibus, non aliter quā si exactissimē læuis foret. Attamen præter uesicarum caui- tatem humanus uterus, ut uirorū scortum, leuem & perquā modicē extuberantem futuram seu tenuissimæ lineæ instar prominēs tuberculum exigit, secundū uniuersæ superficiei longitu- dinem & antè & postè exporrectū, quasi quoddā sinistra à dextra superficiei intersti- tium, aut notula quædam censenda esset. Superficies hæc fundi uteri sinus est semen genitale suscipiens, foetumq̃ cōtinens, quem nō imperitum uulgus modo, uerum & Anatomicorum sæx non unum enumerāt, sed septenario numero eum complectētes, septem matricis cellulas recen- sent: ac tres quidem in dextra uteri sede masculis suscipiendis aptas enumerant, tres uerò in sini- stra fœminis dicatas: septimā autē in uteri medio statuūt, illam hermaphrodytis cōsecrantes. Hæc memini me admodū puerum prima dialectices rudimēta addiscentē, in Alberti illius Ma- gni indoctissimo, de uirorū mulierumq̃ secretis libro, ac in quodā Michaelē Scoto non minus sectionis eiusq̃ quam proficitur physiognomiæ indocto, quā barbaro legisse: & etiam apud Iureconsultos eiusmodi loculos describi, cum aliās sæpius, tum maximē ab utriusq̃ iuris cōsul- tissimo literatissimoq̃ uiro GVILIELMO MARTINO STELLA cognato meo, ut cæterarum disciplinarū, ita quoq̃ Naturæ operum mire studioso didici, quando prolixē de fœ- tus formatione, ac quo potissimū tempore perfectus is dici mereatur, & diuini Hippocratis nō stri suffragio partum septimestrem perfectum esse asserentis, colloqueremur. His accedit præ- ter Nicolum Gentilem, & alios plerosq̃ eius cohortis homines, Mondinus, Alberti, & reuera τὸ σκοτὸ illius meritissimus comes, quialijs ipsius de uteri formatione commentis, à placitis scholasticorum theologorum (quibus frequentior de genitalibus & semine quā medicis di- sputatio est, quosq̃ quum generationis organa in scholis ostendimus frequētissimos habemus spectatores) declinare ueritus, septem sinibus uterum distinctū esse adiecit. Quos quibusdam imaginatos fuisse, non sat uisum est, nisi rursus septem illos sinus scrobes ue, seu fossulas decem rugosos inflexus obtinere astruerēt, ut scrobiculi septē, ruge uerò septuaginta essent. Atq̃ hinc totidem fœtus simul concipi posse pleriq̃ autumant: parū per Iouem in hominū, multo etiā mi- nus in brutorū, quæ plures fœtus plerunq̃ simul utero gerunt, dissectione uersati. Vnica enim duntaxat in uteri fundo est cauitas, latior quidem & altior quā profundior, cuiusmodi etiam uteri fundi formā esse retulimus. ^f Cauitas hæc seu sinus, in humilima sede iuxta fundi foramen, pro illius foraminis amplitudine angustior est, deinde secundū uteri formā sursum dilatatus, in elatiori sua sede uelut in duos cessat angulos, ad elatioris uteri partis latera cōscendētes, quā uelut duos obtusiores efformare docuimus ^g angulos. ^h Media enim sedes elatioris sinus partis non tam altē atq̃ latera ipsius cōscendunt, uteri substantia deorsum hīc quasi septum aliquod, in suam amplitudinē spectante. Hunc sinum in non prægnātibus talem semper adinueni, ut plu- rimum uiscido quodā & subalbo mucō illitum, & læuem quidem, uti dicebā antea, & incon- spicua propemodum futura, seu extuberantiori lineā interstinctum. In angulis illis aut in supē- rioribus ipsius apicibus rugosiores, ac omnino illi ⁱ cauitati similem deprehendi, in quam defe- rentia semen uasa in uiris inseruntur. Nullus enim hīc in inuolutario seminis fluxu, seu albis, ut uocamus, menstruis non laborātibus, manifestus occurrit meatus: quemadmodū neq̃ in uiro aliquis conspicitur, nisi ex ^k uase semen deferente stylum acutiorē secundū uasis insertionem ui intrudamus, atq̃ secus quā secundū naturam habet meatū dilatemus. etiam si uaccis interim leui negotio stylus ex uteri amplitudine deferenti semen uasi indatur. Quinetiā non prægnan- tibus in sinum hunc nunquam arterias aut uenas prominere obseruauī, eorū capitulorū instar extuberantes, ex quibus sanguis ē uenis ad anum pertinentibus in hæmorrhoidum uitio efflu- xurus est. Nec sinus quoq̃ aliquos in nō prægnantis uteri sinu intuitus sum, illis similes quos in sepiarum & loliginum & loliorum promuscidibus cernimus: qui eiusmodi sinus sunt, ac si ceræ medias pisas impressisses, uti caprarum & uacarum Galeni ostendunt uteri, quemadmo- dum in Capite quod priuatim acetabulis dedicabitur, diffusius ostendā. Ad hæc, uenam aut ar- teriam quoq̃ non extuberantem, sed nullo penitus pacto uisui sese offerentem in hoc, ut neq̃ in ^l uentriculi aut intestinorū cauitates terminare, in non prægnantium mulierum uteris cōspexi: imò fundi sinus cōtinuo colore inter rubrum ac pallidum medio perfusus spectatur. Hæc qui- dem interne fundi superficiei sinus ue, cuius tractatio ad uteri formā spectat, est descriptio. ^m In- terna autē ceruicis uteri superficies magna ex parte uaria est, quū cōniuet enim, neq̃ aliās disten- ditur, undecunq̃ rugosa implicitaq̃ est, ac in se cōcidit: si uerò admodū distēditur, exactē læuis & lubrica secundū uniuersam ipsius longitudinē, præterquā ad eam partem, qua in puden- dum terminatur, apparere potest. Hic nanq̃ perpetuò præter laxos implexus ⁿ cuticulares illas

f Quasi A
B duce-
res ad G, et
dein ab A et
B sursum,
in 27 figu-
g 25 fig. l, k.
h 27 figura
F, F.

i 23 fig. o.

k 25 fig. u.

l 16 fig.

m 26 figur.

B, B.

n 25 fig. i.

Interna cerui-
cis superficiei
cuiusmodi

carunculas tuberculaq; non æqualiter omnibus mulieribus propendula adipiscit, quæ *υμφλῶ* Græci uocāt. Ad hæc, in anteriori ceruicis sede paulo supra pudendū, ubi uesicæ collū ipsi^o insertur, nō ad amissim æqualis est. Nā utrinq; ad insertionis latera, tenuis uteri ceruicis portūcula excrefcit, in ipsius amplitudinē propēdens, ac illis mēbraneis processibus forma perq; similis, quos urinæ in urinarios meatus ē uelica, & bilis ex duodeno in deferentē illā meatū, regressum prepedire inuimus. Haud secus quā si uteri ceruix urinā admitteret, penduli uerō processus urinā aut aliā materiā in uesicæ collū regurgitare prohiberēt. Præterea uteri ceruicis amplitudo toto ipsius ductu nō angustatur, & eiūsdē est amplitudinis¹ quā fundo cōtinuatur (si modō amplior distēdiq; aptior inibi nō sit) ac² quā in pudendū cessat. Verū in huius amplitudinis finē seu elatiore sedem, fundi³ orificium prominet, nusquā ceruicis latera suo mucrone cōtingens, neq; propter ceruicis cōtractionem aut distentionē mobile. Porrigitur enim ex humillima fundi sede in hanc ceruicis regionē, uteri substantia obtusioris in pene glandis modō, cui transuersa scissura seu foramen inest, quod uteri aut fundi ipsius os uocari solitū est: quemadmodū muliebri⁴ pudendum, ceruicis uteri os nuncupamus. Verum ut hoc nō distentū alioquin secundū corporis rectitudinē ductæ sectionis modō cōniuet, ita quoq; illud transuersa, at non perpetuō æquali. Prægnātibus enim rugosa est admodū, & perquā angusta, ut specillum nisi ualidius impulsū uix admittat. Quæ nuper pepererūt, ampliorem hanc scissionē, minusq; cōtractam rugosam ue possident: nō prægnātes autem, medio habent modo. Quod uerō, quoties fundi orificiū distenditur ac dehiscit, ut & ceruicis orificiū, orbiculare fiat, manifestū esse, etiamsi nō dicatur, arbitror. Aperitur autē in coitu nō semper quidem, sed quū uirile semen appetēs, id naturali motu sugendo allicit, & quando uterus non concepturus, uirile semen unā cum muliebri semine iterū eructat, aut in pollutione, uel affricū muliebri duntaxat semen excernit. Nequaquā enim distenta uteri ceruice, simul quoq; id perpetuō recluditur. haud enim decuisset insatiæ mulieris arbitrio, etiā post cōceptum uenerē procaciter nimium desideraturæ, orificium illud subijci. Vt interim prætereā quāta successionis speciei noxa, mulieres subinde geniturā præter sententiā non reseruarēt: quantaq; licētia nullo habito cōceptionis metu, maritis parentibusq; imponderent, si modō fundi orificio Natura musculos arbitrarij motus opifices elargita fuisset, idq; ita ac ceruicis uteri fundi orificium semper aperiri potuisset. Quā incepte uerō & falso pleriq; fundi orificiū penem in coitu excipere, illumq; in uteri sinum inseri scripserint, præter alia, corporis quoq; relectio luculentissimē testatur. Porro in partu quū toto tempore quo uterum gessit mulier, ad amissim contractū oclusumq; fuerit, adeō aperiri, extendi, remittiq; ut foetus hæc procidat, scimus quidē, & audiētes stupefcimus: at Naturæ miraculū nimis quā segniter admiramur, summi rerum Opificis prouidentiam hymnis parum celebrātes. Ad uteri quoq; formam ipsius cornua spectare uidentur, quæ Herophilus in mulieribus opportunissimē iam nascentibus bouum cornibus assimilauit. Quemadmodum enim uitulorum capita utrinq; quā pronascentur cornua, extuberant: ita etiam superior uteri pars, quam quartæ circuli parti comparauimus, utrobique ueluti in duos obtusos desinit angulos, qui reuera ueteribus Anatomicis hominū cadauera secantibus cornuū uice habebātur, uasorumq; semen muliebri deferentiū insertionem excipiunt. Neq; hīc quenquam Galeni studiosum (uti sanē omnes qui Medicinæ nomen dedimus oportet esse studiosissimos) mihi ob pleraq; illius dogmata obstrepere uelim, atq; alias uteri partes requirere, quas cornu accuratius assimilari cupiat, priusquā sedulo Galeni loca in libris de Partium usu, de Semine, de Vteri resectione, expenderit, atq; uaccinū uterum muliebri, ac demum Galeni scripta ambobus uteris cōtulerit: ut tandem doceatur, Galenū, ne per somniū quidem muliebre uterum unquam inspexisse, ut uaccinū duntaxat, & caprinum & ouillum. in super ipsum in libris de Partium usu aliorum Anatomicorū placitis nixū esse, ac proinde uterū illic uerius (quamuis interim obiter) descripsisse. in libro autē de Vteri resectione humano capiti equinā ceruicem adiecisse, atq; ex uaccino utero & muliebri chimeram texuisse, quum uaccini uteri descriptionem cum aliorum dissectionis professorū scriptis permiscet. Si itaq; quis naturæ operū studiosior, Græcorū imposturas uidendi cupidus hæc diligēter præstiterit, uaccini uteri cornua ad eum modum habere spectabit, ac si dextrum sinistrumq; decrepiti arietis cornua radicibus, ac internis lateribus linteo simul cōmitteret, ac cornuū radices uaccino utero, quā is ipsius ceruici cōtinuatur, assimilaret, cornuū uerō apices uteri apicibus conferret. Hæc profectō diffusius explicatiusq; prosequerer, nisi cuius promptum esset macellum adire, uaccinumq; uteri situm, formā, magnitudinē, aliāq; in partiū fabrica ad amissim contemplanāda, intueri: aut si grauius sit parumq; deceat macellū accedere, leue omnino est iubere uaccinum uterū adferri, ut tanti autoris sensa intelligātur, ac muliebri utero casu oblato, obseruē, quā cōcinne Galenus caprinū uaccinumq; uterum, non autē humanū depinxerit, ac demum

Fundi uteri orificium cuiusmodi.

Vteri cornua.

Galenū humanū uterū nunquam inspicisse.

025 fi. 26
fi. uesica e.
tiam cū ip-
sius ceruice
apertū pe-
ctatur. deim
27 fi. L.
p 23 fig. r.
deim 15 fi. R.
aut 13 d.
q 27 figur.
K, K.
r 27 fig. ad
crinitam se-
dem.
s 26 fig. C
deim D.
t 25 fig. 4

u 25 fi. i. k.
x 25 fig. u.

u Hic 29 fi.
guram in-
spice.

expen

expendatur qua ratione tot cōtrouersiae inter præcipuos uiros fuerint cōcitatae, quod cuius ani-
 malis partem describerent, non expresserint, ipsi quæ arbitrati sint hominis membra illorum ani-
 malium membris conuenire, quæ illi potissimum sectioni accommodare solent. Atque si quis hæc
 attente examinauerit, facile diiudicabit, quoties oratio alioquin satis prolixa mihi interturban-
 da esset, si perpetuo quando à Galeni placitis studio & sciens reclino, ad huc cerere, aut etiã rationem
 225 fi. i. k. semper cur id faciã addere, ipsius loca simul prolixè adscribēs. Sint itaque muliebris uteri cornua
 429 fi. F, F. dicti iam antea obtusi anguli, caprini uerò & uaccini & ouilli uterorū cornua apices illi arietū
 cornibus undecunq; simillimi: aut non apices solū, sed fundi uteri in illis animalibus tota pars,
 quam geminā esse, etsi longo interuallo connexa inuicē sit, postea dicā. Quandoquidē Galenus
 alibi etiã totas eas partes cornua nuncupauit, quum ex quorundā etiam ueterū sententia in cor-
 nibus fœtus cōplecti docet: quod nō ita inepte de illis animalibus prolatum est. quemadmodū
 628 fi. F, G. multo adhuc rectius de canibus & suibus, qui uterum statim à fundi ipsius orificio, ita in^b duas
 partes diremptum gerunt, ac si indicem à medio maximè diduceres, illosq; digitos uteri partes
 esse fingeres, quæ in nō prægñatibus rectā quodāmodo ducuntur, & in apicē mucronem ue sen-
 sim nō secus desinunt, quā si recta, nō autē obliquata essent cornua: in utero autē gerentibus
 quasi arietis cornuū modò, & hæc quoq; inflectuntur. Porro ne latius expatiatur oratio, eorum
 625 fi. i, k, l. animalium uteris neglectis, nunc muliebris uteri magnitudinē aggrediamur, quam modò antea
 425 fi. x, x. in situs uteri descriptione utcunq; expressimus, neq; fundi quoq; moles magis quā uentricu-
 li aptè describi potest, ut qui pro cōtenti fœtus seminis ue quantitate distēdatur, cōtrahaturq;.
 Præterea idem quoq; de^a ceruicē censendum est, quæ modò uariē cōplexa rugosaq; conuiet,
 modò in coitu (quāuis non semper æquè promptè) pro penis, in partu autē pro fœtus mole, di-
 stenditur. Et quemadmodū latitudo ceruici eadem nō est, ita quoq; neq; longitudo, nam nobis
 uterum inter dissecandū attollentibus, in miram longitudinem ceruix porrigitur. adeo ut non
 minus ridiculum sit, uteri ceruicis longitudinē uel latitudinē, quā penis describere: quanq; &
 is minus adhuc quantitate quā illa differat. Quinetiã uteri ceruix pro mulieris libidine turgi-
 dior, angustiorq; & directior (præterq; quod alijs natura sit strictior) efficitur. ac proinde etiã
 haud miror omnes quodam digitorum numero eius longitudinē describere aggressos, inter se
 pugnare, & hunc à pudendo ad fundi sinum undecim, illum duodecim, istum plures, aliū pau-
 ciores digitos enumerare, & quod omniū absurdissimū est, parem cum nō prægñatibus fundi
 longitudinē atq; ceruicis statuere. Præterea uterus in eum modum à peritonæo ligatus pēdet,
 ut ipsius fundus sursum & deorsum plus minus in coitu sese ducere, ac ad penis lummū tanq;
 animal quoddā, ut & Plato dicebat, dehiscere possit. Quanq; interim uetulis, & ijs quæ sæpius
 pepererunt, aut rudius ab obstetricibus in secundarū euulsione fuerūt tractatae, fundi os in pu-
 dendū quasi depēdeat, ac proinde breuissima implexaq; in illis ceruix uideat, quā inter secandū
 sursum tractā, aut aliās in uiuētibus intrò protrusam, insigniter producere integrū est. Quod
 autē puellis uteri fundus minor sit, quā illis quæ iam diu coiere, aut aliquando uterū gessere,
 etiã alijs proditum est Anatomicis: quanq; in his omnibus testium ferè modò ita fundus uariet,
 ut nullā ipsius molem, quemadmodū neq; uestigē etiã, priuatim circūscribere queam. Vigesima
 septima tamen præsentis libri figura, eam uteri magnitudinem exprimit, quæ frequēter in non
 prægñantibus, & præcipuè in huius anni cōsectione Patauij occurrit. Fundus enim multo mi-
 nor est, quā dissectionum rudis sibi facilè persuaderet. Quod uerò Anatomes professoribus,
 etiã menstruæ purgationis occasione, fundi uteri magnitudinis differētia ponatur, legi quidē,
 quando uterū sanguine turgentē, & paulo post menstrū sanguinē repurgaturū, grandiore
 illo esse docēt, qui nuper uniuersum sanguinē, quem mensis interuallo asseruari sensim arbitra-
 mur, excreuit. Verū hac ex parte nunq; mihi se obtulit uteri differentia, & de sanguinis illius
 collectione purgationeq; suo loco ad præsentis Capitis finem quædā subiiciā. In uteri etiã sub-
 stantia, non minus quā in describenda ipsius magnitudine, dissectionis professores grauiter
 727 fi. H. dissentiūt, atq; adhuc multo magis in ipsius tunicarū numero, & deinde in uenarū arteriarū &
 neruorū uteri ortu & implexu. Mihi (ne illorū falsis ac imaginatione plerunq; cōfictis dogma-
 tibus enarrādis prolixè hæreā) nō prægñantiū fundi substantia cōspicitur neruea, mēbranea ue,
 sed crassa admodum, compactaq; neq; nimis dura, & nō ad amussim, ut cætera quæ generatim
 neruosa dicuntur, candidās, sed carneū aliquid præ se ferēs. Quod autē in præsentia neruosam
 substantiā, non quæ frequētib; cerebri aut spinalis medullæ neruis intertextitur uocē, sed eam
 27 figura. neruorum materiā, quæ ligamētis, tendinibus, ac illis qui propriè nerui nuncupantur substantia
 et iuxta C. (quanq; non uirtuti) respōdet, neminē ambigere reor. Hæc uteri substantia, æqualis duritia, con-
 26 fig. tinuaq; passim est, nisi fortassis ad fundi^c foramen paulo durior collectiorq; euadat. In exteriorē
 27 fig. E. huius substantiæ superficiē, uenæ obscuræ, gracilesq; sed admodū frequētēs integro adhuc ute-
 27 fig. H. ro excurrere uident, quæ inter^f internā^e externamq; uteri tunicā porrigunt. Sūt enim duæ uteri
 H. tunicae,

*Mulieb. is-
 teri magni-
 tudo.*

*Uteri fundi
 substantia.*

Uteri tunicae.

tunicæ, exterior una quam à peritonæo, ut & uesica ipsa cæteraq; quæ illo ambiuntur, insigniter ualidam ac crassam obtinet. Hæc principiū ducit à^a membranis¹ uasa uterū accedētia continen-
tibus, uterumq; peritonæo cōmittētib; . A peritonæo enim quæ uasa ipsi cōnascunt, quæ à ma-
xima uasorū² distributione supra sacrum os facta, uersus crura tendunt, ipsius peritonæi partes
processus ue enascuntur, illis membranis substantia formaq; simillimi, quæ mesenterium efformat.
Sunt enim hi processus instar duarū tenuium membranarū in ipsarum medio uenas & arterias
deducentiū, & multo adipe oppletarū. Atq; tales membranæ à peritonæo uirinq; procedūt,
quæ toti ceruicis & fundi uteri lateribus ad eum modū cōmittunt, quo cauæ intestinorū Ana-
tomis uocatae parti mesenterium³ applātari docuimus: & quemadmodū mesenterium intestinis
tertiā obducit tunicā, ita etiā hæc peritonæi mēbranæ utrobique uterū accedētes, in secundā ipsius
degenerant tunicā, longē crassiorē⁴ ea quam mesenterium intestinis offert. quod scilicet quatuor
peritonæi portiones, utrinque nimirū duæ, eam efforment, quum intestinorū tertiā tunicā duæ
tantū membranæ constituant. ueluti & in canibus & suibus accidere uidemus, quibus⁵ ambæ
uteri partes instar intestini sunt, singulæq; suo duntaxat latere ad peritonæum in lumborū re-
gione colligant: quū unicus & simplex muliebris uterus utrobique peritonæo connectat. Porro
præsentis tunice crassities ob hoc duntaxat nō tanta est, quod tot peritonæi partibus cōstituatur,
sed quia hæc in cōtracto, neq; grauido utero impense collecta compressaq; est, uti & modò de
interna dicturus sum. ^p Interna fundi uteri tunica ipsi peculiaris ac propria est, neq; à peritonæo
pendet, & quæ prius narrata est uteri substantiā constituit. Hæc tunica in non prægnati utero
(quem donec aliud subiūxero, subaudiri uelim) crassitie omnes reliquorū corporis organorū
tunicas, ut tres⁶ uentriculi & ^r intestinorū simul etiā implexas, uincit. Ipsa tamen omni ex parte
non pariter crassa uisitur. Vbi enim fundi efformat⁷ orificiū, crassissima est, & paulo quàm alibi
compactior: deinde etiā in⁸ media sede superioris fundi partis crassa quoq; est admodū, & ut in
sinu uteri enarratione dicebā, in ipsum quasi sinum extuberans. Cæterum quæ uterus in obtu-
sos⁹ angulos definit, semenq; deferentia uasa excipit, hæc tunica tenuior, minusq; secantibus
spissa, quàm in reliqua parte occurrit. In lateribus autem & anteriori & posteriori sede pariter
crassa uisitur, adeoq; compacta, ut nihil præter ipsius substantiam citra fibrarum quibus abun-
dat distinctionē, utcunq; eam disseces, intueri liceat: facileq; hallucinari illos intelligas, qui hanc
uteri tunicā geminā esse uolunt, in dextris quidem unā, in sinistris uerò alterā, quasi utriusq; ma-
nus cōcaua simul ex opposito iungeres, ac singulas manus singulas esse tunicas fingeres. Adeo
enim Galeni locus in libro de Vteri sectione ualuit, ut in dissectione peritiores, eum legentes,
uteriq; dein constructionem inquirentes, suoq; sensu derogantes, illum geminum, etsi non sit,
descripserint. quod profectò nō accidisset, si¹⁰ uaccinum caprinum ue uterum diuississent, quem
inibi, non uerò muliebrem, Galenus describit. Si enim exquisitè uaccinum aggrediaris, &
^r partem ipsius quæ ab uteri ceruice ad eam usque sedem habetur, qua is primū in arietis cor-
nua duci conspicitur, tunica¹¹ liberaueris, quæ à peritonæoeducta toti huic uteri parti commu-
nis, simplexq; existit, mox interna uteri tunica in cōspectu erit, non unica quidem, uti exterior,
sed gemina, utriusq; scilicet uteri partis una peculiaris. quippe tunica exteriori ablata, uaccini
uteri pars, quæ prius unica cernitur, ita gemina est, ac si indicē cum medio simul iunctum con-
spiceres: aut ut de cornibus arietis dicebam, duorū cornuū radices internis lateribus inuicem
committeres. Neq; solum id Galeni nomine in uaccino utero expendendū uenit, uerū etiam
externam utrorumq; fundi uteri partium communem tunicam ab interna, quæ singulis uteri
partibus peculiaris est, adimens accuratè, obseruabis non oscitanter spectandum uenarum ar-
teriarumq;¹² implexum, inter internam externamq; tunicas consistentem: sed adeo internæ con-
nexum, ut eius connexus gratia internam uteri tunicam Galenus uenosam (uti sanè est) appel-
landam duxerit. Verū interim muliebris uterus¹³ substantia adeo compacta constat, ut uix ue-
næ capillorum modo tenues appareant, neque interna tunica non prægnantibus uenis cōspi-
cuis intertexta cernitur. At de uteri uenis & arterijs paulo post agetur, & nunc internæ tunicæ
quæ in muliebris uteri fundo simplex, uti diximus, est, fibræ explicandæ ueniūt. Triplici nanq;
fibrarum genere intertextitur, ac rectas quidē intimas exigit, sed eas nō ita numerosas. Extimas
habet orbiculares, transuersas ue, rectorum copiam utcunq; uincētes. At medias, quæ obliquæ
sunt, possidet plurimas, easdemq; robustissimas. Atq; hæc omnes in his quæ utero aliquandiu
gesserunt, non secus quàm in uesica flatibus turgida cernuntur, in hisq; omnia iam emutātur.
^c Venæ etenim ac¹⁴ arteriæ uterū adeuntes magnæ admodū & cōspiciuæ sunt. ac interior uteri
tunica tanto tenuior rariorq;, & magis neruea uisitur, quanto magis uterus ipse in magnitudi-
nem promouit. Neque amplius exanguis aut nullis confita uenis apparet, uerū magnæ fre-
quentesq; uenæ eam intertextunt, ad internam ipsius superficiem usque ad¹⁵ secundas uidelicet,
admodū dilucidè procedentes: ac deniq; (ut semel dicam) in utero gerētibus omnia à nō præ-
gnan-

Libro de V-
teri sectione.

Interioris tu-
nicæ uteri fi-
bræ cuius-
modi.

Prægnantiū
uterus cuius-
modi.

b 24 fig. O.
P, Q. et 26
fig. E, E. 27
I, I.

i 25 fi. n, u,
y.
h ult. fig. li.
3 b.

l 24 fig. F,
G.

m Specta-
tur id in 10
figura.

n 9 fig. h, k
educunt L.

o 28 fig. F,
G, atq; ita
quæ hic de-
scribuntur, il-
linc ex cha-
racterū in-
dice petes,
quem admo-
dum ex a

29 fig.

p 27 figur.
E, E.

q 17 fig.
r 9 fig.

s 27 fig. G.
26 C, D.

t 27 fi. F.
u 25 fig. i, k.

x 29 fig.

y 29 fig. a
D ad E.

z 29 figur.
F à G.

a 29 fi. cir-
ca D & G.

b 27 figura
E, E, F.

c 25 fi. n, y.

d 1 tabellæ
30 fig. F.

gnantibus plus minus emutatur. Cervicis porrò uteri substantiæ aliquid cōmune cum uirili pe
ne Natura elargitur, eam dico qua duo penis corpora & glandem præcipuè formari diximus. *Cervicis uteri
substantia.*

Quemadmodum enim illa inuolucro inter neruū carnemq̃ substantia medio conformantur,
quā alia fungosa spōgiosaq̃ oppletā esse diximus substantia, sic quoq̃ & ceruix uteri carnea ner
ueaq̃ constituit tunicā, eiūsmodi etiā substantiæ fungosæ nōnihil possidēte. Atq̃ huius substan
tiæ beneficio uteri ceruix penis modo muliere uenerē appetēte extuberat, pudendiq̃ ipsius col
liculi (quas & alas alij uocant) ac cuticulares illius caruncule extrā prominent, cervicisq̃ ampli
tudo penē amplexura, arctatur, & quod ad rectā uirilis seminis eiaculationē sat est dirigitur.
Atq̃ hoc parū cæteri animaduertent Anatomici, cervicē uteri multis & orbicularibus muscu
lis intertextā, non aliter ac^s uesicæ sit ceruix, fingētes. Quod & si in plerisq̃ mulieribus concubi
tus delectationē fortassis augeret, & illę cōstringentiū arctantiūq̃ medicaminū uim nostris offi
cinis relinquerent, nimis tamen uoluntariā uim Natura genitalibus indidisset, & nescio quo
pacto penem plus satis uteri cervicis arbitrio subiecisset. At nō præterierunt Anatomici, cerui
cem in puellari ætate delatiorē molliorēq̃ esse: contrā in prouectioribus, & ijs quæ fre
quentius pepererunt, callosiorem temporis successu reddi, ut etiam cartilagini asperæq̃ arterie
illam in uetulis subinde assimilent. crebro enim congregientium attritu, partiumq̃ exeuntium
collisione ceruix occallescit: & frequenti astringentium lotionē, assiduoq̃ mensium fluxu, haud
secus indurefcunt, quā ob continuū acremq̃ humorem defluentem ulcera ad fistulas per
mutari consueuerūt. ^{h 25 fig. y.} Venæ & arteriæ ceruici insertæ non prægnantibus manifestiores mihi
semper uisæ sunt, quā fundi. at diuersum utero gerentibus accidere certum est. Vteri autē ue
narum arteriarumq̃ seriem unā cum seminalium uasorum constructione iam opportunē subi
ciam, ut deinde uteri connexu quoq̃ sermoni addito, uniuerſa ipsius fabrica absoluat. Mu
lierum <sup>i 24 fig. M,
L, et 25 fig. r,
et 26 fig. F.
h id uidere
est in 1 ta
bella figu
ra 30.
l 25 fig. o, p,
t, s, u.</sup> testes uteri accumbunt lateribus, non prægnantibus quidem paulo elatius quā fun
di superior pars consistit, utero autem gerentibus eandem certē sedem occupant, at quo magis
uterus extenditur, eo inferius quā ipsius summum habetur, ad latera illius^k accumbere appa
rent. Innituntur autem peritonæo ea parte, qua ilium ossa sacro committuntur, omnino laxi,
neq̃ aliter quā seminalium uasorum beneficio peritonæo connexi. Hi uirorum testibus mi
nores multo sunt, forma autem oblongiores, & secundū latitudinem minus rotundi, & qua
si latiores quā spissiores effici deberent, anteriū posteriorūq̃ depressi. Externa superficies inæ
qualis, ac haud secus quā multæ eademq̃ exiguæ unā colligarentur glandule, multis inequa
libus tuberculis oppleta uidetur. Substantia quippe non constant, ut uirorum testes, molli, ac
innato sibi humido læui, continua & æquali: uerū duriori,^m mesenterijq̃ acⁿ inferioris omen
ti membranæ glandoso corpori non absimili, & præter exiguos uenarum ac arteriarum in ip
sa consistentes plexus, sinuosa cauaq̃. Habent enim mulierū testes intus præter uasa sinus quos
dam tenui aqueoq̃ humore plenos, qui prius non læso teste, sed ui compresso, ac inflatæ uesicæ
modo crepante, in miram altitudinem inter disseccandum non secus quā ex scaturigine qua
piam exilire solet. At huiusmodi sinibus nulla peculiaris est forma: inæqualis enim, ut exterior
ipsorū testiū superficies sunt, & nō unus, sed plures, neq̃ illi semper ijdem uisuntur. Hæc testiū
substantia mēbraneo inuolucro undiquaq̃ circūdatur, quod ipsi ualidissimē adnascitur. Atq̃
hoc quidem durum est: sed tenue & longē^o illi inuolucro quod uirorum testes proximē ambit,
duritia & crassitie cedens: neq̃ adeo promptē à testium substantia inter disseccandum separabi
le, & sui testis substantiæ magis participans. Præsens inuolucrum mulieribus eundem quem
uiris usum præstat, seminarijs enim uasis excipiendis aptum est, testium que continet substan
tiam. Præter hanc tunicam mulierum testes nullum exigunt inuolucrū,^p nisi quod in ambitu
peritonæi membranei processus seminaria uasa continentes, & uespertilionū alis longē simili
mi, testium mediā duntaxat partem integunt, non autem ut^q exterior uirilis testis tunica, pror
sus induunt. Seminaria uasa mulieribus similiter ac uiris^r duæ sunt arteriæ, &^s totidem uenæ,
parem omnino cum uirorum uasis ortum sortitæ, at progressu distributionisq̃ serie differen
tes. <sup>t 25 fig. d, g,
u 25 fig. e, h,
x 25 fig. o,
y 22, 23 fig.
gu. d.
z 25 fig. n.
a 25 fig. ab o
ad p.</sup> Dextra enim uena ac arteria, quemadmodū & alterius lateris uasa, à primo ipsarum ortu
dextrorsum peritonæo, ut in uiris, firmatę, ad sui lateris testem descendunt, ac cum primū arte
ria uenæ^x cōmittitur, ambę inuicem, ut uirorū^y uasa postq̃ aliquouſq̃ ē magna peritongi ampli
tudine exciderūt, implicari inuoluiq̃ incipiunt: non quidē uniuerſum ipsorū corpus in implica
tionē absumētes, uerū^m mediā sui partē uena ac arteria in superiorē sui lateris fundi partē deri
uant, multiplici sobole in uteri fundum excurrentē. Quod uerò ex implicationis initio reliquū
est, paulatim magis magisq̃, ut in uiris,^a inuoluit, uaricosumq̃ illud corpus efformatur, sua ba
si elatiori testis parti adnatū, & similiter atq̃ in^b uiris ramos in testis substantiā, & illū ambiens
inuolucrū diffundēs. Deinde^c uas semē deferēs secundū testis corpus, ut in^d uiris habet: quanq̃
magis testi orbiculatim, q̃ in posteriori solū sede aduoluit. Ab interna enim sede basis uaricosi

*Mulierū te
stes cuiusmodi.*

*Testium inu
lucra.*

*Seminaria ua
sa mulieribus
cuiusmodi.*

corporis incipiēs, externo testis lateri, & deinde inferiori ipsius parti & nōnihil interno quoq; lateri adnascitur, haudquaquē tot inuolutionibus, quā testi adnascitur, ac uirile uas donatū. Porro à teste nōnihil sursum ascendens, & testi nō amplius adnatū, reuolutiones eas instar uermis æqualiter procedentes amittit, ac teres planumq; instar nerui in uterū errabundo ductu fertur, in mediā cornū dextri sedem insertū. His organis per me quidem licebit quæuis nomina imponere: ego autem quoniā uirorū organis formā substantiaq; correspondent, eadē nomina illis, quæ his indere inter ostendendū soleo, cum Aristotele, num semen hæc quoq; organa, ut in uiris, num uerò duntaxat ad uoluptatē quēdā preparant humorē, non admodū contendens.

*Vteri uenæ
ac arteriæ.*

Porro hæc uasa pinguibus, quæ inter dissecandum omnia obliterare solent, membranis à peritonæo natis suffulta tutò porriguntur. Cæterū præter nuper cōmemoratas uteri uenas & arterias quæ à seminalibus uasis principiū duxerant, aliæ multo insigniores à caua & arteria magna post illarū supra sacri ossis initiū diuisionē accedunt. Postq; enim ea uasa primum in duos insignes truncos diuiduntur, & hi rursus singuli in duos insignes, sed amplitudine impares ramos dissecti sunt, unū quidē qui maior est, ac per inguina crus accedit, alterū uerò humilior em minoremq; cuius finis per pubis ossis foramen elabit, uteri uenæ ac arteriæ oriuntur, à minoribus humilioribusq; secundæ illius diuisionis ramis pronatæ. Rami itaq; in dextro consistētes (ut qui in sinistro sunt quoq;) insignē porrigunt propaginē: uena quidē uenā, arteria autē arteriam; quæ simul accumbentes, dextrū uteri latus propter fundi orificiū accedunt, ubi in multas scissæ loboles, quasdā sursum in humiliorē fundi sedem exporrigunt, quasdā per uteri ceruicem deorsum digerunt, nōnullas etiā uesicæ impartiētes. Quæ uteri fundū accedunt, nō pregnantibus quodāmodo graciliores & pauciores apparent, q̄ quæ ceruici & potissimū iuxta fundi os implicantur. Neq; ut quispiā arbitraretur ab his uterū accedentibus uasis, uenæ & arteriæ originē ducūt, quæ secundū rectos abdominis musculos sursum ferunt, illisq; uasis quæ ad pectoris ossis posteriorem exporriguntur sedē, cōmunes sūt. nam hæc ortū sumunt à præcipuis uasis per inguina in crus deductis, à quibus etiā furculi pronascunt, muliebri pudendum colliculosq; ipsius accedentes. Vnā cum præsentibus uteri uenis ac arterijs ab ossis sacri neruorū paribus utrinq; etiā nerui deducunt, tenuibus furculis potissimū in uteri ceruicē, & circa humiliorē fundi sedē excurrentes, ramosq; etiā uesicæ promētes. Ad elatiorē porro fundi regionē subinde neruuli perq; graciles diffundunt, à sexti neruorū cerebri paris ramis deducti, qui costarū radicibus exporrigunt. Verū ut hi neruuli prætenues albicātesq; sunt, & pinguibus mēbranis suffulciuntur, ita quoq; inter dissecandū difficulter occurrunt. Atq; ideo nunc propemodū manifestū esse arbitror, quas partes uterus tangat solū, ac quibus alligetur & adnascatur. Anterior enim posteriorq; & superior fundi uteri regiones nullis quas contingunt partibus adnascuntur, latera uerò cōnascuntur, membranis uasa utero deducētibz, & uterū peritonæo ualidē colligantibus, exteriorēq; uteri tunicam producentibus, ac demū carneis illis fibris intertextis, quæ duos efformant musculos, quorū beneficio uterus uoluntario motu nōnihil sursum, dum mulieres ilia trahunt & quasi colligunt, allicitur, quicq; adeo obliquē prorepunt, & quā uterum accedunt, adeo crassescunt, ut perperā uteri cornua illos musculos esse aliquādo arbitratus fuerim, quod scilicet obtusos muliebris uteri angulos cornuū imaginī nō accedere uidebā: neq; arbitrabar mihi uaccā aut caprā, ut Galeni Anatomicorū primarij sensa intelligerē, secundā. Ceruix porro uteri ex lateribus mēbranis quoq; & uasis ipsi exporrectis adnascit, & illorū interuentu peritoneo (sed quemadmodū & uterus, laxē) cōnectitur. Posteriori parte per mediā longitudinem, qua fundo propinquior est, recto intestino ita innititur, ut accumbentes inuicē intestinorū gyros mutuō allocari cernimus. Verū ad ceruicis in pudenda finem, illa podici firmissime cōnascitur, perinde ac si recto intestino & ipsi cōmunis esset tunica, quemadmodū stomacho & asperæ arteriæ cōmunem tunicā esse nō dubitamus. Rursus ceruix anteriori sede elatius quidem ad fundi orificiū innitentē duntaxat habet uesicā, sed paulo inferius fibris quibusdā humillimā uesicæ partē & ipsius ceruicē adnatā possidet. Vbi autē hæc illi inserit, uelut cōmune utriusq; corpus & tunica efficitur. Cæterū in fine quā ceruix in pudendū desinit, cōmune utriusq; ceruicis scilicet & cutis, ut in labris & podice, corpus constituit. Hæc cutis præterq; quod pilosa euadat, ipsi duriuscula, quemadmodū & in mēto, substernitur pinguedo, in uetulis (etiā si illis ceruix occalluerit) unā cū mamillis flaccescens, neq; ita bellē pudendi colliculos alas ue ut

Quibus partibus uterus adnascitur, & quas solum tangit.

Vteri musculi.

in iunioribus sustinēs. At quū hæc citra mortuorū sectionē conspicua sint, enarratione neutiq; indigent: quemadmodū neq; illi primi in pudendo implexus, & utrinq; una prominēs cuticularis caruncula, longa quidē, sed tenuis, & ex longa basi in mucronē desinens. Has *vvuqlw* Græcis uocari inuimus, quæ earū præcisionē plus q; quis arbitraretur cruentam, & cicatricē perinde ac reliqua huius sedis ulcera difficulter suscipientē, docuerūt: quod hæc coriæ quodāmodo carunculæ in nōnullis mulieribus ad tantā molē augeant, ut pudorē deformitatemq; inducant, &

Prominulae in ceruicis orificio carunculae.

e 25 figur. f
ad p.
f 25 fig. t. t.
g 25 fig. u.
h 25 fig. i.

i 24 fig. O.
O. 26 E. E.
h 25 fig. n. 26
fig. H.
l 25 fig. y.
m uittina fi
gu. li. 3 b.
neius. fi. d.
o eius. fig. i.
p 1, 2, 3 fig.
ca. 29 li. 1 r.

q 25 figu. u.
r 26 fig. D.
s 25 fig. x. &
6 mus. tab.
e in f.
t 6 mus. 1 a.
a. aut fi. ca.
6 lib. 3. L ad
M.

u fig. cap. 6
lib. 3 a.
x fi. 2 ca. 11
lib. 4 iuxta
cha. 25, 26
etc.
y ab i. & u
fig. 2 cap. 2
lib. 4.
z 24 figu.
O. O.
a 27 figura
H. H.
b 24 fig. P.

c 25 fig. i. k.

d 27 fig. I. I.

e 25 figu. m.
f Spectatur
in 6, 7, 8 fig.

g 25 fig. d. 27
fig. L.

h 25 figu. u.

& multis nationibus quoque insignis impudicitiae argumento sint: imò à uestimentis iugiter attritae, ad libidinē irritant, & Veneris ardorē suscitant. Vnde etiā Aegyptiis præcipue uisum est, ut anteaquam carunculæ illæ extuberent, tunc potissimum amputentur, quum proximè uirgines nupturæ sunt. Porro quis harum præcipuus usus sit, suo ordine iam audies. Vterus concipiendo semini idoneus, & foetum tantisper complexurus, dum perficeretur, ac alijs quàm sanguine nutriri posset, in humillima trunci corporis sede locatus est, qua ad concubitum seminisque susceptionem, & adhuc ad concepti foetus augmentum, perfecti que partum, nulla aptior excogitari posset. Hæc siquidem longè à facie & nobilissima rationis arce situatur: deinde ossa nulla, quo minus in miram amplitudinem distendi uterus queat, inibi præpediunt, atque etiam ipsi parituro hinc ad inferiora & uersus crura exitus facilis est. Forma autem uteri fundo cōuenit rotundæ proxima, quo reddatur capacior, iniurijsque minus sit obnoxius. Dein fundus unicus simplexque est, quod unicum foetum amplecti debeat: attamen latior uisitur quàm spissior, quod interdum & gemellos concipiat. Non enim geminus cernitur, & intestini instar oblongus, qualis canis & sui, & illis denique animalibus obtingit, quæ plures simul foetus semper propemodum enituntur. Paruus autem, ac magis quàm facile crederetur contractus in non prægnantibus uidetur, ut quàm minimum alia tunc comprimeret organa, & sinum ipsius adeò angustum redderet, ut quæ proximè uniuersam genituram amplecti queat, eam nulla ex parte à se intactā relinqueret. Ac proinde commoda quoque ipsius functioni constat substantia, quæ affatim scilicet contrahi colligi queat, quum nihil complectitur possit, & rursus secundum contenti augmentum sensim in miram amplitudinē distendi. Atque hæc non imbecillis distendi ue citra diuulsionē inepta uisitur, at ualida & iniurijs ferendis pertinax, fibrisque non infirmis, neque ijs ut fors fert intertexta. Verum rectas habet intimas, quod ante omnia semen allicere debeat: & easdem possidet paucas, quod ocyus semen illi ex temperamento ad iustitiā placēs, ac fluidum aptoque membro porrectum, in illum labatur. Obliquas autem plurimas, easdemque rectis ordine succedentes possidet, quod conceptum diutissime retinendum sit. Transuersas uero extimas nanciscitur, quod illas uterus tum primum maxime requirit, quando foetum diu satis amplexum in lucem est editurus. Quod unica eademque crassa contentus fuerit peculiari tunica, neque duas cum uentriculo, carnosam uidelicet unā, & neruosam alterā obtinuerit, hinc factum nemo addubitat, quod continere tantum uterus amplectique debeat, non autem uentriculi modo præter hæc aliud quippiam à proprio nutrimento concoquere & elaborare. Peritonæum illi ualidam exporrigit tunicam, propriæ ipsius tunice inuolucrum, & tutissimum propugnaculum futurum. Hæc externa superficie leuis aqueoque humore oblita est, aliarum partium modo quæ inuicem tangere quidem, non autem cōnasci satius fuit. Si enim uteri fundus non prægnantibus incubenti illi uestique, & quod illi subiacet recto intestino cōnascere, neque laxis illis, sed duris uinculis quibus accubitis partibus alligaretur, quis inficias ibit, uterum cōmodè tunc unam cum foetu non posse distendi, aut etiā in congressu aut partu deorsum uelut animal quoddam repere. Rursus si utero gerentibus, is omnibus quas tunc contingit partibus connatus hæreret, quo nam pacto obsecro semen denuo amplexurus in se concideret, debitamque angustiam efformaret: & quum minimè opus est, intestinorum functioni non semper obesset. Orificium fundi tale est, quod semper conuiuet, nisi quum naturali instinctu semen admittere, aut foetui, aut mensibus iter præbere debet. meritò enim ex mulieris arbitrio, uti & antea dicebam, ipsius apertio occlusioque haudquaquam pendet. Quod uero crassiori & densiori, ac idcirco glandis modo in ceruicis amplitudinem protuberante substantia, quàm reliquum fundi corpus constet, nemo ambigere potest, id ob hoc maxime factum, ut in partu satis distendatur, neque in mira illa amplitudine lacerari diuelli ue periclitaretur. Atque insigni prouidentia in uteri ceruicis substantia efformanda Naturam uti, quis ignorat: qui eam ut dirigam distendi ad seminis susceptionem facile posset, & rursus ne uterus refrigeraretur, locusque seu amplitudo frustra inanis seruaretur, colligi & conuolutim occludi queat, extrusam conspiciat. Deinde ceruicem substantia ad ueneris pruritum apta constare diximus. Vt uero ipsius conuolutio & inflexus, ne uterus frigore afficiatur, plurimum auxilij præstat: ita quoque conuiuentes pendendi colles, & illæ cuticulares carunculæ, ceruicis opplentes initium, eidem usui accommodè censentur. Vasorum seminalium in mulieribus ortus & ductus, ipsaque testium substantia & conformatio, mulieres semen habere mihi utcumque persuadent: uerum id humidius frigidiusque uirili semine esse, indubitatum est. quod testes ipsi & minores sint, & mediam duntaxat arteriæ uenæque seminalium portionem asciscant: dein quod præter sectionem, quæ semen muliebrem ostendit, mulierem frigidiorē esse constet. Neque etiam frequens scortorum concubitus argumentum est, mulieri plus seminis, aut illius humoris quem libidinis nomine Aristoteles mulieri datum scribit, quàm uiro adesse, quum id non ex concubitu, sed ex seminis humoris ue illius eiectionis

Vteri officij,
ipsiusque cōser-
uationis ra-
tio.
Situs ratio.

Formæ.

Magnitu-
dinis.

Substantiæ.

Superficiës
& nexus ra-
tio.

Orificij fundi
ratio.

Vteri cerui-
cis ratio.

Seminaliū ua-
sorum et testiu
ratio.

i 27 figura
A, A, B, B.

*Nervorum
ac uenarū ra-
tio.*

*Mēstruæ pur-
gationes unde
fluunt.*

ctionis frequentia & copia (quibus illa à uiris longè uincuntur) metiendum sit. Porro muliebriū ualorum & testium functionē ac usum, ea quæ de uiri seminarijs organis prodidimus, satis cōmonstrant. Sic quoq; ut uterus, & potissimum ipsius ceruix exacto sensu donaretur, nervos illis frequentes insertos fuisse, quē nunc obtinent sensus liquidò attestatur. Cæterum uenis quas in fundum uteri & ceruicē pertinere diximus, uterum, & quando concepit mulier ijs quæ fundo peculiare sunt, foetum quoq; enutrirī: arterias uerò communi, quod illæ reliquo præstant corpori officio fungi certum est, ipsaq; sectio in utero gerentibus, id nō minus iucundissimè q̃ luculentissimè attestatur. Et mulierum menstruas purgationes ex uterum quoq; petentibus uenis euacuari indubitatum est: at quo modo id fiat, & per quas potissimum uenas, fundi scilicet, an ceruicis ille sanguis profluat, fortassis si diligens Naturæ operum fueris admirator, neq; in alicuius iuraueris uerba magistri, & tu quoq; nō mecum modò, uerum etiam cum eruditissimis uiris IOACHIMO ROELANTS primario apud Mechlinienses medico, nostraq; Brabantiae singulari ornamento, ac VITO TRITONIO ATHESINO, studiorum mihi dulcissimo comite, qui hac de re non semel mecum tum propter alias occasiones, tum maximè propter Hippocratis Aphorismum sexagesimum libri quinti, & Galeni in eundem commentarium literis egerūt, ambigas. Non sanè quod quis menstruus sit sanguis, & quæ ipsius natura, & quantus, & qua ratione in muliere abundet, & quī foetū nutriat, quamq; falsa de ipsius prauitate & graueolentia Plinius, & cum alijs plerisq; Albertus ille scripserint, nos lateat. Neq; (etsi quibusdam secus uisum sit) dubitamus, pariter sanguinem illum in fundi sinum toto mensis interuallo sensim minimè coaceruari, ac mensis periodo turgente iā utero promanare. Hoc enim si accideret, sanguis menstruus nequiquam tenuis, fluidus, ac illi perquam similis esset qui è naribus guttatim distillat: à quo mēstruus neq; manandi forma, neq; alijs omnibus differt, nisi fortassis plerunq; tenuior & aquosior, alia uē eiusmodi qualitate præditus occurrat. Qui si in utero seruetur, quis ignorare posset, illum concretū & frustulatim educendū: ut taceam fundi orificium tum nisi purgatis mēsibus nō posse in congressu recludi. alioquin quando mulier iniret, ac fundi ore semen acciperet, aut id os semē emitteret, etiam sanguini menstruo uia pateret, isq; proflueret. Quin & magnam huius rei coniecturā dant mulieres quædam, nuper à partu neq; fluidum neq; tenuem sanguinem emittentes, uerum magna cōcreti sanguinis cum seroso quopiam humore frustra, perinde ac si sanguinem in uenę sectione extractum, atq; in uitrum aliquot horis collectum in partes cultro diuideres, ac illum tunc in terram abijceres. Eius namq; formæ illis mulieribus sanguinem profluere aliquando conspexi, haud aliter q̃ si apertæ adhuc in uteri fundum pertinentes uenæ, quæ secundinis innascebantur, in uteri sinum sanguinem effunderent: & is ita concretus, non autem stillatim, ut alias solet, ex pudendo manaret. adeò ut facile in fundi cavitatem sanis mulieribus sanguinē menstruum nequaquā sensim asseruari, certò possimus colligere, & arbitrari ut in foetuum dissectione intuemur, uenas ad fundum ceruicemq; pertinentes, quæ suis suffulciuntur membranis, sanguinem hunc paulatim aceruare, ac turgētes illum singulis mensibus apertis ipsarum osculis emittere. Quod ex mulierum quidem sectione mihi uisum esse affirmare nequeo: uerum quod in quodam hæmorrhoidum uitio laborāte nō illubenter expendi, id mihi certissimò in uenis illum sanguinem, non autem in fundi amplitudine asseruari argumēto est. Hic namq; ordinatis uicibus, ut mulieres suis mensibus, ex uenis in sedem pertinentibus, sanguinis crassioris fluxu uexari consueuerat: & quū ex nigro arquato iecorisq; mira duritie periisset, num portæ ramī, an cauæ hunc sanguinē euacuarent indagaturus, illum dissecuri, atq; uenæ portæⁱ ramū sub coli intestini sine, & tota recti longitudine in mesenterio ductū pollicis ferè crassitiē æquare, & sanguine illo crassiori lutofoq; turgere animaduerti, cauæ uenæ^k ramis huc pertinentibus nihil prorsus immutatis. adeò ut perq; stupidus censeret, si posthac ambigerem, num ex portæ ramis, an caug, melancholicus sanguis ex sede frequentius promanaret: & nō certissimò mihi persuaderē, uenas has nimium oppletas, quū iam sensim sanguinē illum admiserint, apertis ipsarū oris eructare. Atq; ita in mulieribus fieri arbitror. an tamē ex fundi uenis, an uerò ex ceruicis semper, aut modò ex his, modò ex illis mēses defluāt, ignorare me, neq; quicq; certi quod mihi omni ex parte sanū esse uidetur, posse affirmare fateor. Hactenus enim nondum mulierem non prægnantē, quæ uenarū crassitiē ab alijs differret inueni, quanq; tamē diuerso modo affectas plerasq; uiderim. Lutetię enim in publica sectione præstanti forma & floridæ ætatis meretricē suspendio necatam primū secui. Patauī quoq; altera obtigit, quæ sibi laqueo mortē intulerat. Deinde monachi cuiusdam diuo Antonio hīc sacri elegāscortum repente uelut ex uteri strāgulatu, aut attonito morbo, mortuū, Patauī studiosi ex monumento creptū ad publicam sectionē attulere, mira industria cadauer uniuersa cute liberātes, ne à monacho dignosceretur, qui idē monumēto creptū cum scorti parentibus apud urbis præfectum

*i fi. ca. 5 li. 8
d, d, c. aut
hic 12 fi. n.
k fig. cap. 6
lib. 3 v.*

fectum conquerebatur. Præter hoc superiori anno mulierculâ utcunq; senē, & fame (uti conij-
cio) in ea annonæ penuriâ enecatâ, pari ratione subductam in scholis adepti sumus. Quæ autem
postremò nobis obtigit, & qua in uigesima quarta & uigesima septima figuris exprimēdis usi fu-
mus, suspendij metu se grauidâ falsò finxerat. Verùm Prætoris iussu ab obstetricibus (quæ illâ
minimè grauidâ affirmabant) interrogata, nunq; quantum à mensstruis purgationibus abesset,
utcunq; id sedulò nos resciscendum ab ea curauimus, indicare uoluit. Verùm huic, & quas non
prægnantes uidi, omnibus uenæ pari se habebāt modo: neq; uel imaginari licebat, quò nam pa-
cto in uteri fundum sanguinē per crassam collectamq; adeò uteri substantiâ ducere possint, præ-
cipuè quum in his uenæ capillorū modo essent tenues, uisumq; quodāmodo effugerent. Quæ
autem ad ceruicem & infimam uteri fundi sedem tendebant, apparere crassiores, & facilius ex
his menses defluere expurgari ue posse uidebātur. Haud secus quàm si sectio ex uenis ceruicem
implicantibus menstruum sanguinem semper excerni, propemodum suaderet.

DE VTERI ACETABULIS. Caput XVI.



ETERVM dissectionis professorum de uteri acetabulis dissensio ad
nos quoq; manauit. Grauius etenim in scholis contenditur, quidnam
uteri sint acetabula: qua etiam de re tantisper dubitauī, donec in oue, quæ
non ita diu utero gesserat, quid uerè uteri acetabula sint, inspexissem. Hæc
enim altero ipsius uteri sinu semen receperat, qui dissectus asperâ inæqua-
lemq; ostendit superficiem, multis^a sinibus oppletam, qui tales prorsus e-
rant, ac si mediam pisæ partem singulis sinibus quis nō secus impressisset,

Quid uerè u-
teri sint aceta-
bula, & quæ
primū ita fu-
erint nuncu-
pata.

^a Hos sinus
spectabis in
oue, aut ca-
pra, aut uac-
ca, quæ non
ita pridem
concepit.

^b 1, 2 fi. ca.
29 lib. 1 g.
c. f.

^c 1, 2 fi. cap.
29 lib. 1 li.

^d 2 fig. cap.
49 li. 2 p.

^e Et hæc
quoque ex
uaccino ute-
ro petenda
ueniunt.

^f Specta D.
G fig. 29.

^g 1 ta. figu-
ra 30 F.

quàm si in ceram eiusmodi sinus pisæ quapiam moliretur. Quando itaq; sinus illos intuerer, ac
Galenī loci ad finem libri de Vteri refectione non immemor essem, quo acetabula sinui foliorū
herbæ assimilant, quam Græci ab acetabulī, seu potius heminae forma *κοτυληδὼνα*, & à cymbali i-
magine *κυμβαλὺνδρα* & *κυμβαλον* uocant: nos autē acetabulum, & Veneris hortum, seu umbilicū
nuncupamus, promptè collegi, hos uteri sinus *κοτυληδῶνες* Græcis, nobis autē acetabula primū
fuisse ad eū modū nuncupata, quo altius incisī ossium sinibus acetabulī nomen accommoda-
mus. Si enim coxendicis^b acetabulum intuitus fueris, illudq; ad hos uteri sinus contuleris, nul-
las reperiēs corporis partes æquè ex merito ab imagine nomen obtinuisse, atq; acetabulum id
coxendicis ossis, à quo iam paulo antè femur resectum sit, & hos uteri sinus. Vt enim coxendi-
cis sinus ita ac si medius globus ipsi impressus esset, cauus cernitur, sic etiā & hi uteri sinus insi-
nuantur: deinde ut coxendicis acetabulī^c supercilia extra reliquam ossis superficiē prominent,
ita etiam in uteri amplitudinem suorum sinuū supercilia procerius quàm reliqua uteri superfi-
cies in ipsius cavitatem extuberant. Ad hæc, ut coxendicis ossis acetabulum mucoso humore
oppletur, ita sanè & uteri sinus mucoso sanguine mihi conspiciēbātur infarti: à quo iam in non
nullis sinibus teres & insigniter mucosum uasculū uidebat pronatū, ad eū prorsus modū quo
terēs ligamentū ex coxendicis acetabulo in femoris caput inserit. Quum itaq; hos ouilli uteri si-
nus inspexissem, unde uteri acetabulorū nomē primū sit institutū, nequaquā hēsi. Vt aut quò nā
pacto illa procrearentur cognoscere, non prægnantis ouis uterū mox aperui, & uteri amplitu-
dinem multo aliter q̃ muliebris uteri asperâ inæqualemq; adinueni. Per uniuersam enim superfi-
ciem^e subflaua uisebant tubercula, & semiglobulī, tales omnino ac si dimidiatas pisas uteri mu-
liebris amplitudini passim quis agglutinasset. Atq; hīc primū discere cœpi, quid Anatomes
professores uellent, qui acetabula uteri extumescētib; in ano uenarū capitibus cōparant, ex
quibus iam paulo post sanguis melancholicus est profluxurus. Si enim non prægnantem uac-
cæ uterum secueris, illo quauis ratione aperto, nihil eiusmodi prominētibus capitulis erit mani-
festius: nihilq; addubitabis, illa acetabulorum loco plerisq; Anatomicis habita fuisse. non for-
tassis quod illa ueris acetabulis assimilarent, uerāq; acetabula uteri esse arbitrarentur, sed quod
ex uteri sectione didicissent, uenas ac arterias inter internā externāq; uteri tunicas admodum
multiplici & implexa prorsus serie in uaccis distributas, suis sinibus in hæc capitula per uniuersam
uteri amplitudinem extuberantia pertinere, ac demum cōcepto iam semine illa aperiri, se-
menq; amplecti, & uasa quædam educere, quæ à uenis & arterijs in capitula pertinentibus pro-
nata, ad feminis usq; superficiem infererentur, illiq; implicita^g secundinam seu tunicā foetus exti-
mam efficerent. Præterea ubi sedulò in nō prægnanti uacca hæc tubercula expenderis, & rur-
sus in illa quæ nuper cōcœpit, sinus illos quos tubercula sese aperientia efformant didiceris, ac
pariter obseruaueris in uacca quæ paulo diutius cōcœpit, quī sinus illi oblitterentur, & disten-
to iam utero prorsus uisum fugiant, ac uasa tantum appareant: ex sinuum loco ab uteri tunica
ad secundinam porrecta, etiam faciliè ratiocinaberis, quid medici indicauerint, qui acetabula

Quæ secundò
acetabula à ue-
teribus fue-
rint appella-
ta.

Ad quæ tertio
acetabuli no-
men fuerit de-
ductum.

uoca-

Aphorif. 45.

uocauere neque sinus illos, neque tubera, uerum uasa ex utero in secundinam pertinentia. Ea enim Hippocrates tum alias, tum maxime in quinto Aphorismorum libro, acetabuli nomine intellexisse uidetur, appellationem hinc fortassis sumens, quod haec uasa ab illis uteri sinibus, quae primum acetabula uocari inuimus, porrigantur. Atque hinc liquet, unde tot in Naturae operum descriptione exurgant contrariae prorsus autorum sententiae, quod scilicet Galeno dissectionis studiosorum facile praecipuo nimium in humani corporis fabricae cognitione credamus, & ipsi nostris manibus dissectionem non aggrediamur: aut si id tentemus, ab illis casu abstineamus animalibus, ex quibus Galeni dogmata expendere liceret. Frustra enim in muliebris uteri amplitudine tubercula illa quae subflaua & dimidiatae piscae simillima esse diximus, indagabis: quum illa his penitus non donetur, uti neque asinae uterus. Si tamen uaccinum uterum ex macello tibi curaueris adferri, nihil his tuberibus (quouis etiam pacto uterum aperias) promptius occurret. Insuper in muliere quae non ita pridem concepit, incassum sinus illos quos coxendicis acetabulo conferebam, inquires: quod non solum hinc conicio, quia non praegnae mulierum uteri illis tuberibus prorsus expertes sunt, sed & quod resectione id in muliere fuisse a marito interfecta didicerim, cuius uteri interior superficies, & uasorum iam in semen pronascentium series nihil a canini & suilli uteri forma discrepabat, quam in foetis canibus indies conspiceret licet. Porro quum in mulieribus ab utero in secundinam uasa pertingere cernamus, illud acetabuli nomen illis propter Hippocratem ascribi poterit, quod ultimò recensebam, quum uasa quaedam ab utero in secundinam pertinentia, acetabuli nomine quibusdam comprehensa attestarer. At iam opportunum erit secundinae & reliquorum foetus inuolucrorum naturam, & foetus formationem sermone quoad licebit uerissime pertractare, & dein mamillarum quoque historiam hoc libro persequi.

DE INVOLUCRIS FOETVM IN VTERO
tegentibus. Caput XVII.

FOETVS inuolucra utcunque quatuor tabellis trigesimae figurae exprimere conati sumus.

Quae in translatione de foetus formatione in controuersiam uenerit soleant.



VVM praesente libro etiam organa generationi subministrantia propter sedis uiciniam describere proposuerimus, conduxerit hinc quoque de foetu, & potissimum de ipsum inuoluentibus tunicis, quaedam subiungere. Quando quidem diffusum de foetus formatione sermonem instituere, prolixi esset negotij, & ut uerum fatear, hinc mihi aliorum autoritatibus duntaxat insistendum esset, & tandem uix mihi ipsi probabilia, non absque frequentibus controuersijs, adducerem. Nam & si quaedam ex foetuum & praegnantium uterorum dissectione didicerim, & in scholis nonnulla commonstrare soleam, id tantummodo ex brutis, neque id ea qua oporteret diligentia habeo. praegnae namque mulieres mihi ad dissectionem paucissimae haecenus obtigere. Quum itaque adhuc permulta ex frequenti ac sedula sectione me adepturum non diffidam, modò in dissertationum Oceanum me haudquaquam coniciam, praeter caetera disputaturus, num muliebri semen ad generationem aliquid praestet. mulieres etenim semen perinde ac uiros habere, muliebrium organorum fabrica superius edocuit. Dein num semen effectiuum simul & materiale principium foetui offerat, an tantum effectiuum. Rursus si semen effectiui principij tantum autor sit, quorsum id euanescat: & si materiale etiam principium sit, quas partes efformet, num scilicet eas quas solidas semper spermaticasque nuncupamus. Item quid primum generetur, omnia ne simul, an iecur, cor, & cerebrum prius simulque: an cor prius, aut iecur prius, & quo nam tempore singula in foetuum formatione fiant: praeter eius generis quaestionum quamplurimas, uix paginis aliquot enumerandas, in quibus omnibus fere Galenum ab Aristotele medici iuxta ac philosophi dissentire arbitrantur, hi quidem Aristotelis placita, illi uero Galeni mordicus defendentes: sed per loue omnes sectione postposita, friuolis quibusdam rationibus, & autoritatum congerie duntaxat innixi. Quum interim sectio hinc pleraque luculentissime ostendat, quam si ita in mulieribus atque in brutis aggressus fuisset, & in has disceptationes me quoque iniiciens (uti aliquando quum quid exactius repererem, facturum sum) aliquot chartas absumerem, & ostenderem pariter quam belle Galenus qui alios de sectionis negligentia increpat, sibi passim consentiat: & quam futiles rationes & a ueritate prorsus alienas in Aristotelem nimis profecto sophisticè contextit, autumans neminem post illum sectiones aggressurum, suasque imposturas deprehensurum. Quanquam Aristotelis sententiam undique ueram esse, non annuam, nihilominus tamen medicos expendere

dere uelim diligentius Galeni nimium omnibus concessum placitum, quo præter simplicem carnem pinguedinemque corporis nostri, omnia semine constare docet: ossa uidelicet, cartilagine, membranas, ligamenta, uenas, arterias, neruos, tendines, musculorum fibras, cerebrum, & si quid aliud in corpore præter pinguedinem & carnem habeatur. Hoc enim ubi sedulo medici affectu omni remoto indagauerint, uiderintque, dein quæ Galenus ad^a secundi foetus inuolucris constitutionem, muliebri semen non sufficiente uirili requirat. At præsens sermo quantumuis ipse renitatur, in alium locum supprimendus est, & ut mihi à principio institutum fuit, foetum inuoluentes tunicae ueniunt pertractandæ, quas num rite Galenus & in libris de Partium usu, & libris de Semine & foetus formatione descripserit, aut uiderit etiã, ipse tecum ubi eas tute in homine, aut sue, canis uel obseruaueris, expendito. Quum enim Galenus canis & suis inuolucra hominis respondere docuerit, tantisper dum mulier sese offerat, in cane effoeta aut sue foetuum inuolucra non oscitanter inuestigare erit operæ precium, ut dein hæc mea Galeni locis conferens animaduertas, num uel canis inuolucra is recte descripserit: ut etiam tunc perspectum habeas, quousque ueram humani foetus fabricam Galenus recensere potuerit. ^b Primum itaque foetus inuolucrum, quod & extimum mihi nominabitur, foetum uniuersum non eo modo obuoluit, quo nucleum à suo putamine obduci integri que cernimus, aut quo reliqua duo inuolucra foetum ambire mox audies, imò foetum duntaxat circulum uasa contingentium modo cingit. Haudquaquam enim superiorem, uti neque etiam inferiore foetus partem contingit, sed tantum ita se habet, ac si quis à mucronata pectoris ossis cartilagine ad elatissimam usque ilium ossium sedem fascia impenso laxa cingeretur. Inuolucris enim huius latitudo ex foetus proportionem tanta duntaxat est, quanta longitudo à foetus ilium ossium elatissima sede ad mucronatam usque cartilaginem pertingeret: aut ut expressius dicam, inuolucris latitudo non multum excedit cubiti cum extrema manu longitudinem: tantum abest, ut inuolucrum id foetum uesicæ alicuius, aut ipsius uteri modo amplexaretur. Porro inuolucris amplitudo tanta est, quanta summa interioris uteri superficie extensio, inuolucrum enim hoc externa superficie utero undique contiguum est, & adnascitur quoque. Dein exacte consistit ad foetus mediam regionem, si modo mihi foetum ita iacentem subaudis, quemadmodum conuolutus implexusque in utero (aliter ac uulgi persuasum habet) secantibus occurrit. Porro ipsius crassities nequaquam membranæ modo tenuis est, sed quum foetus ab utero paulo post resolendus est, uteri inuolucrorum crassitiem longe superat, & pollicis etiam crassitiem facile æquat. Deinde substantia non constituitur membranæ, uerum peculiari, & cui in uniuerso corpore alteram non reperiatis similem, nisi fortassis illam fungosæ penis, aut propinquius adhuc lienis substantiæ assimilare uelles. Est enim huius inuolucris substantia, lienis quasi modo nigricans, friabilis, fungosa, & frequentissima uasorum serie implicita. Quippe omnes uenæ & item arteriæ ab utero foetum petentes, in hoc inuolucrum duntaxat pertingunt, neque undique in foetus ambitu in aliquod uniuersum foetum inuoluens inuolucrum finiunt, sed in hoc duntaxat quod iam describere (utinam tam feliciter, atque præsens in sectione ostendere possem) conor. Vasa itaque uterum implicantia suis osculis in hoc inuolucrum, quod lato crassoque circulo non inopportunè contuleris, pertingunt aperiunturque, & ex singulis uasorum oris noua procreantur uasa tot numero, quot uasorum ora inuolucrum id contingunt, atque à uenarum quidem oris uenæ procreantur, ab arteriarum autem arteriæ: quæ per huius inuolucris substantiam uariè admodum implicitæ, tandem inuicem colliguntur, uenæ quidem in uenas, arteriæ autem in arterias, & tantisper grandiores rami ita collecti in maiores adhuc coeunt, donec omnes uenæ in duos colligantur uenarum caudices, & arteriæ item in duos arteriarum caudices: qui ut uenarum caudices duo inuolucra, quæ uniuersum foetum ambire mox dicam, penetrantes in umbilicum pertingunt, sanguinem & uitalem spiritum foetui in eum prorsus modum deducentes, quo reliquæ corporis uenæ & arteriæ ipsas quas perreptant partibus suam quam continent materiam digerunt. Hoc itaque extimum foetus inuolucrum aliud nihil est, quam plexus quidam & textum, in quod uasa uteri pertingunt implicanturque, ob hoc potissimum, ne totidem uasa foetum subiret, quot ab utero in inuolucrum hoc pertingunt, sed ut huius inuolucris beneficio collecta in pauca redigerentur uasa: quæ per foetus umbilicum ducta, unica tantum sede eademque tuta foetum perforant. ^b Exterior igitur præsentis inuolucris superficies uniuersa uteri internæ superficie adnascitur, proximaque est: interior autem ipsius superficies adhuc pertinacius obnascitur secundo foetus inuolucro, quod iam aggrediar: simulatque indicauero per me licere, ut huic extimo inuolucro ex tuo arbitratu nomen imponas, memor Galenum reliquosque dissectionis professores extimum inuolucrum *χεῖρον*, uti & Latinos secundas, seu secundinæ, alij et loculos appellare. & quum fortè idem cum Galeno illi nomen impones, expende an is id rite descripserit: quod tum feceris

Lib. 2. de Semine.

In lib. de Foetus for.

Primum ac extimum foetus inuolucrum.

a 1 tab. fig. 30 G, G. 2 tab. L, L. 3, 4 tab. O, P.

b 1 tab. fig. 30 P. 2 tab. K, 3, 4 tab. la Q.

c 3 fig. cap. 49 li. 2 E, E. d 19 fl. I, K. e 25 fl. M, Y.

g 4 tab. fig. 30 S.

h Hæc petes ex 1 tabella 30 figuræ, et etiam ex reliquis.

Secundum me
dum ue foetus
inuolucrum.

opportune, quum animaduverteris id neutiquam membranā esse, sed potius lienis suo nigrifican-
te sanguine admodum turgidi substantiam: & non toti uteri superficiei adnasci, sed duntaxat
tantæ superficiei uteri partī, quanta est ipsius inuolucris exterior superficies. ¹ Secundum foetus
inuolucrum à farciminis imagine admodum eleganter à *Maurocordis* à ueteribus est appellatum,
qui id secus ac Galenus uerè cognouerunt. Quum enim inter dissecandum extimum inuolu-
crum ab utero diuulsum est, aterq; & nigrificans subuicidusq; sanguis ab illo profluxit, nullo que
alio foetus inuolucro effracto, foetus ab utero eximitur, is unā cum suis inuolucris farciminis
alicuius, nō quidē oblongi, & quod ex tenuibus formatur intestinis, sed breuis, & ex crassiori-
bus intestinis formati, supraq; & infrā consuti, non autem laqueo tantum intercepti, imaginem
exprimit. secundum enim inuolucrum intestino respondet: foetus autem, & omnia quæ id in-
uolucrum amplectitur, intestino infartorum rationem obtinent. Est enim secundum hoc inuo-
lucrum exacta membrana, uenulis quibusdam & arterijs intertexta, ad eum ferè modum, quo
adherens alba ue oculi tunica illis donatur. Externa ipsius superficies tanta amplitudine, quan-
tum est extimum foetus inuolucrum, pertinacissimè illi connascitur, & uenulas suas arteriolasq;
ab extimo foetus inuolucro assumit: nullum enim uas immediatè ab utero in hanc membra-
nam pertingit, etiam si externa ipsius superficies reliqua (quæ scilicet extimo non connascitur
inuolucro) uterum contingat, sed non connascitur. Nullibi enim secundum hoc inuolucrum
utero, nisi extimi inuolucris interuentu necitur. Interior huius superficies ad amissim læuis est
& humecta, neque alteri prorsus parti connascitur, nisi puncto quodam (ut ita dicam) intimo
seu tertio foetus inuolucro: atque is connexus, ¹ umbilici uasorum ab extimo inuolucro per se-
cundum & tertium ad umbilicum tendentium fit interuentu. In reliqua enim amplitudine se-
cundum hoc inuolucrum tertio nusquam adnascitur, & ^m inter secundum hoc & tertium inuo-
lucrum foetus urina colligitur. A ^{suprema} enim foetus uesicæ fundi regione ² meatus quidam
per umbilicum in cavitatem pertinet, quæ inter secundum & tertium consistit inuolucrum,
atque is meatus foetus urinam in illam amplitudinem deferit, *ὀυραχὸς* hinc appellatus, & mira
industria in hoc à Natura formatus, ne foetus urinam per uesicæ ceruicem reddens, illam cor-
pori suo proximam tantisper dum nasceretur asseruaret, & eius acrimonia mordacitateq; mol-
lis illa ac tenerula cutis erodatur ulceretur ue: sed ut urina procul à foetus cute eius urinarij mea-
tus beneficio, inter secundum inuolucrum & tertium deduceretur, & ut mox de foetus sudore
quoque dicam, partus promptitudinem dum paulo ante egredientem foetum profluit, & uteri
ceruicem humectando emollit ampliat que, plurimum iuuat. Galenus secundum inuolucrum
quo ipse urinam contineri scribit, toto foetui non obduci attestatur, sed duntaxat clunibus,
& extremis partibus. qua in re tuum ipsius requiro iudicium: & hortor pariter, ut quum foe-
tum, si non humanum, saltem canis secas, ut mox atque extimum mihi appellatum foetus in-
uolucrum ab utero distraxeris, foetumq; & ipsius reliqua inuolucra manu contines, ut foetum
erigas, ac urinam deorsum uersus pedum regionem colligi intuearis, ac dein capite illum rur-
sus declines, & animaduertas mox urinam uersus capitis regionem asseruari, illud que mem-
braneum inuolucrum quod ego descripsi, & utero undique (nisi ubi extimum inuolucrum ob-
stat) dixi esse proximum, urinam continere, & neutiquam *χεῖλος* esse, quum nullas prorsus pos-
sидeat uenas & arterias, ab ijs quæ ipsi nutritionis gratia, ut & cæteris membranarum offerun-
tur, & hæ neutiquam ab utero immediatè procedunt, sed ab illis quæ crasso illo & lienoso
foetus inuolucro implicantur. Si enim hæc sedulo expendere, hæc que mea cum Galeni pla-
citū ad sectionem contuleris, promptissimè dijudicabis, quā reliqua Galeni de Foetuum
formatione & seminis natura constare possit sententia. ^o Tertium foetus inuolucrum forma
prorsus secundo respondet, sed minus est amplum, & longè tenuius. tenuissima enim (unde
& *ἀνυῖ* dicitur) membrana est, alba quemadmodum & secundum inuolucrum, & uenulis pa-
riter ac arterijs implicata, foetui proximè & undecunque obducta. Huius exterior superficies
prorsus læuis & humecta est, neque ulli penitus parti adnascitur, nisi ^p uenarum arteriarumq;
umbilicum petentium interuentu. hæ enim quum ab extimo inuolucro per secundum & ter-
tium umbilicum adeunt, secundum inuolucrum primo committunt. Interior quoque tertij in-
uolucris superficies læuis quoque & humecta est, foetui nusquam nisi ad umbilicum, uasorum
umbilici beneficio nexum. Inter hoc autem & foetus cutem sudor copiosus continetur, qui foe-
tus est recrementum, ac ante partum non minus quā foetus urina profluens ceruicem ute-
ri irrigando, foetui faciliorem exitum parat. deinde foetus cuti subflaua quædam & lutosa ob-
ducitur substantia, eius concoctionis (uti arbitramur) recrementum, quod in singularum par-
tium enutritione fieri putamus. Venæ & arteriæ hoc inuolucrum implicantur ab umbilici ua-
sis, quum illud permeant, principium mutuantur: quæ & si sint longè gracillimæ ac tenues, ta-
men

Tertium foe-
tus inuolucrum.

i 1 ta fig. 30
G, G. 2 tab.
L, L. 3, 4 ta.
O, O, P, P.

k 18 fi. cap.
14 li. 7 n. 1.

l 3, 4 ta. 30
fig. N.
m 3 ta. fi. 30
inter O, O
M, M.
n 2 fi. M ab
N.

o 3, 4 ta. fig.
30 M, M.

p 4 tab. 30
fig. N & S.

men inter dissecandum promptè occurrunt, quòd hæc membrana præ cæteris corporis membranæ & tenuissima sit, & omnis prorsus adipis experta. Vnde etiam ipsa post partum apud quasdam nationes non ineleganter exsiccata uesticæ modo seruatur, atque uulgò apud nostrates in masculis galea, in fœminis uitta, apud Italos uerò indusium fuisse persuasum habent: in hoc errantes, quòd omnibus pueris hanc membranam communem haud esse arbitrantur. Quod obstetricum inscitia fieri uideo, quæ interdum, & ut plurimum tertium inuolucrum simul cum secundo à fœtu abstrahunt, tunc illam suam camisiam non obseruantes. Aliquando uerò quum extimum inuolucrum utero adhuc in partu pertinacius adhæret, ipsè que fœtus antea prodit, tunc intimum ipsius inuolucrum capiti ipsius aut cruri, aut manui obductum absq; secundo inuolucro prodit: id quæ tunc mulieres religiosè, & magna superstitione asseruant, neq; ab his modò, uerùm & ab occultis philosophis summopere expetitur. Quum interim pariter & intimum & secundum possent semper matres æquè puerorū nomine (uti charissimam meam matrem fecisse uideo) reponere, si extimum inuolucrum, aut lienosam illam substantiam à secundo inuolucro deradi mox curarent, & ablutas postmodum membranas fœno leuiter opplerent, uesticarum quæ modo exsicarent. Putauerim enim elegantius fore, si grandiam puero mater illius offerret inuolucra, quàm quod ea simul cum fœtus urina, & sudore, & qui profluit tunc atro sanguine in cloacas reijci, aut in terram fodi curant. Quum cæteris uiuiparis animalibus ferè sit innatum, ut simul omnia quæ fœtum inuoluunt, deuorent, ac deglutiant, id quod in parturientibus canibus non iniucundè aliquando obseruui. Porro quæ uenarum & arteriarum in umbilicum pertinentium sit series, in tertio libro qui uenis & arterijs dedicabatur, exequutus sum, quum uenam dicerem in iecur ferri, à qua priusquam in iecur absimitur, in canibus ramus in mesenterij centrum pertingit: arterias autem secundum uesticæ fundi latera deorsum prorepere, atque in humiliores ramos arteriæ magnæ inferi, quos diffundit post magnam supra sacri ossis initium diuisionem. Quo nam pacto autem hæc omnia ad amussim dissectione indagaturus sis, ubi mamillarum sermonem absoluero, ordinatim subiungam.

DE MAMILLIS. CAPVT XVIII.

MAMILLARVM fabricam non aliter delineare licuit, quàm in dextro latere uigesimæ quintæ figuræ eam exprimere conati fuimus.

a Non cõti-
nẽtur inter
A, B, C, D 2
et 24. figu.

b 3 muscul.
tab. Δ.



MAMILLÆ etiam si peritonæo nulla ex parte^a amplexentur, quum tamen fœtum ubi is in lucem prodijt, alant, atq; in organorum generationi subseruientium numerum recensendæ sint, hoc quoq; loco ipsarum fabricam opportunè prosequemur. Mamillarum itaque situs nulli non conspicuus est: super pectus enim ad ossis pectoris latera locantur, par-<sup>Mamillarũ
situs.</sup> ti inferiori brachium pectori admoventis^b musculi superstratæ. Verum ut figura admodum uariant, sic quoq; parem non semper sedem occupant. Ampliores enim mamillæ latiori firmantur basi, propendulæ uerò ac flaccidæ à naturali loco declinant: & quibusdam mulieribus uicinius ad pectoris medium inuicem accedunt, quibusdam autem (quod & pulcherrimum ducitur) inuicem recedunt, thoracisq; lateribus magis appropinquant. Forma illis penè propria, semiglobum refert: quippe exteriùs rotundæ, gib-^{Forma.} bæq; sunt, papillæ (quæ Græcis *θήλη* appellatur) instar processus obtinentes: intus uerò seu posterius, quæ pectus spectant, leuiter admodum sinuantur, secundum pectoris gibbum planæ & amplæ basi commissæ. Mamillarum moles quum à brachium pectori adducente musculo abscedit, quæ illæ potissimum dependent, ampliores quàm in medio ductu euadunt, ut plerisque fœminis simul in basi, & in ipsarum extremitate ampliores ob concidentem ipsarum substantiam uisuntur. Porro substantia qua constant glandulosa est, multo adipe abundans, & uenis^{Substantia.} paucisq; admodum arterijs & neruis intertexta. Nerui quidem semper ijdem in mamillas pertingunt, ac sibi perpetuò similes sunt: uenæ autem & arteriæ crassitie & contento humore admodum pro mamillarum mole, & quo tunc funguntur munere differunt. In glandularum forma, substantia, multitudine & situ multo maior singulis temporibus est differentia. Viris namque multis nullæ ac per quàm paucissimæ eademq; aridæ sunt glandulæ, uti etiam admodum puellis. Alijs autem frequentes extuberantesq; ad sunt, duritia, & mollitie, ac forma uariantes. Iuuentulæ enim quibus iam mamillæ in molem attolluntur, generationiq; aptæ fiunt, harum glandularum obtinent copiam, sed inuicem compactarum & durarum, nulloq; lacteo humo-

re oppletarum. Dein series formaque glandularum in mulieribus à cæteris animalibus, & potissimum uniparis differt. his namque unicum quodammodo & continuum in uniuerso ubere consistit glandosum corpus, illis autem ad papillæ centrum una magnaque & mamillæ modo effigiata habetur glans, cui alia frequentes, sed parua, & amygdalis à cortice liberatis similes in circuitu accumbunt, duriori adipe, & uenarum & fibrarum ex carnea membrana in cutem pertinentium interuentu mutuò commissæ connataeque. Vniuersa enim mamillarum substantia adipis ritu inter cutem & membranam à nobis carneam dictam continetur, neque costis incumbentibus musculis mamillæ alio nexu committuntur, quam per reliquum corpus carnea membrana subditis sibi musculis: nisi fortè hîc paulo plures uenæ interueniāt, à musculis in mamillas digestæ. Vt cunque tamen mamillæ aliquando flaccidæ propendeant, carnea membrana à musculis non abscedit, uerum glandulæ illæ unā cum adipe non amplius constrictæ, sed flaccidæ à carnea membrana laxantur. Mulieres enim lactantes & ultimis mensibus uterum gerentes, has uenas lacteo humore aut lacte oppletas habent, & ipsæ etiam glandulæ eo abundant, & ob id molliores & fungosæ admodum, neque ita inuicem continuæ redduntur, & illum tonum non amplius seruantes, neque amplius duriusculo illas sustinente adipe, sensim flaccescunt & propendent. Verum nunquam eò perueniunt raritatis, ut deuoratum à muliere pilum in se (uti Aristotelis est sententia) reciperent, & pilari morbo, Græcis *πριχίσει* nuncupato, uexarentur. quando quidem nulli dubium est, per tot angiportus tenuesque anfractus ab ore in mamillas pilum nequaquam duci posse, etiam si illud mamillæ, quum in ipsarum consisteret uenis, amplexuræ essent. Est enim id Aristotelis commentum, ipsi ab anu quapiam persuasum. Quamquam fortassis, ut in renibus urinariisque meatibus, quid pili simile in mamillis progigni posse, non omni ex parte uideatur absolum. Cutis mamillæ obducta, reliquæ thoracis cuti congruit: mamillæ enim substantiæ, ut reliquo adipi, con nascitur, pariterque inibi crassa est. At ubi orbiculatim ad papillam nigricat, circulumque constituit, qui quædam Græcis nuncupatur, pertinacius maximæ in mamilla glandi con nascitur, uelut plurimum neruorum, & tenuium uenarum instar fibrarum albicantium interuentu. Quinetiam cutis hîc interdum tenuior quam alibi euadit, fungosum quippiam, ut & papilla, adipiscens. Huius namque substantia penis substantiæ accedit, hoc est neruæ quodammodo cuti intus spongiosa substantia oppletæ, quæ dirigi ac uicissim laxari non minus quam penis apta, & pari sensu prædita est. Obscuri illi tenuesque nerui ac prorsus fibræ modo albicantes, in papillam pertinentes meatus uenarum furculi sunt, multiplici serie inter glandulas excurrentes. Venæ porro mamillis exporrectæ, à triplici plurimum pendent radice. Axillaris enim uena thoracis amplitudinem egressa, ramum insignem in musculos pectori superstratos, & pectoris cutem ipsamque demum mamillam depromit. Quæ etiam elatiorem scapulæ sedem, & summum humerum implicat uenæ, deorsum in plerisque mulieribus ante sectionem conspicuos furculos in mamillæ cutem ipsamque mamillam deriuant. Apparent namque crebro mamillarum cutis uenæ in multis mulieribus, & potissimum quæ aliquando lactarunt, insignes, subuirides, & errabundo ductu, ut in sura & in cubiti interna sede, aut in temporibus, tortuosæ incedentes. Porro uenæ mamillarum à tertia radice principium ducentes, non perinde in cutem atque priores, sed in mamillarum substantiam penitus excurrunt, arteriis concomitata perquam gracilibus. Hæc namque uasa germinant uenæ ac arteriæ à iugulo deorsum sub pectoris osse exporrectæ, & inter cartilaginum interualla ramos pectori incumbentibus musculis & hinc mamillis diffundentes. Atque hæ præcipuæ sunt uenæ in constructione mamillarum animaduertendæ, quando quidem harum interuentu uterus cum mamillis consortij lege afficitur. Hæc namque mamillarum uenæ & arteriæ (si modò quæ illis dispergantur) à iugulo, uti in uenarum & arteriarum serie docuimus, pronatæ, eosque quos diximus ramos per cartilaginum interualla germinantes, deorsum sub pectoris ossis lateribus prorepunt, atque thorace excidentes, super anteriorem peritonæi transuersorumque abdominis musculorum sedem rectis musculis exporriguntur, horum posteriori sedi innatæ, frequentesque soboles, donec ad medium illorum longitudinis deuenerint, huc illuc utrobique emittentes. Porro hæ iuxta umbilici sedem alias uenas & item arterias sub rectis musculis sursum conscendentes operiuntur, atque cum illarum ramis ita implicantur, ac si utriusque manus digitos inuicem infereres, neutiquam enim osculis suis ita conuiuent, ac si utriusque manus digitorum apices è directo, non autem ex latere unā commiteres. Hæc uasa sursum potentia ea demum sunt, quæ à grandioribus cauæ & arteriæ truncis per inguina crus accessuris principium assumere, in tertio libro commemorauimus. Quæ & si ab eadem cum uterum petentibus uenis radice non enascantur, adeo tamen utero accumbunt, uicinaque sunt, ut qui hîc in uteri uenis coaceruatur sanguis, illis uasis excipi, sursumque ferri posse credatur, aut suis osculis sanguinem à descendantibus sub

Libro 7. Historia de animalibus.

Papillæ substantia.

Venarum mamillam petentium series.

c 25 fig. C. d 25 figura D, D.

e tabulæ figuræ 21. f 22, 23 figura 99.

g 3 fig. cap. 49 lib. 2 E. E, F.

h fi. ca. 6 li. 3 parum supra m eductur P. & hic 25 fi. B. i 3 mus. tab. Δ. 5 ta. r. 7 tab. L. k 25 fi. A, A. l fi. ca. 6 li. 3 L. aut 2 fi. lib. 6 B, C.

m Specta 6 muscul. tab. a, e, f. & fi. cap. 6. lib. 3 L, M, r. & fig. cap. 12 li. 3 G & 7. n 6 muscul. tab. Δ.

o 25 fi. uteri uenæ & notatur, illi autem ascendentes ramus.

pecto-

p. 2 fig. ca.
u. lib. 4.

pectoris osse uasis, accipientia ad uteri uenas ac arterias diffundere. Verum hæc ad uenarū & arteriarū in tertio libro traditarū seriem spectāt, quæ in præsentī uenit adeunda, hoc paradoxo non postposito, paucissimas prorsus uenas ab illis quæ sub pectoris osse porriguntur, in mamillas diffundi, & arterias adhuc multo rariores, & si ausim dicere nullas. Nerui mamillarum ab illis pendent, qui subditis musculis exporriguntur, neq̃ aliter hi in mamillarum quàm reliquam thoracis cutem deriuantur, præter^p unicum qui subinde ex quinto costarum interuallo papillam adit, multosq̃ surculos ipsi offert. Quàm uerò singula primario mamillarum muneri idonea rerū Opifex iustissimè fabrefecerit, intelliges, si seorsum unumquodq̃ suo usui adhibueris. Ac præcipuum quidem mamillarum officium in omnibus animalibus quæ animal concipiunt, & animal in lucem edunt, censendum est, tenero adhuc ac iam nuper nato foetui alimentum præparare: quemadmodum uteri munus est semen concipere, foetum que tantisper dum absoluatur continere. Non autem in hoc præcipue, quanquam in quarto de Animalium partibus libro Aristoteles hoc innuit, ubera creauit Natura, ut cordis sedem operiant, & deinde in mulieribus secundario, aut illis abutente Natura ad lactis generationem, & ad ipsum continendum facerent. Quandoquidem plerorumq̃ animalium & uirorum puerorum que mamillæ ad lactis primò generationem, dein uerò ex positu, quẽ non solum in homine commodum, sed & necessarium in pectore obtinuerunt, cordi uelut propugnaculum eas effici documento sunt. Quum enim neque pueris neque alicui animali ad generationem nondum apto mamillæ exurgant, sed ueluti notæ cuiusdam gratia absque peculiari aliquo in illis corpore, quo à reliqua inter cutem & carneam membranam pinguedine discerni possint, duntaxat in illis habendæ sunt, certum est, eas primò non propugnaculi uice fieri: nam in illis animalibus ac pueris mamillæ neque copiosiore adipem, neque glandulas, neque aliud quippiam præter teneram papillam habent, quo propugnacula illis quibus incumbunt organis meritò dicerentur. Ad hæc, si quod incrementum in uiris mamillæ recipere apparent, & quasi alterius cōmodi causa, quàm notæ cuiusdam habendæ sunt, id illis magna ex parte prouenit peracto anno bis septimo, quum primū genitale semen ferre ac pubescere incipiunt, ut stirpes semen laturas primū florere nouimus, adeò sanè ut lactis gratia potius quàm propugnaculi intumescere, effcinationes que ipsis mamillas fieri constet. Nam & lac nonnullis uiris post pubem exprimi, & per suctum frequentiore uel multum prodisse, Aristoteles ipse asserit, & nos quoq̃ non semel id conspeximus: uerū hoc potissimum accidit iunioribus & senioribus uiris, quibus mammae redduntur conspectiores, præcipue si humidiores, leuiore, neq̃ amplis uenis sunt, eorum que ipsorum ijs magis qui fusci quàm candidi sunt. Quòd uerò mamillæ homini, quemadmodum & simiæ, in pectore collocentur, non ita autem cæteris: præter hoc quod brachiorum manuum que operationes non impediunt, latum que pectus, neque ut reliqua ferè animalia in acutum prominēs habeat, mulier puerum lactans abundè indicat, nobis que in illo officio uarijs coniecturis colligere promptissimum est, mamillis commodiorem regionem sessili animali & manibus usuro (ut interim ueneris præteream usum) anteriori thoracis regioni nullam excogitari posse. Nam hic situs lactis generationi propter cordis calorem non est ineptus, & ex abundanti mamillæ cordis propugnaculum & uallum quoddam censi possunt, homini imprimis pectus exporrecturo, neque illo cæterorum ferè animalium modo humi reclinaturo. Deinde & situs hic reciprocum quendā calorem (qui tamen magis necessarius uentriculo & intestinis fuisset) cordi retribuit. Mamillæ enim lanei penicilli, aut uestis, aut ipsius in corpore adipis, aut carnis ritu à corde caloris officina prius excalefactæ calorem illum reprimēdo tegendoq̃ reuerberant. Item, cordis thoracisq̃ cōtinuum motum, cordisq̃ inexpugnabilem calorem ad lactis generationem plurimum conferre, qui concoctionis alterationisq̃ naturam perspectam habet, absq̃ negocio colligit. Porro mamillas homini elatius, cæteris uerò animantibus humiliter ex Aristotelis & Galeni aliorūq̃ philosophorum & medicorum suffragio collocatas esse propter alimentum, aut ut ipsi dicunt, excrementum quod in lac conuertendum erat, penuriam: nō omni ex parte sanum esse arbitror. Primum enim huc scopum dirigūt, quòd foetus in utero inferioris corporis partis excrementitium sanguinem in nutrimentum assumit, mamillæ uerò ad lactis generationem sanguinem præcipue superioris partis. Dein adiūcūt, homini in elatiori parte mamillas reponi, cæteris autem animalibus non item, quòd his superioris partis excrementum in cornua & iubas, secus multo quàm mulieri absumeretur. Quasi uerò cerui, equæ, eiusq̃ generis animantia uenis quæ à iugulo deorsum sub pectore feruntur magis ac homines carerent: & in illis ex superioribus corporis partibus ad uterum sanguis minus quàm mulieri possit transsumi: & non multo plus mulieri, depili aliàs omnino, excrementum in longissimos capitis crines, quàm alijs animalibus in cornua & iubas pro proportionem deperiret. Sed profectò hæc Aristotelis ratio illi correspondet, qua innu-

Mamillæ
nerui unde du-
cantur.

Mamillæ
munus & offi-
cium, ipsarūq̃
constructionis
ratio.

Situs ratio.

Aristotelis problema
notatum

mera de menstruis purgationibus problemata, nescio an tam uerè ac audacter medici & philosophi soluunt. quum inter reliquas huius generis quæstiones, quam ob rem animalium sola mulier, & fortè equa, menstruo laborent sanguine, interrogant, ac intrepidè uulgo imponentes asserunt, alijs foeminei sexus animalibus in pennas, crines, cornua, squammas, eam menstruam purgationem absumi: in muliere uerò, utpote læui ac depili, singulis mensibus defluere. quasi uerò nō frequentioribus & procerioribus plumis gallus quàm gallina, & in reliquo auium grege masculi magis quàm femellæ ornarentur: deinde illi solidiores maioresque ungues, & cristam (qua aues ornantur) longè proceriorem maioremque obtinerent. Ac dein quasi leo non hirsutior læna esset, & ampliori longiori que cauda & iuba equus quàm equa. & in ceruorum sexu & boum non tam pilorum quàm cornuum frequentia, & proceritate, nulla planè esset differentia: & quasi mulieris ad talos usque pendens coma, qua sponfas apud nostras crines, acrium medicaminum ui, Italarum more haudquaquam erodentes, uelut chlamyde obtectas indies uidere est, non uiri omnes pilos sæpe etiam mole superaret. Verum hæc aliò spectant: quemadmodum & illud, cur mamillæ mulieribus maiores quàm uiris obtigerunt, ac pro-

Formæ ratio.

inde reliquam constructionis mamillarum rationem aggrediamur. His forma exterius rotunda, ut minus iniurijs essent obnoxia, perquam idonea fuit: intus uerò ea parte qua pectori committuntur, planas latasque meritò illas fecit Natura, ut firma niterentur basi. Teneram quoque & prominentem meritò adipiscuntur papillam, ut hanc angusto tenero que infantis osculo inditam, is confestim labijs molliusculis constringat, & inferiorem deducens maxillam, & buccas contrahens lac attrahat, deinde instar canalis linguam inflectens ad stomachum, à nemine interim edoctus, propellat. Ut uerò in illo suctu papilla turgidior proceriorque quàm aliàs dum minimè opus est redderetur, similem cum pene possidet substantiam, quæ & laxari concide-

Papillæ constructionis & totius substantiæ eiusdem ratio.

re que, & rursus à suauis contactu intumescere erigi que idonea censeretur. Papilla autem sensu exactiori, & neruorum furculis abundat, ut mamillis hac quoque ex parte cum genitalibus esset affinitas. Ut enim illis ad uenereum congressum generis que propagationem, illecebram ac uoluptatem indidit Natura: sic quoque & uberibus, & potissimum papillis, ut in lucem iam editus foetus tenerulo & nondum dentato ori papillam lubentiùs mater titillandam prurientem que inderet, ac sugendam offerret. Mamillarum uerò glandulosa substantia eius est ad iustitiam temperiei, ut in uenis adductum sanguinem in lac familiare hominis alimentum conuere-tere concoquereque possit. Venæ etiam non minori industria ex remotis longisque partibus multis anfractibus, ut sanguis melius mamillis præpararetur, sunt porrectæ: quod non tam necessario atque utiliter accidit. Necessario quidem, quoniam (& si secus Galeno uisum sit) succinctiori quàm nunc uia uenæ mamillis non potuissent deduci. Quo pacto enim, quæso, à uena caua, quæ inter septum transversum & cordis auriculam nulla suffulta basi uena quæpiam rectà sursum inter costarum interualla ad mamillas (quod Galenus facile factu arbitratur) commodè deduceretur? Primū enim nō ut reliquæ cauæ uenæ caudex, hæc crassam fieri oportuit, ac proinde fuisset inualida, neque cartilaginum interualla tantam uenam indemnem admisissent, sed continuo comprimerentur, & ipsa tutius non firmata in thoracis motibus ilico diuellerentur, sanguinisque eruptionis periculo homines semper fuissent obnoxij. Verum exacta uenarum inter dissecandum ductus consideratio facile argumēto est, neque ab illis quæ in brachium feruntur uenis, in mamillas furculos commodius quàm nunc posse porrigi, multoque minus à caua & arteria magna, nisi à iugulo ubi hæ pectoris ossis summum contingunt. Quis uerò inflexionum & errantis itineris uenarum, & harum quidem frequentium, non autem unius grandioris ad mamillas ductuum usus sit, uenæ ac arteriæ seminalium & aliorum uasorum materiam ab alio organo concoquendam deferentium errabunda itinera & gyri commonstrant. Quid porro ualeat uteri cum mamillis communio, ac proinde uenarum à mamillis ad eas quæ prope uteri uenas enas-

Uteri cum mamillis communio ratio. Lib. 4. de Generatione animalium ca. 8.

scuntur congressus, is demum pernoscit, qui ex Aristotele lactis generationē usumque, & lactis ad tenerum adhuc infantē alendum, necessitatē perdidicit. Primū enim inter mamillas & uterū mirificum esse consensum, præterque quod simul cum utero mamillæ exurgunt, quotidiana in abortibus, & quū secunda ualetudine foetus fruitur, experiētia erudit. Neque id profectò iniuria, quū ad unū opus faciendū uterū & mamillas cōparauerit Natura: uterū quidē, ut & antea diximus, ad semē cōcipiendū, absoluendūque foetū: mamillas uerò, ad foetū recēs in lucē proditū alendū. Atque hæc sanè cōsortij legē uenarū arteriarūque mutuus congressus ductusque efficiūt, que necessaria est, ut quādo foetus in utero auget efformaturque, illi soli alimentū ex utrisque suppeditatū uenæ deriuēt: ubi uerò in lucē editus fuerit, totū id rursus mamillis influat. Vnde etiā fieri nō potest, ut simul & menses probè defluāt, & mulier lactet. Alterū namque membrū semper siccescit, dū sanguis in alterū declinat, deferturque. Sanguinis autē dum utero gerit mulier, ad mamillas re-

fluxus

q5 fig. lib. 6
inter D per
Cad B.

r fig. cap. 6
lib. 3 M.

s. 25 fig. n. 9.

t. 1. uere 6
muscul. tab.
4, 5, 6.

fluxus, priusquā parit, iam diu ad hunc modū incipit. Antequā mulier conceperit, & floridæ tamen sit ætatis, sanguis ille singulis mēlibus profluit; ex quo foetus, ubi mulier cōceperit, alimen tum allicit. Cæterum uenæ indidem ad uteri latera consitæ, tam latæ, tamq̃ proluxæ frequen tesq̃, ac sanguine turgidæ sunt, ut efformatum iam foetus, & augmēto duntaxat indigentem temporis successu affatim enutrient, & nonnihil semper superflui colligant: quod in illis colle ctum, aliò regurgitat, regionem quærens, in quem commodè transmigret. Commoda autem regio sunt (sed ad hoc famulante Natura, & peculiari indita ipsis ui) uenæ secundum rectos abdominis musculos sursum conscendentes, & ad illas accedentes, quæ sub pectoris osse deor sum excurrunt, illæ nanque suum sanguinem in has deponunt, & lac mensibus (ut diuinus aie bat Hippocrates) germanum efficiunt. Quod autem, ut Galenus asserit, uteri uenæ in quo su perfluum id reponerent, nullam commodiorem regionem habeant, falsum est, nisi diuinæ cui dam ac peculiari operationi tantum munus ascribamus. Venæ enim quæ in crus pertinent am pliores, & rectæ magis deorsumq̃ protensæ sunt: aut etiam ut inter conceptionis initia, aut quum mulier uterum non gerit, per uteri uenas sanguis is abundans menstruarum purgatio num modo effluere posset. Et adhuc minus ueritati consonum est, uentris in utero gerentibus molem comprimendo ad sanguinis illius ad mamillas influxum quicquam auxiliari, nam lu culentissime recti abdominis muscoli, dum foeta rescindimus animalia, compressi, admodumq̃ latiores redditi, mirum Naturæ opus nos exosculari cogunt, quo sursum siue per uenas cuti proximè subditas, siue eas quæ rectis exporriguntur musculis, crassior ille sanguis per compres sas angustasq̃ uenas, & etiam plus quàm non prægnante muliere inflexas tanta copia regur gitat. At in hunc modum de mamillarum usu sermo plus satis excreceret: quod ne fiat, nunc opportunum erit omnium quæ hoc libro perstrinximus organorum dissectionem quàm ac curatissime subiungere.

QUONIAM PACTO ANATOMEN AG

gredi conueniat; & priuatim omnium quæ hoc libro commemorantur partium administrandi ratio. Caput XIX.



OO Caput, ac dein postremum sexti libri, & postmodum septimi penul timum lubens ita accōmodarem, ut singula capita eorum organorū quæ suis libris tractantur secandi artificium sic persequerentur, ac si quis hæc duntaxat in aliquo corpore intueri, aut alijs commōstrare proposuisset. Deinde ea Capita ita uelim descripta, ut si simul nexa fingerentur, instar li bri cuiusdam essent uniuersum secandi artificium complectētis: quo quis probè in Anatome uersatus, apud studiosos in publica sectione uti pos sit. Quamquam enim priuatam & inter paucos exhibitam sectionem, publicæ præferendam ne mo ambigat, quum tamen omnibus nō suppetat corporum copia, multoq̃ minus peritior ali quis, qui ad cuiusque uota sectionem aggredieretur, in promptu semper sit, publicam quoque sectionem à studiosis summoperè expetendam duco, ut ipsi uel obiter in ea spectatorum turba edocti, si quando in cadauer incidant, proprijs manibus administrationem accuratè obeant, & studia inuicem conferentes, hanc medicinæ seu naturalis philosophiæ partem debitè ample xentur: idq̃ potissimum in nostra huius seculi felicitate, quando unà cum cæteris disciplinis, Anatome prorsus sopita, eousq̃ promouerit, ut omnia quæ hoc opere persequor, una eademq̃ hyeme & Patauī & Bononiæ in ea spectantiū frequentia ad eum modum non semel aggressus sim, quo præsentem septem libros digessi. Primum enim adhibitis studiosorum & mea opera uariorum hominum senum ac iuuenum, mulierum & uirorum ossibus, compactis & dissolu tis, simul cum simiarum & canum, aliquotq̃ aliorum animalīū ossibus, Galeni librum de Os sibus ad eos qui introducuntur, prælegi, ac ossium cartilaginūq̃, seu eorum quæ fulcrī mo do humanam fabricam sustinent, ac quæ reliqua describuntur cognitionem unà absolui. mox omnium musculorum & ligamentorū pariter, ac omnium quæ secundo pertractantur libro, fa bricam persecutus sum: priori lectione studiosos admonens, quo nam loco Galenus eos quos sequenti lectione ostensurus eram musculos describeret, atque quum longius duxissem Galeni uerba prælegere, ante sectionem, ipsius sententiā semper recensui, ac postmodum hominem & canem, & quum obtigit, simiam in omniū præsentia secui, sedulò omnia uti à me describuntur commonstrās. Absoluta musculorū historia, in eodem corpore in quo illos administraueram, uiscera, & quæ uulgò in tribus uentribus cōtineri dicimus, obiter ostendi: spectatorū animos ad uenarum, arteriarum & neruorum disciplinam hac ratione parans, qua ante musculorum doctrinam ossa aggredior, ut scilicet uenas postmodum, arterias & neruos commodius in alio

Ordo in A
natome docen
da obseruan
dus.

corpore tunc pertractare, ac pariter in eodem quæ ad interiora spectabāt ad amissim absoluerem, ante sectarum partium ostensionem earum fabricam ad eum modum semper docens, quo illam his libris cōmemorare adnissus sum. Quo autē modo quis hæc omnia obiturus sit, partim in primo & secundo recensui, partim uerò hoc capite & in calce subsequentiū librorum complectar. In primo enim libro ossium parandorū rationem, in secundo autem musculorū disse- candi in uno corpore methodum persequabar. At hic me negotio ita accingam, ut etiam hæc omnia in uno tantū cadauere, si modo in corporum penuria id opus esset, administrare queas: ac rursus, si uelis, priuatim singula in uarijs cadaueribus perficias: quod longè etiā est cōsultissi- mum, ne eorundem organorū partium ue series interturbetur, ac uenas quū musculi ostendun- tur, aut quum neruos tractas, musculos explicare tenearis. Corpus itaq; publicæ sectioni adhi- beri conuenit, in suo sexu quā temperatissimum, & ætatis mediæ, ut ad hoc tanquam ad Po- licleti statuam alia corpora possis cōferre. In priuatis autem sectionibus, quæ crebrius accidunt, utile erit quoduis aggredi, ut cuiusmodi id quoque sit expendas, corporumq; differentiam, ue ramq; multorum morborū naturam assequaris. Theatrum porrò ac mensam cui cadauer im- ponetur, earatione confici curabis, qua hanc tibi commodiorem, illud uerò excipiendis specta- toribus aptius fore duxeris.^b Instrumēta autē operi adhibenda, in secundo libro utcunq; recen- sui. Quum itaq; in uno corpore omnia absolueri necessum est, neq; seriatim, ut in his libris do- cemus, singula pertractare licet, de corporis humani fabricæ cognitionis dignitate & usu quæ- dam, si uisum fuerit, leuiter præsentī sceletō præfaberis. uix enim hodie ulla est Academia, quæ non unum atq; alterū habeat, quod sectioni semper utilissimè adhibeatur. Cadauer autē ipsum postquam hominem à cæteris animantibus distinxeris, in caput, corporis truncum, manus & crura, oratione diuides, aut tres ipsius sedes uel uirtutes constitues, quæ singulæ singulis secun- dū Platonis præcipuē sententiam dicantur animis, atque his sedibus & generationis organis postmodum manus cruraq; adijciuntur. Mox licebit accuratius corpus distinguere, & exte- riorum partium nomenclaturam studiose recēdere, quam ex uarijs Galeni & Aristotelis locis, deinde collectim ab autore Introductorij seu Medici, & Iulio Pollice, & cū alijs plerisq; Geor- gio Valla petes: quanquam & ego passim in primo libro Ossium nomina perstringens, earum uocum non pcenitendam supellectilem collegerim. nomina enim superficialijs sedibus indita, etiā ossibus ferè adhibentur. Vnde etiā aliquando in cadaueris cute ossium delineationē in sua sede pinxi, quò ita aptius idem nomen ossi partiūq; quam os occupat accōmodatum ostenderē. His nomēclaturis adnectes partiū differentia, eas in similes ac in strumētarias subdiuidentē. atq; hic utile fuerit cōmemorare, quæ nam partes in harum illarū ue classem reponantur, nō neglecta cōmuni cuiusq; partis descriptione: quam & hic noster labor affatim suggeret, si mo- do singulas descriptiones in suis locis requirere nō grauaberis. Partium nanq; enarrationes ab ipsarum descriptione ferè auspicatus sum, uti etiā inter dissecandū cōsueui, quū seriatim omnia aggredior, & quam doceo partē in alio animali nudā ostendere conor: quod etiā nunc accepto cane, aut agno, aut alio quouis paratu facili nō absq; spectantium usu præstiteris: si modò quid os, cartilago, fibræ, ligamentū, adeps, caro, glādosum corpus, deinde quid musculus, eneruatio seu tēdo, aliq; musculi partes, uena, arteria, & neruus sint, lubeat docere, ac mox quo pacto ma- gis instrumētarię partes cōficiantur ostēdere. hæc enim nō inopportunè generatim, uti dicebā, in animali quopiā (ne hominis corpus hac occasione uicies) cōmonstrātur, quò minus earum partiū ignorātia in cuiusq; membri instrumētijq; enarratione spectatorē remorētur, & ipse nar- rationis seriē cogaris interrūpere. Porrò differentias, quæ inter enarrandū à partiū usu, ut quòd quædā ad uitā, aliæ ad speciei successione, aliæ ad bene uiuendū faciant, aliæq; eius generis diffe- rentiæ, quæ huc quā plurimæ referri possunt, in præsentia neutiquā propositū est recensere, quod huiusmodi passim in singularū partiū capitibus satis prolixè doceā, quodq; hic sectionis rationē mihi explicandā potius q̃ illum in cathedra citra partiū cognitionē, ac ex aliorū libris duntaxat philosophandi modum cōmemorandū assumpserim. Illā itaq; aggressurus, studiorū sodalibus potius quā ministris, qui secantē adiuuent, adhibitis, acutiori nouacula orbicularē sectionē secundū umbilicū adeò profundā duces, ut cutem penetret, dein à media pectoris ossis longitudine rectā sectionē ad umbilicū usq; molieris, & ab infima umbilici sede perges ad pu- bis usq; mediū uirilīs membri (si modò uiri cadauer ad manū sit) radicem cōtingēs: aut, si mulie- ris corpus secas, quousq; pubis ossis sedē inter uulvæ ceruicis colliculos superaueris, ut scilicet à pectore ad pubē usq; una quasi sectio (integrali interim umbilico) pertingat. Post hāc, utrinq; ab umbilici latere sectionē trāuersim ad lūbos usq; duces, id interim studēs, ut solā cutē pertun- das, quod in homine, et potissimū obesiore, factū non adeò est arduū, quum adipis crassities, ne carnosam uitēs membranā, promptē remoretur. Factis hunc in modū sectionibus, cutis an- gulum

Cuiusmodi
corpus sectio-
ni adhiberi cō-
ueniat.

Quum in uno
corpore om-
nes partes
sunt ostenden-
dæ, à quibus
tractatio sit
inchoanda.

Cutis, cuticu-
la, adipis, &
carnosa mem-
brana in abdo-
mine admini-
stratio.

a Bononiæ
& Patauij
tale parau-
imus, quale
ex dimidia
parte, hu-
ius libri
frons pro-
ponit.
b fig. cap. 7
lib. 2.

gulum, qui ex quatuor rectis angulis umbilicum spectantibus superior dexterq̄ est, hamulo, aut summis sinistrae manus unguibus attollito, acutissimaq̄ nouacula cutem ab adipe secernere studeo. Vbi cutis portiunculam liberaueris, hac sinistra manu eleuata, reiectoq̄ hamulo, paulatim cutem ad mamillas usque uersus dorsum transuersis sectionibus proximè ad cutem factis, ab adipe diuides. Hac abdominis thoracisq̄ parte à cute nudata, reliquæ tres pari modo sunt detegendæ, ac cutis & cuticulæ (quàm *ὑπόσπινδα* Græci uocāt) natura uenit inquirenda, quæ in cute quidem absque alio negotio sese offert: cuticulæ uerò non nisi illam ardentis candelæ, quam cuti adhibeas, uel uesiculæ modo à cute abscedere cogas. Cum cute deinceps & uenis sub ipsa secundum abdominis regionem, & ab imò sursum & à pectore deorsum excurrentibus adipe quoque examinata, si hac homo (uti ferè solent omnes diuturniori morbo non enecati) abundet, illam quemadmodum iam cutem ab adipe liberaasti, à carnosa membrana seiunges. quod sanè nisi acutissima nouacula nunquam aptè confeceris. Si uerò macilentius obtigerit corpus, adipem carnosæ membranæ adhærere sines. adeps enim tunc quòd nullam obtineat crassitiem, quo minus carnosioris membranæ natura in cōspectum ueniat, nihil impedit. Vtunque feceris, siue adipem abraferis, siue adnatam membranæ reliqueris, iisdem per membranam ductis sectionibus, quas à pectore ad pubis os, & ab umbilico ad ilia in cute faciendas retuli, harum quoque sectionum anguli hamulo sunt seriatim eleuandi, & ipsa membrana retusiori si lubeat nouacula, aut digitorum beneficio à subditis corporibus separanda, ut iam simul cum magna thoracis parte uniuersum abdomen cute adipe & carnosiori membrana detectum occurrat. Ad hunc sanè modum administrationem in scholis subinde sum aggreffus: quanquam si quis uelit, integrum etiam sit in una tantum abdominis parte cutem, adipem, & carnosam membranam examinare, & à reliqua abdominis sede cutem simul cum adipe & membrana absque ullo artificio laniorum ritu auellere. Verum de harum partium natura, adeoq̄ administratione, in secundo libro egi prolixius, in eodemq̄ libro rationem qua optime^d abdominis musculos, qui utrinque quatuor sunt, aggrediaris, & peritonæum nudes, do cui: dum duplici ratione abdominis musculos dicerem refecandos, in uno quidem latere sectione ab abdominis medio uersus musculorum origines inchoata, in qua primum abdominis musculus oblique descendens, ab ascendente oblique aufertur, mox is à recto & transuersim ducto abdominis musculo, dein rectus à transuerso, recti interim insertionem à costarum cartilaginibus liberata. Alteram sectionem à lateribus ad abdominis medium faciendā præcepi, quæ etiam oblique descendente ab oblique ascendente aufert, & dein hunc ascendente à transuerso ac recto, & rectum insuper à transuerso, & postremò transuersum à peritonæo liberat, sectionis uidelicet serie ad abdominis medium deducta. Ac proinde si seriatim singula in uno corpore ostendere animus est, ex secundo libro abdominis musculorum administratio petenda uenit, quæ nunc prosequar præcedens. In hac etiam priuatim^f uenarum & arteriarum & neruorum series est examinanda. uenarum quidem ac arteriarum, quæ à pubis regione sursum secundum rectorum musculorum posteriorem regionem uersus umbilici sedem contingunt, & eas quæ à pectore huc quoque contendunt, & in proximas sedes quemadmodum illæ furculos utrobique deriuant: neruorū autem ab illis productorū, qui costarū spuriarum interuallis offeruntur, & à lumborum uertebis ad abdominis musculos (ut suo loco comprehensum est) uariè dispensantur. Cæterum transuersis musculis undecunque à peritonæo liberatis, tota ipsius propemodum exterior superficies oculis obijcitur, omni enim ex parte euadit conspicua, præterquàm quæ^k septo transuerso obnascitur, & quæ ex uertebis & osse sacro originem ducit. Cæterum hominis peritonæum natura infirmius est, quàm ut leui negotio id undecunque à septo dirimi queat: quamuis interim solius manus beneficio peritonæum dum adhuc integrum est, ad spinam usque à subditis illi musculis, & nonnihil quoque à carnosa septi sede liberetur, & sphaeram planè oblongam referat. Porro si minori negotio peritonæum penitus à septo auellere uisum sit, id in porcellis præstiteris commodissimè, si postquam (ut in homine) à peritonæo transuersum abdominis musculum seiunxeris, id à carnosa septi parte tuis digitis, cultri uice sensim separare studeas. ita nanque à neruosa septi transuersi parte peritonæum abscedet: & si deinde in opere perrexeris, ab uniuerso uentriculi corpore ad omenti^m usque membranas, deinde & à iecoris gibbo peritonæum auelles, discēs quo nam pacto id illis organis tunicas inuolucraq̄ offerat. Postquam diligenter peritonæum exterius cum suis foraminibus, uenis, arterijs, neruisq̄ perpenderis, nouacula aut cultello à sinistro mucronatæ cartilaginis latere deorsum ad sinistram usque umbilici sedem sectio in peritonæo ducenda est, mente adhibita, ne altius cultello impacto quicquam subditorum uulneres. Hinc ab umbilico eandem sectionem modicè sinistrorsum inclinantem ad pubis

Venarum per abdominis regionem inter cutem & carnosam membranam excurrentium.

Octo abdominis musculorū.

Venarum, arteriarum, neruorum per abdominis musculorū repertium.

Peritonæi à partibus extrinsecus ipsi commissis liberatio.

Asperio peritonæi, et uasorum umbilici administratio.

c. fi. ca. 6 li. 3 a radicib. uenarū L. 5 r.

d. 3 mus. ta. 6. 4 ta. II. 5 ta. Δ. 6 ta. Δ. e ut in 1 figura.

f. fi. ca. 6 li. 3 ab L et r. g. fig. ca. 12. li. 3 a G et r. aut in 6 muscul. tabula a, e, f. h. 2 fi. ca. 11 lib. 4 8, 2, char. 50, 51 etc. i. Quemadmodum 1 fig. h. 7 muscul. tab. Δ. l. 7 muscul. ta. t, u, x.

m. Quemadmodum in 17 fi. h. ab l di. uulsum est.

bis usque os (ut aliquo intervallo ab ipsius medio in sinistrū latus deuiet) tentanda est. Insuper in hac sinistra peritonæi parte è directo umbilici sectionem uersus sinistrum ile molieris, & superiorem eius peritonæi partem ad costas, inferiorem uerò uersus coxam reflectes. Leuata autem nunc sursumq; nonnihil reuoluta, seu dextrorsum inuersa peritonæi dextra parte, uenæ ex umbilico in iecur pertingenti animū adhibebis, quæ potius funi multo adipe oblito, quàm uenæ respondet. Hanc quæ iecori proxima est, & ubi duntaxat à peritonæo abscedit, sinistra manu apprehendes, & acutiori cultello inter ipsam & peritonæum iniecto, transuersis sectionibus eam ad umbilicum sensim accedens à peritonæo diuides. Quò quum perueneris, intacta uena, ab umbilici dextro latere ad ilia usq; sectionē in peritonæo duces, eam peritonæi partem, quæ nunc libera est, super dextri lateris costas reflectens. Cæterum iam adhuc una peritonæi pars, quæ in dextro latere inferior est, umbilico cōnata manet, nōdum ue libera pendet. quare ut & hanc liberes, neq; aliquid interim uities, umbilico sinistra manu comprehenso, ab ipsius dextro latere, sectio in hanc peritonæi partem ad pubis usq; os facienda est, quæ digitorum aliquot latitudine à pubis ossium^o commissura in dextrum declinet. Inuersa modò peritonæi partícula, quæ triangularis adhuc ab umbilico ad pubis os ac uesicæ fundum pertinet, tres quasi funiculi inuicem appositi, atque illi peritonæi parti interius adnati uisuntur, qui studiose cultello acutiori ab ea sunt diuidendi, ipsiq; funiculi inuicem attentè dirimendi ueniunt, ne in homine uersus pubis ossa nimium liberè sectionem producents, uesicæ fundum uulneres. Homi-
nis nanque uesica, eo quòd tota anteriori sede peritonæo connascatur, multaq; pinguedine obducatur, ita rudibus imponit, ut hic uesicam reponi ignorent, uesicam quærentes, quæ ipsis in hominibus perinde atque in bobus & canibus occurrat. Quum itaq; hæc nō oscitanter expendis, medium funiculum uesicæ fundi medio innasci, & nusquam à peritonæo abscedere obseruabis: reliquos autem duos secundum uesicæ latera deorsum, penitusq; ad arterias per pubis ossium foramina in crus delapsuras porrigi conspicias, modò eos à peritonæo acutiori cultello ad illorum usque insertionem liberare non pigeat. Medius funiculus, meatus est, quo è uesica, quū utero gerimur, urina in mediā foetus tunicā, quæ à farciminis specie nomen inuenit, excernitur. Reliqui autē duo, arteriæ sunt, quibus naturalis foetus calor recreatur. Verum neq; hæc tria corpora, neq; id quod iecori inseritur, ullam nunc cavitatē habere uidebuntur, sed planè emortua aridaq; & multo adipe enutrita apparebunt. Vnde etiā alios Anatomes latuerunt proceres, ea omnino aboleri in natis hominibus, quemadmodū in canibus ferè accidit, asserentes. Cæterū posteaq; uenæ ab umbilico iecori insertæ implantionē sedulo in spexeris, integrum est, eam cum umbilico, quem hactenus seruasti, deinde & tres alios funiculos rescare, animaduersoq; peritonæi ad uesicæ fundum^s connexu, sectionem ad omentum cōferes. Reliqua enim quæ in peritonæo adhuc uidenda supersunt, nisi paulatim organa hoc obcincta abstuleris, uidere nequis. Porro priusquam aliquid loco dimoueas, omenti situs uenit obseruandus, num scilicet ut in canibus & porcis, atque adhuc multo magis in simijs, ad pubem usq; id sub uesicæ posteriori sede^t exporrigatur: an uerò (uti frequentius obseruatur) uersus sinistrum latus^u reuolutum, sursumq; etiam supra mediā intestinorum sedem contractum occurrat. Si postremum illud inueneris, utraque manu humiliter omenti extremum modicè eleuabis, ac sensim æqualiter deorsum detrahens id omnibus intestinis ad pubis usque os obtendes. ita enim quantum sit, quodq; interdum^x ad inguina & scortum & inter uesicam & uteri ceruicem deuolui possit, condisces. Vt uerò omēti ad colum intestinū, quæ uentriculo id exporrigitur, connexū cernas, duabus rursus manibus humiliorē omenti finem sursum ad pectoris os attolles, & priusquam aliqua ex parte inferiorem omenti membranæ partem, quæ ueluti ex tertia coli intestini tunica enascitur, à colo disseces, omentum quàm possis maximè pectori obtendito, ac intestinorum situm summa qua poteris industria solis utens manibus inuestigato, & primū anteaquam alicuius intestini locum perturbes, ipsa ut se eleuato iam omento spectanda offerūt, ad amissim contemplaberis. ut quū cuiusq; intestini ductū didiceris, cui peritonæi regioni unumquodq; uicinius sit, in medicamentorum usu & affectibus dignoscendis perspectum habeas. Simulatq; igitur id accuratè neq; obiter profectò obseruaueris, dextram manum recti intestini^z quæ id ossis sacri incumbit initio, accommodabis, & sinistra manu tenuia intestina leuiter in dextrum deprimes, non quidem omnia, sed eorū partem quæ dextræ manui quum à recto conscendes, in progressu erit uicinior. Ad hunc itaq; modum sinistra dextræ famulati, à recto intestino sensim dextram colo ad mouebis, atque^a secundum ipsius ductum reuolutionesq; ad sinistri renis sedem, hinc ad lienem & fundum uetriculi pertinges. quò quum perueneris, mutato manuum ministerio, sinistra colum est apprehendendum, dextra uerò tenuia intestina in sinistrum modicè depellenda, quousq; omnē fundi uetriculi sedem, iecurq; superaueris, & colum sub dextri renis

*Umbilici uasorum præsecctio.
Omenti situs obseruatio.*

Intestinorum situm examen.

11. fi. F, G.

o ultimariū
figu. lib. 1. c.
p. 2 figura
M, K, L.

q. 2 fig. N.

r fig. cap. 12
li. 3 p. fertur
inter f. et r.

s. 2, 3 fig. O.

t Vt Q, Q
in 2 fig.
u Vt inferi-
or membra-
na c, c nota
ta in 3 fig.
x per q. q.
figura.
y Inter T et
L 24 fig.

z Ad T et Y
6 et 8 figu.

a Secundum
8 fi. T, S, R,
Q, P ad N.
aut 6 figur.
R, Q, P, N.

renis regionem (ubi finit) deduxeris. Huc enim quum pertigeris, sinistra manu colli terminum modicè subleuabis, ac ^b cæci intestini situ, formaq; similiter obseruata, manu dextra simul cum sinistra apprehēdes, & utrisq; manibus sibi proximis, iisdemq; ab intestinis nunquam remotis, à colo mox ductus ilei intestini, & dein ieiuni sequeris, quod factu longè est facillimum, usque dum perueneris ad ieiuni principium, quà sub colo retorquetur, ac dorso quodammodo aliigatum ^d duodeno continuatur. Quapropter ut uniuersus intestinorum ductus tibi occurrat, dextra adhuc ieiunum complecteris, sinistra uerò inter iecur & dextram uentriculi sedem intrudes, duodeni intestini inquirens prīncipium: quod ubi inueneris, deorsumq; secundum ipsius ductum descenderis, ieiuni intestini principium, & quæ illi proxima est pars, quamq; dextra adhuc amplecteris, etiam innotescet. Si modò lubet (quod & faciendum maxime consulo) poteris à ieiuno ad ileum, & hinc ad cæcum ac colum, & à colo ad rectum contrario ductu intestinorum situm secundò examinare, nulla interim (ne quid uulneres) facta auulsione. Perpenso intestinorum situ, ac ijs utcumq; in suum locum repositis, omentum rursus intestinis est obuoluendum, uentriculiq; iecoris & lienis situs uenit examinandus. Primum itaq; inter septū transuersum & iecoris gibbum, manum inferes, ut illius gibbum ^e ligamentaq; in cōspectū ueniant. ac quonam pacto ex præcipuo iecoris ligamento tenue ipsius inuolucrum nascatur intuearis, manum transuersim hinc inde ducens. Deinceps inter iecoris cauum & dextrum uentriculi latus sinistram manum, dextram uerò inter septum & latus uentriculi sinistram impones, paulatimq; inuicem adductis manibus, ad uentriculi ^f superius orificium accedes. quod in conspectum ueniet, si modò iecur sinistra sursum non nihil protruseris, & dextra uentriculi corpus deorsum compresseris, atque una eademq; opera iecoris cauum ac uniuersum ipsius situm obiter examinaueris. Præter hæc, ea quoque operatio uentriculi sedem etiam accuratè cōmonstrabit, dummodo hinc inde, nunc iecur sursum trudens, nunc uentriculum deprimēs, manus ducere non detrectes. Lienis porro sedem adinuenies, si inter sinistrū uentriculi latus & septum transuersum, sinistrā manū iminiseris, uentriculumq; cum colo intestino hæc excurrente, in dextrum latus attraxeris: siquidem tunc lienis superius & dimidium ipsius caui latus sese uisui offerunt, et si dextram manum inter lienem & septum transuersum mediam immiseris, lienemq; modicè eleuatum uersus uentriculum protruseris, ipsius quoque gibbum apparebit. Quo tamen hæc omnia leuiori negotio conficias, nō erit inutile interdum aliquod costarum interuallum arcto uulnere ad thoracis usque amplitudinem pertundere. Quum primum enim thoracem uulneraueris, septum transuersum deorsum concidens insigniter flaccescit, quantumuis etiam uehementer antea tensum, sursumq; attractum, iecur & uentriculum in thoracis amplitudinem sursum duxerit, difficilemq; horum inspexionem ob id parauerit. Cæterum iam omenti membranae inuicem sunt dirimendæ, quod fiet, si dextram omento subieceris, hæcq; inferiorem membranam, sinistra uerò manu superiorem apprehendere, trahereq; studueris. hæ enim ocyus inuicem dirimuntur, marsupij, seu sacculi speciem commonstrantes: qua uisa, inuicem membranas adeò diuelles, ut alibi lacerentur, commodeq; manum in illarum amplitudinem inferas, & utrinq; in lateribus, & humiliori omenti sine superiorem membranam ab inferiori ^g discerpas. Iam inferiorem membranam intestinis exporrectā sinere conuenit, & superiorem adeò pectori supertendere, ut elatius uentriculum è sua sede eleuet. quod si nō successerit, sodalis manu id facias oportet, ut cōmodè inferioris omenti membranae exortus, quæq; per ipsum ferunt organa in conspectū ueniant: ac discas pariter, quonam pacto hæc in hominibus colo intestino mesenterij uice sit, tota ea sede ^h quà colum uentriculi fundo attēditur. In hac enim membrana ubi uentriculo substernitur, minor portæ uenæ trūcus ferri, suosq; in quos digeritur ramos educere, apparebit. Deinde præter truncū conspicietur arteria, quæ lienī, uentriculo, iecori, bilis uesiculæ, & ipsi demum omento furculos deriuat. sic quoque & arteriæ radix, quæ superiori sede mesenterij disseminatur: deinceps & nerui duo, quorum dexter iecori bilis folliculo, & dextri fundi uentriculi sedi, & hac quoque parte omento spargitur, sinister uerò lienī & sinistri fundi uentriculi sedi, ipsiq; dextræ omenti parti distribuitur, & ante hæc omnia in humiliori omēti membrana, quà uentriculo subiacet, corpus glandosum, uasorum & neruorū seriem muniens cernitur. Hæc obiter, neque ullo adhibito cultro in præsentia sunt intuenda, manibus tamen summisq; digitis superior omēti pars diligenter est inquirenda: quam obseruabis, si ministri operæ uentriculo semper eleuato, ac uelut ad superiora truso, ab ipsius fundo deorsum uersus iecoris cauum, ubi omentum simul multa colligat corpora, & hinc per dorsum quà arteria magna septum permeat, secundum lienis cauū ad uentriculi fundum usq; deueneris. Hic enim superior est omenti circulus, & si illud saccum marsupium ue esse dixerimus, eius orificium. Quo nam pacto autem ipsius ortum adinuenias, paulo post dicam. In præsentia enim uentriculo in suum

Ventriculi, iecoris & lienis situs examens.

Quæ iecur, uentriculus, lien, uelut in thoracis cauitatem tracta, deorsum protrahi queant. Omentum quæ diuellendū, ipsiusq; ortus inueftigandus, una cum uasis illo suffultis.

b 6, 7, 8 fig. O.
c Ab N per
M ad L, K
u; 7 fig.
d 7 fig. ab I
ad K. 12 fig.
iub S.

e 6 fig. C. 12
fi. O.

f 12 fig. R.

g Corpus
ad imaginē
3 figure paraturus.

h A Pad Q
6 fig.
i Spectabitur omnia
que 3 & 4
figura characteribus
insignimus.

locum

*Quæ organa
in caua iecoris
fede posita
sunt spectanda.*

*Portæ rami
una cum arte-
rijs & neruis
illis attēsis quæ
examinandi.*

*Mesenterij
natura quæ in-
daganda.*

locum reposito, illum in sinistrum latus cum intestinis trahi^k curabis: iecur uerò, ut ipsius cauum adamussim uideas, in dextrum & uelut sursum protrudes. deinde postquam obiter bilis uesiculam contemplatus fueris, sectionem omnium totius corporis molestissimam maximeq; operosam aggredieris. Bilis namque meatus, & neruorum & arteriarum uenarumq; rami (qui omnes simul inferiori membrana omenti ad cauum iecoris colligantur) nunc ueniunt retusiori cultello examinandi, ne acutioris cultelli mucrone uenam quampiam pertundas, si cōp omnia cruore obliteres. Offertur itaq; primū neruulus ab humiliori uentriculi orificio iecoris cauo insertus, qui à sexti neruorum cerebri paris propaginibus superius uētriculi orificiū ad eūtibis pendet. Vbi hunc à uicinis organis diremeris, à membranarū cōnexu diuidendus est alter neruus, qui uno ramo iecoris caui, altero autem bilis uesiculam accedit. Huic neruo arteria attenditur parem cum illo efficiens distributionem, ac mox post neruum liberanda. Huius uerò, ut & nerui initium, paulo post inuenies. nunc enim sat est, hæc inuicem iuxta iecoris cauum separare, hicq; eorum seriem discere. Sub arteria bilis uesiculæ meatus cōsistunt, à portæ uena iam liberandi: primū duo illi, qui ex iecoris cauo ex multis furculis colliguntur, & ilico in unum coeunt meatum, qui una parte in bilis fertur uesiculā, altera in duodenum intestinum. Vbi hos à portæ uena ad intestinum usque & bilis uesiculam secreueris, illam pollice adeò comprimes, ut meatus bile turgentes cōmodius appareant, & num quis meatus ab hac uesicula in uentriculum pertingat, animaduertas: quem si non inueneris, acu meatum in intestina properantem leuiter pertundes, ut profluens bilis argumēto sit, nullum processum ab illo meatu tibi incuria præfectum. Postremò uena portæ est examinanda, ac ilico atque ipsius circumscriptionē quā ex iecore prodit animaduertes, propagines illius obtusiori cultello sunt inquirendæ, semper arteriæ & nerui, uenæ per uniuersum ipsius seriem attensorū, diligenti habita ratione. Primū itaq; furculos portæ aggredieris, qui bilis uesiculæ exporriguntur: deinde eum qui ferè citra arteriæ consortium in dextrā uentriculi sedem, iuxta ipsius inferioris orificij posteriorem regionem modica ramorum serie digeritur. Hunc subsequitur, qui dextrā fundi uentriculi partem & medium superioris omenti membranæ perreptat. Post hunc, qui duodeno nobis uocato intestino deriuatur, quem secundū intestini longitudinē in^m corpus quoddam glandulosum carneumq; descendere obseruabis, si modò (uti iam monuimus) retusiori cultello uenam, illiq; accumbentem neruum, arteriamq; nudare studueris. Modò magnam portæⁿ distributionem deteges, truncum, qui mesenterium adit, obiter tantū expendēs. Atque hoc in præsentia relicto, ad truncum qui lienī potissimū exporrigitur, te cōferes. Atque ut hunc cōmodè uideas, uentriculus & intestina tibi ueniunt ad eum^o modum aptanda, quo situabantur dum inferiorē omenti membranam intuebaris, ac uentriculum sodalis manu sursum attolli, & intestina deorsum premi curares. Patente itaq; nunc tibi superiori sede humilioris omenti membranæ, accurata cura ramos omnes minoris portæ trunci examinabis, quos omnes aut uētriculo, aut lienī, aut ipsi omento, coloq; intestino in homine exporrigi adinuenies. Interea uerò quū ramos hos inquire, ipsosq; à glandoso corpore illos suffulciente liberabis, omnibus ferè arteriam, multis autem neruum attendi obseruabis.^p Arteriarum radix sese offeret in elatissima inferioris omenti membranæ sede, ubi etiam occurret magnæ arteriæ in mesenterium deducendæ origo: deinde utrinq; unus sese offeret neruus, ad magnæ hæc descendens arteriæ latera exiliens, sexti neruorum cerebri paris propaginum, quæ costarum radicibus exporrigūtur, soboles. cuius ramuli unā cum arterijs dum uenam nudas, in conspectum semper ueniunt. Iam & grandioris portæ trunci & paulo antè dictæ arteriæ & nerui per mesenterium seriem, & quæ inibi diuisionibus præfunt glandulas^q inuestigare tempestiuum est. Primum itaq; solis manibus intestina hinc inde inuicem diduces, & nunc in dextrum, nunc in sinistrum latus reuolues, ut citra sectionem mesenterij naturam perfunctoriē cōtempleris. Deinde obtusiori cultellulo maiorem uenæ portæ truncum & dictam nuper arteriam & neruum inuicē liberabis, & dein ut uniuersum ipsorum ductum, & glandulas diuaricationibus interiectas intuearis, unguibus unam mesenterij membranam ab alia diuelles. Ac hoc per uniuersum mesenterium haud uenit tentandum, suffecerit enim in præsentia à centro ipsius aliquot uasorum furculos ad tenuia usq; intestina deduxisse, ac mox^t alteram mesenterij arteriam aggredi, à magna arteria ipsi post seminalium arteriarum ortum depromptam. Atque hanc promptè inuenies, si cum intestinis mesenterium in dextrum latus reuolueris, unguibusq; aut obtusiori cultello mesenterij membranas,^s quæ colo sub sinistri renis sede adnascitur, inuicē dirimere conaberis. Hic enim ilico eius arteriæ rami uenis commissi sese offerēt, rursus arteriæ radicem cōmonstrantes. Quam ubi inueneris, ipsius diuaricationem prosequere, ut discas quæ hæc cum uena mesenterio suffulta recto intestino ramos exporrigat. Parum modò sollicitus, etiam si uenæ huius extrema in rectum intestinū inseri

non

k Quodam modo 12 figurā paraturus, atq; ita hic spectabis quæ illa figura et 13 chara eteribus notauit, unde etiam ex illis figuris sequentiū notas seriatim petes.

l Et hanc quoq; petes ex 12 figur. dein ex 3 figur. mul cum 4. aut integrā seriem ex figur. ca. 5 li. 3.

m 12 figur. i. i.

n 4 figur. f.

o Prorsus ut in 3 figur.

p 4. fi. s. uerum si hic notas requiris, illas omnes ex 3 et 4. fi. sumes. aut 3 et 4. librorum figuris uenas, arterias, neruos exprimemibus.

q Partim ut in 10 figur. partim ut in 12 figur.

r 20 figur. k. aut si. ca. 12 lib. 3. sub. et n. enatū. 510 fi. circa H. et illi proximū G. ac 12 figur. n. aut 11 figur. ab R ad S. dein ad T.

non intuearis: id enim paulo pòst fiet facilius. Hac sanè omenti administratione intestinorum, uentriculi, iecoris, lienis & mesenterij situs, præterea quæ his omnibus exporriguntur uenarum & arteriarum & neruorum surculi sunt examinandi. Porro administrationi, qua quæ adhuc in illis organis uidenda supersunt, commode intuearis, alijsq̃ monstres, nunc me accingam.

Qui intestina à mesenterio resecada, ac à corpore auferenda.

2 fi. ca. 7 li.
2 N. N.
Ad Y &
T 6 figura,
aut H 11 fi.

Maiusculæ instar semicirculi obliquatæ acui filum, quo literarum fasciculi colligantur, trañcien- dum est. hanc per mesenterium sub recto intestino, quæ sacro ossi incumbit duces, & eius inte- stini fæcibus sursum ad coli amplitudinem protrusis, recto intestino uinculum inijcies. absecto iam quod superest filo, fæces uinculo proximas ex recto intestino sursum denuò comprimes, & interuallo trium digitorum plus minus interposito acum rursus sub recto intestino supra pri- us uinculum trañcies, secundò rectum intestinum ita ligaturus, ut inter duo uincula nihil excre-

x Vti factū
est 20 fi. ad
o. aut 24 fi.
ad K. ubi e-
tiam intesti-
na reliqua
à mesenteri-
o resecui-
mus.

y usq; ad L
fig. 7.
20 figura
T. V.
47 fi. Z. 13
d. 15 Q. R.
b Vti in 9 fi.

menti sit reliqui. Deinceps nouacula rectum intestinum inter duo uincula diuides, & superio- rem ipsius partem sensim à mesenterio obtusiori nouacula (ne fortassis negligentior intestina uulneres) resecabis, & dehinc colum, ileum, ieiunum continuò à mesenterio ad ieiuni usq; prin- cipium liberabis, intestinis in peluim repositis. Atq; in hac functione coli intestini supra renum pingues tunicas connexus sedulo est animaduertendus, unà cum uasorum frequenti serie in- testina implicante. Vbi uerò ad ieiuni usque principium pertigeris, id perinde atque rectum, duobus uinculis intercipientes, ita ut elatius uinculum^a insertioni meatus uesiculæ bilis proximū sit, non autem elatius conscendat. Intestina à uentre libera baiulo alicui, quales hñc sectioni adhi- bemus, abluenda offeres, ut si uisum fuerit ablutorum iam^b tunicas & longitudinem examina- re queas. Patauij & Bononiæ postquā abluta scholarumq; scamnis exporrecta essent, aliquan- do uesicæ instar inflari curauimus: ita enim nō solum longitudinem, quæ omnibus uix eadem est (quanquam quatuordecim ulnas ferè æquet) uerum formam ac amplitudinem facile didici- mus. Tunicas autem, intestinis ad hunc modum exporrectis, inquirere est longè facillimum, ap- paret enim mesenterij pars intestinis proxima, quæ ex duabus constat membranis. una supe- riori, altera inferiori. Has si unguibus ab intestinis dirimes, quī tertiam intestinorum efficiant tunicam intueberis, ac qua ratione hæc à peritonæo pendeant obseruabis. Quandoquidem mesenterij membranas paulo pòst à peritonæo enasci spectabis, & iam quī hæc intestinis obuol- uantur disces. Hac tunica ab intestinis distracta, obtusiori nouacula sectionem secundum inte- stini longitudinem duces, studiose præcauens ne id uulneres. Huius insuper sectionis labra unguibus diuelles, & absq; negotio secundā intestinorū tunicam ab intima liberabis, præcipue si id iuxta rectum moliaris. in tenuibus enim intestinis tunicæ nō ita facile in conspectū ueniūt.

Intestinorum tunica quæ ex- aminanda.

66, 7, 8 fi.
gura O.

44, 15 fi.
T. V.

c Vt k diuul-
sum est ab l,
fig. 14.
f 2 fi. Q. Q.

g Quodā-
modo ita fa-
cturus, ut
20 figuram
parauimus.
aut magis
adhuc ut
22, aut 25.

Nunc licebit intestina inuertere, atque unum eius intestini quod nos^c cæcum esse putamus, ori- ficium examinare. Verum intestinorum tunicas licebit ijs adhuc in uentre relictis interdum di- scindere: quanquam illis exemptis, id fieri malim. Interdum priusquam uasa in caua iecoris se- de conspicua, & humiliori membrana omenti suffulta aggrediaris, necessum erit intestina ad eum quem dixi modum auferre: idq; tunc potissimum, quum publicā obibis sectionem, in qua diutius quàm tibi ex usu esset, intestina fortè asseruarentur. Porro iam uenterculus est adeundus, quem modò quoque cum liene eximere soleo, ^d neruis ipsius orificio insertis diligenter prius exa- minatis. aliàs enim uenterculum relinquere consueui, quousque thoracis omnia essent dissecta, ut commodiùs ipsius orificium neruiq; examinari possent. Verum in præsentia ut rite illum eximas docebo: quum autē gulam persequar, ut relictum debite administres subiñciam. Vnguibus ita- que quantum fieri licet in homine, peritonæum à septo transuerso ad uentriculi usque superius orificium^e auellere conaberis, ut tertiæ uentriculi tunicæ uideas principiū. Quod ubi paululum à uentriculi orificio liberaueris, studebis utcunque etiam diuulsam ad uentriculi fundum dedu- cere, ut ex tertia uentriculi tunica superiorem omenti membranā constitui oririq; discas. Deinde acu sub superiori orificio uentriculi trajecto, uinculum sedulo nexum ipsi inijcies, paulo supra uinculum stomachum à uentriculo transuersim liberans. Nunc uentriculo ministri manu è uen- tre eleuato, non tamen penitus (ne uenas rumpat) exempto, inferioris omenti membranæ & mesenterij ex peritoneo originem disces, solis unguibus hanc à dorso sensim distrahēdo utens, uinculis uerò pleraq; intercipientes. ^f Primū simul omnia quæ in cauo iecoris occurrunt, portæ scilicet uenam, arteriam, & bilis meatum, aut si lubet singulis seorsum funiculos accommodabis: post hæc arteriarum radicibus, quæ mesenterio & inferiori omenti membranæ primū dige- runtur, illa sanè arteria nō omīssa, quæ sub feminalibus arterijs orta in mesenteriu fertur. Atque his omnibus unum duntaxat uinculum addi sat est, quanq̃ duo (ut in intestinis faciendum mo- nuimus) inijcere nihil prohibeat: imò, idq; præcipue ad superius uentriculi orificiū, plurimum conduxerit. Inductis in hunc modum uinculis, porta, & reliqua quæ intersepta sunt, ita ut uin- culum in corpore maneat diuidentur, & ocyus solarum manuum opificio uenterculus cum me

Ventriculus et lien & omentū ac mesenteriu quī simul exi- menda, ac quæ in eo opere ob- seruanda.

Aa senterio,

*Lienis tunica
quæ obseruan-
da, simul cū ip-
sius ad uentri-
culum nexu et
substantia.*

*Ventriculi ca-
pacitatis et tu-
nicarum exa-
men.*

*Seminales ar-
teriae quæ obser-
uanda.*

*Caua uena et
arteria ma-
gnæ series, in
peritonæi am-
plitudine fa-
cta, quæ obser-
uanda.*

*Renis tunica
totiusq; a
deo eorūde na-
tura examen.*

menterio, omento & liene ex uentre exempta mensæ imponentur. ac statim cum omenti portio-
ne extracto liene, ⁿ omenti pars lieni obnata unguibus ab illo est discerpenda, ut expendas qui
lienens tunica ab omento initium ducat. Quod uerò attētissimè summaq; diligentia inspicendum
sit, num meatus aliquis à liene in uentriculi orificium pertingat, quæq; uasorum hic habeatur
series, etiam si taceam, neminem ambigere reor. Cæterum ut lienis substantiā obserues, aliquot
sectiones ipsi induces, & illo inter duos asseres compresso, ipsius substantia ab illi insertis uasis
aliquot locis separabis, hacq; ratione uasa aliquot sola & lienis carne enudata spectabis. Ven-
triculum uerò lauandum, deinde uesicæ instar inflandum dabis, ut ipsius capacitatem, quæ sa-
nè est quàm maxima, intuearis, & tunicas ipsius, ut in intestinis faciendum præcepimus, ^m exa-
mines, postmodumq; inuertas, ac bilis meatus ⁿ insertionem in intestinū quod adhuc uentricu-
lo appendet, uideas. Porro ubi hæc omnia exemeris, si quis sanguis alibi effluerit, & quæ in
uentre adhuc reliqua sunt oblitterauerit, spongia aqua copiosiori, non autem aceto imbuta, se-
mel atque iterum eluendus est, nam si lino absterferis, plus tingendo oberis. Solent enim ple-
runque exigui uasorū ductus, multa adipe & membranulis obfiti, difficulter admodum in ho-
mine reperiri, idq; magis si sanguine oblitterentur. Eluto itaque sanguine, ac obiter ijs quæ ad-
huc in uentre reliqua sunt absq; sectione inspectis, & iecore nulla ex parte uulnerato, sed uenæ
cauæ gratia in corpore asseruato, primū membranulas, quæ uelut uenæ cauæ secundā consti-
tuunt tunicam, ad sacrum usque os auellere conaberis, diligēter præcauens ne ^o dextrā semina-
lem arteriā, quæ cauæ corpus transcendit, simul cum membranulis adimas. Est enim hæc tenuis
& membranæ modo albicans, multaq; pinguedine in homine obducta. Quapropter cōmodè
admodum feceris, si priusquam aliquid eorum quæ in uentre adhuc reliqua sunt aggrediaris,
^p arterias seminales inquiras, ac deinde ne lædantur in reliquarū partiū administratione caueas.
Vt uerò id præstes accuratius, animum adhibebis ^q dextræ seminali uenæ, quæ ex caua oritur:
deinde & arteriæ exortui, quæ inferiorem mesenterij sedem adit. Inter hæc duo organa partim
ascendens, partim descendens, nitēris obtuso cultello cauam uenam ex sinistro ipsius latere ab
arteria magna dirimere, membranosis fibris, quorum interuentu hæc uasa committuntur, disse-
ctis. In hoc opere duarum seminalium arteriarum radices in cōspectum uenient, eaq; quò illæ
porrigantur commonstrabunt, si modò ab exortu eas arterias ex membranulis quibus inuol-
uuntur ad seminales uenas usque quibus tandem committuntur sedulo, nullaq; in trahendo ui-
facta liberaueris. Hæc ubi præstiteris, uenæq; caua & magna arteria ut commodius in conspe-
ctum ueniant, membranulis fuerint detectæ, ramos quos in ipso per uentrem ductu emittunt
examinabis, ac primū ^r uenas renum pinguibus membranulis implexas, & deinde magnæ arte-
riæ ac cauæ ^r propagines renibus serosum sanguinem deferentes. Horum origine citra omnem
sectionis operam inspecta, uenæ cauæ propaginē dextro reni propriam suis membranulis dete-
ges, & deinde renis quoque pinguem membranam unguibus lacerans, quo pacto illi ^u inuolui-
tur diligenter examinabis. Denudato rene ^x urinarius meatus quæ ex rene prodit, cultello est in-
quirendus: deinde & arteriæ magnæ propago dextrum renem accedens, quò simul integer ren-
uena & arteria & urinarij meatus principium conspiciantur. Licebit modò aut totam renis na-
turam examinare, aut quousque alia quædam disseueris, renem relinquere. ^y Vt cunq; uerò id
modo postea ue feceris, uenæ cauæ, arteriæq; magnæ propagines uinculis iuxta renis cauum
intercipi debent, & deinde nouacula acutiori sectio recta secundum renis longitudinē in ipsius
gibbo uersus cauum est ducenda, renq; ita bipartitus aperiendus, sanguisq; si quis sit, spongia
madente eluendus uenit. Ita enim ilico renis sinuum natura, deinde & urinarij meatus princi-
pium intuebuntur, nisi cadauer nactus fueris obesius. solet enim pinguetudo in secundo huma-
nirenus sinu collecta, impedimento esse, cur minus sinuum natura penitus secanti occurrat.
Quapropter operæ precium fuerit, canis renem diligenter prius examinare, & ex illo dein hu-
manum cognoscere. Diuiso igitur secundum gibbum seu exterius latus rene, primū digito
sinus secundū in quem urina colatur latera inquires, & foraminis quod in medio ipsius, seu in
primi sinus membranei renum corporis externo latere apparet, stylum immittes, qui in urina-
rium meatū uersus uesicā facile protrudetur. Deinde ubi membranei huius corporis primi ue-
renis sinus anteriorum ramorum cum posterioribus ramis coitum, qui non procul ab externo
renis perficitur latere, obseruaueris, ut illorum ramorum ductus, & primi sinus reliquum cor-
pus & secundi sinus formam naturamq; adinuenias, ea sectione diuisum & ad apertum renem
uicissim claudes & recludes, quo mutuus nuper dictorum ramorum coitus manifestius appa-
reat: dein stylum secundo sinui indes, & ubi ipsius formam expenderis, ab anterioribus primi
sinus ramis eam renis præscindes substantiam, quæ posteriori illarum sedi obnascitur: à poste-
rioribus autem ramis eam adimes, quæ illarum anteriori sedi continuatur, ut modò integer ap-
pareat

*h Quasi B,
B & C di-
scerpentes
ab A in 1 ta
bula 19 fig.
l Vi in 4 ta
bula 19 fig.*

*m Vi in 17
figura.
n 15 fi. R.*

*o 20 fig. h.
25 fig. g.*

*p 20 fi. h, i.
25 fi. g, h.
q 2 fig. f. 25
fig. d.
r 20 fi. h.*

*s 20 figura
X, Y.
t 20 fi. a, b.
22, 23 fi. m,
n. 25 T, V.
u Confer re-
nes 20 figu-
ra cum re-
nibus 22 fi.
x 20 fi. c, d.
22, 23 figu-
q, q. 25 a, c.
y Hic sectio
nis serie dili-
genter ob-
seruabis ta-
bellas figu-
re 21.*

pareat primus sinus, cui modò stylos, quo illum adhuc exactius cognoscas, indere possis, & admirari quàm ridicula ab Anatomes professoribus de renum officio fuerint hactenus prodita. Cæterum tunica præter pinguem membranam renem inuestiens, facile tibi occurret, si sectionis in renis gibbo ductæ labris animum adhibueris. solet enim ea tunica ibidem tunc nonnihil à renis substantia abscedere, & dein promptè ad renis usque cauum unguibus diuelli, ac qualiter hæc è renis uenæ & arteriæ membranis pronascatur, conspici. Hæc ubi in dextro rene intuitus fueris, sinistrum quoque sua pingui membrana liberabis, & uenæ cauæ & arteriæ ramum uersus ipsius cauum excurrentem inuestigabis, animum priusquam aliquid diuellas, sinistræ seminali uenæ adhibens, quam ex medio uenæ ductu enasci citra sectionem utcunque conspicias. Vt uerò ritè intuearis, num à renis sinistri quoque arteria, seminale uas originem ducat, obtuso admodum cultello (nisi fortè secandi peritior fueris) membranulas à renis uena detrahes, & accuratè aliquousq; uenæ seminalis principium quoque à membranulis liberabis: dein uenam renis ab arteria nonnihil deorsum reflectes, numq; ex ipsius ductu ramus qui sinistræ seminali uenæ exporrigitur, principium obtineat, inquires. Vbi uerò hunc non inueneris, sinistro rene pari ratione atque dextro (si modò illum secuisse non suffecerit) aggresso, seminalium uasorum constructionem examinato. ^b Arteriarum & ^c sinistræ uenæ originem iam prius indagasti, ac ^d dextræ etiam uenæ principium citra sectionem à caua oriri conspicitur. Vbi igitur ortum didiceris, & uenas ad arterias usque sensim ex membranis ipsas liberans deduxeris, si masculi obtigerit corpus, penis cutem & scortum à testibus adimes. Primum itaque à pubis osse recta sectione per penem in cute duces, & deinde eius sectionis labris hamulo aut unguibus eleuatis, cutem cum carnosâ membrana à pene ^e auferes, adamussim considerans in cutis extremo ipsius cum carnosâ membrana coalitum, & carnosæ membranæ sub glande à penis corporibus abscessum. ad hæc, perpendes ipsius ad glandis radicem ligamentum, deinde & uenas cutem eam adeuntes, postremò nullam pinguedinē adipem uel inter cutem & carnosam membranam, ut neque in palpebris hîc reperiri, ac proinde leui occasione, ut illas hyatide aut inflatione penis cutem infestari. Pene detecto, & deductis cruribus à pubis osse inter inguina & sinistrum testem sectio ad podicem usque ducenda est, & deinde cum penis cute scortum à testibus & interfeminio liberandū, sectionibus semper uersus dextrum latus deductis. Quum uerò testes cute carnosâq; mēbrana nudas, ne testes suo loco moueas inuertas uel, accuratè obseruandum est. Quum primum enim cute nudati sunt, ipsorū situm, & cui nam potissimum parti uasa seminalia illis applantētur, indagare oportet, ut Naturæ discas prouidentiam, quæ testes ita collocauit, ut ipsius uasa sint tutissima, illisq; ipsi testes uelut propugnacula præponantur. Iam dextrū testem cum ipsius uasis & tunicis à sinistro digitis aut cultello dirimes, & iunctis cadaueris cruribus dextrum testem femori impones, ac mox cultello ^f uenam & arteriam seminales dextrilateris, uicinis membranulis ad peritonæum usque quæ illæ procidunt, deteges, hîc primum in interiori sede peritonæi, postmodum in exteriori qualiter ^g transeant solis manibus considerans. Dein stylum foramini quæ egrediuntur uia ad testis usque infimam sedem protrudes, & peritonæum usque ad foramen quæ uasa transmittit diuides. Insuper secundum styli longitudinem cultello foramini quoque indito, ad humilimam usque testis sedem primam ipsius peculiarem tunicam secabis, & reposito cultello, distentaq; tunica huius à peritonæo ^h ortum, & ualidum ad humilimam testis partem ^k adnexum, præterea & testis ^l musculum examinabis huius nanque natura, ductus & forma in conspectum ueniunt unâ cum gracilibus ramulis à uena & arteria in hanc tunicam numerosa serie ^m excurrentibus. Hac tunica relicta, testem & uasa nunc rursus hinc inde diligentius subleuans, reuoluensq; uenam, arteriamq; ab ipsis contermino semen deferente uase ad testis usque elatiora ⁿ discernes. Vt uerò uenæ arteriæq; insertiōnem adamussim discas, uas semen deferens à proxima testis corpori tunica est ^o liberandum, non quidem uniuersum, sed ad eam usque partem quæ uenæ arteriæq; finibus est proxima. Liberabitur uerò uas ipsum facile, si transuersas sectiones inter testem & uas illud ad suum usque principium acutiori nouacula duxeris. Hac siquidem administratione uasis illius anfractus, & ad testis connexū, ortumq; manifestè animaduertes. Verū nulla ipsius cavitās, neq; quo pacto illud à teste semen assumat, in conspicuo erit. Hoc enim nihil, nisi porosum quid quæ testi adnascitur referet, nullo meatu manifesto ex teste in ipsum pertinēte. Semen deferēti uase ab intimo testis inuolucro ad eum modum liberato, uenæ ac arteriæ anfractuum ramuli proximæ testis corpori tunicæ oblatis melius cōspiciuntur. Vt uerò prorsus in conspectum ueniāt, sanguinem ex anfractibus ad testem comprimes, & deinde anfractibus uinculo ne sanguis refluat interceptis, testem secundum ipsius longitudinem diuidere conuenit. deinde quæ ex tunica testi proxima, & ex anfractu fine ramī ad testis substantiam excurrant, qualiterq; testi ea tunica com-

Vasorum sinistrū testem petentium ortus examen.

Testis et penis à suis inuolucris detectio.

Testis situs examen.

Exterioris testis tunica aperta, uasorumq; seminalium detectio.

Vasorū seminaliū circa testem ac ipsius adeo testis examen.

mittatur, quæq; testis sit substantia, obseruare. Atque hæc primùm in uno quidem teste, dein in altero sunt examinanda. Quippe uix prima fronte hæc omnibus erunt obuia, quum hæc nemo hæc affecutus fuerit. Vnde etiam eadem administratione perpetuò non est utendū, sed quum commemoratam in dextro teste tentaueris, integrum tibi erit sinistrum tuo arbitratu aggredi. Examinatis ad hunc modū testibus, ipsorumq; nihil reiecto, penis musculi & ipsius corpora, deinde uestica & urinarij meatus, & reliquus semen deferentiū uasorum ductus, inser-

Penis musculorum examē.

Penis corporum ortus, & nerarum, articularum, et neruorum huc pertinentium examē.

Pubis ossa quæ dirimenda.

Urinarij meatus ad uesticam, & uasorum semen deferentium ad glandosum uesticæ corpus examē.

Cauæ & arteriæ magnæ distributionū sub osse sacro.

Musculi ceruicis uesticæ, ipsiusque uesticæ fundi et ceruicis examē.

Penis corporum.

Recti intestini musculorū.

tioq; cum adenofo assistente, & omnium uenis, arterijs, & neruis secanda ueniunt. Diductis itaq; cadaueris cruribus, & cute uti monuimus ab interfemineo adempta, primū^p duos musculos ab orbiculari musculo recti intestini in penis radicem, & potissimū in meatum urinæ feminiq; communem pertinentes aggredieris, dein^q alios duos, qui ab humiliore pubis ossium sede originem ducentes penis corporibus inferuntur, adimes, ac ilico penis corporum^r originem examinas, acuto cultello dextrum corpus ab osse unde pronascitur, quā poteris proximè diuidens. Deinceps uerò in penem excurrentibus uenis, arterijs & neruis perfunctoriè hinc perpenlis, ossa pubis inuicem sunt^s seiungenda, quod fiet ocyus, si uesticæ corpus à peritonæi parte pubis os succingente, cultello diremeris, & deinde cultro quā minimè crasso pubis ossium^t cartilagine recta sectione penitus diuiseris. Nouacula enim quum crassior sit, illi officio non æquè est accommoda. Mox uno cadaueris crure in mensa relicto, & alio ab illa propendente, ita cadauer in mensa reclinabis, ut ipsius os sacrum mensæ lateri incumbat, & ui diductis cruribus, ad trium quatuorue digitorū latitudinem pubis ossa inuicem seiungas. parum enim aptè feceris, si pubis ossium portionē exemeris, quod id & fiat incommode, & præter alia multos ita uitiaueris musculos, neque ullus postmodum ossium usus ad sceleti præparationem futurus sit. Quapropter pubis ossium cartilagine dissecta, & dein ipsis ossibus ui diremptis, primū à renibus^u urinarij meatus à suis membranis quibus obuoluntur sunt liberandi, atque ad uesticæ usque corpus perducendi: deinde^x uasa semen deferentia quæ ad pubis ossa deorsum in peritonæi amplitudinem reflectuntur, pari modo ad glandosum assistentem usque expinguioribus quibus integuntur membranis denudandi, atque in eo opere sodalis manu uesticam modò in dextrum, modò in sinistrū comprimere est necessum, idq; maximè quum uenæ cauæ & magnæ arteriæ^y seriem hac in sede inquires. Hæc nanque iam uenit expendenda, ac primū rami quos uena & arteria lumborum uertebis & spinæ, ab dominisq; musculis & peritonæo exporrigunt, qui omnes sunt repertu faciles, si uenam & arteriam nunc in hoc, nunc in illud latius ualidius reflectas, &^z neruos qui sub illis feruntur obtuso cultello quoque inquiras, ac demum ad ipsorum quibus inferuntur organa deducas: illos dico, qui testibus & uesticæ fundo exporriguntur. Porrò rami uenæ ac arteriæ post ipsarum super os sacrum bipartitionem excurrentes, in cōspectum uenient, si radicibus semper animum adhibueris, & cultello retusiori, ne ramorū aliquem uities, ipsorum sequaris processum ductumq;: & id eo leuiori præstiteris negotio, quo nostras uasorum delineationes diligentius operi accommodaueris. Verū ubi hæc diligenter eris intuitus, sinistrum penis corpus à pubis osse etiam dirimito, & quā poteris commodissimè uesticam, ipsiusq; ceruicem à recti intestini termino, cui fortium fibrarum interuentu hæret, diuidito, absectis interim uenis & arterijs in uesticā penemq; excurrentibus: quas si prius uinculis fortè interciperes, parum profectò sectioni obesses. Vescicam modò simul cum pene exemptam, alteri cruri aut asserculo impones, & denuò seminalis uenæ ac arteriæ ductum uersus testem, & à teste dein semen deferentis uasis ad glandulosum assistentem progressum obseruabis, quo denuò exactius seminalium uasorum harmoniam expendas. Post hæc^a musculum uesticæ meatui præfectum examinas, & oblongiori stylo penis glandi ad uesticæ usque fundum imposito, uesticæ meatum à glande ad ipsius usque fundum cultello secundum stylum porrecto^b diuides, ut simul uesticæ cavitatem, & ipsius tunicā, & urinam deferentium meatuum insertionem, & semini urinæq; communem meatum peni exporrectum intuearis. Alicubi igitur urinariū meatum ex renibus in uesticam pertinentem forato, stylumq; ad uesticæ fundum usque indito, ut^c membranulas meatus illius ori in uesticæ fundo connatas species. quanquam etiam integrum sit, ex uesticæ fundo stylum ipsius meatibus indere. Corpus uerò glandosum semen deferentium uasorum suscipiens implantationem, ut lubet poteris discindere, & quoniam pacto ea uesticæ meatui immittantur perquirere. Postremò uesticæ ceruicem à duobus penis corporibus ad glandem usque cultello secernes, ac deinde duo corpora quoad poteris inuicem dirimes, quāq; habeant formam, quāq; natura ad glandem sint prædita conspicias. Ut uerò adamussim ipsorum discas substantiam, peni nunc transuersas, nunc longas, rectas ue sectiones induces. Reiecta modò cum suis appēdicibus uesticā, tres recti intestini musculos, &^e uenas examinas, quæ à portæ uena huc deducuntur, & quæ cauæ hac in parte sunt soboles.

p 1, 2 fig. ca. 49 lib. 2 H. 1, ab M ad G.

q 1, 2 fig. ca. 49 lib. 2 L. K in A, B. r 2 fig. cap. 49 lib. 2 C.

C. s Vti factū cernis 22 fig. t ultimariū fig. li. 1 s.

u 22 fig. q, q ad v. x 22, 23 fig. u. 1, x uers. f.

y Pete hanc ex fig. ca. 6 et ca. 12. & ultima li. 3. z Infimi surculi fi. 2 ca. 2 lib. 4.

4 22, 23 fig. p.

b Vti factū est in dextra figura 23 fig. c 23 fig. r.

d 8 fig. a, b, c. dem d. e fi. ca. 5 lib. 3 c, c.

foboles. Vbi id quoque præstiteris, recti intestini finem ex corpore exsectum abijcies. Deinde
 8 cauam uenam qua primùm sub iecore conspicitur, & ^h magnam arteriam ⁱ quæ septum transit,
 20 fig. Q. deinde ipsarum præcipuos ramos crus adeuntes uinculo duplici intercipientes, ut simul cum re-
 22 fig. h. nibus si adhuc eos in corpore reliqueris, uenas omnes, arteriasq; ex uentre auferre liceat. ita
 7 muscul. Peritonæi or-
 tab. q. tus examen.
 enim peritonæi discēs ortum, & musculos & nervos quoque crus petentes, si fortassis illos
 postmodum aggredi statueris, incorruptiores longè habiturus eris. Iecur autem, ut & antea di-
 xi, tantisper illælum seruandum est, quousq; cor respirationisq; organa administraueris. Atq;
 hæc quidem organorum nutritionis, generationisq; in uiro est administrandi ratio, in muliere
 uerò erit huiusmodi. Primùm mamillarum uisurus naturam, ^k in cute ab ipso iugulo deorsum
 (ut in uiris) ad umbilicum ducenda est sectio: deinde à iugulo secundum clauiculā alia ad sum-
 mum usque humerum, cutisq; à mamillis non aliter ac si in alia corporis sede, ea ab adipe diui-
 deres, uenit liberanda. Mamillis cute detectis, & uenarum ^l ramis qui à uenis in brachiū excur-
 rentibus illis porriguntur, perpenſis, dextram mamillam à ^m musculo brachiū pectori adducen-
 te auferto, uenarum arteriarumq; examinans propagines, ab illis quæ musculis thoraci incum-
 bentibus deriuantur, in mamillam assurgentes. Vbi mamillarum corpus à thorace fuerit libe-
 rum, & adeps undiquaque studiosissimè ademptus, & uarijs per mamillarum corpus ductis
 sectionibus ipsarum substantiam condiscere licebit. Quanquam hæc quoque in uiro inquiri
 poterunt, is nanque si colore fusco & habitu sit obesiori, eandem quoque ostendet substantiā.
 Deinde & ⁿ uenæ quoq; & arteriæ sub rectis latitantes musculis, parī modo in ambobus, etiam
 si magis in muliere expendentur, reliquaq; administratio ad uasorū usque seminalium ^o ortum
 25 fi. d, e, f, g, h. cōmunis mulieri quoq; censenda est. Simulatq; igitur mulieris seminaliū uasorum originem
 24 fig. L. didiceris, solis manibus adinueniendus est ^p uterus & ^q uesica, insuper testes & musculi & uenæ
 24 fig. T. quoque cum arterijs uteri fundo & ceruici exporrectæ, priusquam scilicet aliquid diuidas. De-
 25 cat. a, quemadmo-
 dum ex reli-
 quis 24 & 25 figurarū
 indicibus
 petere li-
 cet.
 25 fi. in 25 fi. gura. uans ne ^r ramos ab illis priusquam anfractus suos constituent, in elatiorem fundi uteri sedem
 25 fig. d, exporrectos uulneres. Postquam uerò ad testem ^s anfractus deduxeris, perinde ac in uiris ipso-
 25 fig. n. 26 rum insertionem & ^x deferentis uasis processum, ipsiusq; in uterum insertionem, & testis sub-
 25 fig. H. stantiam formamq; examinato, uas illud ex pingui cui inhaeret ^y membrana liberans, quæ ue-
 25 fi. o & spertilionum alis imagini multum accedit. Postquam hæc in altero quoque latere obseruaue-
 26 pad. ant. ris, animum adhibebis ^z uenis ac arterijs inferiorem uteri fundi sedem, & ceruicem, uesicamq;
 26 figura I. adeuntibus, quæ in grauidis animalibus accuratissimè, ut & ^a illi qui à seminarijs uasis in uterū
 25 fig. s. b. porriguntur, utq; etiam omnia uteri reliqua in conspectum ueniunt, quandoquidem in illis su-
 25 fi. 26 K. pra modum uenæ arteriæq; turgent. ^b Vrinarij meatus à renibus in uesicam pertinentes, simili-
 24 fi. O. ter ac in uiris ad uesicam usque à suis membranulis sunt emundandi, & deinceps uterus cum
 26 E, E. uesica ex corpore eximendus, dissectis in ipsum & uesicam procedentibus uenarū arteriarum
 25 fig. y. & neruorum ramis, & membranulis uterum uasaq; illa continentibus, & fibris quoq; quorum
 25 fig. n. interuentu uteri collū intestino recto ualide continuatur unā amputatis. Exempli iam uteri for-
 25 fi. a, b, c. mam contemplaturus, ipsius ceruicem ^c inuolues, quo unā uesicæ ceruicis in illum pertinentis
 26 figura. foramen, & uteri fundi orificium citra aliam sectionem uideas, & modò opportunè uesicam &
 ipsius ceruicē musculumq; urinæ meatui præfectū longa sectione diuidas, uesicæ amplitudinē
 & urinariorū meatuum insertionem, ipsiusq; ceruicis cum uteri ceruice coalitum inspecturus.
 Insuper uteri quoque ceruici eodem modò ad illius usque os longam sectionem inferes, ac acu-
 27 figura. tiori nouacula uniuersum uterum secundum latera ab ipsius orificio ad cornua usque ^d diuides.
 ita enim illius sinum, substantiam, formamq; exactissimè cōtemplaberis. Porro si interdum gra-
 uidæ mulieris cadauer nactus, & uterū duntaxat cum fœtu, ipsiusq; inuolucris intueri, animus
 fuerit, ilico à mucronata pectoris offis cartilagine, ad pubis usque os acutiori nouacula sectio-
 nem molieris, quæ peritonæum quoque penetret: deinde aliam utrinque ab umbilico ad ilia
 molieris. Hac nanque ratione ilico se uterus spectandum offeret: & si in alterum latus illum de-
 truseris, uenæ & arteriæ ipsi insertæ supra modum apparebunt turgidæ, adeò ut ipsarum neq;
 series neque ortus citra aliam administrationem latere possint. His itaq; uenis & arterijs unā
 cum uena & arteria sub recto musculo conscendentibus, diligēter obseruatis, leuem sectionem
 nouacula secundum uteri longitudinem ^e tentabis, cauens ne altius quàm uteri est crassities pe-

Peritonæi or-
tus examen.

Cuiusmodi d-
clarū partiū
administratio
in muliere sit.
Mamillarū
examen.

Vteri ac uesi-
cæ situs qui ob-
seruandus.

Seminaliū ua-
sorum examē.

Venarū uteri
fundi humilic-
rem sedem &
ceruicē peten-
tium.
Vrinariorū
meatum.

Fœtus ipsius
que inuolucry-
rum examen.

netres. post hanc alias duas, utrinque nimirum unam duces, cum illa rectos angulos facturās. Sectionum labra unguibus apprehensa inuicē modicē dirimes, & uteri tunicam solis manibus à secundina sensim diuelles, uenarum arteriarumq; ora ex utero in secundinam pertinentiarum pens, quod in partui proximis feceris facilius. Exemptum ab utero unā cum suis inuolucris ^f foetum in peluim aqua plenam repones, atrum & uiridem quodammodo liquorem abluens, qui ex effractis uasorum oris promanat, secundinaeq; obducitur. Modò autē diligenter secundinae substantiam, & quaecunque in illa spectanda sunt unguibus aut cultello examinabis, id imprimis animaduertēs, num ipsa membrana quæpiā sit uniuerso foetui obducta: an tantum instar latioris cinguli sit, lienis substantia efformati. Atque hīc etiam sedulò expendes, qualiter secundinae substantia externae superficiei eius inuolucris pertinaciter obnascatur, quod farmicinis imaginī comparamus, secundumq; seu medium inuolucrum nuncupamus. Vbi itaq; secundinae naturam adamussim examinaueris, foetum hunc inde attolles, secundi illius inuolucris naturam consideraturus. quam simulatq; exterius inspexeris, atque quī totum foetum ambiat didiceris, cultello id alicubi pertundes, & foetus urinam profluere sines, ipsumq; inuolucrum à foetu ^g inuertes, atque ab umbilici uasis dependere tantisper sines, donec intimi quoque foetus inuolucris sudorem continentis harmoniam didiceris. Hoc itaq; pertusum & sudore euacuatum à foetu ^h amouebis, & ab umbilico etiam propendere sines, uasa umbilici inuicem disiungens, meatum illum praecipuē reperturus, cuius beneficio foetus urina in secundum ipsius inuolucrum perfertur. Inuenies aut hunc promptē, si cultello uenas & arterias qua umbilico proximae sunt, diuiseris, ac meatum in ipsorum medio repositum indagaueris. Abscissis his umbilici uasis unā cum foetus inuolucris, & foetu in mensam extenso, à clauiculis per costarum cartilagine ad pubis usque os sectionem in sinistro magis latere cultro aut nouacula molieris, quæ in thorace & peritonæi usque cauitatem pertingit: deinde ab umbilico uenam in iecur & arterias, ad suos quibus inferuntur ramos, & meatum urinam deducentē ad uesicæ fundum, paruo admodum negotio deduces, omnemq; foetus administrationem absolues. Nisi etiam uisum esset inquire, num in foetu peculiaris aliquis processus ⁱ à uena caua ad uenalem arteriam, & ^k ab arteria magna in uenam arterialem pertineat. Acetabula uerò in oue aut capra sunt inuestiganda, utero utcunque uisum fuerit diuiso, abundē etenim fuerit uteri comparere cauitatem, quæ in nō prægnantibus uaccis oppletur tuberculis ab illis non dissimilibus, ex quibus paulo post sanguis e sede profluxurus est: aut si primo conceptionis tempore eiusmodi diuidatur uterus, tunc sinibus conspicitur decoratus, qui primū à ueteribus dissectionis professoribus acetabuli nomen sunt emeriti. Atq; ita praesenti Capite partium quinto hoc libro traditarū administrandi rationem absoluimus: itaq; corpus sectionis serie reliquimus, ut ad reliquarum partiū quas simul in illa administratione non recensui, demonstrationem neuti quam futurū sit inutile.

Umbilici uasorum examen.

Acetabulorum examen.

f Ut 2 tab. figura 30.

g Ut in 3ta. figura 30.

h quæadmodum dicitur in 4. tab. fig. 30.

i Ferè ut 2 figurae F, G, M, K, L.

k A C figurae 5 li. 6 in G fig. 6.

l Ab O in I figura 6 libri 6.

LIBRI QVINTI FINIS.

A N.

ANDREAE VESALII

BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER SEXTVS, CORDI IPSI QVE


famulantibus organis dedicatus, ac mox in fronte figuras sibi proprias offerens,

quò minus & hîc quoq; eadem figuræ uarijs Capitibus

palsim præfigantur.

PRIMA SEXTI LIBRI

FIGVRA.




PRIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARA- cterum Index.

PRÆSENS figura tantam hominis in dorso cubantis partem ex sinistro latere com-
monstrat, quantam ostendendæ thoracis sedi sufficere arbitrati sumus. Ab anteriori itaq; tho-
racis sede et lateribus, ac dein ab aliqua colli regione cutem sectionis serie ademimus, ac dein mu-
sculis qui costis obducuntur resectis, costarum ossa à suis cartilaginibus unà cum pectoris osse li-
berauimus, & costarum ossibus (uti inter secundum fit) effractis, costarum cartilagines sursum
uersus dextrum latus attraximus, ut thoracis amplitudo, hancq; intersepientes membranæ, et pul-
mo, reliquaq; in conspectum uenirent, quæ modo in characterum Indice significabuntur.

- A, A* Sinistri lateris costarum indicantur cartilagines, unà cū pectoris osse, dextrosum sursumq; tractæ.
- B, B* Intercostales musculi interualla cartilaginum occupantes.
- C, C* Costarum à cartilaginibus seiunctarum ossa.
- D, D* Intercostales musculi interualla ossium adimplentes.
- E* Clauicula hic nuda, atque in sua sede adhuc asseruata cernitur.
- F* Venarum, arteriarum, neruorumq; in axillam perreptantium series.
- G* Exterior iugularis uena hic mox auulsa cute secantibus occurrens.
- H, H* Sinistra thoracis amplitudinem interdiuidens membrana, superficie ipsius sinistra hic conspicua.
quam etiam *L, M, N* & *O* indicant.
- I, I* Septum transuersum ea superficie hic apparens, qua sinistram cavitatis thoracis sedem respicit.
- K* Sedes ubi interdiuidentium thoracem membranarum sinistra septo connascitur.

- L* Hæc protuberans sedes, cordis gratia hic in sinistrum adeo prominet. id namq; una cum ipsius in uolucro inter membranas thoracem diuidentes comprehensum, in sinistrum longe magis quam in dextrum porrigitur. atque huius potissimum tuberis occasione præsentem figuram ex sinistro potius, quam dextro latere expressimus.
- M* Vena sinistro pectoris ossis lateri exporrecta, & sinistrae thoracem interdiuidenti membranæ uarios surculos offerens.
- N* Arteria sinistro pectoris ossis lateri exporrecta, & similiter ac uena *M* insignita ramulos sinistrae thoracem intersepienti membranæ exhibens.
- O, O* Ramuli à uena ac arteria deducti, quæ secundum pectoris ossis sinistrum latus à iugulo ad abdominis regionem pertingunt.
- P, P* Nervus septi transversi sinister, hic conspicuæ thoracem intersepientis membranæ superficiei in progressu adnatus.
- Q* Vena in hominibus potissimum à iugulo una cum septi transversi nervo deorsum excurrentes, & membranæ thoracem intersepienti ramulos deriuans.
- R, S, T, V* Pulmonis pars sinistram thoracis cavitatē occupans. ac *R* & *S* huius partis sedem notant, quæ costis, seu ipsas succingenti mēbranæ proxima est, gibbā ue cernitur. *T* uero & *V* eius partis sedem indicant, quæ priusquam collaberetur, exteriori superficiei membranæ thoracem interdiuidentis committebatur. Rursus *R* & *T* partis huius pulmonis superiorem insinuant fibram, seu lobum. *S* autem & *V* inferiorem.

SECUNDA SEXTI LIBRI
FIGURA.



P R A E S E N S figura, quam erectam, nō autem humi prostratam finximus, primam sc-
ctionis serie subsequitur. etenim anteriori thoracis sede & lateribus cute & musculis qui illis ad
nascebantur, denudatis, ac costarū cartilaginibus ab ossibus liberatis, ipsisq; ossibus extrorsum
effractis, tandem pectoris os unā cum ipsi coarctatis cartilaginibus ab utrisq; thoracem inter se
piētibus mēbranis liberauimus, sursumq; deduximus, ut illius interior superficies obuia esset, et mē-
branarum thoracē interdiuidentiu natura accuratiū adhuc quā in prima figura exprimeret.

A, A Pectoris ossis unā cum costarum ipsi commissis cartilaginibus interior, seu thoracis cavitatem
spectans superficies.

B, C Duæ indicantur uenæ à iugulo pectoris os petentes, ac præter frequentes quas diffundunt ramu-
mulo, etiam ad elatiorem abdominis sedem excurrentes.

D, E Duæ arteriæ uenas nuper commemoratas ad umbilici usq; regionem concomitantes, nullibi tamē
ut uenæ ad cutem subeuntes.

F Glandula sub elatissima pectoris ossis sede in iugulo repositæ, ac uasorum securæ distributionē
à Natura præfectæ.

G, G Dextræ thoracem interdiuidentium membranarum pars, quæ dextro pectoris ossis lateri ad-
nascebatur.

H Dictæ modò membranæ dextra, seu pulmonem spectans superficies.

I, I Sinistræ thoracis cavitatem intersepientium membranarum pars, quæ sinistro pectoris ossis la-
teri ante sectionem connata fuerat.

K Dictæ modò membranæ sinistra, seu pulmonem respiciens superficies.

L, L Interuallum indicatur inter duas thoracem intersepientes membranas inibi conspicuum, ubi hu-
mano pectoris ossi continuantur.


M, M Hæc protuberans regio cordis indicat situm. cor enim unā cum ipsius inuolucro immotum inter
membranas thoracem sepientes collocatur.

N, O, P, Q Pulmonis gibbum sedes uē costis contermina indicatur. neutra namque ex parte pulmo-
nis partes in latera refleximus. Verum *N* & *O* duas fibras dextræ partis pulmonis indicant,
N quidem elatiorem, *O* uero humiliorem. atq; ita etiam in sinistro latere *P* & *Q*.

R, R Septi transuersi sedes, quā à mucronata pectoris ossis cartilagine hic *S* insignita, & dein à car-
S. tilaginum quæ pectoris ossi non coarticulantur mucronibus, liberaui.

T, V Cutis deorsum à thoracis anteriori sede, euerfa, atque ea superficie conspicua, qua musculis
obducebatur.

TERTIA SEXTI LIBRI
FIGURÆ.



QVONIAM duæ præcedentes figuræ cordis ac pulmonis sitû abundè indicant, præsentem figuram (uti & subsequentes uniuersas) tanquam è thoracis cauitate euulsam delineauimus, ne si singulis figuris truncum corporis appinxissemus, negotium frustra operosius redderetur. Tertia itaq; figura cor suo uestitum inuolucro continet unà cum pulmone & septi transversæ portione, cui in hominibus magna amplitudine cordis inuolucrum connascitur.

A Hic uenæ cauæ portionem sursum conscendentem & magnam arteriam præscidimus, tanta uasorum cordis asseruata portione, quanta cordis inuolucro obducitur, aut à qua id inuolucrû potius initium ducit. Vbi enim hic B ascripsi, illic inuolucrum pertinacissimè cauæ uenæ & magnæ arteriæ & uenæ arteriali adnascitur, ab illis uasis non secus quàm à corde, toto illo inter

C. uallo abscedens, quod à B ad C metitur. C enim cordis basis sedem regionem uel indicat.

D, E, F Cordis inuolucris anterior sedes, cordis figuram nuci pineæ non admodum absimilem referēs. D enim & E basim notant, F uero mucronem.


G Ab F ad G sedes insignitur, qua cordis inuolucrum septo transverso in hominibus secus multo quàm in canibus adnascitur. Cæterum uenulæ hic in cordis inuolucro conspicuæ, non cordis, at ipsius inuolucris sunt. id namque in hominibus tam crassum ualidumq; uisitur, ut cordis color per illud uix transpareat.

H Septi transversæ pars.

I, I Septi transversæ nerui.

L, M, N, O Pulmo. at singuli characteres singulas humani pulmonis insinuant fibras, lobos uel.

QVARTA SEXTI LIBRI FIGURA.



QVARTAE FIGURAE, EIVSDEMQUE CHARA. cterum Index.


HÆC figura cordis inuolucrum diuisum gerit, ipsumq; cor et cordis uasa anteriori sede ab inuolucro deteximus, corde interim immoto.

A Sedes, qua cordis inuolucrum cordis uasis supra ipsius basim continuatur.

Cor.

- B, B Cordis inuolucrum ab anteriori cordis sede in latera reflexum.
 C, D, E Cordis anterior sedes. ac C quidem & D ipsius indicant basim, E uero mucronem.
 F Vena caua.
 G Arterialis uena.
 H Magna arteria. Venalis autem arteria nisi corde in dextrum latus (uti sexta ostendit figura) reflexo, nulla ex parte conspici potest.
 I Dextra cordis auricula.
 K Sinistræ cordis auriculæ apex.
 L, L Venæ sunt ac arteriæ à cordis basim cingentibus uasis pronatæ, atq; huc ex posteriori cordis sede, adeoq; sinistro ipsius latere antrorsum reductæ.
 M, N, O, P Pulmonis indicantur fibræ lobæ ue.
 Q Septi transversæ pars.


QVINTA SEXTI LIBRI
FIGVRA.



QVINTAE FIGVRAE, ET IPSIVS CHARACTERUM Index.

PRÆSENS figura unâ cum pulmonibus cor exprimit, uerim ab ipsius inuolucro penitus liberum: ac in sinistrum latus in hoc reflexum, ut uenæ cauæ ad cordis basim continuas oculis subijceretur.

- A Cordis dextrum latus, magnaq; ipsius posterioris sedis regio.
 B Dextra cordis auricula.
 C Vena caua, quâ in cor dehiscit, aut ab ipso pronascitur.
 D Venæ cauæ portio, septum transversum permeans.
 E Septi transversæ pars.
 F Venæ cauæ portio iugulum petens.
 G Venæ pari carentis initium.
 H Arteriæ magnæ radix.
 I Arteriæ magnæ truncus, qui deorsum ad spinam explicatur.
 K Portio est nerui sinistri, sexti paris neruorum cerebri, à quo subsequens figura cordis neruulum depromi ostendet.
 L, M, N, O Pulmonis notantur fibræ.
 P Vasorum pulmonem aduentium hic aliqua series conspicitur.



SEXTAE FIGURAE, ET IPSIVS CHARACTERUM Index.


PRÆSENS figura cor in dextrum latus ita conuolutum proponit, quemadmodum mox præcedens id ad sinistram ostendebat reflexum. atq; ut illa uenæ cauæ ad cordis basim continuitatem indicabat, ita præsens uenalem exprimit arteriam, ac sinistram cordis aurem, & cordis quoq; neruulum. cuius ductus ut esset conspectior, arteriæ magnæ aliquot propaggines, & asperæ arteriæ & neruorum sexti paris cerebri portiones huic figuræ adnexas reliquimus.

- A, B, C* Cordis sinistrum latus, & posterioris ipsius sedis magna regio.
D Venæ & arteriæ cordis basim cingentes.
E, E Venæ & arteriæ à uasis cordis basim ambientibus deorsum exporrectæ.
F Sinistra cordis auricula.
G Arteria uenalis.
H, H Arteriæ uenalis soboles in sinistram pulmonis partem excurrentes. Quæ uerò in dextram feruntur, oculis non patent: quòd illarum radix sub corde mox in huius uasis ortu ad dextram pulmonis sedem prorepat.
I Venæ arterialis principium.
K Arterialis uenæ pars, sinistram pulmonis partem petens.
L Arterialis uenæ pars dextræ pulmonis parti distributa, ac secundum posteriorem caudicis magnæ arteriæ sedem reflexa.
M Apex dextræ cordis auriculæ.
N, N Vena caua.
O Magnæ arteriæ caudex.
P Magnæ arteriæ portio deorsum ad spinam detorta.
Q Magnæ arteriæ portio sinistram axillam accedens.
R Arteriæ magnæ portio iugulum petens.
S Arteriæ magnæ portionis iugulum petentis dextra pars, à qua axillaris dextri brachij constituitur arteria *T* insignita.
T tuitur arteria *T* insignita.
V, X Soporariæ seu somniferæ arteriæ.
Y Asperæ arteriæ caudex.
a Dexter neruus sexti paris neruorum cerebri.
b Ramuli, quos neruus *a* insignitus ad dextri recurrentis nerui constitutionem digerit.

c Dexter

- e Dexter recurrens seu reuersus neruus.
d Sinister neruus sexti paris neruorum cerebri.
c Sinistri nuper commemorati nerui surculus, sinistrae pulmonis parti oblatus.
f Ramuli sinistri nerui d insigniti, à quibus sinister recurrens neruus constituitur.
g, g Sinister recurrens neruus.
h Neruulus secundum uenam arterialem exporrectus, ac cordis basis centrum adiens.
i, k, l, m Pulmonis indicantur fibræ.
n, o Septum transversum.

SEPTIMA SEXTI LIBRI FIGVRA.



SEPTIMAE FIGVRAE, EIVSDEM QVE CHARACTERUM Index.

H, A, E, C figura cor à pulmone & septo transverso liberum ostendit, cuius dexter uentriculus unica sectione ad apertus cernitur ab anteriori sede orificij uenæ cauæ ad cordis usq; mucronem ducta, quò id orificium et ipsi præfectæ membranæ in conspectum uenirent. dein ut interior dextræ cordis auriculæ superficies oculis subijceretur, eam intro euer sam finximus.

A Venæ cauæ pars, septum transversum permeans.

B Venæ cauæ pars iugulum petens.

C, C, C Orificium uenæ cauæ in dextrum cordis sinum pertinens.

D, E Orificia sunt ascendantis & descenditis uenæ cauæ partium.

F Dextra cordis auricula inuersa, & inæqualem fibrosamq; ipsius notans superficiem.

G Coronalis uenæ principium.

H, H, H Protuberans in uenæ cauæ orificio circulus.

K, L, M Tres membranæ uenæ cauæ orificio præfectæ.


N, N Fibræ ab inferiori sede membranularum uenæ cauæ orificij, deorsum ad uentriculi dextri latera mucronemq; ductæ.

O, O Carneæ partes indicantur, quæ fibras nuper dictas amplexantur, teretemq; formam exprimunt.

P Hæc uentriculi dextri cavitatis uersus uenæ arterialis orificium pertinet.

Q, R Crassities substantiæ dextrum cordis uentriculum constituentis.

OCTAVA SEXTI LIBRI FIGVRA.



OCTAVA figura in hoc à iam præcedente uariat, quod ex dextri cordis uentriculi se-
de, inibi P insignita, sectionem duxerim in uenæ arterialis usque amplitudinem, ac eius uenæ ori-
ficium distenderim, ut membranæ ipsius aptè in conspectum uenirent.

A Venæ cauæ portio iugulum petens.

B Arteriæ magnæ caudex.

C, D Venæ arterialis orificium. uerùm singuli characteres indicant singula foramina ramorum, in
quos arterialis uenæ caudex primum discinditur.


E, F, G Tres membranæ arterialis uenæ orificio præfectæ.

H, H Cordis uentriculorum notatur septum, seu sinistrum latus dextri cordis uentriculi: atq; ita hic de
xtri uentriculi cordis uniuerſa amplitudo in conspectu est.

I Vna membranarum uenæ cauæ orificio adnatarum.

K Dextra hic pendet cordis auricula adhuc inuersa, atque cum cordis substantia cui proxima est
reflexa.

NONA SEXTI LIBRI FIGURA.



NONAE FIGURAE, EIVSDEMQUE CHARA- cterum Index.

HAC figura idem cor, quod duabus iam præcedentibus, ostenditur. uerùm hic una sectio ex
arteriæ uenalis orificio ad cordis usq; mucronem ducitur, ipsumq; uenalis arteriæ orificium unâ
cum sinistro cordis uentriculo distenditur, apparentibus simul membranæ illi orificio præfe-
ctis, & inuersa cordis sinistra auricula, ut & hæc internam ipsius superficiem ostenderet.

A Magnæ arteriæ caudex.

B Venæ arterialis portio.

C, C Venalis arteriæ orificium.

D, D Protuberans in uenalis arteriæ orificio circulus.

E, F, Duæ uenalis arteriæ orificio præfectæ membranæ.

G, G Fibræ ab humiliori dictarum membranarum sede deorsum ad sinistri cordis uentriculi latera
protenſæ.


H, H Carnea cordis substantia, eas quas modo G & G insigniui fibras amplectens.

I Sinistra cordis auricula introrsum inuersa.

K Septum cordis uentriculorum.

L Hæc sinistri uentriculi amplitudo ad magnæ arteriæ orificium conscendit, cuius membranas mo-
dò explicaturi sumus.

M, M Substantiæ cordis, quâ sinistrum ipsius uentriculum constituit, crassities.




DECIMAE FIGVRAE, EIVSDEM QVE CHA-
cterum Index.

H I C ex sinistri cordis uentriculi dextra elatioriꝫ sede sectionem ad arteriæ magnæ ampli-
tudinē usq; duximus, ut distēto eius orificio tres membranæ ipsi præfectæ, in propatulo essent.

- A* Arteriæ magnæ orificium.
B, C, D Tres membranæ arteriæ magnæ orificio præfectæ. uerū harum trium (uti inter disse-
candum crebro fit) una per medium dissecta est, & utrinq; una ipsius pars conspicitur. Estq;
quam *B* insigniuimus.
E, F Principia sunt duarum coronalium arteriarum.
G Coronalis uenæ & coronalis arteriæ hic apparet portio.
H Arteriæ uenalis orificium.
I, K Duæ membranæ arterialis uenæ orificio appositæ.
L Sinistra cordis auricula introrsum inuersa.
M Fibræ ab humiliori dictarum membranarum sede, ad sinistri cordis uentriculi latera per-
tinentes.
N Carnea cordis substantia dictas nuper fibras adaugens, amplectensq;
O Portio uenæ arteriosæ.
P, Q Cordis substantiæ crassities, ubi sinistrum cordis efformat uentriculum, indicatur.
R Cordis uentriculorum septum.
S, S Hic ad arteriæ magnæ radicem dura & ueluti cartilaginosa cordis conspicitur substantia,
quæ dissectionis professoribus ossis nomine habetur.

VNDECIMA SEXTI LIBRI FIGVRA.




VNDECIMAE FIGVRAE EIVSDEM QVE CHA-
racterum Index.

H A E C figura cor per transuersum dissectum ostendit, ut cordis substantiæ secundum
ipsius uentriculos crassities in conspectum ueniret.


- A* Caudæ uenæ pars. *B* Dextra cordis auricula.
C Arteriæ magnæ caudex.
D Vena arterialis.
E Sinistra cordis auris, cui portio appendet uenalis arteriæ. Atque hi characteres cordis basim insinuant. *F, F* Cordis mucro.
G, G Dexter cordis uentriculus.
H, H Sinister cordis uentriculus.
I, I Septum cordis uentriculorum.

DVODECIMA SEXTI LIBRI FIGVRA.



DVODECIMAE FIGVRÆ, EIVSDEM QVE CHARACTERUM Index.

- PRÆSENT I figura anterior pulmonis sedes, à qua cor præsectū est, delineatur. quæ inferiori, terramq; spectanti bubuli pedis sedi non admodum imagine absimilis uisitur.
- A, A* Stomachi quo cibus in uentriculum fertur pars. *B* Aspera arteria.
C Vena arterialis. *D* Venalis arteria.
E, F, G, H Quatuor pulmonis fibræ, seu lobi. Verum *G* & *H* priuatim pulmonis sedem indicant, septi transuersi gibbo thoracis amplitudinem spectanti congruentem.
I Septum transuersum.

DECIMATERTIA SEXTI LIBRI
FIGVRA.

HÆC figura pulmonis ex thorace euulsi posteriorem notat sedem.

A, Asperæ arteriæ portio, posteriori ex sede hic conspicua.

B, C, D, E Quatuor pulmonis fibræ seu lobi, bubuli pedis superiorem regionem forma exprimentes.

SEXTI LIBRI FIGURARVM

Indicum finis.

QVAS PARTES NATURA AEREÆ

*substantiæ reficiendæ fabrefecerit, ac quæ priuatim uitali spiritui
subministræt. Caput I.*



U A' M affabrè cibi potionisq; organa corporis nostri architectus extruxerit, quemq; ipsorum usus & actionis gratia numerum, situm, formam, connexum, substantiã, ualorum neruorumq; insertionem singulis largitus sit, superior liber non perfunctoriè explicuit. Quocirca præsens instrumenta, aëream quæ continuò defluit substantiam restituentia, ac calorem innatum recreantia, opportunè complectetur. Quòd autem omnes respirationi pulsiq; famulantes particule in horum classem collocandæ ueniant, cuius per spicuum esse arbitror, neque minus quenquam respirationis & pulsus usum (quoad nobis animæ substantiam ignorantibus hunc nosse datur) latere existimo: ac proinde etiam nunc in illorum usu explicando haud longius hærendum est. Quanquam in secundo libro, quum respirationi subseruientes enarrarem musculos, & in tertio, ubi arteriarum usus recensibam, de respirationis & pulsus natura usuq; nonnulla pertractauerim. Absolutam enim horum tractationem neque illic neque hic subiungendam duxi, quòd hanc priuatos eosdemq; complurimos libros exigere, Galenus omnium bonorum autor nos abundè docuerit, quòdq; in præsentis potius partium corporis descriptionem, quàm contentiosè, ignorata adhuc animæ essentia, pulsus & respirationis usum perscribere sit animus. Quando inspiramus itaque, omnibus corporis partibus secundum naturam sese habentibus, neq; caloris ingenti (quem Galenus animam, aut primarium saltem ipsius instrumentum esse alibi attestatur) qualitate quauis occasione ad aucta, tunc aërem per nares attrahimus: cuius portio ad cerebrum, quum per^a octauum capitis ossis foramina, quibus olfactus^b organa incumbunt, tum etiam atque id magis per^c meatus pituitam ex cerebro ad fauces deducentes assumitur, spiritum animale nonnihil enutritura. Verum per nares attracti aëris copiosior portio, ex amplis narium^d foraminibus in fauces secundum posteriorem^e gargarij sedem ducitur, nonnihil ab illo temperata. Hinc in^f laryngem, & dein per totam asperam arteriam in frequentes ipsius per pulmonis substantiam propagatas folioles fertur. Postquam uerò aër ab hac substantia emutatus, ac cordi quodammodo præparatus est, ab^g arteriæ uenosæ surculis similiter pulmonis substantiæ intextis, ex asperæ arteriæ ramis elicitur, atque in^h sinistrum cordis uentriculum per arteriã uenalem delatus, tenui feruidoq; admodum quem cor inibi continet, sanguini cõmiscetur. Huius aëris qualitate contenti in hoc uentriculo caloris qualitas euentilatur, substantia autem caloris (quæ aëre & spirituosi sanguinis exhalatione constat) illius aëris substantia enutritur. Quod uerò uelut fuliginosum ex hac cordis propria peculiariq; functione congeritur, rursus per arteriam uenalem in pulmonem ablegatur, atq; ab asperæ arteriæ propaginibus exceptum, unà cum reliquo aere, quem ex illis propaginibus arteriæ uenalis germina tanquam cordi ineptum non attraxerant, denuò per asperam arteriã & laryngem faucesq; & nares educitur. Huiusmodi sanè in naturali respiratione aeris ductus perficitur: in non naturali uerò aer potissimum per os attrahitur, efferturq;. Vocamus autem non naturalem respirationem, qua alterius quàm temperatæ caloris innati qualitatis nomine utimur, ut quum ea qualitas aliqua ex causa in eum modum increuit, ut per nares adductus aer homini non sufficiat: aut quoties exufflationem, uocem, eiusque generis reliqua, ad quæ secundariò respiratio famulatur, tentamus. Ab aeris substantia in sinistro cordis uentriculo sanguini ibidem contento permixta, uitalis spiritus conficitur, qui ex hoc uentriculo inⁱ magnam arteriam unà cum sanguine impetu ruente ac feruido diffusus, per uniuersum corpus secundum

Sexti libri argumentum.

Qui aër in respiratione digeratur, cordisq; ipsi subministrantium partium functionis enumeratio. Lib. 2. de Arte curat. ad Glauconem.

48 fig. ca. 6
li. 1 A, A, B.
b 12 fi. li. 7
C, D, E 13
fi. L, L.
c 3 fig. cap.
12 li. 1 characteres ad
latera M
positi.
d 2 fi. ca. 12
li. 1 n, o.
e 6 muscul.
tab. E.
f in figurâ
asperæ arteriæ
expri
mentem ca.
38 lib. 1. &
hic 6 fi. Y.
g 2 fi. ca. 15
lib. 3. et hic
6 fig. G, &
12 fig. D.
h Apertus
est in 9 fig.
i 10 fi. A. 6
fi. O. et tota
fig. cap. 12
lib. 3.

*Respiratio-
nis & pulsus
idem usus.*

arteriæ seriè digeritur, & calorē singulis mēbris priuatim innatū reficit temperatq̃, quod ipsius diffusum est instaurans, haud secus sanè atq̃ membrorum substantia à sanguine per uenas adducto restituitur. Et quemadmodum respiratio & sanguinis ex ^k dextro cordis uentriculo in sinistram assumptus, cordi ad uitalis spiritus calorisq̃ natiui repositionem faciunt; sic pari ratione materia à sinistro cordis uentriculo per arterias reliquo deducta, corpori aliarū partium spiritum & natiuum calorem recreat. Atque huius etiam occasionis gratia idem pulsus & respirationis usus censetur. quod enim inspiratio materiei in sinistro cordis uentriculo repositæ præstat, id reliquis partibus in pulsu arteriarum dilatatio largitur: expiratio autem arteriarum contractioni correspondet. At quibus organis, incredibili diuināq̃ artificis ui fabricatis, hæc omnia perficiantur, quāq̃ ratione hæc admiranda Naturæ opera compleantur, iam ordine enitar persequi: ea interim non repetiturus quæ in primo libro de thoracis ossibus, & asperæ arteriæ cartilaginibus, ac in secundo de eorundem musculis, & in tertio de arteriarū constructione persecutus sum. Quapropter ut in libro hunc præcedente à peritonæo sermonis cibi ac potus organorū initium opportunè instituimus, ita quoq̃ & hīc à tunica costas succingente nō immeritō instrumenta aeræ substantiæ nutriendæ dedicata auspicabimur.

*k Patet in
7 fi. & 8.*

DE TUNICA COSTAS SUCCINGENTE. Caput II.

QUANDOQV IDEM costas succingens tunica aliud nihil quàm membrana est, neque ita integrè à costis, ac peritonæum ab ipsi commissis musculis, liberari potest, eius delineationem aliunde sumere non licet, quàm ex figuris internam thoracis amplitudinem superficiemq̃ exprimentibus, cuiusmodi imprimis censeripotest octaua musculorū tabula: ac ex ossium figuris thoracis ossa simul proponētibus, ut duæ priores Capitis deciminoni libri primi, & tres ultimæ eiusdem libri figuræ.

*Nomen & si-
z tunicae co-
stas succingen-
tis.*



Magnitudo.

Figura.

*Tunica su-
perficies qua-
les, quisq̃ earū
ad alias par-
tes nexus.*

TUNICAE membranæ ue costas succingentis, ac *ἡ μεμβράνη* Græcis, uulgò autem pleura dictæ situm, nomen ipsius indicat: hæc nanque omnibus costis (præterquam duodecimæ à ^a septi transuersi implantatione occupatæ) præterea & toti pectoris ossi subtenfa, thoracis uerò uertebrae corporibus, & superiori septi parti thoracis amplitudinem respicienti obducta, figuram & magnitudinem totius thoracis cauitati correspondentem adipiscitur. Pertinet quidem parte ipsius posteriori à prima thoracis uertebra deorsum ad undecimam, è cuius regione septi pars arteriam ^b magnam transmittens consistit. Anteriori autem ipsius parte à iugulo ad humillimam pectoris ossis partem, cui septum innascitur, descendit. In lateribus uerò à prima costa ad superiorem septi superficiem, quam thoracis cauitatem respicere diximus, fertur, hanc uniuersam, ut & reliquam thoracis amplitudinem sublinens. Præsens itaq̃ tunica, perinde atque thoracis cauitas, figura admodum uariat. Superiori enim parte, ut & thorax, angusta est, ac uelut in acutum desinit. inferiori uerò parte latior quàm superiori existit, at in lateribus thoracis quoq̃ modo latior, quàm inferiori sede uisitur. Deinde anteriori parte breuior est, posteriori autem multo longior pro obliqui situs septi ratione existit, nam à pectoris ossis mucrone ad undecimam thoracis uertebra pertingit. Rursus anteriori parte, ut & in lateribus exterius, quemadmodū & thorax ipse, gibba uisitur: at posteriori secundum uniuersam longitudinem, uelut ad amplitudinem ipsius internam impressio nem peritonæi quoque ritu exigit, atque id ratione uertebrae & radicum costarum. Vertebrae enim corpora in thoracis prominent cauitatem, ut & costarum radices, quæ à uertebrae corporibus retrorsum tantisper reflectuntur, donec denuò uersus anteriora deorsum procedentes obliquentur. Interius omni ex parte leuis, & uelut aqueo humore perfusa est, præterquam ubi processus quosdam membraneos exporrigit, ex quibus aut alias educit membranas, aut corpus aliquod sibi colligat. Fit autē id præcipuè secundum uniuersam posterioris suæ partis longitudinem, ad uertebrae nimirum progressum, ubi ^c intersepientes thoracem membranas educit, & ^d asperam arteriam, ^e stomachum, ^f magnam arteriam, & ^g sine coniuge uenam firmat, & sibi ipsi hæc uinculis connectit, illisq̃ tunicas exporrigit. Pariter se habet secundum ossis pectoris & septi quoque à pectore ad dorsum longitudinem, ubi intersepientes thoracem membranæ illi continuantur. Nonnunquam, sed admodum rarò, non secus ac peritonæo internæ huius tunicae sedi adeps durior adnascitur, idque præcipuè, ubi uertebrae propinquior

*a 7 muscul.
tab. 4.*

*b 7 muscul.
tab. 4.*

*c 1. fi. H, K,
L, O. 2 fig.
G, G, H et I,
I, K.
d 1 fi. ca. 38
lib. 1
e 14, 15 fig.
li. 5 A, B, C.
f fig. cap. 12
lib. 3 i.
g fig. cap. 6
lib. 3 F, F.*

pinquior est, quaque ipsius insigniores uenae porriguntur. Præterea modo in uno, modo in altero latere membraneas fibras pulmoni applantat, quibus illum sibi admodum pertinaciter adnectit. Hoc enim non semel obseruauimus, idque potissimum in læuo latere, non quidem ad costas duntaxat, uerum & ad septi^s partem pulmoni uicinam. In canibus uerò, suis, simijs id rarius, aut nunquam reperimus. Quinetiam in hominibus priuatim qua hæc membrana thoracis amplitudinem succingens septo obnascitur, cordis inuolucrumⁿ magna amplitudine ipsi coalescit continuaturque: haud secus, quam si id hinc initium duceret. Porro hæc membrana superficie externa, quod undique adiacentibus partibus adnascatur aspera, inæqualisque, inuicem connexarum membranarum modo uisitur, uix aliqua tamen pinguedine inibi obducta. Insuper, ut neque peritonæum, præsens membrana non adeò pertinaciter omnibus partibus connata hæret, ualidius nanque costarum ossibus ac cartilaginibus tunicae peculiariter unamquamque costam inuestiētis, cuiusque mox meminero, interuentu adnascitur, quam internæ intercostalium musculorum sedi. Sic quoque septi carnosæ parti longè remissius quam neruosa committitur. Quod autem similia cum septo foramina peritonæi modo hinc adipiscitur, perspicuum cuius esse arbitror, quæ septo namque obducitur, ternis foraminibus est peruium. uno quidem uenæ cauæ caudici parato, secundo autem stomacho, tertio uerò magnæ arteriæ & uenæ pari carentis fini. In iugulo amplo continuoque foramine non pertunditur, uerum quæ eam inibi perreptant uasa pluribus foraminibus cōplectitur, ipsique adnascitur, & tunicam aliam à propria illarum ipsis offert. transmittit uerò hinc uenæ cauæ & arteriæ magnæ^k ramos, ad hæc^l stomachum, ^m asperam arteriam, sexti paris neruorum cerebriⁿ neruos, & septi transuersi etiam^o neruos. Postremò secundum posterioris ipsius sedis longitudinem utrinque ordinata serie perforatur, ^p uenis ac ^q arterijs costarum interualla petentibus uiam præbens. Substantia deinceps constat membranea, dura scilicet & tenui, alba, æquali, & robore non nihil peritonæum superante: uerum similiter ipsi quoque peritonæo huius substantia ad dorsum durior quam iuxta pectus sentitur. Ipsius nanque origo à uertebRARUM ligamentis illarum corpora cōnectentibus potissimum pendet. Porro uenis ac arterijs & neruis quoque abundat. ac primum quidem in posteriori parte ipsi uena coniugis expers adnascitur: deinde & magna arteria. in lateribus uerò subtenfas exigit longas, neque eas ualde graciles uenas & arterias, quæ singulis costis exporriguntur. Priori autem parti^r uasa ipsi incumbunt, sub pectoris ossē deorsum ad abdominis superiora prorepentia, & ramos in costarum cartilaginum interualla digerentia. Neruos quoque adipiscitur quamplurimos: quippe in iugulo transmittit maximas sexti paris neruorum cerebri portiones, quæ in pulmonem, uentriculum, & iecur distribuuntur, ^s neruosque recurrentes germinant. Deinde etiam ibidem iter, uti diximus, præbet septi^t neruis, à quibus innumeras soboles tunica hæc mutuatur, quæ septum succingit. Atque hos quidem neruos intus complectitur, exterius autem^u magnos, eosdemque una serie ad singula costarum interualla deductos obtinet, qui huic tunicae unā cum uenis arterijsque attenduntur. Præterea in posteriori sede utrinque ipsi subtenduntur, sexti paris neruorum^x propaggines costarum radicibus distributæ, ac tandem in nutritionis organa (uti diximus antea) diffusæ. Cæterum præter hanc costas succingentem tunicam singulis costis^y alia peculiaris obtigit, quam Græcos alteram succingentem costas membranā uocasse reor. Tale enim quid in libro de Cōstitutione artis medicæ Galenus, morbi lateralis species subdiuidens, indicare uidetur. Est autem altera hæc succingens costas tunica inuolucrum, quod omnibus propemodum ossibus commune censetur, ea nimirum membrana, quam quod os ambit, *σπρίσσειν* Græci nuncuparunt. Quemadmodum enim ossa huiusmodi membranula obcingit, ita quoque & singulæ costæ orbiculatim ipsas ambientem membranam exigunt, peculiare nihil ab eiusmodi cæterorum ossium membranis sibi uendicantem, quas ossium diximus esse inuolucra, & uelut amicitiae uinculum quo aptè durū os molli carni committatur. At thoracis cavitatem succingens membrana, quia amicum pulmonis ad costas contactum molitur, totius thoracis cavitatem uelut una superficie non asperam reddit. Deinde omnibus quæ thorax cōtinet inuolucrum quoddam euasit, unde etiam ab usu tunica (uti à substantia, membrana) dissectionis proceribus uocitatur. Ad hæc ipsa quoque, ut & peritonæum^z omnibus quæ amplectitur organis tunicas exporrigit, eademque firmata colligat. Quod autem cum thorace distendatur, arcteturque, neminem ambigere arbitror. thoraci enim undique adnata, tali constat substantia, qualis & inuolucris loco habetur, ac simul leuis sequaxque est. His accedit, quod præsens tunica septo transuerso tenui & robusto interim opportunè facto, non inefficax robur adiungat, & in ipso, ut & in^a intercostalibus musculis, membranæ musculorum uentrem ambientis uicem abundè gerat: quanquam & propriam membranam intercostales musculi aliorum musculorum modo obscure fortiri uidentur. Venæ autem & arteriæ & ner-

Tunica costarum foramina.

Substantia tunica costarum succingentis.

Principium.

Singulis costis peculiaris tunica.

Tunica costarum usus, & ipsius constructionis ratio.

ui quibus tunica committitur, etiam si ad ipsius nutritionem & sensum usui sint, non tamen huius gratia praecipue, sed uicinarum partium, illi adeo frequentes attenduntur. Vnde etiam ipsi & crebrior cum magna tensione & punctili cruciatu, ut & in cerebri membranis, inflammatio oboritur.

DE MEMBRANIS CAVITATEM THORACIS INTERSEPIENTIBUS. Caput III.

MEMBRANAS thoracis amplitudinem interdiuidentes non aliter oculis subiicere potuimus, quam id prima & secunda figura praestare conati sumus, uti ex illarum figurarum indicibus petere licet.

Intersepien-
tium membrana-
rum nomencla-
tura.
Numerus.

Situs.

Forma. Ma-
gnitudo.

Quo pacto in-
tersepien-
tes membra-
nae in
uicem distent.

Quid inter
membras in-
tersepien-
tes re-
ponatur.



MEMBRANA superiori Capite explicata, uniuersam thoracis cauitatem succingit, sublimitq. at membranæ quas Græci *διαφραγματος*, nos autem intersepien-tes thoracem, aut uulgò mediastinū nuncupamus, eandem cauitatem interdiuidunt, in duas præcipuas amplitudines eam distinguen-tes, unde & nomen suum meritò obtinent. Habentur autem in thoracis medio utrinque^a singulæ secundum ipsius longitudinem procedentes, à iugulo enim ad totam septi longitudinem pertingunt, & à tota pectoris ossis longitudine ad thoracis usque uertebra- rum corpora exporriguntur. Atque his etiam ter- minis membranarum amplitudo circumscribitur, quæ triangulum quodammodo ex inæqua- libus & obliquis costis lateribus ue cōformatum refert. una enim costa, quæ & breuior est, à iu- gulo secundum pectoris ossis longitudinem ad eius mucronem, & septi hîc connexum fertur: secunda uerò hac longior, à iugulo secundum dorsi ductum ad undecimam usque thoracis uertebra- m procedit: tertia longitudine inter illas media, ab osse pectoris secundum septi longi- tudinem decliu- s ad dorsum descendens, duas priores costas cōmittit. Præsentem membranæ in mutua distantia & coitu plurimum uariant. secundum dorsi enim longitudinem, quâ uer- tebris committuntur, inuicem cōtiguæ sunt, & quàm minimam inter se cauitatem fibræ mem- braneis oppletam efformant. Quâ uerò pectoris ossi cōmittuntur, in homine quidem inuicem neutiquam contiguæ sunt, imò pro^b ossis pectoris latitudine mutuò^c distant. Superiori enim parte, ubi id amplissimum est, ac clauiculas primamq. utriusque lateris costam sustinet, mem- branæ etiam inuicem admodum abscedunt: cauitatem nihilominus uniuersam, quam inter se continent, fibrosis membraneisq. nexibus adimplentes. Vbi uerò pectoris ossi secundæ costæ cartilago coarticulatur, quemadmodum pectoris os hîc arctius euasit, ita quoque dextra mem- brana minus inibi à sinistra remouetur. Hæc membranarū disiunctio sensim secundum ossis pectoris longitudinem descendens, ut os ipsum latius efficitur, sic quoque & illa capaci- or red- dita magis diducitur, ita sanè, ut tanta in homine hîc membranarum cōsurgat distātia, quanta undique pectoris ossis cernitur amplitudo. Cæterum quâ membranæ septo transuerso^d com- mittuntur, omnium maximè inuicem abscedunt, atque hîc tantam efformant amplitudinem, quanta septi transuersi membranei circuli est^e latitudo. Cuius, quam ibidem membranæ effi- ciunt rarioribus membraneis fibræ obsita, admodum ampla dissecantibus occurrit, atque huius amplitudinis basis ad amissim correspondet figuræ membranei circuli ipsius septi, quæ latior est qua pectus quàm quâ dorsum respicit, latissima uerò in medio existit. Præsentem cauitatem in ho- minibus nihil prorsus præter cordis^f inuolucrum, ipsumq. cor & uenam cauam septum pene- trantem cōplectitur. In canibus uerò & reliquis animalibus longius pectoris os, longioremq. thoracem possidentibus, amplitudo hæc multo capaci- or uisitur, nullis membraneis fibræ ob- ducta. Dein eius amplitudinis basis à cordis inuolucri mucrone multum, secus quàm in homi- nibus, ut mox subiiciam, distat. Ad hæc, præter uenam cauam illa quoque amplitudo in dictis animalibus pulmonis lobum continet, qui sub sterniculi & manus cuiusdam instar cauam ue- nam hæc progredientem suffulcit. hoc enim homines quum breuiori ductu ipsis uena, quàm illis animalibus ducatur, destituti sunt: quanquam Galenus ex similibus cōiecturam faciens, hunc lobum etiam hominibus tribuerit, ut post eum reliqui dissectionis scriptores ad unum omnes, qui nulla rei habita consideratione, neq. quicquam minus quàm Anatomen aggressi, nil nobis aliud præstiterit, quàm quòd perperam plerq. ex Galeno descripserunt: neq. solum cum illo ueritati pepercerunt, uerum aptè à Galeno edocta admodum misere deprauantes, ac nescio in quæ compendia fœdissimè confarcinantes, ut Galeni ueterumq. omnes de re Anatomica libri propemodum interciderint, occasio fuerit. Cæterum hæc membranarum, quâ dorso, pectori & septo connascuntur, distantia est descriptio. Præterquam & alia uisitur, eas quas dixi sedes nequa-

a 2 fig. dex-
tra G, G,
H. sinistra
I, I et K in-
signitur.

b 6, 7 fig. ca-
19 lib 1.
c 2 fig. G, G
distant ab
I, I.

d 1 fig. K.
e ab n ad l
7 muscul.
tab.

f 3 fig. C, D,
E, F, G. de-
in quæ ha-
bentur in B,
B 4 fig.

nequaquam contingēs, & ad cordis effigiem formata. Præsentem enim membranæ in ipsarum medio cordis inuolucrum, uti diximus, complectuntur, & pro eius amplitudine formaq; dextra membrana à sinistra abscedit, & utraque inuolucrum id adnatum exigit. Adeo ut inter has membranas cordis inuolucrum, ob idq; & ipsum cor unà cum suis uasis contineatur, deinde et cauæ uenæ caudex, & innumeræ membranæ fibræ membranas has inuicem quibus dixi sedibus colligantes. His in medio nulla, nisi id perquam rarò, adnascitur pinguedo: exterius uerò quæ quæq; suam thoracis respicit amplitudinem, multa sæpe, ac præcipue in hominibus, adipe abundant, adeo ut omento quibusdam partibus similes, & pinguioresepius uideantur. Præter pinguedinem ipsis adnascitur^h glandosum corpus, uasorū distributionibus in iugulo præfectum. Venis ac arterijs abundant, sed tenuibus, ac illis quæ per omenti membranas digeruntur perquam similibus. Venæ quidem non à caua, ubi septum permeat (quanquam ita Galenus censuit) originem ducunt, sed potissimum ab illis quæ deorsum à iugulo pectoris ossi exporriguntur. Illæ enim uenæ ac arteriæ secundum harum membranarum ad pectus ductum descendentes, in progressu furculos dispergunt ex anterioribus in posteriora pertinentes. Deinde aliquot soboles his membranarum à uena coniugis experte offeruntur. At præter has plerumq; & potissimum in hominibus, alia notatu dignæ crassitudinis à iugulo secundum utriusq; membranæ longitudinē deorsum ad septū usq; deducitur, septi neruo cōcomitata. Septi enim transuersi nerui in externa membranarum sede ipsis adnati deorsum protenduntur, æquali ferè interuallo à pectore & dorso in progressu distantes. Atq; hi solum nerui cum uasis & adipe^o externæ membranarum regioni, quæ pulmonem respicit, adnascuntur, & læuis quodammodo, & aqueo quasi humore oblita uisitur: interdum etiam aliqua ex parte pulmonem adnatum possidens. Interna uerò membranarū sedes tum propter fibras membraneas, quibus inuicem membranæ committuntur, tum eas quibus ualidissime citra adipis interuentum cordis inuolucro adnascuntur, utraq; asperæ sunt. At si quæ iuxta septum huius cavitatis regio fibris non obsidetur, ea quoq; læuis similiter & aqueo humore madens uisitur. Membranæ hæ tunica costas succingente tenuiores aliquantulo sunt, ab hac ex omnibus illæ sedibus ubi ipsi membranæ committuntur ortum ducētes. Sunt autem illæ sedes, uti diximus, pectoris os, septum transversum & thoracis uertebrae, unde potissimum illæ membranæ enascuntur. Quæ primario usu in hoc creantur, ut cordis inuolucrum, ac proinde ipsum quoq; cor, ne deorsum ac retrorsum concidat, in sua sede continerēt. id enim & si ab alijs minimè animaduersum fuerit, uiuorum & mortuorum sectio luculentissime (si animū modò adhibueris) ostendet, quacumq; ratione has membranas aggressus fueris. Deinde ad uasorum securiorem ductum auxiliantur, & postremò ex uniuersa thoracis amplitudine duas efficiunt cavitates, qui usus haudquaquam minimus cense ri debet: quandoquidem huius beneficio altera thoracis cavitatem pertusa, & pulmone hac sede propter aërem per foramen ingredientem à motu cessante, altera cavitatem adhuc illæsa animali famulatur, quemadmodum in uulneribus & uiuis sectionibus frequenter condiscimus. Num autem ab his membranarum, an uerò à tunica costas succingente organa in thoracis cavitatem reposita, tunicas inuolucraq; mutuentur, hinc contentiosè haudquaquam disceptandum duxerim, quum planè idem usus, quod ad eiusmodi tunicas uasorumq; connexus spectat, harum membranarum & tunicae costas succingentis censendus ueniat. Præterea ne utiquam inuestigandum est, num una tantum in uniuerso thorace costas succingens sit membrana, quemadmodum eam descripsimus: num uerò duæ, ut una quidē dextra esset, ea scilicet quæ dextrā thoracis cavitatem succingit, unā cum dextra intersepiente membrana: alia autem sinistra, quæ ibidem thoracis amplitudini obducitur, & eius sedis interdiuidentem membranam efformat. quod prorsus non esset absurdum, essetq; peculiaris differentiā, qua succingens costas tunica à peritonæo distinguere tur, quum id unicum reuera sit, illa autem tunc duplex censeretur.

DE ASPERA ARTERIA.

Caput IIII.

AD asperæ arteriæ harmoniam spectandam imprimis conducunt figuræ trigesimi octaui Capitis libri primi, deinceps quæ uigesimo primo Capiti libri secundi præponuntur: ac proinde illas, earundemq; Indices intueri erit operæ præcium.

Quæ intersepientium membranarum substantiam subeant.

Pinguedo. Glandosum corpus.

Venæ, arteriæ.

Tum alibi sepius, tum falsam in Aristotelem argumēta confingens in 6 de Placitis Hippocr. & Platonis.

Intersepientium membranarum superficies & connexus.

Ortus intersepientium membranarum. Intersepientium membranarum usus.



*Aspera ar-
teria nume-
rus.
Situs.*

*Ipsi commissi
corpora.*

*Aspera ar-
teria forma.*

IN tertio libro, ubi arteriarum complectebam seriem, hæc cuius constructi-
onem modò persequi statutum est, simpliciter quòd aërem contineat, arte-
ria ueteribus Græcis primùm appellata dicebatur: at temporis successu,
quum & uasa^a uitalem spiritum sanguinemq; impetu ruentē deducunt, &
in uenarum numero non amplius habita, arteriæ etiam nomine donaren-
tur, hæc quidem læues arteriæ, illa uerò aspera, ab inæquali qua cōstat sub-
stantia, nuncupabantur: eoq; nomine ad hunc usque diem aspera arteria
est obuia, non minus sanè quàm situs quoque ipsius, & numerus citra longam enarrationem
conspicui sunt. Vnica enim non hominibus modò, uerùm & animalibus quæ pulmonem nan-
ciscuntur omnibus obtigit, quæ longo ductu, instar caudicis cuiusdam, ex faucibus deorsum
protenfa, frequenti sobole in pulmonis substantiam digeritur. In faucibus enim (quæ Græcis
φάρυγγος nuncupantur)^b duobus narium foraminibus in oris amplitudinē pertinentibus,^c alia
duo in humiliori faucium sede correspondent, quæ quidem nō secundum latus, ut illa, mutuò
contermina, sed unum altero prius cernuntur. At horum quidem posterius stomachi cibum
potumq; ex ore in uentriculum deducētis initium existit. Anterius uerò asperæ arteriæ princi-
pium est, quæ hinc deorsum rectā nusquam in latus declinans, secundum ceruicis longitudinē
ad quartam usque thoracis uertebam ducitur, tota posteriori sede^d substratum habens^e stoma-
chum, uertebularum corporibus, primòq; dorsum mouentium musculorum pari absq; alterius
organī interuentu innitentem, unde & aspera arteria à uertebis tantum remouetur, quāta^f sto-
machi est crassities. Anteriori autem asperæ arteriæ sedi non eadem toto ductu prætenduntur.
in elatissima nanque sede, ubi oris amplitudini committitur,^g os ab^h u figuraⁱ uocandē nuncupa-
tum, ipsi cum illius ossis quoque^j musculis & cute prælocatur. Hinc uerò ad iugulum ac pe-
ctoris ossis elatiorem sedem usque, præter cutem & illi^k subditum ex carnosā membrana mu-
sculum, arteriæ asperæ obtenditur^l bifidus musculus, qui à pectoris osse enatus, ossis^m referen-
tis anteriori parti inseritur, & deindeⁿ alij duo à pectoris quoque osse in scutiformis cartilaginis
humiliorem antiquamq; partem pertingentes, proximæ arteriæ hinc incumbunt. Vbi uerò tho-
racem hæc ingreditur, principia quoq;^o musculorum ex clauiculis & pectoris osse ad^p mamil-
lares in capite processus deductorum, tanquam propugnacula ipsi quoq; præfiguntur. In
iugulo^q glandium inibi uasorum diuarcationi subseruiens, & uasa ipsa præter pectoris os illam
obtegunt. Quod tamen ipsius corpori proximum est, in iugulo quidem est glandium, & pau-
lo demissius in thoracis amplitudine^r ramus arteriæ magnæ in^s soporales arterias distributus,
quæ unà cum sexti paris cerebri^t neruis, &^u internis iugularibus asperæ arteriæ lateribus uici-
nè attenduntur. dein ad laryngis radicem utrinq;^v glandulosum, sed rubicans corpus (quod
postea expressius describemus) ipsi adnascitur. Cæterum quum primùm ad quartæ thoracis
uertebre corpus arteria aspera^w descendit, in duos pares bipartita truncos, unum^x dextris pul-
monis lobis, alterum^y sinistris exporrigit, qui pulmonis substantia undiq; amplexi, parem cum
pulmone sedem occupant. Imaginem asperæ arteriæ uix ulli rectiùs quàm arbori assimilauere,
cuius caudex in duos primùm ramos discissus sit, & hi rursus in innumeras soboles diffusi.
Huius nanq; arboris à radicum propaginibus liberatæ ex terra prodiens initium, laryngi re-
spondebit: totus autem caudex reliquæ asperæ arteriæ parti à larynge ad quartam usq; thora-
cis uertebam protensæ conueniet: arboris uerò rami eorundemq; innumera soboles arteriæ in
pulmonem diductibus conferentur. Vt enim caudicis initium radices educens, uarium, neq;
pari undiq; constans forma uisitur, sic & larynx asperæ arteriæ caput undiq; uariā dissimilemq;
figuram exigit. Superiori enim parte prout aut depressum aut erectum finxeris laryngis^z oper-
culum, acuta aut depressa obtusaq; erit. Anterior autem laryngis pars, & latera quoq; antero-
rem^{aa} scutiformis cartilaginis superficiem commonstrant, quæ secundum ipsius longitudinem
in medio extuberat, illinc lateribus obliquè in posteriora extrorsum procedens. Ad hæc, ut hu-
ius cartilaginis superior pars amplior longè inferiori in hominibus (secus quàm in bobus) exi-
stit, ita etiam laryngis superior sedes hinc latior inferiori cernitur. imò^{ab} humillima laryngis sedes,
quæ secunda laryngis constituitur cartilagine, amplitudinem latitudinem ue reliqui asperæ arte-
riæ caudicis ductus adæquat. Posterior laryngis regio, ac præcipua huius regionis sedes quo-
dammodo plana est, propter primæ cartilaginis quæ scuti imaginem refert, ad posteriora suis
lateribus progressum. aliàs enim hæc regio secundæ ac terciæ laryngis cartilaginum gratia,
paulo minus tota teres esset, uti sanè est humillima posterioris regionis sedes, haud aliter quàm
anterioris regionis humilior sedes, idq; occasione secundæ cartilaginis humilius prima proce-
dentis. In posteriori sede, prout tertia cartilago in laryngis cauitatem cōtrahitur, aut extrorsum
porrigitur, ita quoq; elatiore ipsius apices in interiora exteriora ue magis prominent, laryngis

figura

a Figura 12
cap. lib. 3.
b 2 fi. ca. 12
li. 1 n. o.
c Posses illa
ferre pterere
ex 3 fig. ca.
21 lib. 2 ut
unum esset
inter L &
l, alterū ue
ro ipsum su-
perius H.
* 7 mus. ta.
E subijcitur
F. quod pri-
usquā præ-
scinderetur
incubebat
super B &
C, D.
d 2, 3, 5 fig.
cap. 21 libri
2 H.
e 1 fi. ca. 21
lib. 2 A. aut
4 mus. tab.
P cū R, Q
S, T, V.
f 3 muscul.
tab. r.
g 4 muscu.
tab. S, T.
h 5 mus. ta.
alteri P nota
tur, aut 1 fi.
ca. 21 li. 2 G
in g primæ
figu. aut 4
aut 5.
i 4 tab. o.
k 3, 4, 5 fig.
ca. 6 li. 1 k.
l 2 fig. F.
m 6 fi. R. su-
per Y.
n fig. cap. 9
li. 4 insertæ
F, F, G, G.
o Eiusdem
fig. Net O.
p fi. ca. 6 li.
3 S. aut spe-
cia hic ulti-
mam fi. li. 3.
q 2, 3, 4, 5
fi. ca. 21 lib.
2 M.
r 12 figu. B.
aut specia
1 fig. ca. 38
lib. 1.
s 12 fi. E, G.
t 12 fi. F, H.
u Hic sedu-
lo specia fi.
guras 38 ca.
lib. 1 & ca.
21 lib. 2.
x 2, 3, 4 fig.
cap. 21 lib.
2 L.
y 4, 5 fi. ca.
21 li. 2 g.
z 4, 5, 10 fi.
ca. 21 li. 2 i.
aa 2 fi. ca. 38
lib. 1.
figu.

figuram emutantes. Cæterum reliquus asperæ arteriæ caudex (ut & arborum caudices solent) ad ramorum usq; diuarcationem sibi similis est, non tamen absolutè. Nam quum concidit arteria, neq; aëre distenditur, anteriori quidem parte teres est, uerum paulo uidetur latior ac depressior, hinc ad latera orbiculatim ita ducta, ut in posteriora procedens, angustior fiat. Posterior autem sedes anteriori angustior est, planaq; ac uersus internam ipsius amplitudinem nonnihil orbiculatim impressa uisitur. Quum autem arteria distenditur, ipsius posterior pars æquè ac prior, & magis quodammodo lateſcit, atq; in posteriora tumens orbicularis ut illa efficitur. Eandem formam seruant omnes asperæ arteriæ in pulmonem sparsæ soboles, quæ arborum ramis assilantur, & uniuersam seriem cum pulmonis figura^a parem efformant, in omnes ipsius partes frequentissimis germinibus, uti iam dictum fuit, excurrentes. Externa asperæ arteriæ superficies præter laryngis, quæ uaria est, inæqualis, sed interim ordinata serie procedens uisitur, ac quum aëre distenditur, posteriori quidem parte læuis instat^b continuæ cuiusdam membranæ est, à lateribus uerò & anteriori regione inæqualis: mēbrana, quæ cartilagine mediat, ipsis cartilaginibus magis extuberante. contrā uerò quum laxa cōcidit: nam tunc cartilaginee membranæ substantia eminentiores protuberant. Ad hæc, instar membranarum quæ alijs connascuntur partibus, externa quoque arteriæ superficies aspera est. Posteriori etenim sedi fibrosis nexibus, sed modicis^b stomacho cōmittitur: uerum superior laryngis regio quū cōmunem cum stomacho tunica^c fortiat^d, ualidissimè illius tunicæ gratia ipsi cōnascitur: quemadmodū & larynx stomacho firmissimè^e musculorū opera connectitur, qui stomachū amplectentes, primæ cartilaginis lateribus implantantur. Anterior asperæ arteriæ pars attensis musculis & uasis, ac præcipue^f recurrentibus neruis connascitur. Quinetiam ubi asperæ arteriæ rami in pulmonem excurrunt, propter adnatam ipsis pulmonis substantiā minus læues existunt. Ceterum interior superficies etiam si inæqualis pro cartilaginum extuberantia semper sit, læuis tamen ac uelut unctuosus humore perfusa, neq; ullis fibrosis explantationibus aspera existit. & talis quoq; quod ad læuitatē spectat, interna laryngis est superficies: quamuis interim neq; orbicularis, teres uel, aut tuberculibus minimè sit libera. In humillima enim parte, utcunque aut arcetur, aut diducatur, orbicularis ad amussim patensq; eodem semper modo, ob perforatum quem secunda cartilago efformat circulum, euadit. in medio uerò quum arcetur, penitus conniuet, non orbicularis quidem arcitq; orificij ritu, uerum rectæ instar lineæ seu rimæ ab anterioribus in posteriora protensa. quæ si dirimatur aperiaturq; ab anteriori parte sensim in posteriora tātisper latior efficietur, donec laryngis interior superficies tota quodāmodo orbicularis teresq; intus spectetur. Quando hæc rima arcetur, & conniuet, ipsaq; inferior laryngis pars, quam secunda cartilago extruit, teres orbicularisq; necessariò permanet, utrinq; ad rimæ illius latera una conspicitur fouea, altius quodammodo quàm rimæ superficies conscendens, unde etiam hinc cornuta superficies sub rima confurgit. Superficies uerò laryngis supra rimam consistens, prout hæc aut recluditur, aut comprimitur, etiam differt, nunquam tamen penitus est orbicularis, sed pro rimæ compressu ex posterioribus in priora magis minusq; arcetur. Inferior laryngis operculi superficies concava, superior autem conuexa cernitur. Cæterum uelim hæc uitulina aut bouina larynge (si modo humana non suppetat) assumpta examinari potius, quàm obscura difficilique enarratione discere. Ita enim quæ hinc propter dictionis obscuritatem præterimus, absq; omni negotio sedula inspectione non sine magna admiratione occurrent. Sic quoq; singulorum substantiam & conformationē una atq; altera larynge utcunq; etiam rudi fueris manu, dissecta adinuenies, potissimum quòd laryngis ac reliquæ asperæ arteriæ substantiā in primo libro & secundo, quantū illic conueniebat, persequutus fuerim. In primo enim præter laryngis operculum, trium laryngis cartilaginum situm, formam, & quantum ad musculos in secundo libro intelligendos sat fuit, uniuersam illorum constructionem tradidi. In secundo cum cæteris musculis omnes laryngis musculos ac ligamenta, prout inibi eorum requirebat tractatio, aggressus sum. Quapropter etiam illorū, ut & laryngis & totius asperæ arteriæ, neruorū & uasorum descriptioni hinc minimè immorandum est. Non profectò quòd scribendi laborem subterfugiam, uerum ne à morosiore quopiam eadem inculcare dicar. Quamuis etiam in re non minus pulchra quàm difficilis, undecimo de Confectionibus administrandis Galeni libro, cum alijs quinq; & libro etiam de Voce, priuati sumus. Præterea septimi de Partium usu fragmentum nobis duntaxat asseruatum est, idq; uniuersum in eo libro deest, unde Galeni enarrationem peteremus. Quæ itaq; superioribus libris necessariò recensuimus, hinc nō altiùs repetentes, id solum adiungemus, asperam arteriam membranæ cartilagineaq; formatam esse substantia: ac laryngem quidem tribus consistare cartilaginibus, ea nimirum quam scuto Græci assimilarunt: secunda uerò, quam quòd nomine

Quales asperæ arteriæ exterior superficies.

Connexus asperæ arteriæ.

Interna asperæ arteriæ superficies qualis.

Asperæ arteriæ substantia.

Quibus cartilaginibus asperæ arteria constituitur.

a Confer figurā cap. 33 li. 1 cum 12 et 13 fig. lib. 6.

b 2, 3, 5 fig. ca. 21 lib. 2. H. c Eandem fig. 1. d fig. capiti 9 li. 4. infer. te Q. Q. S. S.

e 11, 12, 13 fig. ca. 21 lib. 2. quarum indices spectab.

f Si uisum fuerit, seriatim spectab. figuras ca. 38. lib. 1. g Intuere figuras ca. 21 lib. 2.

mine destituatur, quasi sine nomine uocauerunt: tertia autem, quæ gemina est, quamq̃ uerum orificijs, quibus aquam manus lauaturis affundimus, respondere arbitati sunt. Deinde laryngis operculum ipsius quoq̃ conformationem ingreditur, quod ex cartilaginea membranaq̃ & pingui substantia (quemadmodū & tertiæ cartilaginis superior pars) constituitur. Reliquū asperæ arteriæ corpus innumeris cōformatur cartilaginibus, una serie eademq̃ forma sese habentibus. Forma quidem circulo correspondent, cui quarta pars sit exacta. propius enim ad anuli circuli ue perfecti figuram quā quidam arbitrantur accedunt. Quod sanè is ad amulsi perpendit, ex quo Celsus primum quartilibri Caput uertit, in quo hanc cartilaginum imaginem dorsi uertebis comparat. Quanquā enim Celsus illius auctoris mentem parum aptè explicuerit, ex cartilaginum tamen uertebRARUMq̃ imagine leui negotio colligitur, illum autorem cartilagines non simpliciter uertebis contulisse: uerū duntaxat circumferentiæ superficiē que corporum thoracis & lumborum (non autem ceruicis) uertebRARUM. Horum nanq̃ corporū imago cartilaginum orbi ductuq̃ quā simillima uisitur. Cartilagines hæ in orbiculo arteriæ figuram imitantur, corpus tamen ipsorum teres non est, sed quodāmodo quadrangulare, multo interim latius quā crassius. Dein cartilagines hæ non eandem toto corpore seruant crassitiem: in medio enim crassiores sunt quā in extremis, quibus paulatim attenuantur, ac uelut in membranam degenerant. Extremis his stomachum respiciunt, media autem parte & crassiori anteriorem asperæ arteriæ sedem efficientes. Neq̃ arbitretur quispiam (illorū sententiā delusus, qui à perfecti circuli figura cartilagines solū desinere prodiderūt, ne arteria stomachū plus æquo comprimeret, uerū potius ut stomacho deglutiēti cederet) eas hanc formam speciemq̃ in caudice ipsius arteriæ duntaxat seruare: in pulmonis uerò substantia completos effici circulos, quandoquidem in pulmonis substantia perinde ac in caudice sese habent, & quod inibi aliter construi nequiuerunt, in arteriæ partium usus commemoratione ostendam. Cartilagines hæ continua serie ac æqualiter semper mutuò distantes in arteria collocantur, & non tantum inuicem disiunguntur, quanta illarum à superiori parte ad inferiorē est latitudo, nisi quum arteria aëre turgēt: concidente enim arteria, cartilagines inuicem propinquius accedunt. Cartilaginū inter se connexus primum propriæ cuiusq̃ cartilaginis membranæ interuentu perficitur. Quemadmodum enim omnibus ferè ossibus, & etiam laryngis cartilaginibus membrana quædam, eo quod ossum sit inuolucrum, nuncupata obducitur, pari quoq̃ ratione circulares asperæ arteriæ cartilagines simili membrana integuntur, quæ ex demissioribus elatioribusq̃ sui partibus processus exporrigens, illarum interuentu cartilagines inuicem cōnectit, uelut membraneum uinculum inter duas cartilagines sese respicientes efformans. Neq̃ solum inter cartilagines, ubi ab inuicem æqualiter distant, eiusmodi confurgit uinculum, uerū etiam ab extremis cartilaginum partibus stomachum respicientibus similes membranei processus exporriguntur, ex quibus continuum quoq̃ instar membranæ uinculum efficitur. His cartilaginibus membranisque aliæ duæ accedunt membranæ, ab ipso usu tunicæ non immeritò appellatæ. Atq̃ una quidem externā arteriæ superficiem undecunq̃ amplexatur, membraneis illis cartilaginum uinculis pertinacissimè connata. Hæc tenuis est, illisque tunica par, quas peritonæum & succingens costas membrana ipsis affirmatis uasis præbent. Præsentis tunicæ interuentu arteria conterminis partibus colligatur, ipsaq̃ imprimis recurrētes nervos securissimè defert. Altera arteriæ tunica hac longè dignior, internam uniuersæ arteriæ sedem succingit, atq̃ ad cartilaginū inter se colligationis robur plurimū auxiliatur. Interior tunica exteriori multo crassior existit, quamuis etiam tenuis sit & ualida. Adnascitur uerò robustissimè cartilaginum proprijs membranis, & interna sede pingui quodāmodo humore oblita uisitur, non undecunque eandem seruans crassitiem. Quum enim linguæ, labrisque & palato, & ipsi demum stomacho communis sit, in laryngis cauitate crassior euasit, & pinguedine inter cartilagines & externam ipsius superficiem obducitur. Vbi uerò rima lingulæ ue laryngis conuiuet, hæc tunica utrinque ad latera dura callosa que efficitur, ac cum substantia colorem quoque immutat: ut enim hic durior, tanquam à frequenti dum spiritum retinemus compressu euadit, ita quoque magis ibidem callosa reddita, candicat, albescitque. Ea parte qua tunica arteriæ ramos in pulmonis substantia diffusos succingit, subliniitue, tenuior longè quā in larynge uisitur: in caudice uerò arteriæ medio se habet modo. Per uniuersæ tamen arteriæ cauitatem, hanc tunicam rectis fibris intertextam esse, ex sectione didicimus. Quæ etiam ostendit glandulas alterutra parte singulas ad laryngis radicem adnatas, quæ magnæ sunt & fungosæ admodum, carnisque propemodum coloris, sed magis nigricantes, & uenis satis conspicuis obductæ, quarum in secundo etiam libro, quum laryngis prosequeremur musculos, memi-

Qui asperæ
arteriæ carti-
lagines inuicē
colliguntur.

Duarū aspe-
ræ arteriæ tu-
nicarum exte-
rior.

Interior tu-
nica.

Glandes la-
ryngis radici
adnatæ.

h figure ca-
pi. 16 et 17
lib. 2.

i Spectatur
id. 2 fi. ca.
38 lib. 2.

k Quia e-
iusmodi me-
branarū ac
aliarū tenu-
ium tunica-
rum ratio
ex totius or-
gani circū-
scriptione
petitur, illæ
q̃ membra-
næ tantum
sunt, eas
nusquā de-
lineauimus.

l 12 fi. ca. 31
lib. 2 f.

m 6 muscu-
tab. L. et 2,
3, 4, 5 fi. ca.
21 lib. 2 M.

meminimus. Aspera arteria omni prorsus sanguine uacans, primario animanti ad aëris in respiratione transitum ductum ue confert, deinde & uocis organum facile est præcipuum. Atque his usibus uniuersa ipsius congruit fabrica. Ex faucibus enim aërem per nares, aut os attractum, recta in pulmonem ducit, hunc per uniuersum pulmonis corpus ita numerosa ipsius serie distribuens, ut pulmonis substantia hunc promptè alteret, atq; cordis muneribus aptum reddat. Cæterum quod pulmonis proprium sit munus, suo dicemus loco. nunc enim fateri asperam arteriam ita efformatam innuere, quod aptissimè aërem dum inspiramus pulmone deferat, ac rursus omnem qui cordi inutilis est, unà cum fuliginosis ipsius excrementis inter expirandum reddat. Ad hanc functionem, asperam arteriam instar membranei meatus, qui facile inanitus concidere, atque rursus oppletus distendi posset, extrui conducebat. Quod enim nisi uacui fuga magnoperè replendum est, ac rursus compressionis duntaxat ui inanendum uenit, distendi comprimiq; aptum esse oportet. Quapropter quum inspiratione aëris ue attractionem dilatati pulmonis gratia fieri omnibus concessum sit, pulmonisq; dilatatio aliud nihil censeatur, quàm suorum uasorum distentio, non quidem simpliciter omnium, sed in primis asperæ arteriæ propaginum: expirationem uerò rursus fieri constet, quoties pulmo in se colligitur, concidit & arctatur, eaq; ratione aërem in sua amplitudine (uidelicet in asperæ arteriæ ramis) contentum exprimit, propellitq; cuius ratio cinari promptum est, asperam arteriam, ut & distendi in inspiratione & denuò comprimi in expiratione posset, debuissè fabrefieri. Verum ad has functiones sat erat hanc ex membranea quapiam carneaq; substantia, ut uentriculū, stomachum, aut arterias ipsas & uenas construī, neque illis quibus abundat cartilaginibus donari, adeò sanè ut nunc frustra, quod ad aëris ratione uacui attractionem, & sui ipsius corporis ex illo distentione, & rursus ad aëris propter ipsius cōpressionē arctationemq; ac expirationē attinet, uel aliquam cartilagine rerum Opifex ipsi largitus uideatur. tantum abest, quod illi opificis industriam ostenderēt, qui omnes asperæ arteriæ ramos in pulmonis substantia distributos ex cartilaginibus perfectos circulos constituentibus fabricatos finxerunt, & aliam hic asperæ arteriæ quàm quā stomacho prætenditur constructionem enarrarunt, haud perpendentes, si aspera arteria ita extrueretur, pulmonem neque distendi, neque laxari ita opportunè posse, aut saltem in longitudinem, aut breuitatem duntaxat, nō autem in amplitudinem asperæ arteriæ ramos proficere posse. Neque minus illi hallucinātur, qui asperam arteriam apertam patentemq; & non stomachi modo concidentem efformatam asserunt, quo aëris liberior esset ingressus & egressus: quandoquidē hi præterquàm quod laryngis arctationē dilatationemq; ignorant, eò uenere ruditatis, ut ipsos lateat, si aspera arteria cum omnibus suis propaginibus semper æquè tensa apertaq; esset, pulmonem neque unquam cōstringendum aut dilatandum, nihilq; uacui fuga in asperam arteriam (ut quæ prius concidisset) attrahendum. Nam hoc uel ex foliis animaduertere debuerūt, quibus longè aliud artificium ad eam partem quæ aërem reddit, quàm reliquæ follium amplitudini adhibetur. Hanc enim artifices distēdi comprimiq; promptam reddunt, ut oppleri inaniriq; possit: non autem ita canalem quem rigidum faciunt, & distendi comprimiq; ineptum, cuius naturæ si totus follis esset, quis omnem ipsius usum nos perdituros, ac instar lagenæ uitreæ follem futurum ignorat? Atque huiusmodi membraneæ substantiæ arteriam constituentis est ratio, quæ hanc membrancam debuissè fieri cōmonstrat. At cartilaginibus abundauit quoque, ut non modò respirationis, uerum & uocis organum fieret. Quemadmodum enim asperam arteriam leuium arteriarum modò, respirationis nomine membraneam confici idoneum fuisset, ita quoque ad uocem amplam, rigidam, duramq; prorsus fistularū, tibiarum & cornuum ritu effingi debuerāt. Quandoquidem ut uox fiat, symmetriam quandam esse oportet, & robur aëris ipsius & substantiæ ab ipso percussæ. Huiusmodi sanè substantia est cartilago, ex qua uniuersam arteriam tibiæ modò extrui sineligamentis & membranis oportuisset. Verum quum absq; inspiratione ac expiratione uox fieri nullo modo potuerit, illaq; cōpressionē ac distentionē necessariò indigeat, meritò laudabimus summi rerum Opificis solertiā, qui asperam arteriam simul commodum respirationis & uocis organum molitus est. Atque tantum artificium in laryngis cōstructione ostendit, ut illa nunc magis, nunc minus claudī possit, & spiritum ipsum ex nostro arbitratu ad magnos sæpe usus retinere ualeamus, & uocem nunc grauē, nunc leuem, prout rimā illam (quæ profectò uocis primarium est instrumentū) arctamus uel laxamus. Hæc nanq; illa est, quam tibicinarū cōiunctis arundinum frustulis similem esse diximus: ac illi etiam rimæ respondet, quæ fistulis illis inest quas labris amplectimur. Congruit etiam usu, quamuis non forma, cornuum & tubarū orificijs, quæ ori illa infantes accommodamus. Deinde & organorum quoque fistulis, & illarum etiam fistularum foramini, quas transuersim inflamus, hæc rima comparatur. At larynx longè

Aspera arteria usus, ipsiusq; constructionis ratio Situs ratio.

Asperā arteriam membraneā substantia oportuisse extrui.

Cūr cartilago asperæ arteriæ constructionē subeat

Laryngis rimæ usus.

omnium fistularum artificium uincit. quæ ita efficta est, ut modo minus, modo magis eam laxare possimus, ac uarias uoces, non autem unicam duntaxat (ut artificum instrumenta) edere ualeamus: & tanta demum thoraci uis inditur, ut ex nostro arbitratu nunc multum, nunc parum aëris ad solam respirationem, aut ut etiam simul uoci, quam effingere lubet, aër inter expirandum sufficiat, emittere queamus. Quàm fuerit necessum secundam laryngis cartilaginem perfectum efformare circulum, & arteriam asperam hic ad laryngis radicem haud posse comprimere, animaduertes, si diligenter uocis generationem ex aëre ab ampla uia in strictam, & hinc rursus in latam impetu deducto, fieri didiceris, atque simul "gargareonem uocis plectrum & palatum instar rotundi ampliusq; spacijs constructum, & cavitatem super id in narium^o foraminibus apparentem, & quarti maxillæ superioris in altero latere ossis cauernas, ac dentes pariter & linguam, & labra rimatus fueris, ac demum musica artificum instrumenta, illarumq; partium usum his Naturæ operibus diligenter contuleris. Neque hic in nominum disceptationem incidere uisum est, rixose certando de rimæ huius & laryngis operculi nomine, quod falso uocis proprium, præcipuumq; organum plerique recensent, quando quidem hoc nihil uoci, nisi fortassis ad illius aliquam modulationem accommodat, & duntaxat ut & in primo libro commemorauimus, cibi & potus inter deuorandū in laryngem casum prohibet. Nam præter hoc quòd sensu id ad uocem nihil facere ex uera sectione perspectum habemus, ratione id alijs cognitum esse oportuerat. nam nullus unquam quo operculum id ageretur musculus, ab alijs animaduersus fuit, neq; etiam ullis mouetur quàm ijs^p quos ab osse^v referente in id inferi commemorauimus, quum interim laryngis reliqui musculi ad unum omnes rimæ illi dilatandæ arctandæ ue subseruiāt. Insuper eius gratia omnem laryngis cartilaginū fabricam extructam esse cognosces, si uel minima Naturæ operū cognoscēdi scintilla arseris, neq; illorū scientiā, indignissimam qui à Natura creatus sit hominis modo, respueris: nam uel bruti alicuius larynge in manibus assumpta, artificum in musicis instrumentis parandis industriā Naturæ opera sectantem maxima uoluptate admiraberis. Quod uerò & reliquarum cartilaginum situs non uulgaris sit, omnibus quoq; notū arbitror. crassior enim ipsarū pars, quæq; orbē efformant, anteriori parti, & quæ iniurijs magis exponitur, prælocata est. Vbi autem à perfecti circuli figura in caudice arteriæ necessariò propter inspirationē deficiunt, opportunè stomachum respiciūt, quò minus illum cōprimant, minusq; ipsius in ciborū assumptione distentionē præpediant: quum interim arteria inibi suscipiēdis noxis inepta sit. Pariter etiam asperæ arteriæ tunicas Natura nō oscitanter extruxit, externā quidem, ut cartilagines instar inuolucris muniat, atque ipsius interuentu arteria uicinis partibus colligata firmataq; securius deorsum prorepat. Interna uerò non solum cartilagines firmitus cōnexura, uerū easdem succinctura, atq; à grauioribus iniurijs munitura, crassior externa euasit, nō tamen talis, ut sua crassitie magnā arteriæ amplitudinē oppleat, & ad defendendas tamen cartilagines sua densitate & robore sufficiat. Sæpe enim aliquid pituitæ inutilis à capite per arteriā defluit, necnō potus aliquid & cibi inter deglutiendū in illam illabitur. Præterea acris quædā qualitas, uel fumī, uel cineris, uel carbonū, uel alterius cuiusdā facultatis medicamētosa etiā inter respirandū attrahitur. Adde quòd pus tussi expectorandū quandoq; sit malignū, erodens, aut alius quis humor, utpote flaua bilis, ac atra, aut pituita falsa intus putredinem experta, per asperam arteriā efferri debēt: à quibus omnibus obducta cartilaginibus tunica, ne illæ radantur, & rosionē alterationemq; ab his nō sine graui ipsarū uitio sentiāt, præcauet. Atque ut larynx eiusmodi noxijs (nimirū ori uicinior) magis subiicitur, ita quoque & tunicam hanc paulo crassiorē obtinet, quàm extremi arteriæ furculi, in quibus tunica tenuior euasit, ne plus æquo pulmonis substantiæ aërem cordi temperātis uim obtūderet, & aëris in uenalis arteriæ germina assumptionē, & rursus cordis fuliginosorū in asperæ ramos attractionē prohiberet. Cæterū pinguedo inter tunicā hanc & cartilaginē in larynge potissimūm reposita, ipsaq; etiam tunica pinguior simul cum uiscido quo undiq; hæc oblinitur humore, ad facilem aëris ductum cōferre uidentur, atq; etiā ne in magnis clamoribus, multisq; motibus exicetur, uoxq; deficiat, plurimum accommodare. Huc quoq; faciunt asperæ arteriæ ad laryngis radicem utrinq; appositæ glandes, humore siquidem meatum imbuunt, nō fluído quidem, sed uiscido & pingui, quemadmodum & ipsæ crassiores spissioresq; cæteris humorem procreantibus glandulis sunt. Quantus uerò eiusce humoris ad uocem usus sit, indies fistulas humectante oleo inungi uidentes docemur. Neque profectò eiusmodi humore procreando illæ tantum quas diximus glandes sufficiunt, uerū & aliæ laryngi accumbunt, quarum nunc situm, ut & gargareonis, opportunè subiiciemus: dein pulmonis, in quem aër as-

sumitur, constructionem pertractaturi.

Vocis generatione.

Laryngis operculi usus.

Cartilaginū coordinatio nis ratio.

Asperæ arteriæ tunicas apte extructas esse.

Pinguedinis & glandularum laryngis ratio.

n 6 muscul. tab. E. o 2 fi. ca. 12 lib. 1 n. o.

p 2, 3, 4 fi. ca. 21 lib. 2 K.

TRIPLEX glandium genus in faucibus repositum, ac præsenti Capite nobis describendum, in uarijs spectatur figuris. Ac primum quidē sexta musculorū tabula *L* insignitur, & in secūda figura, tertia, quarta, quinta Capitis uigesimiprimi libri secūdi *M*. Secundū uerō genus sexta quoq; musculorū tabula *F* insignitur, & decimaquarta quinti libri figura *E*, *E*. Tertium autē prima musculorū tabula *A* indicatur, & in quarta inter *G*, *Q*, *Z* consistit.



QUONIAM nonnullarum^a glandium asperam arteriam humectantium paulo antē mentio incidit, b aliaq; eiusdem functionis gratia creatæ illis accumbunt, nō inopportunē eas quoq; simul hic, de nominibus haudquaquam anxie disceptaturi, prosequemur. Non enim modō minus quā alibi, ingenti nominum pelago fluctuamur: ex quo ut emergamus, fauces nobis ci-
tra omnem contentionem uocari liceat uelim, uniuersum spaciū ab^c inferiori maxilla intus circumscriptum, illud dico, quod in profunditate ab interna menti sede ad ceruicis usq; uertebras pertingit: in latitudine uerō, quicquid inter dextram inferioris maxillæ partem & sinistrā habetur. Hoc enim φαρυγγα ueteribus Græcis uocatum arbitror, quo nomine & laryngem, quod hac sede contineatur, potissimum donarunt: Suidæ distinctionem parum obseruantes, qua masculini generis uocem laryngi accommodat, foemini uerō faucibus. Eundem locum & ἰδυόν ab angustia nuncupasse uidentur, quod nulla in uniuerso corpore sit regio æquē angusta, & tot interim organis donata. Hac enim sede nariū^d foramina in os descendunt, & hic reponuntur larynx uniuersa, i stomachi initium, linguæ^e radix cum osse u imaginē exprimēte, ac numerosis illarum partiū musculis, præterea & musculi maxillam mouētes, tum^f qui ab ossis cuneum imitantis^g processibus instar alarū efformatis originem sumunt, tum^h qui huius angustiae imprimis nomine duobus donati uentribus inferiorē maxillam deorsum uellunt. Adde præter tertij, sexti, septimi parium cerebri neruorumⁱ propagines, m uenas iugulares, & n arterias soporales, & quas nunc lubens enarrarem glandulas hic cōtineri. Est autem harum genus triplex, ac o unum quidem, quod ad laryngis radicem asperæ arteriæ lateribus adnatum, in præcedenti Capite recensuimus. p Secundum uerō elatius laryngi apponitur: quippe in spacio quod nobis hiantibus medium inter narium foramina & laryngem apparet, utrinque in lateribus una reponitur glandula utcunque insignis, & glandi forma perquam similis. Oblonga enim est hæc glandula, ac secundū longitudinem sursum ac deorsum exporrigitur, communi oris tunica, sed ea hic quā alibi tenuiori fungosioriq; uestita. Substantia cōstat alijs glandibus simili, at impenius fungosa, in hocq; propria, ut saluam procreet, ac asperam arteriam & stomachum quoq; cum tota oris amplitudine humectet. Has glandulas Græci ῥιιδιμα uocant, fortassis nō tam quod his angustijs cōtineantur, ac quod gargareonis latera respiciant. Si enim hiantis oris cavitatem intuearis, atque foramina narium & q gargareonem obserues, quid aliud hīc foramina quā duo uelut maria, ipse autē gargareo instar angustæ terræ inter illa deductæ apparebūt, adeo ut nihil obstiterit, gargareonem ἰδυόν aliquando à ueteribus, qui pūeros in cadauerum sectionibus exercebant, nuncupatum fuisse arbitrari. Aliās enim si ad angustiam loci, instrumentorumq; hac in sede frequentiam, animum duntaxat adhibuerimus, glandes asperæ arteriæ adnatæ, quum in maioribus angustijs, quā secundū hoc glandiū genus reponātur, ῥιιδιμα uocitandæ forent. uerū quū illas ab Anato-
mes professoribus hætenus nō descriptas obseruauerim, magis secundū genus (quod etiam nimis quā oscitāter alij enarrarunt) ita appellandū duxerim. Cæterū secundū hoc glandularum genus amygdalis assimilatum, Græci quoq; ἀμυγδαλας nuncupauerūt, quā uocem interpretes tonsillas & amygdalas & Faux uertūt. Quāuis hæc posteriora nomina^r tertio glandoso huius sedis generi quidam attribuisse uideantur, ignorantes interim cum primo genere secundū. Non tamen in his nominū fluctibus & rerum interim inscitia prætereundū est, Græcos quum tumores præter naturā enarrāt, glandularū quæ in faucium initio sibi opponūtur, ac secundū glandularū genus cōstituunt, inflammationes ἀντιόδους nuncupauisse, & ῥιιδιμα inflammationē corporū, quæ in faucibus sunt: nō adijcētes, quæ nam illæ censeantur. Porro^s tertium genus, i inguinum & axillarū glandibus respondet. numerosum enim sub aurium radicibus & uniuerso spacio inferiori maxilla conscripto continetur, ac cavitates omnes exactē implet, uasorumq; diductibus distributionibusue præficitur, has partes quoq; sua humectandi uī imbuens. Hoc nullo peculiari donatum est nomine: uulgus tamen hic in porcis ac cæteris quibus uescimur animalibus, ut & reliquas glandulas, in delicijs ipsas quoq; habet, ac Animel-

Fauces.

ἰδυόν.

Triplex in faucibus glandium genus. Primum. Secundum.

ῥιιδιμα.

ἀντιόδους.

Tertium in faucibus positum glandium genus.

a 6 muscul. tab. L.
b 6 muscul. tab. F.

c 1 fig. ultimarum lib. 1 à G ad I. aut quod complectitur in effra et maxilla sextæ tabu. muscul.

d Post E 6 muscul. tab. e figuræ ca. 21 lib. 2.

f 2, 3, 5 fig. ca. 21 libri 2 H.

g 5 muscul. tab. L, M.

h 6 tab. D. i 3, 4, 5 figu. ca. 6 li. 1 P.

k 5 tab. H, I. l 2 fi. ca. 2 li.

4. T, Y, e, g, n. v, w.

m fig. cap. 6 lib. 3 S.

n figu. ca. 12 li. 3 X ad 4. aut specta ultimam fi. lib. 3.

o 6 muscul. tab. L.

p 6 muscul. tab. F.

q 6 muscul. tab. E.

r 1 muscul. ta. A. 4 ta. inter G, Z, Q.

s 1 muscul. tab. l.

las seu Lacticiā nuncupat. Num uerò & has Græci quoque *πυλμια* appellauerint, sciremus sanè, nisi temporum iniuria Marini uiginti de Confectionibus libri cum Græcorum omnium qui quicquam in Anatome dignum præstiterunt operibus, maxima ex parte intercidissent. Quartus enim Marini liber inter cætera glandulas tractabat, utcunque uerò sit, hoc tertium in faucibus glandularū genus nō minus quàm cætera duo ob uarios quibus implicatur affectus, & scrophulas præcipuè, perpendendum uenit: hocq; imprimis tempore, quando nō id solum genus, uerum & alia duo Gallicus morbus simul cum palato & gargareone miserè exercet.

DE GARGAREONE. CAPVT VI.

IN hiantē ore gargareonem citra dissectionem uidere est, quanquam in sexta musculorum tabula *E* insigniatur, in septima uerò *F*.

Gargareonis
nomina.



ST A quoque corporis pars pluribus donatur nominibus. gargar enim, gurgulio, & gargareon, sibilus ac tintinabulum à uoce nuncupatur. Quia uerò instar uuæ superius angusta, inferius uerò spheræ instar rotunda aliquando dum inflammatione corripitur, propendit, Vuea, seu *σφαυλή* appellatur. Deinde quòd instar caudæ muris, aut columnæ extensa interdum ex humorum affluxu gargareon producat, ut & affectus ille, *λύσις* ac columella dicitur. Porro quoniā secundum naturam se habens, superius latior,

inferius autem strictior uisitur, fundibulū aliqui eum uocauerunt. at nomina sonitus occasione ipsi indita à multis toti laryngi, ab aliquibus uerò laryngis^a operculo tantū accommodantur. Cæterum gargareonis, qui soli inter cætera animantia homini obtigit, situs, forma, color, ac omnia ferè huc pertinentia nō minus ac externa unguium superficies euadent cōspicua, si alicuius hiantis os inspicere non piguerit. Vnde etiā horum enarrationi prolixius quoq; haud immorandū est. Oblonga enim tunc spectantibus occurrit particula fungosa & carnea à palati fine, ubi narium foramina ad os descendunt, in oris amplitudinem propendula, superius ubi palato continuatur latior, inferius pyramidis instar acutior. Venulas quasdā ex uasis palati tunicam adeuntibus in ipsius medio assumit: neruis autē non admodum participat. Porro ipsius primum usum uocis modulationē esse, ac illum ad sermonē homini plurimū opitulari, argumento sunt, qui hunc præfectum habēt: dein quòd soli homines, auiumq; quædā genera hoc donari uidentur, adeò sanè ut non immeritò uelut quoddā uocis plectrum, ita ad cauum palatum pendens, censeatur. Secundariò autē ad aëris attractionē, ne scilicet nimium frigidus in pulmonē feratur, aliquid & homini accommodare creditur, quum his quibus gargareo præfectus est, frigidus aër impensius quàm cæteris noxius esse colligatur. Sic quoq; & ad aëris expurgationem nō nihil conducit. nam puluerē sibi applicat, qui alioquin in laryngem simul cum aëre erat assumendus. At hic usus quū cætera animalia ad terram magis quàm homo spirantia gargareone destituantur, parui pendendus uidetur. Quamobrem uerò alij gargareonem excrementorum à cerebro in os descendentium quoddam receptaculū esse tradiderint, nō satis assequor, & commentum illorum esse opinor: quū gargareon nullam, qua aptè aliquid suscipiat, cavitatē nanciscatur: imò quoties humore imbuitur, laxatus muris caudæ forma propendit, aut alio quopiam grauissimo uitio dum fluxionem suscipit, conflictatur. At nunc tempestiuū erit, pulmonis in quem aër per asperam arteriam ducitur, constructionem aggredi.

DE PULMONE. CAPVT VII.

PULMONEM ostendit præsentis libri figurarū maior pars, prima uidelicet ad characteres R, S, T, V. Secunda ad N, O, P, Q. Tertia ad L, M, N, O. Quarta ad M, N, O, P. Quinta ad i, k, l, m. Duodecima ad E, F, G, H. Decimatertia ad B, C, D, E. Vasa autem pulmonem implicantia partim exprimuntur prima figura Capitis trigesimi octauī libri primi, partim duabus figuris Capitis decimi quinti libri tertij.

Situs pul-
monis.

Numerus.



IT V M pulmonis^a duæ thoracis cavitates indicant, in utraq; enim thoracis amplitudine, inter costas & alteram intersepiantium membranarum cōspicua, pulmo locatur perinde ac cavitates ipsæ geminus. Ipsius enim pars dextram cavitatem occupans, illi quæ in sinistra locatur, substantiæ interuentu neq; continua, neq; etiā cōtigua est. Ambæ enim intersepiantium membranarū mediō inuicem dirimuntur, & ^b uasorum duntaxat interuentu, quæ ex una radice in dextram ac sinistram pulmonis partes digeruntur, illæ inuicem committuntur. Ac dextra quidem pulmonis pars dextram thoracis cavitatem, sinistra autem læuam ita implent, ut nihil prorsus in thoracis amplitudine pulmonis substan-

42, 3, 4, 5, 6
fi. c. 4, 21 lib.
2 L.

^a Vnde ad
dextrū la-
tus G, G. al-
tera ad fini-
strum latus
I, I 2 fig.
^b 12 figu. B,
C, D.

e Inter G. substantia non oppletū sit, præter uniuersam regionem quam interdiuidētes membranas^e in se
G & I, I fi- cōplecti cōstituereq̃ retulimus. Verū in hac cauitate, quam intersepientes membranæ in suo
gu. 2. medio super^d neruosam septi transuersi partem, ac sub cordis inuolucris mucrone efformāt, pul
d 7 muscul. monis quoq̃ portiuncula canibus & simijs continetur: uti & in reliquis animalibus, quibus pe
th. kl, m, n. ctus longius quā homini obtigit. Verū hæc pulmonis portiuncula uniuersam cauitatē mi
nimè infarcit, neq̃ etiam eius cauitatis formam exprimit, atq̃ ita dextra & sinistra pulmonis par
tes, suas quibus cōtinentur sedes examussim referūt. Pulmo nanque priuatim nulla indigebat
forma, sed pro accumbentium corporum effigie, ut et iecur ipsum, efformatur, prorsus suarum
cauitatum effigiem assumens, haud secus sanè quā si aliquis gleba his cauitatibus impressa,
pulmonem construxisset. Vbicunq̃ enim cauitatum sedes cōcauæ sunt, inibi pulmo gibbosus
euasit: ubi autē gibbæ extuberantesq̃ uisuntur, pulmo etiā cauus redditur. Quapropter etiam
fit dextram pulmonis partem sinistra iunctam ad amussim bubuli, aut ceruini, aut alterius bisul
ci animalis calcibus, unguibus uel simul commissis, rara quadam similitudine rēpondere, aut
alteram pulmonis partem unius unguis imaginem referre. Tota enim^e posterior pulmonis se
des, lateraq̃ anteriori unguium regioni, ac lateribus respōdent. Quemadmodum enim ungues
anteriori parte linea impressioneq̃ inuicem dirimuntur, ita quoque & posterior pulmonis se
des huic lineæ similem omnino impressionem, prominentium in thoracis amplitudinem uer
tebrarum corporū occasione, obtinet. Et ut impressio hæc secundū unguium longitudinem
gibbumq̃ modicè obliquatur, ita quoque & pulmonis hac sede impressio secundū dorsi in
exteriora incuruationē ducitur. Rursus ut ungues anteriori parte magis quā posteriori, con
tigui uidentur: ita & pulmo ipse, eo quod intersepientes membranæ ab inuicem multo minus
ubi dorso committuntur distant, quā ubi pectoris ossi proximæ sunt. Deinde determinans
ungues linea superius ac inferius magis patet quā in medio, & inferior rursus pars magis de
hiscit quā elatior: quod & pulmonis quoq̃, quā ipsius partes inuicem dirimuntur, impressio
ostendit. atque id intersepientiū membranarū gratia magis quā iuxta iugulum & septum inui
cem distant, quā in reliquo ad dorsum progressu: dein membranarum distantia septo proxi
ma, latior illa est quā iugulū respicit. Reliqua autē pulmonis posterior pars & latera, propter
costarum inflexus, ut & ungues ipsi, gibba uisuntur. Deinde etiā parī ratione inferior pulmo
nis regio, ut & unguium ipsorum, latior superiori existit. Porrò unguium parti quæ terræ inni
titur pulmonis^f regio exactissimè cōuenit, septum transuersum spectans. Hæc enim pulmonis
regio, ut & unguium, caua uisitur, propter septi^g gibbosam imaginem. Ad hæc, pariter quoq̃
amplo interstitio, ut & ungues etiam, propter amplam intersepientium membranarum hic di
stantiam dextra pulmonis pars impēse à sinistra disiungitur. Porrò pulmonis^h regio pectoris
os respiciens, ipsorum uel anterior pars ad amussim refert posteriorem unguium sedem uniuers
sam, quæ terrā nō cōtingit. Ut enim illa utrinq̃ orbicularis est, & amplo interstitio diffusa, sic &
hæc pulmonis regio interdiuiditur: quæ tanto posteriori etiam sede breuior est, quanto poste
rior unguium regio terrā non cōtingens, longitudine ab anteriori uincitur. Cæterum alia adhuc
impressio hætenus non commemorata pulmonis illi accidit,ⁱ quā is lateribus intersepientium
membranarū accumbit. Harum nanq̃ latera quum hic cor cōtineatur, utrinq̃ extuberāt,^k gib
bumq̃ efficiunt, cui proportionatum sinum pulmo (ut uniuersas quibus continetur cauitates
accuratè oppleat) meritò obtinet: qui sanè & in unguibus illi sinui correspondet, qui inter un
gues quā inuicem accumbunt cernitur, illic nimirū, ubi duriores quidam pili inter ipsas obser
uari solent. Atq̃ ita pulmonis forma unguium imagini cōgruit. Cæterum hæc de humano pul
mone dicta uelim, eoq̃ non flaccido, sed ut secundū naturā thoracem implet, distento.^l Aliās
enim quum cōcidit, atque in lobos seu fibras insigniter distinctus uisitur, elegās hæc propriaq̃
pulmonis forma deperditur.^m Distinguuntur enim utræq̃ pulmonis partes in duos lobos,
membraneis fibris in hominibus inuicem hærentes, neq̃ ita inter refecandum distinctu, ut in
cane, promptos. Hoc loborum interstitium obliqua perficitur linea, è regione propemodum
quartæ thoracis uertebræ incipiente, & oblique deorsum in priora, quasi ad pectoris ossis mu
cronem, protensa. Hæc linea æqualem pulmonis partium diuisionem quodammodo efficit,
quanquam humilior lobus superiori longior existat. Neq̃ sanè perpetuò in duos solum lobos
pulmonis partes secantur, uerū aliquando in tres, interdum in nullos, aut duos, ita tamē inui
cem nexos, ut sectionis potius nota, quā re uera distinctio in homine uideatur. Lobum au
tem qui in canibus simijsq̃ cauæ uenæⁿ caudicem suffulcit, ut iam antea dixi, nunquam in ho
mine obseruauī, & hunc illo destitui certo certius scio. Quāuis interim Galeni locus in septimo
de Administrandis dissectionibus nondū mihi memoria exciderit, quo inquit, quintum hunc
pulmonis lobum illos non latere, qui rectè sectionē administrant: innuens Herophilo & Ma

Pulmonis
forma.

In quot lobos
fibras uel pul
mo diuidatur.

In homine nul
lum pulmonis
lobū cauæ cau
dicem sufful
cire.

*Qualis pulmo
nis superfi-
cies.*

*Pulmonis cō-
nexus.*

*Pulmonis sub-
stantia.*

*Pulmonis
uasa.*

*Pulmonis tu-
nica.*

*Pulmonis
nerui.*

*Pulmonis u-
sus & cōstru-
ctionis ratio.*

rino eiusmodi lobum fuisse incognitum, uti sanè fuit, quòd illi hominum cadauera, non autem cum Galeno simiarum ac canum aggredierentur. in quibus præsentì lobo nihil est manifestius, uti sanè hominem secanti liquidissime etiam constat illum deesse, tum quòd id sensus indicet, tum quòd uena septum permeans cordis penetret^o inuolucrum, neque aliquod prorsus est interuallum ductus cauae inter septum & inuolucrum, quale in canibus maximum uisitur, unde etiam in illo interuallo uena caua hoc quinto lobo tanquam à manu quapiam suffulciri debuit. Pulmo externa superficie laevis undique est, & ueluti humore lento madidus. attamen in plerisque hominibus non infrequenter hæc superficies aspera earum membranarum modò conspicitur, quæ inuicem connascuntur, quandoquidem in illis iam dextra pulmonis pars, iam sinistra, iam utraque etiam pertinacissime thoracis lateribus fibrosarum nexuum interuentu colligatur, adeò ut id hominibus quodammodo peculiare esse uideatur, ut & fuscus quidam, nò autem candente rubore rubeus color, & quædam instar nubium oblineatio, ac in colore inæqualitas, in hominum pulmonibus conspiciuntur: non quidem in laqueo suffocatis solum, aut aliquandiu mortuis, uerùm & in illis quibus adhuc uiuentibus cor execatur: quamuis tamen sensim mortuis pulmones intensius nigrificent, conciduntque. In alijs autem animalibus nisi per quàm rarò, pulmo nulli thoracis parti uel minima fibra hæret, neque thoraci aliter quàm uasorum interuentu committitur. ^{p 6 fi. Y. 12} Aspera enim arteria dorso colligata, & in pulmonem profecta, ^{fig. A.} eum dorso alligat: ^{q 6 fig. L. 12} uena autem arterialis, & ^{fig. C.} arteria uenalis similiter illum cordi connectunt, illa ^{r 6 fi. G. 12} quæ duntaxat pulmonis uincula, ^{fig. D.} nexu^s ue censenda ueniunt. Nisi etiam tenues pulmonis ^{s 6 fi. e. et 2} neruos, & tunicam uasa inuoluentem, quæ à membranis thoracem intersepiētibus, aut illa quæ costas succingit exoritur, ac nexum quoque ad colligationem conducere arbitreris. Vti in hominibus pulmo ualidissime thoracis lateribus subinde, ueluti diximus, alligatur, quod etiā in uulneribus egregie expendendum uenit. Thorax enim sæpe perforatur, & interim in læso latere pulmo non concidit: quòd pulmo à uulneris lateribus non liberatus, aërem qui thoracis cauitatem oppleret, atque occasio esset quo minus pulmo uacui beneficio cum thorace dilataretur, haudquaquam ingredi sinit. Vt taceam, eiusmodi connexus opera pulmonem thoracis motibus quodammodo sequaciorem effici. Cæterum uniuersa pulmonis substantia nihil aliud est, quàm caro mollis, fungosa, rara, leuis, aërea, ac uelut ex spumoso sanguine spuma^e uel sanguinea concreta, multisque uasorum germinibus oppleta. Vasa sunt tria. ac primū quidem est aspera arteria, quam iuxta quartæ thoracis uertebrae corpus in duos truncos diduci diximus, quorum dexter in dextram pulmonis partem, ut sinister in sinistram exporrigitur, & primū in duos ramos sectus, ac his rursus in plures, hisque rursus in alios diuisis, multiplici sobole pulmonem intertextit. Secundū uas uenalis est ^{u 2 fi. ca. 15} arteria, tertium autem ^{li. 3. 12 fig. 14} uena arterialis, quarum in tertio libro cum reliquis uenis ac arterijs necessariò meminimus. Adeò ut de illis hîc nihil planè amplius donec ad cordis cōstructionem deuenierimus, repetendum sit. Hæc uasa similiter ac aspera arteria in pulmonem digeruntur ea serie, ut arterialis uenæ ramî, asperæ arteriæ propaginum posteriori sedi attendantur, uenalis uerò arteriæ soboles anteriori. Atque hæc uasorum digestio undecunque ad externam usque pulmonum superficiem adamussim seruator, non situ modò semper sibi similis, uerùm & magnitudine etiam. Vt enim multo maior est arteriæ asperæ truncus pulmoni insertus, uenæ arterialis & uenalis arteriæ primis in pulmonem implantationibus, ita quoque uniuerso per pulmonem progressu ramorumque serie, soboles asperæ arteriæ ampliores, patentioresque uenarum & arteriarum surculis existunt. Huic in numero uasorum implexui, ea quam diximus pulmonis caro intertextitur, atque omnes uasorum amplectens surculos pulmonem efformat, quemadmodum iecoris substantia iecur ipsum cum frequenti uenarum sobole iecur constituit. Vniuersum uerò pulmonis corpus non aliter ac iecoris, tenui quadam membraneaque obducitur tunica, principium ab illis uasorum inuolucris ducens, quæ asperæ arteriæ ac alijs duobus pulmonis uasis ab intersepiētibus thoracem membranis, seu ea quæ costas succingit, offeruntur. Quum primū enim hæc uasa in pulmonis ducuntur substantiam, ea tunícula à proprijs uasorum tunicis abscedens, in pulmonis tegmentum degenerat: cui ^{y 2 fig. ca. 2} neruuli à sexti paris neruis recurrentes neruos constituentibus, & ^{lib. 4. q. 5} postmodum in uentriculi superius orificium diffusis communicantur. Nulla autem, aut per quàm graciles in pulmonis substantiam sensu non admodum indigentem disseminantur. Pulmo enim in hoc potissimū factus est, ut aërem cordi (quo potissimū ad naturalis caloris non qualitatem solum, sed sanè & substantiam indiguit) præpararet, ac demum cor uiscus aliquod sibi appositum haberet, ex quo aërem suis functionibus aptum semper allicere posset: & ne quemuis statim nos ambientem aerem, eundemque aliter non immutatū assumere cogeretur, præcipue quum natura non solum cordis occasione quamplurima animalia respirare uoluerit,

o 4 fi. B. B.

4 q.

t 1 fi. ca. 38
li. 1. 12 fi. B.

x 1 fi. ca. 15
li. 3. 12 fi. C.

gu. 6 c.

rit, uerum & uocis ad commodam animalis uitam necessariae gratia. Quod enim à pulmone inter expirandum redditur, uocis optima euadit materia. Atque ita uniuersa respirationis organa summus rerum Opifex machinatus est, ut ex nostro arbitratu aerem attrahamus, eumque rursus reddamus, aliter quam cor ex nostra uoluntate neuiquam pendens, agitur. At quum hæc quoque latius dum thoracis musculos traderemus complexi fuerimus, ad pulmonem redeundum est, qui instar promptuarij cuiusdam in duos asperæ arteriæ ramos aerem assumit, cordi illum ingenua suæ carni facultate præparans, ut deinde cor per arteriæ uenalis ramos ex asperæ propaginibus sibi illum allicere queat, ac dein rursus à pulmone quod cordi inutile est, per expirationem reddatur. Quis itaque asperæ arteriæ sit usus, neminem latet: quemadmodum neque uenalis arteriæ usus nulli incognitus est, quum is præcipuus sit, ut aerem cordi aptum, ac à pulmonis substantia in asperæ arteriæ ramis confectum, in se pelliciat, ipsiusque interuentu cor eundem in sinistrum ipsius uentriculum attrahat. Arterialis uena in hoc potissimum facta censetur, ut pulmone aptum suæ substantiæ alimentum ex dextro cordis uentriculo exporrigat, quod læue, aereum, spumofumque esse oportuit, si modò ulla mutatis aerem substantiæ, ad aerem emutandum debebat esse proportio, atque ipse etiam pulmo comprimi colligi, & rursus distendi sequaxque esse posset. Ad quam functionem etiam uenalis arteria pulmone utilis est. nam & hæc illi sanguinem suo nutrimento aptissimum deriuat, quo pulmo tum propter ipsius mollitiem, tum propter continuum motum, tum propter caloris copiam, quam ex cordis uicino indefessumque cordis motum adipiscitur, plurimo præ cæteris corporis partibus indiget. Quod autem pulmonis tunica ipsius substantiæ quæ aeris alterandi uim possidet, atque ramorum implexus firmat, impletque, inuolucris uice sit, omnibus perspectum reor. Sic quoque hanc iustissime tenuem mollemque ut cum pulmone promptè concideret, & facile dilataretur, factam esse, neminem ambigere decet.

Vasorum pulmonis ratio.

Tunicæ ratio.

DE CORDIS INVOLUCRO.

Caput VIII.

PRÆSENS inuolucrum membranarum thoracis amplitudinem intersepientibus liberum, nullaque ex parte dissectum tertia ostenditur figura, ad characteres B, C, D, E, F, G: uti apertum spectatur in quarta figura ad A, B, B. Rursus ipsius portio spectatur in ultima tertij libri figura ad B.



MEMBRANAM uniuersum cor cum suis auriculis ac uasorum initijs instar arculæ cuiusdam aut thecæ inuoluentem, in medio thoracē intersepientium membranarum collocari antea diximus. Verum in presentia huius inuolucris situm paulo altius repetituri, eius effigiem primū nucis pineæ formæ quæ simillimam esse dicemus. Quemadmodum enim ex orbiculari neque penitus depressa basi pinea nux in obtusum, neque impensè prominentem conum mucronem uel desinit, omni ex parte orbicularis quodammodo uisitur, sic quoque & cordis inuolucrum orbiculare basim & mucronem obtusum exigit, pineamque nucem proximè refert. Cæterum inuolucris basis minimè continua est, sed ut minimum quinque foraminibus peruium: duobus quidem, quibus cauæ uenæ iter præbet, uno nimirum, quæ hæc septum perforat: atque id foramen in hominibus perficitur, ubi dextrum latus eius amplitudinis habetur, quæ inuolucrum pertinacissimè septi neruosa parti, secus atque in cæteris animantibus, conasci docebimus. secundum autem foramen illud est, quo eadē uena sursum à cordis basi iugulum petit. tertium porro foramen arteriā uenalem transmittit. quartum uero arteriæ magnæ paratur, & quintum arteriali uenæ uiam præbet. Atque id quodammodo duplex est, quod arterialis uena priusquam ex inuolucro labitur, in duos truncos discinditur, bina in inuolucro foramina perpetuò ferè adeptos: quantum et uenali arteriæ duobus quodammodo locis iter præbeat. His uasis notatu digno interuallo à cordis superficie abscedentibus, præsens inuolucrum ualidissime obnascitur, quodammodo ab ipsis principijs ducens, uidentur namque arteriæ magnæ & arterialis uenæ tertiæ tunice (quas ab intersepientibus thoracē membranarum, ac ab illa quæ costas succingit, exigunt) deinde & secunda uenæ cauæ & uenalis arteriæ tunica ab ipsa membrana profecta, cordis inuolucris principijs statuere. Vasa etenim medio inter cor & ubi inuolucrum ipsis committitur spacio, eiusmodi tunicis penitus destituuntur, ac notatu dignum interuallum inter cordis basim & inuolucris ad illa uasa coalitum existit, neque magis inuolucrum cordis basim, quam mucronem aut latera illius contingit. quod sanè à Galeno expendendum erat, quum inuolucris originem à cordis basi pendere scriberet. Atque hæc foramina inuolucris potissimum basis necessariò obtinuit, sese hic quam maximè licuit rotundam

Forma inuolucris cordis.

Quibus uasis inuolucrum cordis uiam præbeat.

Cordis inuolucris initium.

Lib. 6. de V. su partium.

*Inuolucris cor
dis situs.*

*Inuolucris cor
dis substantia.*

*Superficies
& nexus in
uolucris*

*Quibus uasis
ac nervis inuo
lucrum impli
cetur.*

*Inuolucris u
sus, & costru
ctionis ratio.*

*Cuiusmodi a
qua in inuolu
cro obserue
tur.*

dam efformans. Cæterum reliquum inuolucris corpus nihil prorsus transmittens conti
nuum est, & sibi undecumq; præterquam in forma, quæ ex basi, uti diximus, in obtusum mu
cronem tendit, respondens. Basis hæc summo apice paulo altius quintæ thoracis uertebre cor
pore locatur, huic non penitus, sed duntaxat è regione incumbens. Basis enim media est inter
pectoris os & quartam quintamq; thoracis uertebres, æqualiter ab utrisq; pectoris dico osse &
uertebreis, distans. Item basis quoque à dextris sinistris que costis pariter remota pendet. In pro
gressu uerò descensuq; inuolucris situs uariatur. ac alijs quidem animalibus longiori pectoris os
se quàm homines donatis, inuolucrum id à dextris ac sinistris pariter seiunctum deorsum ten
dit, sensim in anteriora porrectum, adeò ut iam basis posterior, aut si animal resupinum intelle
xeris, humilior ipso mucrone cōspiciatur. In homine autē cui anteriore thoracis partem rerum
Opifex breuiore largitur, inuolucrum decliue ac antrorsum sinistrorsumq; adeò protenditur,
ut mucro magis deorsum quodāmodo pertingat, quàm pectoris ossis pars, cui superior maxi
mè que antiqua septi trāsuerſi pars adnascitur: dein in sinistrum adeò pertinet, ut dextrum mu
cronis latus uix thoracis medium attingat. In anteriora quoque adeò mucro procedit, ut sini
strum pectoris ossis latus, quæque huic coarticulantur cartilagine, contingat. Atque hoc in
uolucrum in se intersepientes membranæ amplexantur, secundum ipsius formam in latera ex
tuberantes. Porro hoc inuolucrum substantia constat membranæ, atque in simularium par
tium numerum cum reliquis membranæ reponenda, nullis enim fibræ intertextæ, sed simplex
est membranæ, utcunque crassa, & admodum dura, cavitatemq; constituens, in qua cor facile
dilatari constringiq; queat. In se enim cor continet nulla prorsus portiuncula illi cōnatum, sed
æqualiter ab illo undiq; uti superius cōmemorabatur, distans. Cavitatis hæc læuis omnino est,
tenui quodam humore oblita, ac adipe penitus omni destituta. Exterior quoq; inuolucris super
ficies omni adipe uacat. Quanquā secus arbitratus sit Aristoteles, cordis inuolucrum pingue ef
se asserens: intersepientibus membranæ forte delusus, quæ huic inuolucro obnatæ præpingues,
ac potissimum in hominibus, uisuntur. Cæterum exterior hæc inuolucris superficies propter fi
brosos nexus, ut mēbranæ inuicē cōnatæ, aspera cernitur. Inuolucris enim lateribus intersepien
tes mēbranæ quodāmodo orbiculatim^h obnascuntur. Anteriori parti, cui illæ mēbranæ nō ob
nascuntur, fibræ membranæ earū membranarū cavitatē implentium cordis inuolucro adna
scunt. Posterior pars uniuersa intersepientes quoq; mēbranas habet cōnatas. Cæterū uniuersus
mucro, & dextri lateris inuolucris egregia portio septi trāsuerſi nerueo circulo ad latus sinistrū
ualidissimè, amploq; admodum spacio cōnascitur, quod hominibus est peculiare. Simijs quip
pe & canibus & porcis à septo multum distat: tantum abest, ut ipsi magna sui portione inuolu
crum cōnecteretur, adeò sanè ut & hinc luce clarius constet, Galenum hominis uiscera aut osci
tāter, aut neutiq; spectasse, simiasq; & canes nobis descripsisse. Verū & homini adhuc priuatim
anterior mucronis pars tunicæ costas succingenti fibrosis nexibus hæret, ea parte qua sinistri
lateris sextæ & septimæ costarū cartilagine pectoris ossi coarctantur, sed & is inuolucris nexus
inter thoracem interdiuidentes membranas perficitur: nullibi enim ex illarum medio inuolu
crum cordis excedit, neq; pulmonem ulla ex parte nisi illarum interuentu contingit. Hoc nul
las arterias in se dispersas exigit, neq; etiam uenas, nisi perquam tenuissimas ab illis ferè exortas,
quæ intersepientibus membranæ tanq; in omentū deriuantur. quum enim cauam transmittit,
ab illa uix aliquid mutuatur: quā autem septo in hominibus cōnascitur, communia cum septo
uasa sibi uendicat. Nervos quoq; adipiscitur nimis quàm obscuros, ac ab illis pronatos, à qui
bus recurrentes nerui iam pullularunt. Quod uerò membraneum hoc cordis inuolucrum cor
di id sit quod dicitur, omnibus conspicuum esse arbitror: quum instar domus & arcule cuius
dam ac thecæ cor luculentissimè amplecti, ac intersepientium membranarū beneficio sustinere ui
deatur. Præterea ut leuius esset, & durius, ex ualida extrui membrana, neminē quoq; ambigere
putauerim. Cæterū an hominibus secundū naturā se habentibus inuolucrum id aquā contineat,
quā serosi humoris modo in ipsius cavitatē inter dissechandū repositā obseruamus, mihi nō ad
modū perspectū est. Quāuis nullā sanè humani cordis sectionē unq; aggressus sim, in qua non
multā eiusmodi aque quantitātē repererim: quocumq; etiā mortis genere siue paulo, siue multo
antè homo interiisset, etiam si adhuc maiorem copiā in mulieribus q; uiris animaduenerim: nisi
illi natura admodum fuissent humida. Quinetiam ferè minus in nuper mortuis adinueni, quàm
in his à quorum sectione diutius temperassem. Is cui Bononiæ cor uiuo eximi spectauimus, a
quam etiam in inuolucro continere uidebatur: uerū id non admodum commodè, utcunque
etiā nos tragœdiæ adiungeremus, expēdere licuit. Patui huius aquæ intueđe cupidī, pullans
adhuc cor cū pulmone reliquisq; uisceribus ilico atq; exemptum erat, in proximam pharmaco
polæ officinam deferri curauimus, ac in inuolucro aquam nonnullam reperimus. Canes uiui

g 2 fig. parū
sub s.

h Vti fit in
2 fig. & 1.

i Inferius L
inter G &
I.
h 3 ft. D, E.

l 2 fig. ca. 2
lib. 4 r.

caui-

cauitatem inuolucris & cordis superficiem humectas habent, at in his nulla aquæ obseruatur quantitas, ut sanè in mortuis quantumuis etiam exigua semper, perinde ac in porcis occurrat, quibus tamen in uiua sectione aqua asseruata uidetur. Adeò ut de uiuorum aqua nihil asserere uelim, uerùm nullam penitus in illis contineri (ut hodie omnes ex spiritu in aquam post mortem conuerso, hanc in mortuis reperiri contendentes affirmant) falsum esse noui. Quandoquidem (ut sæpe antea monuimus) membranæ nullis partibus connatæ, neque inuicem hærentes perpetuò madidæ apparēt, ut oculi palpebrarumq; interior superficies. Ad hunc quoq; modum ubi membranæ cerebrum inuestientes mutuò insternuntur, & interna costas succingentis membranæ, & peritonæi superficies, aciecoris quoq; & intestinorum, reliquarumq; partium inuicem tantum accumbentium, non uerò connatarum superficies madorem semper commonstrāt. Nunc autem cor in continuo uersans motu, neq; dum uiuit animal unquam uel momento quiescens, calidissimū uiscus meritò censetur, cur minus non madorem duntaxat, ut reliqua omnia, sed & aquam à Natura ipsi priuatim eiusdē usus gratia largitā nanciscetur? Precipue quum in humidioris temperiei uiris ac mulieribus copiosiorē aquam, quàm in siccis calidisq;, quibus plures adesse spiritus constat, reperiamus: atq; à phrenitide mortuo cerebri uentriculos seroso humore non nihil falso acriq; plenos obseruauerimus. Neq; hic me mouet, quod quis unde hæc aqua calidissimo uisceri affundatur, interrogare possit: quum præter adipem, quo humanum cor imprimis scatet, madorem in reliquis nuper commemoratis sedibus animaduertamus, & in aquæ subter cutem specie, ab utero *αμνιόν* dicta, tantam aquæ uim in peritonæi amplitudine, & etiā in aquoso ramice, & interdum uiuentibus in thoracis amplitudine asseruari indies discamus. Preterea æstiuo tēpore suspēsi, ac in cruce, ut Gallis & nostratibus moris est, nō procul à suburbijis ad publicas uias relictī, paucis post suspendium diebus, ac si uesicæ aqua distentæ essent, in mirā molem intumescunt. Meminietiam in diebus canicularibus una die occisos canes, quibus cutē detraxeram, & musculi alicuius motum examinaueram, negligentia non abiectos fuisse, & casu in sole relictos, maximam serosæ aquæ uim in peritonæi cauitate, & in thoracis amplitudine collegisse. Cæterum nugaci hac disceptatione relictā, ad cor properemus, ne tandem in theologorum quæstionem, qua de mysterijs plena Saluatoris nostri IESV CHRISTI aqua sanctissimè pertractant, incidamus: ac diuini Ioannis uerissimum Euangelium, his nostris de solis calore in suspensis uirationibus, & carnificinis minimè misceamus.

ut re

DE CORDIS SITV ET FORMA.

Caput IX.

SITVM cordis in sua proportionē ostendit ultima figura tertij libri: dein prima & secunda præsentis libri figura idem quoque ostendunt, quamuis in illis cor suo inuolucro intectū sit, ac inter membranas thoracis cauitatem intersepientes contineatur. Ac in prima quidem figura id ad L spectatur, in secunda autem ad inferius L & M, M. Porro cordis formam ex quarta, quinta, & sexta figuris petere licet.

a3 fi. C, D.
E, F, G.
b4 fi. C, D.
6 fig. A, B.
c4 fig. E, 6
fig. C.



CORDIS situm formamq; ipsius enarratum modò inuolucrum commonstrat. Cor namque pyramidalis figuræ uisitur, & nuci pineæ non admodum est absimile: ex^b basi nimirum latiori in^c mucronem paulo quàm nucis pineæ acutiorem sensim desinens: est^e que multo longius quàm crassius. quanquam in homine, quod ad externam superficiem attinet, non æquè crassum secundum orbem, ut ceteris ferè animalibus, sit. Ipsius etenim latitudo profunditatem nō secus excedit, quàm si quis cor in anteriori posterioriq; sede non nihil depressum affirmaret. Atq; id potissimum in dextra sede illi accidisse, dissecantibus obseruatur. Tota exterior superficies à basi ad mucronis usq; extremum impensè laeuis cernitur, nulli prorsus parti connata. ^aCoronalis tamen uenæ ^cpropagines à cordis basi ad mucronem usq; cum coniugis suæ arterijs excurrentes, sanguineq; turgentes, paulo magis reliqua cordis superficie extuberant, inæqualitatemq; minimam efformāt: quippe maxima sui corporis portione in cordis substantiam imprimuntur, deinde & adeps etiam, quo humanum cor plerunq; abundat, aliquid inæqualitatis inducit. Basis propter uasorum egressus inæqualis ut cunq; uisitur, dextræ enim ipsius sedi^f dextra auricula simul cum ^g uena caua, & ^h arteriali uena committitur, in sinistra autem sedeⁱ læuam habet auriculam, & præter^k arteriam uenalem, ^l magna quoq; arteriæ initium. Porro cordis auriculas, uasa, ut & ipsorum orificia & membranas, cordisq; uentriculos seorsim ordine persequemur, iam cordis situm subnexuri, de quo prolixè

Cordis figura.

Cordis superficies qualis.

Cordis situs.

d6 fig. D.
e6 fig. E.
f4 fi. 1, 5 fi.
B.
g4 fig. F, 5
fig. C.
h4 fi. G, 6
fig. I.
i6 fig. E.
k6 fig. G.
l6 fig. O.

lixè admodum dissectionis professores contendunt: his quidem id in sinistrum thoracis latus collocatum innuentibus, illis autem in medio, quòd ad dextrum ac sinistrum attinet: alijs uerò non ad hanc tantum positionis differentiam cor in medio esse placuit, uerùm & secundum thoracis anteriora & posteriora, deinde superiora & inferiora. alijs rursus hæc omnia quidem toti cordis moli, alijs autem duntaxat basi ascribentibus. Quòd autem in præsentia thoracem omnes appellent^m quicquid costis & pectoris osse, & duodecim thoracis uertebis intercluditur, manifestum esse arbitror: quum alioquin si uniuersus corporis trūcus cum Aristotele ipsis thorax appellaretur, plurimum in situ cordis enarrando aberrarent, quamuis alioquin ad ueram situm descriptionem non admodum accedant. Quandoquidem brutis animalibus quibus pectoris os homine longius obtrigit, non basis solū, sed & cordis propemodum mucro in medio, quod ad dextrum & sinistrum spectat, continetur. Deinceps secundum dorsi longitudinem basis uicinior longè est primæ thoracis uertebre, quàm mucro ipsi duodecimæ. Insuper magis ab elatiori pectoris ossis sede cordis basis remouetur, quàm mucro à pectoris ossis " cartilagine gladij modo in aciem cessante, adeò ut hac dimensione, quam in longitudinem metimur, uniuersum cor mediam sedem nullis animalibus exactè occupet. Quod ad anteriora posterioraq; attinet, omnibus animantibus cordis basis in medio eius thoracis sedis quam sibi uendicat, collocatur. Mucro autem in anteriora magis exporrigitur, non tamen pariter omnibus. Cæterum hominis cor sua basi, quæ ipsius dignissima nobilissimaq; pars, quum uasorum origo sit, censetur: exactè, ut in reliquis animantibus, dextræ sinistræ que sedis medium obtinet: atque quod ad anteriora posteriora que spectat, pariter sese habet. tātum enim à pectoris distat osse, quantum à uertebRARUM corporibus abscedit. In thoracis autem longitudine, quæ posteriori sede duodecim constituitur uertebis, quintæ uertebre corpus respicit, quæ ex tribus totius thoracis dorsi longitudinis partibus primæ humilior sedes & secundæ elatior existit. In anteriori uerò thoracis sede, quæ pectoris ossis longitudine terminatur, ad amissim mediam sedem exigit, tantundem à iugulo remota, quantum ab ea ossis pectoris sede, cui septum inferitur. Atque hic tutissimus, & plurimum ab ijs quæ foris incidere queunt, remotus, basis locus est: à quo reliquū cordis corpus sensim in anteriora, & in sinistrum latus eousq; exporrigitur, ut mucronis posterior pars magis ad pectus atq; antrorsum q̃ ipsum basis centrū uergat, & dextra quoq; mucronis pars in sinistrum magis ipso basis centro protensa, medium pectoris ossis in sinistrum excedat, ipsumq; mucronis centrum sextæ & septimæ costarum sinistri lateris cartilagine respiciat, quæ pectoris ossi coarctantur. Præsentibus terminis quibus cordis situs compræhenditur, illius quoque magnitudo innotescit: quæ sanè homini, ut & cerebrum ac iecur, quàm cæteris animantibus est grandior. Neque id solū homini priuatim euenit, uerùm & illi quoque cor septi transversæ neruosa parti in læuo latere, cui cordis inuolucrū magno spacio ° adnascitur, quàm proximè accedit: secus longè quàm canibus & simijs, quibus cor magno interuallo à septo remouetur.

mi et 2 fi.
ca 19 lib. 1.

n 2 fig. S.

o à G ad F
3 fig.

DE CORDIS SUBSTANTIA. Caput X.

CORDIS substantia quoad fieri licuit, illis potissimum figuris delineatur, quæ id quouis pacto dissectum referunt, ut septima, et quatuor illi proximè sequentes.

Corâis caro.



Corâis fibræ.

RAE CIPVA cordis substantia carne constat, musculorum carne paulo minus rubra, uerùm duritia, spissitudine, & fibrarum quo intertextitur genere plurimum ab illa uariante. Cordis enim caro longè durior existit, & spissior, iniurijsq; ferendis pertinacior, & demum uario robustissimarum fibrarū genere donata. quum interim unius musculorū sedis caro unicam ferè speciē, eamq; sparsim satis disseminatā duntaxat sortiatur. Porrò species fibrarum, quæ cordis carne continentur (nō enim de membranarum uenæ cauæ & uenalis arteriæ orificiorum^a fibris agimus) haud æquè ac musculorū conspicua est: quandoquidem nullum prorsus inuenias musculum, qui uel citra dissectionem ilico atque detectus est, fibrarum suarum differentiam non accuratè ostendat: & adhuc multo accuratius, si uel crudus uel coctus unguibus, aut cultro discerpatur. at cordis quidem caro fibris compactissimis, & inter se plurimum differentibus oppleta uisitur: quæ uerò earundem situs differentiarumq; sit ratio, cōiectura potius q̃ sectione assequimur. Quouis enim modo cordis carnem aut elixam aut crudam rectis uel obliquis uel transversis sectionibus aggrediari, uel utcunque lubet eandem unguibus dilacere, uix unquam cordis notatu dignam portionem secundum

a 7 fig. N.
membrana
rū K, L, M.
et 8 fig. G
G. membra
narū E, F.

unum

unum fibrarum genus diuelli posse obseruabis, ac omnē carnis partem diuersis multiplicibusq; (sed potissimum transuersis) fibris abundare astrues: non enim in corde, ut sanè in stomacho, uentriculo, intestinis, & ipso etiam utero, & ambabus uescis sectionis beneficio fibrarū situm adinuenire integrū est. Quāq; interim triplex fibrarū genus à Natura ipsi largitū esse, nō possumus ire inficias, quum ob uarium & rarum quem in illo uidemus fibrarum implexum, & nulum simplicem earundem ductum: tum etiam propter manifestam ac uehementem cordis functionem, quæ fibrarum potissimum, ut statim dicturi sumus, auxilio perficiuntur. Ceterum & si ratio fortassis suaderet rectas fibras quibus attrahēdi facultas tribuitur intimas, & deinde his obliquas, quæ in alijs organis naturali motu agentibus retentioni præesse creduntur, positas esse, & extimam sedem transuersas ac orbiculares, quæ expellunt, obtinere, non tamen cordis fibris eum situm ascribemus, quum sectio ipsa triplex hoc fibrarum genus inuicem commisceri ostendat, & nunc rectas, nunc obliquas, nunc transuersas, & rursus rectas & obliquas & transuersas quodammodo commonstret, quasi tres priores differentiae singulis uentriculis peculiare essent, posteriores uerò toti cordi ambobusque uentriculis simul dedicarentur. Appello autem in corde rectas fibras, quas in eo perquam elixato ex ipsius basi ad mucronis usque ipsius centrum deduci, tam per cordis uentriculorum septum, quam reliquā sedem conspiciamus: transuersas autem, quæ orbiculatim cor uentriculosq; ambiunt: obliquas uerò, quæ quidem orbiculatim cor uentriculosq; ambiunt, at oblique secundum cordis longitudinem procedunt. Suntq; hæ in duplici differentia. Aliquæ etenim in dextro cordis latere basi sunt uiciniores, in sinistro ipsi mucroni: aliæ autem in dextro latere mucronem magis respiciunt, in læuo basim. Atque his sanè fibris pro cordis mole, si eam scilicet ad musculum conferas, perquam numerosis, & carne has continente amplexantēq; potissima cordis substantia constituitur, cui eadem cum musculorum uentriū substantia accidit compositio. Vt enim in musculis fibræ nerumpereantur, carnem undique habent circumpositam: sic & cordis fibræ peculiari ipsis carne continentur, fulciunturq;. Quæ porro per uniuersum cor fibrarū & carnis simul sit crassities, tunc demum opportunè explicabitur, ubi cordis uentriculos oratione complexi fuerimus. In presentia autem suffecerit, carnis fibrarumq; cordis usum, quæq; adhuc ad cordis substantiam spectant, adijcere: ac innuere, cordis carnem in mucrone quam in basi spissiore solidioremq; apparere. Non ob hoc profectò (ut Galenus arbitratur) ne hîc cor in suis contractionibus pectoris os accedēs facilius lēderetur: uerū quod ea cordis pars tenuis sit, & quod ad eā fibrarū rectarū concursus perficitur, qui carnē mucronis, & si ab alia nō differat, compactiorē cōmonstrat, ad eū prorsus modū quo solidiorem carnem in musculi capite, aut tendinis principio uidemus, quam in musculi uentris medio, ubi fibræ nō adeò atque in illis locis compactæ, ab inuicem magis dirimuntur. Carnis itaque cordis non postremus usus cum musculorum carnis uiu in fibrarum firmatione correspondet. Quod uerò propria peculiariq; ipsius secundum iustitiam temperie ad præcipuas cordis functiones, quæ in sanguinis gratia pulmonis emutatione, & uitali spiritu conficiendo potissimū cōsistunt, opituletur, imò primarius harum functionum autor sit, ex aliorū uiscerū substantia ratiocinamur. Cæterum cordis fibræ alteri functioni subseruiunt, quæ cor tantisper dum uiuit animal, & dilatatur & contrahitur, & aliquandiu inter contractionem dilatationemq; quiescit. Dein quemadmodum cordis fibræ cum musculorum fibris nonnulla consequuntur communia, sic etiam ut & illæ motui famulantur, sed prorsus diuerso. Musculorum enim motus arbitrarius est, cordis uerò naturalis, ac absque lassitudine inscrutabili rerum Opificis industria indefessus, arbitrioq; nostro minimè subditus, neq; ex cerebri neruis, ut musculorum motus, ulla ex parte dependens. Porro cordis dilatationem, quæ mucronis ipsius ad basis centrum est attractio, & omnium laterum cordis distentio, recte efficiunt fibræ, mucronem uersus basim contrahentes. Quod sanè ita perficitur, ac si uimineo circulo orbiculatim eademq; serie complurimas iuncorum scirporum uer radices connecteres, & capitibus illorum simul collectis, uelut pyramidem quandam efformares, ac demum funiculum ex mucronis medio per circuli centrum dimitteres, quo deorsum tracto, pyramis breuior, intusq; multo capacior redderetur. Hinc siquidem cordis dilatationem condiscere quam optimè liceret: quippe uimen quodammodo cordis basi responderet, iuncorum autem collectio cordis mucroni: deinde iunci ipsi & funiculus ille rectis fibris congruerent. iunci quidem illis responderent fibris, qui in cordis lateribus & anteriùs et posteriùs consistunt: funiculus autem illis conferretur fibris, quæ in cordis carneo^b septo inter duos sinus posito frequentissimæ habentur. quanquam quod omnimodam cum rectarum fibrarum motu similitudinem obtineret, nihil confingere possimus. Transuersarum autem seu circularium fibrarum actionem ad aliquid referre, est quam facillimum. hæ enim cordis contractioni imprimis præ sunt, quæ mucronis

*Carnis cordis
disusus.*

Fibrarum usus.

cronis cordis à basi est discessus, & quædam cordis productio, quâ illæ molliuntur fibræ, quoties laxatis rectis impensius arctantur colligunturq̃, haud secus quàm si prius cōtractum in pyramide illa funiculum iam laxes, ac manibus aut alio circulo in medio pyramidis iuncos introrsum comprimās, itaq̃ illius cauitatem minuas, & interim tamen proceriorem reddas. Nunc uerò quî obliquæ fibræ quieti præfint, hoc est aliquantisper, prout cordis functionibus ex usu censetur, simul cum alijs fibris ad contentas materias undiquaque se contrahant, imaginari nō est arduum: præcipuè si diuersos cordis pulsus in uiuo animali examinaueris. Quod sanè facturus es iucundissimè ea administratione, quam septimi libri calci (uel huius tantum rei gratia) subiiciam: in qua non hæc modò, uerùm alia pleraque spectanda proponentur. Nunc autem ad fibras reuersi, eas non motuum cordis duntaxat opifices esse arbitramur, uerùm rectas ad attractionem, ad expulsionem orbiculares, ad retensionem uerò obliquas conducere etiam nobis persuasum erit. Cæterum præter cordis carnem & fibras propriæ ipsius^s uenæ illius substantiam enutrientes, & ⁿ arteriæ innatum suæ substantiæ calorem fouentes, huc etiam enumerandæ ueniunt: ipsa uidelicet coronalis uena, & duæ coronales arteriæ per cordis substantiam quasi musculorum uasa distributæ. Quis uerò uenæ arteriarum^{que} coronalium sit ortus seriesq̃, in tertio libro abundè complexi sumus. Quare cordis¹ neruulo sermoni quoque addito, ad cordis tunicam est accedendum: ac eum quidem neruulum in quarto libro à sinistro sexti paris cerebri^k neruo depromi retulimus, quando ab illo, ubi sinistri lateris recurrentem neruum constituit, sobolem deriuari diximus, quæ cordis inuolucris basim penetrans, & sinistro¹ uenæ arterialis lateri posterioriq̃ sedi exporrecta, in cordis basim (oppidò quàm obscurè) pertinet. Verùm cordis tunica illi membranæ prorsus correspondet, quæ musculorum uentribus pertinaciter obnascitur, tenuissima nimirum membranula quæ à musculorum substantia diuelli nequit. Eiusmodi nanque cordis extimæ superficiæ obducitur, cui in hominibus præcipuè ad basim durioris adipis copia obnascitur: aliquândo & per reliquam cordis superficiem ad mucronem usque, ac id semper imprimis secundum^m uenarum & arteriarū per cordis corpus digressum, illi enim copiosior adipis portio (ut inⁿ omento & membranis thoracem intersepientibus accidere conspiciamus) attenditur. Integrum esset & ad cordis substantiā referre^o tres membranas uenæ cauæ, & ^p duas arteriæ uenalis orificio præfectas, deinde & ^q auriculas, & ^r quatuor ipsius præter id circunuoluentes uenas arteriasq̃, uasa, nisi nunc tempestiuus foret, singula seorsum priuatis Capitibus recensere. Pari quoq̃ ratione & cordis^s os huc spectare uideretur, nisi & id in primo libro prolixius essemus persequuti.

Cordis substantia
et peculiare
uenæ & arteriæ.

Neruius
cordis.

Tunica cordis
substantia
obnata.

Cordis adeps.

g 6 fi. D. 7
fi. G. & fi.
ca. 6 u. 3 E.
h 6 fi. D. 10
fig. E. E. &
fi. ca. 12 lib.
3 B. B.
i 6 fig. h.
k 6 fig. d.
l 6 fig. l.
m 4 fig. L.
6 fig. E.
n 12 2, 3, &
4 fi. lib. 5.
o 7 fig. K.
L. M.
p 9 fi. E. E.
q 4 fig. I.
& K.
r 5 fi. C. de
in 6 fi. N. I.
G. O.
s 7 fig. ad
D. D. 10 fi.
ad S. S.

DE CORDIS SINIBVS, SEV VENTRICULIS. Caput XI.

SEPTIMA figura & octaua dextrum cordis uentriculum apertum proponunt, non uerò & decima sinistrum. undecima autem cor transuersim dissectum oculis subiiciens, uentriculorum cordis naturæ ostendendæ plurimum iuuat.



Ventriculorum
numerus & situs.

Forma dextri.

Forma sinistri.

VONAM pacto cordis uentriculi hominibus, ac proinde & reliquis animalibus pulmonem habentibus conformantur, quoq̃ constant numero, nunc subiungam, sermonem à Galeni cum Aristotele in illorum numero disceptatione omnino cohibiturus. Humanum itaque cor intus duas insigniter amplas obtinet cauitates, secundum cordis latera sitas: unde etiam unam uentriculum sinum^{ue} dextrum, ^b alteram sinistram merito nuncupamus. Horum dexter sinistri amplitudinem uincit, amboque inuicem forma plurimum uariant. Dexter nanque magis deorsum ad cordis^c mucronem ipso sinistro descendens, ^a cauitatem instar crescentis lunæ paratam adipiscitur: quandoquidem dextro ipsius latere, anterioriq̃ & posteriori sede instar interioris semicirculi, aut ita extructæ cameratæ sedis concaua est, exteriori cordis in his regionibus superficiæ, quæ gibba est, respondens: in sinistro autem latere externæ fornicis aut semicirculi sedis ritu (ut sic dicam) gibba cernitur, propter cordis uentriculorum^e septum semiorbis modo dextra ipsius superficiæ in dextri uentriculi amplitudinem protuberantis. Atque hanc formam dexter cordis uentriculus à basi ad mucronem usque seruat, simul cum cordis effigie ex latiori basi angustior redditus. Sinister uentriculus ampla etiam basi incipit, sensimq̃ in arcum uersus cordis mucronem definit, cauitatem instar coni, quod ad totam superficiem spectat, orbicularem obtinens. Cordis nanque uentriculorum^f septum^s sinistro ipsius latere, quo sinistri uentriculi dextrum latus efformat, concauum,

a Patet in
7 et 8. et G.
G in u fig.
b Patet in 9
et 10. & H.
H in u fig.
c 4 fig. E. 6
fig. C.
d Hanc maxime ostendit u fig. ad G. G.
e u fi. l. l. 8
fig. H. H.
f u fi. l. l.
g 10 fig. R.

uum, non uerò utⁿ dextro latere gibbum extuberansq; uisitur, & parem crassitiem naturamq; cum cordisⁱ substantia sinistrum latius & anteriorem posterioremq; sinistri uentriculi sedes constituyente exigit: itaq; prorsus se habet, quasi sinistri uentriculi potissimum gratia cor constitueretur, ac ut dexter uentriculus fieret^k tenuis quædam cordis substantia dextro septi lateri adnasceretur. Vniuersa namq; cordis substantia, præter uentriculorū septum, dextri uentriculi amplitudinem constituens, tenuis admodum est: quæ autem sinistrum uentriculum orbiculatim ambit efformatq;, dextri uentriculi substantiam multis numeris crassitie superat, & undiq; eque crassa uisitur, præterquam in ipsa basi, ubi uasorum illinc prodeuntium dehiscientiumq; gratia, cordis carnea substantia tanta amplitudine deficit, quanta orificiorum est amplitudo. Vtriusq; uentriculi^m superficies perquam inæqualis est, & multis quasi foueis in carneam substantiam penitus impressis obsita. Neq; istæ ad latera tantum, & si secus cæteris omnibus dissectionum proceribus uisum sit, consistunt, ubi dexter uentriculus sinistrum respicit: uerum per uniuersam prorsus uentriculorum superficiem, non solum in nuper occisis animantibus, sed perpetuò, tantisper dum cor ipsum seruare uolueris, apparentes, neq; unquam uel in exiccato corde conniuentes. Deinde præter hanc inæqualitatem, quæ in sinistro uentriculo nonnihil insignior est, amboⁿ carneas quasdam explantationes processus uel intus exigunt, qui teretes sunt, & graciles, & in^o fibras mēbraneas cessant, humiliori sedi^p membranarū in ipsis sinibus positarū continuas. Cernuntur autem carnei hi processus potissimum ad uentriculorū mucronem, humiliorem uel sedem, quos ad fibrarum quas continent robur facere ostendam: quum secundo ab hoc Capite membranarum cordis naturam persequar. Ventriculorum igitur^q septum crassissima, ut dixi, cordis substantia efformatum, utrinq; foueis ipsi impressis scatet, hac imprimis occasione inæquali superficie qua uentriculos respicit donatū. Ex his foueis nullę (quod sensu saltē cōprehendi licet) ex dextro uentriculo in sinistrū penetrant, adeò sanē ut rerum Opificis industriā mirari cogamur, qua per meatus uisum fugientes ex dextro uentriculo in sinistrum sanguis resudat. Præter hætenus commemorata, in utrisq; duo habentur orificia, & totidem uasa in eminentiori uentriculorum sede, in cordis nimirum basi consistentia: & substantia, quum unū quidem uenosum, alterū autem arteriosum sit, differentia. Deinde ambobus uentriculis^s membranæ quædam insunt, quas uasorum orificijs paulo post præfici commemorabimus: ac in dextro quidem uentriculo tres habentur, uenæ caue os spectantes: in sinistro autem duę, uenalis arteriæ origini connatæ, adeò ut & hinc uentriculis quædam exurgat differentia, quemadmodum etiam & ipso usu, & quam continent materia inter se differunt. Porro usum illorum unā cum cordis uasorum & orificiorum & membranarum & aurium usu priuato Capite meritò pertractabimus, quod hæc simul omnia cordis functionibus famulentur: quas, nisi enarratarum iam partiū constructione prius descripta, recensere absurdum foret.

Ventriculorum superficies.

DE CORDIS VASIS, ET EORVN.

dem orificijs. Caput XII.

CORDIS uasis eorundemq; orificijs spectandis pleræq; faciunt figuræ: ac quinta quidem præcipuē uenam cauam proponit ad characteres C, D, E. Sexta autem uenam arterialem Insignitam, & arteriam uenalem Gnotatam, & magnam arteriam Oindicatam. Cæterum septima cauæ uenæ proponit orificium ad C, C, C. Octaua arterialis uenæ ad C, D. Nonna uenalis arteriæ ad C, C. Decima magnæ arteriæ ad A.



Tota fig. cap. 6 lib. 3 hic autem 5 fi. C, D, E.

VPERIORI Capite, quo duos cordis uentriculos complectebamur, quatuor cordis uasa & totidem orificia esse, obiter innuebamus. Ac in uasorum quidem numero sunt uena caua, uena arterialis, arteria uenalis, & magna arteria, quæ omnia singulis ad cordis uentriculos spectantibus donantur foraminibus. Vena caua ad dextrum cordis latius dextrumq; uentriculum refertur: num uerò ab illo in hominibus originem ducat, non admodum contentiose friuolis quibusdam autorum suffragijs innitens, agrediendum duxi, quum sectione (ut rationes subtriceam) in natis hominibus nihil aliud quam cauæ ortum à corde pendere (non secus ac reliquorum trium uasorum) queam colligere. Atque idem de fœtibus, quoad hætenus illorum sectioni incubui, fateri cogor: non interim Galeni sententiæ passim mihi reclamantis ignarus. Quæ enim is de uenæ cauæ principio in sexto de Hippocratis & Platonis dogmatibus contra Aristotelis placitū adducit, omnia in illum (si mo-

Cordis uasa quot & quæ.

Vena caua.

D d dō

dò id quis proposuisset) retorquere esset quàm facillimum. Nisi fortè cum Galeno illi conueniret, quod iecur sanguificationis officinam esse haud falso enunciauerit, quanquã etiã Achillem illum arteriæ uenosæ principium deturbaret. Ex dextro itaq; latere basis dextri uentriculi ad humiliorem eiusdem basis sedem, uena caua^b amplo patentiq; admodum orificio exoritur, ac illico ab exortu (qui totius uenę capacitatem amplitudine multum superat, ac uelut extuberans ad cordis substantiæ terminos, ^c circulus uisitur) sursum ad iugulum, & deorsum uersus septum^d contendit: neque, ut quispiam fortè arbitraretur, uena caua unico ad hunc modum enata principio, in duos truncos magnæ arteriæ^e modo dirimitur, sed dextro basis cordis lateri instar re-cti pali attenditur, ac suo ueluti sinistro duntaxat latere uena ex dextro uentriculo enascitur, ac facile citra aliam diuisionem (quod interim arteriæ magnæ ex cordis basis centro quodammodo prodeunti negatum est) cordis inuolucrum permeans, sursum deorsumque prore-pit. Neque profectò alia cauæ exortus, aut si mauis cum Galeno dicere, insertionis est species, quàm originis trium reliquorum uasorum cordis uentriculos spectantium. Cæterum quoniam pacto toti anteriori cauæ exortus sedi secundum illius longitudinem^f dextra cordis auris adnascatur, in eo quod statim de cordis auribus subnexuri sumus Capite, audies. Vena igitur caua primum cordis uas censebimus, & ipsius ortus similiter primi orificij loco opportunè habebitur. ^g Vena arterialis etiam dextro cordis uentriculo ascribitur, est que ea uena, quam quidem quòd sanguinem in pulmonem deferat, uenæque prorsus uicem gerat, Venam: quòd uerò arteriæ corpus nanciscatur, Arterialem appellari antea diximus. Hæc multo minori quàm caua^h orificio ex dextri uentriculi basis elatissima parte iuxta dextrum latus uentriculorumⁱ septi enascitur, & magnæ^k innitens arteriæ, sinistrorsumque nonnihil suo caudice inclinans, ac cordis inuolucrum permeans, tandem in^l duos truncos diffcinditur, quorum dexter ad sinistrum latus caudicis magnæ arteriæ, posterioremque eius caudicis sedem reflexus, in^m dextros pulmonis lobos digeritur, sinister uerò inⁿ sinistros. Porro^o uenalis arteria, quam in tertio libro pariter cum arteriali uena persequuti fuimus, atque etiam ab usu quòd aërem continet deducit ue, Arteriam: à substantia autem, quòd uenarum corpori respondet, Venosam nuncupari retulimus: inter sinistri cordis uentriculi uasa connumeratur, ac ut uenarum corpus adipiscitur, ita quoque ex molliori sinistri uentriculi sede (ut caua ex dextri) principium ducit. Ex sinistro enim sinistri uentriculi latere ad eiusdem uentriculi demissio-rem partem pari penitus modo ut caua, uenalis arteria^p patenti admodum orbiculari que orificio enascitur, ac statim ab ortu, aut in ipso potius ortu, in^q duos truncos deriuatur, quorum dexter sub cordis basi productus, ac cordis inuolucrum penetrans, in dextram pulmonis sedem dispergitur, sinistro interim in sinistram pulmonis partem exporrecto. Cæterum hæc uenalis arteriæ in primos truncos distributio, adeò illius origini uicina est, ut hoc nomine nonnulli dissectionis professores eius in corde orificium multiplicauerint, ac id geminantes quinque quatuor cordis uasorum orificia enumerauerint. Et rursus fortassis pari ratione uenæ cauæ attendentes, ipsius quoque orificium geminarunt: quum in ipsa etiam origine^r hæc sursum deorsumque properat. Huiusmodi enim quid Herophilus contra Galeni Erasistrati que sententiam ex septimo de Administrandis sectionibus libro innuisse colligitur. Porro nos quatuor cordis uasorum, quatuor tantum orificia, ut reuera sunt, enumerabimus. Quo autem pacto uenalis arteriæ exortui in anteriori quoque ipsius regione^s læua cordis auricula adnascatur, secundo ab hoc Capite explicabimus. Quartum uas, quod adhuc enarrationi deest, quartumque cordis constituit orificium, ^t magna censetur arteria, pari ratione ex sinistro uentriculo, qua arterialis uena ex dextro, principium ducens. Ex dextro enim elatissimæ sinistri uentriculi sedis latere, & ex cordis basis ueluti centro arteria magna enascitur, aliquousque recta^x sursum sub uenæ arterialis caudice tantisper prorepens, donec cordis inuolucrum permeans, in duos truncos diffcindatur, quorum unus corporis superiora, alter inferiora petit. Atque ita profectò durorum crassorumque uasorum, ipsius nimirum arterialis uenæ, ac arteriæ magnæ principia adeò respondent, ut sinistrum arterialis uenæ latus dextro arteriæ magnæ lateri in ipsa origine adnatum sit, amboque uasa hîc ex eminentissima cordis uentriculorum septi sede commune principium radicemque possideant, quod eousque quibusdam animalibus indurefcit, ut id Galenus reuera os esse affirmet. Cæterum^y hîc in sinistro cordis uentriculo ad septi eminentissimam sedem ascensus post dextram orificij uenalis arteriæ membranam inter dissecandum latens conscendensque Aristoteli imposuit, ut inibi tertium cordis uentriculum constituerit, illum arteriæ magnæ principium esse recensens, quod sanè multo minus incusandum uenit, quàm quod uentriculorum cordis numerum pro animalium mole uariare scripserit. At quemadmodum Galenus in huiusmodi leuib^z & obiter

Vena arterialis.

Venalis arteria.

Diuersa Anatomicorum de cordis orificijs placita.

Magna arteria.

Li. 3. de Partibus animal. cap. 4.

b fi. ca. 6 li. 3 D. 7 fig. C, C, C. c 7 fi. H, H, H. d 7 fi. A, B aut D, E. e ut 6 fig. O in P & R.

f 5 fi. B. 7 figura F.

g 1 fi. cap. 15 li. 3. 7 fig. I.

h 8 fig. sub E, F, G.

i 8 fi. H, H. k 6 fi. I super O.

l 6 fi. L, K. m 3 fi. L, M.

n 6 fi. i, k. o 2 fi. ca. 15 li. 3. 6. fi. G.

p 9 fig. D, D. & 12 fig. D.

q 2 fi. ca. 15 li. 3 K, L.

r 7 fi. D, E.

s 6 fig. F.

t figura ca. 12 li. 3. 6 fi. O. 10 fi. A. u 10 fi. S, S. x 6 fig. O sub I.

y 9 fig. L sub E.

ter tantum traditis ab Aristotele descriptionibus prolixè refutandis occupatur, ita sanè Aristotelis sectatores hortarer, ut in Aristotelem affecti, sedulò humani corporis fabricam ipsi rescarent, eam Galeni placitis accuratè conferentes, ut tandem Galeno Anatomicorum principi id obijcerent, cuius dissectionis professores crebrò insinuat, quum utcunque leuiter Aristotelis ut in confectionibus parum exercitati errorem illum citra partium inuentionem committentis fert: at eos grauiter incusat, qui totam uitam huic speculationi dedicarunt, & tamen in plerisque falsi sunt. Si enim quis Galeni dogmatibus non addictus, ea diligenter examinaret, complurima profectò occurrent, quæ altius refelli possent, quàm quæ Galenus alijs imponit Anatomicis. Non enim admodum leue censeretur, quod in sexto de Partium usu arteriæ magnæ orificium amplius uenosæ arteriæ orificio esse asserit: quum interim hoc, illo longè amplius cernatur. Neq; simpliciter Galenus magnæ arteriæ orificium uenosæ contulit, imò ceteris cordis orificijs id amplius esse contendit, adeò in Aristotelis dogmata incitatus, ut nō animaduuerterit uenæ cauæ orificiū uel triplo maius arteriæ magnæ orificio cerni, ac re uera esse, uti & uenalis arteriæ orificiū grandius magnæ arteriæ orificio esse dicebamus. Porro quod & ego in Galeni medicinæ parentis uerba iurauerim, ac philosophis nos insectandi ansam præbere nequitiam instituerim, non lubet hæc, & eius generis permulta diffusius persequi: unde etiam ad cordis membranas sermo iam uenit reflectendus.

DE VNDECIM MEMBRANVLIS QVA
tuor orificiorum cordis. Caput XIII.

PRÆSENTES membranæ seriatim in septima, octaua, nona & decima figuris occurrunt. Septima nanque tres proponit uenæ cauæ orificio præfectas, ac K, L, M insignitas. Octaua tres in uenæ arterialis orificio positas, & E, F, G notatas. Nona duas uenæ arteriæ orificij E & F indicatas. Magnæ autem arteriæ tres membranæ in decima B, C, D insignitæ proponuntur.



A C O R P O R A cordis membranas nuncupamus, quæ cordis uasorum radicibus, ipsorum uel exortibus adnata, calore, substantia, crassitie, prorsus membranæ existunt, materierum regurgitationibus præfectæ. Sunt porro hæc omnes ex præcipuorum Anatomicorum sententia undecim numero, ac tres quidem singulis trium uasorum orificijs, duæ autem duntaxat uno quarto uel adnascuntur. Vena caua, quam primum dextri uentriculi uas esse recensuimus, suas membranas, uti modò subit. Cauæ exortui, qui uelut extuberans in cordis substantia, ex qua proliùs membraneus circulus humiliori uenæ exortus parti proximè adnati modo ac uenæ initium ex cordis substantia principium ducit: & quem exortu extrorsum è cordis uentriculo fertur, ita quoque membraneus hic circulus dextri uentriculi amplitudinem procedit. Insuper ut uena caua ilico à uenæ termino (ut ita dicam) enascitur, abscedit, solo exortu, qui breuissimè substantiæ adnata: sic etiam membraneus circulus minima amplitudine cordis circumducitur, ilico ab illa abscedens ac exacta, & solida, citraque insignem crassitie apparentia. Hæc in uentriculi cordis amplitudinem deorsum ducta, ilico in tres ueluti membranas scinditur, ex ampla basi in obtusum mucronem à semicirculi conuexo differentes. Mucro autem harum membranularum diametrum uentriculi dextri longitudinem cessat, neque aliqua ex parte, quam circumferentia hæc tribus ipsius processibus cordis substantiæ adnascitur. Verum trium membranularum seu processuum, quæ reliquo ipsarum corpore distinctiorque efficitur, fibræ quædam frequenti serie enascuntur, quæ deorsum amplitudinem ductæ, uentriculi lateribus iuxta ipsius mucronem adnascuntur duntaxat, ut Galenus innuit, ad uentriculorum cordis septum, at etiam ad mucronis amplitudinem. Omnis namque inferior membranularum uentriculi mucronis sedi exporrigit, quæ ipsi è directo constituitur. Præsentibus uelut committuntur, excarnes sunt, & cordis substantiæ haud adnascuntur, sed istoteles illas neruos esse arbitratus, hinc cor neruorum principium esse, ubi fibræ ad uentriculi mucronem implantantur, aliquousque carnosa

Membranarum numerus.

Caudemem-
brande.

Dd 2 sub 2

substantia adaugentur suffulciunturque: non aliter profecto apparentes, quam si carnes in cordis uentriculo uirgulæ essent. Cæterum membrana hæc propter tres membraneos ab ipsa deductos processus, trium uenæ cauæ orificij membranularum loco enumeratur, atque quod processus illi quum clauduntur, atque inuicem conniunt, spiculorum fulcis structura similiter existant, Græci *τριγώναιες*, quasi trifulcas dices, eos appellauere. Quum enim membraneo circulo adhuc patente & orbiculari seruato, tres ipsius processus inuicem e regione illius centri coeunt, formam effingunt triangulari cuspidi non absimilem, idque potissimum illi cuspidi, quo in telis Turcæ penetrandis loricis hodie utuntur, qui triangularem quidem efformant cuspidem: sed quod minus oblongum illud ferrum grauaret, anguli que acutiores redderentur, illi inter duos angulos sulcum elimant, adeo ut cuspidis ex basi in mucronem desinens, simul tres angulos & totidem sulcos ostendat: uti etiam hic in corde fieri animaduertes, dum inter disseccandum tres membraneos processus inuicem committes. Cæterum si totius membranei corporis cum ipsius processibus & fibris ad aperti similitudinem petis, eam ex coronæ forma opportunè sumes, quam regum capitibus antiquitatem insculpsisse, in illis que Romæ effodiuntur imaginibus uidemus.

*Venalis arteria
membrana.*

Porro quemadmodum^h uenalis arteria uenæ cauæ tum corpore, tum intro mittendis ad cor materijs, & ortu propemodum accedit, ita quoque uenalis arteriæ membranæ cum cauæ orificij membranis pleraque exigunt communia. Adⁱ radicem enim orbis uenalis arteriæ, ^k membraneus circulus ex cordis substantia enascitur, qui in sinistri cordis uentriculi amplitudinem introrsum (ut^l uenalis arteria extrorsum) ducitur, statimque ab exortu à cordis substantia abscedit, uenæ cauæ orificij membraneo corpore huc usque quam simillima. Verum quum aliquantisper in uentriculi amplitudinem descendit, in^m duos tantum membraneos processus partitur: forma quidemⁿ illis qui ad uenæ cauæ orificiū pertinent respondentes, sed mole & robore superiores. Ex ampla enim basi in obtusum mucronem finiunt, longius in sinistri uentriculi cauitatē, quam cauæ orificij membranulæ in dextri contingentes. Horum processuum unus dextrum uentriculi sinistri latus, alter sinistrum respicit. Anteriùs enim & posteriùs inuicem dehiscunt. Secundum uniuersam eorundem humiliorem sedem (quæ etiam ut cauæ orificij membranularum, crassior duriorque existit) ^o fibræ seriatim ex illis enascuntur, quæ deorsum porrectæ, tandem cordis substantiæ ad mucronis sinistri uentriculi amplitudinem passim adnascuntur: & quemadmodum in dextro uentriculo fieri diximus, ^p carnea cordis substantia adaugentur stabiliunturque. Cæterum quia membraneus uenalis arteriæ circulus in duos tantum processus dirimitur, dissectionis procures duas tantum membranulas ipsius orificio præfici asserunt: quas mitræ episcopali non admodum ineptè contuleris, si modò partem caput amplectentem ipsi membraneo circulo, & huius processus anteriori posteriorique mitræ cacumini assimilaues. quum enim duo tantum hic cernantur processus, utcunque eos inuicem conniungere singas, *τριγώναιες* cum Galeno ipsas appellare non poteris, quod scilicet triangularis cuspidis imaginem nunquam referant.

*Arterialis
uenæ membra-
na.*

Venæ arterialis^q membranæ dictorum modò orificiorum membranis neque situ, neque forma, neque etiam robore respondent. A^r uenæ enim arterialis exortu hæc introrsum in cordis dextrum uentriculum haud pertingunt, sed totæ in eius uasis caudice consistunt, ita ab orificio extrorsum ductæ, ut commemoratæ priùs membranulæ ab orificio introrsum pertinebant. Neque etiam his unus communis que est circulus, uerum tres distinctæ, & non admodum ualidæ sunt membranæ, singulæ semicirculi modo principium ducentes. Venæ enim arterialis orificiū introrsum, atque in suam ipsius amplitudinem nonnihil in origine extuberans, suæ amplitudinis superficiē in tres semicirculos extrorsum à corde latefcentes distinctam obtinet: qui crassiores redditi, in ipsam uasis amplitudinem protuberant, ac suis tuberibus ueluti tres triangulos ita efformant, ut in puncto se contingentes circuli extra suam superficiem, supra infraque contactus terminum angulos constituunt. Ab his semicircularibus tuberibus membranæ tota ipsarum amplitudine, quasi semiplenæ lunæ imaginem referentes pronascuntur, nusquam uasi ipsi, præterquam ad hæc tubera, adnatæ. Harum membranarum latissima sedes, quæ extrorsum à corde magis reliquis membranarum partibus remouetur, & sola membranarum latus est, uasi ipsi non connatum, haud ita rectè cernitur, ac si singulæ membranæ dimidiatum circulum ad amussim exprimerent: uerum modicè id latus introrsum obliquatur, & non adeo altè extrorsum ue in medio conscendit, atque terminis quibus utrinque uasi continuatur. Quum itaque hæc superior latissima que membranularum pars latus ue instar dimidiatæ parenthesis ad hunc modum (inflectatur, & ipsarum membranularum exortus, & ad uasa connexus semicirculum ad amussim exprimat, Græci has membranulas *σύνμοιρῆς* nuncuparunt, ab illorum C imagine. His tribus uenæ arterialis membranulis, tres in arteriæ magnæ ostiolo à Natura creatæ respondent, in nullo prorsus ab illis

*Arteria magna
membrana.*

quam

h 6 fig. G.

*i 9 fi. D, D.
k Est u E,
F proxima
D, D. 9 fig.
l 9 fi. C, C.
m 9 fi. E, F.
n 7 fig. L, K.
n 7 fig. K, L, M.*

*o 9 fi. G, G.
p 10 fi. M jub
l, K.
p 9 fi. H, H.
H. 10 fi. N.*

*q 8 fi. E, F.
G. et 1 fi. ca.
15 li. 3 cha.
1, 2, 3.*

*r 10 fi. B, C,
D. et 1 fi. ca.
2 insertæ li.
3 caracte-
res 1, 2, 3.*

quàm in magnitudine & robore differentes. Magnæ enim arteriæ membranulæ tanto grandiores ualidioresq; uenæ arteriosæ membranulis uisuntur, quanto uenæ arteriosæ corpus ab arteriæ corpore duritia amplitudineq; uincitur.

DE CORDIS AURICVLIS. Caput XIII.

CORDIS auriculas quarta figura proponit I & K insignitas, ut & sexta M & F notatas. Verùm dextram auriculam inuersam ostendit septimæ figuræ F, & octauæ K. Sinistram uero nonæ figuræ I, & decimæ L.



VRICVLAE cordis dissectionum professoribus uocantur; appendices quidam basi ipsius adnati. à similitudine enim, quam illi in situ, non autem in usu, cum propriè dictis auribus obtinent, aurium nomine donantur. Emicat namq; ad utrumq; cordis basis seu capitis latus appendix unus, ex ampliori basi in mucronem desinens, quem ex latere quo reponitur, aut dextrum, aut sinistrum nuncupamus. Dexter itaq; appendix seu auris, dextro cordis basis lateri attenditur, tota anteriori exortus uenæ ca-

Duarum cordis auricularum situs.

Dextra auricula situs, forma.

a 4 fi. I. 5 figura B.
b 5 fig. B ad C, aut potius F septimæ fig. ad H proximū

c 7 fi. F. 8 figura K.

d 6 fig. F. 4 fi. K. 9 fi. I. 10 fig. L. e 6 fig. G. 9 fig. C. C.

uæ regioni secundum illius longitudinem obducta, & etiam suo mucrone à uenæ corpore abscedens, elatius nonnihil quàm cordis basis sursum conscendit. Voco autem exortus uenæ cauæ longitudinem, totam eam sedem quæ à uenæ cauæ parte qua propinquius cordis mucroni uena cordis substantiæ adnascitur, usq; ad eam quæ basis cordis cetro, aut ipsi arteriali uenæ uicinior est, atq; huic exortus longitudini dextræ cordis auriculæ basis longitudo respondet. Huius enim auriculæ effigies pyramidem refert, exq; oblonga basi in mucronem, qui non admodum acutus protensusq; est, desinit. Auriculæ etenim basis longitudo, quam uenæ caue ex corde principij longitudine metiri diximus, ipsius auriculæ etiam admodum distentæ amplitudinē ferè triplo excedit; deinde & longior multo est, quàm progressus à basi auriculæ ad ipsius mucronem pertinens. Porrigitur autem auricula à basi sursum antrorsumq;, adeò ut nulli auriculæ forma, quod ad basim mucronemq;, & deinde ad cauitatem ac compressionem distentionemq; attinet, exquisitiùs contuleris, quàm coriaceis tuberibus utrinque Turcarum fellis affutis, quæ equis fluuium transnatauri uesciarum ritu magno usu inflant. Exterior namq; auriculæ superficies pro ipsius repletionē uariat: quū enim auricula in cordis constrictione turget, oppletaq; est, gibba undique & æqualis & aqueo ueluti humore oblita cernitur. At inanita concidenteq; auricula, superficies hæc rugosa ac ueluti plicis oblita spectantibus occurrit; interim tamen auricula exterius aqueo humore, ut & cordis superficies, obducitur. Verùm quandoq;, licet idrariùs, exterior distentæ etiam auriculæ superficies inequalis, propter adipem illi tunc obnatum uisitur. Interior autem superficies auriculæ cauitatem circumscribens, uentriculorū cordis superficiei omnino respondet. Vt enim hæc ubi uasa educit leuis, tota autē reliqua sede aspera & foueis plena cernitur, ita quoq; illa ubi uenæ cauæ exortui adnascitur, leuis quidem est, reliqua autem amplitudine foueis ac fibrosis implexibus adeò scatet, ut cordis superficiē inæqualitate uincat. Atq; hæc cauitas in amplitudine prout auriculæ corpus aut concidit aut distenditur uariat, foueæ autem nunquam penitus explicantur. Porro auriculæ substantia triplici fibrarum genere, & modica, eaq; admodū dura, & quasi cuticulari carne eas fibras amplectente constat, adeò ut auriculæ fibris cū cordis substantia respōdeat, at carne (quæ, ut diximus, neruea magis cuticularisq; & subnigricans est) à corde differat. Neq; ab hac fibrarum cum ea carnis commixtione uix cutis crassitiem superante, aliud peculiare auricula in sui constitutionē asciscit, nō enim uenas arteriasq; & neruos peculiariter ipsi insertos comprehendimus. Cæterum auriculæ connexus propemodum ita se habet, sinistrum sui basis latus extremo cordis substantiæ, ubi anterior uenæ caue in dextro cordis sinu orificij regio consistit, adnascitur: aut uerius ab illo extremo auricula prodit. Dextrum autem basis latus uenæ caue corpori secundum ipsius exortus à corde longitudinem, & in anteriori illius sede cōnascitur, ac ueluti cum uena commune corpus efficitur. tota reliqua parte auricula ab omni prorsus cōnexu libera est, & perinde ac cordis corpus in cordis quoq; in uolucro continetur, nullis fibrosis nexibus illi commissa. Sinistra cordis auricula pleraq; cum dextra possidet communia, hæc namq; in anteriori sede exortus uenalis arteriæ secundum ipsius longitudinem consistit. Deinde ex basi in mucronē quoq; cessat. uerū is mucro qui acutior dextræ auriculæ mucrone habetur, non adeò sursum, sed in sinistrum magis atq; in latus exporrigitur. Insuper sinistra in prouectioribus ætate hominibus dextræ auriculæ dimidiatæ magnitudini cedit, ut & ipsum quoq; uenalis arteriæ ostiolū longè

Dextra auricula substantia.

Nexus auriculæ.

Sinistra cordis auricula.

minus uenæ cauæ orificio uisitur. Quod ad externam internamque attinet superficies, auriculæ utcunque respondent. quanquam exterior sinistra superficies rugosior magis, multoque inæqualior semper occurrat. Interior autem superficies similiter atque in dextra auricula inæqualis, & foueis oblita cernitur. Substantia etiam similes sunt: uerum sinistra multo durior, ac minus in contractione distentioneque sequax uisitur. Quinetiam si illam dextræ conferas, uelut marcida exicataque spectabitur, adipe semper magis quam dextra exterius abundans. In connexu prorsus conueniunt. nam uti dextra uenæ cauæ & dextro cordis lateri secundum cauæ ortum adnascitur, ita quoque sinistra dextro sui basis lateri cordis substantiæ, ubi uenalis prodit arteria, conascitur: sinistro autem latere ipsi uenalis arteriæ corpori. Vsu, ut suo ordine paulo post dicturi sumus, parum admodum inter se differunt. Nunc enim omnium cordis particularum, quarum iam numerum, situm, formam, connexum, substantiamque complexi fuimus, usum & functionem feriatim subiungere enitemur: id non prætereuntes, in foetibus & nuper natis animalibus auricularum molem longè maiorem ex proportionem occurrere, quam in ætate prouectioribus.

CORDIS, IPSIUSQUE HACTENUS COM

memoratarum partium functio & usus, ipsarumque constructionis ratio.

Caput XV.

Cercuius ani
mæ sedes.



altricum

OR irascibilis, seu uindictæ honorisque concupiscibilis animæ sedem esse, Hippocrati, Platoni, Galeno, & Stoicis ac Peripateticis pariter omnibus concessum fuit. Verum ad hæc, Zeno, ipsiusque dogmata corroboraturus Chrysippus, Possidonius, cæteraque Stoicorum familia, & Aristoteles cum Theophrasto, reliquisque ipsius asseclis, cor principium fontemque esse uoluere, non nunc dictæ tantum irascibilis facultatis, at etiam eius quæ ciborum, potuum, & uenereorum est appetitrix, quam alteratricem Aristoteles, alij uerò naturalem, alij autem simpliciter concupiscibile appellare consueuerunt. Deinde etiam Stoici unà cum Peripateticis rationis uim, & ut semel dicam, animæ principatū in corde collocarunt, omnium id in animali functionum atque officiorum initium esse arbitrati. Quanquam interim iidem inter se decretis pugnent. Aristoteles enim, Theophrastus, ac reliquus Peripateticorum chorus, & ex Stoicis Possidonius, irascibile uim, ac concupiscibilem rationalemque unius substantiæ e corde proficiscentis facultates esse asserunt, animæ autem species partes uel esse inficiantur, neque eas distinguunt. Chrysippus uerò Stoicorum non postremus, sicut in unā substantiā, ita quoque in unam facultatē & iram & cupiditatē cum ratione coëgit. At his omnibus refragatur, ex diuini atque inter medicos facile primarij Hippocratis, & inter philosophos eminentissimi Platonis sententia, Galenus, quum in alijs plerisque locis, tum potissimum in noue libris quos de Hippocratis & Platonis dogmatibus inscripsit. Illis namque libris tres animæ species partes uel Natura admodum inter se discrepantes docens, firmissimis atque scientiā prorsus suo ipsius suffragio faciētibz demonstrationibus comprobatur, iecur ciborum potuumque & uenereorum concupiscibilis animæ, cerebrum autem rationalis ac principis locum esse, cor duntaxat irascibilis animæ ergastulum esse concedens. Porro ne hic forsitan in aliquem ματαιολογον, ac nescio in quem hæresis censorem impingam, ab hac de animæ speciebus earundemque sedibus disceptatione prorsus abstinebo. quum tot hodie, ac potissimum apud nostrates sanctissimæ uerissimæque nostræ religionis censores reperias: qui si aliquem aut de Platonis, aut Aristotelis, suorum uel interpretum, aut Galeni de anima sententijs, uel etiam inter celebrandam Anatomiam (ubi hæc potissimum examinanda ueniunt) mussitare audiuerint, ilico illum de fide ambigere, ac nescio quid de Animarum immortalitate hæsitare astruunt, non perpendentes necesse esse medicis (si modò non temerè ad artem accedere, neque inopportunè agrotanti membro remedia applicare uoluerint) de ijs quæ nos gubernant facultatibus considerare, & quot numero sint generatim, & qualis quæque sigillatim habeatur, quo uel in animalis membro singulæ constitutæ sint, & præter hæc maximè (si modò id adipisci mente possemus) quæ animæ substantia essentia uel sit. Quasi uerò non citra impietatem nullamque prorsus fidei labem quis de grauium illorum autorum decretis nihil proponere, aut etiam illorum rationes alijs nouis corroborare, aut friuola aliorum argumenta refellere posset: ac quasi non aliter de sanctissima, quæque accedentibus pijs operibus fide saluamur, felicemque æternitatē hominum animæ adipiscuntur, quæ de his autorum dogmatibus, ac quas imbecillis & humana ratio suppetit hoc in negotio opinonibus, loquendum interrogandumque foret. Nihilominus interim de animæ facultatibus, functionibus, substantia, natura, speciebus, & earum sedibus inuestigatione remissa, liberè asseremus cor facultatis, atque adeo spiritus uitalis fontem, & caloris natiui sedem fomitemque existere, ac pulsuum autorem esse, singulasque cordis partes illi ad calorem spiritumque spectanti usui subser

Medico de
anima facultatibus ac sede
considerandū.

Cui functioni
omnes cordis
partes famulatur.

43 fi. B, C, subseruire commonstrabimus. Quis itaq; cordis^a inuolucris (ut singula ea serie qua earundem
 D, E, F, G, prius cōstructionē enarrauimus, persequamur) sit usus, peculiare de inuolucro Caput utcunq; *Inuolucris*
 44 fi. B, pertractauit. Deinde & cordis situs, antea commemoratus, in ipso thorace est tutissimus, & ab *us.*
 B. omnibus quæ thoraci extrinsecus noxā inferre possunt remotissimus. Præterea cor in pulmo- *Situs cordis*
 nis id suis lobis ueluti digitis quibusdam amplexantis medio ita^b consistit, ut æqualem prorsus *ratio.*
 ex omnibus pulmonis partibus aëris per^c uenosam arteriam moliatur attractionem, & rursus
 fuliginosorum recrementorū egestionem in pulmonem tentet, & iusta etiam portione per ue-
 nalem arteriam &^d uenam arterialem pulmonī sanguinem porrigat. Ad hæc, cor non admo-
 dum procul ab ore, per quod inspirationē perfici necessum erat, locatum, eam corporis sedem
 nihilominus obtinet, ex qua commodē per^e arteriæ magnæ ramos toti corpori natiuum calo-
 rem, spiritumq; uitalem offerre queat. Quamuis etiam, quod ad totum corpus attinet, à medijs
 partibus tantū superiūs recedat, quantum à pubis ossiū coalitu distat. is enim erecti adultorum
 corporis exquisitissimū habetur medium, nō autē umbilicus, quem Galenus cordis situm enar- *Lib. 2. de De*
 rans, medium adamuissimū esse censebat. Insuper nō omnes corporis partes sedem æquē tutam *cretis Hipp.*
 nanciscuntur, quandoquidem^f basis ipso^g mucronē impensius occultatur, thoracisq; mediam *& Platonis.*
 sedem magis occupat. Non enim omnes cordis partes, quum idem usus singulis haud delege- *Omnes cordis*
 tur, pari tutela indigebunt. Partes enim in basi cōstitutæ, uasorū explantationi & exortui de- *partes non æ-*
 stinantur. Quæ uero ab hac ad mucronis usque cacumen utrinq; in lateribus, & anteriūs poste- *quē dignas es-*
 riusq; habentur, cordis uentriculorū^h parietes censentur, atq; ad uentriculos cōficiendos subser- *se.*
 uiunt. Mucro autē quodammodo processus est ualidus, ac propter cordis fibrarū hīc collectio-
 nem copiamq; & carnis eas suffulcientis amplectentisq; duritiem, solidus admodum, & uelut
 cordis uentriculorum operculum recensetur, instar propugnaculi uniuerso cordi præfectum,
 adeo ut mucro securiūs, quàm basis ipsa pectoris os anterioraq; corporis accedere queat. Mu-
 cro itaq; cordis portio ignobilissima & abiectissima creditur: basis uerò, quoniā uasorum exor-
 tibus præficitur, omniū est primaria: quæcunq; autē inter has sunt mediæ, cum uicinarum di-
 gnitate proportionē exigunt. Quæ enim basi uiciniūs accedūt, paulo minūs habendæ sunt po-
 tissimæ. At quæ inter has sunt mediæ, quantum abscedunt ab alterutra extremitatum, tantū ab
 earum dignitate uel deficiunt, uel accedunt. Quod porrò propter basim quoq; quam latam am-
 plamq; obⁱ quatuor illorū grandium uasorū initia esse oportuit, cor non exacte rotundū esse
 sit, etiam si nō dicatur, omnibus manifestū esse cōiunctio. Quāq; Natura interim cor sphæ- *Formæ cor-*
 ricæ figuræ iniurijs innoxie ferēdis omniū pertinacissimæ, & cæteris omnibus capaciōri, adeo *dis ratio.*
 accedere uoluit, ut cor in maximis ipsius dilatationibus prorsus sphæricū appareat, quæadmo-
 dum in ipsius contractionibus oblongū, & pineæ nucis modò productū cernitur. Neq; etiam
 ob aliud oblongū cor esse dicimus, quàm quod id in mortuis concidens, productūq; semper
 offenditur. Si enim id in mortuis ita distentū obseruaretur, quemadmodū in uiuis sectionibus
 id quoties dilatatur breuius quidem, sed latius fieri spectamus, tunc meritò non oblongū, sed
 rotundū, ac paulo minūs toto sphæricū esse censeremus. Quis autem cordis substantiæ sit usus, *Cordis substā-*
 in decimo Capite, quādo cordis cum musculo cōmunitatem, & rursus differentiā prosequēba- *tia usus.*
 mur, necessariò complexi sumus, præcipuē tum explicantes, cui potissimū muneri triplex fibra
 rum genus cordis substantiā intertexens, dein & caro has amplectens & suffulciēs, præficeren- *Coronalis ue-*
 tur. Cæterū^k uena cordis basim coronæ instar cingens, & ramos per externā cordis superfi- *nae usus.*
 ciem deorsum à basi exporrigens, cordis substantiæ nutrimentū suppeditat, argumētoq; est, cor-
 dis substantiā potius sanguine crassiore hac uena deducto, quàm tenuiori & leuiori & expur-
 gatori quem cordis uentriculi cōtinent, enutrirī. Neq; etiā hanc mihi sententiā quis disturba-
 ret, etiam si uenæ coronalis ramos nō penitus, sed ueluti superficietenus in cordis substantiam
 dispargi cōtenderet, quū tot innumeris musculis etiā uniuerso cordis corpore crassioribus ue-
 nas duntaxat ad extimā superficiē adnasci sciamus, pauciq; admodū in uniuerso corpore sint,
 qui in ipsorū uentres uenas penitus disseminari permittūt. Deinde nō oscitanter perpendendi
 ueniūt præcipui uenæ coronalis^l ramī, ex basi deorsum uersus mucronē descendētes, quorum
 unus anteriūs, alter posteriūs exporrigitur, uterq; secundū cordis uentriculū septi ductū pro-
 tensus, quasi cordis substantia his sedibus^m septi gratia plus alimēti requireret. Quod etiā testan-
 tur ramuli sinistro cordis lateri insigniores quàm dextro exporrecti. nam quāto substantia cor-
 dis ad sinistrū sinum crassior est, tanto etiā eius sedis ramuli tumidiore, frequētioreq; cernun-
 tur. Atq; hæc eò diligētius sunt examināda, quo magis scholastici disputatores suis nugis dis-
 ctionem interturbare assueti, sese excruciant, num uentriculus intestinaq; suo quem totius corpo-
 ris gratia cōficiunt succo, an uerò sanguine enutriātur: non expendentes, alia prorsus functione
 organū aliquod, puta uentriculū, intestina, uescas utraq; urinarios bilisq; meatus, uterū, ue-

*Coronaliū ar
teriū usus.*

*Cordis neruū
li usus.*

*Dextri cor
dis uentriculi
usus.*

*Vena caua o
rificij in cor
pertinentis
usus.*

*Arterialis
uena usus, &
ipsius constru
ctionis ratio.*

nas, arterias, & eius generis organa, sui ipsius corporis substantię nutritioni providere, & eam actionem cuius potissimum nomine cōdita sunt, obire. Parum quoq; animaduertunt, publicis illis attrahendi, retinendi, propellendiq; facultatibus fibras subseruire, priuatarū autē eorundē functionum (quas in ossibus, membranis, cute, & eius generis partibus fibris carētibus expendere licet) insitam duntaxat uim citra fibrarum subsidiū, autorem esse. Quinetiā huc accedunt cordis substantiā implicantesⁿ arteriæ, quas per cordis substantiam uenarum propaginibus concomitatas deferri retulimus. Hæ enim, etiam si cor instar communis officinæ caloris innati fons sit, eumq; imprimis contineat, cordis substantiæ offerūtur, eius insitum calorem temperaturæ. Porro quum hæc adamussim inquires, Galeni placito in septimo de Administrandis confectionibus libro neutiquam acquiescendū uenit, quo coronales uenas ex cordis dextro sinu pronasci docuit. illæ etenim extra sinum à caua^o enascuntur, supra trium uenæ cauæ orificij membranularum principium, adeo ut coronales uenas adiens sanguis à caua assumatur, priusquam hæc in cordis sinum sanguinem depromat. Cæterum^p neruulus cordis basi oblatus, tritantum duntaxat sensus gratia, non autem motus cordi largitur. Cordis cartilagineam, aut si uoles dicere osseam substantiā, uenæ arterialis & magnæ arteriæ^q origini additam, aut ex qua potius illa uasa originem ducunt, ad cordis fulcimentum facere, dissectionis professores arbitrantur: & quamuis etiam ea ipsa substantia, nullum prorsus cui insistat firmamentum habear, nisi forsitan quatuor cordis uasa cordis inuolucrum penetrantia, uerum illa non magis huic cartilagineæ substantiæ, quàm reliquæ cordis basi (si quid modò ad stabilitatē conducerent) firmamento essent. Porro cordis uentriculorū officium eiusmodi ferè est.^r dexter eo quod sanguinem præcipuè cōtinet, sanguinisq; elaborationi potissimum dedicatur, sanguineus Latinis iuxta ac Græcis nuncupatur. is nanq; pulmonis duntaxat gratia, à summo rerum Opifice insigni iustitia cordi insculptus est. Pulmo enim qui instar promptuarij cordi circumponitur, ut id ab illo aërem perpetuò allicere queat, rarus, fungosus, leuis, ac ad thoracis motus sequacissimus fieri debuit. neque eiusmodi profectò suis functionibus idoneo nutrimento ali potuit, nisi priuatim illi sanguis ex eo quem caua cōtinet leuis, aërius, spumosus, expurgatus, nihilq; minus quàm fæculentus, ab alio organo præpararetur, atque ita ipsi pulmoni ad opportunam nutritionem deduceretur. At nullum organū corde ipso calidissimo, & pulmoni proximo uiscere, ad id munus erat aptius: neq; etiam aliud omnino iustius pulmoni hac in re famulari poterat: quandoquidem nimis quàm ingratum cor habendum foret, si pulmoni tam amicè aërem, quo nisi illico concidere emoriq; uelit, perpetuò indiget, ipsius nomine attrahenti, ac obsequentissimi famuli ritu præparati, & illius potissimum gratia fabricato, nullas uices referendas putaret, ac non modis omnibus cor, ut gratiam reponeret, pulmoni opportunum alimentum (quum id citra incommodum possit) conficere, præparare que studeret. Pulmonis igitur occasione dexter cordis uentriculus creatus est, quod etiā liquidissimo animalia confirmant pulmone carentia, ac ob id dextro cordis uentriculo destituta. Hic nanq; uentriculus in animalibus quæ illo donantur, à^s caua uena quoties cor dilatatur, ac distenditur magnā sanguinis uim attrahit, quem adiuuantibus ad hoc uentriculi foueis excoquit, ac suo calore attenuans, leuioremq; & qui aptius impetu postmodū per arterias ferri possit, reddens, maxima portione per uentriculorum cordis septi poros in sinistrum uentriculum desudare sinit: reliquam autem eius sanguinis partem dum cor cōtrahitur arctaturq; per uenam arterialem in pulmonem deriuat, ac proinde cor in dextrum uentriculū sanguinem ex caua uena quoties dilatatur, pulmoni & sinistro cordis uentriculo attrahit: atque is quem in præsentia nouimus, uenæ cauæ in cordis uentriculum orificij est usus. Vena autem arterialis sanguine in pulmonem deferendo potissimum auxiliatur. Cur uerò hæc inter reliquas corporis uenas arteriæⁿ tunicas adipiscatur, in pulmonis sermone obiter expressimus, quum eam crassam ualidamq; factam esse diceremus, tum propter continuos pulmonis & cordis motus, tum etiam ne pulmo tenuis illius quem cōtinet sanguinis plus quàm ad nutritionē sufficere possit (etiam si quàm plurimo indigeat) sibi alliceret: dein ut pulmo, continuo ipsius motu & calore sanguinē in arteriali uena deductum sibi magis excoqueret, spumosioremq; redderet. qualis is iam profectò est, qui per arteriā uenalem ex sinistro cordis sinu pulmoni offertur, quum is iam in utroque cordis sinu elaboratus fuerit. Accedit huc, arterialem uenam organum soli nutritioni opportunissimè subsertuens, quodq; secundum pulmonis compressionem & dilatationē quiescere, atque quàm minimum moueri oportuit, magna Naturæ providentiā alijs corporis uenis impēsius rigidum, crassumq; & cōpressu dilatatuq; difficilius factū esse. Hac siquidē ratione uenæ arterialis propagines, arteriæ uenalis & asperæ distentionē & dilatationē haud impediūt: quum interim si illæ propagines sequaces essent, atque leui occasione distenderentur, magnam pulmonis amplitudinem illo dilatato implerent,

116 fig. D.
10 fig. E, F.
et fi. ca. 12
lib. 3 B, B.

07 fig. G.

p 6 fig. h.

q circa S, S
10 fig.

r Patet in 7
et 8 fig.

s 7 figura
C, C, C.

t 8 fig. C, D.

u 1 fi. ca. 15
lib. 3 B, C.

25 fig. B. 7
fig. F.

37 ut in u. fi
gura.

27 fig. K,
L, M.

28 fig. E,
F, G.

67 fi. N, N.

plerent, & rursus compresso pulmone subsiderent, magnamque uim in asperæ arteriæ propagi-
nibus ex pulmonis cōpressu fieri prohiberēt. Et sanè hinc dum de uasorum robore loquimur,
* dextræ cordis auriculæ usum petere poterimus. Quum enim cor ualido impetu distentū san-
guinem in dextrum ipsius sinum ex caua allicit, & quodāmodo rapiens eum absorbit, quumque
ipsa uena caua ut ex illa in alias corporis partes sanguis non ita, ac ille pulmonis tenuis gratia
nutritionis resudaret, non adeò crasso ualidoque, ac arteriæ constat corpore, periclitaretur profe-
ctò uena in ualida illa cordis attractione, ne rumperetur, nisi sagax Natura dextram cordis au-
riculam creasset, quæ ad cordis motus sequax, & sanguine plena, quum cor dilatatur, sanguinē
eum quem continet, in dextrum uentriculum diffundere posset, ipsaque quodāmodo in uen-
triculum attractionis impetum solutura conuolueretur, cordique instar promptuarij esset. Atque
huic usui auriculæ correspondet cuticularis constructio, quæ leuis & iniurijs interim perferen-
dis contumax, & ad cordis motus sequax est. caua autem uisitur, ut continere materiam possit:
& fibris cōstituitur, ut attractioni, retentioni & expulsionī subseruiat. Neque etiam carne, quæ
fibras illas amplectitur, destituta est. Verum quod cordis substantiæ ipsius auriculæ substan-
tia adeò conuenit, uidetur ostēdere, & innata sibi facultate ad sanguinis leuem quandam cor-
dis uentriculo præparationem conducere. Neque mehercule oscitanter, si quis indefessus Na-
turæ operum indagator fuerit, auricularum usus uenit expendendus. nam modò cōmemorati
usus nequaquam præcipui uidentur, quòd uel ex illarum motu corde penitus concidente, &
in uiuis sectionibus^v transuersim dissecto queas animaduertere, quoties in uiuo animante cor-
dis motu iam cessante, neque dilatatis cordis uentriculis, auriculas tamen adhuc palpitare, disten-
di que ac contrahi obseruas. Cæterum ne irrita cordis dum dilatatur in dextrum sinum sanguinis
ex caua uena fiat attractio, eodem scilicet rursus dum cor comprimeretur per idem orificiū Eu-
ripi ritu, propulso, tres membranulas cauæ orificio Natura præposuit, quæ quidem sangui-
nem dilatato corde in sinum ex caua influere sinunt. at compresso corde, ne idem in cauam re-
fluat, prohibent. Quum enim dexter cordis sinus distenditur, quod fit quoties breuior reddi-
tus in latitudinem insigniter proficit, tunc membranæ illæ laxiores factæ, ad uentriculi dextri
latera cōcidunt, ac sanguini recluso cauæ uenæ orificio aditum præbent. At uentriculo rursus
constricto, seu, ut in constrictione fit, longiore facto, & interim arctato, membranarum fibræ,
ipsæque membranæ propter cordis mucronem ab ipsius basi magis abscedentem tenduntur. &
quum uentriculi mucro in eum modum angustior efficitur, membranularum quoque fibræ mu-
croni uentriculi potissimum adnatæ, inuicem colliguntur, ac proinde etiam e regione centri ue-
næ cauæ orificij, suis extremis inuicem accedentes, orificium id occludunt, ac quo minus san-
guis rursus in cauam profluat, obstaculo sunt. Verum & ad hanc actionem, sanguis ipse à uen-
triculi lateribus compressus auxiliatur. is namque quum uenæ cauæ orificium petit, ad postero-
rem membranularum sedem impetu ruit, eas uersus orificij centrum comprimens, ut illæ ma-
gis inuicem conniueant, autor est, sibi que ipsi ne hac illi aditus detur, obstat, uenæ tunc arterialis
orificium accedens, quod quidem in cordis cōtractionibus patens sanguinem uersus pulmo-
nem transmittit, at quo minus idem rursus dilatato corde in dextrum sinum regurgitet, tres
membranæ arterialis uenæ orificio præfectæ cauent. Illæ etenim quia principium cum uenæ
arterialis origine ducunt, ac sursum tensæ, in uenæ cauitatem cessant, atque ad uenæ latera conci-
dunt, sanguinē in cordis contractionibus promptè in uenā fluere sinunt. at quum is rursus ob
cordis dilatationē ad uentriculū uacui fuga retractus, aut etiā in pulmonis cōpressionē uersus
uenæ arterialis caudicē protrusus ad cor impetu uergit, per uenæ latera descendens, inter uenę
corpus & posteriorē membranularum sedem cōcidit, spaciū quod inter corpus uenæ ac mem-
branas est, implens. Vnde etiā necessariò membranas deorsum protrudens ipsis, ut ad orificij
uenæ arterialis centrum inuicem cōniueant, orificiumque claudant, occasio est. adeò ut quanto
uehementius cor sua dilatatione sanguinē retrahit, ipseque pulmo inter expirandū comprimitur,
tanto exactius membranę uenæ orificiū obturantes, sanguinē in cor refluere prohibet: uerum
nō ita accuratè id præstāt, ut nihil prorsus sanguinis in primo retractionis impetu in cor rursus
defluat. Nam obstaculum, ne quid penitus regurgitaret, effingere, fuit impossibile. Cæterum
quum arterialis uenæ membranulæ nullum nisi à sanguine refluente impetum sustineant, quæ
autem uenæ cauæ orificio præficiuntur etiā secundum cordis motus^b fibrarum suarum quibus
dextri cordis uentriculi mucrone cōnascuntur interuētu, tensionē experiantur, haud mirum est,
has illis longè ualidiores à Natura pro creatas esse, atque huic cauę orificio auriculam propter
uehementem cordis attractionē præfici, siue hanc fabrorum follium aërem attrahentiū modo
cor moliatur, id enim cordi magis quàm cuius alijs inest: siue lucernarum flammæ oleū attrahen-
tis ritu, quippe hac uirtute cor quū innati caloris fomes existat, haud destituitur: siue rursus ut
magnes

Dextræ cor-
dis auriculæ u-
sus, & ipsius
cōstructionis
ratio.

Membranula-
rum cauæ ori-
ficij præfecta-
rum usus.

Membrana-
rum arterialis
uenæ orificij
ratio.

*Sinistri cor-
dis uentriculi
usus & constru-
ctionis ratio.*

*Cordis carnis
usus.*

*Venalis arte-
ria corporis
ratio.*

*Sinistra cor-
dis auricula
usus.*

*Membranula
rū uenalis ar-
teriae & ma-
gnae arteriae
usus.*

magnes familiaritate qualitatis ferrum trahit: quid namque familiarius est cordi ipso aëre, ad infri-
gationem & caloris natiui enutritionem: deinde etiam sanguine utilius & benignius nihil, ad
enutritionem ac spiritum uitalem restaurandum censetur. Sinister cordis uentriculus, quod
spiritum uitalem praecipue contineat, & cōficiat, aëremque amplectatur, dissectionis professori-
bus spirituosus aëreus ue nuncupatus est. Hic tanto^d crassioribus ex cordis substantia lateri-
bus quam dexter uentriculus, cōstituitur, quanto materia quam ipse inclusam seruat, leuior, ra-
riorque, & euaporatu promptior, uelociorque illa est, quam dextrū in se habere diximus. Eadem
enim est laterum horum uentriculorum in crassitie ob cōtentam in ipsis materiam ratio, quam
in uenae arteriaeque tunicis esse aliquādo cōmemorauimus. quanquam etiam fortassis humanae
machinae architectus, sinistrum cordis uentriculum crassioribus lateribus etiam cōstituerit, ut
ille laterum grauitate sanguinis in dextro uentriculo cōtenti copiam pensaret. Minus enim san-
guinis in sinistro uentriculo asseruatur, estque is plerunque tenuior & flauior, quanquā interim
quandoque e contrario crassior rigidiorque appareat, calidior uerò semper. Porro reliqua quae ad
huius uentriculi partium usus enarrationem requiri possint, ex dextri uentriculi enarratione
non importunè petentur. Quemadmodum enim dexter ex caua sanguinem trahit, ita quoque
sinister aërem ex pulmone in^c arteriam uenalem attractum, ad se dilatato corde allicit, illoque ad
caloris innati refrigerationem & substantiae ipsius enutritionē, spiritumque uitalem utitur, hunc
aërem excoquens & praeparans, ut is unā cum sanguine qui ex dextro uentriculo in sinistrum
per uentriculorum septum copiosius resudauit, in magnam arteriam, totumque adeo corpus de-
legari possit. Quod autem eiusmodi alterationibus, cordis caro insigni artificio à rerum con-
ditore ad iustitiam temperata praeficiatur, quoad diuinam hominis fabricam cognoscere possi-
mus, fatemur. Caeterum si quae fuliginosa recrementa ex hac aëris in sinistrum uentriculum di-
latato corde contracti emutatione, ipsoque innato calore producantur, ea rursus per arteriam ue-
nalem cōstricto corde in pulmonem excerni arbitramur. Atque ea potissimum arteriae uenalis
corporis est ratio. nam continuò indefesseque aërem ex^f asperae arteriae ramis, ipsoque adeo pul-
mone in se assumere debebat, & rursus suis motibus cordis rhythmis correspōdentibus, fuligi-
nosas eiusmodi reliquias in asperae arteriae ramos propellere: quod sanè difficulter admodum
fecisset, nisi corpus tenuius rariusque alijs arterijs nacta fuisset. Nam etsi haec eundē cum reliquis
partibus corporis usum praestēt, in quo haec cordi accōmoda censetur, nō tamen arteriae pro
ipsarum mole tantum aërem qui illis non per occultos meatus, sed per patētes in ipsis cauitates
à corde unā cum sanguine offeruntur, assumere, rursusque propellere, ac arteria uenalis debebat,
adeo sanè ut haec necessariò tenui & uenarum corpore confirmata sit. Quanquam natura inte-
rim adeo suae securitati atque possibile fuit, prouidit: quippe longum ex sinistro uentriculo ad
pulmonem ductum (qui ipsi nocuus fuisset) praecauens, statim in ipso ortu eam diuisit, atque bre-
uissimo prorsus ductu illam in pulmonem digessit, ut haec ilico pulmonis substantia undique
suffulta, implicitaque, à ruptionis periculo securior euaderet. Deinde & ex ipsius corporis tenui-
tate, quam Natura nisi illa maximè indiguisset, facile uitasset, alius usus accedit, pulmonis nutri-
tionis accommodus. nam haec arteria, ut reliquae totius corporis (praeter asperam) omnes, san-
guine tenui ac spirituofo oppleta, etiam pulmoni idoneum suppeditat sanguinem, id pulmoni
supplens, quod nimium seuera rigidaque arterialis uena ob corporis sui crassitiem, & sanguinē
quoque minus quam arteriae uenalis sanguis, leuem aëreumque, pulmoni denegabat. Porro^g sini-
stra cordis auricula uenosae arteriae adnata, idem prorsus officium huic & sinistro cordis sinui
praestat, quo uenae & dextro cordis uentriculo dextram auriculam usui esse diximus: & sinistra
auricula tanto minori cauitate donatur, quanto etiam arteriae uenalis orificium, cauae orificio
angustius uisitur. Deinde aër etiam ipso sanguine sequacior est, adeo ut & hac quoque occasione
sinistra auricula iure minor dextra creetur. Nam quum aër ita promptè attrahatur, nō tantum
periculum erat ex attractionis impetu (qui potissimum uacui fuga aërem trahit) uenosae arterie
corpus, ita atque cauae cōuelli. Quod autem sinistra auricula pro ipsius mole paulo carnosior
ac perinde etiam crassior & pinguior, & ad motum minus sequax quam dextra auricula cerna-
tur, argumento quoque est, ad quandam materierum praeparationem auriculas cordi famula-
ri, & auriculas ipsas proportionē quandam cum cordis sinibus fortiri. Porro ut auricularum
par usus est, ita etiam sinistri uentriculi membranulae usu penitus cum dextri uentriculi mem-
branulis conueniunt.^h Duae enim uenalis arteriae orificio commissae, ac introrsum in cordis
uentriculum deductae, corde quidem dilatato aërem ex uenali arteria in uentriculū ferri admit-
tunt, ipsarum fibris propter cordis mucronem uersus basim in dilatatione magis adductum la-
xatis, ipsisque membranulis ad uentriculi latera concidentibus. Quū autem cor constringitur,
obstaculo sunt, ne aër rursus in uenalem arteriam ruat, irritusque cordis labor efficiatur. quan-
quam

*c Patet in
9 & 10 fi-
guris.
d Pete id
ex 11. fig.*

*e 6 fi. G. 9
fig. C. C.*

*f 1 fig. cap.
38 lib. 1.*

*g 9 fig. F.
9 fig. 1.*

h 6 fi. E. F.

quam interim credamus has membranulas quum duæ duntaxat sint, suum orificium cui præfi-
ciuntur, non ita adamussim obturare, ut fuliginosis excrementis per uenalem arteriam exitum
in cordis constrictione præpediant. Quinetiam magnæ arteriæ orificium occupantes mem-
brang, ijs omnino functione respondent, quas in uenæ arterialis orificio haberi retulimus. Hæ
siquidem in cordis cōtractione spiritum uitalem unà cum sanguine, quem impetu ruere Plato
dicebat, in magnam arteriam profluere sinunt. at corde rursus dilatato, spirituq; ac sanguine
denuò ad uentriculum tracto, illius regurgitatione in uentriculum prohibent, sanguine nimi-
rum eas uersus magnæ arteriæ orificij centrū (ut in arteriali uena fieri nouimus) cōprimente.

Præsens itaq; liber constructione partium, quas Natura aëreæ substantiæ reficiendæ fabrefe-
cit, ut cunq; complexus est, quæ quum sui spiritus magnam portionem ad animalis spiritus in
cerebro generatione mittunt, opportunè quum iam eo usq; humani corporis harmoniā dedu-
ximus, sequenti libro cerebrum sensus ac motus arbitrij principij & rationis sedem, omniumq;
uiscerum in altissimo corporis locatum regem, aggrediemur. Priusquam tamen huic libro co-
lophonem adijciam, operæ precium fuerit hoc libro traditarum partium administrandæ sectio-
nis ratione eo ordine cōplecti, qua proximè præcedente libro, cibi potionisq; ac generationis
organorum sectionem docuimus.

CORDIS, PULMONVM, RELIQVORVM

que respirationi seruientium organorum administrandi ratio.

Caput XVI.



NATOMICAM hanc administratione in eo cadauere, quo superiori
libro descripta organa aggressus es, persequi conuenit. ita enim præsens
illi administrationi, & ei quæ in septimo tradetur libro accommodabi-
tur, ut in eodē corpore uniuersam humanarum partium fabricam in cada-
uerum penuria, alijs ostendere queas. Vt enim simul omnia in uno pri-
mum tua solius opera adamussim discas, impossibile arbitror. Præcedent-
is itaq; libri cōtinuata administratione, sustentaculum ceruici subiijcto,
cuius ope ea exporrigatur, caputq; in posteriora reclinatū pendeat. in quem usum quadrangu-
laribus illis fictilibusq; lapidibus uti consueui, eos secundum longitudinem tenuioribus suis la-
teribus mensæ innitētes ceruici supponēs, ac caput deprimēs. Deinde ut in secūdo libro docui,
faciē & uniuersam colli anteriore sedē cute nudo, ac primum faciei^a musculos, qui frōtis cutem
& palpebras, deinde qui genas, labra, & nariū alas mouent aggredior, nō præteriēs in altero la-
tere^b uenarum, arteriarū, & neruorū ramos. Quum itaq; ad eum quem præcepimus modū,
faciei musculos demonstraues, eos qui ossi^c imaginē referenti proprii sunt, ac qui à pectoris
osse in primā laryngis cartilaginē scuti assimilata feruntur, aggredieris. Deinde à pectoris osse
& clauiculis^d musculū liberabis brachiū pectori adducentē, insuper^e illum qui à clauicula pri-
mæ costæ inseritur. Ad hos, musculū quoq; scapulam pectori adducentem à costis separabis,
uenis, uti iā diximus, cū arterijs neruisq; obseruatis. aut musculos in uno latere duntaxat, in al-
tero uerò uenas, arterias & neruos expendes: quorū series si memoria exciderit, à tertio libro &
quarto uenit petēda. præsens enim locus in immēsum excresceret, si illā hīc quoq; ordine recen-
serem. Post hos à pectoris osse & clauiculis rescabunt, qui^f hinc ad mamillares capitis proces-
sus ascendūt, hac in omnibus obseruata ratione, ut singuli suis quibus inserunt ossibus integri
adhuc appensi seruētur, postmodumq; in ostendēdo reliquorū sui articuli musculorū numero
accōmodari possint. Quo nam autē artificio singuli sint scindēdi, quidq; in cuiusq; sectione pri-
uatim ueniat obseruandū, in secundo libro suis locis abundē sum persecutus. In præsentia à pe-
ctoris osse^g clauiculas acutiori cultello liberare contendes, robusta quibus illæ pectoris ossi col-
ligantur ligamēta diuidēs, ac interim accuratissimè cauēs, ne cultello altius iniecto, quæ huic ar-
ticulo sublunt uasā uulneres. Atq; hic^h cartilaginē examinabis, quæ clauiculā pectorisq; ossis
sinum, præter alias articularū cartilagines intercedit, & aliquò reponenda est, ut illa postmodū
in sceleti connexu (si uisum fuerit) uti queas. Liberatas autē clauiculas nitēris ui à pectoris osse
attollere, ac ab illo primaq; costa in exteriora reflectere. ita enim primæ thoracis costæ cartila-
go, quæ costæ ossi cōtinuatur, in conspectum ueniet: quæ cultro non admodum crasso ab osse
estⁱ liberāda, hīc quoque mente adhibita, ne culter profundius mergens, quicquam in iugulo
uitiet. Vbi primæ costæ dissecueris cartilaginē, deinceps ordine reliquas omnes à costis cultro,
aut si uoles nouacula dirimes, continuatā linea intercostales musculos ad thoracis usque capa-
citatem^j diuides. Liberatum nunc cum cartilaginibus à costarum ossibus pectoris os, nō nihil
eleuatum modò in dextrum, modò in sinistrum latus^k reflectendū est, & thoracem intersepien-

Quæ hoc li-
bro pertra-
ctata sint.

Musculorū
quorūdā et uas-
orum admini-
stratio.

Clauicularū
à pectoris osse
se liberatio.

Costarū car-
tilaginū cum
pectoris osse,
ab ipsarū ossi-
bus liberatio.
Membr. tho-
racis amplitu-
dinem interse-
piētū examē.

tes

a3 mus. ta.
A. C, D, E
F. G. r. &
4 tab. K.
M. N.
b fig. cap. 6
li. 3 Z.
c fi. ca. 12 li.
3 b, c, f, g.
d 2 fi. cap. 2
lib. 4 N, O,
X. & ra-
mi ab R, b,
c simul mi-
xtorum aut
4 mus. tab.
H, I. & 5
tab. G.
e 4 tab. R,
Q, S, T, V,
V.
f 4 ta. Pin
N.
g 1 tab. L. 3
tab. A.
h 4 tab. d.
i 5 tab. r.
k 4 tab. o.
ad Z.
l 4 ta. a ab
l, ut in dex-
tro latere 5
tabule su-
ctum est.
m Maior
pars 4 fig.
cap. 22 li. 1.
n Inter ela-
tissimum B
& A: fig.
ca. 19 li. 1.
o Ut factū
est in 8 mu-
scul. tab.
p Ut fit in 1
fig.

tes membranæ quæ pectoris ossi proximæ sunt, ueniunt unà cum cordis situ inspiciendæ.

^q Deinceps transuersa sectione ^r septum transuersum à pectoris osse ipsiq; adhuc commissis cartilaginibus adimi debet, & pectoris os sua mucronata cartilagine sursum attolli, sensimq; ab illo thoracem intersepientes membranæ diuelli. quod quum feceris, uersus cadaueris caput pectoris os reflectes, moxq; iuxta ^s glandium, uenam & arteriam utrinque sub ipso prorepentes retusiori cultello inter membranulas inquire. quas quum singulas uinculis interceperis, os pectoris cum ipsius simul uasis à thorace auferes, tunicæ costas succingentis speciem & intercostalium musculorum, qui inter cartilagines habentur, naturā perpendes. Aut musculis illis non aliter examinatis, os pectoris aliquantisper repones, dum thoracem mouentes musculos simul omnes post cordis administrationē ostendere uisum erit. Quò autem ea quæ in thorace aggredienda supersunt commodius commōstrarentur, consueui primū hamulo hinc inde costas succingentem membranam auellere, & manibus si alicubi pulmo illi fibris cohæreret, ab ipsa dirimere. Insuper pertuso costarum quopiam interuallo cui pulmo adnexus est, demonstrare soleo, quò nam pacto hominis thorax subinde pertundatur, non abolita interim respiratione, neque pulmonis motu quiescente. Mox diuisis intercostalibus musculis, costas ad mediam ferè ipsarum longitudinē frangere solitus sum: quod paruo sit negocio, si singulæ seorsum manu fortiter apprehensæ ui euertantur, inflectantur ue. Verū posteaquam facilem illam parandi sceleti rationem adinueni, ut ossa cadaueris illi compingendo subseruiant, costas integras referuari malim, & manibus simul omnes costas quantum licet extrorsum retorquere, & dein aliquousq; diuisis intercostalibus musculis, inuicem costas sensim dirimere. ita enim satis patens thoracis amplitudo efficitur, potissimū si secundū dorsi longitudinem, ac ad thoracis ferè medium, lapidem, aut globum aliquem subieceris, cuius ui dorsi gibbus extra thoracis amplitudinem prominēs, intro in thoracis amplitudinē ducatur, grandiusq; inter dextri sinistriq; lateris costas fiat interstitium. Hoc itaq; modo costis diductis, aut illo modo disruptis, pari semper ratione thoracis organa sunt aggredienda, ac primū à glandio ad septi transuersi nerueā sedem, ^x dextrum ipsius neruum à dextra thoracem intersepiente membrana cultello liberabis: deinde si uoles, sinistrum quoque. quem ubi simul cum ^y uena à iugulo pronata exporrigi uideris, illum iuxta septum rumpes, uersus ceruicem, ut postea ipsius uideas ^z originem, illum reiiciens. Mox membranas intersepientes cultello secundū thoracis longitudinem inuicem seiungens, atq; à cordis ^a inuolucro liberatas, ipsarumq; ad septum transuersum connexu, & uenarum arteriarumq; in ipsis serie perpensis, illas è thorace auferes. Id duntaxat præcauens, ne uas aliquod insignius lædatur. rami enim membranas irreptantes, & cordis inuolucro intertexti, etiam si diuidantur, uix notatu dignum aliquod sanguinis profluuium concitant. Iam tempestiuum est solis manibus cor cum suo inuolucro hinc inde mouere, quisq; ipsius situs formaq; inuolucris sint examinare: quanquam & ad id summopere conducit inspectio, quam modicè eleuato pectoris osse, cordeq; adhuc immoto membranarum intersepientium causa fieri uolui. Pulmonis quoque lobi manibus iam sunt contrectandi, ut & ipsorum numerus, situs, formaq; indagentur, ac tandem cognoscas, nullam pulmonis partem uenæ cauæ quæ ^b inter septum transuersum & cor cōstitit, in hominibus substerni: imò uenam simul citraq; interuallū, & septum & cordis inuolucrum penetrare, & quæ uena hac ducitur inuolucrum magna amplitudine hominum septo priuatim cōnasci. Atque hæc, quæ Galeni placitis penitus renituntur, & uerè paradoxa ex hominis haud mendaci libro deprompta sunt, neutiquam prætermittere conuenit, quin rabulas illos susurronesq; appelles, qui quum à sectione absunt, apud alios tam acriter se Galeni decreta tueri arbitrantur: inter secandum uerò & præsentī corpore prorsus, ac si quis linguam illis præscidisset, silent. Cæterū dum pulmonem obiter contemplatus fueris, inuolucrum cordis longa sectione ^d diuidetur, & liquor ipsi innatans spongia extergebitur, ac demum à cordis uasis inuolucrum refecabitur, adhibito studio ne ^e sinistri recurrentis nerui principium uitietur. Vt uerò cauæ uenæ per septum transuersum transitum, ac ipsius per thoracem ductum examines, sectionem septo ad uenæ usque caudicem induces, præcauens ne duorum cauæ uenæ ^f propaginum in illud excurrentium radices simul uulneres: dein sursum paulatim conscendens, qui ^g caua dextræ cordis auriculæ committatur, citra ullam sectionem obseruabis. Sic quoque supra cordis basim, à cauæ dextro latere ^h uenam sine coniuge nasci inuenies: cuius ramos ductumq; melius discas, si primū dextram pulmonis partem uersus sinistram latus eleuaueris, & postmodum sinistram in dextrum latus reuolueris. hæc nanque citra sectionem fiunt obuia: quanquam exempto corde & pulmonibus, illa adhuc licebit exactius intueri. Neq; sanè hæc obiter sunt spectanda, at grauius naturæ artificium in uenæ coniuge carentis ductu, principioq; indagandum est, diligenterq; obseruandum, num ut in agnis & por-

Nerui septi transuersi.

Cordis inuolucris examen.

Cauæ uenæ distributionis per thoracem & iugulum examen.

q Vt ex 1. fi. facias secundam.

r 1. fig. 1. l. 2. fi. R, R. et 7. mus. tab. A. s. iuxta F. 2. fi. requires B, C, D, E. t. Vt spectatur in 8. mus. tab.

u Ferè ut factum est in 1. & 2. fig.

x Sinister in 1. fig. P, P insignitur, in 3. aut fig. uterq; i. *y* 1. figura Q. Q. *z* 2. fi. ca. 11. lib. 4. n. a. b. c. m. *a* 3. fig. B, C, D, E, F, G.

b 5. fig. inter D & C.

c 3. fi. G, F.

d Vt factum est in 4. fig. *e* 6. fi. g. g. ductum ac.

f fi. ca. 6. li. 3. C. *g* 5. figura C ad B. *h* 5. fig. G. et fi. ca. 6. lib. 3. F.

i Hic sedulo circa H
specta figuram capi. 6
lib. 3.
h 2 fi. F.

l 6 fig. I.
m 6 fig. G.
n 6 fig. O.

o fi. ca. 9 in
serta li. 3. et
hic 6 fig.

p 6 fi. R. Q.
S, T, V, X.
q 6 fi. P &
figu. cap. 12
li. 3 i.

r 5 mus. tab.
P in N.

s 6 fig. a se-
cundum V.
t 2 fi. cap. 2
li. 4 h. dein
h, k.

u 6 figu. T.
x fi. ca. 9 li.

4 inserta
Pad E.

y 6 figur. b.

z fi. capiti

9 lib. 4. in-
serta Q.

Q.

a 6 figur. d.

b 6 fig. e.

c 6 fig. h.

d 6 fig. P.

e 6 fig. c.

f 6 fig. 8 & 8.

g 4. 15 fig.

lib. 5 T, V.

h Vt factu
est in 7 fig.

i 7 figu. K,
L, M.

k Vi Fin 7
fig.

k inuenteris, facile hac administratione cognoscentur. Deinde quum uenæ cauæ intueris orifi-

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cium,

cis aliquando occurrit uena quæpiã, in sinistrum latus porrigatur, iuxta cauæ ad cor cõnexum pronata. Porrò cauæ in iuguloⁱ distributio, retusiori cultello, quo incumbens illi^k glandium adimetur inquirenda est. neque sanè alio tibi utendum est artificio, quàm ut nostras ad manum habeas uenarum delineationes, mentemq; summa cura accommodes, ne uenam aliquã pertundas. Vbi uerò cauæ seriem adinueris, utraque iugularis & humeraria, prius tamen quantum poteris sanguinis in illis compresso, & deinde caua uena, ubi sine pari promit uenam, uinculis intercipientur, ac quicquid uenarum inter uincula consistet, è corpore adimetur, & deinceps abluto sanguine ilico ad arteriæ magnæ propagines neruosq; recurrentes adinueniendos sectio conuertetur. Corde itaque in manu assumpto, ^l uenæ arterialis, & ^m arteriæ uenalis, ipsiusq; ⁿ magnæ arteriæ radices, quæ cordis basi proximæ sunt, intueris: quod factu est facillimum, si cum ipsarum coloribus, tum situi mentem adhibueris. dextræ enim auriculæ uicina est arterialis uena, & albicans, ac quodammodo in sinistra proficiscens uisitur, ac inter cordis uasa elatior est. Arteria autem uenalis uenæ modo nigricat, & cæteris uasis demissior, propter sinistram auriculā latitat, neq; adeò longè ipsius progressus se offert. Magna autē arteria in cordis basis medio sub arteriali uena quodammodo occultata conspicitur. Hanc ubi primum intuitus fueris, ^o nostra neruorū recurrentium cum arterijs effigie sectioni adhibita, omnes magnæ arteriæ ramos inquireto, quorum ^p superiores ac iugulo proximi citra aliud opus iam erunt conspicui, nisi fortassis glandij aliquot reliquiæ adhuc supersint. ^q Truncus autem qui ad dorsum retorquetur, non nisi sinistra pulmonis parte in dextrū latus eleuata intuebitur. Cæterum ut recurrentes uideas neruos, postquam cōmunes laryngis musculos, ^r qui à pectoris ossis elatiori sede procedentes, infimæ scutum imitantis cartilaginis sedi implantantur, administraueris (si modo illos priusquam pectoris os adimeres, cum ossis ^s referentis musculis, non resecueris) sexti paris ^t neruum in latere primum dextro secundum soporariæ arteriæ longitudinem ab illa cultello sensim liberabis, ipsius ^u ramulum qui costarum radicibus exporrigitur, quum iuxta thoracem accesseris, & quos hîc musculus ex pectoris ossis summo enatis furculos deriuabat, perpendens. Simulatque uerò neruum ad ^x arteriam dextræ axillæ porrigendam deduxeris, tres quos ad illam reflectit furculos (nisi ^y duo aut unus tantū sit) quàm poteris studiose uicinis membranulis acutiori cultello liberabis: ne fortè retusiori, membranulas inter scindendum trahens furculos uioles. quanq̃ denuo acutus fortassis furculos simul cum membranis incautè resecabit. Inuentis furculorū principijs neruū asperæ arteriæ lateri exporrectum à sua cui nectitur membrana, ipsaq; aspera arteria liberabis, longa sectione inter neruum & asperam arteriam acuto quoque cultello facta. Liberatum hoc pacto neruum summis sinistrae manus digitis apprehensum modicè ab aspera arteria attolles: sexti uerò paris truncum quæ soporariæ arteriæ exporrigitur, dextra manu eleuabis, ac deinde mutuo nunc sursum nunc deorsum ductis manibus, nerui recurrentis reflexum naturamq; perquires. Ad eundem sanè modum ^a sinistram, sexti paris truncum à soporaria sinistra lateris dirimere conuenit, & ipsius furculos quos musculis à pectoris ossis elatiori sede enatis, & costarū radicibus exporrigit indagare, & postmodum ^b obseruatis quas pulmonis tunicæ deriuat propaginibus, & eo ^c furculo quem secundum uenæ arterialis trunci sinistrum latus cordis basi offert etiam accuratè perquisito, ad magnæ usq; arteriæ ^d truncum, qui ad dorsum reflectitur, sexti paris huius lateris neruus est deducendus, & acuto similiter cultello ^e soboles ^f recurrentē neruū hîc efformātes sunt adinueniēde. Hos ubi uideris, obtusiozem stylum sub eo arteriæ trunco uersus sinistrū asperæ arteriæ latus protrudes, & leuato nō nihil stylo, truncū arteriæ à dorso cui firmissimè cōmittitur, modicè dirimes. Deinde ab aspera arteria, neruū ad arteriæ magnæ usq; truncū liberabis, & utraq; manu ipsius reflexum, ut in dextro latere, ostendes. ^g Reliqua uerò sexti paris neruorū ad stomachum series, nō nisi exempto pulmone cōspicietur. nunc autem si uisum fuerit, foramine inter asperæ arteriæ cartilagine facta, illiq; fistula quapiã indita, & aspera arteria super foramen compressa, ^h pulmonem inflari curabis: inflatus siquidem suam formā manifestius commōstrat, corq; ex toto amplexatur. Demisso dein pulmone, cordi à dextræ auriculæ radice ad ipsius usq; mucronem, nouacula sectionem ⁱ induces, in dextrum ipsius uentriculū usque penetrantē. Mox ueniculo digitis distento, spōgia sanguinē semel atque iterum elues. Vena enim caua & arterialis uena, ut sanguis in uentriculū fluat, isq; postmodum spongia exugatur, comprimendæ sunt. Exterso sanguine dextri uentriculi amplitudo est indaganda: deinde stylo ^j tres membranæ ori uenæ cauæ præfectæ obiter ueniunt spectandæ. Vt uerò prorsus in conspectum ueniant, cultello ex dextro sinu in cauā uenam intruso, sectionem à uentriculo per auris corpus in uenam usq; duces: qua distenta, membranæ omnino uidebuntur, & auris cauitas, naturaq; si ipsam ^k inuenteris, facile hac administratione cognoscentur. Deinde quum uenæ cauæ intueris orifi-

Arteriæ magnæ per thoracem et iugulum & collum distributionis & neruorū recurrentium examen.

Pulmonis inflatio.

Dextri cordis uentriculi & ipsius orificiorū membranarūq; examen.

Ee cium,

cium, coronalis uenę¹ origo etiam apparebit: cui si stylum ex molli plumbo indideris, quo nam pacto cordis basim cingat, ramosq; in ipsius corporis superficiem deriuat, obseruabis. Hic uelim quoque ex uenę cauę amplitudine stylum in^m uenam coniuge destitutam inderes, ipsius à caua originem, ridiculamq; nostrorum Æsculapiorum rationem consideraturus, qui in octo utriusque lateris inferiorum costarum inflammatione, Hippocratem non mittendum esse sanguinem asseruisse affirmant, quod cor ex uena sine pari sanguinem adeò rapiat, ut nihil sanguinis missione ex uena hac educi possit. Quasi uerò nunc tibi secanti non longè esset clarissimum, cor in sanguinis missione, inflammatis octo inferioribus costarum interuallis nihil obstare, ac proinde sanguinem tunc quoque mittendum: & Hippocratem non adeò fuisse stupidum, ut octo humiliores costas sub septo transuerso esse arbitratus fuerit, & inflammationem huius sedis ad clauiculam usq; etiam tensionem producere ignorauerit. Verum hic sermo ne præter institutum ad meum de uena in laterali morbo secanda placitum longius expatietur, refrenandus uenit: quanquam meherculè nunquam magis hac de re sententiã quàm præsentibus uenis indagandam arbitrer, non autem citra uenarum cognitionem solis autorum distortis suffragiis eruendam. Porro simulatque coniuge carenti uenę stylum immiseris, oblongus crassusq; baculus cauę uenę est^m imponendus: quem quum absque negocio rectà per cauam ad inum usque uentrem protruseris, quàm bellè Galenus & cæteri dissectionis professores huc usque hallucinati sint, discas, qui cauam ex iecoris gibbo uno caudice enatam^o similiter ac magnam arteriam in duos trũcos, quorum hic inferiora, ille uerò superiora petit, diuidi censuerunt. Verum hæc quum iecur aggredieris, uisurus es explicatius, quanquam nihil prohibet, modò septum transuersum è corpore quantum poteris resecare, iecurq; in sinistrum latus adeò reflectere, ut posterior ipsius sedes in conspectum ueniat: ac ubi baculum à uenę cauę sede quã cor spectat ad eam usque regionem qua renibus uenę offeruntur, detrusum aliquandiu in uena seruaueris, animaduertesq; iecoris substantiam toti cauę posteriori sede non^p obduci, cultello secundum baculi longitudinem ducto cauam diuides, ac uenarum à caua iecori exportarumⁿ ora inuestigabis. Dein ijs qui nimium pertinaciter in Galeni Anatomes professorum primarij uerba iurauerunt appellatis, singula ipsius argumenta de uenarum ortu resumes, atq; studiosos ne ex commentarijs nauigare discant, hortaberis, unicam ueritatem, non uerò autoritatem, illosq; in cathedra gestus commendans. Porro sectione rursus ad cor conuersa, digito aut stylo in elatiori dextri sinus sede arterialis uenę orificium^r inquires, & illi intruso cultello, ex dextro uentriculo aliquousque in arterialem uenam sectionem duces. Qua facta, sanguineq; si quis erit eluto, uisui sese arterialis uenę orificium simul cum suis^s membranis offert: quas, ut exactiùs contempleris, stylo attolles, eodemq; arterialis uenę ductum in pulmones examinabis. Tunicę etiam ipsius ex quibus arteriæ instar conformatur, facillè uidentur, modò quis ductiã iam sectionis lateribus labris^{ue} animum adhibuerit. Sinistrum cordis sinum similiter longa sectione à sinistrae auris radice ad cordis usque mucronem facta aperies, & sanguinem perinde ac in dextro exterges. In hoc ipsius primùm intuebere amplitudinem, deinde cordis substantiæ in hac sedeⁿ crassitiem, postmodum stylo^x duas arteriæ uenalis orificio præpositas membranas facillè adinuenies, ac quæ inuicem in cordis constrictione conniueant, obseruabis. Ut uerò exactiùs se offerant, cultello uenalis arteriæ ori immisso, sectionē in ipsius usq; cauitatem^r molieris, ac ad aperto distentoq; ore membranas denuò contemplabere, plumbeo stylo uenalis arterię in pulmones primas distributiones inquirens. Magnæ autem arteriæ orificium, & membranę ipsi præfectæ inuenientur, si post^a alteram arterialis uenę membranam, quæ cordis sinuum septo uicinior est, digitum in elatissimam sinistri sinus regionem protruseris. is namque magnam subibit arteriam, & dein cultello secundum digitum in arteriæ orificium intruso, ex cordis sinu sectionem in arteriæ amplitudinem duces. Quando enim hanc tentaueris, & arteriæ magnæ^b membranas in ipsarum sede, quæ uasis corpori incumbunt, inspexeris: coronalium arteriarum^c ortus tibi occurret: adeò ut nunc nihil in corde spectandum tibi sit reliqui, nisi fortè illo uariè dissecto, ipsius substantiam & arterię magnæ arterialisq; uenę dissectis radicibus, os inquirere statueris, quod cordi priuatim ab Anatomes professoribus ascribitur. Si igitur nullum os præter cartilagineas dictorum modò uasorum radices adinueneris, illas à reliqua cordis substantia resecabis, ut simul cum cartilaginibus clauicularum articulationibus peculiare ad ossium compositionem reseruari recondiq; ualeant. Corde in hunc modum abiecto, asperam arteriam (seruata interim larynge) examinabis, primùm quidem ipsius cartilagineas & membranas, quibus illæ inuicem colligantur: & dein ipsius primam in pulmones seriem. qua inuenta, aliquam pulmonum fibram integrè à reliquis pulmonibus absecabis, ac in uenę arterialis ramum, & arteriæ uenalis & asperæ ramos stylum intrudes, & diuulsa pulmonis membrana horum ramorum

*Caua uenę
ortus examē.*

*Arterialis
uenę orificij
ac membrana
rum examen.*

*Sinistri cor-
dis sinus ipsi-
usq; uasorum
et membrana
rum examen.*

*Cartilaginea
cordis substā-
tiæ examen.*

*Aspera ar-
terid.
Pulmonis.*

17 fig. G.

m; fi. G. et
figu. cap. 6
lib. 3. F.

n In D 7 fi.
et figura
ca. 6 li. 3.
o Ut O in
P et R fi-
gura 6.

p Vti spe-
ctatur in
18 fig.

q Ut uidere
est in fig. 6
capiti lib. 3
inferia ad
A, B.

r Ex 7 figu-
ra facturus
octauam.

s 8 figura

E, F, G.

t 1 fi. ca. 15

li. 3 B, C.

u 9 figura
M, M.

x 9 fi. E, F.

y 9 figura

paraturus.

z 10 fig. A.

a Vbi in 9

figu. K lati

tat sub E.

b 10 fig. B,

C, D.

c 10 fi. E, E.

rum propagines, distributionisq; naturam inuestigabis. ad quod mirifice conduxerit undecunque rupta lobi illius membrana, ipsum inter duos asseres adeò comprimere, ut pulmonum substantia à suis quibus obnascitur uasis abscedat. Licebit modò aspera arteria ab ipsius capite diuisa, eaq; deorsum à stomacho tracta, pulmones omnino è thorace auferre, & stomachi^d progressum adinuenire, qui citra aliam sectionē pulmone reiecto, unà cum neruis sexti paris illum amplexatibus, cōspectui sese offeret. Tamen ut neruorū in uentriculi orificiū seriem intuearis, septum transuersum à stomacho liberandū est, ipsaq; insertio, si uentriculus adhuc in corpore asseruatus sit, indaganda. Insuper foramine alicubi in stomacho quā collum perreptat factio, fistulaq; illi indita, uentriculum quā poterit maximè inflari curabis, & deinde stomacho iuxta laryngis radicem diuiso, illum cum uentriculo, aut solum, si prius uentriculum ademeris, è corpore trahes, glandulis illis qui in medio ipsius ferè ductu plurimum consistunt, similiter examinatis. Iam quoque tempestiuū esset (nisi id prius præstitisses) iecur à septo transuerso secernere, ac tandē ex corporea uferre. quod ubi feceris, ipsiusq; formā diligēter contemplatus fueris, cultello uenæ cauæ iam flaccidæ indito, hanc lōga sectione aperies, ut exactē pateat ipsius per iecoris substantiam transitus, deinde ramorum à cauā in iecur ingressus. Vbi itaq; duo præcipua illorum uideris orificia, alteri stylū quā poteris penitissimè indes, & ablato uenæ portæ quo iam antea eam interceptisti uinculo, illius quoq; ramo secundū uenæ cauæ styli ductū in iecur procedenti alterum stylum immittes, & postmodum obtuso cultro iecoris substantiam ab illis ramis, qui stylos cōtinent, niteris abradere, ut uenarū per iecoris corpus seriē, ipsiusq; substantiam discas, ac demum inter duos qui stylis distenduntur ramos bilis uesiculæ meatulos obserues, & bilis uesiculam à iecoris corpore erasam inuertas, solamq; sedulò contempleris. Postremo^g uenæ ab umbilico in iecur deductæ ingressum, insertionemq; expendes, mente thoracis uertebrarum corporibus adhibita, ut cultello grandem arteriam secundū longitudinem aperias, ramorum quos utrinq; in costas spargit uisurus orificia. Deinde ramis illis disectis, arteriam ex corpore adimito, & uenæ coniuge carentisⁱ propagines expendito, ut & hanc quoque à uertebrarum corporibus liberes. Modò tibi in propatulo est sexti paris neruorum cerebri^k ramus, qui radicibus costarum exporrectus sub tunica costas succingente ad organa à peritonæo circumplexa cōtendit. Vt uerò^l neruulos cernas, quibus ramus ille adaugetur, à thoracis uertebris tunicam costas succingentē detrahes, ut costis pariter hac nudatis, quæ modò recensuimus conspiciantur. Cæterum ubi à costis tunicā thoracis cauitatem succingentem ita diuulseris, cultelli mucrone ad costæ os proximè adactō tunicam obseruabis, quæ priuatim singulis costis obuoluitur. eam dico, quam secundā costas succingentē tunicā nonnulli dissectionū periti nuncuparūt. Absolutis ad hūc modū omnibus quæ peritonæo & tunica costas succingente inuoluunt, si uisum fuerit, quā poteris aptissimè costas in suas sedes reponere conaberis, & osse pectoris quoq; cum cartilaginibus ipsi coarctatis assumpto, & clauiculis etiam in suam sedē repositis, quā licebit studiosissimè musculos eos quos iam antea ab insertionē pendere sinebas, suis locis situabis, primū dico thoracē mouentiū, primum brachij motuū opificem, scapulæ motorū^p primū, eum qui à pectoris osse & clauicula in mamillarē capitis processum fertur. Quod ubi præstiteris, ea prorsus serie quam in secūdo libro docuimus, omnes brachiū & scapulam mouētes musculos ex altero latere aggredieris: mox omnes qui thoracis motibus præsumt, & qui capitis ac dein dorſi motibus famulantur. postremo^r temporalem & masseterem. cubiti enim & brachialis, digitorumq; motibus subministrantes musculos licebit post cerebri anatomen dissecare. Neq; est quòd hīc prolixè commemoratos musculos seriatim ac sigillatim recenseam, quum id ita diffuse in secundo libro factum esse minimè ignores. Cæterum in altero cadaueris latere uasorum neruorumq; seriem licebit sedulò exquirere, quum id factū sit facillimum, si illorū descriptio te nō lateat, in musculorumq; sectione probè uersatus sis. quanq̃ & ego manus uasorum neruorumq; administrationē, ut puta paulò difficiliorem, etiam postea persequar. In præsentī autē os adeundum est. & quandoquidem iam faciei omnia extrinsecus persecutus es, ut id aperias necessum est. quod nulla ratione facturū es melius, quā robusto cultro infimæ maxillæ inferioris sedi sensim appposito, & postmodum huius, malleiq; opera maxillæ inferioris osse diuiso. Verū ad eum modum ossa quæ sceletō præparādo alioquin apta essent, propter fractam inferiorem maxillā uitias. & si illæsa maxilla illam in altero latere in suo ad temporis os articulo dissoluere conatus fueris, atq; ita illa in alterū latus reflexa, quæ in ore sunt administrare proposueris, sectionis claritati utcunque oberis. Quapropter diuiso, ad eum quem dixi modū, osse, primū fortioris cultri dorſo diuisioni imposito, illoq; postmodū obliquo, ossa inuicem modicè dirimes: ac deinde utroq; singulis manibus apprehēso, extrorsum deorsumq; ui torquebis, osq; aperies. Deinde è narium foraminibus obliquatum instar sypho

du spectatur
14. &
15 fig. lib. 5.

e 14, 15 fig.
lib. 5. F. F.

fiducluti ui
surus, quod
13. fi. lib. 5.
exprimitur
ad X, Y, Z.
g 2 fi. lib. 5.
F. G. 12 fig.
Mad N.
h fi. cap. 12
li. 3 k, k.
i fi. ca. 6 li.
3 G. G. ab F.
k 2 fig. ca. 2
li. 4. h.
leiusdem fi.
i, i, i.

m Eam par
tē quæ dex
træ manus
subijcitur &
musc. tab.
n 4. tabu. d.
o 3. tabu. Δ.
p 5. tabu. r.
q 4. tab. o.
r 4. tabu. r.
s 4. tabu. Δ.

t Vi factum
est in 6 mu
scul. tab.

Stomachi.

Iecoris.

Examē eorū
quæ uertebrarum
corporibus exporri
guntur.

Musculorū
brachium, sca
pulam, thora
cē, caput, dor
sumq; mouen
tium examen.

Tēporalis et
masseteris.

Oris apertio
organorūq; in
faucibus posi
torum examē.

nis stylum in oris usque amplitudinem protrudes, " gargareonis naturam examinās. Mox cultello à gargareonis radice ad incisivos usque dentes in oris tunica sectionem duces, eam cutis alicuius modo nonnihil ab incumbentibus organis liberans. In hoc opere tertium ^x nervorum cerebri par sese offeret, quia linguae & inferiori maxillae derivatur. dein ^y septimum cerebri nervorum par ^z sexto commissum, una cum ^a soporali arteria, ^b interiorique iugulari uena. & si aliquantulum ascenderis, ^c quartum quoque nervorum cerebri par, & ^d ramos quosdam tertii paris & quinti paris temporali exporrectos musculo uidebis, si modo unum organum ab alio sensim separare non piguerit. Ad hanc linguae musculi, uti in secundo docuimus libro, adinuenientur, in quorum administratione nervorum in linguam excurrentium propagines, ac uenae simul & arteriae sese offerent. Musculi etiam inferioris maxillae reconditi, hic paruo negotio occurrunt, ^f is uidelicet qui in ore delitescens cum temporali & massetere maxillam sursum ducit, & ^g is qui à processu stylum referenti enatus, ad summum mentum inferiori maxillae implantatur. Praeterea ^h tonsillae, ⁱ aliaeque glandes uasorum distributionibus in faucibus praefectae, tibi hanc administrationem molienti pulchre occurrent. Laryngis autem ^k musculi ita prorsus atque in secundo monuimus libro, sunt aggrediendi, ipsorumque nervi dum dissecantur, non perfunctorie ueniunt animaduertendi. Ablato itaque nunc una cum lingua osse ^v imaginem referente, laryngeque ac stomachi initio, inferiorem maxillam à superiori prorsus liberabis, non neglectis interim peculiaribus hic repositis ^l cartilaginibus, quas perinde ac cartilagines clauicularum cum pectoris osse articulos intercedentes, ad skeleti constructionem asseruare nihil prohibet. Atque ita etiam pari ratione os ^v imaginem referens, & laryngis nasi ^m alarum cartilagines ad eundem usum aliquò repones. Nunc palatitunicam, & eam quae nares succingit, ab osse sedulo in hoc abrades, ut mutuum earum tunicarum discas nexum. Si uero quum caput dorsumque mouentes musculos aggrediebaris, ⁿ primum dorsum agentium par ex sententia non spectaueris, id modo ablatis his quae fauces occupabant factum est facillimum, adeo ut & capitis dorsique motibus praefectos musculos tantisper integros asseruare nihil prohibeat, quousque inferiorem maxillam, eaque quae faucibus continentur, sectionis serie ademeris. Quanquam haec omnia ex secundo libro cuius obuia esse debeant, quemadmodum quoque ex primi libri calce discitur, quum costae à uertebis ad skeleti praeparationem sint auferendae, pectorisque os & cartilagines ipsi commissae, seruandae. Adeo ut nihil praepediat, in proposito cadauere à prima uertebra caluariam caput ue ipsum liberare, in illoque

quae sequens liber enarrabit condiscere. ad cuius finem omnia quae in nobis proposito cadauere adhuc uidentur sunt reliqua, commemorabo.

LIBRI SEXTI FINIS.


AN-

u 7 muscul.
tab. A.
x 2 fig. ca. 2
li. 4. S, T, Y.
y 2 fi. cap. 2
li. 4. v, w.
z eius. fi. c.
a fig. ca. 12
lib. 3. X, a.
b fig. cap. 6
lib. 3. S.
c 2 fig. ca. 2
lib. 4. Z.
d eiusd. fig.
Q, R, b, c.
e figura ca.
19 lib. 2.
f 6 muscul.
tab. D.
g sta. H, I.
h 6 tabu. F.
i 1 tabu. A.
k figura ca.
21 lib. 2.
l Figura in
serta capiti
10 lib. 1.
m 4 muscul.
tab. L.
n 8 muscul. ta.
A, B.

ANDREAE VESALII⁶⁰⁵ BRUXELLENSIS, DE HUMANI CORPO-

RIS FABRICA LIBER SEPTIMVS, CEREBRO ANI-
malis facultatis sedē & sensuum organis dedicatus, & mox in initio omnes
propemodum ipsius figuras, uti & duo proximē præceden-
tes libri, commonstrans.

PRIMA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.



PRIMÆ FIGVRÆ, EIVSDEMQUE CHARACTERVM INDEX.

PRIMA septimi libri figura humanū caput ita adaptatū exprimit, quemadmodum id cerebro ostendēdo opportunē à collo & inferiori maxilla dissectiōibus liberatur. Præterea tam caluariæ partē orbiculatim serra abstulimus, quanta quoq; omniū quæ in caluariæ cōtinen-
tur amplitudine uidendorū gratia, auferri solet. quanta uerò illa sit, liquidò dijudicabis, si septi-
mam figurā sexti capitis libri primi examinaueris, quæ hinc ablatā caluariæ partem interna su-
perficie exprimit. Quēadmodū itaq; præsens figura sectionis serie cæteras omnes inuicē ordine
succedentes præcedit, ita quoq; illā septimi libri figurarū primā non inopportunē inscribimus,
quæ durā cerebri cōmonstrat membranā adhuc illæsam, neq; aliqua ex parte pertusā, uulne-
ratā uē. quamuis interim ipsius membranæ uincula diuulsimus, quæ per capitis suturas ad mem-
branā efformandā porriguntur. quæ quod caluariā succingit, πρὸς τὴν κεφαλὴν nuncupabitur. atque
cum his fibrīs pariter uascula sunt effracta, quæ per caluariæ foraminula & suturas deducta,
ipsi duræ membranæ, ac illi quæ caluaria succingitur, communes censentur. Cæterū ex duobus
qui figurā ambire conspiciuntur orbibus, humiliorē, cutis & membranæ ipsi subditæ cōstituunt,
elator autem ipsa est caluaria. Vniuersum uerò hoc orbe complexū, durā cerebri membranā
refert, omnibus characteribus in figurā cōspicuis uniuersim semelq; indicatam. at singuli chara-
cteres in hunc modum priuatim habent.

A, A Dextrū duræ cerebri membranæ latus, seu eius mēbranæ pars dextrā cerebri regionē ambiēs.

B, B Sinistrum duræ cerebri membranæ latus.

C, C, C Tertius duræ membranæ sinus secundū capitis longitudinem exporrectus, & hic nulla ex

Ee 3 parte

partē adaperitū, uerū elatiorem ipsius costā uti naturaliter se habet integrā, & quartæ circuli partis modo extuberantem ostendens.

D, D, D Duo inuicem appositi ductus, uenarū modō in durā cerebri membranā secundū ipsius uniuersū latus excurrentes.

E Ductus duræ cerebri membranæ, in quem sexta caluariā ingrediens uena exhauritur.

F, F, F His characteribus uenulæ indicātur, à dura cerebri membrana per caluariæ foraminula ad capitis cutem, membranasq; caluariam succingentes, transmissæ, quarū frequentiores & crassiores iuxta **F** maximè latitantis sedem plerūq; obseruantur.

G, G, G Portiunculæ fibrarum à dura membrana per coronalem suturam ad caluariā succingentis membranæ constitutionem prosilientium.

H, H Portiunculæ fibrarum quibus sagittalis sutura uiam offert.

I, I Hi quoq; characteres in umbra occipitiij regionis latitāt, sedem notātes, à qua fibræ porriguntur per suturam **A** Græcorū similem, ad caluariæ inuolucri constitutionē deductæ.

K Vnum tuberculū eorū quæ inæqualibus caluariæ sinibus plerūq; iuxta sagittalis suturæ cū coronali coitū cōspicuis, adnasci solēt. Caput ex quo hanc primā depinximus figurā, tribus eius generis donabatur tuberibus, quorū unum **K** insigniuimus, & utrinq; ad **H** unū quoq; se offert.

L Cautas frontis ossi iuxta superciliorum sedem propria, quæ inter secundum subinde aperitur, si quando frontis os non procul à supercilijs serra diuiditur.

SECUNDA SEPTIMI LIBRI FIGURA.



SECUNDÆ FIGURÆ, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

PRÆSENS figura sectionis serie primam subsequens, tertium duræ membranæ sinum (quem prima figura **C** aliquot insignitum gerit) longa sectione secundū capitis longitudinem ducta adaperitum commonstrat. Insuper ad huius tertij sinus latera, per capitis quoq; longitudinem duas deduxi sectiones, utrinque nimirū ad sinum singulas, quæ durā membranā duntaxat penetrarunt, & duræ membranæ latera ab ea membranæ separarūt parte, quæ dextram cerebri partem à sinistra dirimit, atque in subsequēti figura tribus **D** insignietur. Præter tres iam cōmemoratas sectiones utrinque aliā quoque molitus sum, quæ ab aure ad uerticē pertingēs, solam

solā quoq; durā diuisit membranā, ut illa postmodū aptē à tenui membrana cerebri posset deduci, deorsumq; (ut hic factū cernis) reflecti. Occurrit itaq; hic tenuis cerebri mēbrana prorsus illaesa, cerebroq; proximē obducta, & uasorum ipsius seriem in haecenus denudata regione, eleganter commonstrans.

A, A, A Elatior sedes duræ membranæ, partis dextram & sinistram cerebri partes intercedentis, atq; hæc sedes *A* & *A* notata, tertij duræ membranæ sinus costā est caluariam cōtingens, & hic per medium dissecta.

B, B Tertij duræ membranæ sinus cavitās hic est in propatulo.

C, C Orificia, uasorumq; initia ex tertio duræ membranæ sinu in tenuem membranā pertinentia. atq; hic uasorū orificia in cōspicuo sunt, à læuo huius sinus latere in tenuis membranæ partē pertinentium, quæ sinistræ cerebri sedi obuoluitur. Orificia autem à dextro latere pronata, hic nō conspicuntur, uerū initia occurrūt uasorum in tenuem membranā, qua dextræ cerebri sedi obuoluitur.

D, D, D uoluitur propagatorū, ac *D, D, & D* insignitorum.


E, E & c. Tenuis membrana cerebrum inuestiens.

F, F, F Ductus, uasū ue in tenui membrana secundū cerebri inuolutionum seriem excurrentia.

G, G, G Propagines notātur à ductibus secundū duræ membranæ latera excurrētibus, atq; in prima figura aliquot *D* notatis, in tenuem membranā pertinentes.

H, H, H Duræ membranæ portiones à tenui membrana diuulsæ, & deorsum reflexæ.

TERTIA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.



TERTIAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

IN præsentī figura à tota cerebri parte supra sectionem cōsistente, quam orbiculatim serra in caluaria molimur, utranq; cerebri membranā, tenuem nimirum & duram auulsimus, ac duræ membranæ portione, dextrā cerebri partem à sinistra dirimentē, atq; in secūda figura adhuc in sua sede seruātā, ab osseo diuisimus septo, quo odoratus organorum sinus distinguūtur. atq; hanc partem, ut ipsius effigies in conspectū ueniret, super sinistrā cerebri sedē explicatā reliquimus, dextra & sinistra cerebri partibus adeo ab inuicē manūū beneficio diremptis, ut callosi corporis superior sedes elegāter se hic spectandam offerat.

- A, A, A* Dextra cerebri pars. *B, B, B* Sinistra cerebri pars.
C, C & cæt. Hic passim cerebri conuolutiones, gyri & anfractus indicantur.
D, D, D Duræ cerebri membranæ portio, dextram cerebri partem & sinistram intercedens, hic ex sua sede super sinistram cerebri partem producta.
E, E, E Quando primum dextram cerebri partem à sinistra inter dissecandum diducere contendimus, tunc manus ope ea uasa effringuntur, quæ ex tertio duræ membranæ sinu in tenuem membranam utrobique pertinent. ac proinde quum in huius figuræ administratione id quoque nobis faciendum fuerit, effracta eorum uasorum initia hic oculis subiiciuntur.
F Ductus uenæ modo in humiliorem sedem duræ membranæ partis excurrēs, quæ dextram cerebri partem à sinistra determinat, atque hic ductus à quarto duræ membranæ sinu anteriori sede enascitur.
G, G, G Ductus iam ante *F* insigniti per pagines in eadem duræ membranæ partem sursum aliquousque excurrētes.
H, H, H Surculi ab humiliori angulo tertij duræ membranæ sinu propagati, in duræ membranæ partem, qua dextra cerebri pars à sinistra dirimitur.
I, I Principia sunt ductuum, qui à quarto duræ membranæ sinu uenarum prorsus modo in tenuem cerebri membranam secundum superiorem callosi corporis regionem perferuntur, atque hic una cum tenui membrana auulsi sunt.
K Initium uasis à quarti sinu duræ membranæ termino pronati, atque sub eo cerebri corpore quod testudini seu cameræ instar arcus constructæ assimilamus, in tertium cerebri uentriculum, & dehinc ad plexus constitutionem excurrentis, quem secundis seu extimo foetus inuolucro comparamus.
L, L Cerebri callosum corpus.
M, M Sinus utrinque ad callosi corporis latera in cerebro conspicui, quos hic aliter quam modo præstitimus, exprimere nequimus, quum angusti sint, & angustiores rimas plurimum referant.
N Portio duræ membranæ partis, dextram cerebri sedem ac sinistram interuenientis, ac superius *D* aliquot insignita, quæ septo conuasebatur, olfactus organorum sinus dirimenti, ac octauum capitis ossis processui.
O, O Tenuis membranæ portio à cerebro diuulsa. *P, P* Duræ cerebri membranæ portio.

QVARTA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.



QVARTAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHA-
racterum Index.

IN quarta figura omnes duræ tenuisq; membranarū partes resecuimus, quæ in prioribus figuris occurrerunt, ac dein dextrā sinistramq; cerebri portionē sectionis serie ita ademimus, ut iam cerebri uentriculi in conspectū uenire incipiāt. Primum namq; secundum dextrū callosi corporis latus, ubi sinus altero M in tertia figura notatus cōsistit, longā duximus sectionē, quæ per dextrū cerebri uentriculū ducta, dextræ cerebri partis eam portionē abstulit, quæ supra sectionē habebatur, qua orbiculatim caluariā serra diuisimus. Atq; quum idem quoque in sinistro latere absoluimus, hic ad sinistrū latus sinistrā cerebri partē ita reposuimus, ut superiorē sinistri uentriculi sedem aliqua ex parte cōmonstraret, calloso interim corpore in capite adhuc seruato.

A, A, A Cerebri adhuc in caluaria relictī pars dextra.

B, B, B Pars sinistra.

C, C, C Portio cerebri sinistra, quæ sectionis serie à reliquo cerebro ablata, hic resupina iacet.

D, D, D Lineæ partim cerebri anfractus, et partim uariū cerebri substantiæ colorē cōmonstrantes, quicquid enim extra lineas consistit, quasi luteū & subcinericiū magis est: quicquid intra, ad a-

E, F. mussum album uisitur. quemadmodum E & F in dextra & sinistra cerebri parte luteum est: G, H. uerò & H album prorsus, & interdum rubris punctis interstinctum.

I, I Callosum corpus utrinq; à cerebri substantia, cui alioqui continuatur, liberum.

K, K Callosi corporis portiuncula, adhuc sinistræ cerebri parti quæ adempta est, continua.

L, L Dexter cerebri uentriculus.

M, M Sinister cerebri uentriculus.

N, N Sinistri uentriculi superioris sedis portio.

O, O Plexus cerebri ab imagine quā cum extimo fœtus in uolucro similem exigit, xogeadis nuncupatus.

P, P Aranearum modo graciles uenæ dextri & sinistri uentriculi substantiæ hoc in loco connatæ, ac ab illis diductæ uasis, quæ nuper commemoratū, & secundis nō absimilem plexum extruunt.


Q Venulæ à nuper quoq; cōmemoratis uasis in tenuē cerebri membranā sub callosi corporis anteriori sede huc excurrentes, & incerta serie (quemadmodum & P notatæ) inter resecandum se offerentes.

QVINTA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.

PRÆSENS figura quod ad relictam in caluaria cerebri portionē attinet, nulla ex parte uariat: atq; id solū habet proprium, quod callosum corpus hic anteriori sua sede à cerebro primum liberauimus, ac dein eleuatum in postiora refleximus, septum dextri ac sinistri uentriculorum diuellentes, & corporis instar testudinis extructi superiorem superficiem ob oculos ponētes.

Ab A A, A, A itaq; & B, B, B, ac dein D, D, D, & E & F, & G & H eadem hic indicant, quæ in quarta figura. Sic quoque & L, L, & M, M, & O & P & Q eadem insinuant.


R, R, R Notatur inferior callosi corporis superficies. est enim id à sua sede motum, atque in postiora reflexum.



S, T, V Supe-

- S, T, V* Superior corporis instar fornicis seu testudinis extructi superficies, & ueluti ipsius triangularis circumscriptio, quam ab *S* ad *T*, & à *T* ad *V*, & ab *V* ad *T* metimur.
- X, X* Dextrū uētriculū et sinistrū intercedētis septi inferior pars, corpori testudinē referēti cōtinua.
- Y, Y* Septi iam commemorati superior pars, calloso corpori continua. Hoc namq; septū nō secus atq; modò disruptū est, depingi licuit. & alia quoq; parata fuit figura, in qua duæ manus (uti inter secandum facere consueui) callosum corpus nondū in anteriori ipsius sede liberatum, modicè attollebant, quo speculum seu septum adhuc integrum oculis subijceretur. Verū quū nō adeò cōcinne in pictura atq; in ipsa sectione successit, eam figuram ne frustra paginā obliteraret, reieci.

SEXTA SEPTIMI LIBRI FIGURA



HÆC figura quòd ad cerebri portionem in caluaria relictam spectat, etiam quartæ correspondet. atq; à quinta in hoc differt, quod corpus testudinis modo fabricatum anteriori sua sede à cerebri substantia liberauerimus, id sursum in posteriora reflectētes, ut inferior ipsius superficies in conspectū ueniret, & uas illud etiam cerneret, quod à quarto duræ mēbranae sinu pronatū, sub corpore testudinis modo extructo fertur, & plexuum tandem nō minimā partem constituit, quos secundarū imagini ueteres assimilarunt.

Huius autem figuræ characteres ita ut sequitur, se habent.

- A, A* Corpus testudinis modo extructum hic inferiori ipsius superficie, qua tertij uentriculi superiorem constituit sedem, conspicuum.
- B, B* Portio corporis instar testudinis efformati in dextro uentriculo, à cerebri substantia hic principium ducens.
- C* Portio corporis testudinē forma & usu referentis, quæ ex sinistro cerebri uentriculo pronascit.
- D, D* Dexter cerebri uentriculus. *E, E* Cerebri sinister uentriculus.
- F* Arteria per inferiorem posterioremq; dextri uentriculi sedem à dextræ soporalis arteriæ ramo duram cerebri membranam perforante, huc in dextrum uentriculum conscendens.
- G* Arteria in sinistrum cerebri conscendens uentriculum.
- H* Vās à quarto duræ cerebri membranæ sinu principiū ducens, ac sub corpore instar testudinis efformato, in cōmunē dextri & sinistri uentriculorū cavitatē, seu terciū uentriculū properans.
- I* Vasis *H* insigniti in duas portiones diuisio.
- K* Vasis *H* insigniti diuisionis altera portio, dextrum cerebri petens uentriculum.
- L* Portio nuper commemorati uasis, sinistrum accedens cerebri uentriculum.
- M* Plexus dextri uentriculi à secundinarum imagine comparatus, atq; ab arteria *F* insignita, & uasis *H* indicati portione, quam *K* notauimus, constitutus.
- N* Plexus sinistrum cerebri uentriculum occupans, ac ex uasis *G* & *L* insinuatīs conflatus.

O, O Huius


O, O Huiusmodi uenulae cerebri substantiae hic obnascuntur, ab illis productae uasis quae K & L notauimus.

P A uenis quae cerebri substantiae hic offeruntur, ramusculi extra uentriculorum amplitudinem hanc ad tenuem cerebri membranam pertinent.

Q Meatus ex comuni concauitate dextri ac sinistri uentriculorum, seu à tertio cerebri uentriculo recta decliuis pertinens uersus peluim, quae cerebri pituitam excipiens, eam infundibuli modo ad glandem defert, eius infundibuli extremo subditam.

R, S Canales sinusue leuiter in uentriculorum substantia exsculpti, & pituitam ad meatus nuper Q insigniti orificium deducentes.

SEPTIMA SEPTIMI LIBRI.
FIGVRA.



SEPTIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

PRÆSENS figura à tribus proximè præcedentibus plurimum uariat. nam cerebri substantiae in illis relictæ, ea pars in hac ablata cernitur, quæ dextri sinistriq; uentriculorum sedem in illis figuris cõspiciam efformabat. dein tota ea quæ cerebello adhuc innitebatur, hic quoq; resecta est, ut duræ mēbranæ conspiceretur portio, cerebellū ac cerebrum intercedens. Insuper duræ membranæ sinus in illa consistentes ductis cultelli anterioris mucrone sectionibus, hic etiam aperuimus, & uas à quarto sinu duræ membranæ in cerebri uentriculos pertinēs, hic ex tertio cerebri uentriculo subleuatū, & à plexibus secundinæ similibus auulsum, in posteriora refleximus,

ut tertij cerebri uentriculi, seu communis dextri sinistriq; uentriculorum concauitatis sedes in conspectum melius ueniret, unâ cum eius cavitatis meatibus.

A, A Cerebri substantiæ adhuc in caluaria reliquæ dextra pars.

B, B Cerebri substantiæ adhuc in caluariæ asseruatæ sinistra pars.

C, C, C Lineæ hic passim conspicuæ illis correspondēt, quas tres modo præcedentes figuræ similiter cōmonstrarunt. Verum quia huiusmodi lineæ substantiæ ue cerebri diuersitas, inibi duntaxat consistunt ubi cerebrum tenui membranæ uicinius est, præcedentes figuræ eas solum in lateribus ostēderunt. hæc autem quum hic tanta cerebri portio ablata sit, ut iam apparens superficies in basi non procul à tenui membrana distet, etiam lineæ in basi spectantur. Quod itaque lineis hic inter

D, D cipitur, fuluam seu subpallidam cerebri notat substantiam: quemadmodum sedes *D, D, D* insignitæ. Quod uero extra lineas consistit, alba est prorsusq; candicans cerebri substantia, hic

E, E, E *E, E & E* insignita.

F Portio est soporalis arteriæ secundum humiliorem angustiorēq; dextri uentriculi sedem sursum ad plexus secundas imitantis constitutionem prorepens. Cæterum si perpenderis quānam sede hic *F* reponatur, & quānam in sexta figura, promptè expendes, quī dexter cerebri uentriculus, quemadmodum et sinister, ex posteriori sua sede instar cornu arctatus, deorsum in anteriora per cerebri substantiam ducatur. Hic namque ubi plus cerebri substantiæ quā in sexta figura abstulimus, præsens arteriæ portio *F* notata antrorsum magis uergit, quā *F* in sexta eādē quoque notans arteriæ portionem, ubi iam posteriorem uentriculi sedem conscendit. Atque id *F* & *G* subsequēntis figuræ magis liquidò ostendunt, in qua huius uentriculi ductus nomine, adhuc plus cerebri substantiæ, quā in hac quæ ordine septima est, abstuli.

G Arteriæ soporalis portio secundum humiliorem posterioremq; sinistri uentriculi sedem sursum, quemadmodum arteria *F* insignita, prorepens.

H Humillima sedes tertij uentriculi: quam ut aptius cerneretur, nonnihil distentam finximus.

I Meatus recta decliuus ex tertio cerebri uentriculo pertinens, cerebriq; pituitam ad peluim huic excipiendæ paratam deferens.

K Meatus ex tertio cerebri uentriculo inter cerebri testes natesq;, in cavitatem cerebelli et dorsalis medullæ communem pertinens.

L Glandula nuci pineæ non absimilis, & uasorum ex quarto sinu duræ membranæ cerebrum petentium fulcrum.

M, N Hanc cerebri partem testes & nates quoque cerebri appellauimus, hic adhuc tenui membrana obtectas.

O, O, etc. Duræ cerebri membranæ processus portio ue, inter cerebellum & cerebrum reposita. Qui hæc accedunt instar uenarum ductus, partim à primo secundoq; duræ membranæ sinibus, partim uero à quarto pronascuntur.

P, P Duræ cerebri membranæ dexter seu primus sinus.

Q, Q Duræ cerebri membranæ sinister seu secundus sinus.

R Primi & secundi duræ membranæ sinuum congressus, quem Græcorum nonnulli λανὸν, quod est torcular appellarunt.

S Principium tertij duræ membranæ sinus.

T Quartus duræ membranæ sinus, similiter atque alij hic adaperthus.

V Vas à quarto sinu duræ membranæ in cerebri uentriculos porrectum, hic autem in posteriora ex sua sede reflexum.

X, X Hac sede cerebellum dura cerebri membrana non obtectum ostenditur.

Y Ductus uenarum modo à quarto duræ cerebri membranæ sinu in tenuem membranam pertinentes, quæ cerebellum ipsiq; cerebri testes induuntur.

Z, Z Duræ membranæ sedes, qua ossi omnium totius corporis ossium durissimo, & auditus organum intus continenti adnascitur. Hanc namq; caluariæ regionem cerebro deteximus.



OCTAVAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARA-
cterum Index.

PRÆSENS figura à septima in hoc uariat, quòd hic adhuc cerebri plus resecueri-
mus, & testes longa sectione in hoc diuiserimus, ut meatus occurreret ex tertio uentriculo in
quartum pertinens. Ad hæc, duræ membranæ portio cerebello obducta, hic dissecta, atque in
posteriora reflexa cernitur. Quum itaque præsens figura pleraque cum septima habeat commu-
nia, in hac idem *A A*, & *BB*, & *CC*, & *DD*, & *EE*, & *F* & *G* & *H*, quod in
ad *H*. septima, indicabūt. Verum arteriæ *F* & *G* insignitæ, tanto magis hic quàm in septima an-
terius uergunt, quanto magis cerebrum uersus basim in septima quàm in sexta ablatum est.

I Meatus in sexta etiam figura *I* notatus, qui rectà decliuis fertur, atque cerebri pituitam ad pel-
uim defert.

K Meatus pituitæ deducendæ paratus, qui interdum ab illo deducitur meatu qui ex tertio uentri-
culo inter testes in quartum uentriculum pertinet.


L Ne *L* in umbra prorsus latitaret, aut si suo poneretur loco, & eius nomine quo in conspectu
esset umbra ueniret exsculpenda, itaque delineatio hic omninò uitanda, *L* ad anteriorem cere-
belli partem reposui, foramen meatumq; notaturus, qui ex tertio uentriculo cerebri in quartum
fertur. Quod foramen si *L* in illo locaretur, exprimi neutiquam potuisset.

M Glandulam hic adhuc reliquimus, quæ pineæ nucis formam ostendens, uasorum ex quarto duræ
membranæ sinu in cerebri uentriculos pertinentium fulcrum efficitur.

N, O, P, Q Quatuor his characteribus corpus id indicatur, quod ante sectionem unicum est, atque
in septima figura *M* & *N* insignitur. hic uerò ex sectionis serie diuisum occurrit. ac *N* &
O eius corporis sedes indicant, quibus testium nomen accommodatur. Puerò & *Q*, illas quas
nates ferè nuncupamus.

- R, R, R Cerebellum tenui adhuc obductum membrana.
 S, S, etc. Vasa uenarum modo tenuem cerebelli membranam implicantia.
 T, T Propagines uasorum tenuem cerebelli membranam implicantium, ad eas producta arterias, quæ secundum dextri & sinistri cerebri uentriculorū posteriora sursum cōscendunt plexus efformaturæ, quos extimo foetus inuolucro dissectionis proceres contulerunt.
 V, V Duræ membranæ portio, quæ superiorem cerebelli sedem à cerebro dirimebat.
 X, X Propagines notantur à uasis, dictam nuper duræ membranæ portionē implicantibus, in tenuem membranam qua cerebellum uestitur excurrentes.
 Z, Z Idem hic Z & Z notant, atque in septima figura, duram uidelicet cerebri membranam ossi adnatam, in quod auditus organum reponitur.

NONA SEPTIMI LIBRI FIGURA.



NONAE FIGURAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.


I N hac figura eadem cerebri portio, quæ in octaua seruatur. uerū præsens figura in faciem prorsus reposita, eam duræ membranæ partem abscissam habet, quæ cerebrum à cerebello dirimit. deinde cerebellum hic deorsum è sua caluariæ sede manibus protractum, ac deorsum modicè inuersum propendit, ut ipsius regio caluariæ aliàs contigua, oculis subijceretur, & dorsalis medullæ cavitās uideretur, alteram partem quarti uentriculi constituens. Ad hæc, præter uenarum quarundam & neruorum progressus, etiam primus & secundus duræ membranæ sinus hic aperti ad amussim exprimuntur.

- A, A Cerebri portio adhuc in caluariæ amplitudine reliqua, atque hic in sua sede adhuc asseruata.
 B, C, D Tribus his characteribus cerebellum deorsum ex sua sede reflexum indicatur, tenui membrana adhuc inuolutum, ac dorsali medullæ connatū. Verū B priuatim cerebelli dextram indicat sedem, caluariæ sinui P notando correspondentem. D uerò sinistram, quæ illi caluariæ sedi insidet,

insidet, cui *R* inscribam. *C* autem cerebelli media pars insignitur, uermi non absimilis, & suis finibus eos constituens processus, quos uermium imagini veteres compararunt.

- E* Posterior terminus mediae partis cerebelli, qui uermiformiū processū posterior mihi recēsebit.
F, G, H Dorsalis medullae pars adhuc in caluaria consistens, ac *F* & *G* huius partis seu dorsalis medullae sedes indicant, quibus cerebellum cōnascitur. *H* uero sedem dorsalis medullae significat, ē caluariae amplitudine procidentem.
I Sinus dorsalis medullae calami quo scribimus mucroni non absimilis, ac mediam cavitatem constituens communis uentriculi dorsalis medullae & cerebelli: quam quartum cerebri uentriculū dissectionis periti uocarunt.
K Vasa ductusue uenis quā simillimi, hāc in cerebellum ab illis uasis pertinentes, quae in primum & secundum durae membranae sinus exhauriuntur, atque ut hi ductus frequentes admodum sunt, ita etiam non semper pari propagantur serie.
L Et hāc quoq; ductus uenae similis in tenuem cerebelli membranam pertinet, ab illis uasis quae hac in parte duram cerebri membranam intertexunt.
M Quintum cerebri neruorum par.
N Sextum cerebri neruorum par.
O Septimum par neruorum cerebri, atq; hic uidere est quot surculis duo postrema cerebri neruorum paria principium à dorsali medulla, nequaquam uero à cerebello, ducant.
P, Q, R Sinus occipitis ossis, quibus correspondet cerebelli figura, nam *P* cerebello inscriptum, *B* congruit. *Q* autem, *C. R* uero, *D*.
S, S, S Dexter seu primus durae membranae sinus, hic cultelli mucrone adaperitus.
T, T, T Sinister seu secundus durae membranae sinus, atq; in nulla cerebri delineationum, horum sinum ductus ita conspicue ac in praesenti oculis subijcitur.

DECIMA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.



DECIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM INDEX.

H A C figura eam cerebri portionem expressimus, quae dorsalis medullae educit initium: dein cerebellum à dorsalis medullae hic conspicua parte ademptum est, & cerebri testes, & nates, et glans pineae nucis imaginem referens, ac postremo cavitates ea dorsalis medullae quae cum cerebelli cavitatem quartum cerebri efformat uentriculum, hic pariter exprimuntur.

- A, A* Cerebri pars dorsalem producat medullam.
B Meatus ex tertio cerebri uentriculo in quartum sub cerebri natibus tendens, cuius terminum in
C. quartum pertinentem uentriculum *C* insigniui.
D Glans cerebri, nucis pineae imagini à dissectionis professoribus assimilata.
E, F, G, H His characteribus cerebri testes ac nates indicantur. uidetur namq; dissectionis procures gratia lineae inter *E* ac *F*, et inter *G* et *H* cōspicuae, superiora tubera *E* & *G* insignita ab inferioribus *F* & *G* notatis distinxisse, ac superiora testes uocauisse, quod illis glans penis quasi modo incumbit. Inferiora autem nates uocarunt, quod meatus ex tertio uentriculo in quartum per-


inentis terminus *C* hic insignitus, podici conferri possit.

I, K Sedes duæ, quibus dorsalis medullæ initium cerebello adnascitur.

L, M, N, O Cavitas dorsalis medullæ initij, alteram partē quarti ventriculi constituens, atq; ab *He*rophilo calami cavitati assimilata, quam atramēto scribentes intingimus. Sedes enim *L* insignita eius calami cavitatis parti respondet, quæ indici scribentis proxima est. *M* autem & *N* angulis illis assimilari possunt, quæ in cavitatis calami lateribus consistunt. *O* uerò mucronem exprimit, quo characteres formamus.

P Dorsalis medulla hic præsecta est, quæ in uertebras procidens caluariam egreditur.

VNDECIMA SEPTIMI LIBRI FIGURA



VNDECIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM INDEX.

HAC figura cerebellum à caluaria, ipsaq; adeò dorsali medulla auulsum & supinum iacet, humiliorem ipsius sedem qua dorsalem spectat medullā cōmonstrans. Ac proinde regiones ipsius quibus dorsali medullæ continuatur, ac sinum insuper ostendit, qui alteram portionē efformat quarti ventriculi seu sinus, cerebello & dorsali medullæ communis. Porro ad humiliorem præsentis figuræ sedem fines pinximus mediæ partis cerebelli, ut processuum uermis imaginem referentium natura conspiceretur.

A Dextra cerebelli pars tenui membrana cerebellum inuestienti liberum, uti etiam totum cerebellum hic ea membrana denudatum commonstratur.

B Sinistra cerebelli pars.

C, c Media cerebelli pars. ac *C* notat huius partis anteriorem regionem, *c* uerò posteriorem.

D, d Fines terminiq; mediæ partis cerebelli: quorum anteriorem *D* indicat, posteriorem uerò *d*.

E Cerebelli sinus, qui cum dorsalis medullæ sinu quartum nobis appellatum cerebri uentriculum constituit.

G, G His sedibus cerebellum dorsali medullæ adnascitur.

H Anterior finis mediæ partis cerebelli hic, ac si ab alio cerebello is resectus esset, expressus.

I Posterior finis mediæ partis cerebelli, à cerebello quoq; exectus.



DVODECIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.

HAC figura caput à sinistro latere exprimitur, dextro nonnihil subleuato. Ex caluariae autem amplitudine cerebellum hic euulsimus, ea tantum cerebri relictà portione, quæ in octaua & nona figuris adhuc seruabatur. Verùm illa cerebri portio hic in sua non consistit sede, sed eleuata est, & in posteriora ab ipsa caluariae basi aliquousque reflexa, ut tandem in conspectum uenirent cerebri processus forma neruis non absimiles, et olfactus organo subministrantes: quorum sinister è sua sede cum ipso cerebro eleuatus est, dextro adhuc duræ cerebri membranæ quæ octauo capitis ossi obducitur, connexo.

A, A Cerebri pars dextra.

B, B Sinistra cerebri pars, tenui membrana adhuc quemadmodum & dextra pars obuoluta.

C Dextrum olfactus organum in sua sede adhuc seruatum.

D Sinistrum olfactus organum, unà cum cerebro in posteriora reflexum.

E Sinus, cui sinistrum olfactus incumbit organum. eaq; regio duræ membranæ hic indicatur, quæ odoratus nomine hac in sede multis, sed exiguis foraminibus peruiâ cernitur.

F Vena caluariam petentium sexta, hic in duram cerebri membranam aliquot surculis excurrents.

G Septum sinus olfactus organis incisus interdiuidens.

H Duræ cerebri membranæ partis portio, quæ dextram cerebri partem à sinistra dirimit.

I, I Cerebrum passim excauatæ sibi in caluaria amplitudini respondens, hic quoque ad frontis ossis regionem sibi insculptis cauernis congruit, & leuibus tuberibus prominet, quæ alij mamillares cerebri uocarunt processus.

K Vena caluariam petentium quinta, cui iter præbet foramen secundo neruorum pari exsculptum.

L L, ut & subsequentes characteres, in umbra occipitij cavitatis latitat, & parui etiam est mo-

M. menti. quandoquidem *L* caluariae sinum indicat, cui dextra cerebelli pars congruit. *M* sedem,

N. O. quæ mediam cerebelli partem respicit. *N* sinum, in quem sinistra cerebelli pars reponitur. *O* ue

P. Q. ro dextrum seu primum sinum indicat duræ membranæ. *P* autem tertium, *Q* secundum, seu sinistrum.



DECIMAE TERTIAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE
characterum Index.

H A E C figura occipitio prorsus innititur, & uniuerſa cerebri ſubſtantia quæ adhuc reliqua erat, in poſteriora deorſum deflexa pendet, ut olfactus organa, & uiſoriorum neruorum coitus, & maximi ſoporaliſ arteriæ rami in conſpectum uenirent.

A, A Dextra cerebri pars, adhuc tenui membrana cerebri obducta.

B, B Sinistra cerebri pars.

C, C Cerebri tubera, quæ à ſimilitudine quam cum papillis habent, mamillares cerebri proceſſus plerisque nuncupantur.

D, D Sinus olfactus organis parati.

E Septum olfactus organis paratos ſinus interdiuidens.

F, F Sinus caluariæ, quibus mamillares cerebri proceſſus *C* & *C* inſigniti congruunt.

G, G Vtrinque notatur uena caluariam ingredientium ſexta.

H Vena caluariam ingredientium quinta.

I Vas notatur uenæ correſpondens, in tenuem cerebri membranam ab illis uas excurrens, quæ in dura conſiſtunt membrana.

K Principium eorum ductuum qui per duræ membranæ latus excurrunt, perinde ac ſi uena eſſet arteriæ commiſſa. Atque hi ductus in prima figura multis *D* inſignuntur.

L, L Olfactus organa hic unâ cum cerebro à dura membrana deorſum diuulſa.

M Neruorum uiſoriorum coitus.

N Viſo.

N Visorius neruus dextrum oculum petens.

O Visorius neruus sinistrum petens oculum. & perinde ac dexter uenula cōcomitatus, ab illis propagata uasis, quæ tenuem cerebri membranam inibi contexunt.

P Soporalis arteriæ ramus duram cerebri membranam perforans, ad latus glandis cerebri pituitam excipientis.


Q Arteriæ *P* notatæ propago, dextrum accedens cerebri uentriculum.

R Arteriæ *P* notatæ propago hic in tenuem cerebri membranam surculos diffundens.

S Hic portio conspicitur peluis cerebri pituitam excipientis.

DECIMA QVARTA SEPTIMI LIBRI

FIGVRA.



DECIMAE QVARTAE FIGVRAE, EIVSDEM QV B
characterum Index.

CAPVT hic in sinistram aurem reclinatum iacet, internæ caluariæ amplitudinis basim exprimēs, dura cerebri membrana succinctam. Atque tanta duntaxat cerebri dorsalisq; medullæ adhuc asseruatur portio, quanta cerebri neruorum paribus uidendis sufficit. Visorium porro neruorum exortum coitumq; resecuri, ne peluis latēret cerebri pituitam excipiens.

A, A Modica cerebri portio unā cum dorsalis medullæ initio.


B, B Nerui uisorii ea parte hic tantum conspicui, qua caluariæ amplitudinem egrediuntur.

C, C Peluis cerebri pituitam excipiens.

D Hic in peluim pertinet meatus cerebri pituitam ex tertio uentriculo deducens, ac *I* in septima figura & octaua notatus.

- E* Dextra soporalis arteriae ramus, duram membranam ad latus dextrum glandis perforans, quae cerebri pituita excipitur.
- F* Sinistra soporalis arteriae ramus iuxta sinistrum latus dictae nuper glandis duram cerebri membranam perforans.
- G* Secundum cerebri neruorum par.
- H* Tertij paris neruorum cerebri gracilior radix.
- I* Tertij paris neruorum cerebri crassior radix.
- K* Quartum neruorum cerebri par, tertij paris crassiori radici conterminum.
- L* Minor radix quinti paris neruorum cerebri, omnibus ignorata Anatomes professoribus.
- M* Quintum neruorum cerebri par, seu maior quinti paris radix.
- N* Sexti paris neruorum cerebri principia ac surculi.
- O* Septimi paris neruorum cerebri principia ac surculi. Si quid in hac figura spectandum sit reliquum, id absque characterum opera prompte, uel ex proxime praecedentibus percipitur.

DECIMA QUINTA SEPTIMI LIBRI
FIGURA.



DECIMAE QUINTAE FIGURAE, EIVSDEMQUE CHARACTERUM Index.


PRÆSENT I figura portionem eam amplitudinis caluariæ dura cerebri membrana succinctam depinximus, quæ supra ossis cuneum imitantis medium habetur, unâ cum modò indicandis organis. Abs re namq; fuisset, integrum caput harum particularum gratia de lineasse.

- A, B* Neruorum uiseriorum portiones.
- C* Sinistri lateris arteria, quæ duram membranam hic perforans, partim in tenuem cerebri membranam, partim uerò in dextrum cerebri uentriculum digeritur.
- D* Dextri lateris arteria.
- E* Hic peluis collecta propendet, cerebri pituitam ex tertio defluentem uentriculo excipiens.
- F* Foramen, quo peluis huius infundibuli modò extructæ finis glandem petit, cerebri pituitam excipiens.
- G, G* Secundi paris neruorum cerebri portiones.

DE HVMANI CORPORIS FABRICÀ LIBER VII.
DECIMASEXTA SEPTIMI LIBRI
FIGVRA.

621


HAC figura nudam depinximus glandem, qua cerebri pituita excipitur, unâ cum pelui seu infundibulo pituitam huc deferentē, & hic flaccido propendente. *A* lateribus uerò arteriarum soporalium portiones, quæ reticularem plexum efformare dicuntur, ita hic expressimus, uti nobis inter secandum occurrere. Atq; ut eæ arteriarum portiones uariè se se-
cautibus offerunt, ita quoq; uariè eas delineauimus.




- A* Glans, cerebri pituitam excipiens.
B Peluis, seu infundibulum cerebri pituitam super modo dictam glandem deferens.
C, C Arteriarum portio, quæ secundum suorū in osse caluariæ foraminum ductū obliquè ferūtur.
D Sinistræ arteriæ ramus in duræ membranæ sinistrum latus excurrent.
E Arteriæ sinistræ portio per proprium foramen ad narium usq; amplitudinem pertingens.
F, F Hac sede diuersam arteriæ seriem delineauimus. ac dextrum quidem *F* arteriam notat ea serie ductam ut hic non dirimatur: quemadmodum sinistrum *F* arteriam hanc in duos ramos, qui mox in unum rursus coeunt, insinuat.
G Arteriarum portiones duram cerebri membranam perreptantes, ac partim in cerebri uentriculos, partim in tenuem membranam cerebri basi obductam digesti.
H Propago arteriæ per foramen secundi paris neruorum cerebri caluariam excidens, ac neruum uisorium, ac dein oculum petens.

DECIMASEPTIMA LIBRI SEPTIMI
FIGVRA.

- HAC* figura plexum finximus, cuiusmodi is esse deberet, qui Galeni in
A, B. libris de Vsu partium descriptionibus conueniret. Significet itaq; hic *A*
& *B* arterias caluariam subeuntes, moxq; in mirabilem illū plexum diffu-
C, D. sas. C uerò & *D* ramos in quos plexus illius propagines colligūtur, quiq;
illis prorsus arteriarum magnitudine respondent, quas *A* & *B* indicaui-
mus. Cæterum *E* glandem notat, pituitam cerebri excipientem.




PRÆSENTI figura arteriarum sub dura cerebri mēbra-
na cōsistentium, ac ad glandis cerebri pituitam admittentis latus reptan-
tium seriem depinximus, quam in ouium ac bonum capitibus obseruamus.
Atq; hanc proponere libuit, ne quis nos latere arbitraretur, quæ illorum
animalium hic cum homine sit differentia. Significat autem in hac figura
A dictam iam sæpius glandem, *B* & *C* arteriarum sedem, qua primum
in caluariam ingrediuntur.



DECIMAOCTAVA SEPTIMI LIBRI FIGVRA.

PARVA hac figura erectam finximus peluim, seu cyathum, quo cere-
bri pituita in glandem ipsi subditum distillat. ac dein hic finximus quatuor
ductus à glande pituitā per proxima glandi foramina deferētes. Indicet igi-
tur *A* glandem, cui pituita instillatur. *B* peluim, qua hæc ducitur. *C, D,*
E, F uerò, meatus ad faciliorem pituitæ huc decubentis egressum paratos.



Porrò præter has septimi libri figuras, ad earum potissimum cognitionem spectantes quæ in cal-
uariæ habentur amplitudine, etiam huc faciūt duæ figuræ mox ad finem primi Capitis libri quar-
ti additæ, & septem parium neruorum cerebri delineationem exprimētes: quas quum illic proli-
xè indicauerimus, abs re prorsus esset easdem hic quoq; reponere, et earū indicē ascribere. Præ-
terea figuræ oculi constructionem exprimentes, etiam si ad septimum referantur librum, tamen
Capiti decimoquarto duntaxat illas præponam, quod oculorum fabricæ dedicabitur. Atq; id in
illis figuris priuatim faciam, quod nulli alteri quàm dicto iam Capiti famulentur.

CE.

CEREBRUM GRATIA PRINCIPIS ANIMAE,

quemadmodum sensus quoque ac motus ex nostro arbitratu pendentis,
extructum esse. Caput I.

Quid quintus
liber et sextus
pertractarunt.



Septimi libri
argumentum.

Cerebri fun-
ctionū et par-
tium brevis e-
numeratio.

In lib. de Ve-
narum & Ar-
teriarū sectio-
ne.

cipis animae (cuius beneficio imaginamur, ratiocinamur, memoramus) fomes adhuc comme-
moranda supersit, praesens liber illi opportunè consecrabitur, cerebrum ipsiusque partes uniuer-
sas unā cum sensuum organis pertractaturus. Quemadmodum itaque cordis substantiae, vitalis
animae uis, ac propriae iecoris carni, naturalis animae facultas induntur, insuper ut iecur crassio-
rem sanguinem, ac qui perquam caliginosus est, naturalem spiritum, & cor item rursus san-
guinem impetu per corpus ruentem unā cum uitali spiritu conficiunt, & perinde atque haec ui-
lōcera per dedicatos sibi canales omnibus corporis partibus suas materias deriuant, ita quoque ce-
rebrum aptam ipsius muneri obtinens materiā, in proprijs sedibus, ac illius functioni appositē
subministrantibus instrumentis, animalem spiritum longè clarissimū tenuissimumque parat, quo
ad diuinas principis animae operationes partim utitur, partim autem ad sensuum motusque in-
strumenta per^a neruos tanquam per funiculos continuò distribuit, ea nunquam spiritu, qui
praecipuus eorum instrumentorū functionis autor censetur, destituens, non minus sanè quam
iecur & cor nullas corporis partes suis quas illis impertiunt materijs (tantisper dum ualeat ho-
mo) indigas relinquunt, etiam si non semper cum qualitate tum copia easdem diffundant. Ner-
ui igitur (quorum originē à cerebro pendere in quarto libro indicauimus) id cerebro praestant,
quod^b magna arteria cordi, & caua iecori, ut qui paratum à cerebro spiritum illis quibus hunc
mandari oportuit instrumentis deducant, diligentesque cerebri satellites & nuncij censeantur. Cae-
terum animali spiritui materiā suppetit uitalis spiritus, in arterijs numerosa serie ambas cerebri
membranas accedentibus abundans, & dein aër quem uersus cerebrum tum per foraminula
priuatim olfactus organi occasione in^d octauo caluariæ osse exsculpta, tum comprimis per ea
caluariæ^e foramina quae palatum spectant, inter spirandum attrahi multo antè diximus. Ac aër
quidem, qui dum inspiramus per angustissimos flexuososque & tortuosos ductus^f inter duram
cerebri membranam ac tenuem attrahitur, atque ob difficilem transitum extenuatur, cerebroque
aptissimus redditur, undecumque ubi aditum reperit, in cerebri^g dextrum &^h sinistrum, & horū
ⁱmedium uentriculos sese insinuat. Vitalis autem spiritus & si copiosissimus in^k omnibus tenuis
duraeque membranae uasis ductibus ue habeatur, attamen in dextrum & sinistrum cerebri uen-
triculos plurimus à praecipuis arteriarum^l ramis fertur, quas superius obliquo longoque ductu
contra Galeni placitum caluariam perforare, atque ad^m glandis cerebri pituitam excipientis late-
ra porrigi retulimus. Ab his namque arterijs, quas reticularē plexum Galenus efformare docuit,
non minimaeⁿ soboles tenuis membranae processibus suffultae, per humillimas dextri sinistrique
uentriculi sedes ingrediuntur, tandem secundum totum uentriculorum progressum in illorum
amplitudinem incedentes. Verum praeter has arterias, & quarto quem ego ita nunc cupaui du-
rae membranae sinu^p uas quoddam sub eo corpore quod testudinis camerae ue instar arcus extructe
imaginē refert, ac nobis cameratū appellatur, in anteriora cerebri per comunem dextri sinistrique
uentriculi cavitatem, seu potius tertium cerebri uentriculum contēdit. Hoc uas tandē in^q duos
ramos bipartitum, uno ad dextrum, altero ad sinistrum uentriculum diffunditur, & eius loci ar-
terijs commixtū, rete efformat, quod ab extimi foetus inuolucris imagine nomē inuenit. Ab aë-
re itaque in cerebrum ingresso, ac uitali illo spiritu ob frequentes sanè anfractus ad cerebri usus
magis magisque adaptato, in cerebri dextro sinistroque uentriculis, & ipsorum mutua concauitate
tertio ue

a 2 fi. ca. 2.
b 2, 3 fig.
ca. 11 lib. 4.
b fi. cap. 12
lib. 3.
c fig. cap. 6
lib. 3.
d 8 fi. ca. 6
li. 1 A, B, A.
e Passim cir-
ca M fig. 3
ca. 12 li. 1.
f 2 fi. inter
H, H, H &
E, E, E. aut
inter D, E,
G, H, K &
A, A, B, B fi-
gurae 13.
g 4, 5 figu-
L, L.
h 4, 5 figu-
M, M.
i 7 figu. H.
k Tota fig.
ca. 14 li. 3.
l 6 fi. C, C.
aut fi. cap.
14 li. 3 L.
m 16, 18 fi-
gura A.
n 14 fig. E,
F. aut 6, 7,
8 fig. F, G.
o 7 figu. T.
p 7 fig. V.
aut 6 figu.
H, I, sub A,
A, A.
q 6 figur. in
K, L.
r 6 fi. M, N.

57,8 fig. ab
H per Km
I fi. non. et
E fi. undeci
m.e.
t 10 fi. E, F,
G, H.
49 fig. H.

tertio ueniculo animalis spiritus à cerebri uirtute elaboratur, quam ab opportuno elementorum ad iustitiam cerebri substantiæ temperamento, pendere credimus. Porro huius spiritus animalis portio^s tertio cerebri uentriculo per oblongū meatum^t inter ea corpora cerebri quæ clunibus & testibus assimilabuntur porrectum, in cerebelli uentriculum fertur, quem partim cerebelli sinus, partim dorsalis medullæ cauitas efformant. Ab hoc uentriculo in["] dorsalem medullam, atq; ita in neruos ab illa propagatos, animalis spiritus non mediocris portio digeritur. A reliquis autem cerebri uentriculis, spiritum in neruos ab illis proximè principiū ducentes, ac sic in sensuum motusq; arbitrarij organa dispensari arbitramur, non admodum anxie disceptantes, num spiritus ille tenuissimus per aliquos neruorum meatus (ut uitalis per arterias) an secundum nerui corporis latera luminis modò ad columnam, dirigatur: an uerò neruorum duntaxat continuitate cerebri uis ad partes pertingat. Atq; hætenus sanè cerebri functiones in uiuorum animalium sectionibus admodū probabiliter & uerè quodammodo possum assequi. Sed quī in imaginatione, ratiocinatione, cogitatione, memoria (aut quomodocunq; aliter, nescio quorum dogmatibus acquiescens, principis animæ uires subdiuidere, aut enumerare uelis) cerebrum suo fungatur munere, haudquaquam ex sententia apprehendo. & si fortè accurato indefessoq; cerebri partium intuitu, ac deinceps ex reliquarum partium corporis, quarum usus uel leuiter in dissectione exercitatum haud latet, speculatione, qua similitudo indagaretur, uel probabile quid indipisci possem, id sanè citra sanctissimæ fidei labem neutiquam conficeretur. Quis enim, Deum immortalē, huius ætatis philosophorū, addam & theologorum uulgus nō admirabitur, qui tam ridiculè diuinæ ac summè admirabili hominis cerebri machinæ detrahentes, ex ipsorū somnijs in humanæ fabricæ cōditorem impijssimis, nō secus quàm si Promethei essent, nescio quam cerebri struem nugacissimè ementiūtur, eam quam incredibili prouidentia atque adeò eis quos corpori præstare debuit usibus affabrè immensus rerum Opifex effinxit, procul ab oculis arcentes, suamq; tot inartificiosis abundantem monstris præponentes, & parum (prò pudor) solliciti in quantam impietatem teneros quos instituunt animos temporis successu rapiunt, tunc uidelicet, quum illi præceptorum sectis non amplius addicti, & Naturæ operum discendi cognoscendiq; studio flagrant, proprijs manibus in homine cæterisq; animalibus, quæ ipsis fuere tradita, rimari, altiusq; expendere aggrediuntur. Nondū enim memoriæ excidit, me quum in Castrensi pædagogio Louanienſis gymnasij facile præcipuo ac laudatissimo, philosophiæ operam nauarem, in commentarijs quos præceptor noster professione theologus, ob idq; ad pias opiniones cum philosophorū miscendas inter reliquos eius Academicæ moderatores paratissimus, in Aristotelis libros de Anima prælegebat, scripsisse, cerebrum tribus donari uentriculis, atq; horum primum anteriorem, secundum medium, & tertium posteriorem esse, eosq; à situ ad hunc modum nomen obtinere, & à functione etiam aliter appellari. Siquidem primus seu anterior, qui frontem respicere dicebatur, sensus cōmunis uentriculus nuncupatus est, quòd ab hoc quinque sensuum nerui suis instrumētis deferri, & dein horum neruorum beneficio odores, colores, sapores, sonos, & tactiles qualitates in hunc uentriculum deduci, illi homines arbitrarentur. Ac proinde præcipuus primi uentriculi usus censebatur, ut obiecta quinque sensuum, quorum genus sensum communem uulgò uocamus, reciperet: atq; illa ad secundum uentriculum, qui meatu quodam primo neciebatur, transmitteret, quò secundus de eo obiecto imaginari, ratiocinari & cogitare possit. quippe uentriculo illi cogitatio seu ratio tribuebatur. Tertius autē uentriculus memoriæ erat sacer, in quem secundus omnia quæ ex obiectis illis, de quibus abūdè ratiocinatus esset, mādari uoluit, cōmodè deponebat. Atq; tertius uentriculus hæc prout humidior siccior ue erat, aut ocyus aut tardius sibi, uelut in ceram aut lapidem duriores insculpebat. Dein pro sculpturæ leuitate uel difficultate præsentem uentriculum quæ ipsi mandātur, aut breuiori, aut longiori temporis interuallo asseruare, commentaria illa docent. Neque profectò tertius iste uentriculus hæc sibi suoq; nomine, aut retinet, aut insculpit, sed secundi uentriculi gratia, nimirū ut quoties hic de aliquo memoriæ sinui credito, ratiocinari instituit, ille ocyus hoc quicquid est in secundum uentriculū deleget, ac ueluti in rationis officinā uersandū exporrigat. Cæterum ut singula quæ ita nos edocebamur, aptius assequeremur, tabula quædā ostendebatur nescio à qua philosophiæ Margarita deprompta, dictosq; iam uentriculos oculis subiiciens, quam nos discipuli prout scholasticæ picturæ quisq; erat studiosior, suis commentarijs expressius appingebamus. Neq; hac figura tres duntaxat uentriculos complecti nobis persuadebatur, uerum ipsam quoq; omnes simul capitis partes, nedum cerebri, ostendere arbitrabamur. Atq; hæc Opificis nostri solertiā in corporis humani fabrica nunq̃ inspicientiū sunt figmenta: qui quàm in cerebri cōstructione enarrāda aberrant, sequēs sermo ostendet, qui eadem methodo qua in duobus proximè præcedētib; libris usus sum, post perfunctoriam hanc cerebri descriptionem, ipsius partes seorsum singulas unā cum omni-

Thomas, Scoti, Alberti, & eius cohortis scriptorum de cerebri uentriculis opinio.

Brutorū cere
bri cōstructio
nē ab hominis
non differre.

omnibus sensus instrumētis explicabit. Quantū uerò impietatis imperitis, & nō adeò adhuc in sanctissima nostra fide obfirmatis animis, eiusmodi uentriculorū cerebri usuū (quod ad principis animæ uires spectat) descriptio conciliare possit, hi (etiā si ipse sileā) perpendunt, qui quādrupedum (quibus omnē rationis uim, ac præcipuē animam rationalem ex theologorū præcipuē placitis adimimus) cerebra, hominū cerebris quā proximē omni ex parte accedere didicerunt. Quandoquidē ouis, capræ, bouis, felis, simiæ, canis, & quas secui auiū cerebri cū humano cerebro in partiū cōformatione, ac potissimū in uentriculis, uix ulla prorsus occurrit differentia, nisi quod mole cerebra pro animalū qua donata uident ratione, certo uariare cognoscimus. Homini nanq̃ cerebrū obtigit maximū, mox simiæ, canis, ac eadē serie deinceps, prout animal quoduis ad rationis uim uiciniū accedere quibusdā argumētis colligimus. Neq̃ cerebrū homini tantū pro corporis ipsius portione grandius obtigit, imò id omniū animalū cerebris maius uisitur. Hominis nanq̃ cerebrum uel duobus equorū, boum, aut asinorū cerebris grandius apparet. Sed hæc omnia, ut & uentriculorū fabrica, ex sequētibus euadēt perspectissima.

DE DVRA CEREBRVM AMBIENTE

membrana, & sub cute caluariā succingente membranula. Caput II.

DVRA cerebri membrana in multis occurrit figuris. in prima enim externa ipsius proponitur sedes uniuerſa, quæ supra scissuram cōsistit, qua cerebrū ostensuri, caluariam diuidere solemus. Secunda uerò eam membranae partem interna commonſtrat sede, uti etiam nona, duodecima, decimatertia, internam sedem proponunt, qua caluariæ regionem succingit infra dictam nuper scissuram, cōsistentem. Cæterum processuum ipsius inter dextram & sinistram cerebri partes deductū, refert tertia figura ad D, D. Illum autem qui cerebello insternitur septima figura O, O, O. Atque in illis etiam figuris dura membranae occurrūt sinūs, uti optime figura capitis decimi quarti libri tertij. Porro membranā caluariæ exterioris obductā nullibi priuatim delineauimus, quum tenuis sit, ac ossi undiq̃ circundetur, atque ex ossis circumscriptione petenda ueniat.



Dura mēbra
nae situs, ac nu
merus, magni
tudo, forma.

VE M A D M O D V M sanē uniuerſam cauitatem qua nutritionis organa continentur, a peritonæo succingi recensuimus, atq̃ id instar sacci cuiusdā omnia illi imposita amplecti, & pariter quoq̃ costas succingentē tunicam omnia quæ in thorace collocātur, ambire cōmemorauimus, ita etiā uniuerſa caluariæ^b cauitas cerebro excipiendo adaptata, quadā subducitur^c membrana, quam propter crassitiem qua cæteris nō cerebri modò, uerū totius corporis præstat membranis, crassam, & ab insigni duritie duram, ut & cuticularem, nuncupamus. Hæc nō minū quā peritonæum & costas succingens membrana unica cōtinuāq̃ omnino uisitur, præterq̃ quod quibusdā^d foraminibus & sinibus uenarū modò extructis sit peruia. Vnde etiā ilico præsentis membranae sitū, & quod ad ipsius externā superficiē attinet formā, magnitudinēq̃, etiā si aliud nihil sermoni addidero, ossiū cognitio edocet. Quandoquidē nullū caluariæ os priuati alicuius usus gratia, in caluariæ amplitudinē extuberat, cui hæc mēbrana nō cedat, sed ab illo introrsum premi sinat. Rursus nullus in ea cauitate consistit sinus, quē hæc quoq̃ mēbrana nō impleat. atq̃ (ut semel dicā) omni ex parte ossibus proxima necit, alijs locis remissius, alijs uehementius, uti paulo post audies, cōnata. Atq̃ hinc etiā sit, externā durioris membranae superficiē propter ossiū sinūs, tuberaq̃ inæqualē, & deinde fibrarū quibus hæc ossibus cōmittitur occasione, asperā, aut nō adamussim læuē lubricamq̃ uideri. Ac præcipua ossiū tubera, quæ eā orbicularē sphaeræq̃ modò rotundā esse prohibēt, in capitis potissimū basi cōspiciunt. & horū quidē primū censeripotest^e osseū septū olfactus organorū sedē interdiuidēs: dein ea caluariæ extuberantia, quæ ut oculis in caluaria^f sedes cōmoda exsculperetur, in capitis amplitudinē iuxta illius basis anteriora ac septi illius latera extuberat. Præterea inæqualitas illa, quæ propter ossis cuneiformis crassitiē in qua ipsi propriæ cōsistunt^g cauernæ parandā, & aptā^h glandulae cerebri pituitæ excipiētis sedē insculpendā, in medio ferē amplitudinis caluariæ cernit. Deinceps alia duo insignia quoq̃ tubera in hac amplitudinē ideo pminēt, ut idoneā auditusⁱ organi sedē Natura fingeret. Postremò ea quoq̃^j eminētia iā dictis accedit, quæ in occipitijs ossē à posteriori parte foraminis spinalē medullā transmittētis rectā sursum ad mediū interualli porrigit, quod inter id foramen & futuræ Græcorū^k imaginē exprimētis eminentiorē sedē consistit. Atq̃ hæc capitis ossiū tubera q̃ minus dura mēbrana in ipsius basi instar oblongæ sphaeræ utrinq̃ ad anteriora leuiter depressæ appareat, in causa præcipuē censent. Alia uerò^l tubercula, quæ propria durae membranae uasa uenarū ac arteriarū ferē materiā continētia in exteriori ipsius superficie efformāt, nō adeò illius orbiculatim formā inturbant, E.

a 1, 2, 3. fi. li.
5 A, B, C, D.
b Hæc ostē
ditur simul
in 6 & 7 fi
guris cap. 6
lib. 1.
c 1 fig. A, A,
B, B. 2 figu.
H, H. deim
in tota cal
uariæ basi
in 14 fig.
d 1 fi. C, C,
C, D, D, E.
7 figu. P, P.
Q, Q. R, S.
T.
e 3 fig. cap.
12 lib. 1. n.
f Ad latera
m, n, x, L. fi.
gu. 3 capi
tis 12 lib. 1.
aut hīc ad
latera G, G
13 fig.
g Occurrit
hæc pluri
mis insigni
ta caracte
ribus 1 fig.
ca. 9 lib. 1.
h 8 fig. ca. 6
li. 1 C, D.
i 3 fi. cap. 12
lib. 1. M.
k 16 fig. A.
l Inter T, T,
R, a, i, A, A
fi. 3 ca. 12 li.
1. aut hīc 7,
8 fi. Z.
m figu. cap.
8 lib. 1.
n 3 fi. ca. 12
li. 1. ab e ad
h. aut hīc 9
fi. Q. 12 fi
gura M.
o 1 fig. C, C,
C, D, D, D.
E.

bant, seu quo minus rotunda uisatur, non magnopere obstant, quum hæc uenarū duntaxat ritu protuberent. Porro nullus in caluariæ amplitudine sinus (præter eos quos necessario nuper commemorata in basi capitis tubera constituunt) occurrit, quem Natura non exsculperit duræ membranæ uasorū gratia, ut scilicet sinus uasis cedant, ac citra compressionē ipsi locū dent, & ne duræ membranæ uasa ipsi membranæ damno sint, quo minus hæc ossi proxima apponi queat. Ex horū sinuum numero illæ cavitates sunt, quæ extuberans latus^q primi duræ mēbranæ sinus & secundū & tertij admittunt, deinde illi quoq; sinus, qui in caluariæ lateribus instar mediæ cavitatis uenarum multiplici serie exsculpuntur, & si quis alius eius generis in anteriori olfactus organorū sedis regione conspicitur. Cuiusmodi uerò hæc duræ membranæ uasa sint, ac unde principium ducāt, in tertio libro fidelissimè expressimus. Porro ut externā huius membranæ superficiē cognitu meherculè in capitis uulneribus perq; necessariam, sermone totam & diligenter perstringamus, nunc fibras ipsius, & ad caluariā connexū recensebo. Primum citra alterius corporis interuentum hæc undiq; ossi attigua est, parua omnino ipsius regione dempta, quæ super ossis cuneiformis^u mediū habetur, ubi dura mēbrana nonnihil ab ossē abscedit, substratam habens glandulā cerebri pituitā excipientē, et soporalium arteriarū maximas soboles, quæ reticularē plexū efformare alijs dissectionis professoribus falso creduntur. Omnibus partibus caluariæ quibus hæc membrana est attigua, in eum modū cōmittitur, ut duo inuicē accumbentes muscoli mutuò hæere connectiq; solent. Verum eo cōnexionis genere in capitis basi firmius q; in lateribus & uertice & fronte & occipitio affirmatur. Deinde uniuersis acutioribus ossium processibus pertinacissimè cōnascitur, perinde ac si ab ipsis originē duceret. Sunt uerò huius generis processus^x ossē illud septū olfactus organorū sedem distinguens, deinde illi qui ad^y latera foraminū^z uisorios neruos transmittentiū, & sinū glandi pituitā excipienti paratum consistunt, & qui iuxta^b foramen uisuntur quinti paris neruorū cerebri crassiorē^c radicē transmittens, & uniuersim omnes processus foraminaq; capitis amplitudinē respicientia. Pari quoq; ratione præsens membrana caluariæ futuris adnascitur, quanq; is connexus non æquè ualidus sit, atq; is quem ad ossēos processus perfici relatū est, quod ille instar simplicis tantum lineæ, nō autem notatu digna amplitudine huius modo accidat. At futuris non solum dura membrana connascitur, uerum tenues membraneasq; fibras inter illas uersus capitis exteriora transmittit, quæ caluariæ uertice inter dissecandum abstracta, in dura membrana simplicis lineæ ritu extuberant, asperamq; ipsius membranæ superficiē ostendunt, futurarū situm ac imaginē in ipsa etiam membrana tunc^d referentes. Cæterum præter fibras externā quoq; duræ membranæ superficiē minus æqualē reddunt^e tubercula quedā in uertice frequēter prominentia, ubi sagittalis futura coronali iungit. Hæc si quando adsunt, inæqualiter extuberant, & pares sibi in caluaria insculptos^f sinus obtinent, quibus pertinacissimè innascunt. Vnde etiā huius generis tubera nō obiter, neq; per transennā expendenda ueniūt, ne minus cauti in cauterij administratione & capitis uulneribus caluariā perforemus: etenim horū tuberū nulla ratione habita (quod in his locis & in futuris mēbrana ab ossē difficulter abscedat) eā unā cū ossē haud leui malo pertunderemus. Ad hæc, mēbranæ ad caluariā connexū, & exterioris ipsius superficiē asperitatē^g uenulæ quædā adaugēt, per caluariæ poros partim ex dura mēbrana ad caluariæ inuolucra, partim ab ipsis inuolucris ad durā mēbranā deductæ. Hoc itaq; modo dura mēbrana caluariæ cavitatē succingit, & omnibus ea cavitatē contentis obducitur organis. Verum præter hæc, dura membrana^h magnā sui portionē inter cerebrū ac cerebellum insinuat, quæ uniuersam cerebelli superiorem sedem integēs, cerebri regionē cerebello incumbētē ab illo interdiuidit. Quinetiā à mediā sede huius duræ mēbranæ portionis, ubi dextra cerebri pars sinistrā respicit, & secundū totāⁱ tertij duræ mēbranæ sinus longitudinē^k alia quoq; duræ mēbranæ portio processus^l ue educitur, secundū capitis longitudinē dextrā cerebri partē à sinistra dirimens. Hic processus falcis messoriæ imagini aliqua ex parte accedit: nam ipsius sedes illi duræ mēbranæ portioni cōtinua, quæ cerebellū integit, falcis basi correspondet. ea uerò quæ septo sinuū olfactus organorū cōnascit, falcis mucroni assimilari potest: is nanq; mēbranæ duræ processus à posteriori capitis sede antrosum ductus, sensim falcis ritu arctatur. Deinde processus huius pars tertio duræ membranæ sinui cōtinua falcis dorso nō absimilis secantibus occurrit, siquidē extrorsum curuatur, & tertij duræ mēbranæ sinus nomine crassior uisitur. Processus autem pars^m callosum cerebri respiciēs corpus intrò obliquatur, ac proinde falcis aciei forma accedit. Hæ mēbranæ portiones processusⁿ ue nihil omnino à reliquo ipsius corpore, nisi una duntaxat sede in crassitie duritiāq; uariāt. Nusq; enim membrana crassior secantibus obseruat, q; in illa parte qua cerebellū integit. Hæc nāq; ubi^o natibus cerebri proxima cernit, triplo ferè q; in reliqua sede crassior duriorq; euadit, adeo sanè, ut canes hoc loco os possideant superiorē cerebelli regionē integens, cerebrūq; ne id

Duræ mēbranae ad caluariam nexus.

membrana.

Duræ mēbranae processus.

Gg cerebellum

p3 fig. ca. 12
li. 1 h, h, i, i.
h, et eius. ca.
4 fi. l, l.
q9 fig. S, S.
r9 fi. T, T.
s1 fig. C, C.
C, C.
t3, 4 fi. ca.
12 fi. 1 T, T.

u3 fi. ca. 12
lib. 1 M. aut
circa F hic
fi. 15. cui sub
sternitur 10
ta 16 fig.

x3 fi. ca. 12
lib. 1 n.
yeiusdē fig.
y iuxta E.
z13 fi. N, O.
a3 fi. ca. 12
li. 1 M.

b eius. fig. 4.
c9, 14 figu
ra M.

d Confer 1
fig. G, G, G
H, H
I, I cum cal-
uariæ par-
tis primæ fi-
guræ subie-
ctæ r, r
e, o et Δ, Δ.
e. fi. K, et u
trinque ad
H iuxta G.
f in figura
primæ fig.
subiecta Ω,
Ω.
g1 fig. F, F.

h7 fi. O, O.
O, O. 8 figu-
ra V, V.
i1 fig. C, C.
C. 2 fi. B, B.
k3 fig. D, D.
D, D.

l12 fi. L, H.

m3 fi. L, L.

n7 figura
M, N.

Lib. 9. de Ad
nun. dissect.

cerebellum premat suffulciēs. Sed & neuter horū processuū seu partiū duplicatur (ut Galenus rem parum expendēs docuit) uerū simplex est, quemadmodū & ipsa membrana, quā cerebri lateribus aut caluariæ attenditur. Nam & si tertius duræ membranæ sinus cultello secundū longitudinem^o dissectus, primo intuitu membranæ^p processum inter utraq; cerebri partes intercedentem geminā, exq; duplicata membrana constare ostendit, id tamen sinus duntaxat gratia uisitur. Quantūuis namq; inferiorē sinus tertij angulū dirimere studueris, membranā extra sinus amplitudinem nunq; in duas subdivides. Atq; par ratio eius^q partis duræ membranæ censetur, quæ elatiorē cerebelli sedem obueat. Deinde si infimus ille duræ membranæ sinuū angulus duplicationē argueret, idem sanē in duobus reliquis sinuum angulis accideret, ac non perperā cerebri duram membranam duplicem esse assereres, quacūq; parte caluariā contingit. Insuper horum duræ membranæ processuum superficies specie cum reliqua interiori membranæ superficie congruit, qua uix inter omnes corporis superficies aliā magis splendidā lauem ue, & (quod non obiter expendendum uenit) omni adipe, quemadmodum quæ in caluariæ consistunt amplitudine omnia, destitutam reperiās. Quinetiam interior hęc superficies aqueo humore longē magis quā exterior perfunditur, & multo candidior apparet: & quum fibris omnibus quibus alteri parti adnasceret, uacet, impensius lubrica tersaq; quā exterior superficies conspicitur. Porro quemadmodum exterior superficies os caluariæ undiq; respicit, ita & interior tenuē cerebri spectat membranam, cui nullius corporis interuentu, quā ductuum instar uenarum ab ipso in tenuem membranam pronatorum ope adhæret committitur ue. Quandoquidem si dura membrana parī modo tenui membranæ, ipsiq; adeo cerebro, ut caluariæ connasceret, quo minus tenuis membranæ uasa, & ipsum adeo cerebrum distendi contrahi q; possint, illa impedimento foret. quod præcauēs Natura, ampliorem duræ membranæ cavitatem ipsa cerebri mole, nō secus atq; cordis^s inuolucrū corde etiam ipso amplius uisitur, produxit. Quanquam interim duram membranam à tenui non ita liberauerit, ut cordis inuolucrum à corde, quod illi ne unius quidem fibræ interuentu connascitur, quum tamen innumeros uenarum instar ductus dura membrana tenui membranæ exporrigat, mirabili industria horum beneficio illam si bi affirmās. Vt simul ductus illi uenæ arteriæq; & postmodum uin culi uices gerant, ut cerebrū ne concidat commodē subleuetur, interim uasorum tenuis membranæ & ipsius cerebri motibus non præpeditis. Atq; hoc singulare Naturæ mysterium ipse leui negotio colligis, si modō uasorum cerebri series, quam tertio libro docui, ex animo nō exciderit. eam dico numerosam ramorum sobolem, à tertio duræ membranæ sinu utrinq; secundū totam cerebri longitudinem, in dextræ partis cerebri & item sinistræ tenuem membranam procurrentem. Hęc namq; superiorem cerebri partem duræ membranæ admodum ualidē appensam reddit, & dura membrana caluariæ connata, & propter^u fibras quas per suturas diffundit à caluaria abscedere prohibita, cerebrum quo minus in se delabatur, subleuat. atq; quum nulla alia ex parte dura membrana tenui (nisi forsitan hīc atque illic rarīs hīdemq; per quā laxiss^x ductibus) commissā est, liberum cerebri & uasorum tenuis membranæ motum non obtundit. Cæterum præsens sermo nunc sanē exigeret, ut sinuum uasorumq; duræ membranæ numerum, situm & naturam explicarem, at quum id pro uiribus in tertio libro tentatū sit, non abs re chartis hīc pepercero.

Duræ mēbra
ne cum tenui
connexus.

Duræ cerebri
membranæ
uasa.

Foramina.

Duræ mēbra
ne usus, & cō
structionis ra
tio.

Pari quoque ratione duræ membranæ foramina ex proposito neūquam enarranda putauerim, quod prolixior foret oratio, aliud nihil propemodum complexura, quā caluariæ foraminum in caluariæ amplitudinem qua cerebrum continetur pertinentiū catalogū, in primo libro iam pridem cōmemoratum. Vbicunq; enim in caluariæ dicta amplitudine uisuntur foramina, ibidem & dura quoq; membrana ferē peruia est, sui processus perpetuō exporrigens, illis qui à cerebro principium ducunt neruis, & ipsi etiam dorsali medullæ inuolucris modo obductos. Ac proinde tot primū foraminibus dura cerebri mēbrana donatur, quot neruorū paria à cerebro initiū ducūt. Nam & si^u idē quarto pari & crassiori tertij paris radici foramē insinuatū sit, gracilior tamē tertij paris radix, priusq; secundi paris^b neruū contingat, priuatim durā mēbrana perforat. Septē his utrinq; positis foraminibus, aliud ab utroq; latere accedit, quod^d neruulū transmittit, quem ego non procul à quinti paris radice pronatū obseruauī. Ad hęc, dura membrana^u unico eodemq; inconiugato & orbiculari ueroq; foramine pertunditur, quod infundibulo cerebri pituitam excipienti uiam præbet. Dein iuxta huius foraminis latera^f aliud utrinque spectatur foramen, maximum arteriarum cerebrum petentium ramum transmittens. Postremò^g multis foraminulis ad olfactus organorum sedem dura cerebri membrana abundat. Porro præsentis membranæ^h sinus, qui uenas arteriasq; caluariam subintrantes exhauriunt, neque etiam ductus ex his sinibus in tenuem membranam instar uenarum propagatos, in foraminū numero habemus. Atqui inter primarios duræ membranæ usus non minimus censetur,

o Ut in 2 fi.
B, B.
p 3 figura
D, D.
q 7 fig. O,
O, O.

r 2 fi. D, D.
G, G 8 fig. u
r 4 X, X.

s 4 fi. lib. 6
B, B.

t 2 fig. C, C.
C & D, D.
D.

u 1 fi. G, G.
G, H, H, I, I.

x 2 fi. G, G.
8 fi. X, X.

y In figura
ca. 12 lib. 1.
z Quo edis
citur Ket I
fig. 14.

a 14 fig. H.
b 14 fig. G.
d 14 fig. L.
non procul
ab M.

c 15 fi. ad F
uā præbēs
E.

f 15 fi. fora
mina hæc
transmittūt
C & D.

g Ad E 12
fig. & 13 fi.
D, D.

h 1 fi. C, C.
D, D. 7 fig.
P, Q, R, S,
T.

ut

i fig. 14 ca.
li. 3 in alte-
ro latere u.
u. alioquin
absorbetur
C, D, E, K,
F, r, G, H.

ut aptis quibusdam sinibus omnes caluariā petētes uenas, omnesq; (si duos modò ramos dem-
pseris) arterias excipiat, ipsarumq; materiā in suos sinus assumat, eam ita deducētes, ut hæc
propaginibus uenis similibus, atq; ab illis sinibus depromptis in tenuem membranā cōmodis-
simè deferatur, & dura membrana ipsi tenui membranæ & cerebro instar lagenæ fiat, ex qua te-
nuis membrana, & dein cerebrum materiā ad opportunos usus sibi alliciant, in uenis & arte-
rijs uersus caput transmissam. Cæterum propagines à tertio duræ membranæ sinu utrinq; in-
numera serie in sedem tenuis membranæ sibi proximam deriuatæ, cerebrum uelut suprà innui-
mus, suspensum, atq; ne deorsum concidat, uentriculiq; ipsius comprimantur, opportunissimè
sustinent, ut dura cerebri membrana pariter ipsius inuolucrum et fulcrum reddatur. Ad quod
rursus summopere conducunt fibræ per futuras à dura membrana prorepentes, quæ duram ce-
rebri membranā (quæ alioquin non satis durissimo ossi connasci poterat) caluariæ firmant,
atq; quo minus cerebri grauitate tracta, deorsum labatur, in causa sunt. Neque id sanè prestitis-
sent, nisi peculiare artificium extra caluariā Natura moliretur, quod indies fabri imitantur,
quoties clauorum acies quando duos simul compingunt asseres reflectūt, ne uno assere tracto,
ex altero clauus prōptè uellatur. Natura namq; fibras has Vulcani ligamenta, quibus is Martē
Veneri colligauit, cū simul & uinciāt & sustineāt, artificio superiores, nō solūm per reflexos ad-
modū & obliquitatis nomine firmātes ductus transmisit: uerū trāsmittas rursus dilatauit, auxit,
atq; in unū omnes adeò cōmiscuit, ut in membranā quandā tenuē degenerent, quæ quòd calua-
riæ obducatur, περιεργαίως Græcis nuncupatur. Quāuis hæc omnia nō citra alterius corporis in-
teruentū, ut cæteris uisum est dissectionis professoribus, caluariæ adnascatur: sub ipsa enim alia
adhuc tenuis consistit mēbrana alijs quoq; omnibus propemodū ossibus præcipuè cōmunis, ac
ab amplexu quo ossa succingit περίσσω appellata. Inter reliqua autē ossa hac mēbrana priuata,
caluariæ interna est cauitas cerebro excipiendo adaptata, cui nusq; ubi durā membranā contin-
git, eiusmodi mēbranula obnascitur, adeò ut tanta etiā huius cauitatis sedes, quantæ dura mem-
brana non connascitur, hac quoq; membranula alijs ossibus communi obcincta sit. Visitur au-
tem illa sedes^k ubi duræ membranæ glandula cerebri pituitam excipiēs, & maximi arteriarum
cerebrū petentium rami substernuntur. Quòd autem rerum parens Natura harum præcipuè fi-
brarum gratia duas transuersas, & unam secundū capitis longitudinē^l futuras digesserit, ipsa
duræ membranæ forma commonstrat, quæ superiori sua sede illis lineis opportunissimè ueni-
ret firmanda. Quemadmodum inter dissecandum tertio duræ membranæ sinu sursum tracto
liquidò discimus, impense Naturæ industriā admirantes, quā duræ membranæ portione pro-
cessum ue inter cerebellum & cerebrum ita produxit, ut illo sursum ducto, ita cerebrum susti-
neat, ne suo pondere cerebello quicquam comprimendo obsit, ad quod egregiè auxiliatur du-
ræ membranæ pars, dextram cerebri partem à sinistra dirimens, & tota basi dicto nuper pro-
cessui continua. Porro si quid interim artificij in duræ membranæ harmonia enarrandum ad-
huc reliquum sit, id unā cum tenui membrana iam subiunxero.

Membrana
exterius calua-
riæ succingen-
tis creatio
usus.

k Vbi sub
is figura F,
C, D, confi-
sit tota 16
figura.
l Spectatur
figuris 6 ca
pi. li. 1.

DE TENVI CEREBRVM INVOLVENTE membrana. Caput III.

TENVIS membrana cerebro obducta occurrit in secunda figura, auulsa autem
in tertia. Atque ita etiam cerebello obuoluta spectatur in octaua.



a Hæc ex fi-
guris pete-
re debes se-
ctionis serie
sepe conse-
quentibus,
ut 2, 3, 8, 9
11, 12, 13.
b 2 fi. L, L.
c 3 fig. C, C.
C. et passim
in superfi-
cie 11 fig.

TENVIS cerebri membrana, quemadmodum & dura, duntaxat unica &
sibi ipsi continua est: nullam siquidem prorsus suæ naturæ aut ad cerebel-
lum, aut ad utramque cerebri partem, aut in ipsis cerebri uentriculis anfra-
ctibusq; ac ut semel dicam, tota amplitudine, quam dura membrana con-
stituit, inuenias, quæ non unius tenuis membranæ portio habeatur: ad eū
modum quo in animalis cute iam à corpore detracta, partes cutis cōtinuas
esse dicimus, quibus aures, pedes, & cauda induebātur. Porro ipsius situs
ex cerebri ac cerebelli cognitione desumendus est: nihil enim dura membrana amplexatur, cui
tenuis membrana exterius non obuoluatur. Nulla etenim^m exterioris superficiē cerebri & cere-
belli & dorsalis medullæ & neruorum portiuncula conspicitur, quam tenuis membrana uici-
nissimè, & citra alterius corporis interuentum proximè non integat, si modòⁿ superiorem cal-
losi corporis superficiem exceperis, quæ sola eiusmodi membrana, quum dura utcunque sit,
haud continetur. Præterea omnes cerebri ac cerebelli^o anfractus, in quos tenuis membrana un-

Tenuis mem-
brana nune-
rus.

Situs.

Exterior su-
perficies.
Constructio-
nis ratio &
usus.

dicuntur sui partes processus ue ingerit, huius situm ostendunt, uti sanè & ipsius quoque figuram & magnitudinē. Hæc membrana exteriori^d superficie uelut aqueo humore oblinitur, secundū partium quas ambit tubera extuberans. ipsa namque uix alibi crassitiem uariat, ac tenuissimæ semper membranæ innumeris uasorū ductibus oblitæ speciem cōmonstrat. Quippe uasorum potissimum gratia illam rerū Opifex condidit, nimirū ut instar^e mesenterij & humilioris membranæ omenti & extimi foetus inuolucris (à quo suum nomen tenuis mēbrana Græcis χοροειδής nuncupata, mutuauit) ea uasa tutò deduceret suffulciretque. Quinetiam cerebri & cerebelli est inuolucrum, non simplex profectò, ut dura membrana, quæ propugnaculū potiùs ac defensoriū cerebri aduersus caluariæ occursum censetur, quàm operimentum: sed quod ipsorum substantiā proximè contineat & firmet, non secus quàm caseorum formæ lac paulo antè coagulatum sustinent, & fingūt pariter. Atque ad hos usus Natura hanc membranam summè idoneam produxit, tam mollis enim tenuisque & sequax est, ut aptissimè omnibus anfractibus sinibusque sese ad profundissima usque ingerat, & quæcunque uasa cerebrum expetebat, ea deducere possit. Quinetiam adeò leuis cernitur, ut sua grauitate neutiquā uim cerebro inferat: & tam ualida interim duraque existit, ut à dura cerebri membrana fursum tracta non diuellatur, imò illum suspensionis impetum à Natura sagacissimè frequenti numerosaque & continua uasorum serie paratum sustinet, eo pollens robore, ut concinnè cerebri substantiam instar formæ cuiusdam (uti iam diximus) amplexetur & sustineat. Cæterum magis Naturæ sapientiam admirabimur, si non minori industria illam hinc atque in quatuor elementorum sedibus assignandis usam esse inquisuerimus. quod sanè ilico obuium fiet, si terræ caluariam, aquæ duram cerebri membranā, aëri tenuem, & igni substantiam cerebri assimilaueris; ac dein expendis rerum Opificis solertiam, qui ut inter terrā & ignem, quoniam natura à se inuicem maximè absunt, aquam et aërem collocauit, ita quoque in medio caluariæ & cerebri (quod substantijs longè discrepant) utrasque membranas interiecit, nō contentus uno amicitiae uinculo illa interueniente. Oportet namque nō situ solum id in medio locari quod est uerè medium, sed etiam natura: si modò quod secundum eandem proportionem ab extremis uariat, uerè medium censeatur. Neutra autē membrana proportionaliter à caluaria & cerebro uariabat: nam tenuis plus ab ossis duritie uincebatur, quàm ipsius cerebri mollitiem superaret. Econtrariò autem dura multo erat cerebro durior, paulo uerò osse mollior. Quapropter si tenuem duntaxat membranā Natura creasset, nequaquā indemnis caluariæ occurreret: si duram, cerebrum ipsius consuetudine læderetur. Quo minus igitur ipsum cerebrum aut eius proximum inuolucrum offenderetur, prior tenuis membrana, post hæc autem dura locatur: quæ quanto est osse mollior, tanto ipsa tenui est durior: quanto uerò hac tenuis est mollior, tanto tenui mollius est cerebrum. Quanquā rursus tenuis membranæ mollietis usui sit, ut illa commodè undequeque in cerebri anfractus sese ingerat, & in uentriculos, processus uarios unā cū uasis porrigat, uti prius est relatū. Quinam uerò eiusmodi habeantur processus, in plexuum & uentriculorum cerebri descriptione persequar, præsentī sermone ad cerebrum opportunè deflexo.

DE CEREBRI AC CEREBELLI NUMERO, situ, forma, reuolutionibus & substantia. Caput IIII.

HIS quæ præsentī Capite pertractantur ostēdendis, potissimum seruiunt tertia figura, ac dein omnes ferè ad decimam quartam usque: sed potissimum prima figura Capitis secundi, libri quarti, basim cerebri ac cerebelli cum dorsalis medullæ initio proponens.

Cerebri numerus.



DISSECTIONIS professoribus cerebrum in^a anterius, quod cerebrum, & in^b posterius, quod cerebellum uocant: deinde anterius in^d dextrum & sinistrum diuidi consueuit; non quod Anatomicorū procures cerebrum omnino diuisum, & non aliqua semper ex parte continuum esse arbitrati sint (quanquam etiam illorum scripta tale quid subinde innuant) at quod ut unica manus in digitos, ita quoque cerebrum in diuersas partes discretum uideatur. Quemadmodum enim prius de tenui cerebri membrana differebatur, sic etiam dextra cerebri pars, & sinistra, & cum his cerebellum, & dorsalis medulla, neruique ad unum omnes, insuper & nates testesque cerebri, deinde^h callosum corpus, & id quod instar testudinis effigiatum est: præterea dextri sinistrique uentriculorum^k septum, & uermiformes cerebelli processus, & si quid est eiusmodi, inuicem continuæ partes existunt, eademque substantia constituuntur in duritia coloreque aliquantulum uariante. Insuper omnia quæ modò recens

d In 2 fig.
e Potissima
pars 10 fig.
lib. 5 et tota
11 fig.
f 2 fig. lib. 5
e, e, e.
g 1 tabulæ
fi. 30 lib. 5 F
et 2 tab. K
et 3, 4 Q,
R.

h 6 fi. H, I,
F, G, M, N.

43 fig. A, A
et B, B. 1 fi.
cap. 2 lib. 4
A, A.
b 8 fi. R, R.
R. tota 11 fi
gura et 1 fi.
ca. 2 lib. 4
B.
d 3 fi. A, A.
e 3 fig. B, B.
f Quicquid
præter ossa
ult. fig. deli-
neatur lib.
4.
g 7 fi. M, N.
h 2 fi. L, L.

i 6 fig. A, A, A. k 5 fig. X, X, X, Y. l 11 fig. C, D, e, d.

rimamur, ita ab inuicem differunt, ut nō aliter q̄ si differentes disiunctæq̄ partes essent, plerisq̄ imposuerint. Quotū enim quemq̄ Anatomicorū inuenias, qui cerebrū nulla substantiæ continuitate cerebello continuū esse nō asserat: adde alios qui cerebrū in duas partes ut pulmones dissectū esse docēt, et omnia nobis indefesso scribendi pruritu, suis somnijs fidē dantes, perturbāt.

Cerebrū nanq̄ quantūuis tota sede, ^m quā cerebello incumbit, & ⁿ quā frontē spectat, penitus in duas partes dissectū sit, & eadē sectio secundū totā cerebri longitudinē in ipsius elatiori regione ducatur, non tamen ob id in medio ipsius iuxta^o basim inter occipitium & frontem omnino diuisum cernit̄. Quanta enim callosi corporis est^p longitudo, tanta quoq̄ sedes secundū longitudinē cerebri consistit, quā dextra eius pars sinistræ continuatur. atq̄ ita uel huius corporis interuentu, & eius^q quod instar testudinis extructū est, & ^r septi dextri sinistriq̄ uentriculorum supra

cōmunem eorū uentriculorum^s cauitatē, tertium^{ue} uentriculum duæ cerebri partes continuæ sunt. Deinde in basi etiam eas esse continuas ostendit, cum magna & secundū longitudinē & profunditatē qua continuant^r regio, tum cerebri testes & nates & omniū maximē quod ex cerebri basis medio pronascit̄, dorsalis medullæⁱ initiū, quod amplum crassumq̄ est, & perinde ac illæ duæ cerebri partes hoc in loco continuū unumq̄.

Deinceps etiā si dextra sinistraq̄ cerebri partes quā cerebellum integunt, nihil minus q̄ cerebello continuæ sunt, tamen inferior cerebelli sedes iam dicto dorsalis medullæ initio duobus locis^u continuatur, idēq̄ cum ipso corpus, si

continuitatem spectes, efficitur. Cæterū quis præcipuus continuitatis locus sit, quæq̄ omnes illæ quas paulo antē enumerabam partes censeantur, ordine suo loco seorsim enarrabo. Hactenus enim quæ nunc præcessere sermone complecti libuit, ne in cerebri numero aliquis, qui iam admonitus sectionem aggressurus est, ilicō me unā cum cæteris Anatomicis hallucinatum arbitretur. Ac proinde nunc cerebri situm opportunē aggrediar, quem ipsius cerebri membranæ, & potissimū^x interna caluariæ amplitudo edocent. Quicquid enim eius amplitudinis duabus cerebri membranarum & glande pituitam cerebri excipiente & ramis quibusdā maximarum cerebri petentium arteriarum non occupatur, id uniuersum cerebro ac cerebello adimpletur.

Cerebellum decuplo aut undecuplo minus cerebro est, atque unā cum dorsalis medullæ principio eam caluariæ amplitudinis sedem sibi uendicat, quæ posteriori parte^a tuberum in capiti samplitudinem cauitatem^{ue} auditus organorum causa prominentium, & deinde duobus in occipitijs ossis^b sinibus circumscribitur, qui ut duobus primis duræ mēbranæ^c sinibus, quos dextrum & sinistrum nuncupamus os, cedat, caluariæ cauitati insculpuntur. Hanc enim instar circuli circumscriptionem cerebellum nulla ipsius parte excedit, hæc^{q̄} circumscriptio cerebelli situm opportunissimē demonstrat. Haud enim hominibus, ut bobus fortassis (quos Galenus ad cerebri cognitionem duntaxat aggressus uidetur) cerebellum in occipitiū adeo porrigitur, ut nō etiam postrema cerebri pars in posteriora magis quā ipsum cerebellum uergat, nobisq̄ uocatum occipitium impleat. Quippe postrema & elatissima humani cerebelli pars uix eousq̄ ascendit, ubi digitis infimam occipitijs partem attingere possimus. Neq̄ etiam in nobis aliqua occipitijs ossis sedes musculorū insertionibus libera contingi potest, quā cerebellum implet, etiam si interim Anatomici ipsius situm ita recenseāt, quasi totā in occipitio prominulam regionem, ex cuius tubere uulgus memoriæ ingenijq̄ uim metitur, cerebellū infarciret: imò elatissima cerebelli portio ad^d mediā duntaxat sedē pertingit, quæ à posteriori sede^f foraminis dorsali medullæ uiam præbentis, & ^Λ literam imitantis futuræ^g partem habetur, quæ sagittali committitur, usq̄ ad quam alijs cerebellum conscendisse suis bobus & asinis, aut somnijs delusi scripserunt.

Præterea superior cerebelli pars in hominibus, quemadmodum sanē in canibus, bobus & ouibus instar globi cuiusdam, aut etiā acutius nequaquā extuberat, sed plana et depressa minimumq̄ in medio prominens conspicitur. Hæc itaq̄ caluariæ sedes cerebello dedicata, ipsius situm, circumscriptionem, formam ac magnitudinem edocet. Cerebellum etenim, quemadmodū & sua sedes, latius est quā longius aut profundius, & humiliori ipsius regione, idēq̄ potissimū iuxta ipsius posteriora latioris globi imaginē exprimit: in cuius medio acuta, neq̄ admodū latā habetur^h impressio, quā illi inducitⁱ tuber instar crassissimæ lineæ in occipitijs osse prominēs, quod eius ossis robur insigniter adauget, cuiq̄ dura cerebri membrana pertinacissimē connascitur.

Porro in anteriori parte, ^k qua cerebellum ad cerebri nates exporrigitur, id quasi in acutum fertur, undiq̄ suæ sedis formam accuratē referens. Cæterū eiusmodi omnia in cerebro, quod per me si uoles antequam cerebrū etiam adhuc nuncupare poteris, ostendit reliqua caluariæ cauitas cerebello nō oppleta. Vnde etiā cerebrū secundū ipsius basim depressum est, neq̄ globi modo extuberat, quamuis interim inæquale & nō unius formæ uisitur.^m Vbi enim oculorū sedibus & olfactus organorū sinibus innititur, uariū est: nam ad sinus organorum olfactus antrorsum

extuberat, utrinq̄ autem ad sinū illorū latera propter ossis in caluariæ cauitatē extuberantis prominentiam, unā impressionē admittit. Prominet uerò ibidem inæqualibus tubcribus os ad com

Quibus sedib:
dextra cere-
bri pars sin-
istræ continue-
tur.

Cerebellū quā
cerebro sit cō-
tinuum.

Cerebelli si-
tus & magni-
tudo.

Cerebelli
forma.

Cerebri ma-
gnitudo &
forma.

sinūm

modos oculorum sedes & foramina narium confingenda. Deinde cerebrum opplet duos grandes in caluariæ cavitatis sinus, qui ad ossis cuneum referentis^o sinus latera spectantur, quo glans cerebri pituitam excipiens sustinetur. Vnde etiam cerebrum ossis quo continetur formam glæbæ ritu sibi uendicās, utrinque in ipsius basi instar mediæ globi prominens tuber constituit. In horum tuberum medio cerebrum impressum cernitur, cuneiformis ossis processuum occasione hinc circum sinus latera productorum, quo nuper commemorata glans sustinetur. Quinetiam simili prorsus modo basis cerebri reliqua ipsius sede pro ossium tuberibus auditus organa continentibus, & cerebelli superiori regione suam figuram effingit, omnibus sinibus sese inferens, & amice admodum tubera admittens. Atque hinc etiam in lateribus & anteriori & posteriori & superiori sede cerebrum caluariæ cavitatis effigiem exprimit. His enim sedibus cerebrum instar oblongæ sphaeræ utrobique uersus anteriora propter temporum cavitatē depressæ, rotundum, & in posteriori parte multo quàm in anteriori latius uisitur, quasi cerebrum ipsum & cerebellum nullam peculiarem formam exigerent, ac abundè ipsis esset, si propria illorum substantia magna mole, & simul utcunque quò in se sinus cerebri cerebelli que functionibus aptos habere posset, collecta in capite reponeretur. Eiusmodi siquidem quid caluariæ basis sinus tuberaque ostendunt, & impressiones in temporibus^p temporalium musculorum gratia conspicuæ. Calua-

o Ad latera
M. fi. 3 ca. 12
lib. 1.

*Sectio dex-
træ nobis uo-
catam cerebri
partem à sin-
istra dirimēs,
et cerebri an-
fractus.*

riæ itaque cavitatis externæ cerebri superficiei imaginem monstrat, ad quam & 9^a sectio cerebri diuidens, & innumeri quidam gyri ac circumactus referuntur. Vniuersa namque cerebri sedes illa sectione diuisa, atque ut bifulcorum pedes in duos quasi ungues illius beneficio disincta, extimæ cerebri superficiei magna pars existit. Attamen dictam cerebri formam parum interturbat, quum dextra cerebri pars sinistrae accumbat: neque recta illa linea diuisæ cerebri partes inuicem magis dehiscant, quàm quanta duræ cerebri membranæ, & tenuis duplicatæ est crassities. In homine etenim secus atque in oue uniuersam sectionem interdiuidit duræ membranæ^d portio, processus uel, duas cerebri partes septi ritu interstinguens. Dein seorsum utramque cerebri partem tenuis membrana ambit, & implicat. Cæterum gyri ac reuolutiones cerebri, quas^e tenuium intestinorum anfractibus elegantissimè Erasistratus assimilauit, per uniuersam cerebri superficiem undique eadem frequentia habentur. Sunt uerò sinus permulti penitus in cerebri substantiam penetrantes, & profectò imagine intestinorum tenuium reuolutionibus simillimi. Neque opinor illos alicui aptius quàm his, aut etiam nubibus quos rudes pictorum discipuli, aut in scholis pueri delineare solent, conferri posse: quanquam in similitudine indaganda non admodum sit laborandum, quandoquidem hominis cerebrum hac ex parte nihil peculiare adipiscitur, & hos in cerebri substantia apparentes circumactus a sinis, equis, bobus, & alijs quæ hæcenus uidi animantibus communes homo obtinet. Nisi forsitan aliquis hinc differentiam assumere statuisset, quod tanto profundiores homini illos gyros Natura insinuauerit, quanto ipsius cerebri substantia copiosior uisitur. Horum itaque inflexuum effigiem cuiusuis animalis cerebrum uel in prandio aut cœna spectans, discas licet. Porro in illorum usu recensendo non medici

p 4 muscu.
tab. r.
q Specta-
tur integra
m 3 fig.
r 3 fig. C.
C, C.

d 3 fig. D.
D, D.

e 7 fig. lib. 5.

*Cerebri an-
fractus usus.*

*Lib. 8. de V.
su part.*

mines intelligant, an uerò minimè: quemadmodum Galenus contra Erasistrati placitum pugnans, in hunc modum censuit. Quum asini etiam admodum multipliciter cerebrum habeant complexum, quos deceret, quantum ad morum ruditatem attinet, omnifariam simplex, & minime uarium nancisci cerebrum. Melius autem arbitraretur bonam substantiæ temperiem corporis intelligentis (quodcumque hoc fuerit) prudentiam sequi, & non uarietatem compositionis. Neque etiam multitudini spiritus animalis oportet, ut puto, magis quàm qualitati perfectionem intellectus acceptam referre. Atque hic Galenus sibi dum maxime illius operam requirimus similis, orationem uelut freno cohibens, aliò quum reuolutionum usum exprimere debuisset, reflectit: satis esse arbitratus, si non intelligentiæ præesse has reuolutiones indicauerit, quod sanè non inficiamus, sed interim eas magnum Conditoris artificium ostendere, & non ob aliud quàm ad cerebri substantiæ enutritionem eas procreatas esse, à Galeno additum oportuit. Cerebri namque substantia citra omnem membranarum fibrarum plexum continua, neutique adeò firma fuerat, ut per illam arteriæ uenæque, ut in reliquis corporis partibus, digeri possent: & tam multa crassaque est, ut uenæ & arteriæ in superficie tantum exporrectæ ipsi nutriendæ, illiusque insito calore rescillando sufficerent, quum penitiores cerebri partes si ad illum modum uasa protenderentur, illorum materia carerent. Quod prouidens Natura, sinuosos illos implexus passim cerebri substantiæ impressit, ut in his tenuis membrana frequentibus uasis oppleta sese insinuaret, cerebri substantiæ alimentum appositissimè ita subministratura. Atque huius etiam nutrimenti potissimum occasione cerebrum in^o duas partes dissectum fuit, ut scilicet tenuis membrana sese in ipsius medium implicaret: ac inibi in reflexus deducta, cerebri substantiam enutrit. Haud enim citra eiusmodi cerebri dissectionem, & profundissimas reuolutiones illa cerebri sedes qua dextra sinistram

f 2 fig. E.
E, E.

g 3 fig. A, A.
E, B.

*Cerebri secti-
onis ratio.*

respicit,

h Speculatur
in u fig.

i u fig. E.

h 3 fi. R, R,

R. 9 fi. A, B,

C. 11 fig.

A, B & C,

D, c, d.

19 fi. C. aut

u fig. C, D,

c, d.

m u fig. C,

D & c, d,

dem H, I.

n Ad A, B

u fig.

o u fig. G, G.

p 1 fig. cap.

u lib. 4.

q 1 fi. cap. 2

lib. 4 D.

r 10 fig. L,

M, N O.

s u fig. E.

t G, G figu-

re u comit

tuntur I &

K 10 fig.

u Patet id

in 9 fi. E.

x Patet id

ad L 8 fi.

y Speculatur

id in i figu.

cap. 2 li. 4.

z u fig. E.

a Istud pe-

tes ex disse-

cta cerebri

substantia

in 4, 5, 6, 7,

8 figuris.

b 3 fig. C,

C, C.

respicit, enutriti potuisset. Atque huic sententiæ suffragantur cerebelli reuolutiones, quæ neu-
tquam æquæ atq; cerebri reuolutiones altè penetrant, sed paulo minùs quàm superficialiæ, at
frequentes admodumq; continua serie deductæ uisuntur. superficialiæ quidem, quod exigua
pars alenda sit, quodq; facile cerebellum à profundioribus anfractibus ad uentriculum uique
ipsius perforaretur. frequentes autem, ut copia aliquantulum leuem illam penetrationem sup-
pleat. Porro harum series quodammodo^k triplex est, effigie cum cerebri reuolutionibus neu-
tquam cõueniens. apparet nanq; cerebellum ob suas reuolutiones & impressum illum, quem
ab occipitis ossis tubere in posteriori sede obtinet, tribus partibus efformari, dextra una, &
alia sinistra & tertiã media. ac dextra quidem sinistraq; cerebelli partes duos quodãmodo glo-
bos inuicem appositos ostendunt, in quorum inani spacio, ubi scilicet globi sese non cõtinge-
rent, tertiã cerebelli pars reponitur, quæ ligni caseiue recentis uermem refert ob suas reuolu-
tiones, quæ transuersim secundum cerebelli longitudinem mutuò æquè distantes ducuntur.
Huius partis apices uersus inferiorem cerebelli sedem reflexi, uermiformes cerebri^m processus
suo loco efformare docebimus. Dextra autem sinistraq; cerebelli pars in superiore cerebelli
sede parallelas quoque & secundum cerebelli latitudinem ductas reuolutiones exigunt, quæ
deorsumⁿ protensæ, quasi in centrum, colliguntur, ad eam cerebelli^o sedem, quam dorsalis
medullæ initio connatam esse dicemus, contendentes. ac dextræ quidem partis reuolutiones
ad sui partis sedem porriguntur, dorsalis medullæ initio continuam: sinistrae autem, ad sui
partis sedem. At hæ cerebelli partes inuicem discretæ incontinuasq; nequaquam sunt, sed in-
uicem continuæ unicum corpus, ipsum scilicet cerebellum constituunt. quod unicum, non au-
tem cerebri modò geminum Galenus à Natura extructum esse asserit, quod duo dorfa, neque
totidem dorsales medullas hominem habere minimè decuisset: quasi ex cerebro, quod ne-
cessariò ueluti in duas partes diuisum, neque substantia continuum, p unica dorsalis medul-
la produci nequiuisset, ac proinde cerebellum ut corpus unicum necessariò procreatum fuisset,
ut unicæ dorsali medullæ aptum principium fieret. At Galene, qui in nugis cerebro qui-
busdam, & etiam subinde immerito tuis delusus simijs, Herophilum, & Lycum, Andream,
& alios Alexandriae dissectionis professores, qui humana aggrediebantur corpora, irridere
soles, cerebrum in suæ basis medio unicum, neque ut in superiori parte diuisim cernitur,
& unicam dorsalem^q producit medullam, in cuius superiori sede mox ab ipsius exortu Na-
tura^r sinum insculpsit, qua mediam quarti cerebri uentriculi amplitudinem constitui dice-
mus. s reliquam enim eius uentriculi amplitudinem, cerebellum supplet, quod utrinque dum
taxat ad dorsalis medullæ sinus latera quasi duabus circularibus applantationibus^t adnasci-
tur, continuum cum dorsali medulla corpus effectum. mediõ^a nanque^u posterioris cerebelli
sedis pars, ut neque etiam^x anterioris dorsali medullæ continua, connatã ue est, sed tantum te-
nuis membranæ interuentu posterior pars dorsali medullæ committitur. Non aliter, mihi cre-
de, quàm si Natura cerebellum condidisset, ut dorsali medullæ transmissum à cerebri sinibus
spiritum magis adaptaret, tuereturq;. A cerebello etenim quantumuis in ipsius duritie à cere-
bro differentia assignanda, & ratione cur cerebellum à cerebro diuisum sit expendenda solici-
tus fueris, nullius omnino uel minimi neruuli propago à cerebello^y ortum ducere reperies. &
profectò nulla est cerebri quæ frontem spectat, & qua in occipitium etiam longius in homine
quàm ipsum cerebellum fertur, in duritiæ differentia: neque etiam adeò notatu digna cerebelli,
quum tenui membrana id liberatum cernitur, cum cerebro in duritiã est pugna. At ut cere-
bri basis, unde dorsalis medulla ortum ducit, cæteris omnibus cerebri partibus, & ipso quo-
que cerebello durior uisitur, ita quoque dorsalis suo principio sensim durior euadit, neque co-
lore, neque duritiã cerebello ipsi supernato correspondens. Cerebellum enim magis flauum,
cinericiũ ue est, perquàm paucis albescentibus lineis interstinctum, & duntaxat in sui^z si-
nus superficie candicans. uniuersum uerò dorsalis medullæ initium cerebello adhuc in capite
subnatum albissimum est, ut & cerebri basis ipsi originem præbens, quæ omni prorsus reuo-
lutione ac anfractu quibus cerebellum scatet, destituitur. Porro quæ horum omnium sit sub-
stantia, uel in mensa etiam ex uitulorum, aut leporum, aut auis alicuius cerebris discere inte-
grum erit. est autem substantia quædam peculiaris & propria, qualem in uniuerso corpore
similem nullam reperias, ad ingenitas cerebro actiones idonea: non minus sanè quàm cordis
substantia, & pulmonum caro, & iecoris, & lienis, & renum, & testium suis quibus præsumt
functionibus aptissima censetur. Cerebri substantia, quam capitis medullam alij appellarunt,
ab ossium medulla differt, tum alijs plerisq; accidentibus, tum quod liquefieri nequeat, neque
inediæ tempore aut alijs occasionibus, ut reliqua corporis pinguedo absumatur, minuatur ue.
^a Hæc nō uniuersa candicat, uerum quicquid^b reuolutionibus proximũ est, subflauũ aut subci-
nericiũ est, æquali semper à reuolutionis superficie distantia, quanta nanq; reuolutionis pro-

Cerebelli im-
p. exultatio
& species.

Galeni ratio-
ne unitatis ce-
rebri parum
apte assigna-
se.

Dorsalis me-
dullæ initium.

In li. 8. de V-
su part.
Cerebri ac ce-
rebello duriti-
es, neruorũq;
ortus.

Cerebri, cere-
belli, et dorsa-
lis medullæ co-
lor et substan-
tia.

Cerebri sub-
stantiæ cõ os-
sium medullæ
discrimen.

propaginem

funditas est, tanto quoque ab intima reuolutionis parte interuallo, in cerebri substantia, is quem diximus, color obseruat: quasi rursus color ille in substantia, quod ad colorem attinet, reuolutiones duplicaret. Quicquid autem cerebri ita coloratum non est, albidissimum & candidum prorsus uisitur. Verum ut permultae cerebelli sunt inuolutiones, ita quoque uniuersum propemodum, ut paulo ante admonui, secantibus flauum occurrit. Quacumque itaque ex parte cerebri cerebelliue substantiam tenui qua proximè continetur membrana detexeris, hanc subflauam ac uelut aqueo humore oblitam, & nunquam uenis implicitam adinuenies, etiamsi interdum rubra & uelut sanguinea puncta in illorum cerebri substantia in illis potissimum obseruaturus sis, qui phrenitide ante mortem laborarunt, uerum illa nulla uenae exprimunt imaginem. Cerebrum namque ex nullo uase alimentum assumit, quam ex his quae tenui membrana suffulta ipsi circundantur, ut autem illi frequentia uasa undique obducerentur, cerebrum in tot quot diximus partes praecipue diuisum fuit: quamquam etiam diuisiones illae, ut & anfractus ad mollem cerebri substantiam ne cōcidat sustinendam, equaliterque suffulciendam, non mediocriter auxiliatur. Parum enim Galeni rationi cur cerebrum diuisum, aut, ut ipse loquitur, geminum sit, tribuo, inquit namque, cerebrum hac occasione geminum esse, ut quemadmodum uno oculo uitiato, aut uno teste execto, alterum seruamus: ita etiam dextro cerebri uentriculo laeso, sinister adhuc suo munere fungeretur. Haec siquidem Galeni ratio aliquem in copia uentriculorum recensenda locum fortassis haberet, non autem in enarranda cerebri diuisione, quum id nisi supra uentriculos geminum diuisum uesit. callosum enim nobis uocandum corpus, quod cerebri partium continentem comonstrat, ad elatissimam dextri & sinistri uentriculorum sedem consistit. Caeterum nunc tempestiuum erit, cerebri uentriculos aggredi, atque ita internam cerebri superficiem, quaeque ipsius partes adhuc narrandae supersunt, persequi.

DE CALLOSO CEREBRI CORPORE, ET
dextri sinistrique cerebri uentriculorum septo. Caput V.

SUPERIOREM callosi corporis sedem nulla ex parte diuulsam eleganter proponit tertia figura characteribus L, L. Insuper hanc sedem, sed a cerebri substantia in lateribus liberam, ostendit quarta ad I, I, I. Humiliorem uero sedem spectandam offert quinta ad R, R, R. ubi etiam praesens spectatur septum ad X, X. dein Y, Y.

Cerebri substantia: a nutritioni qualiter prospectum.

Lib. 8. de V. su part.

c 3 fig. L, L.

Callosi corporis sedes et nomenclatura.



PAVLO ante omnem cerebri cerebellique substantiam exterius tenui membrana circundatam, ea parte qua membranam respicit subflauam, & quasi cinericiam esse retuli. At quaedam cerebri pars in externa ipsius superficie sese offert, tenui membrana non obuoluta, uerum intimae cerebri substantiae modo, externa superficie candidas albaque, & reliqua cerebri substantia ad superficiem consistente durior, unde etiam uetustissimi Graecorum partem hanc *τὸν μόλον* appellauerunt, quos imitatus in orationis serie, hanc partem callosum corpus semper appellauimus.

Deinde Graecorum nonnullis id etiam a forma, quod inferiori sede arcus modo sinuatum sit, ac ab usu quod sustineat, *τὸν μόλον* uocatur: quamquam in cerebro corpus recensebo, quod hoc nomine a pluribus magisque ex merito donatur. Caeterum callosum corpus in medio cerebri uisitur, si cerebri dextrum sinistrique & basis cerebri medium in humiliori ipsius sede, & elatissimam cerebri in uertice regionem spectes, & quodammodo etiam ad priora posterioraque facta comparatione. Callosi enim corporis postrema pars anteriori cerebri sedi paulo uicinior est, quam antica posteriori. In conspectum autem secantibus uenit, leuiter dextra cerebri parte a sinistra manibus dirempta. quicquid enim ita diducto cerebro, inibi partes ipsius unit, album candidasque conspiciunt, ipsumque callosum est corpus, longum quidem, sed arcuatum. Praesens corpus in illa superficie quae ita diducto cerebro in conspectum uenit, gibbosum cernitur. eo quasi pacto, quo capitis uertex supra elatissimam frontis & occipitij sedem, & capitis latera protuberat: quamquam adhuc callosi corporis obliquitas non adeo insignis est, atque uerticis iam dictae partis. Quae admodum uero cerebrum, ut dicebam, diremptum superiorem callosi corporis superficiem egregie laeuem aequalemque ostendit, ita quoque indicat corpus id communem cum cerebro partem esse, & non ex cerebri substantiae superficie quae mollior & subflaua est, sed ex intimiori substantia quae durior & alba uisitur, nasci. Obseruant enim utrinque ad callosi corporis latera secundum ipsius longitudinem singuli sinus in cerebri substantia instar profundioris lineae insculpti, ac cum superiori callosi corporis superficie eo magis patefcentes, quo cerebrum uehementius, quasi id sursum in latera etiam acturus, diduxeris. Interior autem inferior uel ipsius superficies dextro sinistroque cerebri uentriculo ad aperto secantibus primum occurrit: quae etsi secundum callosi corporis longitudinem introrsum, ut superior extrorsum curuat, haud tamen simplex est. nam secundum callosi corporis longitudinem duae instar quartae circuli partis insinuatae superficies ducuntur, & in medio callosi corporis tuberculum quoddam instar lineae secundum illius

Callosi corporis initium, seu cum reliqua cerebri substantia continuas. Sinus ad callosi corporis latera obuij.

d 3 fi. L, L.

b 5 figura R, R, R. c 5 fig. S, T, V. 6 figura A, A, A.

d vti factum est in 3 fig.

e Ad M, 3 fi. f 5 fi. id corpus sursum et in posteriora reflexum est. atque ita hic cernitur ad R, R, R. g utrinque una ad Y, Y 5 fig.

h in 5. fi. di-
uissum est,
et una pars
X, X insi-
gnitur, alte-
ra Y, Y.

illius longitudinem exporrectū uisitur, perinde ac si altero quidem puncto duas quartas circuli partes in callosi corporis medio iunctas, reliquo autem puncto ad latera sursum protensas, intelligeres. Præsens tuberculum deorsum prominens, sensimq̃ extenuatum, tandem dextri sinistriq̃ uentriculorum cerebri septum efficitur: & tota interna callosi corporis superficies tanta dextri sinistriq̃ uentriculorum est portio, quanta est hæc ipsius callosi corporis superficies. ac dextra quidem superficiei portio dextrum uentriculum, sinistra autem sinistrum respicit. Porro dextri & sinistri uentriculorum^h septum eadem cum cerebro cōstat substantia, sed in medio quod ad superiora & inferiora attinet, adeo est tenuē, ut quum clara luce confectionem administramus, aut in altero tantū latere candelam admouemus, splendor ipsius pelluceat, similiter lapidibus hisce specularibus, quos extenuantes, & quā exactissimē læuigantes instar orbiū aut quadrangulorū in ostiorum & fenestrarū lapidibus Italos architectos inglutinare cernimus. Commodius tamen hanc septi regionē madidæ hostiæ, quales missæ sacerdotes adhibere solent, quā duris illis lapidibus comparaueris. Nisi etiam quia id corpus diaphonum quodam modo est, illud cum speculari lapide cōferre uisum sit. In superiori parte qua septum toti lōgitudini corporis callosi continuatur, & inferiori qua superiori parti eius cerebri partis, quam fornici cameræ ue simillimam esse dicemus committitur, ipsum crassius quā in media regione existit. Quandoquidem humiliorem septi sedem corpus testudinis modò effigiatum ex superiori sua parte educit, quemadmodum superior septi pars ab inferiori callosi corporis regione enascitur, produciturq̃. Callosum corpus unā cum septo nullis uenis, neq̃ etiā tenui membrana, uel aliqua etiam parte attextum est, sed ē uicinis partibus nutrimentū mutuatur. Non enim adeo grandis, crassaq̃ cerebri est portio, ut priuatis uasis indigeat, quamuis interim magnum animanti usum præbeat. Huius siquidem interuentu, dextra cerebri pars sinistra continuatur, deinde dextri & sinistri cerebri uentriculorum septum producit, atque id etiamⁱ subleuat, ac demum eius septi interuentu attollit fulcitq̃ testudinis instar effigiatum corpus, quo minus id magno omnium cerebri functionum malo cōmunem duorum cerebri uentriculorumⁱ cauitatem compressurum delabatur. Cæterum duo^k sinus in cerebri substantia profundioris lineæ ritu ad superiorē corporis callosi superficiē incisi, præter hoc quod ea cerebri pars calloso corpori producendo inepta sit, idq̃ ex penitiori substantia nasci debeat, ad pituitæ defluxum ex superioribus cerebri partibus facere creduntur, quam excipientes per gibbam callosi corporis superficiem in anteriora profluere sinunt. Verum de pituitam expurgantibus meatibus suo loco agendum erit, nunc autem uentriculi opportunè pertractabuntur.

Dextri sin-
istriq̃ uentricu-
lorum septi hi-
storia.

Callosi corpo-
ris ac septi ur-
sus.

i 3 fig. L, L
et 5. fi. R, R,
R subleuat
Y, Y, X,
X. eiu. fig.
et Y, X, at-
tollit S, T,
V eiu. figu-
ræ, ne A, A,
A 6. fi. præ-
mat H, I. 6
fig. aut H 7
et 8 figura.
k 3. fi. M, M.

DE CEREBRI VENTRICVLIS.

Caput VI.

DEXTRVM cerebri uentriculum ostendunt quartæ & quintæ figuræ L, L, & sextæ D, D. Sinistrū autē quartæ & quintæ figuræ M, M, & priuatim quartæ N, N. deinceps sextæ E, E. Communem uerò horum concauitatem seu tertium uentriculum exhibet septimæ & octauæ figuræ H, cuius meatus ad quartum tendens uentriculum K insignitur, qui partim undecimæ figuræ E notatur, & partim nonæ I, & decimæ L, M, N, O.



VENTRICVLORVM cerebri numero is ascribitur, qui cerebello dorsaliq̃ medullæ communis est, ac quartus etiam dicitur, tres nanque in cerebro uentriculos, Herophilum imitati, collocamus. Ac unum quidem in dextra cerebri parte, alterum in sinistra, & tertium in cerebri, seu duorum primorum uentriculorum medio recensemus.^a Dexter prorsus cum sinistro situ, forma, magnitudine, alijsq̃ omnibus quæ in partiū constructio-

Ventriculorū
numerus.

Dextri & si-
nistri historia.

a 4. fi. L,
L. 6 figura
D, D.

b 3. fi. A, A.

c 5. fig. L, L.

d 5. fig. X, X.

e 5. fi. R, R,

f 5. fig. S, T,

g 5. fig. V.

scribentur, de sinistro quoq̃ nos dixisse arbitrari conduxerit. Ponitur autem in^b dextra cerebri parte secundum totam quasi huius partis longitudinem protensus, tantum enim antica sede à fronte, quantum postica ab occipitio distat. remouetur autem adeo illis locis ab externa cerebri superficiei, quantum ipsius uentriculi dextrum, exterius ue latus à superficiei cerebri distat, caluariæ latera respiciēte. Internum autē uentriculi dextri latus secundum^c callosi corporis longitudinem sinistri uentriculi interno lateri proximum est: neque aliud interstitium ambos separant, quā^d tenuis quædam, & uelut quod ad subtilitatē attinet membranea cerebri portiuncula, quam septum uocauimus, atque à^e calloso corpore enatā, toti superiori parti secundum longitudinem cameræ modò extructi^f corporis continuam connatamq̃ esse diximus. Dextri itaq̃ & sinistri uentriculi latera toto spacio quo septum illud porrigitur, quanta ue callosi corporis est

est longitudo, minimo interuallo ab inuicem remouentur. Verum ubi in ea cerebri parte consistunt, quæ prorsus diuiditur, ut illa quæ cerebello incumbit, & quæ fronti proxima est, ibi uentriculi latera mutuò maximè distant: nam præter cerebri membranas hanc sectionē subintran-tes, etiam plurima cerebri substantia uentriculos dirimit. Vnde etiam fit, dextrum exterius uel dextri uentriculi latus nonnihil obliquè duci. Anteriùs enim & posteriùs in dextrum magis quàm in medio accedit, sinistrum autem latus sinistrorsum magis media ipsius sede, quàm eius extremis protenditur. Anterior uentriculi pars obtusa est & rotunda, non autem ut omnes mihi scribere uidentur, in acutum uersus olfactus^s organa, autⁿ uisorios neruos desinens. Neque etiam hac parte aliquem ductum à se porrigit, nisi quod interno latere, ut mox dicā diffusius, decliuis adⁱ tertium uentriculum pertingat. Cæterum posterior uentriculi regio occipitium respiciens, obtusa quidem est & rotunda, at deorsum sensim in cerebri substantiam uersus priora paulatim arctata tantisper^k descendit, donec ibidem desinat, ubi olfactus organorum & uisori-orum neruorum consistit principium, & quæ maximè soporalium arteriarumⁱ rami in cerebrum feruntur. Atque hic^m ductus si longitudinem spectes longior est, quàm media ipsius uen-triculi longitudo, quam ab occipitio ad frontem protendi diximus. & sub media etiam illa lon-gitudine ductus hic in cerebri substantia tenditur, cornu modò in mucronem desinens, qui non in uisori-orum neruorum & olfactus organorum initia finit, & quadam continuitate neruos il-los & organa olfactus nequaquam perforat: uerum in unam cerebri reuolutionum ibidem ad cerebri basim terminatur, atque in seⁿ maximam cerebrum petentem arteriam cum tenuis

*Per multa
Galeniparū
uera dogma-
ta hic non
describi.*

membranæ processu illam suffulciente admittit. Hæc quum dico, innumera Galeni dogmata mihi reclamare haud ambigo, quæ olfactus organa cerebri anteriores esse uentriculos docet, & eosdem uentriculos tenues sensim factos in uisorios neruos suo mucrone finire, & quod lon-gè alienissimum est, anteriores hos cerebri uentriculos uersus nares pituitā eructare attestatur, eiusmodiq; nō pauca, quæ potius ex refectione, quàm proluxa quapiam disceptatione disci con-suluerim. Quandoquidem hæc adeò manifesta sunt, ut admonuisse tantum abundè sit, si mo-dò non duntaxat libris confusus, tuis manibus cerebrum etiam aggrediaris, aut alteri accuratè fecanti astiteris. Vniuersa igitur uentriculi superficies læuis & aqueo humore oblita, & inter-dissecandum subinde eodem oppleta conspicitur.° Superior uentriculi pars omni inæqualita-te est expers, quemadmodum & utraque latera, nisi quod leuis ille uentriculi obliquus ductus quasi tubera inducere uideatur. Inferiorem uentriculi partem inæqualem efficit^p sinus qui-dam, ex posterioris uentriculi sedis externo latere antrorsum obliquè ad communem uentri-culorum cauitatem prorepens, atque ad pituitæ leuiorem defluxum paratus. Dein ad inæqualita-tem facit ea uentriculi pars, quæ deorsum uersus anteriora è posteriori uentriculi sede prorepit. Ille nanque uentriculi reflexus unà cum sinu illo in causa est, ut monticulus quodammodo in anteriori posterioriq; inferioris sedis uentriculi regionibus extuberet. qui à dextro latere decli-uus ad sinistrum latus fertur, uersus cōmunem uentriculorum amplitudinem. Inferiores enim uentriculi dextri & sinistri partes, quæ tota callosi corporis longitudine cōtinuæ uisuntur, uer-sus utriusq; medium communem eorundem cauitatem deorsum inclinatur, neque ut superio-res partes & latera orbiculatæ, & ab inuicē septo aliquo diremptæ sunt. Neque profectò aliud est^q communis uentriculorum cauitas, quàm inferiorum dextri & sinistri uentriculorum par-tium sub^r corpore testudinis imagini à dissectionis professoribus comparato descensus cōcur-susq; qui inferiori parte oblongam uallem duorum uicinorū montium exprimit, acutum uel secundum ipsius longitudinem angulum efformat. Superiori uerò sede ad testudinem imitan-tis corporis effigiem cauitas illa secundum concauum orbiculata, teres uel uisitur. Cuiusmodi uerò corpus illud sit, paulo post explicabitur: nunc interim uentriculorum sermone tantum instituto, quorū iam duos dextrū uidelicet & sinistrum recensuimus, & propemodum etiam tertium, qui communis amborum est cōcauitas, quæ binos à se educit meatus, quorum^s unus ex humiliori ipsius sede, ubi acutum angulum secundum totam sui longitudinem uallis cuius-dam ritu exprimit, rectā deorsum uersus^t glandem porrigitur, cerebri pituitam excipientem.

*Communis uē-
triculorū dex-
tri & sinistri
concauitatis,
seu tertij uen-
triculi histo-
ria.*

*Meatus à
tertio uentri-
culoeducti.*

"Alter autem meatus qui posterior est, tertij uentriculi non minima pars censendus uenit, qui inter cerebri^x testes & nates ac super dorsalis medullæ initium decliuis, ad quartum uentri-culum retrorsum pertinet. Meatus huius initium non adamussim orbiculare uisitur, sed quo-dammodo triangulare. seruat enim in inferiori sede acutum suæ cōcauitatis unde prodit angu-lum: in superiori uerò meatus parte, quæ^y glandi uasorum tertium cerebri uentriculum peten-tium diuisioni præest, proxima cōspicitur, transuersa linea anguli illius latera connectit, ipsaq; cum illis alios duos angulos constituit. Atque huiusmodi etiam meatus ipsius^z orificium est, quo quartum uentriculum sub cerebri natibus respicit. Ex inferiori meatus angulo, quæ pri-

g 13 fi. L. L.
h 13 fig. N,
O.
i 5 fi. sub S,
T, V. & 6
fi. Vbi cor-
sistit H, I. et
7 fig. H.
k Cōfer, F,
G, 6, 7, 8 fi-
gurarum.
l 13 figu. P.
m Specta fi-
guram 3 ca-
piti insertā
lib. 4.
n 13 fig. Q.
6, 7, 8 fi. F.

o 4 fi.
N, N.

p 6 fig. aut
R aut S.
quāuis cha-
ractere nō
notatus in
4 figu. pul-
chre occur-
rat.

q 6 fig. sub
H, I. 7, 8 fi-
gura H.
r 5 fig. S, T,
V. 6 fig. A,
A, A.

s 7, 8 fig. I.

t 16 18 figu-
ra A.

u 7, 8 fig. K
& octauæ
etiam L. 10
fig. B, C.
x 7 fig. M,
N. 8 fig. N,
O, P, Q. 10
E, G, F, H.
y 7 fi. L. 10
fig. D.
z 10 fig. C.

mum

a vbi K cō-
stituitur 8 fi.
b 14 fig. C.
C. 15 fi. E.
c 9 fi. L. 10
L, M, N, O
cum 11 fi. E
constituit
quartū uen-
triculum.
d 1 fi. cap. 2
lib. 4. D.
e 7, 8 fi. K.
10 fi. B.
f 10 fig. L.
11, N, O.
g 9 fig. H.

h 10 fi. I, K.

i 11 fig. E.
k 11 fi. G, G.
l 8 fi. mediū
R. 9 fig. C.
m 11 fig. C.
D. c, d.

n 7 fi. X, X
iuxta M, N.
o 9 fi. quasi
E ad H cō-
mitteres.

p 4, 5 fi. O.
O. 6 figura
M, N.
q 1 tabella
fig. 30 P. 2
tab. K. 3, 4
ta. Q. R.
r 5 fig. H, I.
s 7 fig. V
eductū a T.
t 4 fig. P. 6
fig. O, O.
t 18 fi. cap.
14, 15.

u 6 fig. M,
N, H, I.

mūm inter cerebri testes ferri incipit, ^a meatus alius raro educitur, qui per cerebri substantiam deorsum in priora protensus, tandem ad ^b cyathum usque peruenit, quem cerebri pituitā excipere docebimus. Cæterum ^c quartus uentriculus, ad quem posterior meatus tertij uentriculi porrigitur, ex dorsalis medullæ & cerebelli sinibus componitur, nō secus quā si utraque manu unam cavitatē fingeres. totus enim uentriculus in cerebelli corpore haud insculpitur. Dorsalis itaque medulla ex cerebro ^d prodit, ubi tertius uentriculus ^e meatum uersus quartum uentriculum primum porrigit, testesq; ipsi & nates dorsalis medullæ principio continuantur, ac meatum illum tertij uentriculi cum dorsalis medullæ initio æqualiter deducunt, ita ut meatus superior pars illis, inferior autem dorsali medullæ incisa sit. Postquam uerò meatus ille nates superauit, eius portio quæ dorsali incisa uidetur, dilatari incipit, ac ^f sinum efformat usque ad eum ferè dorsalis medullæ ^g locum, quā caluariam hæc egressura est, pertinentem. Sinum hunc rectissime Herophilus concauitati assimilauit calami quo scribimus, nam si huic sinui eam calami partem, quam atramēto intingimus, comparaueris, animaduertes profectò calami orificiū ubi adhuc calamus teres est, & sectioni uicinus, tertij uentriculi meatus fini respondere, qui sub natibus prominet: deinde cuspidem quo literas fingimus, similem obseruabis infimæ sinus partī, quā is in dorsalem medullam iam ex caluaria excisuram, ueluti porum angustumq; meatum producit. duos autem calami angulos, quos inter mucronem & elatissimæ sectionis initium fingimus, cavitatisq; calami latera sinus lateribus simiilima ostendes. Ad huius cavitatis latera, ubi anguli illi consistunt, unus ^h utrobique dorsalis medullæ processus orbicularis habetur, cui duntaxat cerebellum adnascitur, continuumq; cum dorsali medulla corpus efficitur. Atque huiusmodi dorsalis medullæ cavitās est, alteram quarti uentriculi cavitatem constituens. Quæ autem in cerebello spectatur, uti iam dicturus sum se habet, inter ^k duas orbiculares cerebelli sedes, quibus dorsali medullæ continuatur: & inter eius cerebelli ^l partis ^m extrema, quam ueluti tertiam ipsius portionem recensuimus, sinus quidam imprimitur latior quā longior, non tamen admodum profundus, qui alteram quarti uentriculi partem constituit, in anteriori & posteriori sede patentis, quod neque anterior neque posterior cerebelli pars dorsali medullæ adnascatur, quamuis interim sinus hic tenui cerebri membrana, & anteriori & posteriori parte occludatur. In ⁿ anteriori enim parte tenuis membrana, qua cerebellum cerebro & cerebri natibus cōmittit, sinum obuoluit, ^o posteriorem uerò sinus sedem obstruit, eius loci tenuis membranae portio cerebellum dorsali medullæ ibidem colligans. Quartus uentriculus nihil in se præter aqueum humorem, qui & alijs uentriculis cōmunis est, inter dissecandum cōtinere animaduertitur, quemadmodū neque meatus ex tertio cerebri uentriculo in quartum pertinens. Porro dexter & sinister præter huiusmodi humorem etiam ^p plexum quendam in se continent, quem dissectionum periti ^q extimo foetus inuolucro comparāt. Communis autem cavitās, seu tertius uentriculus ^r uenosum illud uas deducit, quod plexus illius constituendi gratiā à quarto duræ membranæ sinu in tertio libro propagari docuimus. Deinde anterior quæ horum uentriculorum pars ab illo uase ^s uenulas impense graciles interdum assumit, illis quā similimas quibus ^t adhærentem oculi tunicam exornari conspiciamus. atque huiusmodi uenulae uentriculorum superficiei adnascuntur facilius, quod durior & quasi callosior cerebri substantia in uentriculorum superficie, quā alibi esse uideatur. Cæterum Galenum minor, cæterosq; omnes, qui post illum in Anatome nobis quicquam prodiderunt, & ab ipso perperam citra sectionis aggressum illi nimium fidentes (si modò quid boni complexi sint) deprompsere, quod hos scribere non pudeat, trium cerebri uentriculorum superficiem tenui membrana, uti ipsum cerebrum cingi obduciq; quartum autem non ita: quum nulla prorsus alicuius uentriculi meatus ue superficies tenui membrana obuoluatur. Quis enim, obsecro, diligenter humanæ fabricæ partes examinans, neque alicuius scriptis picturis ue (uti sane debet nemo) solum addictus, non uel hinc conspiciet, Galenum pleraque, & præcipue in libris de Vsu partium imaginatum fuisse? Arbitrabatur namque tam mollem cerebri esse substantiam, ut incisi ipsi uentriculi in se colligi debuissent, si tenui membrana intus non succingerentur. uerū durio rem cerebello tribuens substantiam, sibi persuadebat, eius uentriculum citra membranæ, quæ ipsi fulcri loco esset, beneficium posse contineri. Ego sanè arbitror Galenum quum illos libros scriberet, apud Herophilum, aut Andream, aut Marinum, aut Lycum, aut alium quempiam ex illis proculdubio præstantissimis Alexandriae dissectionis professoribus, tenuem cerebri membranam describentibus legisse, in tres cerebri uentriculos tenuis membranæ processus partes ue porrigi, at non item in quartum uentriculum. qua ratione illi uentriculos membrana quapiam ueluti peritonæo, aut tunica costis subducta succingi non indicabant, uerū eas tenuis membranæ ^u partes intelligebant, uasa in uentriculos deducentes,

Quarti uentri-
culi historia.

Quid singulis
insit uentricu-
lis.

Tres primos
cerebri uentri-
culos tenui mē-
brana non sue
cingi.

Ventriculorum
usus.

centes, à quibus secundarum modo efformati plexus fabricantur, cuiusmodi pars in quartum uentriculum nulla exporrigitur. Quinetiam præter id quod uentriculi membranæ neutiquam succinguntur, illæ obstaculo essent, quo minus cerebri substantia materiâ suis uentriculis oblatam, in animales spiritus, interstitio quodâ præpedita, emutaret. Cæterū præter narratos iam tenuis membranæ processus dexter cerebri uētricus, uti etiā sinister in posteriori sua sede, ubi deorsum reflecti incipit, * principiū corporis camerae aut testudinis modò effigiat continet, quod obiter additū adhuc esse (ne quid in uentriculorū cōstructione prætermissum uideat) uolui, nam peculiare illius corporis Caput præsentī subiicietur, quod ut uentriculorum usum recenserē expeteret quidē. at quicquid propemodū adducere scriptisq; mandare ausus essem, in huius libri initio, ubi cerebri usus obiter enarrandus erat, recensui. Nihil enim in præsentia uentriculis aliud tribuere statui, quàm illos amplitudines sinusq; esse, in quibus attractus per inspirationē aër, uitalisq; spiritus à corde ipsis transmissus, priuatae cerebri substantiæ ui in animalem spiritum emutatur. qui postmodum per nervos ad sensuum motusq; organa distribuitur, ut illa huius spiritus beneficio, & apta suis munij cōstructione suo fungantur officio, quo muscoli mouent, oculus uidet, olfactus organa olfaciunt, auditus organa sonos percipiunt, & lingua sapores dignoscit, & demū omnis pars cui neruus exporrigitur, tactiles qualitates diiudicat. Hunc itaq; in gignendo animali spiritu usum uentriculis ascribere neutiquam uereor, at de principis animæ facultatum in cerebro sedibus (quamuis etiam has illi qui hodie theologi uocari gaudent, omnia impune sibi licere arbitrati, assignent) nihil enarrandum duco. Quando omnes quibuscum uiuimus, præcipuas principis animæ uires simijs, canibus, equis, ouibus, bobus, eiusq; generis animantibus penitus adimunt, & ut cæteras taceam, soli homini ratiocinandi facultatē, eamq; omnibus quantū ab ipsis capere possum, parem tribuunt: quamuis interim homines nullo sinu illa animalia superare inter disseccandum cōspicimus: neque solum numerus idem est, at cætera omnia (si modò molem & temperamenti ad iustitiam integritatem excipias) inter se sint similima. Liceat itaq; uel illorum hominū gratia me ab alio uentriculorū usu inquirendo abstinere: neque uel hic Galeni placiti meminisse, qui in tertio de Hippocratis & Platonis dogmatibus, mediū uentriculum: in libris autem de Partium usu postremum, principalissimum esse docet. Ac proinde Deo rerum omnium opifici hymnos canentes, gratias agemus, quòd nobis rationalem animā, quam cum angelis (ut Plato etiam male tractatorum philosophorum haud immemor innuebat) cōmunem habemus, largitus fuerit, cuius beneficio si modò fides adsit, æterna illa fœlicitate fruemur, quando animæ sedem ac substantiā non corporū refectione, aut nostra corporeo uinculo obruta ratione inquirere necessum erit. nā is qui uera est sapiētia, nos nō hoc generabili & putrescibili corpore amplius, sed spiritali suoq; quàm similimo constantes, edocebit. At quum adhuc id sumus quod nos esse debilis ratio dicitat, in reliquis cerebri partibus summi rerum Opificis industriam pro uirilī indagemus.

x 4 fig. L.
M. 5 fi. S. T.
6 fi. B. C.

DE CEREBRI CORPORE, TESTVDI-

nis camerae ue imagini à dissectionum peritis comparato.

Caput VII.

SVPERIOREM huius corporis, quod in *Arabum* interpretum libris *Zac* & *Zachd* dicitur, sedem ostendit quintæ figuræ *S, T, V*. quanquam & eius sedis modicam partem etiam proponat quartæ figuræ *L, M*, & sextæ figuræ *B, C*. ubi etiam inferior sedes spectatur ad *A, A, A*.



LORNICIS seu testudinis modò extructum corpus, in illarum cerebri partium numero reponendū uenit, uel quarum etiam interuētū dextram cerebri partem sinistrae continuam esse nequimus inficiari. Est itaque id unicum, & in cerebri medio repositū, ac pariter utriusq; cerebri partibus commune. Hoc eandem cum^a calloso corpore substantiam, & parem quoque longitudinē, ac usum etiam quodammodo eundem adipiscitur. Verū forma ortusq; huic peculiaris accidit. Ex posteriori nanq; dextri & sinistri uentriculorum sede, qua hæc deorsum in priora reflectitur, statim in ipso reflexu corpus quoddam^b enascitur, similem prorsus substantiam cum cerebri uentriculorū substantia sortitum, nisi quòd paulo quàm uentriculorum substantia candidior, duriorq; uisitur. Huius corporis^c pars, quàm dexter uentriulus educit, ei continua est, cuius principium ex sinistro pendet, ac simul ambæ partes latum quoddam corpus efficiunt, quod statim ab ortu à reliqua

43 fig. L, L.
4 fi. l. l. l. s
fig. R, R, R.
b 4 fi. L, M.
5 fig. S, T. 6
fig. B, C.
c 5 fi. S, con
tinuum est
cum T. et 6
figura B, A,
cum A, C.

a 5 fig. S, T
ad V. 6
fig. B, C ad
supremū A.
e iuxta P 6
figuræ.
f 5 fig. ab S
ad T. aut 6
fi. à B ad C.
g 5 fig. ab S
ad V. aut 6
fi. à B ad su-
preum A.
h 5 fi. à T ad
V. aut 6 fig
à C ad su-
preum A.
i 5 fig. O, O
6 fig. M, N.
k 6 figura
A, A, A.

lin 5 fi. tota
occurrit.

m 5 fi. X, X
qui chara-
cteres in in-
tegro ad-
huc cere-
bro conti-
nui sunt cū
X, Y eiusdē
figuræ.

n 5 fig. S, T.
o 6 fig. H, I.
aut 7 fig. V
à T natum.

qua uentriculorum cerebri substantia abscedit, ac sensim in acutum^d definens antrorsum per-
fertur, ad eum usq; cerebri locum pertingens, ubi anterior cōmunis dextri & sinistri uentriculi
cauitas, tertij ue uentriculi pars^e cessat. Ibidem nanq; acuto quodā angulo corpus hoc substan-
tiæ cerebri rursus unitur, cōtinuum^f ue est, toto reliquo ductu à principio statim inferiori ipsius
sede tribus cerebri uentriculis nusquam connatum, corporis ue alicuius interuentu cōnexum.
Obtinet itaq; præsens corpus triangularem figuram inæqualibus lateribus conformatam. ac
primum quidem latus, quod & breuissimum est, à posteriori sede dextri uentriculi ad poste-
riorem sinistri protenditur.^g Alterum in dextro cōstitit uentriculo, à posteriori ipsius sede uer-
sus interiora usq; ad priorem tertij uentriculi partem protensum.^h Tertium in sinistro positum
uentriculo, secundo lateri longitudine respondet. Secundum duo hæc lateraⁱ plexus illi prore-
punt, quos ad secundarum formā dissectionis professores extructos aiunt. Cæterum hi tres
huius corporis anguli duntaxat cerebro inferiori corporis sede connati, continuiq; sunt. latera
enim omnia à cerebro prorsus abscedunt. Superiori uerò parte corpus id unico tantum angu-
lo, qui acutus est, anterioraq; spectat, cerebri substantiæ continuatur. Inferiori sede corpus id
unica donatur^k superficie, triangulari testudini fornicij ue quàm similima. unde etiā corpus
hoc, quemadmodum & ab usu ueteribus Græcis *ψαμμοειδής* nuncupabatur. Hæc superficies,
tertij uentriculi elatiorem sedem constituit, ac proinde etiam sub ipsa dextri sinistriq; uentriculi
fit communio. Cæterum^l superior huius corporis superficies, gibba, ac pro inferioris superfi-
ciei cauitatis ratione conuexa uisitur, non tamen simplex cōtinuaq; ut illa. Ea nanq; secundum
corporis longitudinem in medio in^m acutum quodammodo extuberat, continuaq; cum dextri
& sinistri uentriculi septo efficitur, adeò ut in utroq; latere una haberi uideatur superficies, quæ
in ipso corporis ex posteriori uentriculorū sede exortu impense orbicularis, ac oblongæ sphæ-
ræ superficiiei tam similis conspicitur, ut nonnullis hiⁿ exortus eousq; imposuerint, ut illos ce-
rebri nates esse arbitrarentur. Alij, magno supercilio, uermium cerebri loco, operæ precij sese
quippiam inuenisse iactitantes, in Italiæ gymnasijs ostenderūt. At hic mihi sermo cohibendus
est, ne ad eiusmodi Anatomes imperitos homines expatietur: quibus non sat fuit omnia igno-
ralle, nisi sibi particulæ, nullius in medicina usus, inuentionem magno fastu uendicarēt, quam
fortè à Galeno eleganter accurateq; perscriptam nugacissimè & falso commōstrarent. Corpo-
ris itaq; testudinis modo conformati omnes superficies, quæ læues omnino sunt, & aqueo hu-
more perfusæ, tres cerebri spectant uentriculos. tota enim inferior ipsius superficies tertij uen-
triculi superiorē sedem, uti iam dictum est, conficit: dextra pars superioris superficiiei dextrum
respicit uentriculum, sinistra sinistrū. Vt uerò uentriculos ipsos neutiquam tenui membrana
succingi relatum est: ita quoq; hoc corpus tenui membrana prorsus liberum est, nihil aliud in
sui constructionem præter cerebri substantiam admittens. Porro Natura id creauit, ut instar
testudinis, superiorum corporum impetum, quo minus illa corruant, sustinentis, tertium cere-
bri uentriculū amplum seruet, seseq; ipsum haud cōcidere sinat. ad quem usum, præter aptam
constructionē, tres eius anguli quibus se sustinet, auxiliantur. quinetiā septum uentriculorū, cal-
losi corporis beneficio sursum tractū, hoc quoq; corpus subleuat, attollitq;. Quæ quū ita sint,
corpus istud magna ex parte tertij uentriculi cauitatem efformat, & sub se^o uas, à quarto duræ
membranæ sinu, citra omnē compressum securissimè deduci sinit: quod per tertiu uentriculū
rectā fertur, ac tandem bipartitū in dextrum sinistrumq; uentriculū digeritur.

DE CEREBRI GLANDE NUCIS PI-

neæ imaginem exprimente. Caput VIII.

Ostenditur hæc septimæ figuræ L, & octauæ M, & decimæ D.

a 5 fig. S, T.
V. 6 figura
A, A, A.
b 6 fig. H, I.
c 7 fig. T.
d 7 fig. L, 8
fi. M. 10 fi-
gura D.
e 7 fi. K, 10
fig. B.



V X T A posteriorem testudinis modò formati^a corporis sedem, qua pri-
mum^b uas uenosum ex^c quarto duræ membranæ sinu in tertium cerebri
uentriculum porrigi incipit, glandulam Natura condidit nuci pineæ aut
turbinate figuræ similem, ac proinde *λωροειδής* & *κωνοειδής* à ueteribus ap-
pellatam. Reponitur autem sub uasis illius initio, mucrone suo sursum spe-
ctans: basi uerò, cerebri substantiæ incumbit paulo posteriùs quàm^e mea-
tus initium uisitur, qui ex tertio cerebri uentriculo in quartum procedit.

Glandis pineæ
a nuci similis
situs.

f 7 fi. M, N.
10 fi. E, G.

Neque profectò aliter ipsius situm exprimere possim, nisi etiam eminentissimæ & anterio-
ri^f testium cerebri parti glandem illam inniti adijcerem. Hinc nanque cerebri parti in homine
potiùs innititur, quàm quod quadam substantiæ continuitate hinc cerebri substantiæ cōtinua,
aut quæpiā cerebri particula censenda esset. In hominibus nanq; cerebro uix hæret: frequentissi-
meq; nisi quis mentem operi accōmodet, in confectione unā cum uenoso uasē auelli cōsueuit.

Hinc

Hh In

Præsentis
glandis usus.

In agno autem, aut prouectoris ætatis oue, cerebro non hæret modò, uerum etiam cerebri substantiæ quodammodo continua cernitur. Insuper homo eam glandem, minorem quàm uel agnus, fortitur. unde tum hanc ipsam, tum quæ sequenti Capite describentur organa uisurus, commodissimè agninum cerebrum aggredieris. habebit enim id omnia proceriora, & ut opportunè alicui rei eadem assimiles, accuratius conficta. Galenus glandem hanc quæ cerebri substantia durior, magisq; ad glandis quàm ad cerebri naturam accedit, meatui à tertio cerebri uentriculo in quartum porrecto præesse, & quod aliquibus dissectionis professoribus uisum erat, glandem hanc meatum illum occludere, aperireq; prorsus negat: nò eandem huic glandi, ac glandoso corpori usum tribuens, quod sub dextro uentriculi orificio, duodeno intestino connascitur, quodq; apertioni constrictioniq; eius uentriculi orificij præesse arbitratus est. Verum ut id illius muneris gratia, haud fabricatum suo loco ostendimus: sic etiam hîc cum Galeno testamur, præsentem cerebri glandem meatum nequaquam obturare, uel ob hoc præcipuè quod haudquaquam meatum adeò cōtingat, ut antè ipsius orificium cōniungere posset. Verum ob id factam opinor, ut quemadmodum aliæ corporis glandulæ permultæ firmamentū esset uasi quod tertium cerebri uentriculū accedit, & ab ortu statim in frequētes ramos tenui membrana contextos diuiditur, id ipsum suffulciens, ne meatus illius principio statim in ingressu incumbens eum obstrueret, animalemq; spiritum ex tertio cerebri uentriculo in quartum ferri prohiberet.

g 12 fi. lib. 5
i. 15 fi. S.

h 6 fig. H.

DE TESTIBVS ET NATIBVS Cerebri. Caput IX.

PROPONUNTUR hæc primum in septima figura ad M, N. dein in octaua ad N, O & P, Q. postremo in decima ad E, G & F, H.

Test. & natura
cerebri numeri.

Situs.

Substantia.

Forma.



AS quoque cerebri partes illarum classi annumeramus, quæ^a dextram cerebri partem^b sinistræ continuam esse arguunt. Sunt autem testes hîc testesq; aliud nihil prorsus, quàm quædam cerebri particula in hoc fabricata, ut^c meatus ex tertio cerebri uentriculo quartum accedens uentriculum tutò citra aliquem à superioribus cerebri partibus compressum deducatur: neque etiam, etsi multitudinis nomine particula nominatur, ob id in plures disiunctasq; partes diuisa est. nam unica cernitur, elegāter à quadam similitudine hæc nomina sibi uendicans. Reponitur enim illa cerebri^d pars inter anteriorem cerebelli sedem, & posteriorem tertij uentriculi partem: deinde inferiori sede spectat dorsalis medullæ^e initium, superiori eam cerebri partem quæ cerebello iam inniti incipit. Continuat^fur autem cerebro, aut (ut rectius dicam) à cerebro nascitur tota, anteriori scilicet sede sua & inferiori: in lateribus autem & superiori & posteriori partibus nulli particulæ continua est, sed tantū tenui membrana ut reliqua cerebri superficies obducitur. Substantia ipsius, quoniā tenui membrana succingitur, subflaua est, illiq; substantiæ cerebri respōdet, quæ proximè tenui membranae passim accedit. In superiori parte iuxta anteriora, glandula incumbit ipsi, quam paulo antè uasorum deductui præfectam ostendimus. Pars hæc, effigiem quandā exprimit, duabus sibi commissis natibus quàm similitam. Verum quoniam^h superior ipsius pars testes magis, propter glandem illam quæ peni assimilatur, refert, ueteres qui pueros iure hæreditario domi in cōsectionibus exercebāt, *διδύμους* eam appellauere. Nos itaq; illos imitati, testes ipsam & gemellos nuncupamus. Cæterum quia inⁱ posteriori inferioriq; huius corporis parte prominet orificium^j meatus illius qui ex tertio uentriculo quartū petit, quodq; id orificium similitudinem aniferre uideatur, & in posteriori huius cerebri partis sede^k impressio quædam instar lineæ transuerim feratur, superiora quodammodo ab inferioribus distinguens, huic posteriori inferioriq; parti *γαστήρ* nomen ueteres indidisse arbitror, nos autē natulas, aut clunes dicere poterimus. Cæterū temporis successu uidentur Græci hæc nomina cōfudisse, & partē hanc quæ meatum ex tertio uentriculo in quartū summa Opificis solertia deducit, cōtinetq; modò *διδύμους*, modò *γαστήρ* appellauisse.

43 fig. A, A.
b 3 fi. B, B.

c 7, 8 fi. K.
10 fig. B, C.

d 7 fig. M.
N ponuntur in H, K, & X, X.

e 1 fi. cap. 2
li. 4 D. aut hîc quod in 10 fi. habetur sub A, A, F, H.

f 7 fi. D, D.
g 7 fi. L, 10 fig. D.

h 10 fig. E.
G. quibus proximum est D.

i 10 figura F, G.

k 10 fig. C.
18 fig. K.

m 10 fi. in ter E, G & F, H.

DE CEREBELLI PROCESSIBVS VER

mis imaginem exprimentibus, ac demum tendinibus illos continentibus.

Caput X.

PROCESSVM horum natura potissimum petitur ex undecimæ figuræ C, D, & c, d. ac dein ex H, I. Octaua uerò figura huc quoque confert, ad medium R uersus L, & nonæ figuræ C, E.

SVPE

a8 fi. medi-
um R. 9 fi-
gure C.

b u figu. C,
D & H.
c u fig. c, d
& I.

d 8 fig. K.
e 10 fig. C.

f 10 figu. L,
M, N, O cū
E u figuræ.



VPERIVS cerebelli formam explicantes, cuiusmodi uermiformes cerebelli processus sint, innuimus. Dicebamus namque^a unam quodammodo cerebelli partem à prioribus in posteriora, ueluti in orbem duci, eamque talibus implexam reuolutionibus, ut uermis in ligno nascentis effigiem appositissime ostenderet. Duo huius partis apices, quorum^b hic anteriorem uentriculi cerebello & dorsali medullæ communis sedem respicit, ^c ille uerò posteriorem, procul dubio à dicta nuper similitudine ueteribus Græcis σκωληκοειδής nuncupantur. Nihil enim aliud sunt quam prominentior cerebelli substantia, uermē (uti dicebam) referens. At non satis scio, quid Galeno in mentem uenerit, quòd uermiformem processum^d meatus ex tertio uentriculo in quartum pertinentis^e orificio inferiori præfectum esse finxerit, ac uelut alterius tantum processus apicis^f ue usum explicuerit. Quamuis etiam uix satis mihi constet, utrum ipsorum, anteriorem uidelicet aut posteriorem indicauerit. Nam si priorem intelligit, is suo apice, quum ad posteriora ex anterioribus ducetur, ad meatus orificium nequaquam sese producere posset: imò si proreperet, in posteriora magis dirigeretur, ^g communem cerebelli & dorsalis medullæ uentriculum potius occupaturus. Posterior processus, qui in priora ex posterioribus protenditur, præterquam quòd suo apice in cerebelli sinus substantiam confundi magis quam prior uideatur, neque ut ille promineat, neuiquam ad communis eius uentriculi orificium usque produci posset. Sed quorsum hæc commemoro? quum neminem ambigere arbitrer, meatum illum ex tertio cerebri uentriculo in illum qui cerebello dorsali^h que medullæ communis censetur, pertinentem, nunquam debere occludi, quum nullum obstructionis usum, quicquid nobis confinxerimus, indagare ualeamus: quum interim ut continuò in dorsalem medullam animalis spiritus confluat, illum perpetuò patere ex usu sit. Neque quenquam, nisi fortè ab Alberto, Thoma, Scoto, eiusque cohortis Theologis, edoctum esse opinor, qui alterum uermium (nam utriusque par usus in unius orificij clausione esse nequit) meatus huic præfectum esse sibi persuaderet, ut phantasmata in memorie sedem, quam in cerebello esse confingunt, ingredi sineret: & rursus fures in memorie carcere colligatos, in medium uentriculum, quem rationis sedem esse aiunt, transmitteret. Siquidem frustra tunc rerum Opifex Deus eiusmodi uermiformes processus cani, ouibus, & id genus animalibus, quibus illi nullam ratiocinandi uim ascribunt, largiretur. Sed unde, obsecro, huic processui iste ex uoluntate sua pendens motus obtingeret? & si ipsi processui aliquis fortè motus peculiaris alicuius substantiæ aut temperiei ratione assignandus esset, nō tamen uermis modo processus is educi contrahiⁱ que posset: quandoquidem reuolutiones illæ, quarum gratia processus isti uermibus comparantur, non orbiculatim ipsos ut uermium gyros ambiunt: neque quo sese processus illi rependo firmarent aliud est, quam qua secundum eorum etiam ductum continui sunt cerebelli substantiæ. Vtunque sit, mihi in præsentia sat est, locum constructionemque horum processuum indicauisse: illis interim nullum motum aut usum aliū tribuenti, quam reliquæ cerebelli substantiæ. & si quid confingere liberet, non unius tantum processus, quem Galenus aliquando duntaxat cognouisse uidetur, sed duorum, quos rursus solo multitudinis nomine indicauit, usum nugacissime ementirer, intrepide asserens anteriorem quum elongatur, atque in posteriora magis ducitur, sese extenuare, atque principium quarti uentriculi, cuius superiorem sedem constituit, amplius apertiusque reddere. Posteriorem uerò processum similiter in anteriora aliquando produci, ac attenuari, ob idque^j uiam aperire confingerẽ, quæ ex quarti uentriculi posteriori sede in dorsalis medullæ regionem, quæ modò ex caluaria procidit, instar meatus cuiusdam terminatur. Atque ut processus quoties extenuarentur, apertioni præesse dicerem: ita rursus eosdem collectos, ob idque in crassatos meatus, quibus præsumt, angustiores reddere affirmarem. At mihi non libet paruam aliquam, eamque falsam Creatoris industriam recensere, & interim reliquum cerebri artificium propemodum uniuersum destruere. Vnde etiā multo maxime Galenum miror, qui tenuis membranæ partes cerebellum cerebri testibus^k colligantes, tendines & ueluti uincula appellauerit, quæ utrinque latera uermiformis processus complecterentur, ne fortè dum is mouetur, in obliquum declinet. Nihil enim aliud sunt illi Galeni tendines uincula^l ue, quam nunc dictæ tenuis membranæ portiones. Mirum quoque est, eam tenuis membranæ^m sedem, quæ dorsali medullæ posteriorem cerebelli partem, quæ uermiforme illud corpus intrò ac ad anteriora uersus quartum uentriculum reflectitur, colligat, in tendinum numero Galenum non reposuisse, quum illa membranæ portio posteriorem processum exactius quam priorem eius sedis membranæ pars dirigeret.

DE INFUNDIBULO, ET GLANDULA

pituitam cerebri excipiente, reliquisq; ductibus eandem expurgantibus. Caput XI.

H V C primum spectant *M*, *M* tertiæ figuræ sinus notātia, ad callosi corporis latera positos. Dein septimæ & octauæ figuræ *I*, meatum indicās, qui ex communi dextri & sinistri uentriculorū cerebri cōcauitate pituitā deducit. Postea *S* decimæ tertiæ figuræ, & *C*, *C* decimæ quartæ, & *E* decimæ quintæ, & *B* decimæ sextæ ac decimæ octauæ peluim indicāt pituitā excipientē. Glans uero in quam hæc distillat, notatur *A* decimæ sextæ, & *E* decimæ septimæ, & *A* etiā decimæ octauæ: ubi *C*, *D*, *E*, *F* obiter ductus notant, pituitam à glande deferētes.



Breuis enumeratio partium ad pituitæ defluxum famulantium.

Meatus ex tertio cerebri uentriculo e ducti.

Peluis in quā cerebri pituita defluit.

Glandula pituitæ excipientis historia.

ALVARIAE futuras ad fuliginosorum cerebri excrementorum transitum summopere opitulari, primus liber ubi futurarū usus recensiebatur, ostendit. Præsens autē locus exigat, ut partes singulas pituitosæ excretioni famulantes enumeremus. Sunt autē hæc, duo in cerebri substantia insculpti meatus, dein tenuis membranæ portio infundibuli instar efformata, postmodum glandula infundibuli huius mucronem excipiens, & meatus à glandula hac ad palatum nariumq; foramina pituitā deducentes. Duos equidem cerebri meatus, quum tertium cerebri uentriculum, seu communem dextri sinistriq; uentriculi cauitatem prosequeretur, antea recēsiui, ac ^b unum quidem insigni satis amplitudine ex media cōmunis cauitatis sede rectā deorsum in cerebri substantia insinuatū descendere dixi, ita fanē ut præsentis meatus finis ē regione eius caluariæ^c partis sit, quæ sinum^d glandulæ qua cerebri pituita excipitur reponendæ aptum, constituit. Alter meatus, quem rarissimē obseruauī, quicq; dicto longē arctior secantibus occurrit, ac ex^e meatu illo deducitur, qui à tertio uentriculo in quartum per cerebri testes natesq; pertingit. quamprimum enim meatus is cerebri testes subire incipit, ex anteriori inferiori ue ipsius sede, alter pituitæ expurgandæ subseruiēs cerebri meatus producit, sensim deorsum in anteriora tantisper protensus, dum in finem primi meatus terminetur, idemq; ex ambobus meatibus orificium cōsurgat. Adhuius^g orificij latera, tenuis membrana etiam hic cerebelli basim succingens, orbiculatim à se educit sui^h portionem processum ue, substantia prorsus cum reliqua tenui membrana similem, nisi quod gracilibus prorsus uenis, quanq; interim frequentibus, intertextitur. Præsentis processus initium accuratē refert elatissimā regionem infundibuli, quo in angustioris orificij lagenas uinum infunditur. est enim amplum, & orbiculare. Ab exortu uerò sensim in arctum infundibuli quoq; modo cogitur, donec tandem ueluti in angustā oblongamq; fistulam similiter atque infundibula finiat, quæ deorsum protensa, per peculiare sibi in dura cerebri membrana excisum foramen descendit, suo mucrone adⁱ glandem qua cerebri pituita excipitur, desinens. Adcō ut uniuersum hoc membranæum corpus infundibulo, & imagine, & usu quāmsimilimum censerī debeat, unde etiam Græcis *χοάνη* nuncupatur. quanquam etiam à scyphi, seu in qua in balneis lauamur conchæ forma (quam superior huius corporis pars exprimit) *ωέλως* appelletur. Nihilominus alibi à nominū impositoribus, humilior corporis huius infundibuli fistulæ non absimilis, *χοάνη* dicta uidetur. reliqua autē pars superior, quæ sensim in arctum desinit, magnaq; ex parte uisorijs neruis quā illi inuicem cōeunt, subēditur, *ωέλως*. Rursus integrū hoc membraneum corpus, *ωέλως* nonnullis uocatum uideo: glandem autem in quam pituita distillat, *χοάνη* quasi forma quæpiam esset, in quam aliquid infunditur. Et si ueteres, qui generis successione pueros Anatomen edocebant, id nomen glandi nō attribuerint, eam inter omnes in caluariæ amplitudine repositas partes solam priuato nomine indigā reliquisse uidebuntur. Locatur autem glandula sub dura cerebri membrana in proprio ipsi in osse cuneum imitātē exsculpto^l sinu, cuius etiā effigiem exprimit. depressa nanq; est, & in humiliori parte quodāmodo gibbosa orbicularisq; in superiori uerò concava, & sinu quodam insinuata, secundū orbem nō prorsus circularis cōspicitur, uerū paulo minùs toto quadrata. Substantia constat glandulosa, sed cæterarum glandiū corporis substantia longē duriori & compactiori. Omni ex parte tenui membrana obducit, quæ aut ab infundibuli termino glandulæ sinui innato exoritur, aut etiā à membrana caluariæ os tota illa sede succingēte, qua in hac regione dura cerebri membrana à caluariæ osse abscedit, distatq;. Huius caluariæ ossi obductæ inibi membranæ interuētū glandula firmatur, & etiā duabus insignioribus soporalium arteriarū propaginibus adhæret, quæ ad ipsius latera^m prorepūt, & ridiculē in hominibus reticularē plexum formare cæteris dissectionis professoribus credūtur. Nō secus profectō quā si & illarū propaginū gratia, hæc glandula effingeretur,

a Spectantur figuris ca. 6. lib. 1.

b 7, 8 fig. I.
c 3 fig. ca. 12
lib. 1. M. aut
hic ad D
14 fig.
d 16, 18 figura A.
e iuxta K 8
figura.
f 7, 8 fig. K
10 fig. B, C.
g 14 fig. D.
h 14 fig. C, C.
i 16, 18 fig. B.

i 16, 18 figura A.

k 13 figure
est sub M,
N, O.

l 3 fig. ca. 12
li. 1. M.

m 1d petes
ex 16 figu.

geretur, ipsisq; eundem præberet usum, quo reliquæ glandulæ uasorum distributionibus ductibusque firmandis & suffulciendis, præsumt. Porro ad huius glandis latera deorsum utrinqueⁿ canales duo descendunt, ac unus quidem uersus anteriora prorepat in^o foramen de-
n 18 fig. C, D & E, F.
o 1, 3 fig. ca. 12 li. 1 G.
p 14 fig. G. q 2, 3 fig. ca. 12 lib. 1 X.
r ultima fi. lib. 3.
 sinens, quod^p secundum cerebri neruorum par deducit, quodq; contra Galeni placitum multo uisori^j nerui foramine maius esse innuimus. Alter uerò in posteriora magis descendit, atque per inæquale asperumq; foramen seu rimam ducitur, quæ ad anteriorem sedem lateraq;^u foraminis quod soporalis arteriæ^r insigniorem ramum in caluariæ amplitudinem transmittit, habetur. Atque hæc omnia pituitæ cerebri euacuandæ ministrant. quippe duo meatus, quos in cerebri substantia inscisos diximus, ex cerebri uentriculis humorem illum deducunt, atque in infundibulum defluere sinunt. Ipsum autem infundibulū superius amplum latumq; extruitur, non horum duntaxat meatuum, qui in unum tandem orificium desinunt, occasione, uerum etiam ut fines illos dextri sinistriq; uentriculorum cerebri contineret, quos ex posteriori uentriculorum sede deorsum in anteriora reflexos inter cerebri reuolutiones hîc desinere commemorauimus, quando quidem & hi suæ sedis pituitam deferunt, atque in infundibulū exporrigunt. Præterea infundibulū ea cōstat amplitudine, ut si quid pituitæ super^o callosum corpus & sinus illos colligeretur, quos ad callosi corporis latera conspici retulimus, id ipsum in infundibulum tenuis membranæ beneficio procumberet. Siue enim eiusmodi humor ab anteriori callosi ac instar arcus protuberantis corporis sede, siue à posteriori descendat, ad tenuem membranam cerebri basim inuestientem influere, & hinc paulatim in infundibuli amplitudinē prolabi potest. Infundibulum uerò ab omnibus his ductibus pituitam excipiens in angustum cogitur, ut tandem hanc per unicum & priuatim sibi in dura membrana patens foramen deducat, ac innoxie in illius glandulæ centrum promanare sinat. Glandula quadam substantiæ familiaritate defluxus impetum sustinens, & quantum conijcere possum, os ab iniuria uindicans, pituitam hanc excipit, ac sensim citra stillicidium à lateribus suis eam undequaque defluere sinit, per omnia foramina hîc in caluariæ basi tum uenis tum arterijs tum neruis ipsis exculpta. Priuatim enim pituitæ gratia foramen nullum ossi insinuatur, nisi forsitan rima anteriorem sedem lateraq; foraminis soporalis arteriæ insigniorem ramum deducens ambiens. Ridiculū nanq; est, quod Galenus de foraminibus spongiarum aut cribri perforationes referentibus nusquam nō comminiscitur, quum huius generis foraminulum sub glande nullum consistat. Quod te malim
53 fig. L, L. t 3 fig. M, M.
 exⁿ ossis cuneum imitantis constructione, & deinde humoris defluentis lentore & substantia metiri diligenterq; expendere, quàm re oscitanter indagata, solis autorum suffragijs deditum impietatis me arguere, tanquam Galeni omniumq; quos legi dissectionis professorum decreta hîc perturbem, quibus illi nos in tantam conditoris admirationem allicere se arbitrantur: non perpendentes, si ad eum modum quem illi ementiuntur, Deus os illud creasset, quàm parum fuisset prouidus, qui hîc continuum os ne pituita quicquam ipsi incommodaret procreandum duxerit, tantum abest ut foraminibus peruium (ut ipsi confingunt) fabrefecerit, præcipue quum hæc caluariæ pars tantis foraminibus neruorum, uenarum & arteriarū gratia sit insculpta, & ipsum cuneiforme os hac sede qua glandula ei incumbit, intus^x duas tam insignes & notatu dignas cauernulas adipiscitur, duobus foraminibus in narium amplitudinē, uti in primo docuimus libro, pertinentes: & si quādo illæ cauernulæ, quemadmodū inter secundū aliquādo uidimus, nō occurrēt, tunc os ipsum inibi ut calcis aut tali os solidū uisitur, & nihilæque promptè cōmonstrat, ac per ipsius foraminulas seu cauernula pituitam neutrquam defluere. Decumbit itaque pituita & in palatum per ea quæ palatum spectant foramina, & non minima profectò
88 fig. cap. 6 lib. 1.
 portione per foramen secundi paris neruorum ad oculorū sedis radicem, & hinc per^y amplum foramen cum alijs quamplurimis foraminibus, cæteris ignotum dissectionis professoribus, in narium amplitudinē fertur. Neque etiam ambigo, aliquem & hîc admiraturum, quamobrem nullos adhuc meatus pituitam ad olfactus^z organorum sinus deducētes enarrauerim: quod sanè non ob aliud accidit, quàm quod nullam prorsus pituitam per hos sinus expurgari aut ulem, mirerq; plurimū, qua fronte alij per tenues illos ac neruis nō ab similes cerebri processus, quos olfactus organo tribuimus, ab anterioribus cerebri^b uentriculis pituitā ad nares deduci, non erubuerint scribere: quū nullus omnino in ipsis meatus sit, neq; etiā in hominibus ea consentiant crassitie, ut uel meatum quo pituita deduceretur, habere possent. Adde nullū prorsus pituitæ ductū ad olfactus organorū sinus imaginari posse, nisi fortassis^c anteriore callosi corporis regionem, quæ pituitam sibi influentem in illam sinuum olfactus organorū amplitudinē dimittere queat: uti fortassis accidit, si quando cerebrū nimia pituita uexatur. unde etiam non naturalis per nares pituitæ fluxus perficitur, & pruritus, calor, dolor & odorandi uirtutis noxa, eiusq; generis symptomata oboriuntur quamplurima, quemadmodū indies in distillationibus
9 Queritur sub charactere & in 12 cap. li. 1. 213 fig. L, L. 413 fig. D, G & D, G.
66 fig. D, D. & E, E.
inferius L 3 fig.

Canales a glande deducti.

Earum partem quas pituita expurganda subseruire hacenus diximus, usus, & constructionis ratio.

bus quæ ad narium summa pertinent, ac grauedines nuncupamus, accidere experimur. adeo sanè ut si adamussim singula perpenderimus, necessario per olfactus organorum sinus foraminula ue aut cribri aut spongiæ modò forata, quum lege Naturæ homo dispensatur, nihil pituitæ defluere fatendum erit; & si fortè casu defluit, non minus præter naturam fluxum esse donabimus, quàm quum foramina quæ ad glandis exsculpuntur latera, totam pituitam non adamussim deducunt, hæcquæ deorsum uersus^a foramen dorsali medullæ transmittendæ paratum decumbit: ac cum dorsali prolabens, in dorsum, & dein secundum neruorū ductum modò in brachia, modò in crura, modo in lumborū musculos, modò aliò quouis promanat. ut nunc taceam, quàm grauiter Natura ueniret inculanda, quæ tam patētes amplosquæ pituitæ in caluariæ amplitudine, dum adhuc tenuis aquea^b est, ductus fecisset, adeo autē retortos angustosquæ & inflexos in^c octauo capitis osse produxisset.

d Quo de-
ducitur H
9 figure.

e 8 fi. c. 6.
li. 1 A, B, A.

DE CEREBRI PLEXIBVS, QVORVM

alter reticulari, alter secundarum efformato plexui similis esse creditur.

Caput XII.

HVC facit maxime decimi quarti Capitis libri tertij figura, & huius libri figura quarta & quinta ad O, O, sexta ad M, N. & dein tota fere decima sexta & decima septima.



In lib. de Ve-
narum & ar-
teriarum secti-
one.

VANTVM Galeno dissectionis professorum facile principi à medicis & Anatomicis illum secutis nōnunquam præter rationem attributum sit, uel beatus ille & mirabilis plexus reticularis attestatur, quem is nullibi non in suis libris inculcat, quoquæ nihil frequentius medici in ore habent, eumquæ etiā si nunquā (uti ferè nulla in humano corpore) uiderint, ex Galeni sententia enarrant. Verū ut alios taceam, ipse meam stupiditatem & nimiam in Galeni aliorumquæ Anatomicorū scriptis fidem haud satis demirari possum, qui adeo in Galenum affectu laborauerim, ut nunquam in publicis sectionibus humanum caput, absque agnino aut bouino ostendere aggressus fuerim, ut quod in homine neutiquam reperi-rem, id ouillo capite refarcirem, spectatoribusquæ imponerē, ne plexum illum nomine omnibus notissimum, neutiquam inuenisse dicerer. Nihil enim minus à soporalibus arterijs, quàm eiusmodi reticularis plexus, quem Galenus recenset, perficitur. Multoquæ minus arteriæ foramen quod ipse tradit ingrediuntur, aut totæ etiam in plexum illum absumuntur. Primum enim^a tota soporalis arteria dextra (est enim eadem utriusque ratio) caluariam petens per unum foramen indiuisa, uti Galenus commemorat, non ingreditur, uerū ubi ad caluariæ usque basim conscendit, insignem sui propaginem ad^b foramen nerui^c sexti neruorum cerebri transmittit, quæ unà cum grandi^d uena sibi coniuge in dextrum, primumue duræ cerebri membranæ sinum exhauritur. Secundò soporalis arteria nequaquam commune^e foramen cum^f tertio neruorum pari obtinet: uerū longè maiori industria, quàm Galenus arbitrabatur, rerum Opifex usus est. maiori nanque soporalis arteriæ ramo^g obliquum & in osse diu procedens foramen machinatus est, in cuius ductu id fieri uoluit, ob quod Galenus plexum efformatum confinxit. ut enim uitalis spiritus in multis gyris anfractibusquæ arteriæ excoqueretur, apta^hq; animali spiritu efficiendo materia fieret, Galenus arteriam ilico atquæ in capitis amplitudinē ingressa esset, in innumeros ramos diffundi dicebat, qui inuicē ita imponderetur commisceretur ue, ut plexum efformare uiderentur illi similem, qualem in collecto piscatorio reti fieri cernimus: aut illi plexui, qui ex pluribus inuicem incumbētibz retibus consurgeret. Atque hunc imple- xum inter os & duram cerebri membranam fieri asserit, interim tamen duræ membranæ por- tinnacula quæ os succingeret, plexui substrata. Deinde ut plexus ille ex uno uase, aut si dextrū si- nistro coniunctū fingit, ex duobus complicari incipit, ita quoquæ plexus huius surculos sensim colligi, ac tandem in duo rursus uasa desinere attestatur, molle illis uasis respondentia, quæ plexum efformare dicebātur. Quàm uerò hæc ab omni prorsus ueritate sint aliena, quantumquæ Naturæ oscitantiam arguant, is demum percipiet, qui ueram eius arteriæ soporalis rami seriem didicerit, quem per oblongum illud ossis foramen in caluariam penetrare diximus: & ut ple- raque taceam, expenderit pariter, quàm impossibile sit uasa æquè grandia cerebrum petere, atque in caluariam primum pertingunt, quum tam insignesⁱ rami duræ membranæ latera, & per^k foramina secundi paris neruorum ad oculos, ac ad narium amplitudinem ab illis uasis priusquam tenuem accedant cerebri membranam dispergantur. Cæterum quæ horum uaso- rum uera sit series, in tertio libro dum cerebri uasa non minus quàm reliquas corporis uenas & arterias persequer, adeo uerè & ad amussim describere conatus sum, ut hic locus neutiquam eius

Hic specta-
bis 16 et 17
& ipsi pro-
ximā figu-
ras.

a fi. cap. 12
li. 3 Z. et fi.
ca. 14. lib. 3
B. quod di-
uiditur in
F, G.

b 2, 3 fi. ca.
12 li. 1. c.

c 1, 2 fi. ca.
2 li. 4 c.

d fi. cap. 14
lib. 3 C.

e 2, 3 fig. ca.
12 li. 1 Q.

f 1, 2 fi. cap.
2 li. 4 M.

g 2, 3 fi. ca.
12 li. 1 X.

h Ut specta-
tur 17 fig.

i fi. cap. 14
lib. 3 r, x, f.
k 1, 2 fi. ca.
12 li. 1 G.

l. fi. cap. 14.
lib. 3. d. 7.
hic 4, 5 fig.
O. 6 fig. M.
N.

eius seriei enarrationem expetat: uerum si memoria quæ illic complexus sum exciderint, eò lectorem remitto, hortorque ut illo capite diligenter perlecto, id uniuersum hîc denuò poni sibi persuadeat. Porrò ut huius soporalis arteriæ ramî sobolem ibidem enarraui, sic etiam plexus, quem extimo foetus inuolucro comparamus, naturam quoque inibi recensui: ac proinde in præsentia duntaxat superest, ut studiosos qui duobus proximè præcedentibus annis mihi secanti non astitere, sedulo ad *u. p. l. u.* horter, quo iam admoniti, corporis humani fabricam Galeni meaq; descriptione perlecta diligenter expendant, in posterumq; Anatomicorum libris minus fidei adhibeant. Hîc autem denuò cerebri plexuum obiter memini, ne quid in cerebri constructione hoc libro præterîsse uiderer. Atq; quo minus id fiat, singula sensuum organa seriatim iam aggrediar.

DE OLFACTVS ORGANO.

Caput XIII.



LIBRI quarti tertium Caput conscribens, atque necessario propternaturorum seriem olfactus organi constructionem prosequens, arbitrabar me hoc loco certius aliquid de olfactus instrumento præcepturum, quam illo Capite nudam constructionem enarrans, faciendum duxeram. Verum quum aliud nihil certius mihi studiosè admodum odoratus organi naturam inquirenti haftenus occurrerit, præsens Caput cum illo commune esse uelim. Præter^a duos enim illos neruis non absimiles cerebri processus, qui in^b octauæ caluariæ ossis sinus pertingunt, & frontis ossis^c sinus, & substantiam illis contentam, &^d foramina tum duræ cerebri membranæ, tum ossium hîc recensere possem. Nollem namque hîc de odoribus, & huius sensus medio, & dein temperie aliquid pertractare, ne in immensum hîc meus conatus, qui præter opinionem iam excreuit, impensius crescat.


12 fig. C.
D. 13 fig. L, L.
b 8 fi. ca. 6
li. 1 A, B, A.
c 3, 4 fi. ca.
12 li. 1 K.
d 13 fi. D, D
G, G.

DE OCULO VISVS INSTRUMENTO.

Caput XIII.

PRIMA DECIMIQUARTI CAPITIS

FIGURA.



HÆC figura earum quæ præsentî Capiti præponuntur prima, alteram oculi partem exprimit, una sectione ab anteriori sede per posteriorem, atq; ita per neruum uisorium diuisi: perinde scilicet, ac si quis diuisæ secundum longitudinem cepæ alteram partem ea superficie delinearet, qua alteri parti connata continuaq; fuerat. Atq; hoc quoq; modo cælos, & quatuor elementa in plano depingere solemus.

A Humor crystallinus.

B Tunica anteriori humoris crystallini sedi obducta, & tenuissima ceparum pellicula instar pellucida.

C Humor uitreus.

D Nerui uisorij substantia.

E Tunica quam reti assimilamus, quamq; resoluta uisorij nerui efficit substantia.

F Tenuis cerebri membranæ portio, neruo uisorio obducta.

G Uuea tunica, in quam tenuis uisorium neruum induens membrana degenerat.

H Hac sede uuea tunica in posteriora cõprimît, neq; corneâ exterius illi obductâ cõtingit tunicâ.

I Foramen, quo uuea foratur, ipsa uue pupilla.

K Tunica ab uuea initium ducens, & cilijs seu palpebrarum pilis imagine correspondens, ac interstitium pariter uitrei humoris ab aqueo.

- L* Durae cerebri membranae portio neruum visorium obuoluens.
M Dura oculi tunica, quam dura cerebri membrana constituit.
N Durae oculi tunicae pars, quae cornu instar pellucida visitur.
O, O Humor aqueus, atque inferius *O* sedem indicat, in qua suffusiones plerunque proueniunt.
P, P Musculi oculum mouentes.
Q Adhaerens, albaue oculi tunica. Caeterum subsequentes modo figurae seriatim oculi partes exprimunt, primum quidem humores, ac dein tunicas. Atque has figuras omnes semper ad primam quam modo expressimus, non inepte contuleris: quandoquidem illae compositionis ordine inuicem subsequuntur, ac ad primae huius figurae proportionem sunt expressae.

SECUNDA. III.

IIII.

V.

VI.



DECIM ET OCTO FIGURARVM HIC SERIATIM
 primam subsequentium, & earundem characterum Index.

- SECUNDA* figura solum crystallinum humorem anteriori sede ita exprimit, quemadmodum is omnibus illum ambientibus partibus liberatus, è directo intuenti occurreret.
 Tertia figura nudum prorsus crystallinum humorem commōstrat, ea sede se ostendentem, qua
R. ex latere, ut ita dicam, ab aliquo spectaretur. Verum *R* asperitatem, sedemque notat, cui oculi tunica

tunica palpebrarum pilos referens, ac undecima & duodecima figuris exprimenda, humori crystallino connascitur.

Quarta figura humorem vitreum ita effectum demonstrat, quemadmodum is si suam formam, quam in oculo obtinet, reseruaret, in anteriori ipsius sede conspicuus esset, quum crystallinus humor ex illo euulsus esset. S enim cavitatem ipsius indicat, in quam media crystallini humoris pars reponebatur.

Quinta figura vitreum humorem eadem facie qua quarta exprimit, verum adhuc ipsi crystallinus humor T notatus innatet.

V. Sexta vitreum humorem ex latere exprimit, unam cum crystallino, qui ipsi adhuc innatans V notatur.

Septima figura aqueum humorem ex latere ita exprimit, quemadmodum in oculo consistit, & adhuc anteriorem crystallini humoris sedem integrit. X namque crystallinum humorem in presenti Y figura notat. ac Y eam humoris aquei sedem indicat, qua uveae tunicae pars in ipso (dum integer est oculus) continetur, quae a cornea abscedit, distatque.

a, b. Octava figura vitreum humorem a notatum, & aqueum b insignitum simul demonstrat, ita inuicem distitos, quemadmodum ea dirimuntur tunica, quam palpebrarum pilis non perperam in effigie assimilamus. Atque huius tuniculae sedes inter hos humores consistens c indicatur.

Nona figura tunicam anteriorem crystallini humoris sedi obnatam, & insigniter pellucidam, atque hic ab ipso humore liberatam, a latere exprimit.

Decima figura crystallinum humorem a latere ostendit, adhuc ea tunicula intactum, quem nona figura expressit. atque hic d tuniculam, e uero crystallini humoris partem indicant posteriorem, & illa tunicula non obductam, sed in vitreo humore, quum integer est oculus, natitantem.

Undecima figura anteriorem seu posteriorem partem indicat tunicam quam uvea producit, quaeque palpebrarum pilis assimilatur. Caeterum haec circulo g & g notato ab uvea pronascitur, circulo f, f. autem f & f insignito crystallino humori inseritur, adnascitur uero.

h, h. Duodecima figura tunicam, quam undecima ostendit adhuc vitreo humori obductam, & crystallino adnatam continet. h enim & h tunicam notant. i uero, humorem crystallinum.

i. Decima tertia figura, tunicam ostendit, quam reti dissectionis periti comparant, atque haec a latere exprimitur unam cum nerui uisoriae substantia k insignita, & dura tenuisque cerebri membranis libera.

Decima quarta figura uveae tunicae internam ostendit superficiem. hic enim ipsam euersam, uti inter secandum fit, delineauimus. l itaque portiunculam notat tunicam, in quam uisoriae nerui substantia dissoluitur. m sedem, in qua anterior uveae regio introrsum seu in posteriora comprimitur.

Decima quinta figura externam uveae tunicae superficiem ex latere delineatam continet, unam cum nerui uisoriae substantia, tenui membrana cerebri obducta. n enim nerui uisoriae substantiam o notat, hic a tenui qua inuoluitur membrana liberam. o tenuis notatur membrana, nerui uisoriae substantiam integens, & hic a dura membrana, quae ipsam quoque ante sectionem obuoluit, denum data. p, p uenarum arteriarumque a dura oculi tunica in uveam pertinentium sunt portiunculae, q, q. iam ex serie sectionis effractae. q, q sedes, qua uvea tunica anteriori in parte comprimitur, & a cornea abscedit, r foramen, uveae pupillam constituens.

Decima sexta figura duram oculi tunicam ex latere demonstrat, transuersa sectione in hoc diuisam, ut series in conspectum ueniret, uasorum ab ipsa in uveam pertinentium. Significet igitur s neruum uisorium, unam cum duabus illum inuoluentibus membranis abtruncatum, & uenis arterijsque concomitatum. t uero & t uenas, arteriasque per duram oculi tunicam excurrentes. u autem u uueam tunicam hic propter durae scissionem, conspicuam, & ramulos durae tunicae uasorum excipientem. Caeterum x sedem indicat, ubi dura oculi tunica instar cornu laeuigatur, pellucidaque cernitur. sedi autem y notatae pupillae respondet foramen.

Decima septima figura integram nudamque durae oculi tunicae externam superficiem ex latere spectandam exhibet, unam cum magna uisoriae nerui portione, in qua a notat ipsius substantiam, b, y, d. b uero tenuem qua obducitur membranam, y autem duram cerebri membranam, d uenas arteriasque neruum uisorium concomitantes. Porro x, & dein y, idem hic atque in decima sexta indicant.

Decima octaua figura oculum à palpebris liberatum, atque ex sua in caluaria sede erutum, una cum ipsius musculis nondum disiectis à latere exprimit. atque neruum indicat uisorium, & musculos oculum mouentes, & adhærentē oculi tunicam, & maiorem oculi circulum seu iridem, ubi adhærens membrana desinit, corneæq; tunicæ pertinacissimè adnascitur. * autem sedem notabit, è regione pupillæ seu minoris circuli consistentem.

Decima nona figura anteriorē oculi integri, & à palpebris tantum liberi sedem exprimit. atq; hic a carunculam insinuat, in maiori oculi sedis angulo repositam. * uerò & & deinde, idem hic atque in præcedente figura indicant. Cæterum si alicui oculi enarrationem ab extimis ipsius partibus persequi uisum sit, is inuerso oculi figurarum ordine decimā nonam secundæ loco habebit, & decimā octauam tertiæ, atq; ita deinceps.

Oculorum
situs.

Oculi constructio
quo quæ enarranda.



ATIONEM formationis capitis primo libro perquirentes, oculorum situm, qui neminem latet, descripsimus. in secundo autem libro oculorum numerum & mouentes ipsos musculos, uti & palpebrarum quoque naturam necessario edocuimus. In præsentia uerò oculi sphaeræ modò exactè rotundi constructionem enarraturis, eam à centro aut ab ultima ipsius circumferentia auspicari integrum erit: perinde ac si oui constructionem quis, ab ipsius luteo ad album, & deinde ad tenuem membranulam albo obductam, &

postea ad putamen crustam uel aggredieretur: aut à crusta ad tenuem eam membranulam, ac deinde ad album, & hinc ad luteum enarratio fieret. Pari prorsus modo quo mundi partes, aut à terra ad aquam, aërem, ignem, lunæ coelum, ac sic deinceps ad extremum usque coelum, aut ab hoc coelo ad centrum usque mundi, ipsam uidelicet terram, recenseremus. Mundo namque & ouo oculi fabrica quod ad constructionem spectat, conferri potest. Quam quo exactius tradatur, eademque postmodum memoriæ firmitus hæreat, à centro primū ad extremā superficiem, & postmodum ab hac ad illud pertractabimus. Est itaque oculi centrum humor, quem Græci λευκωμασιν uocant, uti & nos quoque, qui & glaciale illud nuncupamus, à similitudine nimirum quam cum lucidissima glacie & exactissimo crystallo obtinet, non quidem in consistētia aut duritie, uerum in colore, seu luce potius & pelluciditate. Est enim is humor optimi crystalli modò pellucidissimus, & omnia quibus iam exemptus uitri alicuius modo imponitur impense quorundam specillorum ritu adaugens. Consistentia autem ea constituitur, ut ab oculo liberatus non defluat, sed ipsius rotundam formam molliusculæ ceræ ritu seruet. Atque hæc non exactè rotundum exprimit globum, sed & anteriori & posteriori parte leuiter non secus compressum, quam si ex lignei globi medio secundum lineas æquidistantes orbem crassiusculum ferra eximisses, & deinde duas globi partes denuò conglutinasses, adeo ut præsens humor in anteriora & posteriora minus protuberet, quam secundum orbem in latera, & superius & inferius quodammodo ad lentis similitudinem, unde etiam hunc humorem φακωσιν Græcis nuncupatum fuisse arbitror, etiam si nescio quam oculi tunicam alij ita uocare uideatur. Superficie constat læui & insigniter lubrica. Vniuersæ ipsius anteriori sedi tunica obnascitur instar tenuissimæ ceparum pelliculæ, cuiusmodi inter crassiores ceparum orbis reperimus, tenuis & exactissimè pellucida. at hæc tunica eius generis ceparum pelliculæ durior est, ac (ut dicebam) toti anteriori humoris crystal lini sedi obducitur, nulla parte posteriore ipsius sedem contingens, sed inibi finiēns, ubi crystal linus humor amplissimus cernitur: & ipsius capacior consisteret circulus, si illum multis æquedistantibus circulis, seu lineis orbiculatim obuolutum fingeremus. Huic tunicæ nullum priuatim nomen inditum esse uidetur, nisi fortè à cōtinuarum aranæ telarum imagine hanc ἀραχνοειδὴς Græci uocauerint. respondet enim tenuitati, quamuis neuti quā robore & duritia, illis aranearum telis. Ego illam inter dissecandum, uti iam dixi, ceparum tenuissimis, ac pariter pellucidissimis membranulis cōfero: cornu etiam illam collaturus, si modò cornu in laminas diuisum tam tenue ac pellucidum & læue, atque hæc est tunica, reddi posset. Tunicæ enim huius substantia à cornu substantia nihil differt. Sit igitur præsens tunica secundum in oculi constructione nobis enarratum corpus, quod quidem anteriori tantum centri, hoc est humoris crystal lini parti, obducitur, ac uelut semiglobus tantum in oculi fabrica censendum uenit. Porro posterior humoris crystal lini sedes, dicta nuper tunica non obiecta, in alio continetur humore, qui instar medijs globi in posteriore oculi sede copiosus reponitur, uulgaris quidem albo uitro iam refrigerato colore seu luciditate correspondens. non enim adeo lucidus est, atque crystal linus humor, aut exactissimū crystal lum. Consistentia autem, humore crystal lino longè mollior uisitur: & ab oculo exemptus, suum terminum formam uel neuti quā seruat. quamuis interim aquæ modò non defluat, sed ita consistat, quemadmodum uitrum in fornacibus fusum, & ferreis canalibus

Humor crystal linus.



Tunica ceparum modo pellucida, anterioris humoris crystal lini sedi obducta.

Posterior humor.

41 fig. A. et tota 2, 3 fig.

61 fig. B. tota 9 fig. et 10 fig. d.

610 fig. c. d. 3 fig. R.

61 fig. C. et decim 4, 5, 6 fig. et 8 fig. a.

nalibus, quibus id ab artificibus à fornace eximitur, obuolui cernimus. Atque huiusmodi uitro quidem ita ignito, consistentia hic humor congruit: at non colore seu luciditate, quum humor, uti prius dixi, refrigerato uitro luciditate respōdeat, fufum autem uitrum candenti ferro colore quàm similitimum uideamus. Quando itaque præsens humor cōsistentia fuso uitro, luciditate autem refrigerato & formato iam uitro respōdet, *ὡς αἰσθάνομαι* Græcis, nobis uerò uitreus meritò nuncupatur. Atque hic humor multis numeris copiam crySTALLINI humoris superās, quum adhuc in oculo reponitur semiglobo similis est, cuius plana superficies oculi anteriora spectaret, rotunda autē seu conuexa in posteriora protenderet: & in cuius anterioris sedis, seu planæ superficiei medio¹ sinus imprimeretur tantus, quanta posterior humoris crySTALLINI pars est. Is namque humori uitreo ita immittitur, ac si globum in aqua natantem cerneret, cuius media pars exactē in aquam mergitur, altera supra aquam conspicua. atque ut inter eiusmodi globum & aquam nihil mediat, ita quoque inter crySTALLINUM & uitreum nihil prorsus intercedit: neque illi humores inuicē secus cōmittuntur, quàm globus aliquis in duriuscula pulte complecteretur. Porro reliquæ regioni sedis anterioris uitrei humoris crySTALLINO non occupatæ² tuniculam quandam obduci, suo loco dicam, quæ cilijs palpebrarum ue pilis assimilabitur, quæque orbiculatim lineæ modò crySTALLINO humori, ubi is amplissimus est, ³adnasci docebitur. Nunc autem ⁴inuolucrum mihi uenit enarrandum, quo posterior uitrei humoris sedes proximè cōtinetur, quàmque nerui uisorijs substantia in quarto libro constituere dicta est. ⁵Neruus etenim uisorius tenui, duraque cerebri membranis, & aliquot uenis arterijsque cōcomitatus, ad posteriorem oculi sedem fertur, ac illi nonnihil uersus externum oculi latus implantatur, ipsius substantia in inuolucrum iam enarrandum dissoluta. tenuis autem membrana nerui substantiam obuoluens, in ⁶aliā degenerat oculi tunicam, quæ uuea uocabitur, & dura quoque membrana in ⁷aliā quæ dura dicitur, & uenæ quoque & arteriæ (uti seriatim enarrabo) oculi constructionē subintrāt. Quum primū itaque nerui uisorijs substantia in oculum mergitur, mollior reddita dilatatur, in latum quoddam inuolucrum posteriori uitrei humoris sedi obductum, & nō ultra mediam oculi sedem in anteriora pertinens, & extremè gracilibus, sed interim cōspicuis uenulis, ac item arterijs intertexta. Hæ uenulæ à tunice radice antrorsum ductæ ipsi exporriguntur, quum primū neruus ille dilatatur. Cæterum Galenus in decimo de Partiu usu innuit, hoc inuolucrum à plerisque tunice nomine nō dignari: forsitan quod cæterarum tunicarum modo membranea non sit, sed mollis, & ueluti mucor aliquis ex naribus procidens. quum enim hoc inuolucrum secantibus in unum colligitur, atque à sua radice propendet, mucorem, aut cerebri substantiam aqua quapiā dilutā refert, nō enim ita solidum crassumque, ac cerebri substantia uisitur. Vt cūque uerò sit, siue tunica nuncupandū ueniat, siue minus, constat Galenum quoque in libris de Hippocratis & Platonis decretis, & item in octauo de Partium usu hoc inuolucrum, tunicam appellasse. Neque ego scio quod nomen illi aptius quàm inuolucrum, aut tunice indipossit: quum, uti diximus, toti posteriori sedi humoris uitrei proximè obducatur, illumque integat, perinde atque tenuis oui pellicula oui album tunc cōtinere diceremus, quum dimidiā oui partem ab alia effractam & adhuc oppletam manibus seruaremus. Est enim hoc inuolucrum forma dimidiato tantum ouo comparandum, aut minori piscatorum reti, quod uni accommodatur baculo, & ex ampla basi dimidiati globi modo in obtusum mucronem fertur. Ab huiusmodi enim retis imagine arbitror præsens inuolucrum Græcis *ἀμβλυροειδὲς* nuncupatum fuisse, nam retis formam, non autem plexum refert, quum undique sibi sit continuum. Nisi forte uenulas & arterias ipsi intertextas, quis reti assimilandas cōtenderet. Hactenus itaque quatuor oculi partes recensui, duos nimirum humores, & totidem tunicas: ac proinde iam meritò⁸ eam aggrediar tunicam, quæ à tenui membrana nerui uisorijs substantiam concomitantem⁹ producit. Mox enim atque hæc membrana simul cum neruo oculum subit, in tunicā degenerat ad omnes oculi sedes, globi modo, ut ita dicam, pertinentem. non enim uti nuper cōmemorata tunica, quam nerui producebat substantia, posteriorem oculi sedem solum occupat, uerum & anteriori quoque obducitur, & in tota posteriori oculi sede proximè tunicam inuestit, à nerui substantia pronatam, & in horum contactu prorsus nihil mediat, neque ambo etiam inuicem aliquo nexu præterquam contactu committuntur, quæ autem præsens tunica à tenui membrana conformata, anteriori oculi sedi obducitur, interna sua superficie undique¹⁰ humorem cōtingit & cōplectitur, quem aqueum & albugineum uocari paulo post audies. Externa uerò huius tunice superficies passim¹¹ ea tunica proximè obducuntur, quam à dura membrana uisorio obducta pronasci dicam: neque quicquam inter eas duas interuenit, sed ita inuicem cōmittuntur, quemadmodū dura membrana tenuem succingit in nerui uersus oculum progressu. Verum id priuatim huic tunice quæ à tenui pronascitur membrana accidit, quod exacti globi modo prorsus nō sit rotunda, nam anteriori regione

ὡς αἰσθάνομαι.
h humor.

Oculi inuolucrum ex nerui uisorijs substantia, solutū & reti cōparatū.

ἀμβλυροειδὲς
tunica.

Tunica à tenui cerebri membranarum, & uuea nuncupata.

obducitur

f 4 fi. S.

g 1 fi. K. &
11 & 12 fi.
i 12 fig. h, h
adnascuntur i.

k 1 fi. E. &
tota 13 fig.
deim 1, 2 fi.
cap. 2 li. 4 l
eductum
ex G.

l 17 fi. a cū
8, 7, d. aut
1 fig. E cum
F & L.

m 1 fi. G. et
tota 14, 15
fig.
n 1 fi. M. &
tota ferē
16 & 17 fi.

o 1 fig. G ab
Feductum.
& tota ferē
14, 15 fi.

p 1 fi. O. O.
& 7 fi. &
8 fig. b.
q 1 fi. Me-
natū ab L.
aut 16 et 17
figure.
r 1 fi. H. 14
fig. M. 15 fi-
gure q. q.

gione non nihil introrsum comprimitur, aliqua sui parte planam superficiem pro conuexa ac orbiculari commonstrans. Quum enim hæc tunica ad eam usque anterioris oculi sedis regionem pertingit, secundum quam maior oculi educitur circulus, quem iridē uocamus, aut quo albū oculi (ut ita loquar) à nigro distinguitur, & eā tunica à dura cerebri membrana pronata pars consistit, quam cornu in luciditate & substantia quoque cōparabimus, ipsa ab hac abscedit quam dura procreat membrana, neque amplius illam contingens inibi in posteriora comprimitur, quam illi parti quam cornu assimilamus, ita subduci debuisset, quemadmodum secundum reliquam oculi regionē illi subducitur tunica, quam dura membrana efformat. Neque hac duntaxat impressione præsens tunica à tenui membrana cerebri generata donatur, uerum etiam in huius compressionis medio foramine quodam peruia est, quod minimū in oculo apparentē effor-

Pupilla.

mat circulum, & pupilla nobis appellatur. Adeo ut hæc tunica uuae folliculo, à quo pedunculum quo affirmatur extraxeris, quam simillima sit, præsertim si uuam illic parum concidisse, & ut sit uacuari intelligas, ubi pedunculum extraxeris. Totus enim uuae folliculus tunica huic respondebit: ea autem coincidentia illi respondebit compressioni, quam in anteriori parte hæc tunica sibi uendicat. Foramen autē quo pedunculus firmabatur, ipsi pupillæ cōparatur. Atque ab hac similitudine Græci præsentē tunicā *παροειδὴν* & *ῥωγὰ*, nos autē uueā appellamus. Quoniā uerò à tenui cerebri membrana *χοροειδὴς* dicta, hæc tunica constituitur, Græci illam quoque *χοροειδὴν* nuncuparunt. Quanquam nō ob id solum quod à tenui membrana cerebri producit, eam ita uocarunt, sed forsitan quod ipsa uenas arteriasque oculi sustinet, perinde atque tenuis membrana cerebri uasa suffulcit. Quandoquidem passim quā uuea tunica, illa obducitur, quam duram cerebri membranā progenerare mox dicam, uenarū arteriarumque surculi ab hac in uueam pertingunt, & uueam ita exasperant, ut hac quoque ex parte internæ superficiei folliculi uuae accedat, quæ fibras illas continet, quibus uuae caro & acini sustentur. Quum itaque ab ea tunica quam dura cerebri membrana procreat, complures uasorum surculi sparsim in uueam producantur, sit eorum surculorum internentu uueam illi tunicae connasci. Quā uerò uuea tunica ab illa secundum iridis circulum abscedit, introrsumque premitur, uuea pertinaciter secundum totum circuli ductum ipsi adnascitur, & colorem euariat. Uuea namque tota superficie qua dura tunica succingitur, perpetuò nigra est, & modicè humecta: in anteriori autem suæ compressionis sede uariè tingitur, eumque semper exprimit colorem, qui in oculi iride seu maiori circulo, aut oculi nigro occurrit, cuius gratia oculos nigros aut cæcios, aut glaucos dicimus. Neutiquam enim is color humorū oculi beneficio cōsurgit, quod & si magnū sit paradoxū, nō secus tamen id probatum uelim, quā quod is oculi color in uuea perpetuò appareat, siue integro oculo, siue effluxo humore, siue ipsa uuea tunica à dura liberata, diuulsaque. Quod non solum in hominis oculo est cernere, sed & in cuiusuis alterius animalis oculo. Cæterum interna uueæ superficies uarijs interstinguit coloribus, in posteriori enim oculi sede, qua hæc tunica primum pronascitur, subalba est, mox uiridis, & dein cærulea iridis in modum efficitur. atque hos colores in posteriori oculi sede adhuc interna hæc superficies possidet, in anteriori autē oculi sede uniuersa impense nigricat, & non adeo læuis hic atque in posteriori sede uisitur: quod illi potissimum accidit propter processus, quos à se hac in parte educit tunicam constituturos, quæ anteriori uitrei humoris sedi obducitur, & ueluti interstitiū est uitrei & eius quem aqueum nominabimus. Præsens tunica planis duntaxat donatur superficiebus, non autem concavis aut conuexis. Quandoquidem hanc tunicā constitueres, si ex tenuissima araneæ tela orbem excinderes tantum, quāta est anterior sedes uitrei humoris, ac dein in hoc orbe alium orbiculū excinderes, foramen facturum tam amplum, atque crystallinus humor amplius est, ubi uisitur amplissimus. Huiusmodi namque orbi præsentem tunicam cōferre posses, si illum circulatim ab uuea tunica pronasci fingeres, illicque suo foramine crystallino connasci, ubi is amplissimus cernitur. Verum hæc tunica tenuitate araneæ telas ferè superat, & processulis ab uuea pronatis talibus constat, ut nigra cilia, seu palpebrarum pilos imagine insigniter exprimat. Num autem tunica, aut aliter nuncupanda sit, nō admodum moror: modo quānam sede reponatur, & quibus cōmittatur, quā sit imagine & substantia, explicē, mihi que nullum occurrat nomen quod ipsi aptius sit quā tunica, aut si uoles, interstitij inter uitreū humorē, & eum quem albugineū aqueum uenuncupabimus. Sed iam tempestiuum fuerit & duram tunicam sermone complecti, quam à dura cerebri membrana uisoriū neruum inuestiente pronasci ac dissolui credimus. Quum primum enim hæc membrana oculi posteriori sedi applantatur, dilatescit, & crassior ac durior ipsa cerebri dura membrana euadens, orbiculatim undique oculo obducitur, tam in anteriora quā in posteriora pertingens. quanquam interim cum passim sibi similis sit, neque simplici donetur nomine. Quā enim posteriorem oculi sedem constituit, & in anteriori sede ad maiorem

*Uuea tunica
colores.*

*Ex humorū
aut spirituum
copia oculorū
colorem non
euariari.*

*Tunica cilijs
& palpebrarū pilis
comparata.*

*Dura oculi
tunica à dura
cerebri mem-
branaeducta.*

s 16, 17 fig.
x. 18, 19 fig.
gura d.
t. 1 fig. N.

u. 1 fig. 1. 14.
fig. m. 15 fig.
gura r.
x 16, 17 fig.
y. 18, 19 fig.
gura n.

y 15 fi. p. p.
16. fi. n. n.

z 1 fi. K.
et 11, 12 fi.
gura.

a 1 fi. K in-
ter C et O.
et 8 fi. c in-
ter a et b.

b 1 fig. M. e-
ductum ab
L. et tota
ferè 16, 17.
c 16 fig. f.

d 18, 19 fi. d.

rem

*παροειδὴς tunica.
χοροειδὴς tunica.*

rem oculi circulū seu iridem usq; pertingit, crassa & dura est (unde & σκληρότης nuncupatur) & dein duræ cerebri membranę modo opaca, & minime pellucida. Ea uerò sede qua oculus nigrū seu iris cōsistit, hæc tunica in cornu imaginem degenerat, quod in laminas diuisum & exacte læuigatū, uetri alicuius loco lucernæ accōmodatur, pellucidumq; est. Neq; hæc præsentis tunicæ pars, cornu in luciditate qua id etiā superat solū respōdet, uerū & substātia quoq; est enim hæc tunicæ pars cornu modo dura. & ut cornu in laminas diuidi radiq; potest, ita etiā hæc tunicæ pars secantibus nō secus radii disiungi q; ualet, quā si ex laminis aliquot seu squamis inuicem compactis cōstitueretur. Atq; hinc est ea oculariorū medicorū cura, quæ senibus hanc tunicæ partem deradi præcipit, quā à tanta cum cornu similitudine *κοραβειδὴ* Græci, nos uerò corneam nominamus. Quāq; uidentur Græcorum pleriq; non hanc tantum præsentis seu duræ tunicæ partem ita appellasse, uerum uniuersam (quum ipsa insigniter dura sit) tunicā. Quod uerò pellucidā duræ tunicæ partem à reliqua ipsius sede nō pellucidā, ac si illa diuersa esset tunica, in præsentī non distinguā, neminem iam mirari arbitror, quum haud aliter quam modò diximus illæ partes inuicem uariant. Interna huius tunicæ superficies, tota ea sede qua cornu modo non pellucet, uueam tunicā absq; alicuius substātiæ interuentu succingit, ipsiq; uenarum artēriarumq; gratia, uti prius diximus, adnascitur: quemadmodum etiā illi pertinacissimē ac orbiculatim adnectitur, secundū maiorē oculi circulū seu iridē. Porro ea sede qua hæc tunica cornu instar pellucida cernitur, uueā non cōtingit, & tantisper atq; oculus sanus est, ab uuea notabili interuallō inibi distat, quā uuea anteriori in sede comprimitur. Hoc interuallum & uniuersum spaciū quod inter anteriorem crystallini humoris sedem & pupillam habetur, humore illo adimpletur, qui adhuc enarrādus superest, ac uerus humor censetur. nam aquæ modo tenuis quodammodo secantibus & suffusiones curantibus occurrit, & insigniter aquæ modo pellucidus cernit: unde etiā *ὕδαρ βειδὴς* Græcis, nobis uerò aqueus nominat. quanquā pleriq; hunc oui humori comparātes, illum albugineum nuncupent: etiam si arbitrer Græcos hunc humorem in albo non cōtulisse, quū neutiquā æquē crassus sit, & multū accedit illi humori, quem ex recentibus integrisq; ouis igni appositis resudare cernimus. Atq; hic humor uueæ tunicę partē corneæ in sano oculo nō contiguam sustinet, & (uti dixi) in priori ac in posteriori eius partibus continetur: atq; quum in oculo cōsistit, terminoq; alieno, ut sic dicā, cōcluditur, uitrei humoris modò dimidiū exprimit globū, cuius posterior pars, quæ plana constat superficie, tantū habet sinum, quanta in anteriora protuberās crystallini humoris est pars. Anterior autē aquei humoris sedes gibba, dimidiatiq; globi modo rotunda est, secundū oculi nimirū formam. Cæterum externa durę tunicæ superficies tota sede qua pellucida cernitur, ac reuera cornea existit, admodum læuis est & lubrica: uerū cætera sede ita aspera inæqualisq; uisitur, quemadmodū inuicem cōnatæ mēbranæ ad mutuū contactū exasperātur. Posteriori enim duræ mēbranæ sedi præter uenas & artērias ipsi implicitas^h musculus inserit, quem musculorū oculū mouentiū septimū numerauimus: deinde lateribus superioriq; ac inferiori externæ huius superficiē sedibus, neruosa tenuitates musculorū inferuntur, quos sex primos oculū mouētes recēsuimus. & deinde anteriori quoq; duræ tunicę parti ad iridē usq; seu maiorē oculi circulū tunica obnascitur, quæ adhuc cōmemorāda superest, ac adhærēs eo quod oculū continet, & uicinis partibus cōmittit, dicit, alba à colore quē possedit etiā nuncupata. Hæc mēbrana anteriori tantū oculi sedi obducta tenuis est, illi cōtinua quæ internā palpebrarū sedē inuestit, oculiq; partiū numero ascribitur, quemadmodū & ipsæ palpebrę, si modò cui id uisum sit, his quoq; partibus adijci possunt. Fuit itaq; hæc oculi partiū series: humor crystallinus: tunícula cepis pelliculę tenuissimę modò pellucida, anterioriq; crystallini humoris sedi obnata: humor uitreus in posteriori oculi sede tantū positus: tunica in quā uisoriū nerui substātia resoluit, ac posteriore humoris uitrei sedē tantū amplectit: tunica uuea, à tenui cerebri mēbrana principiū ducēs: tunica seu orbis araneæ telæ modò tenuis & nigricans, & interstitiū uitrei humoris ab aqueo: tunica dura, quæ in anteriori oculi sede cornu modo pellucida reddit: aqueus humor: septē oculum mouētes musculi: tunica adhærēs, seu alba, anteriori tantū oculi sede obnata: palpebrę, & demū uenæ ac artēriæ. Cæterū si quis modò oculi cōstructionē ab extimis ad intima aggredi uelit, iam promptissimum est retrograda serie illū eas persequi: aut si uolet separatim humores, & dein tunicas cōmemorare, nihil prohibet. Ego uerò nunc ea oculū enarratione persecutus sum, qua in scholis uti soleo, primū oculi cōstructionē explicans, & in charta maiusculā effigiē ita sensim delineans, atq; in prima huic Capiti preposita figura oculū exprimere conatus sum. dein post enarrationē ita sectionē obiens, quēadmodū suo loco in ultimo huiuslibri capite subiiciā. Verū ut oculi fabricā adeò studio se soleo cōmonstrare, ut spectantiū nemo in ipsa quicq; desideraret: ita in ipsius partiū usu explicādo hīc prorsus obmutesco, quod mihi ipsi de primario uisus instrumento nō satisfaciā, atq; hac in parte quod sanū undiq; sit, à me non adferri posse, mihi persuadeam.

κεκοσμημένη τὴν ὀφθαλμὸν

Humor
uitreus.

ὕδαρ βειδὴς ὀφθαλμοῦ
Aqueus.

Adhærēs ab
albæ oculi tunica.

Oculi partiū
usus.

deam. Non sanè quasi crystallinū humorem præcipuū uisus instrumentū esse, & ut hic alatur uitrū produci, & huius gratia oculi reliquias partes efformatas esse, quemadmodū Galenus in decimo de Partiū usu diffuse persequitur, cōmemorare, aut hīc proluxè etiā scribere nequirē: sed quod mihi certò quī uisus fiat, nō constet, hincq̃ reliqua oculi cōstructio depēdeat, quodq̃ potissimū de huiusmodi philosophorū & medicorū cōtrouerisijs priuatim quædā aliquādo mihi scribenda duxerim, præsentilabore ad iustam molem perducto.

DE AUDITVS INSTRUMENTO.

Caput XV.



QUAE de auditus organi fabrica modò enarranda essent, superiūs in primo libro ita explicui: atque in præsentia, si inibi nihil commemoratum fuisset, ea pertractarem. In octauo enim primi libri Capite^a cavitatem auditus organi gratia in caluaria exsculptam, paratamq̃, & deinde huius concauitatis foramina membranas & ossicula recensui. In decimo sexto autem eiusdem libri Capite, auris cartilaginū & reliquarum constructionem, uti tunc occurrit, modoq̃ animo obuersat̃, persecutus sum. Nihil enim hic certius de auditu sonituq̃ percipiendo, quā inibi attexere possum, nisi etiam plus nunc quā dum illa scriberem, ambigem, mihiq̃ longè minus satisfaciā, & non satis mirari queā, omnes de auditu, ipsiusq̃ obiectis tam proluxè citra organi ipsius uel maximè superficialiā cognitionē scribere: ex quo tamen præcipuæ ad præsentem disceptationem petendæ erant demonstrationes.

^a Hæc omnia ostendit fig. cap. 8 lib. 1.

DE GVSTVS INSTRUMENTO.

Caput XVI.



LINGVAM oris amplitudini adamussim congruentē gustus esse instrumentum, medicis iuxta ac philosophis concessum est omnibus. quū itaq̃ in decimo nono secundi libri Capite^a, nouem linguæ musculos, & uariā illam fibrarum, compositionisq̃ in ipsius parte hiantē ore ante cōsectionem conspicua speciem unā cum illius inuolucris recensuerim, & in tertio libro^b uenas^c arteriasq̃ linguā petentiū seriem similiter descripserim, in quarto libro ipsius neruos minime negligēs, quorum^d alter præcipua maioris tertij neruorum cōiugij radice numerabatur portio, gustus occasione potissimū linguæ oblata, alter uerò septimi neruorū cerebri paris propagines musculorū nomine linguam implicātes, nemo, uti arbitror, hīc à me requireret, ut proluxā de linguæ fabrica inter cæteras partes, ut uerū fatear, mihi minus cognita, sermonem instituā, aut diffuse saporū differētias & qualitates commemorem.

^a Hi obuij sunt in figuris cap. 19 lib. 2.
^b fig. cap. 6 li. 3. ramus ab X.
^c fig. cap. 2 lib. 4. Y. Y.
^d 2 fig. cap. 2 lib. 4. ramus li. 4. w.

DE TACTVS INSTRUMENTO.

Caput XVII.

Galenus in primo libro de Locis affectis.



Tactus quoq̃ instrumentū in quarti libri initio me persecutū arbitror, quum nullum neruū tactus sensu nō præditū per corpus digeri assererē, & Naturę scopos in neruorum distributione quantum is locus exigebat enarrarē: illorū subridens sententiā, qui unam eiusdem nerui portiunculam sensui, aliā mortuā absq̃ sensu præesse docuerūt. Ac proinde totius humanæ fabricæ partiū enarratione pro mea uirili absoluta, nunc superest, omniū partium quæ præsentilibro aggressi sumus, sectionis rationē perscribere: & si cuius partis in alijs libris traditæ secandi ratio nō expressa sit, etiā illam ad huius libri calcem seriatim subiungere, & postremò de uiuorū sectione nōnulla proponere.

CEREBRI, OMNIUMQVE QUAE PRÆSENTI LIBRO traduntur organorum administrandi ratio.

Caput XVIII.

Caput ad cerebri inspectiōnē quī parandum.



DVMODO musculos ceruicem occupantes, & neruos ē ceruicis dorsali medulla profluentes, in corpore quod nutritionis uitalisq̃ facultatis organis inspiciendis hætenus subseruiuit, aggressus fueris, suadeo nunc caput ita atque ad præcedentis libri finem recēdū, à reliquo corpore auferri. Ablatum enim longè commodiūs, minoriq̃ molestia attrectabis, unde etiam capita detruncatorum hominū ad hunc usum sunt accommodatissima: præcipuè quod illa uix bene mortua, statim à sumpto supplicio minus morosorum iudicū ac præfectorum opera, obtineri possunt. In quorū numero si quis unquam alius, meherculè habendus est, studiorū unicus Meccenas, illustrissimiq̃ senatus Veneti lingu-

a Quædam
modū figu-
ra 7 cap. 6
lib. 1. ablata
est à 6 figu-
eius. cap. ac
ut 1 fig. hu-
ius libri est
parata.

Caluaria ad
cerebri Ana-
tomen qualiter
aperiēda

b 1 fig. F, F.

c Ex prima
fig. facies se-
cundam.

d 2 fig. C, C
et D, D.

e 2 fig. G, G.
f 3 fig. D, D
inter A, A
et B, B.

Cutis, adipis,
membra car-
nosæ, ac dein
caluaria iuu-
lucris, illi q̃ sub
dita adhuc mē-
brana examē.
Dura mēbra
næ amplitudo
quæ examinan-
da.

Tenuis mē-
brana dete-
ctio.

singularē ornamentum MARCVS ANTONIVS CONTARENVS, ob raram phi-
losophiæ linguarumq̃ cognitionem, ac tot felicissimè obitas legationes, toti orbi clarissimus,
qui nunc Patauinae urbis Prætor uigilantissimus, uberē profectò nobis ad Anatomes admini-
strandas copiam suppeditat, ipse humanæ corporis fabricæ studiosissimus indefessusq̃ specta-
tor, ac alius ueluti Romanorum Boëthius aut Sergius. Qualecunq̃ igitur caput obtigerit, sem-
per eius os serra^a diuidendum est, ac proinde nouacula aut cultro in capitis cute ad os usque or-
bicularem duces sectionem, quæ pollicis latitudine elatius quàm supercilia sunt, non inoppor-
tunè auspicabitur, hinc per tempora ad eminentissimā maximeq̃ posticam occipiti sedem ten-
dens, & illinc rursus per tempora frontem accedens. Ducta hac linea, tenuiori serra, qua in gan-
grena auferendis membris uti consueuimus, aut alia ab eburneorum pectinum artificibus pe-
tita, caluariam secundum illam lineam diuides, studiose præcauens, ne altius quàm os sit, fer-
ra descendat. In hoc opere conduxerit capitis crines nondum abrasos, neque etiam aures præ-
sectas esse, quo leuiori negotio altera manu, & sodalis utraque caput ne ferræ cedat cōtineatis.
Vbi caluariam orbiculatim diuideris, obtuso cultelli mucrone secundum sectionem ducto, num
aliqua ossis pars adhuc diuidenda supersit examinabis, ut & eam quoque serra diuidas. Porro
ne sectionis finem ipsius principio elatiorem, depressiorem uel moliaris, si modò id citra aliam
operam (quanquam factu sit longè facillimum) te facturum nō fides, nihil obstiterit funiculum
colore aliquo intinctum nudæ caluariæ fortiter illorum qui trabes in asseres diuidunt modo,
circundare, ut coloris orbicularem lineam, quæ ferram dirigat, caluariæ intingat. Atque hunc
funiculum ossi obuoluere conuenit, postquam iam cutem orbiculatim dissecuisti: quippe cu-
tis sectio te manu ducere nequit. nam sectionis in cute factæ latera, dum caput ualidè cōtinetur,
hinc inde abscedente cute diuelluntur. Diuisa ad hunc modum caluaria, si à ceruice inferioriq̃
maxilla caput habueris liberum, illud sua basi mensæ impones, utrinque si uisum fuerit ne in la-
tera cōcidat, lapidem, aliud uel simile collocans. Si uerò caput reliquo corpori sectionis ratio-
ne adhuc hæreat, tot ceruici occipitiq̃ quadratos lapides, aut truncum aliquem subijcies, ut
caput in anteriora reflexū eleuatumq̃, ac si basi inniteretur, tibi assurgat. Insuper sectioni per cal-
uariam factæ ualidioris cultri dorsum transversim ad frontem primum impones, & illo modi-
cè sursum deorsumq̃ acto, sectionem aliquousq̃ dirimes. Idem quoque in occipiti temporib-
usq̃ tantisper faciendum est, quousq̃ caluariam à dura cerebri membrana liberam esse conie-
ceris. tūc enim uerticis crinibus apprehensis attrahentē manū os subsequetur. Adempto osse,
cutem simul cum adipe & carnea mēbrana solis manibus (alicubi tamen cultro prius liberatā)
facile diuelles, & deinde cultelli mucrone Græcis uocatū *ποδωρητορ*, ipsumq̃ *ποδωρεορ* indaga-
bis, deinde etiam^b uenulas ex uerticis cute in caluariā uersus durā cerebri membranam, aut ab
hac in illam profectas. Iam dura cerebri membrana aliqua ex parte cultello est perforanda, &
calamo fistulæ uel, aut quo in elicienda urina uti consueuimus syphone, foramini indito, sectio-
nis latera ad illum digitis cōprimenda sunt, ut postmodum syphone inflato, quanto dura mem-
brana cerebri mole amplior sit, condiscas. Atque suffecerit in altero tantum latere eiusmodi fo-
ramen fieri. nam copiosus qui inflatur spiritus undiquaq̃, duram cerebri membranam disten-
dit, inflatq̃. Verum si quum caluariam serra diuideres, duram membranam alicubi oscitanter
dissecueris, illa quoq̃ sectio dum inflatur membrana opportunè, ne aërem transmittat compri-
metur.^c Diuisa rursus membrana, acutioris cultelli mucronem tertio duræ membranæ sinui,
per totam capitis longitudinem in elatissima eius membranæ sede procedenti intrudes, lon-
gaq̃ sectione uniuersum quoad poteris, aut ab occipito ad frontem usque, aut à fronte ad occi-
pitiū diuides. Atq̃ hic sinus si suspēdio, aut aliter quàm capitis supplicio homo necatus fuerit,
sanguine oppletus conspicietur, quem extergere conuenit, & distento sinu ipsius formā, &^d ra-
morū qui utrinq̃ ab ipsius lateribus, & ex inferiori eius sede pullulant, orificia inspicere. Porro
ut cerebrū dura ipsius membrana nudes, iuxta frontis os eam ad tertij illius sinus latera perfo-
rabis, et deinde stylo in foramen indito, secundum illum cultello ad occipitis usq̃ os cōtinuò ad
sinus eius latera sectionē deduces. Hac ad utrunq̃ sinus latus facta sectione, rursus durā mem-
branam cultelli mucrone propter aurem, quā ossi proxima est perforabis, hincq̃ rectā sursum
usq̃ in priorē, seu secundum capitis longitudinē, ductam sectionem secando perges. Postremò
in capitis uerticem quatuor sibi proximarū sectionum angulos unguibus attolles, & deorsum
tractos à cerebro reflectes, habita ramorū ratione, qui ex tertij duræ membranæ sinus lateribus,
& ijs uasis quibus duræ membranæ implicatur latera, in tenuē cerebri membranā pertinent.
Insuper dextra cerebri parte à sinistra modicè manuū beneficio diducta, septum à dura mem-
brana inter utranq̃ cerebri partē extructū, & soboles à tertio duræ membranæ sinu utrinq̃ in
tenuem membranā diffusæ, quantū fieri poterit attollētur, ut qui illarū interuentu in uiuētibus

cerebrum erigatur utcunque intuearis. ac dein acutiori cultello illis propaginibus à suo sinu liberatis, eam duræ membranæ partem à ⁸ septo sedium olfactus organorum liberes, ac ueluti ex cerebro eleuatam in posteriora reflectas, ipsius ⁹ sinu qui uenæ instar toti inferiori ipsius sedi exporrigitur inspecto. Cuius origo, ut & cæterorum omnium, paulo post in propatulum ueniet. Nunc autem ductus in tenuem membranam excurrentes, ipsaq; membrana inspiciuntur. Vbi itaq; nuper dictam duræ membranæ partem in posteriora reflexeris, ac utranque cerebri partem disiunxeris, ¹ longos in tenui membrana ductus intuebere, qui per capitis longitudinem in illam ex quarti duræ membranæ sinus termino producuntur. Horum ortus in præsentia curiosius non uenit inquirendus, ne fortassis quum cerebrum nimium studes disungere, aliquid incuria rumpas. Aliàs enim hortarer, ut utraque cerebri parte quàm maximè in posteriori sede disuncta, duram membranam quæ cerebri partes intercedere incipit, quam posses proximè ab ^k illa duræ membranæ parte, quæ cerebellum ac cerebrum interuenit, acutioris cultelli mucrone diuideres. tunc enim ^l quartus tibi appareret sinus, & quas ille educit ^m propagines. Deinde etiam cerebro à dura membrana, quæ id & cerebellum intercedit, modicè eleuato, ramuli ex illius duræ membranæ parte in tenuem cerebri membranam exporrecti uiferentur. Verùm hæc cerebri portione ablata inspicere longè erit satius. ac proinde illis ductibus qui secundum capitis longitudinem in tenui membrana supra ⁿ callosum corpus feruntur expensis, unguibus, aut cultello alicubi tenuem membranā diuelles, ac deinde sensim à cerebro ipsiusq; ^o anfractibus eam digitis detrahes. Cerebrū hac liberatū membrana suos ostendit anfractus: argumentūq; est, quā à tenui membrana cōtineatur, quū scilicet hac detracta, impense dilatescat, & concidens prorsus, quodammodo defluat. Porro cerebri anfractuum altitudo ac profunditas digitis, aut stylo uenit indaganda. atque ita etiam solo digitorum munere ^p elatior callosi corporis sedes, & qui utrinque hīc consistunt sinus, inquirentur. Simulatq; uerò hos inuenieris, utrinque magnam cerebri ^q auferes portionem, primū magna & acutiori nouacula sectionem per dextrum, qui ad callosum corpus cōsistit, sinum deducens, quæ totam cerebri partem sinu illo superiore, à fronte ad occipitiū usque simul in dextro latere adimat. pluribus enim reiteratis sectionibus, operatio turpiter uitatur. Ademptam cerebri partem in mensam ita repones, ut elatior dextri uentriculi sedes in conspectu sit. ea enim quam fieri præcepimus sectio, dextrum uentriculum diuidit, si modò rectè secundum sinum qui ad dextrum callosi corporis latus uisitur, administrata fuerit. Dextra cerebri parte ad eum modum ablata, in sinistra idem quoque (ut & sinister quoque pateat uentriculus) moliendum est, per sinistram iuxta corpus callosum consistentem sinum facta sectione, callosoq; corpore quàm fieri licebit maximè immoto, diuulsoq;. Quandoquidem id postquam sinistram quoque cerebri uentriculum inspexeris, uidendo uentriculorum ^r septo seu speculo, sensim, & quàm accuratissimè ubi utrinque continua illi cerebri pars adempta est, summis utriusq; manus digitis modicè æqualiterq; attollendum uenit. Septum enim si ad eum modum callosum corpus erexeris, & dein candelam contrario eius quod inspicis lateri (nisi illi clarior dies obluceat) adhibendam curaueris, euadet cōspicuum. ^s Iam callosum corpus ^t anteriori parte, qua olfactus organorum interstitio uicinius est, cultello à cerebro liberabis, & deinde id hac parte eleuatum digitis sursum trahes, in posterioraq; diuulsum reflectes. ita nanque ^u elatiorem speculi septiue sedem calloso corpori, ^x inferiorem uerò illi cerebri parti quam testudini ac camerato assimilamus, cōnatam cernes. ^y Cameratum autem (cuius nunc superior sedes undique obuia est) obtusiori stylo uenit examinandum. ac primū quidem stylus ad syphonis formam obliquatus camerato ex dextro uentriculo in sinistram mittetur: & camerati perpenis lateribus, anterior ipsius pars cerebri substantiæ non procul ab olfactus organorum septo connata, cultello ^z diuidetur, & digitis deinde eleuata in posteriora reflectetur, ut & ipsius inferior superficies quæ testitudinis modo caua est, occurrat. Reflexo itaq; camerato, quā id posteriori sua parte uelut ex dextro sinistroq; cerebri uentriculo enascatur, immisissis stylis peruestigabis, & deinde id in pristinam ipsius sedem repositum longa sectione diuides, aut potius cultello uniuersum radicitus præscindes. Conduxerit tamen priusquam præsecetur, sub ipso stylum ad ^a eam usque partem, qua ex quarto duræ membranæ sinu ^b uasa ductus ue, ad anteriores cerebri uentriculos sub camerato pertinet subijcere, ac adamussim ipsius usum constructionisq; rationem elegantissimam examinare. Statim uerò atque ademptum, longaue sectione diuisum, ac postea utrinque diductum erit, attendes ^c plexui à secundarum forma ^d *χρυσιδίη* Græcis dicto, & ductibus à quarti duræ membranæ sinus finē exporrectis. Ac proinde primū posteriorem uentriculi sedem stylo inquires, qualiter hæc scilicet ex posterioribus deorsum in priora descendat, per illamq; ^e arteria ascendat, quæ antrorsum prorepens, alteram eius ductus portionem assumit, qui à quar-

Tenuis membrana à cerebri reuolutionibus auulsio.

Superioris callosi corporis superficiem examen. Dextri & sinistri uentriculorum apertio.

Dextri sinistri uentriculorum septi examen.

Corporis testitudinis modo efformati examen.

Uentriculorum dextri & sinistri, & in ipsis uasorum examen.

23 fi. N. aut
6 fi. cap. 6
lib. 1. a.
h 3 fi. F. &
secundum
G, G.

i fig. ca. 14
li. 4 d, e.

k 7 figura
O, O, O,
l 7 fig. T.
m fi. ca. 14.
li. 3 Y, Y, a,
a, b, d, e, f, i.

n 3 fi. L, L.

o 3 figu. C,
C, C.

p 3 fig. L, L
& dein M,
M.

q Paraturus
4 figuram,
quam hic sedulo
inspicies.

r 5 fi. X, X
& Y, Y.

s Ex quarta
figura nuno
parabis
quintam.
t Vbi infimum
Icon-
sistit in 4 fi
gura.

u 5 fi. Y, Y.
x 5 figu. X,
X.

y 5 fig. S, T,
V. & 6 fig.
A, A, A.

z Ex quinta
figura
parabis sex
tam.

a 7 fi. V ex
T.

b 6 fig. H, I,
c 4, 5 fi. O,
O. 6 fig. M,
N.

d 6, 7, 8 fi.
F, G.

66 fi. Hec I
 fecantur in
 K, L.

67 fi. L. 10
 fig. D.

68 fi. E, G
 F, H.

69 fi. H.
 70 fi. I.
 71 fi. C.
 C. aut 15 fi.
 gu. E.
 72 fi. K. 8
 fi. L.
 p Parabis
 modo 7 fig.
 73 fi. 8 fig.
 F, G.
 74 fi. O, O.
 75 fi. D, D.
 76 fi. B, B.
 77 fi. ab
 Sac R po-
 nis stylū mo-
 dō in P, P.
 modō in Q.
 Q. & mo-
 dō in T.
 78 Vti factū
 est in 3 fig.

79 fi. E, G.
 80 fig. F.
 H.
 81 Vti factū
 est in 8 fig.

82 fi. T, T.

83 figure
 I, K. ad 11 fi
 guræ G, G.
 d Vti factū
 est in 9 fig.
 84 fig. K.
 f Vltimæ 3
 libri figuræ
 ff.
 85 figure
 L, M, N, O,
 cū 11 fi. E.
 86 Vti factū
 in 11 figura.
 87 fi. C, D.
 & c, d.

to duræ membranæ sinu in cerebrū sub camerato proficiscitur. Hunc enim rectā supra com-
 munem dextri sinistriq̃ uentriculi cauitatem longius procedere obseruabis, & deinde biparti-
 tum uersus dextrum & sinistrum cerebri uentriculum porrigi, tandemq̃ ab hoc ac commemo-
 rata ultimò arteria nuper dictum plexum efformari. Cæterum quum hos ductus ex quarto du-
 ræ membranæ sinu prorepentes conspicias, illi quoq̃ spectandi sunt, qui tenui membranæ &
 humiliori parte duræ membranæ dextrā cerebri partem à sinistra interdiuidenti, à quarto sinu
 offeruntur. Vbi enim hos inspexeris, ductus qui à quarto sinu sub camerato in cerebri uentricu-
 los pertinent, ea sede cultello sunt diuidendi, qua commemoratos efformant plexus. Hinc ele-
 uati in posteriora leuiter reflectentur, ne simul^s glandula quam *λωροδεξιο* Græcis uocari diximus,
 auellatur. hæc siquidem illis ductibus sua sede remotis, in conspectu iacet. Verum hæc tentanti
 ouillum cerebrū ad manum esse uelim, quòd id glandulam illam & cerebriⁿ testes, natesq̃ aper-
 tius nonnihil quàm humanum caput commonstret. Glandula hac in suum locum reposita, di-
 gitisⁱ communem dextri sinistriq̃ cerebri uentriculorū sinum, qui instar rimæ modò spectanti
 occurrit distendes, ac mox^k meatū quo pituita uersus^l peluim ex tenui membrana extructam
 defertur, unà cum^m meatus principio intueberis, qui ex tertio uentriculo cōmuni ue hac cōcaui-
 tate in quartū uentriculū pertinet. quibus inspectis^p totā cerebri portionē cerebello incubentē
 transuersa in cerebro ducta sectione adimes, id duntaxat hīc præcauens ne^q ductus arterias ue
 per posteriorem dextri sinistriq̃ cerebri uentriculorū regionem ascendentes, unà disseces. Ap-
 paret modò duræ membranæ^r pars cerebellum ab ipsi incumbente cerebri portione diuidens,
 & etiam^s illa quæ inter dextrā cerebri partem & sinistram ducitur. quapropter tempestiuum
 est, ut quatuor duræ membranæ sinus simul examines. Tertio itaque duræ membranæ sinui
 quem dudum per longitudinem^t dissecuisti, plumbeum inseres stylum,^u quem facile in tres reli-
 quos eius membranæ sinus hinc protrudes: si modò utrinq̃ ad latera primum, ubi cerebelli ela-
 tior pars ossi proxima est, illum impuleris. ita enim dextrum & sinistrū sinum, seu primum & c
 secundum inuenies. Deinde si sub radice duræ membranæ partis dextram & sinistram cerebri
 partem interueniētis stylum detruiseris, quartū sinum comperies. Quo tamen eos uideas ex-
 actius, acutioris cultelli mucrone longis ductis sectionibus omnes sunt aperiendi: & deinde cul-
 tello tota duræ membranæ pars cerebello superius obducta, orbiculari sectione secundum os
 ducta uenit præsecanda,^x aut sectione secundum longitudinem ducta, diuidenda, ac retrorsum
 reflectenda. Vt cerebello obiter inspecto, cerebrum denuò aggrediaris, cōmunem dextri sini-
 striq̃ uentriculi sinum distendens, ac exactius pituitæ ductus immisso stylo examinās. Vt uerò
 communis cauitatis seu tertij cerebelli uentriculi meatum in cerebri cauitatem porrectū obser-
 ues, obliquatum stylum meatui indes, leuiterq̃ in cerebellum concidere sines. Stylus enim grā-
 uior syphonis modo incuruatus, etiam nō impulsus secundum meatus ductum, in cerebellum
 deuoluitur. Manente adhuc in meatu stylo, digitis cerebellum nonnihil à cerebri testibus diri-
 mes, quoad scilicet stylum inter cerebellum & testes ipsos intuearis, tunc enim, & præcipue in
 ouis cerebro, quæ pars^v testibus, & quæ^w natibus similior sit, disces. Quod quū obseruaueris,
 cultello testes ipsos natesq̃ secundum stylum^a diuides, ut meatus ille ex communi dextri & sini-
 stri uentriculi cauitate ad cerebellum porrectus euadat conspicuus, pauloq̃ accuratius meatus
 à cerebro ad peluim pertinens, pituitamq̃ eò deducens, reddatur conspectior. Poteris modò
 tenuem cerebelli membranam hamulo discerpere, & b uenam quæ ab illius ductibus in poste-
 riorem humilioremq̃ anteriorum uentriculorū sedem pertinet examinare. Quippe hanc repe-
 ries facillimè, modò illam iuxta anticā cerebelli partis cum cerebro connexum inquisiueris, qui
 præsentis uenæ potissimū sit interuentu. Vt uerò^c coalitum cerebelli cum dorsali medulla
 cognoscas, caput quasi in faciem^d reclinandum est, & manu inter cerebellum & duram cere-
 bri membranam occipitis ossi commissam, imposita, cerebellum in priora, deorsumq̃ detra-
 hi debet, quousq̃ uniuersum à dorsali medulla liberatum decidat. in ea enim administratione
 nihil obstat, quo minus^e uenulas ductus ue ex primi secundiq̃ duræ membranæ sinuum
 principijs, aut^f uenis arterijsq̃ per transuersos ceruicis uertebrae processus repentibus, in
 cerebellum porrigi uideas, ac dorsalis ex ipso cerebro ortum, formam, & sinum cum cerebelli
 sinu^g quartum efformantem uentriculum cernas. Deinde etiam reposito capite, & cerebello
 in^h primum posito, ipsius intueberis sinum, & partes quibus dorsali medullæ connasceba-
 tur, & præcipue ipsius reuolutionū anfractuum ue pulchram imaginem. à quibus ilico uelut
 manu ducēris ad duos reuolutionumⁱ apices uermibus assimilatos, & ueluti reuolutionum
 terminos per cerebelli medium secundum ipsius longitudinem deductarum. Atque id ap-
 parebit clarissimè, si per eam longitudinem utrinque longa sectione ad earum reuolutionum
 latera ducta, eas à reliqua cerebelli substantia liberaueris, exactasque in mensam exporre-

*Glandula testi-
bus incubetis.*

*Tertij uentri-
culi, ipsiusq̃
meatum.*

*Duræ mēbra-
næ sinuum.*

*Cerebelli detec-
tio.*

*Testium et na-
tum examen.*

*Dorsalis me-
dulla cum cere-
bello coalitus.*

*Quarti uentri-
culi examen.*

*Vermiformis
processum.*

*Nervorum
pariū examē.*

*Forū quæ in
duræ membra-
næ basi sunt
examen.
Glandis pitui-
tam excipien-
tis, ipsiq; accū-
bentium arte-
riarum.*

xeris, ita nanque unus tibi apparebit uermis, illis quàm similimus, qui ueris tempore è salicibus decidere solent, aut bōmbicibus priusquam sese folliculo includant: & adhuc multò magis quum iam aliquandiu inclusi fuerūt, folliculum tamen nondum corrofere. At si uniuerfas illas medias reuolutiones simul non abstuleris, & duntaxat extrema execueris, duos poteris com-
monstrare uermiformes cerebelli processus, unum quidem priorē, posteriorem uerò alterum. Porro non solum exectis ad hunc modum uermiformibus processibus, ipsorum imago exami-
nanda uenit, uerum etiam quando cerebellum à dorsalis medullæ initio auellitur, ipsorū usum præcipuo studio expendere conduxerit. Inspectis itaq; cerebelli partibus, nervorū paria inuesti-
gabūtur. quod ut fiat ocyus, ^k manu inter cerebrū & frōtis os inserta, cerebrū sensim attolletur, ut primū à plerisq; uocatum cerebri^l mamillarē processum, & dein olfactus organo seruien-
tes uideas^m processus, qui è suis sinibus stylo quopiā aut digito ueniunt euellendi, & unā cum cerebro sursum in posteriora flectendi: in quo opere caput non inutiliter in occiputⁿ reclinabi-
tur. ita enim reuolutum eorum processuum ortum pulchrè ostendet. Atque hic pariter in con-
spectum uenient^o uisiorum nervorum principia, & eorundem congressus, & sub illis^p peluis cerebri pituitæ expurgandæ parata. Mox^q & arteriarum in duræ membranæ amplitudinem ingressus occurret, quæ partim in tenuem absumentur membranam, & partim in dextrum & sinistrum cerebri uentriculos properant. Vt uerò exactam earum arteriarum seriem spectes, & hīc quoque tenuem membranā à cerebro diuelles, & uentriculorum terminos inibi in reuo-
lutiones, nō autem in olfactus organa uisorios ue nervos finire, nihilq; minus quàm à uentricu-
lis in ea organa pituitam excerni, illisq; ad^r octauum capitis os deduci. ^s Nunc uisorios nervos à cerebro diuides, & totam ipsorum portionem in caluariæ amplitudine tibi conspicuam, stu-
diose refecabis, ne nuper dictam peluim simul auferas. ea nanque hac administratione tota oc-
currit, pulchreq; cernitur, qui^t meatus ex tertio uentriculo ad hanc pertinet, & qualiter illa in
"glandem cesset, quæ duræ membranæ subiicitur, facileq; dilatato hīc proprio duræ membra-
næ^x foramine spectabitur. Cōduxerit tamen membranā inibi tantisper illæsam seruare, dum reliquos cerebri nervos examinaueris. Capite igitur in sinistrū latūs^y reclinato, & cerebri parte quæ adhuc reliqua est, in suum locum utcunq; reposita, cerebrum postea in sinistrum latūs deorsumq; reflectes, & ^z secundi paris originem contemplaberis, mox^z minorem tertij paris ra-
dicem, qua diuulsa cerebrum adhuc magis in sinistrum deflectes, & mox^a tertij & quarti paris exortum intueberis: insuper & ^b quinti paris originē, quam similiter diuidere competit, ut^c ner-
uulum intuearis, qui iuxta quinti paris radicem principium obtinens^c temporali musculo, & in ore^d delitescenti maxillamq; attollenti offertur. ^e Sextum quoque par & septimum euadunt conspicua, si uarijs ipsorum quibus ortum ducunt propaginibus animum adhibueris. Cæte-
rū quum paria hæc perquiris, ^f ductus quoque uenarū modō ex duræ membranæ sinibus in tenuem excurrentes obseruandi ueniūt, & nervorū exortibus in sinistro si uisum erit latere, similiter adinuētis, quicquid dorsalis medullæ, aut cerebri in capite reliquum est auferes, ut du-
ram membranā quā cerebri basi subiacet, adhuc integram uideas, & olfactus organorum si-
nus foraminulis peruios, & undique egredientes nervos intuearis: quibus inspectis, primi ac se-
cundi duræ membranæ sinuum originem, & in illos subeuntia uasaⁱ examinabis, acutiori cul-
telli mucrone ipsos aperiens. ^k Ductus autē secundū duræ membranæ latera excurrentes, & in ipsius iuxta frontem basi conspicui, uel citra aliam sectionem sunt obuī. ut uerò glandulam, & quem dissectionis professores ementiuntur reticularem plexum uideas, animum adhibebis duræ membranæ^l foramini peluis infundibilī ue mediū excipienti, & adhuc peluis portionem adnatam habenti, non negligens interim^m arteriā utrinque ad foraminis illius latera duram membranā penetrantem. quæ ubi obiter intuitus fueris, ⁿ acutioris cultelli mucrone sectionē ex illo foramine utrinq; ad arteriarum usq; transitum duces, & labris sectionum distentis, glandula sese offeret, arteriæq; ad ipsius latūs strata. Verū hæc magis reddentur conspicuæ, si hamulis & acutioris cultelli mucrone, quàm poteris maxime duram membranā hīc liberaueris, aperueris ue, ac ab arteria duram penetrante membranā plumbeum stylum ad soporariam usque arteriā in ceruice adhuc consistentem, impellas. Id nanq; in homine factū promptum est, si modō tuis oculis Galeni nomine fidē derogare nolueris. Hīc enim quàm pulchrā de reticu-
lari plexu in hominibus cōmenti sint hætenus omnes, obseruabis: potissimū si ouillum aut bubulū cerebrum hīc quoq; sectioni adhibueris. Præterea glandulam sua sede dimouens, ac ut duritiem ipsius experiaris eandem cōprimens, perpendes quid Galeno in mentem uenerit, quod per crassissimā ossis cuneum referentis sedem, quam spongiæ modō peruiam esse scribit, pituitam ad palatum colari censuerit, & non potius proprios hīc pituitæ & attracto per inspi-
rationem aëri ductus, foraminaq; non minima etiam indagauerit. Relicta modō interiori calua-
riæ

k Vti factū
est in 12. fi.
l 12. fig. 1. I.
aut 13. figu-
ra C. C.
m 12. fig. C.
D. 13. fi. L.
L.
n Vt factū
in 13. fig.
o 13. fig. M.
N. O.
p 13. figu. S.
aut 14. fig.
C. C.
q 13. fig. B.
14. fi. E. F.
r 8. fig. ca. 6
li. 1. A. B. A.
s Vti factū
est in 14. fi.
t 14. fig. D.
u 16. fig. A.
x 15. fig. F.
y Vt in 14.
figura.
z 14. fig. G.
a 14. fig. H.
b 14. fi. 1. K.
c 14. fig. M.
d 14. fig. L.
e 4. muscu.
tab. r.
f 6. mus. ta.
D.
g 14. fi. N.
dein O. aut
potius seria-
tim specta-
tu. cap. 2.
li. 4.
h Apparent
in 9. fi. ad t.
in 13. ad l.
i Vt factum
est in 9. fig.
k 13. fig. H.
K.
l 15. fig. F.
m 15. fig. C.
D.
n Inspectu-
rus 16. figu-
ram.

riæ sede oculum aggredi conuenit, ad cuius sectionem humanus, si recentius adhuc fuerit cada-
uer, suffecerit; alioqui enim bubulus quàm nancisci poterit recentissimus, simul quoque operi
adhibebitur. Primùm itaque^o palpebrarum, & deinde^p oculi musculos, quemadmodum in se-
cundo docuimus libro, inquires: in quo opere neruorum quoque & uenarum arteriarum que
per oculorum sedem ductuum habenda est ratio,^q secundi dico neruorum cerebri paris, & mi-
noris radices tertij paris, quorum ramulos faciliè adinuenies, si eos in pinguedine oculi muscu-
lis obducta perquisiueris, & præcipuè si ossa reseruare nolens integra, ferra frontis os superio-
rem oculi constituens sedem, instar trianguli prius exueris, & deinde primum neruos illos, &
postea extracto oculo ipsius musculos indagaueris. aliàs enim oculus cum musculis illæso osse
esset eruendus, acutiori cultro in oculi circuitu proximè ad os ductis sectionibus, usque ad ner-
ui uisorij è caluariæ amplitudine qua cerebrum continetur egressum. Vtunque uerò oculum
euulseris, conduxerit semper^s adhærescentem membranam quàm licebit uicinissimè ab osse
dirimere, imò etiam eius portionem qua internam palpebrarum efformat sedem, oculo appen-
sam seruare. ut interdum adhuc intactis oculi musculis, cultello acutiori ad^t iridem usque ab
oculo ac si cutem à corpore auferres, auellere, & deinde unde ortum duxit considerare possis.
Aliquādo uerò ipsam nō nisi ablatis oculi musculis aggredieris, perpendens semper hanc totā
anteriorē oculi sedem, præter corneam tunicam seu pellucētem duræ tunice partem ample-
cti: illos uerò totam posteriorem, præter portiunculam ab ingrediente^u uisorio neruo occupa-
tam. Cæterum oculo & musculis & adhærescente membrana^x libero, uisorium contemplabe-
ris neruum, primū^y uenas arterias^z que secundū ipsum ex cerebro in duram usque tunicam
exporrectas: deinde portionem uisorij nerui longa sectione diuides, & cultelli mucrone duræ
cerebri membranæ, & tenuis membranæ portiones neruum inuestientes, & postmodum ner-
ui substantiam^a inquires, ut uelut trium præcipuarum oculi tunicarum initia ostendas, & dein-
de uisorium neruum ab oculo^b diuidas, ut nihil præter duram, ceu exactissima quæpiam sphæ-
ra, appareat. Sphæram hanc summis digitis sinistrae manus ita apprehendes, ut pollex quidem
pupillam, reliqui autem eam sedem in quam uisorius neruus implantatur comprehendant, dein
dextra manu acutiori nouacula sectionem quàm poteris longissimā in dura oculi tunica trans-
uersim duces, ut citra compressionem omnes oculi humores excidere possint. Hi enim hac du-
cta sectione, oculo^c que in dextram manum assumpto, in manus sinistrae uolam ita sunt demit-
tendi, ut crystallinus uitreo elatiorem locum habeat: negocium enim confuderis, si uitreus su-
per crystallinum reuoluatur. Atque id ne fiat uitabis, si quum in uolam ex oculo humores pro-
labi sinis, oculum non admodum à uola eleuatum tenueris, & posterior oculi pars, qua uiso-
rius neruus inseritur, uolam magis respexerit. Susceptis ad hunc modum humoribus, & repo-
sita illa oculi parte ex qua humores prolapsi sunt, manū leuiter modicè ue inuertes, ut aqueus è
uola sinistrae manus profluat, solusq; uitreus cum crystallino^d referuetur. Mox considerabis^e tu-
nicam palpebrarum pilis quàm simillimam, quæ orbiculatim crystallino humori connata, an-
teriore uitrei humoris sedem inuestit, integitq;. Tuniculam hanc cultelli mucrone à crystal-
lino humore primū diuelles, & deinde à uitreo subleuatam, supra chartam extends. Crystalli-
num humorem digitis ex uitreo quàm minimè compressum eximes: & uitreo in suum locum in
charta reposito, illæsum crystallinum humorem scripturæ alicui primū impones, & deinde
cultelli mucrone ipsius lateri modicè indito, scripturæ nunc altius, nunc demissius accommo-
dabis, quū omnia specilli instar longè quàm sint maiora reddat, consideraturus. Porro ipsius
tunicæ, quam tenuissimæ in cepis pelliculæ modo tenuem ac pellucidam, sed duriorē esse di-
ximus, ex ipsius primū lateribus cultelli mucrone dirimere conuenit, & deinde unguibus ab
humore auulsam, in suum in charta locum reponere. Vt uerò crystallini humoris discas duri-
tiem, poteris illum inter digitos premendo confringere, & postmodum chartæ adhibere.
Cæterum ut tres adhuc reliquas contempleris tunicas, oculi partem ex qua humores decide-
runt, super sinistrum pollicem euertes: & ilico^f quæ ex uisorij nerui substantia dissoluitur, tuni-
ca sese offerret, aut extensa adhuc, aut ut plurimū solet, instar mucī collecta. quapropter stylo
rursus uenit extendenda, & quantam habeat amplitudinem, cuiusque coloris & substantiæ sit
inquirendum. Deinde rursus erit colligenda, ac denique à suo^g principio ubi duntaxat firma-
tur absecta, in chartam reponenda. Iam interna uueæ tunicæ^h sedes undiquaque est conspicua,
in qua primū ipsius intueberis colores, deinde hamulo à dura ipsam diuellens, uenarum ex
dura in illam transitum, & nigricantem ipsius colorem perpendes. quum uerò adⁱ iridem diuel-
lendo pertigeris, ipsius hîc contemplaberis ad corneam firmissimum connexum, & pupillam:
cuiusq; calor is uuea sit, quā à cornea^k abscedit, atq; è corneæ regione consistit. Diuulsam hoc
modo uueā, & à suo exortu ubi firmissimè corneæ duræ ue committitur, dissectam, in chartam
modo uueā, & à suo exortu ubi firmissimè corneæ duræ ue committitur, dissectam, in chartam

*Alia oculi ad
ministratio.*

*Auditus or
gani examen.*

*Musculorū
in proposito
hactenus cor-
pore non disse-
ctorū examē.*

*Venarum, ar-
teriarū et ner-
uorum per ma-
nus seriei exa-
men.*

repones, & solam iam durā cum pellucida ipsius instar cornu partem quam carneā uocamus, contemplaberis, ipsius examinans crassitiem, & eam partem pellucidam. Postquam & hanc in suum ordinē in charta locaueris, memoriā omnia cōmendaturus, uelut ab oculi centro ad extimam usq; superficiem, & hinc rursus ad centrum singula enumerabis, & postea nisi molestum fuerit, sinistrum aggredieris, à quo¹ adhārentem membranā, & ^m musculos, ut in dextro administrabis, uerū in duram quā uueam simul penetret sectionem, nullam duces, sed quam minime compresso oculo nouacula mucrone sensimⁿ sectionē in dura molieris, nō quā primo iniectu eam diuidat, sed quā sæpius iterata, ad uueam usq; pertingat. sectioni deinceps tenuem, sed retusum stylum inferes, ac sensim uueam à dura dirimes, ut iam commodē forpicula duræ tunicæ sectionem, quā orbiculatim oculum ambiat, illæsa interim uuea perficere queas, ut uenarū ex dura in uueam transitum, & uuea postmodum dissecta, humorum situm paulo melius contempleris. Absoluta oculi Anatome, auditus^o organum, si ossa reseruanda minus duxeris, erit aggrediendum. & primum auris Natura euadit conspicua, si à cartilaginea qua conformatur substantia, cutis utrinq; separetur. At auditorij nerui processus difficilius adinuenit, serra tamen maxima ossis portione, quā supra meatum habetur, & deinde cultro fortiori reliquo ossē ad meatum usq; execto, membrana in quam neruus degenerat, & huius organi ossicula euadunt conspicua. Si enim serra meatum tetigeris, omnia uiciabis, & cultro etiam subinde nihil promouebis, quod in angusto & anfractuoso meatu, mollis tenuisq; neruus facile cum ossibus diuellatur, contundaturq;. Omnia tamen mihi percommodē succedunt, si serra totum ossis partem, quā auditus organū continet, à reliqua caluaria libero, & deinde transuersim ualidiori cultro os uniuersum impetu disseco. Cōuenit autem ita sectionē moliri, ut ea ossis sedes quā neruum à cerebro procedentem primum excipit, ab illo separetur, cui auris connascitur. Rursus si ossa haud reseruanda putas, suaserim ut frontis os quā supercilia spectat, passim effingeres, ^p si num illum quem continet accuratē examinaturus. idem quoq; in ossē cuneum imitante molientum est, ut ipsius quoque^a antra crebro apparentia, & quā illis cōtinetur materia in conspicuo sint, neq; quicq; septimo hoc libro descriptū lateat. Cæterū nunc aliquot musculorū administratio adhuc superest, quibus uidendis alterū latus suffecerit. Aggredieris itaq; musculos cubiti mouentes, & qui radium, & brachiale, & digitos mouent: mox tibiam mouentes, & qui femoris motuum autores censentur: deinde pedis & digitorū motuū opifices ita simul cum ligamentis resecabis, quemadmodū in secūdo libro iam multo antē commemorauī. Prorsus enim absre ducerem, si eos musculos, administrandiq; rationem uel obiter etiam hīc pertractarem. Quod uerò ad manus & cruris uenas, arteriasq; & neruos attinet, quum horum administratio nondum expressa sit, aliquid dicam. reliquarum enim partium uasa, neruosq; iam pridem retulimus. Primum itaq; à summo humero ad pollicis usque ungue in cute sectionē adeo leuiter duces, ut carnosam membranā non uulneres: deinde sectionis labris inuicem diremptis, omnī studio laborisq; patientia cutem à carnea membrana ita auferes, ut adipem omnē membranæ adhærere sinas. studio scq; expendas, ne uenam quampiā, aut neruulum cuti connexū sinas. & si fortē aliquem ramum cuti exporrectum negligentia diuiseris, atque cum cute aliquousq; à carnea membrana seiunxeris, illum à cute sedulo resecas, & carneæ membranæ ita atq; prorepebat, obtendito, ac dein cutem quemadmodum cœpisti adimito, nullibi cutis aliquid, neque in brachio, neq; in cubito, neq; in manu extrema relinquens. Iam^r uenulas & ⁿ neruulos obseruabis, duræ membranæ qua brachium attollentē integit musculum oblatos: dein^p primum neruum brachij, qui carnosæ membranæ aliquousq; in externa brachij sede exporrigitur, deinⁿ ramulū tertij nerui^x inter musculum brachium attollentem, & eum qui brachium pectori adducit, in carneam membranā hīc in anteriori brachij sede disseminatū. In posteriori autē brachij sede & inferiori regione externi lateris brachij^y neruorum surculos expendes, carneæ membranæ à quarto neruo brachium ingrediente deriuatos, simul cum^z ramo quem externæ cubiti sedi obliquē offert. Mox^{*} sexti brachiū petentis nerui seriem uniuersam expendes. ea enim tota carneæ membranæ duntaxat exporrigitur. Iam humerariæ secundū internum latus musculi brachium attollentis² egressum spectabis, & ramulos quos hinc inde donec cubiti attingat articulum dispensat. Ad cubiti autem articulum^b ramum obseruabis obliquē deorsum ad cōmunis uenæ constitutionē, ab humeraria diffusum: dein^c eum qui secundū radium in posteriora cubiti ad paruum usq; fertur digitum, axillaris uenæ ramum sibi affiscens. ^d Ramum uerò quem humeraria rarius ad articuli cubiti profundiora mittit, si modò adfuerit, etiam citra sectionem expendes, axillaris uenæ^e portioni animum accōmodans, quā sub mediā longitudine brachij carneam membranā subit. Hanc enim^f ramum ad communis uenæ cōstitutionem promere cernes: dein^g alios ipsius ramos secundū ulnam, seu inferiorem cubiti regionem ad brachiale ferri

l. 18, 19. fi. ca.
pi. 14. n.
m. 18. fig. ca.
14. f. 1.
n. Vti tentā
tū est in 16
fig. cap. 14.

o Exprimi,
tur fig. ca. 8
lib. 1.

p. 3, 4. fi. ca.
12. lib. 1. K.

q. 8. fi. cap. 6
li. 1. C, D, G.

r. fi. ca. 6. li.
3. d.
s. 2. fig. ca. 12
lib. 4. g. h.
t. eius. fi. x.
u. eius. fi. v.
x. 3. mus. ta.
inter P. et

Δ.
y. 3. fi. ca. 12
lib. 4. Ω. cr.
char. 32. de
riuati à φ.
z. eiusd. fig.
char. 33.
* 2. fi. ca. 12
li. 4. r.

a. fi. ca. 6. li.
3. inferius a,
dein e. e.

b. eius. fig. h
ad a.

c. eiusd. fig. i
uersus l. ubi
suscepit x,

x.

d. eius. fi. g.
e. eiusd. fi. r.

f. eiusd. fig. t
ad a.

g. eius. fi. n.
x, y, z.

h eius. fi. a. ferri spectabis, & etiam animaduertes huius portio-
 nis uenæ seriem uniuersam quoque intueberis, ad secundi brachium petentis neruiⁱ propagi-
 nes animum dirigens, quæ ab illo producuntur, simulatque in cubiti articulo carneam mem-
 branam ex alto adit. ad hæc^k ramum quarti nerui etiam spectabis, qui externe cubiti sedi ad bra-
 chiale usque spargitur. Nervos autem digitos implicantes, aliquo pacto etiam modo cernis. ue-
 rum magis conduxerit, eos tum primum expendere, quum radices ipsorum ad digitos usque
 perduxeris. Postquam itaque hæc omnia, non resecta adhuc carnea membrana diligenter non
 sine magno usu spectaueris, carneam membranā unā cum ipsi annexis uenis & neruis à succum-
 bentibus musculis auferes: ac mox^l musculum, cuius beneficio brachium pectori adducitur,
 ad ipsius usque insertionem ab illis quibus adnascitur partibus liberabis, idem & in^m illo molie-
 ris, qui brachium attollit, & qui scapulam mouentium primus & secundus habentur, dein cla-
 uiculam à summo humero^q resecabis, & ^r musculum auferes à pectoris osse & clauicula mamil-
 lari capitis processui insertum, & ^e eum qui à scapula ossi^v imitanti implantatur, & ⁱ eum quoque
 qui à prima pronatus costa, transuersis processibus ceruicis uertebra-
 rum inseritur. Cæterum quum hos adimis musculos, parum curandum est, num illos auferas illæfos, parumque uul-
 neratos. hîc enim non musculorum, sed uasorum natura uenit discenda: & perpetuò cau-
 dum est, ne uas, non autem musculus uitiatur. Si itaque ad hunc modum accuratè hos muscu-
 los ademeris, in ceruicis uertebra-
 rum latere neruorumⁿ radices seriesque eleganter occurrent,
 qui ab illis profiliunt uertebri-
 bus: atque ita etiam plexum neruorum in brachium excurrentium
 obseruabis, à quo seriatim cuiusque nerui digestionem persequeris. Ac^x primus occurrit, qui
 musculo brachium attollenti præcipuè offertur: deinde^y secundus, & ^z tertius. quorum seriem
 commodiùs spectabis, si capita^a musculi cubitum flectentium anterioris illinc unde prodeunt
 liberaueris, atque à subdito illi^b musculo ad insertionem usque ipsius detraxeris. Mox enim ita
 præter secundi & tertij nerui ad brachium ingressum, etiam^c quarti & quinti & sexti nerui, &
 dein^d arteriæ & ^e axillaris, & ^f humerariæ uenarum ingressum adinuenies, sensimque singulorum
 seriem sequeris, quæ in secundo neruo obseruatu est prompta, & tertij quoque nerui series ad
 cubiti usque articulum in propatulo est, uti etiam & quinti nerui & sexti. Quartus autem ner-
 uus, quæ secundum brachij os uersus externum illius tuberculum retorquetur, non occurrit,
 nisi oblique secundum nerui ductum^g musculos cubiti extensionis autores disseueris, neruique
 progressum ita uitiatis musculis persequutus fueris. Vbi autem hunc ad externum cubiti articuli la-
 tus usque deduxeris, ^h ramosque quos hactenus in progressu edidit examinaueris, ⁱ musculis ab
 externo humeri tuberculo principium ducentibus, à sua origine liberatis, ramos quarti nerui
 expendes, qui illis musculis offeruntur, & eam sequeris^k propaginem quæ tandem externæ
 pollicis regioni, ut & indicis quoque & medij surculos exhibet. hanc enim leui negotio repe-
 ries, si^l musculo attenderis bifido tendine brachiale extendenti. Iam quarti nerui^m propago si-
 militer inquirenda est, quæ ulnæ exporrecta, ad brachiale usque excurrit, & ⁿ musculis ab exter-
 na ulnæ sede initium ducentibus surculos depromit. Ut uerò reliquum^o tertij quintique nerui, &
 dein^p reconditæ axillaris uenæ portio-
 nis, & ^q manus arteriæ in cubito extremaque manu pro-
 gressum uideas, ^r musculorum ab interno humeri tuberculo originem fumentium capita ue-
 niunt liberanda: ita enim in anteriori cubiti articuli sede uenæ & arteriæ, & tertij nerui in cubi-
 tum ingressus occurret: & ^s eleuato secundos quatuor digitorum articulos flectente musculo,
 ipsorum ad brachiale usque progressum etiam obseruabis, unā cum quinti nerui (qui secun-
 dum posteriora interioris humeri tuberculi in cubitum fertur) portione ulnæ exporrecta, atque
 sub medio longitudinis ulnæ^t ramum diducente, qui in cubiti exteriora reflexus, externæ sedi
 parui digiti & anularis & medij surculos offert: quem leui negotio, quum in superficie propæ-
 modum ducatur, adinuenies. reliquum uerò quinti nerui & tertij progressum reperi-
 es, si^u trans-
 uersum in interna brachialis sede repositum ligamentum diuiseris, ac dein exiguo cultello ue-
 næ, arteriæ, & eorum neruorum seriem ad extremos usque digitos perduxeris. Cæterum
 priusquam cruris neruos & uasa inquire, etiam diligenter obseruabis neruorum ex lateribus
 thoracis uertebra-
 rum profilientium^x distributionem. quam tunc demum opportunè inue-
 nies, quum sedulo illorum distributione perlecta, musculorum dissectionem perspectissimam
 habes, qua hîc non minus indiges, quam ante musculorum administrationem absolutissima of-
 fici cognitione. Quum itaque ad lumborum uertebra-
 rum usque deuentum erit, ab inguine ad
 pedis usque pollicem similiter atque in manu, sectionem duces: cutem ad carneam usque mem-
 branam diuidens: ut dein uniuersam cruris & pedis cutem illæsa carnea membrana, & uenis, &
 arterijs, & neruis, inter hanc & cutem excurrentibus ad carneam membranam relictis, commo-
 de

Venarum, ar-
 teriarum et ner-
 uorum cruris
 examen.

de (licet laboriose) auferas, ac mox¹ quatuor neruorum crus petentium radices exortusq² inuenias, quos reperiens neruos e³ lumborum uertebis & sacro osse profilientes, secundum ipsorum seriem subsequendo. Deductis autem ad crus quatuor neruis, primi nerui⁴ sobolem obseruabis, carneae membranæ in externa femoris sede exporrectam, dein secundi nerui⁵ sobolem in anteriori femoris sede ad carneam membranam diffusum, atque hic⁶ uenam obseruabis per femoris & tibiæ interiora ad pedis usque summum simul cum illius rami sobole exporrectam. Terti⁷ nerui⁸ sobolem carneae membranæ oblatam inuenies, si inguini animum adhibueris. Ut autem quarti nerui⁹ ramum in carneam membranam diffusum inuenias, primum femur mouentium musculum ab ilium osse & sacro coccygeq¹⁰ ad insertionem usque liberabis, moxq¹¹ quarti nerui truncum eumq¹² ramum spectabis. Quo inuento, etiam¹³ ramum quarti nerui in carneam membranam iuxta poplitem, femorisq¹⁴ humiliora diffusum absque sectione inquires, & dein quarti nerui ramos tibiæ cuti multifariam simul cum uenis depromptos in carnea membrana peruestigabis. & mox ad inguina reuersus, primi nerui seriem in musculis occultatam cultello per musculos quæres, quod & in secundo & tertio facies: quanquam cum tertio etiam arteriæ & uenæ¹⁵ propagines inueniendæ sint, quæ per pubis ossis foramen in femur delabuntur. Venam autem & arteriam insigniores femur petentes dissectis uitiatisq¹⁶ musculis sensim adinuenies, & ipsarum obseruatis ramis, progressum eorundem sequeris, quæ secundum femoris os reuertentur, ac poplitem unâ cum quarto neruo adeunt. Atque ubi tria hæc, uenam scilicet arteriam & neruum reperiens, quæ in poplite diuidantur peruestigabis, & musculis ligamentisq¹⁷ uariè dissectis, uniuersam ipsorum seriem discies. quod sanè feceris facile, quanquam laboriose, si modò horum distributione sedulo prælecta, & meæ de humani corporis fabrica Epitomes tabulis ob oculos positis, exactam ossium musculorumq¹⁸ cognitionem habueris. Est enim in hominis partibus accuratè discendis diligens ordinis habenda ratio.

DE VIVORVM SECTIONE NONNVL

la. Caput XIX.

Quid mortuorum sectione, & quid uiuorum discatur.



Ossium ac cartilaginis usus in uiuo animæ re quæ uidetur.

Ligamentorum usus.

Musculorum usus et functio quæ spectatur.

Nerui in musculis usus.

TI sanè mortuorum sectio cuiusque partis numerum, situm, figuram, substantiæ proprietatem, compositionem accuratissime docet: ita quoque uiui animantis sectio interim functionem ipsam manifestò ostendit, interim ad huius inuentionem ratiocinationes percommode exhibet. quare etiam meritò in mortuis animantibus primum studiosi ueniunt exercitandi, ut postmodum actionem usumq¹ partium inquisituri, promptè uiuum animal aggrediantur. Cæterum quum corporis permultæ sint particulae, differentibus actionibus usibusq² dicatæ, multiplices quoque uiuorum sectiones esse, neminem ambigere decet. In ossibus enim, ut seriatim singula pertractemus, à uiuorum Anatome petimus, num corporis hæc optimum fulcrum ac firmamentum sint, numque omnia his adnascantur adstabilianturq³. quum enim uiui animantis os aliquod ruptum cernimus, uniuersum membrum fracturæ subiectum collabi, neq⁴ amplius firmari intuemur: quod quia crebrius casu obuenit, in ossium usu indagando uiuorum sectionem non magnopere requirimus. Cartilagines quoque simili ratione quædam firmare, quum franguntur, discimus: in articuli uerò alicuius dissectione, uidemus quid cartilago præstet, etiam si hanc in uiuo animante non obeamus. atq⁵ ita etiam ligamenti ossa colligantis usus in mortuis quoque uisitur, ut & ligamentorum etiam transuersim tendinibus obductorum. dum enim⁶ transuersum in brachialis interna sede positum ligamentum diuidimus, ⁷ musculumq⁸ digitorum secundos aut tertios articulos flectentem ad suum principium trahimus, id uidemus in hoc potissimum factum, ut tendines, quominus e⁹ sua sede exurgant, contineat. quanquam id in cane uiuo etiam licebit cernere, si obiter cutem à cubito & manu, ut ita dicam, extrema liberaueris, & cultello transuersum in brachiale ligamentum, & alia quæ in externa ulnæ radij sede ad brachiale habentur, diuideris. mox enim quum canis suo impetu digitos flectet, & extendet, tendines e¹⁰ suis sinibus subleuari cernes. Atque in hac eadem administratione musculorum actionem specularere, quum illos in se, ubi maxime sunt carnei, colligi crassescereq¹¹, & rursus produci graciles que fieri uidebis, prout collecti partem attrahunt, aut remissi eductiq¹² eam ab alio musculo in contrarium uelli sinunt, aut etiam alioquin suam collectionem non exercent. Neque id hinc in cubito duntaxat est obseruandum, uerum altius ab eodem cane cutis est adimenda, ut brachium uniuersum axillaq¹³ denudetur, & nerui per axillam in id prorepentes appareant, atque ex illis aliquem laqueo intercipias, cuius feriem in musculos quosdā pertinere cognoueris. Verum quum canis neruorum & hominis nume-

rus

2 fi. ca. 11
lib. 4. char.
57, 60, 66,
71.
2 eiusd. fig.
cha. 58.
1 eiusd. fig.
cha. 61.
b fi. ca. 6 li.
30.
c 2 fi. ca. 11
lib. 4. cha.
68.
d eiusd. fig.
cha. 72.
e 9 muscu.
tab. n.
f 2 fi. ca. 11
lib. 4. char.
74. atque
ita tota re-
liqua quar-
ti nerui se-
riem inde
pete.
gulti. figu.
lib. 3 i.

a 4 muscu.
tab. 8.
b 4 musc.
tab. B. 5 ta-
bu. 8.

c 2 mus. ta.
characte-
res 1, 2, 3,
4, 5, 6.

rus distributioq; non admodum conueniat, suaserim ut quum hanc sectionem in uiuo cane obiturus es, mortuum quoq; ad manum habeas, in quo neruorum per brachium & cubitum excurrentium seriem didiceris, atque ita neruum aliquem inueneris, qui in musculos quosdam digeritur: uti ferè illi erunt, quorum alter in homine^d tertius est, ac secundum anteriorem cubiti articuli sedem in cubitum fertur: alter uerò^e quintus, secundum posteriorem humeri tuberculi regionem in cubitum properans. Huiusmodi enim nerui in cane etiam obseruantur, & illis alicubi priusquam ad cubiti articulum pertingant ligatis, motus aboletur musculorum digitos & brachiale flectentium, unde si & illum neruum etiam uinculo interceperis, qui in homine mihi^f quartus numeratur, atque secundum humerum ad externum ipsius tuberculum porrigitur, etiam motus abolebitur musculorum brachiale & digitos extendentiũ. Conduxerit autem huiusmodi neruos laqueis intercipere, quo illis modò in hoc modò in illo neruo solutis musculorum motum restitui obserues. Iam musculo alicui muris forma donato (quales hñc in cubito occurrunt plurimi) longam sectionem induces, quæ uentrem totum penetret, ut musculi illius motum, huius sectionis gratia non perdi expendas. Dum autem transuersam sectionem uentri induces, tantum musculi motũ aboleri uidebis, quanta erit sectionis profunditas. Atq; quum uentrem prorsus diuides, musculum ad insertionem ipsius una parte, alia uerò ad exortum colligi obseruabis. si uerò alterius musculi tendinem præscindes, musculũ uersus exortum cõtiellĩ cernes. Item si caput diuideris, is ad insertionem cõtrahetur. Si uerò insertionem & caput abtruncaueris, musculus ad ipsius uentrem sedemq; qua maximè carneus est conglobabitur, itaq; musculorũ functio tibi hæc molienti erit obuia. Si autem priuatim nerui alicuius, aut musculi functionem inquirendam duxeris, eum neruum & musculum, ut iam in brachio & cubito faciendum præcepi, aggredieris. Neque est quod hñc prolixè cõmemorem, qualiter in his administrationibus canes aut eius generis animalia ligare conueniat, quum quisque pro sua industria, si modò in mortuorum sectione adamussim uersatus fuerit, hæc omnia rectissime obiturus sit, & citra mortuorũ sectionis peritiam in uiuorũ Anatome omnia in cassum tententur. Adeò ut de neruorũ musculorumq; sectione mihi nihil dicendum supersit, quanquam & de neruis recurrentibus paulo post quædam subiiciam. Vt autem uideas num^g nerui substantia, aut membranæ illam induentes animalem uim præcipuè porrigat, opportunè feceris, si cutem femoris tibiæ & pedis auferas, ac^h primo femur mouentium musculo à suis exortibus liberato, quartum femur petentem neruum inquiras: & huius membranæ à nerui substantia detractis, expendas quĩ pedis digiti ipseq; pes adhuc moueatur, ipseq; neruus concreditum sibi munus adhuc exerceat. Verum si quis medullæ dorsalis munus rimari statuisset, ac uidere cuperet, quĩ ea læsa, partes læsioni subditæ sensum motumq; perdant: huic licebit canē ita asseri cuipiam aut trunco alligare, ut dorsum ceruicemq; porrigat, quo dein grandiori cultro uertebra- rum aliquot spinæ præscindi queant, tandemq; dorsalis medulla ea sede nudari possit, qua illam quis secandam arbitrabitur. nihil enim facilius est, quàm tunc uidere motũ sensumq; subditarum sectioni partiũ aboleri. Cæterum in uenarum usu inquirendo, uix quoq; uiuorum sectione opus est: quum in mortuorũ Anatome affatim discamus, eas sanguinē per uniuersum corpus deferre, & partē aliquam non nutriri in qua insignis uena in uulneribus præscinditur. Item in arterijs uiuorum sectionem uix requirimus, quanquam licebit alicuiⁱ arteriam in inguina procedentem nudare, uinculoq; intercipere, ac intueri partem arteriæ uinculo subtenfam, non amplius pulsare. Atque ita leui negotio obseruatur in arterijs sanguinem natura contineri, si quando arteriam in uiuis aperimus. Vt autē certiores fiamus, pulsandi uim nō arteriæ inesse, aut contentam in arterijs materiam pulsum opificem existere, uerum à corde eam uirtutem pendere, præterquàm quòd arteriam uinculo interceptam nō amplius sub uinculo pulsare cernimus, licebit inguinis femoris ue arteriæ longam sectionem inducere, & canaliculum ex arundine tam crassum assumere, quanta arteriæ est capacitas: & illum ita sectioni indere, ut superior canalis pars altius in arteriæ cauitatem pertingat, quàm sectionis superior sedes: & ita inferior quoq; canalis pars, deorsum magis ipsa inferiori sectionis parte protrudatur, ac dein uinculum arteriæ circundet, quod ipsius corpus super canalem stringat. Quum enim id sit, sanguis quidem & spiritus per arteriam ad pedem usq; excurrit, uerum tota arteriæ pars canali subdita non amplius pulsat. Soluta autem uinculo arteriæ pars canali subdita, non minus quàm superior pulsum ostendit. Quanta uerò uis à corde per arterias cerebro deducatur, postea uidebimus: nunc Galeni uiuam in hac demonstratione confectionem summopere mirantes, qua omnia præscindi suadet quæ cerebro & cordi sunt cõmunia, semper omittens^j arterias, quæ per transuersos uertebra- rum ceruicis processus caput petunt, & etiam nō mediocrem portionem uitalis spiritus in^k primos duræ membranæ sinus, atq; ita etiam in cerebrum deferunt, adeò ut nō mirum

Nerui uis
sus examen.

Dorsalis me-
dulla.

Venarum.

Arteriarum.

d. 2, 3 fig. ca.
u. li. 4. 7. &
eius lib. ult.
figura T.
e. 2, 3 fi. ca.
u. li. 4. * et
ult. fig. m.
f. 2, 3 fig. ca.
u. li. 4. 7. et
ult. fig. e.

g Intimam
nerui substā-
tiā, & duas
illi obdu-
ctas mēbra-
nas ostēdit
17 fi. ca. 14
huius libri
h. 2, 7.
h Vt in 10
mus. ta. libe-
ratũ est n.
et uidetur f.
i 2, 3 fig. ca.
u. li. 4. cha.
71 & ult. fi-
gura 1, 1.
k fi. cap. 12
li. 3 p.

l fig. cap. 12
li. 3. F.
m 7 fi. P, P
& Q, Q.
9 fi. S, S &
T, T.

*Forū quæ pe-
ritonæo conti-
nētur functio-
num examen.*

*Generationis
organorum.*

Factum.

*Cordis ipsiq̃
subministran-
tium partium
usus examen.*

rum sit, cerebrum diutius in illa administratione suo munere fungi, quàm commodè Galenus fieri arbitrabat̃. respirat enim in hac sectione diutissimè animal, & aliàs mouetur. si uerò currit, itaq̃ multo spiritu indiget, non multo pòst concidit: quanquam adhuc postea cerebrum animalis spiritus substantiam recipiat, ab illis arterijs quas per transuersos cervicis uertebrae processus caluariam petere recensui. Cæterum hoc loco ubi de uiuorum sectione obiter tantum pertractandum duxi, haud proposui Galeni aut rectè, aut minus rectè celebratas uiuorū sectiones recensere: quum hîc abundè fecero, si perfunctoriè aliquot sectiones recenscam singulis libris dicatas. Atque quum iam ad quintum usque sit deuentum, modò de nutritionis organis sermonem instituemus, quorum munus ferè in mortuorum sectione etiam discimus. Videmus enim peritonæū omnium ipso complexorum organorum esse inuolucrum, omentum ut & mesenterium uasorum deductioni & distributioni optimè subseruire, uentriculum cibos & potum conficere, hosq̃ per stomachum huc deferri. Quanquam & uiuos canes, qui modò paulo aut multo antè cibum sumpserunt uiuos aggredi, atque ita etiam intestinorum munus rimari, nihil prohibeat. Iecoris autem officiū, ut etiam lienis, aut renum, aut uesicæ, in uiuorum sectione uix melius quàm in mortuorum intueri possumus. nisi quis uiuo cani lienem execare uoluerit, uti & ego aliquādo feci, diebusq̃ aliquot canem asseruauī. Atque ita etiam renem aliquando executi: uerū uulneris curatio molestior est, quàm quæ hinc sumitur cognitio iucunda, nisi quis nō tam organorū cognitionis ratione has sectiones aggredieretur, quàm ut manum exerceat, ac abdominis uulnera aptè suere discat: quod & in intestinis studiose experiendum est, quo quis uulnerata cōsuere, atque in abdomen quum exciderint, imponere assuescat. Verū hæc perinde ac ossium luxationes, & fracturæ quas in brutis, ut & medicaminū quorundam uires aliquādo tentamus, exercendis potiùs manibus, & rectæ curationi instituendæ, quàm organorum officijs indagandis conducunt. Porro uiuas sectiones instrumentorum generationi subseruientium indies ferè in ramicum curationibus, & in animalibus quæ castrantur obseruamus. atque illæ propemodum uasis seminarijs & testibus spectandis sufficiunt: nisi quis illam quoq̃ addere uelit, qua testis substantiam ex tunica ipsi proximè obducta eximimus, aut etiam à seminarijs uasis testis substantiam unā cum illa tunica rescindimus. Verū in foetuum uiua administratione iucundum est spectare, qualiter simulatq̃ foetus aërem ambientem contingit, respirare nititur. Atque hæc sectio opportunè in cane aut sue obitur, quum nō multo pòst sus est paritura. Si enim ipsius abdomen ad peritonæi usque cavitatem diuiseris, atque dein uterum quoque in unius foetus sede aperueris, ac "secundina ab utero liberata foetū mensæ imposueris, cernes per pellucas membranasq̃ ipsius tunicas, qualiter frustra respirare conatur, & ueluti suffocatus moritur. si uerò ipsius inuolucra pertuderis, foetusq̃ caput illis liberaueris, mox illum ueluti reuiuiscere, & eleganter respirare cernes. Atque quū id in uno foetu indagaues, alium aggredieris: quem ab utero nō liberabis, uerū apertum uterum ita inflectes: & inferiùs illic aperies, ubi foetus secundinum desinere, aut secundinæ inferiorē partem haberi arbitraberis, quo scilicet ea uteri pars integra seruetur, quæ secundinæ obnascitur, per reliquam uerò sedem foetus detectus sit. ita enim spectabis arteriarū uteri, & dein secundinæ pulsum: & foetu adhuc in suis membranis ueluti fursum protruso, cernes umbilicum petentiū arteriarum motum, & foetum nondum respirare, neque etiam ad respirationem conari. mox uerò atque membranas pertundes, foetus respirabit, & umbilici arteriarum pulsus intercidet, pulsantibus interim adhuc uteri arterijs. In cordis & pulmonis functionibus pleraq̃ expendimus, motum uidelicet pulmonis, & num aspera arteria eorum quæ bibuntur portionem assumat: dein cordis dilatationem & cōstrictionem, num idem rhythmus sit pulsus cordis & arteriarū, & dein qualiter uenalis arteria distendatur ac cōprimatur, & quū execto corde animal adhuc uiuat. In quibus obseruādis, magnoperè animali indigeremus lato pectoris osse donato, & ° mēbranas thoracem intersepientes tam distantes obtinente, ut diuiso secundum longitudinem pectoris osse, sectionem inter eas membranas ad cor usque ducere possimus, citra thoracis cavitatum (quibus pulmones continentur) pertusionem. Verū quum nullum eiusmodi animal præter hominem, & non caudatam simiam occurrat, in canibus ac porcis illisq̃ animalibus quorum nobis datur copia, sectiones ita sunt aggrediendæ, ut prædicta omnia intuearis. Quod itaque pulmo thoracis motum sequatur, hinc patet, quòd sectione in aliquo costarum interuallo ad thoracis usque cavitatem ducta, læsi lateris pulmonis pars concidat, neque amplius cum thorace distendatur, reliqua adhuc pulmonis parte thoracis motum sequente: quæ etiam mox concidet, si & in altero latere sectionē in thoracis usque cavitatem molieris. atque ita animal etiam si thoracem aliquandiu moueat, non minùs morietur quàm si suffocatum esset. Verū in hac administratione obseruandum uenit, ut sectionem quàm proximè ad superiorem alicuius costæ

n: ta. fi. 30
lib. 5 F. et 2
ta. K. et 3 et
4 ta. Q. R.

o: fig. li. 6
G. G. et I. I.

Ita ducas, ne ad inferiorem sectionem dirigens, uasa hæc exporrecta pertundas. tum enim sanguis illinc profluere, qui aeris per uulnus immissi & emissi gratia, spumofus redditus, pulmonis loco tibi imponeret. Incaute enim secantibus eiusmodi spuma pulmo esse uidetur, ipsiq; pulmonem aliquandiu etiam sua insita ui distendi opinantur. Vt uero naturalem pulmonis cum thorace sequelam uideas, ex altero latere duarum aut trium mediarum costarum cartilagine dissectabis, & sectionibus per illarum costarum interualla ductis, singulas costas extrorsum reflectes, ipsasq; franges, quo opportunam constituas sedem, per quam lateris illæsi pulmonem uidere queas. quum enim thoracem intercipientes membranæ in canibus admodum pellucidæ sint, per facile est, per eas pulmonis partem thoracis motum adhuc sequentem intueri, ac illis etiam membranis leuiter pertusis considerare, qualiter & ea pulmonis pars intercizat.

p 6 fig. lib.
6 G.

q 3 fi. li. 6
D, E, F.

r vii para
ta est 2 fig.
lib. 6.

Priusquam tamen eas pertundas, cōduxerit^r arteriæ uenalis propagines in eam pulmonis partem, quæ iam cōcidit, manibus apprehendere, & aliquousq; ab ipsis substantiâ pulmonis liberare, ut discas num ille perinde atque cor moueatur. Cordis enim motus etiam hîc tibi est conspicuus, præcipuè si cordis^q inuolucrum diuideris, atque ab illo cor in eo latere detexeris, ubi hanc administrationem moliris. Conduxerit uero hanc in sinistro latere tentari, ut scilicet dextra pulmonis pars adhuc moueatur, & etiam uniuersum arteriæ uenalis truncum manu apprehendere queas. In huiusmodi quoque administratione non inutiliter cordis basim apprehendes, & uno uinculo uasa ab ipsa prodeuntia simul & ocyus intercipientes, ac dein sub uinculo cor excabis, solutisq; quibus animal colligatum est laqueis, currere fines. Vidimus enim aliquousque etiam ita affectos canes, sed præcipuè feles, cucurrisse. Cæterum cordis motus, ut & arteriarum, rectius spectabis, si mox atque canem asseri alligaueris, sectionem à iugulo per costarum cartilagine, quæ illæ ossibus continuantur, in utroq; latere acuto admodum cultro duces, ac mox ab unius sectionis fine transuersim ad finem alterius sectionis, tertiam sectionem in peritonæi usque amplitudinem molieris, & leuato pectoris osse cum ipsi coarctatis cartilaginibus, & septo transuerso ab ijs liberato, pectoris os ad animalis faciem sursum reflectes, ac mox diuiso cordis inuolucro, una manu cor apprehendes, & alia arteriam magnam dorso exporrectam continebis. Quanquã & hæc omnia melius obibis in ea uiua sectione, quam inter alias utpote uberiorẽ in scholis exhibere cōsueui, atq; hanc ideo simulatq; nõnulla de cerebro subiunxerõ, perscribam prolixius, ut ab alijs leuiori negotio etiã aggredi possit. In cerebri igitur ipsiusq; partium examine, parum omnino in uiua sectione uidendum est, quum hîc uelimus nolimus, uel theologorum nostratum causa, memoriam, rationem, & cogitationem brutis animalibus adimere debeamus, utcunque illis cum homine eadem sit constructio: atque ita Anatomes studiosus, & in mortuorum sectione uersatus, nullaq; hæresi infectus, probè intelligit, quàm malè mihi cōsultum uelim, si quod aliàs longe lubentissimè facerem, de cerebri uiua sectione aliquid instituerem. Quòd tamen ad sensum & motum attinet, uidere est, cerebro ablato utrunq; perire. Atque hîc eadem indagandi est ratio, quam in neruorum administratione præcepimus. Num uero cerebrum sentiat, in homine uenit inuestigandũ: qui quũ id scinditur, aut premitur, indicet num dolore afficiatur, num ue quo cerebrum alteratur, sentiat, uti in capitis uulneribus indies experiri integrum est. Rursus caluariam canis posse frangi, & cerebri uentriculum aut dextrum aut sinistrum aperiri, ac quũ animal motum perdat, illumq; denuò occluso uentriculo recipiat, neminem ambigere arbitror. Porro sectionem quam me descripturum paulo antè pollicebar, in prægnante cane, aut sue aggredieris: quanquam uocis occasione suam accipere magis conueniat. canis enim aliquandiu ligatus, utcunq; illum afficias, subinde neque latrat, neq; ululat: itaq; uocis ablationem aut resolutionem interdum expendere nequis. Primum igitur animal ut supinum iaceat, anterioremq; colli sedem, & liberum corporis truncum porrigat, asseri ita quàm poteris ualidissimè alligabis, quemadmodum hîc modò interiecta tabella proponit: quanquam id quisq; pro sua industria, rerumq; copia facillè præstabit, haud enim arduum est asserem quempiam sumere, cui foramina insint, ligandis cruribus apta: aut si nulla adsint foramina, promptè asseri duo baculi subiiciuntur, illisq; crura aduinciuntur. Inter cætera autem, superioris maxillæ præcipua habenda est ratio, ut illa ualidè asseri firmetur, quod feceris catenula, aut corda quapiam robustiore ante dentes caninos ligata, ac dein cuipiam asseris anulo, aut foramini, aut ut commodius duxeris commissa, ut scilicet collum exporrectum, caputq; immotum sit, &

Cerebri fun-
ctionis exat-
men.

Viua sectio,
qua Patanij
ac Bononiæ
Anatomes
speculationi
colophõ adhe-
beri solet.



*Nervorum re-
currentium exa-
men, uocisq; e-
orum sectione
abolitio.*

*Septi trans-
uersi functio-
nis examen.*

*Pulmonis
motuum.*

*Aqua in cor-
dis inuolucro
reposita, &
cordis motuum
examen.*

*Num cordis
& arteriarum
par pulsus sit,
examen.*

interim animal libere respiret clametq;. Priusquam uerò animal ita uincitur, Ipektoribus in mortuorum Anatome uersatis recensere soleo, quæ nam potissimum præsentī sectione sint uidentia, ne proluxa in dissectione enarratio operi obsit, illamq; interturbare cogar. Mox itaque longam in collo sectionem acutiori nouacula duco, quæ cutem & subiectos illi musculos ad asperam usque arteriam diuidat, id cauens, ne sectio in latus aberraret, uenamq; notatū dignam uulneret. dein manibus arteriam asperam compræhendo, & illam ab incumbentibus musculis digitorum duntaxat opera detegens, ad huius latera soporales arterias, illiq; attenuatos sexti paris nervorum cerebri nervos perquiro, dein recurrentes nervos lateribus asperæ arteriæ adnatos etiam obseruo, quos interdum laqueis intercipio, interdum præscindo, idq; primum ex altero latere, ut nervo hic intercepto præfecto ue dilucidè obseruetur, quī media uox pereat, totaq; ambobus nervis læsis intercīdat, & si laqueos soluo rursus redeat. id enim citò & citra insignem sanguinis fluxum expenditur, ac pulchrè auditur, quā ualidam efflationem animal citra uocem moliatur, recurrentibus nervis cultello diuisis. Hinc ad abdomen uenio, & acuta ualidaq; nouacula sub spuriarum costarum cartilaginibus, mucronataq; pectoris ossis sede sectionem instar semicirculi uno ductu ad peritonæi usque cauitatem molior, ex cuius sectionis medio ad pubem usque aliā tento, quæ promptè succedit, si cultrum aut nouaculam peritonæi amplitudini indem, itaq; intestina & uterū foetibus distentū duabus illis sectionibus detegem, id sedulò studens, ut peritus sodalis pollicem^a uasis obdat, quæ sub pectoris osse descendentiā abdomen petunt. illa enim sola hætenus multum sanguinis fundunt. Hic modò sectioni uiciniōres hortor, ut manu^b septo transuerso adhibita, ipsius motum experiātur: dissitos autem, ut uentriculi & iecoris ueluti in thoracis cauitatem assumptionem & dimissionem spectent. Interea in altero thoracis latere longam sectionē ad costarum usque ossa duco, ad eam ferè regionem, qua costæ in cartilaginē^c degenerant, & dein secundum costarum ossa transuersas sectiones molior, ut ossa incumbētibus musculis aliqua ex parte liberem: & dein si operosiores administrationem sequi uisum sit, intercostales musculos in duobus costarum interuallis à tunica costas succingente auferam, ut dein mediam inter illa interualla costam solarum manuum auxilio à tunica costas succingente auellam, illaq; à sua cartilagine fracta, & deorsum in latus inflexa, magna tunicæ costas succingentis appareat amplitudo, quæ pellucida pulmonis motum utcunque arguat. Hac insuper pertusa, uidetur quī huius lateris pulmo concīdat, thorace interim æquè ut prius moto. Vt uerò id magis in conspicuo fiat, plura costarum ossa à suis cartilaginibus libero, & quā possum maxime hoc thoracis latus^d aperio, ut commodè per membranas thoracem intersepientes, altera pulmonis pars, quæ in thoracis cauitate nondum læsa pulchrè cum thorace mouetur, in conspectum ueniat, ac deinceps illis membranīs pertusis, hæc quoque mox à perforatione concidere uideatur.^e Nunc in altero etiam latere acutiori cultro, una sectione costarum ossa à cartilaginibus libero, & à cartilaginibus pectorisq; osse septum transuersum, ut os illud cum cartilaginibus diuulsis thoracem intersepientibus membranīs, sursum ad collum reflecti queat, cordisq; inuolucrum in conspectu sit. quod ilico cultello aperiendum est, obseruandumq; quantum aquæ contineat, & quī cor agitur. Verū cordis motui non diu animum adhibebis, quin potius ut animali iam ferè propter concidentes pulmones suffocato succurres: ut dein adamussim rursus cor arteriasq;, & foetus in utero contentos, quandiu uisum erit, examines. Hætenus enim sanguinis fluxus parum incommodi animali intulit, si modò illa quæ sub pectoris osse repunt^f uasa sodalis diligenter pollice, aut indice & medio obturauerit, atque pectoris os sursum ad collum reflexum iaciat, itaq; ob uasorum obliquitatem illa nihil amplius fundant. quod & in uasis costis singulis exporrectis sit, quum costæ efractæ deorsum, uti fieri solet, euertuntur: ipseq; dum sectionem administras, uasa tantisper dum obliquentur occludere adnissus fueris, illorumq; series te non fugerit. utcunque sit, mihi in hac sectione sanguinis fluxus obesse nūquam uisus est. Vt uerò uita animali quodammodo restituatur, foramen in asperæ arteriæ caudice tentandum est, cui canalīs ex calamo aut arundine indetur, isq; inflabitur, ut pulmo assurgat, ac ipsum animal quodammodo aërem ducat. leui enim inflatu in uiuo hoc animali pulmo tantum quanta thoracis erat cauitas intumet, corq; uires denuò assumit, & motus differentia pulchrè euariet. Inflato igitur semel atque iterum pulmone, cordis motum uisu tactuq; quantum lubet examinas, & arteriæ magnæ caudicem dorso explicatam, aut in thoracis cauitate, aut ad lumborū uertebras comprehendis, & spectas pariter, nihilq; tibi manifestius occurrit, quā cordis & arteriarum pulsum rhythmus. quo aliquandiu obseruato, pulmo rursus inflandus est: hocq; artificio, quo mihi gratius in Anatome nullum comperi, magna pulsum differentiarū cognitio paranda. Quum enim pulmo diu flaccidus concidit, undosus, formicans, & uermicularis cordis arteriarumq; pulsus motus ue

*Specta siui
sum fuerit
figuram ca-
piti 9. li. 4.
imposita.*

*a 6. muscul.
tab. a.
b 7 muscul.
tab. a.
c Inter T et
S 6 muscul. ta.*

*d Quasi pa-
raretur
fig. lib. 6.*

*e Quasi 2
fig. li. 6. pa-
raretur.*

*f 2. fi. li. 6.
B, C, D, E.*

tus ue spectatur, inflato autē pulmone, magnus rursus & uelox efficitur, mirasq; inæqualitates proponit, & ut semel dicam, hæc administratio eiusmodi est, qua omnium optime pulsum naturam medicinæ candidatis proponere soleo. Verum in horum examine foetuum gratia non diu hærendum est, sed in aliqua bicorni canis suis ue uteri sede, sectionē super foetum aliquem duco ad ^s extimum ipsius usque inuolucrum penetrantem: quo deinceps ab utero diuulso, foetum cū suis inuolucris eximo, & effracto extimo, medioq; inuolucro, per intimum ualde pellucidum ostendo, quī foetus respirare conetur, quamq; pulchrē intimo quoque inuolucro fracto aërem ducat. Mox proximum foetum, quantum possum detego, uterum nulla ex parte ab extimo inuolucro diuellens, ut hic ita foetus uasorum naturā examinetur, uti prius uitam foetuum dissectionem faciendam præcepi. Et quum hæc facio, ac per interualla pulmonem inflari curo, nondum cordis & arteriarum motus latet, uerum magno admodum interuallo animalis uitæ succurritur, & cordis ⁿ auricularum motus expenditur, perinde ac ⁱ arteriæ uenalis, & rursum ^k uenæ arterialis: quæ si non sat sit proximē ad cor tetigisse, in aliqua pulmonis fibra ipsius substantiam à uasis unguibus discerpo, & quod hīc animaduertendum est, pro spectatorum industria obseruari sino. Quum hæc absolui, ^l dextrum cordis uentriculū aperire soleo, & obseruare quī cor nihilominus adhuc moueatur: dein ^m sinistro similiter aperto, aut cordis media parte transuersa sectione ⁿ ablata, spectatores moneo, ut adhuc auricularū cordis motum nondum quiescere intueantur. Dein si animali potus colore aliquo infectus ante sectionem oblatus sit cuiusmodi ille in pulmonibus occurrit, perquiro: hac sectione, quam pro spectantium eruditione adhuc operosiores interdum instituo, toti Anatomiciæ speculationi colophonem in nostris scholis perinde addens, atq; huic meo de Humani corporis fabrica studiosorum nomine suscepto labori, finem impono.

Foetuum
examen.Arteriæ ue
nalis, & uenæ
arterialis mo-
tuum examen.LIBRI SEPTIMI ET VLTIMI
FINIS.

Kk 2

8 Specta si-
mul tabellas
30. figuræ
lib. 5.

h 4. fi. lib. 6.

l. K.

i 6. fig. lib.

6. G.

k 6. fig. lib.

6. I.

l patet in 7.

fig. lib. 6.

m patet in

9. fi. li. 6.

n uti factū

est in 11. fi.

lib. 6.

LOCORVM INTER EXCVDENDVM OPERARVM INCVRIA
deprauatorum emendatio lectio.

Pag. 5. uers. 1. legend. friabilis 10. 25. brachiale 12. 50. synneurosis 17. 40. cartilagine 19. 45. PFLVEGEL 43. 39.
delitescens 52. 29. confinxisse 54. 7. secunda figura 73. 27. connexum 76. 27. excipit 78. 52. uocatum, secundo excep. 49. 52.
figura decem 81. 45. continua 90. 7. ἐπισπλάγγειος 111. 24. comprimitur 114. 32. immoreris 125. 55. admonens 129. 17. transversos
132. 16. insinuatum 135. 49. plurimis. ¶ 56. eleganter 156. 10. suo 157. 17. cervicis 159. 16. nihilq. non 167. 2. σφυροειδής ¶ 21.
μυλῖται ¶ 33. τρεῖς ἄκρους ¶ 44. cassos 168. 54. μετατάττει 181. **QVARTA MUSC. TAB.** 233. 25. dele,
ligamenti 224. 32. radici 225. 32. intercostales ¶ 47. alias ¶ 48. insertio 229. 25. mouentes 234. 47. non nisi 236. 13. findendis
242. 37. neruuli ¶ 45. ideo magis 243. 45. membrana 244. 36. amplitudini 250. 16. non nisi ¶ 42. nimis quam 257. 2. hyoides
264. 52. adducentem 265. 31. dorsum 266. 19. muscolum hunc ¶ 26. non nisi 283. 44. liberatam 286. 15. at uaccinum 293. 47. tho-
raci ¶ ult. abdominis 298. 4. inferior superiorq. 299. 36. famulari 301. 1. incidenti 312. quæ hanc sequuntur paginæ usq. ad finem
libri tertij, numeros habent uno centenario falsos. 216. 40. externo latere 217. 3. mouentibus musculis 223. 9. naturā 227. 17. in ani
¶ 29. commonstrant 270. 10. σφαιρίδες 273. 46. dele, perficitur ¶ 48. magni 283. 43. corporis 294. 16. ad dexterum 300. 26. ter-
tios 308. 25. quas 340. 42. cervicis 343. 54. musculorum seriem 359. 14. latus superioris 388. 25. inutile 390. 52. pathico 499. 3. νῆ-
στις 508. 6. cremori 510. 25. condidisset 515. 15. insignes 520. 21. ingenio ¶ 28 hæc ¶ paulo post, extructæ 526. 15. nouerimus 527. 38.
suscceptionē 528. 2. non magis 543. 10. superstitione 585. 19. ab utre 592. 56. στυμοειδής 594. 23. altericem 597. 24. in marg. orificio
600. 17. illam 625. 29. dura membrana 629. 56. sinuum 631. 32. media ¶ 38. propaginem 637. 54.
Huic 647. 45. concomitante ¶ 54. obducitur

RERVM ET VERBORVM

IN PRAECEDENTIBVS DE HVMANI CORPORIS

FABRICA LIBRIS MEMORABILIVM INDEX, IN QVO PRIMVS NV
merus paginam, secundus uersum indicat. Animaduertendum tamen etiam, quibus numeris * adiectus
est, in secundo alphabeto quærendos esse. quod ideo obseruauimus, ut errorem in
numeris à pagina 312 usque ad finem libri tertij, operarum incu-
ria commissum, emendaremus.



BARTICV

latio. 13.8

abdomē cur

nō etiā offeū

creatū. 89.18.

& 505. 50

abdominis

membrana,

335. 45.

abdominis musculi recti pars, qua si

mie abundant, & canes 282.35

abdominis musculi transuersi, 356. 4.

& 355.

abdominis musculi transuersi à pe-

ritonæo separatu difficiles. 283. 1.

abdominis musculorum octo descri-

ptio. 280. 50. oblique descēdentis.

281. 11. ascēdentis. ead. 42. recto-

rum descriptio. 282. 12. transuer-

forum. ibidem 46.

in Abdominis musculorum descri-

ptione uariis Galenus 283. 6.

abdominis musculorū functionem

inepte assignat medicorū uulgas.

283. 27

abdominis musculorum uenæ ac ar-

teriæ. 355. 21.

abdominis musculorū usus. 283. 10.

abdominis musculorum octo admi-

nistratio. 549. 25. eorundem ad-

ministrandi modus duplex. 285. 33.

prior, qui fit à musculorum exortu

oblique descēdentis. 283. 48. ascen-

dētis. 284. 7. recti. ead. 34. transuersi.

45. Alter modus, ab ipforū termi-

nis. oblique descēdentis. 284. 56.

ascendentis oblique. 285. 9. recti.

ead. 14. transuersi 16.

abdominis musculorum delineatio.

oblique descendētis. 179. ult.

ascendentis. 183. 2. recti. 185. 46.

transuersi. 188. 34.

abdominis musculos solos nouisse

uidetur Medicorū uulgas. 283. 27.

abdominis sectio. 548. 57. inde

ἀκωνθα. 167. 31. 33.

ἀκωνθα. 57. 28.

acceptabulum 10. 25.

acetabulum 10. 2. 25.

acetabulum herba. 539. 27.

acetabulum femori articulando pa-

ratum 130. 53

acetabulum in coxendicis offe, & hu-

mero 5. & 6. 44

acetabulorum uterī examen. 558. 28.

acies digitorum quæ 121. 48.

ἀκροχρη. 116. 3.

ἀκρωμιον. 99. 23. 54. & 100. 3. & 167. 55.

ἀκρωμιον ὀστέον.

acuale os. 167. 55

acus sectionibus apti. 236. 50. eo-

rundem delineatio 235

adaicon. 168. 3

Adami morsus os. 167. 27

additamentum. 7. 18. & 8. 1

additamentum necatum. 168. 14

* ἀδλῶ quid. 261. 29.

ἀδλωσθῆναι πρᾶσις. 525. 18. & 526. 51

adeps, σιμελῆ. 233. 28.

adeps quid. 233. 28. ubi sit copiosior.

ibid. 31. qbus sit copiosior. ibid. 41

adeps cur albet. 233. 50.

adeps intestinis obnatus. 501. 51.

adeps mesenterij. 505. 2.

adeps omenti. 497. 19.

adipis omenti usus. 497. 51.

adipis administratio, siue resectio.

234. 1. & 548. 56. & 549. 10.

adipis delineatio 231. 30

adipis usus quis 233. 41. & 51

adiutorium brachij 168. 4

adnatum 7. 18

adnexus 7. 18

Aeginetis cur præcisi ab Athenien-

sibus pollices 125. 1

Aegyptiorū pudendi muliebris ca-

runculas amputandi mos 537. 2

aër qui in respiratione digeratur.

569. 27

aëreæ substantiæ reficiendæ quas par-

tes Natura fabrefecerit 569. 27. inde

ætas nostra rerum capitibus potius

quàm proluxa enarratione gaudet

521. 5

ἀγκῶν 111. 6. & 168. 13

agis os 168. 28

al Arabum articulus. 385. 56

ala omenti superior quid 358. 15. &

humilior. ead. 18

alæ nasi 151. 27

alagosos 167. 40

albadaran officulum 126. 55

alberiteren 395. 16

Alberti Magni de menstrui sangui-

nis prauitate error 538. 18

Alberti Magni de secretis mulierum

indoctissimus liber 531. 13

alfaic os 167. 28

Alfud, Alfaud, Alphaed 387. 49

ἀλλανθῆδες, secundū fœtus inuolu-

crum ueteribus appellatum 542. 4

ἀλώπεκος musculi 297. 14

alterati color in nutritione alteranti

similis 508. 10

ἀμρυγὰ 237. 23

ἀμυρόν 11. 1

ἀμυρόν membraña cuiusmodi, & cur

dicta 542. 46

ἀμυρόν tunica 647. 41

amygdalæ faucium quæ 579. 46

ἀνέσσωσις 502. 15

Anatome priuata publicæ præferen-

da 547. 35

anatomiae hæcenus obseruata ratio

inutilis 155. 40

anatomes studiū cum Galeno pror-

pus collapsum 83. 14

anatomes studio ueteres exercere pu-

eros soliti 83. 22

ad Anatomem cuiusmodi corpus ad

hiberi conueniat. 548. 10

* anatomem spectantium notata ne-

gligentia 222. 6

in Anatome docenda qui ordo ob-

seruandus 547. 44. inde, per totū

anatomicorū instrumentorū descri-

ptio 236. eorundē delineatio 235

anatomicorum de cordis offe error

94. 13

anatomicorum de cordis orificijs di-

uersa placita 590. 34

anatomicorum de intestino cæco nu-

gæ 500. 18

anatomicorum de pylori situ error.

390. 28

anatomicorum de uentriculi cellulis

error 391. 35

anatomicorū de uentriculi exteriore

tunica in fundo nimis carnosæ er-

ror. 392. 10

Anchæ os 168. 20. 28

anchoraformis processus 168. 1

ἀνδροειδής processus 98. 23. & 168. 1

10. ANDREAE ALBII ho-

spitalitas 78. 50

And. Vesalij admonitio ad lectores

& typographos 267. 47

And. Vesalij primum compingen-

di sceleti tyrocinū Louanij factum

161. 46

ἀνδρῶν 168. 16

anima Galeno quid 569. 28

de Animæ facultatibus ac sede con-

siderare, Medici quoque officium

594. 45

animarū immortalitatis disputatio-

nem solos Theologos sibi uendi-

care 126. 48

animellæ quæ 579. 56

ἀνω κοιτία 290. 47

ansæ ossium temporum 167. 10

ANTONIUS ZVCCA 260. 55

ἀνθρώπων dicta Herophilo, cutis hu-

mana 231. 43

- αὐτὸς* faucium glandule quę 579.
 45.51.
αὐτὸς cur Græcis, pollex 124.54
αὐτὸς 139.36. & 141.11. & 168.38
 anuli à quodam deglutiti, rursusq;
 excreti historia 390.46
 anum referens in cerebro orificium
 633. 44
 * *αὐτὸς* dicta arteria 294.47
αὐτὸς 13.8
αὐτὸς intestinum 502.14
αὐτὸς musculorum 220.22
 * apoplectica arteria 296.45
αὐτὸς 8.13
αὐτὸς cum *ἐπιφύω* subinde ab
 alijs confundi 8.43
 Appendix 7.18. inde
 appendices in ætate prouectioribus
 pertinacius adharere. 7.26
 appendices in natu grandioribus co
 alitæ ossibus 12.32
 appendices in pueris ab ossibus sæ
 pius quàm articulos luxari 27.24
 appendices interdum ossium capita
 Galenò dici 9.42
 appendices nò solum grandioribus
 ossibus cōtingere 7.53. & quibus
 potissimum eodem
 appendices sinuum medullam conti
 nentium non esse opercula 7.40
 appendicū connexus in iunioribus
 solum spectatu facilis 8.11
 appendicū & processuū differen
 tiæ 8.22
 appendicum femoris, ilium ossis, &c.
 delineatio 5. & 6.14. inde
 appendicum processus. 8.29
 applantatio 7.18
 Aqua in cordis inuolucro cuiusmo
 di. 584. 47. eiusq; causa 585.4
 Arabum, de Carnea substantia ma
 nus internæ regioni superstrata,
 notata sententia 303.56
 Arabum sententia, de musculorum
 intercostalium numero 290.14
 Arabum autorū, de testium muscu
 lis notata sententia 286.4
αὐτὸς dicta oculi tunica 646.44
αὐτὸς intestinum 501.14
 arcualia ossa 166.39. & 167.10
 arcualis futura 166.27
 Aristoteles unde cor neruorū prin
 cipium esse iudicari 591.56
 Aristotelis locus de articulorum mo
 tu 65.10
 Aristotelis de auditorij organi me
 tibus lapsus 52.57. inde
 Aristotelis de costarum numero sen
 tentia 89.54
 Aristotelis de crurum in animalibus
 flexione, &c. dogma 145.18
 Aristotelis sententia de dentium nu
 mero, notata 46.46
 Aristotelis de effectiuo hominis
 principio sententia 520.43
 Aristotelis de humeri cum cubito ar
 tulatione lapsus 107.15
 Aristotelis de lienis usu sententia ex
 pensa 513.14
 Aristotelis de mamillarum situ ra
 tio 545.46
 Aristotelis de mamillarum *τεχναί*
 sententia 544.16
 Aristotelis de ossium continuitate lo
 cus 12.3
 Aristotelis locus de ossium per clauū
 connexu. 15.43. et de tñu tali. ead. 50
 Aristotelis de postbrachialis ossibus
 sententia 120.9
 Aristotelis de quadrupedū genu ar
 ticulo lapsus 139.14
 Aristotelis de seminalib. arterijs san
 guine destitutis opinio 526.5
 Aristotelis de septo transuerso sen
 tentia 291.51
 Aristotelis lapsus de futurarū in ui
 ris ac mulieribus differentia 26.50.
 item de canum caluarijs ead. 54
 Aristotelis de tertio cordis uētriculo
 lapsus 590.55. item de uentricu
 lorum numero pro animalū mole
 uariare solito eod.
 Aristotelis de thorace sententia 88.39
 Aristotelis libri de Animalium histo
 ria 90.2
 Aristotelis locus de futura inter uen
 triculum & omentum, &c. 357.19
 Aristotelis notata sententia, se sensu
 cutis 232.23
 Aristotelis nullam generandi semi
 nis uim testibus tribuentis senten
 tia 527.16
 Aristoteli omenti pars colon dorso
 colligans, pro omento non habita
 496. 32
 Aristoteli superior tantum omenti
 membrana cognita 496.12
 Aristotelem falso cordis inuolucro
 pinguedinem tribuere 584.23
 Aristotelem ubi de epiglottide agit,
 perperam ab interpretibus intel
 lectum 155.6
 armalia ossa 166.54
 arquato laborantis lien cuiusmodi
 512. 21
 Arterialis uena. uide Vena arterial.
 arterialis uenæ appellatio 590.19
 arterialis uenæ orificij membranarū
 ratio 597.39
 arterialis uenæ usus, ipsiusq; constru
 ctionis ratio 596.44
 * arteria quid sit 259.13. composi
 tio eius. 37. & delineatio. ibidem.
 Compositionis ratio 260.5
 * arteria *αὐτὸς* Aristoteli quæ 294.49
 * arteria apoplectica, lethargica, som
 ni, subeteni, quæ 296.44
 * arteria Aristoteli, Platoni, Hippo
 crati, quæ 259.16
 Arteria aspera præcipuum uocis or
 ganum 577.2.50
 * arteriæ asperæ appellatio quando
 cepta 259.34
 arteria aspera, quibus cartilaginibus
 constituitur 575.56
 arteriæ asperæ cartilagines. 3.55.
 earundē usus & ratio 577.41
 arteriæ asperæ cartilagines, quā inui
 cem colligentur 576.27
 arteriæ asperæ examen 602.53
 arteriæ asperæ exterior superficies
 qualis 575.12. item interna. ead. 23
 arteriæ asperæ figura. 151.32. eiusq;
 cartilaginū descriptio. ead. & 152.
 per totum. & 153. 8. inde
 arteriæ asperæ gratia datum homini
 collum 63.6
 arteriæ asperæ numerus, ac situs 574.
 9. forma. ead. 37. cōnexus. 575.17.
 substantia. ead. 41. inde
 arteriæ asperæ pulmonī insertæ deli
 neatio 568
 arteriæ asperæ ratio & situs. 62.53.
 inde
 arteriæ asperæ ratio ac usus 153.14
 arteriæ asperæ tunica exterior & in
 terior 576.37. inde
 arteriæ asperæ tunicarum apta con
 structio 578.30
 arteriæ asperæ usus, ipsiusq; constru
 ctionis ratio 577.1
 arteriæ asperæ commissa corpora
 574. 21
 arteriam asperā membranea substan
 tiam oportuisse extrui 577.10
 * Arteriæ magnæ appellationes ua
 riæ 294.47
 arteria magna quartum cordis uas,
 eiusq; orificiū cuiusmodi. 590.42.
 & origo. eod.
 * arteriæ magnæ ortus 298.40. or
 tus sedes 299.2
 * Arteriæ caudicis bipartitio. 299.19.
 Partis ascēdētis distributio 299.23.
 quæ ad sinistri lateris primā costā
 oblique tēdit. ibid. quæ sinistrā axil
 lam petit. 300.1. quæ dextrā. 301.1.
 Maior portio, suprema corporis
 petens. 300.53. soporalis sinistra.
 ibid. 56. dextra 301.6. soporalis
 ad caluariam series. 301.10.
 * Arteriæ partis descendētis distri
 butio. 301.39. quæ ad inferiora co
 starū interualla. ibid. 42. ad septū
 transuersum. 56. quæ ad iecur, bilis
 uelicā, uentriculū, lienē, duodenū,
 coliq; partē accedūt portūncule.
 302.1. quæ mesenterij accedit præci
 puā. 302.47. ad renes. ibid. 50. ad
 partē mesenterij humiliorē. 303.7.
 ad lumborū uertebras. ibid. 11.
 Arteriæ magnæ supra os sacrum fa
 cta diuisio, eiusq; supra cauā ascen
 sus. 303.17. partium huiusce diui
 sionis distributio. 303.32. quā pu
 bis ossis foramen transit. ibid. 47.
 per crura distributio. 304.6. quā
 tibiā adit. ead. 22.
 * Arteriæ magnæ per uniuersum cor
 pus delineata distributio. 295. bi
 pertitio. 296.2. ascendētis partis
 delineatio. ibid. quæ axillā petit.
 296.26. soporarię utriusq; delinea
 tio. 296.43. caluariā petēs. ead. 54
 * Arterię partis descendētis distribu
 tio delineata. 297. quæ ad inferiora
 costarū interualla, septum, iecur, bi
 lis

lis uesicam, uentriculum, lienem,
duodenū, colicq; partem. 297. 126.
quæ ad renes utrinq; ibid. 46.
* Arteriæ supra os sacrum diuifio deli-
neata. 297. 54. per crura distribu-
tio. 298. 17. &c.
arteria cur cauæ solum iecoris sedi ex-
porrecta 508. 45
arteria dextri & sinistri lateris ab um-
bilico in magnam exporrecta. 356.
& 357. 8
arteriæ cauum iecoris & bilis uesicu-
læ petentis figura 358. & 359. 20
arteriæ in uesicam distributæ ratio
518. 28
arteriæ magnæ cum corde situs deli-
neatio. 564. eiusdem orificium. 557
arteriæ magnæ & cauæ uenæ distri-
butionum sub osse sacro examen
556. 28
arteriæ magnæ in mesenterium ex-
cursus 504. 34. 44
arteriæ magnæ membranæ cuiusmo-
di 592. 56
arteriæ magnæ non idem cum sto-
macho per septum foramen 388.
36. inde
arteriæ magnæ orificij delineatio u-
bi quærenda 589. 42
* arteriæ magnæ ortus non contro-
uersus 298. 44
arteriæ magnæ per thoracem & iu-
gulum collumq; distributionis exa-
men 601. 10
arteriæ magnæ series in peritonæi am-
plitudine quæ obseruanda. 554. 30
arteriæ magnæ seu arterialis uenæ ra-
dicis figura 93. 39. 56
arteriæ magnæ super cauam uenam
ascensus, ambarūq; supra sacri os-
sis initium diuifio 370. & 371. 30
* arteriæ ramus, cuius pulsum ante
brachiale exploramus. 300. 28. Eius
delineatio 296. 34
* arteriæ tunica peculiare binæ. 259.
42. tunica asciticiæ 260. 5
arteriæ uenalis ad cordis basim et pul-
monem connexæ delineatio. 564.
16. inde
* arteriæ uenalis descriptio 312. 17
delineatio 311. 54
arteriæ uenalis appellatio, & descri-
ptio eiusdem 590. 25
arteriæ uenalis, eiusdemq; orificij deli-
neatio ubi quærenda 589. 42
arteria uenalis & magnæ membran-
ularum usus 598. 52
arteriæ uenalis examen 601. 14
arteriæ uenalis in corpore ratio. 598
23. eiusdem usus 583. 10. 40
arteriæ uenalis membranæ cuiusmo-
di 592. 15
arteriæ uenalis pulmonis insertæ deli-
neatio 568
arteriæ & uenæ coli & recti intestini
501. 40
arteriæ ac uenæ gracilium intestino-
rum 499. 38
arteriæ ac uenæ in musculorū fabri-

causus. 220. 35
arteriæ ac uenæ renibus oblata. 515. 15
arteriæ ac uenæ uentriculum peten-
tes 392. 22. inde
* arteriæ Coronales. 299. 9. earumq;
descriptio. ibid. delineatio 296. 1
* arteriæ cur pluribus tunicis quàm
uena, conformata. 260. 14
* arteriæ neq; à cerebro neq; ab extre-
mis corporis partibus nascuntur
298. 52
arteriæ omenti 497. 12
* arteriæ feminales. 302. 53. earūdem
delineatio 297. 46
arteriæ feminales an sanguinis exper-
tes 526. 4
arteriæ uitalem spiritum foetui defe-
rentes 518. 39
arteriam soporalem non ferri per idem
foramen cum tertio ac quarto ner-
uorum pari 52. 32
* arteriarū ac uenæ umbilici descri-
ptio. 284. ortus. ead. 7. ductus. ead.
25. usus. ead. 28
arteriarum & uenarum in intestinis
ratio 503. 35
* in Arteriarum ac uenarū serie Na-
turæ artificium 260. 46
arteriarū anatomes ratio. 552. 4. inde
* arteriarum cerebri delineatio. 305
arteriarum diductibus subditæ glan-
dulæ. quare Glandulæ.
* arteriarum in animali numerus.
260. 20
arteriarum in iecur excurrentium ra-
tio 507. 36
arteriarum per abdominis musculos
repentium administratio 549. 35
arteriarum per manum tendentium
examen. 656. 26 per crura. 657. 49
arteriarum testes petentiū ratio. 523.
17. inde
* arteriarum trium caluariæ subeun-
tium descriptio. 307. 2. quæ in pri-
mum duæ membranæ sinum ex-
hauriuntur. ibid. 49. tertiæ
arteriæ series. 310. 18. omnium deli-
neatio 305. 47
arteriarum uentriculi munus. 493. 6
* arterias recondens Natura. 300. 43
arthrodia 12. 22. & 14. 9
ἀρθρώδια 103. 11
arthrodiam quando constituerit Na-
tura 14. 18
ἀρθρον 9. 22
ἀρθρώσις. ἀρθρον 13. 2
articulatio, articulus. 13. 3. & 9. 22.
& ead. 48
articulus totius corporis dignissimus
quis 65. 16
articuli 121. 48
articuli capitis motibus parati. 64. 8
articuli duplices quibus modis for-
mentur 14. 55
articulorum cartilagines. 42. ac ui-
scidus humor. ead. 10.
articulorum cōpositionis triplex for-
ma 13. 40
articulorū motus non eadē ratio. 13. 3

articulorū per ligamenta coitus. 17. 31
articulos omnes non iisdem agi mo-
tibus 13. 20
artus 7. 14
artuum capita, non recte ἐπιφύσεις &
κονδυλός Galeno dici 9. 48
arundo brachij minor 168. 9.
maior. 12. 38. inde
ἀρύντανα, ἀρύντανοειδής cartilago. 154. 12
Aseth 168. 4
asinæ uterus acetabulorum expers
540. 9
aspera melius terere quàm leuia. 46. 7
asser os 167. 44
asserum nexus 16. 4
ἀσπρωγὰ 145. 38. & 168. 44
ἀσπίς ead.
Atlas uertebra 167. 35
Αὐχλὺς 10. 11. & 167. 35
auditorius meatus 52. 46. 51
auditus instrumentum 650. 8
auditus instrumentum Anatomicis
parum probe cognitum 323. 42
auditus organi examen 656. 12
auditus organi ossicula. 33. 50. & 34.
4. Galeno ignorata ead. 37.
auditus organi ossa quot 162. 37
auditus organi ossiculorum usus. 35.
33. & harmonia. ead. 49.
auditus organo parata cauitas, fora-
mina q; in ipsam pertinentia. 34. 39
auditus organorum constitutio 31.
29. inde
auditus ratio difficilior cognitu. 35. 36
* Auicenna, Persa 227. 30
* Auicenna, unde Anatomem descri-
pserit 227. 32.
auium iecoris situs 505. 46
auriculæ cordis. uide Cordis auriculæ
auris cartilago. 4. 53. eiusdem descri-
ptio. 150. 40 inde
aures quibusdam cur mobiles 242.
53. & 250. 43
aurium ossa 166. 49
aurium situs 19. 7
axillaris uena. quere Vena axillaris.
axillarum ualli, musculi 267. 41
ἄξων 67. 25
* ἄξωνος dicta uena 279. 28

B.



Aliste os 168. 46
basillare os 166. 46. &
167. 2. siue baxillare. 4
βασιλίδης 11. 7. & 106. 23
Βελονοειδής processus.
31. 40. & 166. 56
beriteron, berbetinen 385. 57
Biliosis naturis peculiare quid. 511. 5
bilis in intestina defluxus utilitas.
510. 45
bili excipiendæ & emittendæ parati
meatus 509. 33
bilem expurgare ubi conduxerit
510. 27
bilis uesicula carentes quosdam repe-
riri, ab Aristotele & Plinio prodi-
tum 511. 7
bilis uesiculæ, eiusdemq; meatuū de-
lineatio. 365. 7. inde. & 366. 26
Kk 4 bilis

- bilis uesiculę delineatio 370.18
 bilis uesiculę in uentriculum meatus
 493.9. in iecore. 507.35. eorumq;
 situs ratio 508.44
 bilis uesiculę meatus cur duodeno
 insertus 503.44
 bilis uesiculę meatus duodeno infer-
 tus, an propaginem uentriculo of-
 ferat 509.51
 bilis uesiculę situs. 509.5. forma. ead.
 14. substantia. 20. uenę, arterię
 & nerui 26
 ex Bilis uesicula meatum in uetricu-
 lum non semper pertinere. 510.21
 bolus dulcis 359.56
 boum cerebra crebrius Galeno tra-
 ctata 32.49
 Brabantis omentum plumę nomi-
 ne dici 497.48
 brachiale quid 117.1. & 168.15
 brachiale ab ulna diuidens cartilago.
 113 55
 * brachiale in supinum & prouum
 non agitur, contra quęm Galenus
 tradidit 215.19
 * brachiale mouētium musculorum
 administratio. 223. primi & secun-
 di. ead. 3. tertij. 224. 6. quartij. ead.
 32
 * brachiale mouētium musculorum
 descriptio. 214.3. primus. ibid.
 secundus, tertius, quartus. ibid. 26.
 munus omnium 215.4
 brachiale mouentiū musculorū deli-
 neatio. primi. 183.18. secundi.
 180.14. tertij. 195.54. quartij.
 201 55
 brachiale octo ossib. construi, inter se
 forma differentibus 117.2. inde
 brachialis ad tarsum proportio. 147.
 55
 brachialis ad cubitū articulus. 117.43
 brachialis cum radio articulatio. 113.
 41. inde
 * brachialis motus quot. 214.1
 brachialis os rectum, & cartilagino-
 sum, quod nam 118.14.16
 brachialis ossa quibus sedibus, aut
 cartilagine aut ligamētis obducantur
 117.14
 * brachialis ossa neclentiū ligamen-
 torum descriptio 220.55
 brachialis ossa quot. 149.20. & 162.42
 brachialis ossa quot alijs ossib. con-
 termina 118.29. inde
 brachialis ossiū cur duo ordines. 117.
 26. eorundem nomina, & articula-
 tio cuiusmodi. ead. 37. inde
 brachialis ossium delineatio. 115. &
 116. 10.
 Βραχιον, brachium. 105.2. & 168.3.
 Βραχιονα quid appeller Hippocrates.
 99 57
 brachium paruum 168.3
 * brachium totum, manus Hippocra-
 ti dictum 220.1
 brachij adiutorium. 168.4. cāna. ead.
 brachij & femoris os in quadrupedi-
 bus & auibus Aristoteli ignoratū,
 15.
 brachij motus 13.23. & 264.14
 brachij motus tam uarij unde 102.56
 brachij motorū musculus quispiam
 Galeno descriptus, quo simiā ac
 canes abundant, homines carent.
 266.41. eiusdem musculi descri-
 ptio, in simia, cane, & bobus. 267.1.
 administratio 268.50
 brachij motorum musculus primus,
 quo pacto duorū loco haberi que-
 at 263.7
 brachij motorum secundus muscu-
 lus, perperam a Galeno in plures
 diuisus 270.16
 brachij motorum quintus, circūuer-
 tentium primus, a Galeno non de-
 scriptus 267. ult.
 brachij os. 168.3. eiusdem figura. 5.
 & 6. 10. & 2. eiusdem descriptio
 & figura 104.5. & 105.1. inde
 * brachij totius ligamentorum descri-
 ptio. 220.4. administratio. 223.55.
 & 224 45
 brachium adducens musculus quo
 simia abundat 263.14
 brachium attollens musculus quis.
 264. 48
 brachium attollentibus musculis de-
 scribendis, Galenus uarijs. 265.21
 brachium ac scapulam mouētes mu-
 sculi, in quibus animalibus ab ho-
 mine maxime uariant 270.3
 brachium mouens musculus quispi-
 am male a Galeno assignatus. 263.
 49. & 14
 brachiū mouentes musculi, num re-
 spirationi quoq; seruiant. 292.47.
 & 293 13
 brachium mouentium tertius muscu-
 lus, non recte a Galeno inter circū-
 uertentes brachium relatus. 265.46.
 & 270 53
 brachium mouentium quartij muscu-
 li ortus ac functio non recte a Ga-
 leno tradita 266.23
 brachium mouentium musculorum
 administratio. 268.27. primi. 269.
 16. secundi. 270.7. tertij. ibid. 50.
 quartij. 24. quintij. ibid. ult. sextij.
 271.3. septimi 270.55
 brachium mouentium musculorum
 delineatio. 176.34. secundi. 182.40.
 tertij. 191.20. quartij. 198.27. quin-
 ti. 204.11. sextij. 191.16. septimi.
 201. 12
 brachium mouentium musculorum
 descriptio. 462.22. primi. ibid. se-
 cundi. 264.28. tertij. 265.30. quartij. i-
 bid. 53. quintij. 267.46. sextij, se-
 ptimiq; 266.5
 brachiū pectori adducens musculus,
 quo simiā abundant 263.14
 brachiū petētes nerui. quere Nerui.
 * in Brachio musculi quot 222.2
 Βραχιαλα ossa 166.33
 brisauolo 359.55
 bucca saporita 359.56
 buccas mouentium musculorum de-
 lineatio. primi & secundi. 179.20.
 tertij & quartij. 182.26. & 185.5. quin-
 ti & sextij. 179.18. septimi & octa-
 ui 182.20
 buccas & labra mouentium muscu-
 lorum descriptio. 242. primi & se-
 cundi. ead. 22. tertij & quartij. 243.17.
 & reliquorum quatuor. 244.5. eo-
 rundem administratio. 245. primi
 & secundi. ead. 1. tertij & quartij.
 246.5. & reliquorum quatuor. 245.
 35.
 buccella 10.26
 buxei cultri ad sectionem quomodo
 parandi 236.29

C



Aecum foramen. 53.12
 cæcum intestinū cuius-
 modi. 362.11. & 500.
 9. in cane. 33. in glirib.
 & sciuris. ead.

cæcum intestinum unde dictū. 500.38
 cæci intestini an duo orificia. 500.25
 cæci intestini ortum in cane & homi-
 ne uariare 500.42
 Cælij Rhodigini lapsus 66.32
 calaminum os 166.57
 calamo assimilatus ab Herophilo ce-
 rebri sinus 635.12
 καλονος 168.45
 calcar capitis 166.56
 calcar pedis 168.48
 calcis latus internum quale. 147.5. ex-
 ternū. ead. 16. pars anterior. ead. 21
 calcis ossis figura 5. & 6. 6
 calcis ossis figura 142. & descriptio.
 143. 10
 calcis ossis sedes terram spectans. 146.
 41. eiusdem superior sedes, extra
 tibię rectitudinem retrorsum du-
 cta. 50
 calcis ossis sinus 146.31
 * καλινος 261.38
 καμιλεας quid 497.29. & 505.7.
 callosi corporis cerebri historia. 632.
 21. sedes ac nomenclatura 632.24.
 initium, seu cum reliqua cerebri sub-
 stantia continuitas. ibid. 47. late-
 ribus adiacentes sinus. 632.50. usus
 633. 20
 callosi corporis delineatio, quibus in
 locis spectanda 632.24
 callosi corporis administratio. 652.21
 calor ingenitus corpori, Galeno ani-
 ma 569.27
 caloris ingeniti substantia 569.39
 caloris natiui fomes cor 594.56
 calua 166.20
 caluaria cur non solido constet osse.
 26. 8.28.
 caluaria cur pluribus ossibus effor-
 mata 11.51.
 caluarię anterioris figura. 36. & ra-
 tio. ead. 31. & 47.31.
 caluarię appellatio. 25.55. & 48.4
 caluarię basis, seu sedes. 22.6.
 & 38.3. 14
 caluarię basis interna sedes. 24.1. in-
 de. & 48.2. & 49
 caluariae

I N D E X.

caluariae basis exterior facies 48.1.
 & 49
 caluariae figurae 18
 caluariae forma aptiss. quae 19.20
 caluariae nomina 166.19
 caluariae ossa cuiusmodi esse oportu-
 erit 28.11
 caluariae ossa quot 162.34
 caluariae pars mollissima & rarissima
 quae 30.32
 caluariae ratio 88.52
 caluariae sedes, lapidosa 167.6
 caluariae sinus durae membranae ua-
 lis cedentes 53.47
 caluariae squamae 20.13
 caluariae tabulae 20.17
 caluariae tam integrae, quam seiun-
 ctiae figura 20
 caluariae quaedam absque futuris 27.
 6 inde
 caluariam succingentis membranae
 externae descriptio 625.12
 calx 163.47. calcis os, ead.
 cameratum dictum corpus cerebri.
 636 37
 canis animal minime pituitosum.
 51 6
 canis caluariae interna superficie abū-
 dans os 32.44
 canis caecum intestinum cuiusmodi.
 500 33
 canis caluariae foramina 51.7
 canis sacri ossis descriptio. 81.37. item
 coccygis 82.3
 canes ab homine uariantes in muscu-
 lis brachium mouentibus. 266.41
 canes colo & mesenterio ab homini-
 bus differre 496.25
 canes in non paucis partibus ab ho-
 mine uariantes. In musculis tho-
 racis. 287.20. & 52. item 288.55. i-
 tem 289.19. & 30. itē 293.41. & 45.
 item 294.4 & 33
 canū caluaria nō absq̃ futuris. 26.54
 canū & hominū colon differre. 501.16
 canum & hominum πύλας colo-
 ris diuersi 497.30
 canum iecur quale. 506.43. & 507.7
 canum iecoris situs 505.46
 canum omētī ratio, & ad hominis di-
 uersitas 496.42. & 497.3
 canum penis osseus 527.50
 canum renes cur altius siti 514.33
 canibus macilentius obtingisse mesen-
 terium 504.54
 in Canibus nulla cum hominis ossi-
 bus similitudo 85.28
 caninae caluariae figura. 36.32. & 37.51
 canini capitis figura 47.32
 canini renis ad humanum differen-
 tia 516.9
 canini uteri delineatio 382.1
 canini dentes 46.1. & 167.19. cur
 dicti 46.3
 canna 168.9.11.38
 canna brachij 168.4
 canulae secantibus aptae. 237.11. de-
 lineatio 235
 caput cur copiosiore euacuatione e-

geat 26.9
 caput cur super primam uertebam
 non simul & circumducatur, & in
 latera inclinetur 67.41
 caput humanum oculorum gratia ef-
 formatum 19.1
 caput in ossibus quid 9.6.25.49.
 item capitulum ead.
 caput instar tecti domus calidae. 26.7
 capitis calcar 166.56
 capitis commissurae 27.43. inde
 capitis figura naturalis quae 19.13
 & 20.21
 capitis figurae naturalis cuiusmodi fu-
 turae 26.38
 capitis figurae aliquot non naturales
 19.23
 capitis figurarum non naturalium cu-
 iusmodi futurae 27.29
 capitis ligamentorum ad ceruicis pri-
 mam secundamq̃ uertebam de-
 scriptio. 280.6. administratio. i-
 bidem. 35. delineatio 279.47
 capitis motus lateralis quibus uerte-
 bris committatur 68.9
 capitis motus propius quispiam, con-
 tra Galeni sententiam 276.12
 capitis motuum differentiae 276.1
 capitis motuum observatio difficilis.
 63.14 46. inde
 capitis motorum musculorum par
 primum, cur Galeno tertium sit.
 176 34
 capitis octauum os 32.33
 capitis olla, theca, testa, scutella, etc.
 166 24
 capitis ossa cur a maxillae superioris
 ossibus distincta 48.6
 capitis ossa futuris circūscripta quot.
 29 54
 capitis ossium foramina, eorumq̃ de-
 scriptio 47.17. & 49.9. inde
 capitis structurae ratio, quotq̃ eius fi-
 gurae 17.46. & pag.18
 capitis tabulae 20.12
 caput circumuertentium musculorum
 descriptio. 278.10. & 24. admini-
 stratio 279.35
 caput flecti & reflecti super primam
 uertebam 65.4. & 67.10
 caput mouentium musculorum deli-
 neatio. paris primi. 204.3. secun-
 di paris. 205.36. tertiij. 209.19. quar-
 ti. ibid. 27. quinti. ibid. 28. sexti.
 ibid. 30. septimi paris 182.32
 caput mouentium musculorum de-
 scriptio. 276.1.
 caput mouentium musculorum par
 secundum, in homine, a Galeni de-
 scriptione diuersum 277.20
 caput mouentium, sed motu nō pro-
 prio, musculorum traditionem to-
 tā, quare sub Dorli motoribus, 4.
 paria prima. ratio 297.12
 caput mouentium musculorum po-
 steriorum descriptio. 276.35. par
 eorum primum. ibid. par secun-
 dum. 277.2. & utriusque paris mu-
 nus, ead. 30. par tertium; 277.56.

quantum. 278.5. quintum ac sex-
 tum par. ibid. 10. & horum fun-
 ctio ead. 24.
 caput mouentes musculi anteriores.
 eorum descriptio. 278.29. par om-
 nium capitis motorum, septimū.
 278.29. functio binis paribus po-
 steriorum opposita 278.4
 caput mouentium musculorum, iux-
 ta septem parium ordinem, admi-
 nistratio 279.15
 capita ossium non semel ἐπισφύσας quo-
 que Galeno dici 9.42
 capitū in ossibus alia prominētia, alia
 depressa 9.7. & quae ead. 16. inde
 capitum in ossibus differentiae. 9.31.
 quantus earundem cognoscendā-
 rum usus 39
 capita futuris destituta. 27.6
 capita uirorum a mulierum capiti-
 bus non perpetuo futuris uariare.
 26.47 inde
 λαγλία 387.48
 carina hominis 167.31
 carnosae membranae quare Membr.
 carnosae membranae in abdomine ad-
 ministratio 548.57. & 549.16
 caro, cur musculis addita 220.26
 caro musculorum, praecipuum motus
 organum 222.39.
 carne, quid uocet Aristoteles. 232.30
 * λαγωῦς arteria 301.9
 λαγρός quid 117.1. & 168.15
 cartilago brachiale ab ulna diuidens
 113 55
 cartilago, χόνδρος 166.18
 cartilago clauiculae articulationis cū
 pectoris osse peculiaris 102.19
 cartilago epiglottalis 93.20
 cartilago glutinis uicem subiens. 4.31
 cartilago innominata quae 154.5
 cartilago in articulis quibusdam tet-
 tia 4.13
 cartilago inter uertebras triplex. 301.4
 cartilago inter uertebras iuxta Gale-
 ni sententiam quid praestet. 300.33
 cartilago ligamentorum substantiam
 ingrediens 4.35
 cartilago mucronata, siue ἐπισφύσας.
 93.2. eius usus. ead. 17. & 167.46
 cartilago omnibus articulis commu-
 nis. 44.26
 cartilago quid, eiusq̃ natura, usus, ac
 differentiae 3.35. inde
 cartilago scapulae sinum frequenter
 augens 98.3
 cartilago spinarum apicibus obna-
 ta 59.4
 cartilago, tarsus uocitata 238.27
 cartilaginis in ossium connexu u-
 sus 16.46
 cartilaginis temperies 150.54
 cartilaginē osse promptius stringi ac
 dilatari 3.53
 cartilaginee aliquid continuo erigen-
 tes 4.38
 cartilaginee nasi 151.1. asperae arte-
 riae ead. 32. & 153.9
 cartilaginee nudis & extantibus par-
 ticulis

- ticulis adnatæ 4.44.51
 cartilagine quibus tibiæ ossis sinus
 augentur 138.44
 cartilagine costarum cum pectio-
 ris osse, ab ipsarum ossibus libera-
 tio 599.52
 cartilagine palpebrarum & aurium
 descriptio 150.29.40
 cartilaginum substantia 4.45
 cartilaginea cordis basis 93.35. inde 56
 cartilaginea cordis substantiæ exa-
 men 602.50
 cartilagineum in uertebis ligamen-
 tum 57.46
 cartilaginea uasorum radices quo pa-
 cto inquirendæ 94.31
 cartilaginofum os brachialis quod-
 nam dictum ueteribus 118.16
 cassos os 167.44
 κατακλεις quid 100.5
 Caua uena. uide Vena caua.
 cauæ uenæ ad cordis basim conti-
 nuitas expressa 563
 cauæ uenæ distributionis per thora-
 cem & iugulum examen 600.48.
 inde
 cauæ uenæ & arteriæ magnæ distri-
 butionum sub osse sacro examen
 556. 28
 cauæ uenæ orificio præfectarum mem-
 branularum usus 597.23
 cauæ uenæ ortus examen 602.16
 cauæ uenæ series in peritonæi ampli-
 tudine, quæ obseruanda 554.30
 caudæ os 167.41
 cauilla 167.5. & 168.46
 cauillæ 168.42
 cavitæ auditus organo parata 34.39
 cellulæ coli 362.25
 Cor. Celsus in ijs quæ ad Anatomem
 pertinent, sæpe lapsus 154.56
 Cor. Celsi de arteriæ asperæ forma
 locus 576.9
 Cor. Celsi de incerto brachialis ossium
 numero sententia 117.13
 Cor. Celsi de inferiori maxilla locus
 44. 14
 Cor. Celsi de pectoris osse lunato sen-
 tentia 93.7
 Cor. Celsi locus de primis colli uerte-
 bris 67.29
 κυνωίς 281.28
 * cento apud Arabes uenarum quæ-
 dam copia 290.13
 κεφαλή, κεφαλαίον 9.5.20. & 10.1
 κεφαλαίος tunica 649.9
 κεφαλή 168.8
 cerebelli delineatio unde sit petenda
 628. 42
 cerebelli descriptio totius. 628.45.
 situs ac magnitudo. 629.14. for-
 ma. ibid. 45. implexuum ratio &
 species. 631.1. durities. ibid. 36
 color & substantia. 631.41. quo
 pacto continuū sit cerebro. 629.15.
 administratio 653.27
 cerebelli processum uermiformiū de-
 scriptio 639.1 delineatio ubi spe-
 cianda 638.55
 cerebelli sedes 31.2
 cerebelli situs 19.17
 Cerebrum cuius animæ facultatis se-
 des 594.37
 cerebrum homini grandius datum
 ex proportionem 507.11
 cerebrum, neruorum principium.
 316 39
 cerebrum quo pacto mole in anima-
 libus uariet 624.9
 cerebrum rationis sedes, quale domi-
 cilium natura sortitum 26.1
 cerebrum sensus ac motus arbitrarij
 principium, et rationis sedes. 599.13
 cerebri arteriæ. quare Arteriæ cere-
 bri.
 cerebri corpus callosum. quare Cal-
 losum corpus.
 cerebri corpus testudinatū camera-
 tum uel eiusque descriptio 636.37.
 usus. 637.34. delineatio unde pe-
 tenda sit. 636.41. administratio.
 652 42
 cerebri delineatio unde sit petenda.
 628 41
 cerebri dura membrana. quare Mem-
 brana dura cerebri.
 cerebri descriptio totius. 628.45. nu-
 merus. ibid. 45. magnitudo & for-
 ma. 629.51. anfractus, & eorundem
 usus. 630.34. partes, dextra ac sini-
 stra. ibid. 15. cur sic sectum. ibidem
 54. & quibus sedibus continue-
 tur. 629.6. durities. 631.37. co-
 lor. 631.42. substantia. ibid. 43.
 quo pacto ab ossium medulla diffe-
 rat. 531.51. nutritioni quo pacto
 prospectum. 632.9
 cerebri, eiusque partium omnium admi-
 nistratio 650.47
 cerebri excrementorum in os descen-
 dentium receptaculum an garga-
 reon 580.37
 cerebri fabrica in brutis ab homine
 non differens 624.4
 cerebri figura 19.16.19
 cerebri galea 166.20
 cerebri glandis descriptio. 637.42
 cerebri infundibulum, glandula, &
 pituitam excipientes ductus reli-
 qui. descriptio omnium. 640.1. de-
 lineatio unde petenda. ibid. 4
 cerebri partium ac functionum bre-
 uis enumeratio 622.21
 cerebri os cuiusmodi à Galeno tradi-
 tum 32.41
 cerebri neruorum quinque surculi tem-
 porali musculo obliti 33.29
 cerebri neruorum parium aliquot e-
 xamen 604.3
 cerebri neruorum historiam quare
 in Neruis cerebri.
 * cerebri membrana uenarum modo
 cauæ 307.13
 * cerebri membranae dure sinus qua-
 les sint. 307.41. cavitates, sinuum
 quatuor quales. 308.28. usus sinu-
 um. 307.41. primi & secundi si-
 nus constructio. 307.55. tertius &
 quartus sinus. 308.8. quæ à primo et
 secundo sinu enascantur propagi-
 nes. 308.48. quæ à tertio. ead. 54.
 à quarto. 309.8. processus à quarto
 sinu, cerebri petens uentriculos. ead.
 36. omnium delineatio 305.45
 cerebri membrana tenuis. quare Me-
 brana cerebri.
 cerebri pituita, ad palatum per quos
 meatus eat. 641.42. & in narium
 amplitudinem. ibid. 44
 cerebri pituitam per olfactus organa
 non expurgari 641.46
 cerebri plexus secundas referentis tra-
 ditio 643.3
 cerebri plexuum, reticularis & secun-
 darum plexibus similis, descriptio.
 642.13. delineatio ubi spectanda.
 ead. 16
 cerebri reuolutiones intestinorum an-
 fractibus eleganter ab Erasistrato
 collatae 630.25
 cerebri substantia ab ossium medul-
 la quo pacto differat 631.51
 cerebri testium ac natium descriptio.
 638.18. delineatio unde petenda.
 ibid. 21. administratio 653.37
 * cerebri torcular 309.45
 cerebri uenæ. quare Venæ cerebri.
 cerebri uentriculi. quare Ventriculi
 cerebri.
 cerebri uentriculorum anteriorum du-
 ctus. 323.7. delineatio ead. 11
 de Cerebri uentriculis confutata recen-
 tium opinio 623.19
 * in Cerebri uentriculis prioribus con-
 stituti plexus fabrica. 310.39. deli-
 neatio 306.40
 cerebro dorsalem medullam respon-
 dere natura 58.17.56.
 cerebrum nullis musculis indiguisse
 88 52
 cerebrum oculorum gratia in capite
 locari, & dein cerebri nomine reli-
 quos sensus 18.21. & 19.5
 Ceruix 10.12.16
 ceruicis flexioni præfecti musculi. 278.
 56. eorumque administratio. 295.47.
 ceruicis motus, alius peculiaris, alius
 dorso communis 295.32
 ceruicis motorum musculorum de-
 scriptio. quare Dorsum mouentium
 musculorum. 4. prima paria, usus,
 sub Vsu eorundem. administra-
 tio. sub iisdem. ratio. 297.11. & 277.
 49. & 278 56
 ceruicis motuum differentia quæ. 276.9
 ceruicis nomina 167.34
 ceruicis uertebam primam secundæ
 necientis ligamenti descriptio. 280.
 30. administratio. ead. 42. deli-
 neatio 279. ultimo
 ceruicis uertebrae. uide Vertebrae.
 ceruicis uertebrae cuiusmodi. 59.18.
 quot numero 63.12
 ceruicis uertebrae delineatio. 60
 ceruicis uertebrae primæ ac secun-
 dæ ad caput annexio, ligamento-
 rumque descriptio. 280.6. admini-
 stratio.

- stratio, ibid. 35. delineatio. 279. 47
 ceruicis uertebri adnascēs ligamen-
 tum quoddam 301. 44. 49
 ceruices in ossibus qui potiss. dican-
 tur 10. 20
 ceruini cordis os medicorum impo-
 stura excogitatum 94. 23
 χαλκοδόν ossa 148. 3. & 168. 52.
 chamel 385. 52
 χέλη 11. 1
 chirurgiæ instrumentorum delineatio
 329. 20
 χαλκὴ Græci 640. 38
 χόνδρος 90. 22. & 166. 18
 * χορίου 294. 3. & 541. 56
 χοροδόν dicta membrana 628. 6
 χοροειδὴς oculi tunica 648. 17
 * χοροδόν plexus. 309. 32. & 310. 41. &
 643. 3
 CHRISTI lateris apertæ aquam
 sterijs plena 585. 28
 CHRISTOPHORVS PFLVE-
 GEL SALISBURGENSIS
 19. 45
 cibo ac potui in corpore, concoquen-
 dis famulantia organa, earumq; ra-
 tio 385. 5
 cibum potumq; uentriculo deferen-
 tis uia nomina 388. 6
 ciceri assimilatum ossiculum, ac mira-
 eius uis 126. 37. inde
 Ciceroni parum recte mesenterium,
 medium intestinum dictum 504. 6
 cilia 150. 26
 λῶν cur pro gargareone 580. 17
 circumuersionis motus 13. 27
 λισσοειδὴς πλάσματος 524. 4. 37.
 & 525. 14
 clauale os 166. 57
 clauiculæ ad summum humerum ne-
 xus 103. 8
 clauiculæ curuitas, eiusdemq; usus.
 102. 28. 43
 clauiculæ substantia, tubera, asperita-
 tes, læuitates, foramina 103. 12. inde
 clauiculæ tuberculi articulatio 99. 45
 clauiculæ 167. 51. & 168. 42
 clauicularum à pectoris osse libera-
 tio 599. 46
 clauicularū delineatio. 101. inde. ea-
 rundem numerus, & ad pectoris
 os articulatio, 102. 2. inde. usus.
 ead. 53
 clauis 167. 51
 clauium ossa 167. 40
 λῆιδος 102. 1. & 167. 51
 λήμυ 138. 24. & 168. 36
 clunium ossa 167. 39
 clypeus oris stomachi 167. 48
 clypeus pectoris 167. 54
 clypeus, pro omento 494. 39
 coarticulatio, 12. 20. & 13. 18
 coccyx auis, cuculus 83. 24
 coccyx, siue coccygis os 1. 46. et
 56. 56 uide Os coccygis.
 κόκκυγος appellatio 83. 23. & 85. 27
 coccygis canini descriptio. 82. 9. eius-
 dem foramina 85. 17
 coccygis humani descriptio. 83. 28. in-
 de & 84. 43
 coccygis ossis in parturiētibus maxi-
 mum momentum 131. 52
 coccygis ossis nomina 167. 40. inde
 coccygis ossis quot ossa 162. 39
 κοδόν 166. 20
 cogitationis ossa 166. 40
 * κοίλη dicta uena 276. 52
 κοιλία cur dictus Græcis uentriculus.
 389 30
 coitus pruritibus ac delectationis causæ
 expensæ 526. 9. inde
 colatorij os 167. 5
 κόλον 7. 13
 coloni excrementorum uelut prom-
 ptuarium 503. 1
 colicellulæ 362. 25
 coli in hominibus & canibus discrim-
 eni 501. 16
 coli intestini à recto differentia. 501. 16
 coli intestini circa tenuia situs. 361. 11.
 & 362. 16 & 501. 14
 coli intestini uentriculi fundo expor-
 recti, etc. figura 358. 19. & 357
 coli principium ubi 500. 51
 coli situs ratio 502. 57
 coli tunice ac fibræ cuiusmodi. 501. 20.
 inde. uenæ & arteriæ. ead. 40.
 nerui 50
 κόλων capita non recte ἐπιφύσεις &
 κοινύλας Galeno dici 9. 48
 colo mesenterij uice esse inferiorem
 omenti membranam 496. 24
 collum 10. 11. & 167. 35
 collum asperæ arteriæ gratia datum
 homini 63. 6
 collum homini pulmonū gratia da-
 tum 62. 49
 colli uertebre. 56. 48. et uide Ceruicis.
 collo carētia uocem non edere. 62. 57
 columella cur pro gargareone. 580. 17
 commissura instar unguis. 16. 3
 commissuræ temporū squamose. 27. 44
 commissurarum ossa iungentium ty-
 pus. 12. 10. ac differentia. 13. 1. inde
 * communis dicta uena 287. 15
 κόχνη, κόχχος 163. 31
 κόχχος, κόχχοι 29. 31. & 166. 19
 concupiscibilis animæ sedes iecur.
 505 38
 κοινύλας, κοινύλοι 9. 20. 48. & 10. 1. 36
 κοινύλοι digitorum qui 121. 48
 κοινύλας non recte Galeno dici artu-
 um capita 9. 47
 κοινωειδὴς processus 66. 33
 κοινωειδὴς glans, quæ & κοινώγιον * 309.
 38. & 537 49
 κοινωειδὴς processus. 98. 24. & 167.
 55. & 168. 1
 cor 387. 48
 cor an lienis beneficio refrigeretur.
 514 11
 * cor arteriarum fons, sine authorum
 controuersia 298. 44
 cor cuius animæ sedes 594. 19. 38
 cor humanum uero osse carere. 93. 54
 cor insiti caloris fomes, & irascibilis
 animæ sedes 96. 36
 cor neruorum esse principium, cur
 ab Aristotele proditum 591. 56
 cor neruorum principium non esse.
 316 48
 cor quatuor uasorum ad contermi-
 nas sedes connexu sustineri. 94. 21
 cordis, ipsiusq; partium functio, et u-
 sus, ipsarumq; constructionis ratio.
 594. 15 inde
 cordis, ipsiq; subministrantium par-
 tium functionis enumeratio. 569.
 36 inde
 cordis à pulmōe liberi, & dextri eius-
 dem uentriculi ad apertū delineatio.
 565. 566. item sinistri uentriculi. 567
 cordis ab ipsius inuolucris prorsus li-
 beri delineatio 563
 cordis adeps 585. 17. & 588. 24
 cordis auris dextra 563. sinistra. 564
 cordis auriculæ dextre usus, & ipsius
 constructionis ratio. 597. 3. item utri-
 usq; ead. 18. sinistra 598. 42
 cordis auricularū delineatio, ubi que-
 renda 593. 7
 cordis auricularum situs. 593. 12. dex-
 tre situs & forma. ead. 18. substantia.
 42. nexus. 47. item sinistra. ead. 53
 cordis basis ratio & usus 595. 25
 * cordis basim cingens uena 278. 56
 cordis caro cuiusmodi. 566. 43. & fi-
 bræ. ead. 49. inde. item carnis usus.
 588. 34. & fibrarum. ead. 38
 cordis caro cur in mucrone quàm in
 basi spissior solidiorq; appareat.
 587 29
 cordis carnis usus 598. 20
 cordis cartilaginee siue osse substanti-
 æ usus. 596. 15. eiusdem examen.
 602 50
 cordis cum suo inuolucro & pulmo-
 ne delineatio 561. & 562
 cordis dextrum latus expressum. 563.
 item sinistrum 564
 cordis dilatatio quid 587. 45
 cordis figura. 585. 41. superficies. ead.
 48. magnitudo 586. 32
 cordis formæ ratio 595. 29
 cordis inuolucrum cuiusmodi aquam
 contineat. 584. 47. & cur potissimū.
 585 11
 cordis inuolucrum quibus uasis uiam
 præbeat 583. 41
 cordis inuolucrum quibus uasis ac
 neruis implicetur 584. 39
 cordis inuolucrum delineatio ubi que-
 renda 583. 28
 cordis inuolucrum examen 600. 32
 cordis inuolucrum forma. 583. 36. initiū.
 ead. 49. situs. 584. 4. substantia. ead.
 17. superficies & nexus 22
 cordis inuolucrum usus & constructio-
 nis ratio 584. 43. & 595. 1
 cordis mēbranæ quæ. 591. 30. & quot
 numero. ead. 33
 cordis mucronis ratio & usus. 595. 20
 cordis neruulus. 588. 17. eiusd. usus.
 596 13
 cordis orificiorum membranulæ, ea-
 rumq; delineatio ubi querenda.
 591 23
 de Cordis

de Cordis orificijs, Anatomicorum
diuersa placita 599.34
cordis os, siue cartilaginea substan-
tia 93.34. inde
cordis ossis, siue cartilagineos substā-
tiæ delineatio 567.20
cordis partes nō æquæ omnes digne.
595 17
cordis partes omnes cui functioni po-
tissimum famulentur 594.56
cordis per transfuersum dissecti deli-
neatio 567
cordis pulsus in uiuo animali examē.
588 7
cordis scutum 167.44
cordis situs. 561.28. & 585.57. eiusdem
ratio 595.3
cordis situs ac formæ delineatio ubi
quærenda 585.34
cordis substantiæ delineatio ubi quæ-
renda 566.40
cordis substantiæ peculiare uenæ &
arteriæ. 588.13. eidemq; obnata tuni-
ca. ead. 22
cordis substantiæ secundū ipsius uen-
triculos delineatio 567.24
cordis substantiæ usus 595.37
cordis uasa quot, & quæ 589.47
cordis uasorum & orificiorū eorun-
dē delineatio ubi quærenda. 589.40
cordis uentriculus dexter cur sangui-
neus dictus 596.20
cordis uētriculus sinister cur spirituo-
sus siue æreus appellatus 598.5
cordis uentriculi dextri, & ipsius ori-
ficiorum membranarumq; examē
601.50. item sinistri 602.35
cordis dextri uentriculi usus. 596.20.
item sinistri, eiusdemq; cōstructio-
nis ratio 598.3
cordis uentriculorum delineatio ubi
quærenda 588.36
cordis uentriculorum numerus & si-
tus. 589.45. dextri forma. ead. 48. &
sinistri. 54. eorū, superficies. 589.10
cornix 8.53
coronale os 166.42
coronalis futura, *σεφανιαία*. 166.27. &
21.16. & 23.4. cur dicta 26.41
coronalis uenæ usus 595.41
coronalium arteriarum usus. 596.6.
earundum ortus 11
κορώνη, κορώνη 8.53
κορώνη appellatione quid Galenus
uoluerit intelligi 65.36
κορώνα 106.17
corpus cuiusmodi ad sectionē adhi-
beri conueniat 548.10
corpus testudinatū cameratū ue-
636.37. quere itē, Cerebri corpus te-
studinatū.
corporis humani medium exactissi-
mum quod 595.14
corporis humani ossa quo artificio
parāda ad inspectionē. 155.23. inde
corruptelæ hominī connata necessi-
tas 384.38
κορώνη siue *κορώνη* ossa
corticales futuræ 166.48
166.36

κορώνη ossa 166.33
costæ quot 162.40
costæ spurie siue nothæ, & legitimæ.
167 50
costarum ad uertebras articulatio. 91.
20. eiusdē articulationis, ductusq;
earundem delineatio 87.1. inde
costarum asperum tuberculum. 91.4
costarum cartilagine 3.52. & 5.2
costarū cartilaginū cū pectoris osse,
ab ipsarū ossibus liberatio. 599.52
costarum ductus 93.24
costarum in cōpingendo sceletō qua-
lis obseruanda ratio 161.16
costarum longitudo, amplitudo, læ-
uitas & asperitas non eadem om-
nium 90.31. inde
costarū numerus. 89.45. uiris & mu-
lieribus idem ead. 50
in Costarū octo inferiorū inflāmatio-
ne an mittēdus etiā sanguis. 602.5
costarum osseæ substantiæ deline-
atio 87.17
costarum substantia & appendix
cuiusmodi. 7. 50. & 90.15. inde, car-
tilagine. ead. sinus. ead. 47
costis singulis peculiaris tūica. 571.39
costas succingens tunica. uide, Tu-
nica costas succingens.
costas succingens tunica altera, uete-
ribus dicta quæ 295.2
κοτύλη 10.2.24
κοτύλη & *γλαύκη* discrimen 10.44
κοτύλη 10.24
κοτύλη herba 539.25
κοτύλη cur uteri acetabula dicta.
539 28
coxa 168.26
coxa os 128.55. & 168.21.28
coxendix 128.56
coxendicis acetabuli ad uteri aceta-
bula collatio. 539.2
coxendicis os. 6.2. & 127.17. & 128.
52. & 131.36 & 168.21.
coxendicis ossis acutus process. 131.18
coxendicis ossis appendix. 131.25. eius-
dem figura. 5. * item ligamenta ad
os femoris. quære, Femoris os.
coxendicis ossis robori quomodo sit
prospectum 130.35
coxendicis ossis superiori sede inscul-
ptus sinus. 130.22. eiusdem tubera.
ead. 28
κρανιον 166.19
crassū intestinū. uide Intestinū crass.
κρανιος dentes 167.23
κρανιος 141.10
κρανιος dicti musculi 285.57
Cretensiu renuēdi mos, retrorsum
flexo capite 63.30
cribratum os 167.5
cribri modo peruium os 28.24
cristæ os 167.13
crocodilis nō idem motus maxillarū
ut reliquis animantibus 246.14
κρανιος futura 166.35
κρανιος ossa 166.48
crus 168.34
cruris arundo maior, & minor, 169,

38 inde
cruris domestica canna 168.39
crurum in hominibus & quadrupe-
dibus similitudo 145.1. inde
per Crura tendentium uenarum &
arteriarum examen 657.49
crystallinus humor, siue *κρανιος*
646 25
κρανιος 168.16
κρανιος dentes 167.17
κρανιος 168.16
cubi 147.36
cubum referēs os. 148.4. inde. & 169.
53. eiusdem descriptio. 144.27. inde
cubiforme os 168.53
cubitus quid 109.18. & 110.44
cubiti flexus ratio 106.11
* cubiti motus duo 226.50
cubiti nomina 168.5
cubiti ossium figura 108.3
* cubiti sedis internæ musculorū nu-
merus. 221.45. externæ sedis. ead. 51
* in Cubiti sede externa ligamētōrū
trāsuerforū administratio. 223.56
* cubito adiacētibus musculis obna-
ta membrana. 220.42. obseruanda
quomodo 222.31
* cubitum brachiali necessitā liga-
menta 221.1
cubitū flexentiū musculorū delinea-
tio. primi. 198.49. secundi. 193.17.
extendentium itidem primi. 201.
50. secundi 175.45
* cubitum mouentes musculi in ca-
nibus 219.29
* cubitum mouentium musculorum
descriptio. 216.50. flexentiū pri-
mus. 217.8. secundus. ibid. 38. am-
borum functio. 218.12. extenden-
tium primus. 218.50. secundus. 219.
5. tertius. ead. 12. administratio
omnium 225.4
cultelli parui pro sectione apti. 236.
20. earum delineatio 235.47
cultralis cartilago. 167.48
cultri è buxo, pro sectione parandi.
236.29. eorum delineatio 235
cultrorū uulgarū ad sectionē descri-
ptio. 236.27. delineatio 235.48
cuneiforme os. 21.35. & 22.14. & 23.15.
40. & 25.20.39. & 30.2. & 36.45.
& 38.10 & 167.2
cuneiforme os *πυλμορφον*. 32.3. eiusd.
antra. ead. 5. inde
cuneiforme os spongiæ modo non
esse peruium 32.15
cuneiformis ossis circumscriptio. 28.
44 & 29.1
cuneiformis ossis foramē Anatomici-
cis ignoratum hactenus. 49.31. pe-
culiare 52.45
cuneiformis ossis medium neutiquā
perforatum, cōtra Galeni traditio-
nem 51.33
cuneiformis ossis sinus 54.56
cuneiformis ossis futura. 28.33.44 qui-
bus sedibus occurrat. 29.4. eiusdē
interuallum 29.18
cursoribus lienem eximi, stultē per-
suasum

suasus vulgo	513.8
cuticula quid	223.14
cuticula, <i>κόρυμιν</i>	232.18
cuticulæ administratio. 234.1. & 548.50. & 549.6. delineatio	231.30
cutis in homine, <i>ἀνθρώπιν</i> dicta Herophilo	231.43
cutis manus. quare, Manus	
cutis quid sit	231.35
cutis administratio. 234.1. & 548.30. & 549.6. delineatio	231.30
cutis differentiæ à connexu. 231.43. à neruorū copā. ibid. 48. à mollicie. ibid. 50. à motu. ibid. 56. à pilis. 232.4. à foraminibus. ibid. 7	
cutis & membrana in frōte & pene, scortocq; nullo adipe substrata cur.	521.42
inde	
cutis humanæ crassities	161.54
cutis quæ partes in homine moueantur	237.25
cutis substantia	231.38
cutis uenis, arterijs, ac neruis prædita, ac sensus compos	232.21
cuti per uniuersum subdita membrana carnosa	232.45
<i>κόρυμιν</i>	111.6. & 168.13
<i>κόρυμιν</i> os 1.41. & 148.4. & 168.53	
<i>κυμαλίνης</i> & <i>κυμαλίνης</i> , herba	539.26
cymbā referēs os. 168.49. eiusdē delineatio. 5. & 6.5. & 142. & 143.14. eiusdē sinus. 147.28. & sedes. ead.	
cymbam referētis ossis per medium dissecti figura	2
<i>κόρυμιν</i>	167.19
<i>κόρυμιν</i>	166.20

D



<i>ἀκτύλοι</i>	168.17
<i>ἀκτύλοι</i> Herophilo quid sit	234.38
dearticulatio	12.16.
& 13.	7
<i>ἀκτύλοι</i> dictus musculus	264.45
dens processus	61.55. & 66.31
dens secundæ uerterbræ tuber, siue processus	66.31
dentis dicti ossis ligamētū. 230.2. & 44	
dētis molaris facies utraq; 33. & 34.25	
dentis processus cum prima uertebra contextus	66.39
dētes, <i>δόντες</i> , eorūq; nomina. 167.16	
dētes frigore potissimū uexari. 45.35	
dentes omnium ossium durissimi. 2.54. &	46.11
dentes quī maxillis infigantur. 46.17	
dentes quot	162.38
dentes radicibus inter se uariare. 46.20.	inde
dentes sensu præditi	3.20. & 45.26
dentes soli omniū ossium nudi	3.26
dentū à ceteris ossib. differētia. 45.42	
dentium alueoli	44.41. & 45.10
dentium appendices	46.56. inde
dentium cauitas	46.51
dentū dolori, remediū optimū. 46.39	
dentium excessus præsecādi, aut exurendi mos	45.33
dentium frequentia argui uitæ longitudinem	46.49

dentium numerus. 45.47. & nomina. ead.	inde
dentū numerū aliqñ uariare	46.31
dentium præsepola	46.17
dentium puerorum appendices	7.51
dentū radicibus affixi neruuli. 45.30	
dentium usus	1.20
dentium utriusq; maxillæ figura. 45	
<i>δόντις</i> , cutis dicta	232.14
<i>δόντις</i>	290.47
<i>δόντις</i> membrana, quæ. 572.13	
diarthrosis, <i>διάρθρωσις</i> 12.20. & 13.7. & 120.	24
<i>δόντις</i> , dentes	167.17
<i>δόντις</i> , cur testes dicti	521.20
<i>δόντις</i> dicti in cerebro	638.42
digiti, <i>δόντις</i>	168.17
digiti, cur inæquales	125.15
digiti, cur unguibus donati	149.42
digiti manus. quare, Manus digit.	
digitorū articulationis forma. 124.21	
digitorum dignitas. 124.54. usus ac litus. ead. & 125.2. inde	
digitorum flexus, extrorsum mirabilis	124.36
digitorum forma in mulieribus pulcherrima, qualis	122.12
digitorum manus ossa, quot	162.43.
pedis. ead. 48	
digitorū manus cuti interne nervosa tenuitate subnati musculi descriptio. 302.26. administratio. * 222.32	
digitorum ossa	9.49.55
digitorum ossa non penitus medullæ expertia	121.50
digitorum ossa perperam Galeno solida constituta.	2.51
digitorum ossa quot. 120.35. & cuiusmodi. 121.16. inde.	& 149.20
digitorum ossium appendices	89
digitorum ossium articulationis ratio	123.30
digitorum ossium magnitudo, & forma decentissima	122.8.14. inde
digitorū pedis ossa, eorumq; descriptio	142. & 143.24
digitorum pedis figura	5. & 6.7
digitorum pedis ratio	149.13
digitorū tertij ossis processuli. 124.46	
digitos flectentium musculi secunditendinum per primi tendines transitus	306.5
digitos mouentium musculus uigelmus tertius, ad brachiale referendus	312.11. & 313.3
digitos manus mouentes musculi. quare, Manus digitos, &c.	
digitos pedis mouētes musculi. quare, Pedis digit. mouent.	
digitos quinq; omnino fingi oportuisse. 124.50. non plures. 125.14	
digitos singulos tribus ossibus efformari, meritò	121.47
diploa	20.15
<i>δόντις</i> <i>διάρθρωσις</i> intestinum. 499.2	
dorsalis medulla, quot neruos edat	339.37
dorsalis medullæ delineatio	331
dorsalis medulla, eius descriptio. 338.	

23. ab ossium medulla quo pacto differat. ibid. quæ sint illi cū cerebro cōmunia, quæ peculiaria. 339.2. cur sit unica. 339.20. cur sit facta. 338.34. muniēda quo pacto? ossibus. 338.51. mēbraneis inuolucris. ead.	52
dorsalis medullæ cum cerebro coalitus	653.42
dorsalis medullæ terminus ex osse prodies sacro, inter neruos nō censetur	339.44. & 350.18
dorsalem medullam in sexto ossis sacri osse terminari	85.2
dorsum, eiusq; ossium descriptio. 564.41. & 99.22	
dorsum illū ossis	129.52. & 130.1
dorsi ligamēta ualida quædā, & eorū usus. 301.17. ligamenta in spinarum interuallis posita	301.25
dorsi medullæ initium. 631.24. color. 631.41. substantia. ibid.	
dorsi motū differentiæ	295.22
dorsi musculi, à Galeno frigide descripti	295.45
dorsi nomina	167.30
dorsi ossiū multitudinis causa. 58.10. & quot constet ossibus	ead.
dorsi ossiū non par magnitudo, neq; dorsalis uitæ aqua amplitudo. 58.31	
dorsi pars thoraci respondens, proprios flexionis musculos cur non habet	298.4
dorsi uertebrae. 167.37. earundem appendices	7.46
dorsi uertebrae ligamenta, iuxta Galeni placitum, eiusq; improbatio	300.33
dorsi uertebrae ligamēta, <i>δόντις</i> dicta	301.10
dorsi uertebrae ligamenti species canibus propria	301.40
dorsi uertebrae neccientium ligamentorum descriptio. 300.23. administratio	302.5
dorsum flecti antrosum, fuisse commodus	59.40
dorsum homini quāta industria Natura creauerit	57.51. inde
dorsum mouētū musculorū delineatio. paris primi. 191.11. secūdi. 191.15. tertij. 205.47. quarti. 209.35. quinti. 191.50. sexti. 205.50. septimi. 209.40	
dorsum mouentium musculorum descriptio	295.18
dorsum mouentiū musculorū iuxta singulorū pariū ordinē administratio. 299. parium 4 priorum. ead. 28. quatuor postremorū, nempe quinti. 299.38. triū sequentiū. 300.1	
dorsum mouentiū musculorū, iuxta 8 ipsorū paria sigillatim exposuit usus. 296. paris primi. ead. 13. secūdi & tertij parium usus. 296.48. quarti. 297.8. quinti. 298.1. sexti. ibid.40. septimi. 299.2. octauī. ibid.	20
Dorsum mouentium musculorum par primum, Galeno parū apte in plures	L1

plures diuisum. 296. 4. usus non
recte assignatus. ead. 18
dorsum mouentiū musculorū par 5.
à Galeno nō recte descriptū. 297. 16
dorsum mouentiū musculorū pa-
ria duo. 7. & 8. Galeno incōgni-
ta 298. 11
dorsum mouentium musculorū pa-
ria 8. ac primum. 295. 48. secundū.
296. 20. tertiū. ead. 39. quartū. ead.
52. par quintum. 297. 13. sextum.
298. 10. septimū. ead. 44. octauū.
299. 7
duales dentes 167. 18
dulcis morsus, seu bolus, quid 359. 55
duodenū intestinum 362. 1
duodenū cur in nullos anfractus
ducatur 502. 52
duodenū intestinum cur exortus
390. 36
duodenū non minus quā ieiū-
num, inane 499. 19
duodeni appellatio 498. 57
duodeni intestini ductus, & ratio
498. 52
duodeni tunicæ cuiusmodi 499. 30
duodeni intestini uenæ & arteriæ.
499. 39. nerui. ead. 52
duodeno cur insertus bilis uesiculæ
meatus 503. 44
dura ossa 166. 54
dura mater, dura Cerebri membra-
na. quære, Membrana dura cereb.

E



*Ε*κφυσις quid 498. 53
efflos 494. 39
elephantiasis laborantis
lien maior 512. 19
elephantiasis laboran-
tium superficies cutis & color, cu-
iusmodi 511. 54
emulgentes uenæ delineatæ. 370.
& 371. 18
enarthrosis 12. 22. & 13. 43
enarthrosis quando in simplici ar-
ticulo 13. 55
ensiformis cartilago 167. 46
Εντρεα 498. 5
Ενδρριμς 232. 18. & 549. 6
Ενδρριμς tunica, quæ 522. 43.
& 524. 12
epiglottalis cartilago 93. 20. & 167. 48
Ενγλωττις 154. 47. & 155. 1. & 258. 29
Ενγλωττις & *γλωττις* differunt, quo-
modo 261. 33
Ενγλωττις delineatio 257. 44
Ενγονατις 168. 31
Ενμυλς 168. 31
Εννωτιον 167. 53
Επίφυσις 7. 18. inde
Επίφυσις cum *Αποφύσει*, subinde ab
alijs confundi 8. 43
Επίφυσις quoque ossium capita Gale-
no non semel dici 9. 42. 47
epiplex. 494. 39 (495. 8)
Επιπλοκή, cur Græcis dictus ramex
Επιπλοκισαι 495. 31
Επίπλοος, *Επίπλος*, &c. 494. 44
Επισφονς 67. 24

Επωμις, dictus musculus 99. 43. &
102. 35. & 264. 46
Erasistrati opinio de arterijs sangui-
ne destitutis 526. 4
Erasmi Roterod. de talorū lusu dia-
logus parum anatomicus 107. 18
Erasmi de talo lapsus 140. 19
Ερυθροδεις inuolucrum 522. 19
excessus 8. 13
exortus, cur duodenum intestinum
appellatum 390. 36
exortus uenæ cauæ, qui 593. 20
expiratio alia naturalis, alia uiolēta,
& quæ 292. 52
expiratio, quibus musculis perficia-
tur 292. 55
expirationis usus 570. 8
expirationem Naturalē, cur citra mu-
sculi opē fieri scribat Galenus. 293. 1
explantatio 8. 13

F



Aux 167. 15. & quid
579. 46. 13
faucium glandulæ triū
generum 579. 23
faucium organorū exa-
men 603. 48
femen 168. 23
femur mouentis musculi descriptio
297. 26
* femur mouētes musculi, quot con-
stituendi 242. 24
femur mouentium musculorum deli-
neatio. primū. 196. 10. secundū. 199. 3.
tertiū. 202. 10. quartū. 202. 13. quin-
ti. 205. 1. sexti. 195. 28. septimū. 195.
30. octauū. ult. noni. 193. 36. de-
cimi. 199. 14
* femur mouentiū musculorum de-
scriptio. 238. 20. primū. ead. 32.
secundū. ead. 43. tertij, quartū,
quintū. 239. 2. munus omniū. 240.
31. sexti. 240. 49. septimū, octauū.
241. 4. omniū. 241. 22. noni, deci-
mi. ibid. 40. decimo appensæ car-
neæ portiones 242. 12
* femur mouentiū musculorū quin-
tus, totius corporis mole maximus
239. 44
femur mouentiū musculorū decē ad-
ministratio exposita ordine. 242. 36
femur petētes nerui. quære. Nerui.
femoris appendices. 7. 55. eorund.
delineatio 5. & 6. 14
femoris superius caput 9. 8
femoris capita 5. & 6. 31
femoris inferiora capita, cur retror-
sum producantur 134. 17
femoris ceruices 10. 14
femoris dextri figura 5
femoris & brachij os in quadrupe-
dibus & auibus Aristoteli ignora-
tum 15. 52
femoris figura laudatissima, quæ 135.
40. inde
femoris luxatio qua partē creberri-
ma 131. 11
femoris motus 13. 25. & 238. 20
femoris os 168. 22. 25. 28

femoris ossi comparatum auditus or-
gani officulum 35. 22
* femoris os ossi coxendicis alligan-
tium ligamētorū descriptio. 252. 31
administratio 256. 21
femoris ossis descriptio & figura 133. 1
inde. & 134. 1
femoris processus 8. 23
femoris processus, seu rotatores, duo
134. 52
femoris secundum ipsius longitudi-
nem forma 135. 24
femori ad tibiam articulādo sedes 138.
femori articulādo paratum (34
acetabulum 130. 53
fenestratum os 168. 25
fibrarum cordis & musculorū ratio
quatenus eadē aut diuersa. 587. 41
fibrarū in intestinis ratio 503. 26
fibrarū in uesica, uentriculo, & bilis
uesicula ratio 518. 13
fibrarū motibus naturalibus seruien-
tiū species, & cuiusq; functio. 258. 6
delineatio ibidem
* fibrarum, quæ motibus, tum natu-
rali, tum arbitrario sunt præfectæ,
differentia 257. 32
fibrarum usus 596. 3
fibras tunicarum in uesica optime co-
gnosci 518. 12
fibula 1. 45. & 138. 26. & 168. 39
fibula quid à fura differat 138. 30
fibula secundū ipsius longitudinem
triangula 140. 33
fibulæ ad tibiam os nexus. 139. 17. ubi
à tibiam osse dehiscat 24
fibulæ cum talo articulatio 140. 2
fibulæ excarnis pars 140. 28
fibulæ figura. 136. descriptio 137. 6
* fibulam ad tibiam os colligantium li-
gamentorum descriptio 253. 30
filum, sectioni aptum 236. 56
focile brachij minus. 168. 9. maius. 12.
& 38. inde
foecunditatis præsagium ex umbilici
ua forum nodis 383. 42
foetus, ipsiusq; inuolucrorū examen
557. 50
foetus inuolucrū primum ac extimū,
cuiusmodi. 541. 16. & quali sub-
stantia 33. inde
foetus inuolucrū secundū, seu mediū
cuiusmodi. 542. 4. itē tertiū. ead. 44
foet⁹ inuolucris extimi nomina. 541. 56
foetus inuolucra elegātius à matrib.
asseruari, quā abijci, &c. 543. 15.
eadem ab reliquis animātibus rur-
sum deuorari. ead. 19
foetus inuolucrorū delineatio 383. 10
foetus in utero situs. 382. & 383. 32. nō
qualis uulgò traditur 541. 28
foetus urinæ meatus. 357. 11. & 356. &
518. 360. ipsius ratio. 542. 25. quo-
modo inquirendus 558. 18
foetus urina & recremento uteri cer-
uicem irrigari ad faciliorem par-
tum 542. 53
foetui uitalem spiritum deferentes ar-
teriæ 518. 39
foetum

foetum inuoluens membrana à quibusdam exiccata asseruari solita, eiusq; diuersa nomina 543.4
foetum inuoluens membrana falso nō omnibus pueris communis habita 543.5. deq; eo supstitutiones. ead. 11
foramen cæcum. 34.39. & 53.12
foramina auditus organi cavitatem ingredientia 34.39
foramina neruis emittendis parata 58.47. inde
foramina neruos in sacro osse transmittentia 84.21
foraminula per caluariæ amplitudinem sparsim obuia 54.23
foraminū capitis siue caluariæ descriptio. 47.17. & 49. inde
foraminū in uertebis, neruos in latera transmittentium natura 70.29
foraminum speculatio ut iucundissima, ita ab alijs hætenus prætermisfa 53.19
forficulae, aptæ secantibus. 237.7. delineatio 235
FRANCISCVS PINELLVS
Genuensis 90.5
frontis cutem mouentis musculi delineatio, ubi spectanda 179.7
frōtis musculi, quære, Musculi frontis
frōtis os. 21.33. & 23.12. & 30.1. eius circūscriptio. ead. 13. & 36.40. & 166.42
Fued, fuhed 387.49
fundibulum cur pro gargareone 580. 19
furcula pectoris ossis 91.22
furculæ inferioris medium 167.49
furculæ 102.2. & 167.51. inferiores. ead.
fusi ossa 167.32

G



Alea, foetum inuoluens membrana quibusdā dicta 543.4
* Galenus de Vsu partium libros emendare aggressus, non plenē id præstitit 219. 48
Galenus non pauca, in libris præcipue de Partiu usu, imaginatus est tantū, in animalib. non uisa 635.47
Galenus ē quibus animalibus Anatomem scripserit. 233.21
Galenus hominem nunquam secuit 275. 3
Galenus in Aristotelē iniquior. 591.1
Galenus in Aristotelem calumniæ nimis sophisticæ 540.55
* Galenus studio in Aristotelem suū ipsius oblitus 267.14
Galenus in Euripide ridendo q̄ standis ossibus occupator 145.27
Galenus medicinæ parens 591.15. rarum Naturæ miraculum. 63.17. summus Naturæ admirator. 500.39. omniū bonorū autor. 569.24.
Galenus non raro quæ maximē fuerant exponenda, tacitus præterit. 630. 43

Galenus quid fecerit, ne aliquā partem ab alijs descriptam præterisse uideretur 32.52
Galenus simiarū sectionis, quā hominum studiosior. 42.55. Item in simiarū sectione quā hominum peritior 81.24. inde
Galenum simiæ & hominis Anatomem confundere 83.17
Galenum simiarū potius anatomem quā hominis tradidisse 85.8
Galenus simiarum sectione delusus 307. 1
* Galenus simiarum sectioni nimitū fesus, priorum Anatomicorum rectas sententias sæpe evertit. 234.19. & * 246.16. & 274.25. & 299.50. & 631. 24
Galenus aliquot librorum interitus 575. 51
* Galeni Anatomicæ annotationes 219. 51
* Galeni autoritas quanta sit 278.41
Galenus boum pene delusi falsū de humani penis materia dogma 529.8
Galenū humani penis fabricā nunq̄ spectasse 527.54
Galenus crebri in Anatomicis tradendis lapsus 591.3
Galenus de Administrandis sectionib. libri postremo ab eo scripti 63.42
Galenus demonstrationes Anatomicæ magna parte falsæ 526.48
Galenus de Demonstratione librorum interitus quatenus dolendus 526.34
Galenus de Ossibus librum græcum per inuidiā quorundam latere hætenus 42.48
Galenus diligentie plurimum debere 68.15
Galenus in Anatomicis sectatores notati 572.52
Galenus interpretum lapsus 98.25. & 140. 19
Galenus interpretum mendæ Anatomicæ à Vesalio sublatae 55.39
Galenus loca ab hominis descriptione discrepantia, nō pauca missa 42.11
Galenus loca non pauca inter se dissidentia, aut aliq̄ falsa, ommissa 232.5
Galenus loci quatuor emendati in libro Administrationū primo. 309.24
G A L E N I L O C A
quædam uel exposita, uel reprehensa, eaq; iuxta rerum seriem digesta: quorū tamen catalogum diligens Lector abundē perlectis hisce libris locupletabit. nobis enim ex multis uix pauca saltem hæc annotare, propter Galeni auctoritatem, libuit.
Galenus sententia, de Adipe inter cutē manus internæ, & tendinē illi subnatum, notata 303.26
Galenus de tribus Animæ speciebus, aut partibus inter se natura diuersis, sententia 594.36
Galenus notata sententia, de usu Appendicum in ossibus. 7.39. Item quod solis magnis ossibus adsint

appendices. ibidem. 54. & 8.5.
quodq; solis adsint sinus 2.51
Galenus de Arteriæ magnæ & uenosa orificijs lapsus 591.10
* Galeni locus de Arteriæ ortu. 299.6
Galenus ignoratum, Arteriā soporalem non ferri per idē foramen cum tertio ac quarto neruorū parī. 52.32
Galenus sententia, de Arterijs plexum reticularē constituentibus 622.46
Galenus sententia de Astragali situ, notata 15.50
* Galenus, duo Brachij ligamenta, ignorans 220.25
* Galeni sententia de motu Brachialis in pronū & supinū, notata 215.19
Galenus de Cæco intestino, sententia 500. 30
Galenus ignota, nō pauca Capitis foramina 52.32
Galenus locus de Capitis motu super uertebam secundā, notatus. 67.9. eiusdē alius de ossibus in motu à se inuicem abscedentibus. ibid. 54
Galenus sententia de Capitis motu proprio quopiam, notata 176.12
Galenus de capitis motibus, notata sententia 63.26
Galenus locus de capitis motu in latera super prima uertebra, improbatus 65.7. & deinceps
Galenus super Cartilagine inter uertebrae dorsū reposta, notata sententia 300.33
Galenus uana ratio, de Cerebelli simplicitate 339.24
Galenus sententia de cerebelli duplicitate, improbata 631.20
Galenus ratio de cerebri diuisione, notata 632.13
Galenus sententia de cerebri reuolutionibus, notata 630.37
Galenus dogmata nō pauca de Cerebri uentriculis, notata, alia ommissa 634. 20
Galenus de præstantia Cerebri uentriculorum, uariis 636.26
Galenus sententia de superficie uentriculorum Cerebri tenui mēbrana cincta, eiusq; improbatio 635.40
Galenus sententia, Colon seu artuū capita *ὑποφύσεις* & *κοιλότητες* uocari docentis, improbata 9.47
Galenus de Cordis osse sententia 93.51
Galenus de Costarū articulatione, sententia 91.22
Galenus de Costarum cartilaginibus, sententia 90.27
Galenus de Crurū in animalibus flexione, &c. dogma 145.20
* Galeni sententia de cubiti flexionibus planē imaginaria, notata. 218.14. in enumerandis musculis harum autoribus uarietas. ead. 19
Galenus de digitorum forma sententia. 123.28. & articulatione. ead. 30.
Galenus placitis, de Dorsū motibus, sententia contraria 76.45
Galenus subinde Dorsum, & spina

nam in tibiā & femur mouentiū
 musculorum descriptione confun-
 dere 129.57
 Galenus Dorſi motores musculos
 quatuor poſtremos ignorās. 298.11
 Galenus in deſcriptione Dorſi mu-
 ſculorum, notatus 295.45
 Galeni de effectiūo & materiali ho-
 minis principio, ſententia 520.42
 Galeni de Femoris ad coxendicis os
 motu lapſus 134.16
 Galeni de Foetus inuolucris dogma
 ta quatenus uera 541.12
 Galeni de ſecundo foetus inuolucro
 ſententia 542.31
 Galeni ſententia, de foraminis ſecun-
 dū neruorū cerebri par trāſmitten-
 tis magnitudine, improbata. 50.25
 Galeni ſententia, de foraminibus cri-
 brum referentibus, ac pituitam ce-
 rebri expurgantibus, fictitia 641.28
 * Galeni notata ſententia de Glande
 inteſtino ieiuno adnata. 264.47
 Galeni de Glanduloſa carne ad infe-
 rius uentriculi oriſiciū ſententia
 391. 2
 Galeni anatomica demōſtratio, qua
 Glandoſum corpus ſemini paran-
 do non præeſſe conficitur 526.47
 Galeni de Humeri tuberculo interio-
 re & exteriore ſententia 107.7.16
 Galeni de Humero poſt femur om-
 nibus oſſibus grandiore, ſententia
 105. 9
 Galenum falſo Humerum exterius
 gibbum, interius ſimū, &c. ſta-
 tuiſſe 107.39
 Galeno canū inteſtina magis quā
 hominum inſpecta 500.39. & 501.31
 Galeni de Mamillarum ſitu ratio
 545. 46
 Galeni locus de Maſſeteribus mu-
 ſculis notatus 246.30. & 248.6
 Galeni locus de Maxillæ ſuperioris
 futuris explicatus. 29.38. alius de
 eorundē oſſium cōſtitutione. 39.11
 Galeni loca aliquot de Maxillæ ſupe-
 rioris oſſiū numero, futuris, refuta-
 ta. 42.11. & deinceps
 Galeni locus de Membranis proces-
 ſus uermiformes cōtinentibus, no-
 tatus 216.14
 Galenus an rectē tria Meſenteria nu-
 meret, & cuiuſmodi. 504.19
 Galeni locus, Muſculum inter liga-
 mentum ac neruum ponentis eſſe
 medium 220.41
 Galeni opinio de Muſculorū ortu,
 notata 223.24
 Galeni opinio de Muſculorū fibris,
 notata 227.7
 Galeni notata ſententia, qui Muſcu-
 li tendine careant 228.27
 Galeni locus notatus de Muſculorū
 tendinibus 222.51
 Galenus in deſcribendis abdominis
 muſculis, uariis 283.6
 Galeni locus, de muſculo Brachium
 attollente, notatus 264.42

Galenus in deſcribendis Brachium
 attollentib. muſculis, uariis 265.21
 Galeni ſententia, de muſculo tanquā
 Brachium circumuertente notata
 265.46. & 270. 53
 Galeni, de muſculo quopiam tanquā
 Brachij motore, notata ſententia
 263.49. & 14
 Galeni, ſuper muſculo quopiam Bra-
 chij motore, in hominibus autem
 nō reperto, notata ſententia 266.41
 Galeni, de quarto Brachij motorum
 muſculo, notata ſententia 266.23
 Galeno præteritus muſculus inter
 Brachij motores quintus 267. ult.
 Galeni, de muſculorum Caput mo-
 uentium pari ſecundo, notata ſen-
 tentia 277.20
 * Galeni ſententia ficta, de muſculis
 cubitum mouentibus 217.1
 Galeni loca de muſculis Digitoſ mo-
 uentibus, notata. 305.33. & 306.4.
 & 14. item 307.1
 Galeni, ſuper muſculorum qui Dor-
 ſum mouent, pari primo, notata
 ſententia 296.4. & 18
 Galeni, in deſcribendo quinto Dor-
 ſum mouentium muſculorum pa-
 ri, notata ſententia 297.16
 Galeni, in deſcribendo ſexto Dor-
 ſum mouentium muſculorū pari,
 notata ſententia 298.12
 * Galeni de muſculo femur mouentiū
 quarto, eiꝯꝯ ortu ſententia 239.26
 Galeni de muſculorum intercoſtaliū
 functione, notata ſententia 290.21
 Galeni locus, de muſculis Labra mo-
 uentibus, notatus 242.29
 Galeni ſententia, de muſculo Manus
 internæ regioni ſubnato notata.
 302. 44
 Galeni, de quarto muſculorum pa-
 ri, Oſſi v priorum, notata ſen-
 tentia 251.39
 Galeni, de Palpebrā mouentibus mu-
 ſculis opinio 239.14
 * Galenus in tradendis muſculis pe-
 dem digitoſqꝯ mouentibus, admo-
 dum uariis 243.44
 * Galeni ſententia, de muſculis primis
 Pedem mouentibus, notata. 245.35
 de quarto muſculo. 246.16. de o-
 ctauo. 248.7. de muſculis Pedis di-
 gitoſ mouentib. 250.13. & 21. & 251.38
 Galeni ſententia, muſculis Pollicis &
 parui digiti abductioni præſectis,
 notata ſententia 308.35
 Galenus ignorans tres muſculos, ſe-
 cundū Pollicis os flecſentes 309.15
 Galeni ſententia de muſculis Pollici
 præſectis, notata 312.38
 * Galeni, de muſculi in Poplite lati-
 tantis functione, notata ſententia
 237.37. & 56
 * Galeni ſententia de primo Radiū
 mouentiū muſculorū, notata. 216.6
 Galeni in muſculorū Scapulā mo-
 uentium traditione, notata ſenten-
 tia 274.10.42. ac deinceps

Galenī, de muſculo quopiam tanquā
 Scapulā mouente, notata ſenten-
 tia 275.12
 Galeni ſententia, in tradēdo Scapulæ
 motorum ſecundo muſculo, nota-
 ta 275.48
 Galeni ſententia, de muſculis tem-
 porum lineamentis, notata. 250.40
 Galeni ſententia, de quarto Thoracis
 muſculo, notata 289.10
 * Galeni ſententia, de muſculis Tibiā
 mouentibus, notata 230.8
 Galeni ſuper primo Tibiā mouen-
 tiū muſculo, notata ſententia. 231.22.
 ſuper ſecundo. ibid. 41. ſuper ter-
 tio. 232.2. ſup quarto. ead. 21. & 39.
 ſuper quinto. 232.47. & 233.24. &
 236.57. ſuper ſexto. quem perfun-
 ctoriē tantū attigit. 234.46. ſuper
 nono. 235.43. ſuper tendinibus, ti-
 biæ muſculorum 236.7
 * Galeni ſententia, de muſculi in ueſi-
 cæ ceruice uſu, notata 228.12
 * Galeni locus, de muſculo uolæ me-
 diæ, &c. ſubnato notatus 222.50
 Galeni ſententia, de Neruo paris ter-
 tiij notata 325.45
 Galeni ſententia, de neruorum opti-
 corum foraminibus 324.43
 Galenus neruorum recurrentium
 inuentor & admirator 329.19
 Galeni in neruorum traditione no-
 tata ſententia 350.3
 Galeni exploſa ſententia, quod ner-
 uorū aliij ſenſui, aliij motui præſint
 348. 49
 Galeni locus de neruis ē primo de
 Locis affectis notatus. 344.57. eiꝯꝯ
 locus alter ē lib. 3. de Adminiſtratio-
 nibus Anatom. 345.37
 Galeni locus de Oculi tunica, ē de-
 cimo de Vſu partium 647.28
 Galeni de ometiti membrana colon
 dorſo colligante ſententia 496.30.41
 Galeni ſententia de acutis Oſſium
 proceſſibus notata 9.1
 Galeni ſententia de numero oſſium,
 os ſacrum conſtituentium 339.49
 Galeni loca de oſſiū inter ſe ſtructurā,
 a ueritate aliena, ē multis aliqua
 enumerata 16.57. & deinceps
 Galeni de octauo brachialis oſſe, ſen-
 tentia 118.21
 Galeni locus de oſſe inter cerebrum
 ac cerebellum in canibus poſito,
 explicatus 32.44
 * Galenus, libro de Vſu partiū, Coc-
 cygis os ignorans 239.26
 Galeni ſententia de oſſis cuneiformis
 conſtitutione ac uſu notata 32.13
 Galeni ſententia de oſſe cuneiformi
 tanquam perforato inſtar ſpōgiæ,
 improbata. 51.31. & quod pituita
 illac non coletur. ibid.
 Galeni ſententia de oſſibus digitorū
 tanquam ſolidis improbata 2.51
 Galeni de tertio quodā oſſe in ſum-
 mi humeri cū clauicula nexu, ſen-
 tentia 100.2. inde
 Galeni

- Galenus de osse Maxillę inferioris tanquam gemino, notata sententia. 44. 8
- Galenus de Pectoris ossiũ synarthrosi sententia 91. 53
- Galenus de Pedis & manus ossium pari numero lapsus 149. 22
- Galenus de primo Pollicis osse lapsus 148. 44
- Galenus de Sacro osse & coccyge, sententia notata 81. 14. inde. & 82. 18. & 85. 16
- Galenus de Tibiæ ossis sinibus sententia 138. 45
- Galenus quædã Ossa ipsi non uisa, tanquam in humano essent corpore, recensere 32. 51
- Galenus de Patellæ cartilagine lapsus 142. 4
- Galenus notata sententia, de Pituita cerebri per olfactus canales educenda 323. 7. & 48
- Galenus de Postbrachialis ossibus sententia 120. 8
- Galenus de acuto ulnæ Processu *σὺλκῳ* *ἢ* sententia 114. 6. inde
- Galenus sententia, de anteriori Processu primæ ceruicis uertebrae, notata 64. 47
- Galenus sententia, de Processuum in cerebro uermiformium usu, notata 639. 9
- Galenus sententia, de Processibus duræ membranæ tanquam duplicatis, notata 626. 1
- * Galenus sententia, de quinto Pulmonis lobo cauam uenam sustinente, notata 280. 31
- Galenus de quinto Pulmonis in homine lobo error 581. 55
- Galenus de Quadrupedum genũ articulo lapsus 139. 14
- Galenus de Renum situ ratio minime approbanda 514. 53
- Galenus de Reticulari in caluaria plexu lapsus 524. 8
- Galenus reticularis plexus nusquam inuentus. 642. 12. superq̃ eo locus est libro de Venarum sectione 29
- Galenus de Seminalium uenarum ortu & ductu sententia 523. 20
- Galenus de Seminis ex sinistro teste pruritũ, sententia expensa 526. 13
- Galenus placitum; omnia præter carnem & pinguedinem, Semine consistare, in humano corpore 541. 2
- Galenus opinio, de Septi foraminibus, notata. 225. 52. & 291. 26. & 43
- * Galenus de Simiarũ ad hominẽ differentia, notata sententia 243. 47
- * Galenus sententia notata, de Sinibus in membrana cerebri dura constitutis 307. 30
- Galenus de Stomachi cum arteria in processu sententia 388. 36. inde
- * Galenus sententia, de Tendine lato, qui plantæ cuti subnascitur, notata 244. 15
- * Galenus de tendinũ in digitos manus insertionem, notatus. 213. 10.
- contraria de his docet. ead. 25
- Galenus sententia de tendinibus XVII musculi digitos mouentium, notata 310. 8. & 13
- Galenus opinio de tendinibus processus uermiformes continentibus notata 639. 48
- * Galenus notata sententia, de Tibiæ motuum differentiis 230. 46
- Galenus quid Testis caput appellatum 522. 45
- * Galenus ignota Venæ axillaris diuisio quædam 286. 41
- * Galenus de uena caua uentriculo substrata opinio 392. 24
- * Galenus argumenta de uenæ cauæ ortu in Aristotelem, non nimium firma. 275. 13. & quæ, quocq̃ pacto. mox infra. 13
- * Galenus irrefutabilis demonstratio, de Cauæ uenæ ortu, cõfutata. 276. 2
- Galenus de uenæ cauæ principio sententia explosa 589. 56
- Galenus de cauæ uenæ in omentum ductu error 496. 45
- * Galenus sententia, qua cauam uenã ubi iecoris gibbo committitur esse amplissimã statuit, cõfutata 278. 1. & 275. 23
- * Galenus locus, à uena caua priusquã cor attingat ramos in thoracis membranas distribuẽtis, notatus. 280. 45.
- eiusdem alius de uenæ arterialis ortu, notatus. ead. 50
- Galenus de Coronalium uenarum ortu sententia 596. 10
- * Galenus de ortu uenæ sine pari sententia uaria 281. 4
- Galenus cur de uena pari carẽte tam uariẽ scripserit 281. 53
- Galenus de uenis Mesenterij ac intestinorum lapsus 504. 48
- * Galenus de Portæ uena, ut sanguinem conficiente, sententia uaria 267. 13
- Galenus de portæ cauæ ramis iecoris sanguinem preparatibus, opinio 508. 6
- * Galenus in descriptione uenarũ humanarum & axillaris, partim uerus, partim falsus, & quò pacto 286. 6
- * Galenus simiarũ uenas docens, hominũ uenas non persequit̃ 262. 28
- Galenus de Ventriculi situ sententia 389. 35
- Galenus sententia, de nexu corporum thoracis Vertebrarũ, notata. 73. 12.
- Item de foraminibus uertebraarum nervos transmittentibus. 73. 52.
- Item de costarum ad uertebrae articulationem. 74. 20. Item de transfuersis infimarũ thoracis uertebraarum processibus ibidem
- Galenus in assignatione aliquot in lumbis uertebraarum, uariũ. 79. 9.
- Eiusdem sententia, lumborum uertebrae processum affingẽtis ad imitationem simiarum accanum, improbata 78. 39
- Galenus uertebrae ginglymo connexas arbitratus, tria ossa, pro hac sententia ad articulationem concursura, non animaduertit 15. 22
- Galenus hominis Viscera aut oscitanter, aut neutiquam spectasse 584. 33
- Galenus umbilicus non recte corporis medium constitutus 595. 13
- Galenus de umbilico corporis medio sententia 389. 39
- Galenus uaccinus caprinus uel Vterus, nõ muliebris, descriptus 534. 33
- Galenus de uteri cornibus notata sententia 286. 14
- Galenus de uteri uenis in mamillas se se exonerantibus sententia 547. 11
- Galenus humanum uterum nunq̃ spectasse 532. 43
- Galenus studiosos esse omnes medicinarum candidatos debere 532. 49
- Galenus in humani corporis fabricæ cognitione nimium à plerisque tribui 540. 5
- Galenus peculiaris mos 292. 1
- Galenus quædã non obseruata 4. 22
- Galenus ex ueris aliorũ Anatomiarum descriptionibus fecisse falsas 85. 25
- Gallicus morbus glandulis faucium palatoq̃, & gargareoni præcipue infestus 580. 7
- γάργαρα* 497. 9
- gargareon cur *ἰδμὸς* Græcis 579. 39
- gargareon uocis plectrum 580. 30
- gargareonis nomina. 580. 13. eiusdẽ situs, forma, substantia, usus, &c. ead. 25. inde
- gargareonis præfectio 580. 29. inde
- gargareoni infestus Gallicus morbus 580. 7
- gargareonem soli inter animantia homini, & quibusdam auibus obtigisse. 580. 21.
- gargareonem temerẽ à quibusdam excrementorum cerebri receptaculum esse, confictum 580. 37
- γαστήρ* undedictus Græcis uentriculus 389. 30
- γαστρονμία* 138. 30
- γλασῖνοι* dentes 167. 17
- gemelli dicti, in cerebro 638. 43
- gemini cur testes dicti 521. 20
- GEMMAE FRISII laus 161. 46
- generandi amor animantibus natura ingenuus 520. 17
- generationis nostrę principia. 384. 10
- circa Generationis organa moueri solitæ quæstiones 520. 38
- generationis organorũ uirilium delineatio 374
- generationis organis, utendi quocq̃ appetitus natura adiectus 520. 15
- generationi subseruentiũ partium breuis enumeratio 520. 4
- genu articuli cartilagines 139. 11
- * genu articuli ligamentorum descriptio. 253. 3. administratio. 256. 26
- genu rotula. 168. 31. oculus. ead. 33
- genuini dentes. 46. 35. & 167. 22

INDEX.

γίββος 167.14
gibber 9.49
gibberus, siue gibbus ulnæ processus 111.15. & 168.14
gibbosorum uertebrae 71.19
ginglymos 12.22. & 14.33
ginglymon, quando natura format 14.51
γυγλυμοειδὴς humeri orbita 106.24
GISBERTI CARBONIS Lovanienſis medicilauſ 162.11
γόμεφος 2.2
γόμεφοι dentes 167.21
gomphosis 12.22. & 15.39
glans cerebri, pinæ nuciſ ſimilis, eiusq; deſcriptio. 637.42. ſitus quiſ. ibid. 47. uſus; 638.5. delineatio unde petenda 637.45
glandis cerebri pituitam excipietis, & accumbentium ipſi arteriarum examen, ſeu adminiſtratio 654.40
glandulæ cerebri teſtula incumbenſis adminiſtratio. 653.9. eiufdem hiſtoria. 640.45. delineatio unde ſpectanda. 640.9. canales ab ea ducti 641.2
glans penis cuiuſmodi 523.32
glandes inteſtinorum 499.54
glandes, ſiue glandoſum corpus meſenterio cur Natura addiderit 505.7. inde
glandium in faucibus, triplex genus 579. 28
glandularum laryngis ratio 578.50
glandularum in mamillis ratio diuerſa 543.56
*** glandularum quæ uaforum diductibus ſubduntur, deſcriptio.** 261.4. nomen. ead. 29. differentiæ à nomine, colore, imagine. ead. 32. uſus. ead. 7. & 43
glandularum ſtomacho crebro adnatarum uſus 389.18
glandulis faucium infeſtus Gallicus morbus 580.7
glanduloſa caro non procul ab inferiori uentriculi oriſicio 391.2
glandoſum omenti corpus. 358. & 359.55. & 497.27
glandoſum corpus uaforum ſemen deferentium inſertionem excipietis 525. 18
glanduloſum corpus ueſicæ ceruicis initio adnatū. 373.57. & 372. eiufdem uſus 526.38
glanduloſi corporis in ipſa uaforum diſtributione poſiti delineatio 363
γλάνη 10.3.32
γλάνης & ποτύλης diſcrimen 10.44
γλωοειδὴς ſinus 66.6
glirium cæcum inteſtinum cuiuſmodi 500.34
gloſſocomi inſtrumenti delineatio 329. 21
γλωτῆς, qualiter ſpectanda adminiſtranti 261.20
γλωτῆς quid. 253.29. ὠγλωτῆς. ibid. & 154. 43
γλωτῆς & ὠγλωτῆς nō eadē 261.33

γλῶττις dicta in cerebro 638.47
γλῶττις 135.2. & 168.29
granatum malum, cartilago. 93.19. & 167. 48
granatum malum teſticulorū 168.29
grandinoſum os 148.13. & 168.54
γραφοειδὴς proceſſus 31.40. & 112.5. & 166. 56
*** Guades dictæ uenæ** 270.14
*** guidetz dictæ uenæ** 270.14
gulæ appellatio quibuſdam pro ſto macho 388.8
G V L I E L M V S M A R T I N V S S T E L L A iureconſul. 531. 16
gulofis maius iecur datum 507.10
gurgulio quid 580.13
guſtatus ſedes 19.10
guſtus inſtrumentum 650.20
guttur 153.18
gutturis os 167.27

H



Hæmorrhoidum fluxus par ratio cū menſtruo ſanguine 538.38
*** Hæmorrhoidum modus** 267.14
hæmorrhoidū ſanguis unde profluat 538.46
hamuli pro ſectione paradi. 236.32. delineatio 235.49
*** hanabub Arabibus uocata uena** 276. 53
harmonia 12.22. & 16.9
harmoniarum coitus cuiuſmodi 16.47
Haſoher 387.50
ἡβης os 168.24
*** Hector ab Achille circum Troiam tractus quo pacto** 246.8
ἡπατικὴ dicta uena 276.53
hermaphroditorum ſpecies, cur non etiam recenſeantur 592.26
ἰδρόν os 167.39
Hippocratis locus de ſecundo ceruicis uertebrae nomine 66.31
*** Hippocratis ſententia, de phlebotomia in pleuritide quæ** 281.54
Hippocratis ſententia de ſepto tranſuerſo, notata 291.43
Hippocratis de ſtomachi inceſſu ſententia 388.36
Hippocratis de ſummo humero locus 99.54
Hippocratis de temporalibus plagis locus 33.30
Hippocratis locus de uertebrae luxatione explicatus 58.23
Hippocrati quæ dicantur acetabula 540. 2
Hiſpani cuiuſdam, & unionum ab eo deuoratorum hiſtoria 390.48
homo quibus locis à ſimia differre Galeno perſpectus 528.3
hominis primarium effectiuū principium uirile ſemen 520.38
hominis principia ipſum diſpenſantia, tria 88.50
hominis uiſcera ad ipſorū fabricam

diſcendam non inutiliter coquiſ. 512. 2
homini breuiſſimam obtigſſe inferiorem maxillam 43.47
hominem neceſſario corruptioni obnoxiiū, mortalem ue eſſe. 384.1. inde
hominem pluribus oſſibus coſtare, motus gratia, etc. 11.42. inde
hominem producere immortalē materiæ occasione non licuiſſe. 519.54
hominum & canum πάγληρας diuerſi coloris 497.34
hominum fabricæ ratio 520.5
humani alimentū ad plantarum nutritiuam uim differentia 493.42
humerales muſculi ſex. 106.39. inde
humeraia uena, quære, Vena humeraria.
humerus quid. 13.49. & 105.1. & 167.53. & 168.3
humerus ſummus quid. 99.23.52. & 100.44. eiuf uſus. ead. 45. & 102.52. & 167. 55
humeri appendix. 5. & 6.23. & 8.2
humeri articulus. 97.55. cur à coſtis remoueatut 102.52
humeri caput 9.10
humeri figura & deſcriptio. 104.5 & 105.1. inde
humeri foramina 107.52
humeri in anteriori ſede aſperitas ad quid parata 107.46
humeri orbita γυγλυμοειδὴς 106.24
humeri oſſis figura 2. & 5. & 6.10
humeri partis ſuperioris & inferioris deſcriptio. 105.15.43. item mediarum partium 107.29
humeri inferioribus proceſſibus nulli appendices 8.28
humeri tuberculū externum. 106.46. internum. ead. 55
humero excipiendo paratus ſinus 97. 42
humerū poſt femur nō eſſe omnium oſſiū grandiffimum, uti Galenus cenſuit 105.9
humerum ſcapulæ neſcientium ligamentorū deſcriptio. 271.17. adminiſtratio 272.3
humeri 167.51
humerorū ſcapulis in ſceſto coniungendorum ratio 161.28
*** Hymen puellarum conſtituentes uenulæ** 290.13
hyoidis oſſis figura. 55.5.11. inde. ſitus & nomina. ead. 33. inde
hyoidis oſſis firmatio, & uſus 56.23
hyoidis oſſis medium oſſiculum. 55.45. latera. 56.6. inde
hyoidis oſſis quot oſſicula 162.38

I



Iacitor quid 525.2
ianitor, uentriculi oriſicium. 390.27. & 391.16
IACOBVS NIGER Genuenſis 90.5
*** Iecoraria dicta uena quæ.** 276.55. & 277. 1
iecur an crapula abſumatur 507.14. iecur

- iecur anteriori peritonæi sedî conne-**
xum 507.51
iecur cuius animæ facultatis sedes.
 594 37
iecur homini grādus, & quibus ma-
ius obtigerit 507.11
iecur humanum nullis fibris diui-
sum 507.3
iecur maxima ex parte costis succin-
gi muniriq̃ 505.49
iecur nulla peculiari eguisse figura.
 506 21
iecur nutritionis organorum præci-
puū, & sanguinis officina. 505.30.
 & 508 33
iecur quare sanguine nutriatur cras-
siori 508.39
iecur septo connectentium præcipu-
um ligamentum 356. & 357.5
iecoris caui delineatio. 365.4. & 570.8
iecoris constructionis ad testes colla-
tio 525.41
iecoris examen 603.13
iecoris fibrarū ridicula quibusdam
efficta nomina 506.51
iecoris fibrarum uentriculum appre-
hendentium figmentum unde na-
tum 506.47
iecoris forma uaria 505.55
iecoris gibbæ posteriorisq̃ sedis de-
lineatio. 369.1. cauæ. 370.8. &
 372.30 & 373.4
iecoris gibbus 357.4. & 356
iecoris humani formā à canū & por-
corum iecoribus uariare 506.42
iecoris ligamenta, ac ex illis prona-
scens tunica 507.42
iecoris munus siue officium. 385.13.
 ipsiusq̃ structuræ ratio 508.4
iecoris sanguificatio quî conficiatur.
 508 14
iecoris sedis figura 360
iecoris situs, eiusdemq̃ ratio 505.
 31.44. qualis in auibus & canibus.
 505 46
iecoris situs examen. 551.14. & 552.1
iecoris substantia. 507.16. uenarum
 series. ead. 13. arteriæ. 35. substantia
 ualis circumfusa. 38. nerui. 55. eo-
 rumq̃ omnium ratio. 508.41. inde
ieiunum ab ileo nihil minus quàm
inanitione dirimendum 499.18
ieiunum intestinum cuiusmodi.
 499 3
ieiunum intestinum cur cremorem
suum ocyus transmittat 503.47
ieiunum intestinum & ileum cur in
uentris medio sita 502.54
ieiuni intestini finis ubi constituen-
dus 499.9
ieiuni intestini uenæ & arteriæ. 499.
 39. item nerui ead. 49
ileon intestinum cuiusmodi. 499.7
ileum & ieiunum intestinum cur in
medio uentris sita 502.54
ilei intestini initium ubi statuendum.
 499 10
ilei intestini nerui 499.49
ilium 118.57
ilium os. 6.2. & 168.19. & 127.14. &
 128 50
iliū ossis appendix. 5. & 6.17. & 129.
 50. spina, dorsum. ead. & 130.1. &
 129 52
ilium ossis appendix quibus muscu-
lis occupetur. 130.4. quibus inter-
 na eius amplitudo ead. 14
ilium ossis dorsî lineæ, ipsumq̃ occu-
pantes muscoli 130.38
iliū ossis pars retrorsum magis quàm
sacri ossis transuersi processus ex-
porrecta 129.42
ilium ossis sedis figura 355. & 356.5
*** ilium ossa, cum osse sacro neçtenti-**
um ligamentorum descriptio. 252.
 17. administratio 255.19
ilium ossa cur in mulieribus ampli-
ora 132.1
ilium ossis figura 5
ilium ossis sedes sacro ossi commissa
qualis 129.16
incisorij dentes 45.49. & 167.17
incudi comparatum ossiculum. 34.
 54. ipsius figura 33. & 34.26
indusium quibusdam dicta foetū in
uoluens membrana 543.4
*** iues** 257.37
iues, dicti muscoli 267.44
iuis os 166.45
infundibulum cerebri. quare, Ce-
rebri infundibulum.
innominata cartilago quæ 154.5
inspiratio naturalis uiolenta 292.52
inspiratio quibus musculis fiat. 292.
 55.
inspirationis usus 570.7
instrumentorum Anatomicorū de-
scriptio. 236. delineatio 235
instrumentorum chirurgicorum de-
lineatio 329.20
intercostalium musculorum descri-
ptio, & administratio. 289.40. ex-
 terni. eadem. 49. interni. 290.7
intercostalium musculorum munus
iuxta Galeni mentem. 290.21. iux-
 ta ueritatem ead. 28
intercostalium musculorum nume-
rus. 289.40. iuxta Arabes. 290.14
internodia 116.27. & 121.47
interpretum oscitantia 111.7
interscapiliij uertebrae 167.37
intersepientes membranæ. uide,
Membranæ.
intestinum cæcum. uide, Cæcum.
intestinū crassum in colon et rectum
diuidi 501.10
intestinum duodenum 362.1
 & uide, Duodenum.
intestinum ieiunū. uide, Ieiunum
intestinum.
intestinum mediū an recte à Cicero-
ne uersum pro mesenterio. 504.6
intestinum ileon. uide, Ileon.
intestinum princeps quod nam.
 501 15
intestinum rectum, & colon, uide,
 Rectum, & Coloni.
intestini cæci, coli, rectiq̃ imago &
ductus 351.15. & 362.41. & 363
intestini crassi ductus ac situs. 500.51
intestini gracilis ductus. 498.33. ead.
 iusdem in tria diuisio. 498.47. for-
 ma, & substantia 499.21. inde
*** intestini recti anularis muscoli de-**
lineatio 226.34. & 225.28
intestini recti musculorum examen.
 556 56
intestina continuū quidem esse cor-
pus, sed pluralitatis numero, ua-
rijsq̃ nominibus diuersas ob cau-
sas donari 498.11
intestina quî à mesenterio refecan-
da, & à corpore auferenda. 553.4
intestinelorum à uentriculo exortus.
 498 29
intestinelorum crassorum historia.
 500 3. inde
intestinelorum crassorum tunica.
 501. 20
intestinelorū ductus longitudo quan-
ta 498.9
intestinelorū formæ ratio. 503.13. item
 substantiæ, & tunicarum. ead. 17
 fibrarum. 26. uenarum & arteria-
 rum 35. neruorum 42
intestinelorum glandes 499.54
intestinelorum gracilium uenæ & ar-
teriæ 499.38. item nerui. ead. 49
intestinelorum historiæ breuîs enume-
ratio 498.23
intestinelorum in scortum descensus.
 495.24. inde
intestinelorum munus 385.10
intestinelorum munus, ac dein eorum
constructionis ratio 501.57. inde
intestinelorum nomine quæ compræ-
hendantur 498.6
intestinelorum pars caua quæ dicatur
Anatomicis. 499.35. item quæ gib-
 ba ead.
intestinelorum sedis figura 360
intestinelorum situs examen. 550.45.
 eiusdem ratio 502.51. inde
intestinelorum situs, forma, substan-
tia 498.23
intestinelorum tenuium ductus deli-
neatio 361
intestinelorum tunicam interiorem ali-
quando in ægris putrescere, exte-
riore salua 503.19
intestinelorum tunica 362.41. inde
intestinelorum tunica quî examinan-
dæ 553.21
intestinis nullas uenas propagari à
caua, contra quàm Galenus tradit.
 504 49
intestinis obnatus adeps 501.51
Introductorij autor alius à Galeno
 17 15
inuerecundum os 166.43
inuolucrum cordis. uide Cordis in-
uolucrum.
IOACHIMVS ROELANTS me-
dicus 538.12
 LI 4 IOAN.

INDEX.

IOANNES CENTVRIO Genu
ensis 124.39
IOANNES DRYANDER medi
cus 395.3
irascibilis animæ sedes cor 594.19
iris, oculi circulus quis 240.37
ιδμος cur pro faucibus 579.20
ιδμος 128.56. & 168.21
Italiae circumscriptionem referens
os 1.43
ιγυς 11.1
iugale os. 22.6. & 23.20. & 33.3.13.
& 38 14
iugalis ossis usus 33.21.32
iugalia ossa 1.37. & 167.8
iugularis uena. quare, Vena iugul.
iugulum pectoris ossis 92.22
iugula 102.2. & 167.51
ιφου uertebrae 167.38

L
Abra 11.1
labra mouentes muscu
li. quare, Buccas mo
uentes musculi.
labra mouentium mu
sculorum historia. quare, Muscu
lorum labra mouentium.
labrorum fungosa substantia. 245.40
laceriam uiris quibusdā post pubem
exprimi 545.28
lactis in mamillis generatio, eiusq; ra
tio 546.48
lactes an recte pro mesenterio uer
sum à Gaza 504.6
lacticia quare 580.1
λαγόνες 281.28
λαγόνω os 168.19
lambdoeides futura. 21.19. & 23.5.
32. & 166.28. unde dicta 26.42
lambdoeides futurae additamēta. 28.39
λαμβοειδής os 55.36. & 167.26
lapidea, siue lapidosa ossa. 1.34. & 33.
7.33 & 166.48
lapidosa caluariae sedes 167.6
larynx. uide Arteria aspera.
larynx, etiam φάρυγξ dicta 579.17
larynx, asperae arteriae caput 153.18
laryngis cartilagines 3.40. & 5.2
laryngis cartilaginum coordinatio
nis ratio 578.21
laryngis cartilaginum figura & de
scriptio. 152.3. inde. & 153. per totū.
laryngi appositae glandulae 261.16
laryngis glandularum & pinguedi
nis ratio 578.46
laryngis γλωττις, qualiter spectanda.
261 20
laryngis ligamenta 260.31
laryngis lingua seu rima, praecipuū
uocis organum 144.47
laryngis duo musculi Galeno igno
rati 260.19
laryngis musculorum administratio.
260.41. comuniū ordine. 48. pro
priorum. 12. ordine 261.35
laryngis musculorum descriptio. 258.32
laryngis musculorum examē. 604.14
laryngis musculorum alij proprii, a
lij communes, 258.37. priorum



numero 12. descriptio ordine. 258.
46. functio. 259.45. communium,
qui sex sunt, descriptio. 259.49.
functio 260.9
laryngis musculorum delineatio. 256.
communiū, primi & secundi. 257.
32. tertij, quarti. ead. 34. quinti &
sexti. ead. 38. priorum delinea
tio. 257.48. & deinceps
laryngis operculum 154.35. eiusdem
bini musculi. 260.16. descriptio. i
bid.
laryngis operculi, duorum musculo
rum administratio, qui ē commu
nibus non habentur 261.5
laryngis operculi musculorum deli
neatio 257.43
laryngis operculi usus 578.13
laryngis radici adnatæ glādes. 576.54
laryngis rimæ usus 577.52
laryngis substantia cuiusmodi. 575.55
laryngis superficies exterior & inte
rior qualis 575.11. inde
laryngem succingens tunica 260.36
lateralis morbi uenæ sectio cuiusmo
di optima 514.6
* in Lateralis morbo quare uena secan
da 267.31
latum os 167.39
laude os. 166.45. & 167.27 (166.11
LAZARVS Hebraeus de Frigeis.
λαει, siue planæ testibus compara
tae 520.50
* λανός, seu torcular cerebri 309.47
λεπιδωειδής ossa 166.48
λεπιδωειδής προσκολληματα 27.54
λεπιδωειδής futurae 166.35
* lethargica arteria 296.45
liē cur linguosum uiscus appelletur.
511 42
lien cur risus author uulgò dicatur.
514 8
lien qualis in auribus & canib. 505.47
lien quid in uentriculum eructet, &
quo meatu 513.36
lienē beneficio, an cor refrigeretur
514. 11
lienē eximendi ratio, in Anatome
553. 38
lienē nutritio, eiusdemq; ratio 385.18
lienē omēti membrana adhuc tecti
figura 357. & 358.21
lienē omni ex parte cōspicui figura,
369.22. inde. & 370
lienē situs 494.16. & 511.25. forma.
ead. 32. superficies & color. 52.
substantia 512.7.14
lienē situs examen 551.14
lienē tunica, & nexus eiusdem 512.53
lienē tunica quā obseruanda, simul
cum ipsius ad uentriculum nexu &
substantia 554.2. inde
lienē uasorum series 512.6
lienē uenæ, arteriæ & nerui unde du
cantur 512.37
lienē uenarum arteriarum & neruo
rum series 358. & 359.51
lienē usus ac functio 513.7
lienem cursoribus eximi, stultē per

suasum uulgò 513.8
ligamentum, συνδισμός, quid 215.8
ligamentum ceruicis uertebra primam
secundae annectens. 280.30.
descriptio. ibid. administratio.
ead. 42. delineatio 279.57
ligamentum, linguam faucibus alligans,
quale 255.53
ligamentum secundū linguæ longi
tudinē, ossis uicem præstans. 255.17
* ligamentū inter ulnam & radium.
221. 13
ligamentum ossis dentis dicti 280.
2 & 44
ligamentum totam pedis amplitudi
nem subiens. quare Pedis ampli
ligamenti descriptio, quo ostenditur
caput super uertebra secundā ad
anteriora posteriora ue non mo
ueri 280.28
ligamenti & nerui, in musculis con
stituendis permixtio. 220.14. eius
delineatio 218.38
ligamenti in musculorum fabrica ne
cessitas 219.50
ligamenti substantia 215.16
ligamēta alia unum duntaxat usum
præstant, alia plures: & quare qua
lem 217.1
ligamēta, caput humeri scapulæ cer
uici annectentia. 268.22. eorū de
scriptio. 271.17. administratio 271.3
ligamenta dorsi uertebrae. quare
Dorsi uert.
ligamenta ἐγκλωσία, id est transuersa
seu anularia 215.65
* ligamenta femoris ossis. quare Fe
moris ossa
ligamenta fibulae ad ossa tibiae. quare
Fibul.
ligamenta genu articuli. quare Ge
nu art.
ligamēta in externa cubiti sede. quare
Cubit.
ligamenta laryngis 260.31
ligamenta Manus. quare, Manus li
gament.
* ligamenta musculorum manus con
stitutionem subeuntia. 221.21 (24
ligamēta nerui nomine uocitata. 315.
ligamenta νδρωχονδρωδής συνδισμα
dicta, quare 301.10
ligamenta, ossa colligantia. 215.12.
tendines in suis sinibus continen
tia. ibid. 31. ossium sinus succingen
tia. 216.17. ossium acetabula, au
gentia. ibid. 24. propugnaculi
uicem præstata. ibid. 29. quare in
terstitij instar sunt. ibid. 43. mu
sculi constitutionem ingredientia.
ibid. 52
ligamēta pedis transuersa. quare Pe
dis ligamenta.
ligamentorum, ab usu sumptæ diffe
rentia quinque. 215.12. prima. ibid.
secunda. ibid. 31. tertia. 216.29.
quarta. ibid. 43. quinta. ibid. 52
ligamentorum capitis ad ceruicis uer
tebra primam & secundā descri
ptio.

ptio. 230. 6. administratio. *ibid.* 35.
delineatio 279. 47
ligamentorum cuiq; parti corporis
peculiarium traditionem, sub ipsi-
us partis elemento reperies: uelut
Thoracis, Capitis, &c.
ligamentorum differentie alie, ut ab
ortu. 217. 29. à partibus necen-
dis. *ibid.* 32. à partibus quibus
committuntur. *ibid.* 33. à substan-
tia. 16. 41. à situ. *ibid.* 52. à for-
ma. *ibid.* 54
ligamentorum maxillam inferiorem
superiori necentium administra-
tio 250. 33
* ligamentorum os sacrum cæteris
annectentium administratio. 243
29
* ligamentorum, os sacrum ilium of-
bus colligantiū, descriptio. 252. 17.
administratio 256. 19
ligamentorum substantiam ingredi-
ens cartilago 4. 35
ligamentorum thoracis descriptio
294 45
ligamentorum transuerforum, ad di-
gitos flectentium musculorum ten-
dines usus 308. 1
ligamentorū uiscidus humor, & quid
præstet 16
ligamentorum usus. 16. 31. inde
ligamentis cōmune, obtuse sentire
218 14
ligamentis transuersis adscribendæ
membranae 216. 5
Ligures, ἐπὶ τῶν πλεῖστον ueteribus dicti.
90 6
limborum uaria fuitio 16. 5
lingua cur musculis indigeat. 253. 37
lingua, quid rarum in musculis habe-
at 254. 1
linguæ gustatorium organum cuius
sit beneficio 254. 15
linguæ fibrarum delineatio 253. 32
linguæ fibrarum officia 255. 11
linguæ iusta magnitudo 253. 34
linguæ ligamentum. 254. 10. ossis ui-
cem præstans 255. 17
linguæ motus, in de Partiu usu quali-
ter tractetur à Galeno 253. ult.
linguæ musculorū cognitio cur diffi-
cilis 253. 45
linguæ musculorum examen. 604. 8
linguæ musculorum nouem admini-
stratio, ordine 255. 26
linguæ musculorum nouem, euiden-
tium, descriptio ordine 254. 28
linguæ nouē musculorū natura ac si-
tus delineatus 253
linguæ musculorum sectio apud Ga-
lenum interiit 253. 51
linguæ os 167. 27
linguæ portio ante sectionem cōspi-
cua quibus constet partibus. 254. 8.
& 255 3
linguæ reliqui corporis administra-
tio 255. 42
linguam faucibus alligans ligamen-
tum quale 255. 53

linguam mouentium musculorum
delineatio 252. 40
lingula, uocis organum 154. 52
λίθον ὀστέα ossa 33. 33. & 166. 48
λόβοι iecoris 506. 40
lobi pulmonis quot 581. 46
loculi, extimū foetus inuolucrum.
541 56
longaon intestinum 501. 15
Louanium obsidione à C H R I-
STOPHORO PFLVEGEL li-
beratum 19. 47
luhach quid Arabes dicant 4. 26
lumbare os 167. 39. & 168. 20
lumborum uertebrae, 167. 38. eorūq;
motus 295. 33
lumborum uertebrae quomodo fora-
minibus à ceruicis uertebis uariēt
70 40
lumborum uertebrae delineatio.
77. uide, Vertebrae lumborum.
lumbos mouentium musculorū tra-
ditio tota. quære, Dorsi mouen-
tium paria quatuor postrema. siue
5. 6. & septimum.
Luteriæ itineris à porta D. Jacobi ad
eam quæ Martini dicitur, uaria
nomina 498. 18
luxationes appendicū in pueris fre-
quentiores quàm articulorū. 27. 24
M



Alarum cutis musculo
caret 243. 40
mallei forma, secanti a-
pta. 237. 9. eiusdem
delineatio 235
mallei in auditus organo delineatio.
33. & 34. 24
malleolus interior 8. 32
malleoli exterioris & interioris figu-
ra & descriptio. 136. & 137. 57. &
138. 6. inde. & 139. 50. & 140. 17.
malleolo non dissimile ossiculū. 35. 14
malleolū ab Anatomicis perperam
pro talo usurpari. 140. 17. & 168. 44
malleoli 168. 41
malum granatum, pectoris ossis car-
tilago. 93. 19. & 167. 48. item testicu-
lorum 168. 29
mamillaris capitis processus. 22. 25. &
23. 30. & 31. 27. & 36. 44. & 167. 1
mamillæ an ex deuorato à muliere pi-
lo uexari τριχιδεσθαι possint. 544. 20
mamillæ cur homini elatius, cæteris
animalibus demissius positæ. 545.
46
mamillarum cum genitalibus affini-
tas 546. 25. cum utero. ead. 46
mamillarum examen 557. 10
mamillarum formæ ratio 546. 16
mamillarum glandulosæ substantiæ
temperies 546. 29
mamillarum munus & officium, ip-
sarūq; cōstructionis ratio. 545. 10
mamillarum natura oculis subiecta
378. & 379 inde
mamillarum nerui unde ducantur.
545. 4
mamillarum situs, forma, substantia.

etc. 543. 33 inde. & 544. 6
mamillarum situs ratio 545. 33
mamillas petentium uenarum series
544. 31. inde & 546. 39
mandibula 167. 14
mansorium musculus à iugali osse
initium ducere 33. 32
manus quid Hippocrati 116. 5. &
220. 4
manus summa extrema ue que. 116. 2
manus colliculorum siue montium
apud chiromantas, fabrica 303. 44
manus cutis interna, cur debilis. 303.
14
manus delineatio 115
* manus digitorū ac pedis ratio mo-
tus prope par 248. 57
manus digitorum motus 304. 41
manus digitos flectentiū tendinum
ligamenta transuersa, eorūq; usus.
308 i
* manus digitos flectentium muscu-
lorum administratio 223. 13. primi,
secundi, tertij. *ibid.* octo sequen-
tium. 224. 45. quinq; sequentium.
ibid. decimiseptimi, octauū, no-
ni. 224. 9. reliquorum ad uigesi-
mum tertium. *ibid.* 26. sex ultimo-
rum 224. 38
manus digitos mouentium muscu-
lorum delineatio. primi. 187. 18. se-
cundi. 189. 4. tertij. *ibid.* 13. octo,
quatuor digitorum primos articu-
los flectentium. 193. 25. maioris
primum pollicis os flectentiū. 183.
24. minoris. 189. 17. decimiseptimi
omnium. 195. 47. decimioctauū.
ibid. 50. deciminoni. 198. 53. ui-
gesimi. 172. 51. primi. 198. 53. secun-
di & tertij. 198. 47. pollicem maxi-
me abducentis. 172. 49. adducentis
220. 6. quatuor musculorū digitos
quatuor pollicis adducentiū. 199. 11
manus digitos mouentium muscu-
lorum descriptio. 304. 38. numerus
305. primus 305. 4. functio. 36. se-
cundus. *ibid.* 40. tertius 305. 25. fun-
ctio amborū 307. 1. & 308. 10 octo
sequētes, primis quatuor digitorū
ossibus præfecti. 308. 15. duo se-
quentes, pollicis ossi primo præfe-
cti. 308. 31. qui secundo, tres rursus
aliij. 4. *ibid.* 47. functioq; 309. 11. de-
cimus septimus. 309. 52. decimuso-
ctauus & decimus nonus. *ibidem.*
26. functio omnium. 311. 1. & 23.
uigessimus. *ibid.* 25. uigessimus pri-
mus, secundus. 311. 33. functio utri-
usq; 312. 19. uigessimus tertius. 311.
42. Sex reliqui, quorum duo pol-
lici. 312. 31. reliqui quatuor, digitis
præfecti. ead. 52
* manus digitos mouentium muscu-
lorum insertiones simul collectæ.
231 25
manus digitorum lateribus addita
substantia carnea cur 304. 23
manus digitorum ossa cuiusmodi, et
quot singulorum. 121. 47. eorundem
tendines,

- tendines, etc. 123. 14. inde. uide, Digitorum ossa.
- manus digitorū regioni internæ superstrata substantia carnea. 303. 44.
- manus extremæ ossa quot. 149. 19
- * manus ligamentorum administratio. 224. 45. & 223. 56
- * manus ligamentorum descriptio. 220. 1. quæ tendines continent annulorum modo. ead. 12. quæ ossa connectunt. ead. 49. quæ musculorum constitutionem subeunt. 221. 21
- manus ossicula sesamina cuiusmodi. 126. 1
- manus pecten, & pectus. 168. 16
- manus summæ cutem internā qualem parari decuit. 302. 54
- manui summæ adnata caro, quid præstet. 304. 30
- manus uolæ mediæ nervosa tenuitate sua subnati musculi descriptio. 302. 26. administratio. *. 222. 32
- manum petentes nervi. quære Nervi.
- per Manum tendentium uenarum ac arteriarum examen. 656. 26.
- * in Manu extrema musculi quot. 221. 39.
- MARCI ANTONII CONTRARIUS laus. 651. 1
- MARCVS ANTONIVS GENVA philosophiæ professor Patavij. 35. 54
- Marini Anatomicorum librorum iactura. 580. 2
- Marini lapsus de patellæ cartilagine. 142. 5
- masseteris musculi examen. 603. 42
- masseterem à iugali osse principium ducere. 33. 32
- μασσητης dicti musculi. 246. 26
- μασσωδης processus. 31. 36. & 167. 1
- MATTHAEVS TERMINVS medicus. 159. 24
- de Matricis cellulis stulta quorundā persuasio. 531. 10
- * matricis dicta uena. 293. 30
- maxilla inferior cur durior facta. 43. 52. cur unico ferè osse in homine. 44. 1
- maxilla inferior homini breuissima. 43. 48
- maxilla inferior sola mouetur in homine. 246. 14
- maxilla inferior ualidior superiore, & scabiei Gallicæ minus obnoxia. 39. 15
- maxillæ inferioris ceruix. 10. 15
- maxillæ inferioris duo utrinque processus. 44. 20. cartilago peculiaris. ead. 26. foramina. 32.
- maxillæ inferioris figura. 5. & 43
- maxillæ infer. in posteriori sede amplitudo, tenuitas, sinus, asperitates. 44. 45. inde
- maxillæ inferioris motus tres. 246. 22
- maxillæ inferioris musculi. 604. 10
- maxillam inferiorem mouentiū musculorum delineatio. lateris alteri us primi. 182. 8. secundi. 182. 6. tertij. 188. 8. quarti, qui deorsum maxillam trahit. 185. 10
- maxillam inferiorem mouentiū musculorum descriptio. 246. 14. administratio. 249. 48
- maxilla superior quid. 39. 23
- maxilla superior cur pluribus ossibus, ijsq; cauis ac leuibus constet. 39. 1. inde.
- maxillæ superioris ossa. 22. 1. 5. & 23. 18
- maxillæ superioris ossa priuatis nominibus carere. 167. 12
- maxillæ superioris ossium expressio. 36. 31. & 38. 12
- maxillæ superioris ossium structuræ ratio. 39. 15. & eorundem enumeratio. ead. 25. inde. & 42. 7
- maxillæ superioris tractatio perperam à Galeno instituta. 42. 14. inde
- maxillæ musculorū nomina. 246. 25
- maxillam deorsum trahētis musculi administratio. 250. 24
- maxillam deorsum trahentes musculi quid peculiare obtineant. 249. 12
- maxillam mouentium musculorum historia, quære, Muscul.
- maxillas connectentia ligamenta. 250. 33
- maxillares dentes. 167. 21
- meatus foetus urinam educens. 518. 36
- meatum urinam renibus in uescinam deducentium historia. 518. 43. eorundem artificiosa insertio. 510. 10
- * mediana dicta uena. 287. 15
- medianum pro mesenterio. 504. 6
- mediastinum uulgo quid. 572. 14
- medico de animæ quoq; facultatibus ac sede considerandum. 594. 45
- medicorum de cordis ceruini osse impostura. 94. 23
- medicorum in Anatome oscitantia & ignorantia. 81. 1. 36
- * medicorum in distinguenda sectione uenarum pedis, imperitia. 293. 24
- * medicorum in uenarum scientia ignoratio. 288. 2
- medulla cur in singulis uertebis impar. 58. 47
- medulla dors. quære Dors. medul.
- medulla proprium ossium nutrimentum. 3. 1
- medulla qua ossiū parte reponatur. 3. 3
- medullæ dorsalis eadē cum cerebro natura. 58. 17. 55
- medullæ dorsalis initium quod. 322. 22
- medullam continentium sinuum appendices non esse opercula. 7. 40
- * μεγαν dicta uena. 276. 53
- membrana carnea quæ. 232. 45. cur sic dicta. ibid. 54. & 386. 4. & 521. 36.
- membranae carnosæ administratio. 234. 1. delineatio. 231. 30
- membrana cerebri tenuis *μενινγες* dicta. 628. 6
- membranae cerebri tenuis delineatio quibus locis petenda. 627. 42
- membranae tenuis in cerebro descriptio. 627. 38. numerus. ibidem 45. situs. ead. 51. superficies exterior. 628. 2. fabricæ totius ratio & usus. ibidem. 4
- mēbrana dura cerebri cur sic dicta. 624. 34
- membranae duræ basis, et eorum quæ ad sunt illi examen. 654. 40
- membranae duræ cerebri administratio. 651. 30. tenuis. ibid. 46
- membranae duræ cerebri delineatio quibus locis petenda. 624. 16
- membranae duræ cerebri descriptio. 624. 14. situs, numerus, magnitudo, forma. ibid. 34. superficies interior. 626. 10. usus & constructio nis totius ratio. 626. 53. nexus ad caluariam. 625. 12. ad tenuem membranam. 626. 27. processus. 626. 40. uasa. ibid. 37. foramina. 626. 40
- membranae duræ cerebri sinuū administratio. 653. 21
- membranae caluariam foris succingentis creatio & usus. 627. 12
- * membrana, musculis in cubiti longitudine, obnata. 220. 42. obseruanda quomodo. 222. 31
- * membrana, musculis cubitum occupantibus obducta. 220. 42. obseruanda quomodo. 222. 32
- membrana ossibus obducta. 3. 23. 30
- membrana *μενινγες* dicta. 294. 56
- membrana pubis ossium. quære, Pubis ossa.
- * mēbrana pubis ossis Foramen occupans. 252. 28. administratio eius. 256. 19
- * membranae pubis os comprehendit Anatome. 243. 25
- membranæ cerebri. quære, Cerebri membranæ.
- membranae intersepiētes quo pacto inuicem dissent. 572. 25
- membranarum intersepiētium nomēclatura, numerus, situs, forma, etc. 572. 13. inde
- membranarum intersepiētium substantiam subeuntia quæ. 573. 6
- membranarum intersepiētium superficies & connexus. 573. 20. ortus. 27. usus. eod.
- membranae orificiorum cordis unde cūm. 591. 33. uide, Cordis, etc.
- membranae, transuersis ligamentis adscriptæ. 216. 5
- membranarum thoracis amplitudinem intersepiētium examen. 599. 57
- membranularum cauæ uenæ orificio præfectarum usus. 597. 23. item arterialis uenæ. ead. 37
- membranularum uenalis arteriæ & magnæ arteriæ usus. 598. 52
- membrum. 7. 14
- memoriæ os. 166. 45
- mendosa

I N D E X.

mendosa ossa 166.54
mendosa futurae 166.36
menstrui sanguinis ad lactis genera-
tionem in gerentibus uterū ratio.
547.1 inde
menstrui sanguinis temperamētum
acratio 384.13. inde
menstruæ purgationes unde fluant
mulieribus 538.8
de Menstruis purgationibus proble-
mata quorundam 546.2
μηροῦ 168.28
meri quid 388.9
μεσεντερειον, & μεσεντερειον 504.5
mesenterium quas uenas aut arteri-
as admittat. 504.34.46
mesenteria quomodo Galeno nume-
rentur tria 504.19
mesenterij centri delineatio. 365. &
366 51
mesenterij delineatio 363. & 364
mesenterij & omenti eximendi ratio
in Anatome 553.49
mesenterij grandior arteria. 358. &
359 44
mesenterij mēbranae & adeps. 505.1
mesenterij muliebris delineatio. 377
mesenterij natura qui per sectionem
indaganda 552.43
mesenterij nomenclatura 504.5
mesenterij situs. 504.11. substantia.
ead.14. forma & ortus 18
mesenterij substantiæ ratio & usus.
504 33
μεταληπτικόν 120.2. & 168.16
metaphrenum 56.50
μεταφρενὺς uertebrae 167.37
μεταστροφος 168.54
μετάπρως 166.42
Michaelis Scoti indoctus. de physio-
gnomia scriptum 531.13
mola 168.31
molaris dentis utraque facies. 33. &
34 25
molari denti simile officulum 35.13
molares dentes qui 46.4. & 167.21
molarum exasperadarum ratio. 46.8
Mondini de uteri formatione error.
531 20
monilis à quodam Hispano deuora-
ti historia 390.48
monoculum foramen 53.12
IOAN. BAPTISTA MONTA-
NVS medicus 307.31
mordentes dentes 167.20
morsus Adamios 167.27
morsus dulcis 359.55
motus animalis maxime proprius.
11 40
motus circumuersionis 13.27
motus seruato sensu perit, & contra.
348 34
motus arbitrarij sensusq; principij
cerebrum 599.13
motus articulorum non eadem ratio
13 3
motus euidentes. 13.4. obscuri 9
* motus naturales alij fibris, alij sine
illis perficiuntur 257.40

mucronata pectoris cartilago, eius-
que usus. 93.3.17. & 167.46. & 357.
6 & 356
muliebris Anatomes ratio ac series
557 9
muliebris corporis trunci delineatio.
877 & 378
muliebris pudendi prominulae ca-
runculae. 536.54. earumq; præcisio
cuiusmodi eadem
muliebris pudendi carunculae non in
omnibus æquales 532.1
muliebris uterus acetabulorum ex-
pers 540.9
mulieres etiam semen habere perin-
de ut uiros, idq; cuiusmodi. 537.52.
& 540 41
mulieres genibus innixas felicius
parere 131.56
mulieres præpingues cur ad concipi-
endum minus aptæ. 495.5.16. &
530 16
mulierum à Vesalio hætenus secta-
rum catalogus. 538.52. & 540.15
mulierum pinguedine, seminalium
uasorum seriem latere. 376.56
mulierum pubis ossa quid à uiro-
rum ossibus differant 131.42
mulierum testes cuiusmodi. 535.23.
eorundem inuolucra 38
mulierum uasa seminaria cuiusmo-
di 535.47
mulierum uesica quatenus à uiro-
rum diuersa 519.24
mulieribus parturiētibus non reclu-
di pubis ossa 131.50
musculus quid sit, secundum alios
219.44. quid reuera sit 222.36
musculus μελεωδης dictus. 264.45
musculus μετωπῖς 264.46
* musculus in manu latefcentem ten-
dinem educētis administratio. 222.
32. descriptio eius 302.27
musculus natura inter ligamentum
& neruum medius 220.8
musculus neruosa exilitate, uolæ me-
diae & digitorum cuti interne sub-
natus. 302. descriptio eius. ead. 27.
administratio * 222.32
musculus, qui scapulam antrorsum
agit, controuersus. 263.49
* musculus totius corporis mole ma-
ximus 239.44
musculus uesicæ ceruicis. quare,
Vesicæ ceruic. 220.21. delinea-
tio. 218.39. finis, seu tendo. 220.21.
delineatio. 218.44. uenter. 220.21.
delineatio 218.41
musculi caput, tendine non semper
tenuius 221.53
musculi uenter, designatus 218.40
musculi uenter, ubi reponendus pro-
prius 227. ult.
musculi femoris motorum quarti or-
tus 84.16
musculi frontis cutem mouentis de-
scriptio. 237.19. administratio. ibi
dem 43

musculi in ore delitescētis admini-
stratio. 250.15. eiusdem descriptio.
248 31
musculi masseteris administratio.
250.5. descriptio eiusdem 246.42
musculi maxillam deorsum trahen-
tis, ac tribus illis superadditi, quar-
tiq; descriptio 249.6
musculi membrana 220.37
musculi neruosa exilitate sua mediae
uolæ & internæ digitorum cuti sub-
nati delineatio 172.27
musculi nomen unde. 224.42. etc.
musculi structuræ depicta ratio. 218.
musculi substantia præcipua, caro.
222 39
musculi temporalis descriptio. 247.
43. eiusdem administratio. 249.48
musculi temporalis robur maximū,
ex historia 248.22.
musculo temporali quot neruorum
propagines offerantur 327.15
musculū nullum os mouere nisi eidē
inserat, Anatomicorū ἀξίωμα. 307.6
musculi articulorum motores pri-
mi, superficiei proximi 226.34
musculi, carnis appellatione dicti A-
ristoteli 232.23.30
musculi λεπυρσῆρες dicti. 235. ultimo.
nullum sortiuntur musculum con-
trarium 288.1
musculi etiam uinculorum loco. 16.39
musculi duo laryngis operculi. 260.
16.
musculi humerales sex. 106.39. inde
musculi in ore delitescētes, dicti qui.
246 40
musculi intercostales. quare, Inter-
costales musculi.
musculi intestini recti. quare, Inte-
stini recti.
musculi μεσσητῆρες qui. 246.33. tem-
porales. ibidem. 37
musculi non æquas portiones nerui
ac ligamenti recipiunt, & quomo-
do 220.39
musculi non omnes ab ossibus oriū-
tur, contra quā Galenus. 223.24
musculi, oppositis musculis destitu-
ti 260.28
musculi os aperientes, qui 246.41
musculi penis. quare, Penis musc.
musculi recti intestini cuiusmodi.
501 54
musculi, tendinum nomine dicti ab
Hippocrate 267.41
musculi tendinibus destituti. 222.49
musculi ueteribus carnis nomine ap-
pellati 16.41
musculi qualiter munus obeant su-
um 222.19
musculorum administrationis ordo
duplex 264.1
musculorum brachiū, scapulam, tho-
racem, caput, dorsumq; mouentiū
examen 603.36. inde
musculorum capita, non minus quā
tendines sentiunt. 222.5. & laesa
conuulsioni obnoxia sunt ibid.
muscu-

- musculorū carni adipem intexi, con-
 trā quā alij affirmarunt 222. 42
 musculorum differentiā quatuor de-
 cim. 223. à substantiā. ead. 5. ab
 ortu. ead. 24. ab insertione. 56. à
 parte quā mouetur. 224. 19. à for-
 ma. ead. 28. à foraminibus. 225. 49.
 à magnitudine. 226. 4. à colore. i-
 bidem. 12. à situ. ibidem. 32. à fi-
 brarum genere. ibid. 42. earumq;
 compactione. 227. 17. à musculo-
 rum capitibus. ibid. 34. à uentri-
 bus. ibidē. 54. à tendinibus. 228.
 23. à mutuā musculorum in offi-
 cio oppositione. 229. 18. à munere.
 ibidem 26
 musculorum fabricæ expositio toti-
 us. 219. 47. eiusdem delineatio.
 218 28
 musculorum fabricæ quid præstet li-
 gamentum. 219. 50. quid neruus.
 ibid.
 musculorum impressiones. 4
 μυρρηνα 228. 19
 musculorum laryngis historia. quæ-
 re, Laryngis musc.
 musculorum linguæ, historia tota.
 quære, Linguae musc.
 musculorum numerus cōtrouersus.
 229. 36. unde petendus. ut à fibris.
 229. 41. ab impressionibus. 230. 15.
 à capitibus. ibid. 20. à tendinibus.
 ibid. 44. à mutuo connexu. 231.
 6. à concursu. ibid. 11
 musculorum omnium usus commu-
 nis 283. 10
 musculorum ortus omnium iuxta
 Galenum. ab osse 223. 24
 musculorum ossis v referentis descri-
 ptio 250. 50
 musculorum ossis v par quartū, sca-
 pulæ motibus non subseruit, con-
 tra Galenum 251. 39
 musculorum ossis v referentis par
 quartum quid peculiare sibi uen-
 dicet 251. 30
 musculorum ossis v propriorum, pa-
 ria quatuor. 251. 3. & deinceps. nō
 propriorum assignatio. ibid. 56. ad
 ministratio unde petenda 252. 37
 musculorum ossis v propriorum iux-
 ta quatuor paria administratio.
 252. 12. eorundem functio. 250. 57
 musculorum ossa mouentium non
 pauci tendinibus carent, contrā
 quā Galenus 228. 27
 musculorum pars neruea, carnea, li-
 uida, quæ 226. 29
 musculorum quamque corporis par-
 tem mouentium historiam, sub cu-
 iusq; partium earum elemento ini-
 tiali reperies, uelut eorum qui fron-
 tis cutem, qui palpebras, oculos,
 buccas, labra, nasi alas, maxillā in-
 feriorē, linguā, larynga, brachiū,
 scapulā, caput, abdomen, testes ui-
 riles, tum muliebrem uterum, tho-
 racem, dorsum, manus, pedes, etc.
 musculorum quorundam & uaso-
 rum administratio 599. 32
 musculorum tendines qualiter diffe-
 rant 228. 44
 musculorum totius corporis maxi-
 mus 131. 35
 musculorum trium, masseteris, tem-
 poralis, ac in ore delitescents mu-
 nus 248. 50
 musculis cur addita caro 220. 26
 musculis cur addita uenæ & arteriæ.
 220 35
 musculis nerui non omnibus in ca-
 pitis exortu inseruntur, & quomo-
 do 221. 30
 musculis non omnibus neruus mi-
 scetur, & quibus 221. 4. & 223. 11
 musculis omnibus unum tantum fi-
 brarum genus tribuens Galenus
 227 7
 musculis, quādo tendines annectan-
 tur 222. 47
 musculis quid nerui uere præstent.
 222 16
 musculis uenas ad extimam tantum
 superficiem adnasci 595. 47
 musculosa temporum lineamenta.
 250 39
 musicorum instrumentorum fabri-
 cæ ratio ex auditus organi compa-
 ge desumpta 35. 48
 musicorum artificum instrumenta
 ad naturæ imitationem fabrefacta.
 578. 11. 24
 mustacem uocare Latinos labri por-
 tionem quandam 244. 32
 mustelarum penis osseus 527. 50
 musti feruentis ad iecoris sanguifica-
 tionem comparatio 508. 18
 μυρμηκας, & μυρμη 168. 31
 μυρμηκας dentes 167. 21
- N
- ariū foramina. 39. 7.
 & 54 7
 narium septū. 37. 10. 25
 narium situs 19. 8
 nasi alæ. 151. 27. earundē
 cartilagines 3. 49
 nasi alas mouentium musculorū de-
 lineatio. primi, secundī. 179. 13. &
 182. 16. tertij & quartī 182. 15
 nasi cartilaginū descriptio. 151. 11.
 inde.
 nasi cartilaginū structura uel soli-
 us Gallici morbi nomīne non osci-
 tanter expendenda 151. 29
 nasi musculorum alas mouentiū de-
 scriptio. 244. 27. administratio.
 245 47
 natis 168. 29
 natium cerebri descriptio 638. 19
 naturæ in neruis digerendis scopus.
 317 17
 nauiculare, siue nauiforme os. 168.
 49. uide, Cymbam referens os.
 nerualia ossa 166. 39
 nerualis futura 166. 31
 neruus instrumentum sensus. 18. 24
 neruus non cēsetur, dorsalis medul-
 læ terminus, ex osse sacro prodies.
 339. 44 & 390. 18
 neruus nullus cordi commissus præ-
 ter unum 315. 50
 neruus omnis sensu tactus præditus
 317 44
 neruus omniū corporis crassissimus
 quo sinu feratur 131. 16
 * neruus pulsatilis apud Arabes qis.
 259 50
 neruus quibus cōstet partibus. 316. 20
 neruus quinti neruorum cerebri pa-
 ris, etc. 34. 13. 47 inde
 neruulus iuxta quinti paris neruo-
 rum cerebri radicē, hactenus igno-
 ratus. 50. 6
 nerui appellatio. 16. 34. quā late pa-
 teat. 315. 24. quibus organis pro-
 prie competat ead. 29
 nerui cum ligamēto in musculorum
 fabrica permixtio. 220. 14. eius de-
 lineatio 218. 38
 nerui, in musculis constituendis ne-
 cessitas 219. 50
 nerui coli, & recti intestini 501. 50
 nerui coniugatim enascuntur. 318. 11
 nerui cutem subeuntes non eandem
 semper proponunt seriem. 345. 10
 nerui idem cerebro præstāt quod ar-
 teria magna cordi, & uena epati.
 622 32
 nerui in papillas distributi 344. 1
 nerui intestinorum graciliū. 499. 49
 nerui nō omnibus musculis miscen-
 tur, & quibus 221. 4. & 223. 11
 nerui omenti 497. 18
 nerui quid musculis ue- præstent.
 222 16
 nerui, uasorum nomine appellati.
 317 53. (31.
 nerui uentriculi, eorūq; usus. 493. 12.
 nerui uisori perforati. 324. 34. & nō
 perforati ead. 36
 neruorum per abdominis musculos
 repentium administratio 549. 35
 neruorum alios sensui, alios motui
 falso præfici 348. 34
 neruorum Anatomæ ratio 552. 7
 neruorum brachium adeuntium ori-
 go diligenter consideranda cur.
 344 46
 nerui in brachiū à quibus partibus
 ducantur. 344. 43. eorundem im-
 plexus descriptus. ead. 50. ac deli-
 neatus ead. 16
 neruorum in brachium ac manū ex-
 tremam distributorum expositio.
 344. 43. primi. 345. 1. delineatio.
 336. 5. secundī. 344. 15. delineatio.
 336. 8. tertij. 346. 19. & 347. 17. deli-
 neatio. 336. 11. quartī. 346. 28. deli-
 neatio. 336. 33. quintī. 347. 17. deli-
 neatio. 336. 52. sextī. 348. 50. deli-
 neatio 337. 3
 neruorum cerebri initium unde sit.
 322 21
 neruorum cerebri iuxta septem pa-
 ria examen 654. 8
 neruorum cerebri paris primi descri-
 ptio tota. 324. ortus. ead. 1. coalitus.
 13. ingressus

I N D E X.

13. ingressus in oculos. eadem. 26.
in tunicam reti comparatam dila-
tatio. eadē. 24. ductus delineatus.
325.1. an sit perforatum, quæstio.
324 34
neruorum cerebri paris secundi de-
scriptio. 325.22. quod oculorū mu-
sculis distribuitur ead. 29
neruorum cerebri paris tertij descri-
ptio. 325.36. radix duplex. ead. 37.
tenuioris ortus ac distributio. ead.
42. crassioris itidem 326.5
neruorum paris quarti descriptio.
326 33
neruorum cerebri paris quinti descri-
ptio. 326. 45. eiusdem meatus. 52.
46. & 53.10. item ad auditus orga-
num series 34.47
neruorum cerebri paris sexti descri-
ptio. 327.29. in thoracis amplitu-
dinem distributio. 329.29. in nu-
tritionis organa series. eadem. 47.
recurrentium dexter. 318.42. li-
nister. eadem. 53. cursint facti.
329.13. amborum delineatio. 318.
35 & 39
neruorum cerebri paris septimi de-
scriptio 330.34
neruorum ē cerebro prodeuntium
par cæteris Anatomicis ignotum.
322.34. & 337.11
neruorum cerebri paria quot. 322.27
neruorum ē cerebro prodeuntium
ortus delineatus. 318. eorun-
dem depicta uniuersa series. 319.
par primum. 320.18. secundum.
eadem. 23. tertium. eadem.
24. quartum. 40. quin-
tum. 41. sextum. eadem. 49.
septimum 321.42
neruorum decussatim facta distribu-
tio fictitia 325.7
neruorum differentia. 316.42.
à mollitie & duritie. ibidem. 45.
& eiusdem differentia ratio. 317.
5. ab originis forma. ibidem.
346. ab ipsorum cavitare. 317.51
à serie. ibidem 54
neruorum à dorsali medulla pro-
deuntium omnium delineatio.
332 & 333
neruorum ē dorsali medulla prode-
untium numerus. 339.37. non
idem in omnibus animalibus. ea-
dem 47
neruorum femur, tibiam & pedem
adeuntium distributio exposita.
350. primi. eadem. 34. se-
cundi. eadem 46. tertij. 351.6.
quarti. eadem. 15. Singulo-
rum delineatio. 337. primi. ea-
dem 27. secundi. ead. 30. ter-
tij. eadem. 39. quarti. eadem. 44
neruorum in intestinis ratio. 503.
41.
neruorū ē lumborum uertebri pro-
deuntium descriptio. 349.12. sunt
autem quinque paria. Delinea-
tio 337.7

neruorum per manum distributio,
quo pacto citra sectionem depre-
hendatur 348.21
neruorum qui in extremam manum
distribuantur expositio. 348.13
neruorum ortus à cerebro. 315.39.
non ē dura eius membrana. 316.18.
nec à corde 315.49
neruorum ortus uarie à priscis con-
stitutus 315.39
neruorum sacri ossis foramina. 84.
21.
neruorum ex osse sacro profluentium
descriptio. 349.37. deline-
tio 337.17
neruorum paria recēfendi mos qua-
lis ueteribus 82.27
neruorum principium cor esse, un-
de iudicari Aristoteles 591.56
neruorū propagines temporali mu-
sculo quot offerantur 327.15
neruorum recurrentium examen.
601 17
neruorum recurrentium sciētia, Ga-
leni inuentum 329.19
de Neruorum sectione liber Gale-
ni, uix totius fragmentum est.
325 46
neruorum septum transversum in-
gradientium descriptio. 341.35 de-
lineatio 334.57
neruorum septi transversi examen.
600 24
neruorum in uertebri foraminum
ratio 70.29. inde
neruorum ē uertebri ceruicis prode-
untium paria septem. eorumq; de-
scriptio. 340.1. par primum. ibi-
dem. secundum. eadem. 30.
tertium. quartum. quintum. 341.2.
sextum. septimum 342.16
neruorum ē uertebri ceruicis pro-
deuntium delineatio. 334. par
primum. eadem. 20. secundum.
eadem. 25. tertium. eadem. 30.
quartum. eadem. 40. quin-
tum. eadem. 54. sextum. 335
12. septimum ead. 29
neruorum ē thoracis uertebri pro-
deuntium descriptio, iuxta paria
duodecim. 342. par primum,
omnium octauum. 45. eius deli-
neatio. 335.35. secundum quod
omnium est nonum par. 343.15.
eius delineatio. 335.41. terti-
um. quartum. ac cætera paria us-
que ad thoracis duodecimum. uni-
versorum autem uigesimalum par.
343.21. delineatio eorundem. 335.
46.
neruorum tria paria in osse sacro &
coccyge 82.25
neruorum uesicæ ratio 518.30
de Neruorum uisiorum decussa-
tione historiae authoris. 324.46
in Neruis digerendis scopus natu-
ræ triplex. 317.17. sensus. ibidem.
21. motus. 27. tristantium digno-
tio 25

neruis emittendis parata foramina.
58.47 inde
neruis unde spiritus animalis prebe-
atur 316.32
neruos in musculorum initia potius
quàm fines inferi, Anatomicā a-
xioma 341.44
vñs quid 499.3
νευροχονδρωδης dicta σπινθηρμα. 217.
46. & 301.10
νευρομύητρος musculi. 29.14
νευρος unde 315.35
Nicolai & Gentilis de uteri forma-
tione error 531.20
nodus 9.49
νόςτος 56.41. & 167.31
νώτς uertebrae 167.37
nouacularum ad sectionem descri-
ptio. 236.7. delineatio. 235.46
nutrimenti uehiculū cuiusmodi Hip-
pocrati dictum 508.30
nutritionis instrumenta, triplicia
384. 52
nutritionis necessitas 384.40
nutritioni ex cibo potuq; famulan-
tium partium enumeratio. 385.
5. inde
nutritioni subseruientiū instrumen-
torum necessitas 384.47
nutritiua uis quatenus in plantis &
hominibus differat 493.35
nutritionis organorum enumera-
tio 519.39
νύμφη quid 290.51. & 532.1. eiusq;
in mulieribus differentia. ead. &
536. 55



O
Βελία futura. 26.43. &
166. 30
occipitis siue occipiti
os. 21. 33. & 22.27. &
23.13. & 30.1. eiusdem
circumscriptio. ead. 40. &
166 45
occipitis os ubi crassissimum. 30.47.
& 53. 55
occipitis ossis capitula 31.11
occipiti ossis, quā primæ uertebrae
articulatur, descriptio 64.15
oculus genu 168.33
oculus scapulae 168.2
oculi angulum interiorem occupan-
tis carunculae usus 40.20
oculi humores. Cristallinus. 646.
25. delineatio. 646.54. Vitreus.
646.1. delineatio. 645.3. Aqueus.
649.21. delineatio. 644.6
oculi musculorum descriptio. 240.
12. administratio. 241.29. deline-
tio 239.30
oculi partium omnium breuis enu-
meratio. 649.42. earundem usus.
ibid. 54
oculi partium omnium delineatio
644. 7
oculi sedes quot efformetur ossibus
39. 37
oculi tunicarum expositio. αραχνοει-
Mm δλως

<i>ὄσος</i> . 645. 44. delineatio. 643. 46. quæ reti comparatur. 647. 15. delineatio. 643. 50. uueæ dictæ. 647. 15. delineatio. 643. 52. quæ cilijs seu palpebrarum pilis respondet. 648. 41. delineatio. 643. ult. duræ. 648. 52. delineatio. 644. 1. adhærentis, seu albæ. 649. 34. delineatio. 644. 6. cornea 649. 9	amenti descriptio. 357. 15. & 356	os sacrum. 56. 55. uide, Sacrum os.
oculorum colorem ex humorum spirituum ue copia non uariare 648. 31	amenti diuersa nomina 494. 39	os sacrum, amplum, latum, <i>πλατὺν</i> , idem 85. 30
oculorum fabrica tota exposita. 646. 12. eiusdem administratio. 655. 1. delineatio 643. & 644	amenti & mesenterij eximendi ratio in Anatome 553. 49	os sacrum cæteris annectentium ligamentorum administratio. 243. 29
oculorum gratia formatum caput 18. 1	amenti fabricam suis usibus respondere 497. 45	os sacrum quale in simijs & canibus. 81. 37. inde. & catulis ead. 43
oculorum musculi. quære, Musculi, &c.	amenti figura & quantitas. 495. 31. & 358. & descriptio. 359. 3. inde	* os sacrum ilium ossibus colligantium ligamentorum descriptio. 252. 17. administratio 256. 19
oculorum sedes à cuneiformi osse maxima parte constitui 29. 31	amenti glandosum corpus 497. 27	ossis sacri appellatio, unde 85. 33
oculorum situs 18. 5	amenti inferioris membranae sectio difficillima 510. 6	ossis sacri constitutio. 58. 34. & 59. 15
oculis, cur additus motus uoluntarius. 240. 12. eiusq; differentia. ibid.	amenti intestinis obducti situs. 356. 17	ossis sacri delineatio 79
oculos mouentes musculi, eorumq; numerus, descriptio tota. 240. 12. delineatio. 239. 29 administratio. 241. 26	amenti membrana inferior qua parte mesenterij uice 496. 26	ossis sacri in homine descriptio. 83. 28. inde
oculos mouentium musculorum delineatio 239. 31	amenti membranae descriptio. 357. & 358. 15 inde	ossis sacri neruorum foramina. 84. 21. spinæ. ead. 30. anterior, posteriorq; sedes. ead. 38. & 85. 16
oculos quî munierit natura 18. 15	amenti membranae superiori exportæ uenarum & artiarum propagines 357. 21. & 356. & 358	ossis sacri, sex interdum ossa 84. 52
<i>ὀσθὺς</i> , & <i>ὀσθονὶς</i> secundæ uertebrae tuber 66. 31	amenti ortus, ac dein nexus. 495. 45. cum colo. 496. 20	ossi sacro nexorum ossium in uiris & mulieribus differentia 131. 41
<i>ὀσθόφωρος</i> 388. 6	amenti præcipuus usus quis. 497. 36	ossa sacri ossis lateribus commissa in pueris tribus efformari ossibus 132. 34
<i>ὀστέλας</i> 111. 5. & 168. 13	amenti situs. 494. 47. eiusdem obseruatio 550. 33	ossium sacro ossi nexorum in uiris & mulieribus differentia 131. 41
<i>ὀσφύς</i> , <i>ὀσφύς</i> 168. 5	amenti substantia enumeratio. 495. 36	ossium sacri ossis lateribus commissorum usus 129. 4
olfactus organum 51. 9	amenti superior anterior' ue, & inferior seu posterior membrana. 495. 42	ossis u referentis figura. 55. 5. 11. situs & nomina. ead. 33
olfactus organum constituentes cerebri processus 323. 25	omentum implicantes uenæ. 496. 44	ossis u referentis musculorum descriptio. uide, Musculi.
olfactus organi descriptio 643. 14	omentum uentriculi anteriori sedi non obduci 494. 22	ossa ad disciplinam utilissima, quæ. 159. inde
de Olfactus organo sententiæ uariæ 322. 51	omêto quatenus comprimi uteri fun di os possit. 495. 9	ossa an sensu prædita 3. 21
olfactus organa. 30. 3. 14. eorundem sedes. 32. 35. cribri modo peruium os 28. 24.	<i>ὀμοπλάτη</i> 167. 53	ossa cumulatim in cimiterijs asseruari solita, ad sceleton inutilia. 159. 19
olfactus organorum sedes, non pariter amplæ in singulis caluarijs. 51. 6	<i>ὀμὸς</i> 99. 54. & 167. 53	ossa, cur circa connexum molliora 7. 32
olfactus organorum sinus pituitam cerebri non expurgant 641. 46	* <i>ὀνὸς</i> quid 261. 29	ossa digitorum. uide, Digitorum ossa.
olfactus sedes 19. 8	<i>ὀφρυοὶ</i> 11. 1	ossa dissoluta ad disciplinam aptiora, quàm compacta 159. 6
omêtum an deuolui ad scortum possit 495. 9. 20	<i>ὀφρύοντες</i> dentes 167. 24	ossa emundata, quomodo iungenda 159. 30
omentum cur plumæ nomine Brabantis appellatum 497. 48	oris apertio, organorumq; in faucibus positorum examen 603. 48	ossa inter se omnia contigua. 11. 55
omentum cui rete & reticulum appellatum 497. 10	<i>ὀφρύον</i> 167. 41	ossa iungentium commissurarum typus 12. 10
omentum quî diuellendum, ipsiusq; ortus inuestigandus, unâ cum uasis illo suffultis 551. 34	osamium & osanum os 167. 40	ossa lapidea 1. 34. & 33. 7. 33
omentum sacculo, aut minoribus piscatorum retibus simile. 359. 6. & 358	os, <i>ὀστέον</i> 166. 17	ossa non hominis solum, sed & brutorum omnis generis animantium, philosophiæ ac medicinæ studiosis obseruanda 162. 21
amenti adeps. 497. 19. eiusdem usus ead. 51	os quid, eiusq; natura, & usus. 1. 1. inde	ossa omnia, præter dentes, tecta. 3. 26
amenti ala superior, & humilior, quid 358. 15. 18	os amplum, latum, sacrum, idem Galeno 81. 48	ossa præruptæ rupi similia quæ, & cur ita dicta 33. 34
amenti arteriæ ac nerui 497. 12. 18	os in cerebro à Galeno traditum, quale 32. 41	ossa senum, iuuenum, & puerorum inuicem uariare 27. 12
	os de corde cerui Medicorû & Pharmacopolarum impostura excogitatum 94. 23	ossium capita pleraque sine appendice 9. 45
	os cordis. uide, Cordis os.	ossium coctionis tempus ex ætatum ratione obseruandum. 157. 35
	os coxæ, siue coxædicis. uide, Coxæ, & Coxendicis os.	ossium coctionis scopus 157. 39
	os coccyx. 56. 56. eiusdem delineatio 79	ossium commissuræ, earumq; cartilaginee 4. 3
	ossis coccygis descriptio 84. 43	ossium
	ossis cymbam referentis sinus 147. 28	
	ossis dentis dicti ligamentum. 280. 2. & 44	
	os ilium. uide, Ilium os.	
	os iugale. 22. 6. & 23. 20. & 33. 3. 13. & 38. 14	
	os pectoris. uide, Pectoris os.	
	os pubis. uide, Pubis os.	

I N D E X.

ossum connexus quibus constet.	
16	30
ossum differentia ab usu.	1.9. ma-
gnitudine.27. forma.29. & alijs	
2.	inde
ossum foramina	3.8
ossum in calce macerandorum, ac	
flumine emundandorum ratio.	155
23	
ossum in hominibus & quadrupedibus similitudo	145.35
ossum inspectio inutilis cuiusmodi	155.39
ossum inter se structura & cōtexus.	11.36
inde	
ossum nutrimentum proprium medulla	3.1
ossum omniū corporis humani numerus	162.28
ossum omnium nomina tam latina quam græca, &c.	166.
17	inde
ossum omniū soli dentes sensu præditi.45	25.36
ossum partes sedesq; uarijs uocibus indicari	7.2
ossum per coctionem parandi modus	155.50
ossum processus	8.17
ossum quibusdam sedibus perinde ac si undiq; circumscriberentur nomina imponi	33.10
* ossum sesamoidum manus, administratio	224.46
oslibus non solum gradibus appendices contingere	7.53. & 8.5
in Ossibus spectanda præcipue quæ.	155
37	
osliculum incudi comparatum.	34.
54. & malleolo	35.14
osliculum magis & occultæ philosophiæ sectatoribus obseruatū, quale.126	37
oslicula sesamina, quære; Sesamina offic.	
ὄστρον quid	521.39
ὄστρον uertebrae	167.38
ὄστρον, OS	166.17
ὄστρον meatus, qui & ὄστρον, & ὄστρον	
λοι ποροί	518.50
ὄστρον βαφον	10.24
ὄστρον φαλός	19.30

P



Alato infestus Gallicus morbus	530.7
palma	168.15. inde.
quid Celso	120.3
palpebra retorta dicta Hippocrati quæ	239.11
palpebram superiorem cur moueri oportuerit	238.34
palpebrarum cartilagines.	3.48. & 4.40.
& 150.17	
palpebrarum fabrica.	238.21. & administratio
ibid.	
palpebrarum musculi .quare, Musculi palpeb.	
palpebrarum pili	150.26
palpebras mouentium musculorum	

delineatio .179.10 & 238.21. eorundem descriptio.	238.21. ad ministratio
239.23	
palpebras mouentium musculorum difficilis cognitio	239.13
* πάλυξ quid. 261.37. & 497.29. & 505.	7
panniculus carnosus	233.8
panniculus carnosus, non sunt octo abdominis musculi	233.8
panniculus rotundus	385.55
papilla, θήλη	543.44
papillæ substantia	544.24
papillæ constructionis, & totius substantiæ eiusdem ratio	546.24
παράλημιον	168.40
παράπημιον	168.10
παράσφαγίς	102.33
παράσφαγίς. 55.39. λιγροσθίς & ἀδινωθίς. ead.41.	& 167.26
parastates λιγροσθίς	524.4.37. & 525
14	
parastates ἀδινωθίς	525.13
παρέγχυμα quid	507.40
παρέγχυμα lienis	512.16
parietalia ossa	166.40.54
paris, siue paria ossa	167.9. & 166
39	
παράδμια, faucium glandulæ cur.	579.36
50	
partium functiones naturales aliæ per fibras fiunt, aliæ absque illis.	257
40	
parturiētes genibus innixas facilius parere	131.56
parturientibus non recludi pubis ossa.131	50
partus septimestris Hippocratis sententia imperfectus	531.16
patella quæ femoris ossi connectatur.	141
57.	
patellæ figura, & descriptio. 141.25.	
situs, & forma. eadem	41. inde
patellæ nomina	168.31
patellæ substantia & usus. 142.4. 14	
IOAN. PAVLVS GVIVCI-VS Vrbinas	46.45
paxillares dentes	167.21
paxillum	167.4
pecten	168.16
pecten & pectus τὸ μιστὸν quibusdam	120.3
pecten pedis	148.36
pectinis os	168.24
pectus quid	88.40
pectus manus	168.16
pectus & pecten pedis	168.55
pectoris clypeus, siue scutum. 167.54	
pectoris siue pectorale os. 88.42. & 167.43. quale in quadrupedibus.	91.45. eiusdem synarthrosis. eod.
pectoris os utrinq; lunatum	93.7.
pectoris ossis à cartilaginibus costarum liberi delineatio	87.27
pectoris ossis cū cartilaginibus, etc. administratio	599.56
pectoris ossis unā cum ipsi coarctatis cartilaginibus interior superficies expressa	560

pectoris ossis ad ensē comparatio.	92
50	
pectoris ossis furcula, iugulum, σφαγὴ	92.22
pectoris ossis humani descriptio.	92
8	
pectoris ossis quot ossa	162.40
pectoris ossis substantia & usus.	93.
11. inde	
pectoris uertebrae	167.37
πεδίου	148.36. & 168
54	
pedium quinque ossibus constare.	148
41	
pedij ad tarsum coarticulatio.	148.49.
pedij descriptio	148.35
pedij ossa quot	162.47. eorundem appendix.
8.6. capita.	9
12	
pedij ossium figura & descriptio.	5. & 6. & 142. & 143.22. inde
pedij ossium interualla. 149.2. ad digitos articulatio	7
* Pelopis sentētia falsa, de uenarum & arteriarum ortu	298.47
peltalis cartilago	153.23
peluis cerebri pituitam excipiens.	640
23	
penis	168.25
penis constructionem subeuntia.	528
7	
penis duo præcipua corpora.	528.10.
eorundem delineatio.	372. & 373.12. & 374.2. examen.
556.	53.
penis corporum ortus, uenarumq; arteriarum & neruorum huc pertinentium examen	556.12
penis & testium à suis inuolucris detectio in administranda Anatome.555	19
* penis fabrica exposita	226.44.
musculi quatuor ordine. eadem.	56. officium. 127. s. administratio.
eadem	16
* penis fabricæ totius delineatio.	225
28	
penis musculorum examen.	556.5
* penis musculorum traditio apud Galenum perijt	227.26
penis situs	528.1
penis structuræ ratio. 527.40. eiusdē substantia	ead.45
peni tres meatus falso ab Arabibus attributi	529.16
penis uenæ, arteriæ ac nerui.	528.47. cutis. eadem. 57. inde.
musculi. 529	1
πεδύλακτιον.	26.14
πεδύλακτιος membrana	627.19
περίστροφος	166.22
perinæi situs	528.41
πεδύλακτιον. 3.24. & 571.43. cartilago.	153
53	
πεδύλακτιος membrana	294.56. & 576.29. & 627
22	
περίτόναι & ὑμῶν 385.48. χιτῶν. eadem, & περίτόναι σπένδαμα. eadem.	
Mm 2	dem.

dem	50	rum descriptio.	248. 46	pri-	φακοδολις dictus humor	646. 24.
peritoneum in similiarium partium		mus, secundus, tertius.	249. 2.		36	
numero	386. 1	qualiter in simijs sese habeant.	250. 31.		φάλαγγες digitorum quæ.	121. 48
peritonæum non undique pariter		decem sequentes, primis			pharmacopolarū impostura excogi-	
crassum	386. 39	digitorum articulis præfecti. ea-			tatum os de corde cerui.	94. 23
peritonæum quibus partibus perui-		dem. 46			φάρυγγος	55. 42. & 167. 28
um	386. 46	decimusquartus &			φάρυγγος appellatio	579. 17
peritonæum quibus uasis ac nervis		quintus. 251. 3.			φάρυγγος	574. 12
implicetur	386. 57	decimus sex-			φάρυγγος	46. 17
peritonæum tactus sensu etiam præ-		tus, pollicem ac tres proximos di-			φάρυγγος	19. 28
ditum	387. 6	gitos abducens. 251. 22.			φάρυγγος	290. 47
peritonæum, transuersis abdomi-		mus septimus, octauus. eadem. 43.			φάρυγγος in mamillis quid	544. 24
nis musculis pertinaciter adhærēs.		reliqui ad 22. usque, digitos quatu-			φάρυγγος	110. 44. & 168. 5
283	1	or pollicis adducentes	252. 1		pia mater. quære, Tenuis cerebri	
peritonæi à partibus extrinsecus ipsi		* pedis digitos mouentium muscu-			membrana.	
commisilis liberatio	549. 41	lorum numerus	252. 8		pinguedo. quære, Adeps	
peritonæi ad uesicæ fundum nexus.		* pedis digitorum motus	248. 46.		pinguedinis humanæ usus	157. 33
357	11	46.			pisces ut collo, ita etiam pulmonibus	
peritonæi apertio	549. 54	* pedis digitorū ac manus, ratio mo-			destitui	62. 51
peritonæi figura. 355. & descriptio.		tus prope par	248. 57		pituitæ cerebri purgandæ parati mea-	
ead.	& 356	pedis digitorum ratio	149. 13		tus. 32. 20. inde. & 51. 3. 28. inde	
peritonæi laterum uenæ. 356. 1. &		pedis fabricæ ratio	148. 46		pituitam cerebri excipientes ductus.	
355.		* pedis ligamentorum transuerso-			640	1
peritonæi magnitudo & situs. 386. 5.		rum descriptio. 253. 38.			pixis os	168. 22
forma, etc. ead.	19	ossa pedis committentia. eadem.			planarum ad testes comparatio. 520.	
peritonæi nomina	385. 46	54. administratio. 256. 41			50	
peritonæi ortus examen	557. 5	* pedis motus	245. 4		planta	168. 54
peritonæi superficies cuiusmodi.		pedis ossa quot	149. 21		planta pedis	148. 36
386. 22. processus ab eodem enati.		pedis ossium delineatio. 142. 23. de-			plantæ appellatio	147. 54
eadem	30	scriptio	143. & 144		plantæ cuti subnatus latescens ten-	
peritonæi usus	387. 10	pedis ossium quibus in manu nul-			do. quære, Pedis plantæ.	
περιονη quid	138. 25. & 168. 40	lum respondeat	147. 46		platarum nutritiua uis quatenus ab	
περιονη	168. 41	pedis ossicula sesamina cuiusmodi.			humana differat	493. 40
* pedis amplitudinem subeuntis li-		126	24		planum pedis. 148. 40. & 168. 54	
gamenti descriptio. 244. 22. ad-		pedis pectus & pecten	168. 55		πλάτη	167. 53
ministratio	255. 1	* pedis plantæ cuti subnati tendinis			Platonis Anatomica dogmata. 145.	
* pedis ac digitorum motibus famu-		lati descriptio	244. 3		36	
lantium musculorum alij in tibiæ		pedis posterioris in quadrupedibus			Platonis de ingenito nobis genera-	
sede anteriore consistunt.	254. 30.	appellatio quæ.	145. 11		tionis amore sententia	520. 22
alij in posteriore. eadem.	41.	pede ab extrema manu uno osse su-			Platonis de septo transuerso senten-	
alij in pede. ead. 47. & quot sigil-		perari	149. 19		tia	291. 50
latim	ibidem	* pedem mouentium musculorum			πλάτυς os	167. 39
pedis calcar	168. 48	administratio. 255.			πλάτυς os	31. 41. & 166. 56
* pedis cruris cauitas, per quam tra-		cundi. eadem. 14. tertij & quarti.			pleura uulgo quid	570. 29
iecto fune Hector ab Achille cir-		ibidem. 17. & 23.			πλευρά	167. 50
cum moenia Troiæ actus	246. 8	55. sexti 256. 4. septimi & octau.			Plinij lapsus	107. 17
pedis dextri ossium delineatio	5	ibidem.	11		Plinij de menstrui sanguinis prauis-	
* pedis digitos mouentium muscu-		pedem mouentium musculorum de-			tate & graueolentia error	538. 18
lorum administratio.	primi.	lineatio. primi. 205. 20. se-			Plinij in appellatione tali lapsus.	
255. 32		cundi. ibidem. 21.			140.	19
secundi & tertij. eadem.		tertij 207.			plumæ nomine omentum apud Bra-	
44.		39. quarti. ibid. 42.			bantos appellari	497. 48
decem sequentium.	255.	quinti. 211. 37.			pollicis os secundū, uix extra rectam	
54.		sexti. 180. 47.			lineam extendi	123. 57
decimiquarti, quinti.	256.	ptimi. 189. 31.			pollicis ossis primi ad brachiale ne-	
7.		octau.	179. 39.		xus. 123. 37.	
decimi sexti. eadem.	14.	noni	103. 52		secundi, etc. ea-	
decimi septimi & octau.	255. 33.	* pedem mouentium musculorum			dem. 48. & 124. 5.	
reliquorum quatuor	255. 52	descriptio. 245. 10.			tertij, &c.	
pedis digitos mouentium musculo-		primus.			eadem	9
rum delineatio	primi. 210. 27.	ibid.			pollicis ossis primi & postbrachia-	
secundi. ibidem. 35.		secundus, tertius, quar-			lis ossium ad brachiale contextus.	
tertij. ibi-		tus. 245. 21.			118	47
dem. 29.		quintus, sextus.			pollicis pedis ad manus pollicem di-	
eorum qui primos		246. 22.			scrimen	149. 14
digitorum articulo flectunt, &		septimus, octauus.			pollicis usus ac dignitas. 124. 54. si-	
sunt decem. 211. 46. & 212. 13.		247. 11.			tus	125. 24
decimiquarti. 183. 50.		nonus. 248. 14.			pollicem furibus præcidendi mos:	
decimi. 186. 48.		mus omnium. ibid.	24		124	57
decimisepti. ibi-		pedum in quadrupedibus & homi-			IV LII Pollucis lapsus.	65. 30. &
dem. 52.		nibus similitudo	145. 1. inde		66	32
decimi septimi. 179.		petrosorum ossium appellatio un-				
50.		de	33. 34			
decimi octau.	173. 49.					
quatuor musculorum, digitos qua-						
tuor pollicis adducentium.	210. 46					
& 211	48					
pedis digitos mouentium musculo-						

- polus 168.33
 polux 387.50
 πολύμορφον dictum cuneiforme os. 32.3. & 148.15. & 167.3. & 168.53.
 * popletica dicta quibusdam uena. 293.32
 * in Poplite latitantis musculi descriptio. 237.37. administratio. 255.40.
 porcorum iecur quale 506.45
 portæ uena. quare, Vena portæ.
 portæ uenæ officium 508.4
 portæ uenæ omenti membrana fultæ figura 358. & 359.18
 portæ uenæ ramī unā cum arterijs & nervis illis attensis quī examinandi 552.20
 portæ uenæ ramorum officium. 385.9.
 πορσι δπηκοι 324.36
 postbrachiale 168.16
 postbrachialis appellatio 120.7
 postbrachialis appendix 8.6
 * postbrachialis ossa neccientia ligamenta 220.51
 postbrachialis ossa quot. 120.8. & cuiusmodi sint. ead. 34. eorundem interualla. ead. 47. & 149.20. & 162.43
 postbrachialis ossa quī cedāt musculis 120.56
 postbrachialis ossium & primi pollicis ossis ad brachiale connexus. 118.47
 præcordium 387.48
 præcordia dicta quæ 290.48
 prægnantium uterus cuiusmodi. 534.52
 præsepola dentium 46.17
 processus 8.13.37
 processus alis similes 32.28
 processus dens appellatus, etc. 61.55. & 66.31
 processus lumborum uertebrae ex abundanti attributus à Galeno. 78.41.
 processus mamillaris. 22.25. & 23.30. & 31.27. & 36.44
 processus stylo scriptorio similis. 23.30. & 31.33. & 36.44
 processus appendicibus donati alij, alij non 8.25
 processus laterales siue transuersi in uertebrae quī 57.5. item descendentes. eadem. 18.22. posteriores. eadem. 30. & 59.21
 processus uespertilionum alis comparati 21.38. & 23.15. & 25.51
 processuum & appendicum differentia 8.22
 processuum in femoris ossibus alijsq; usus 135.2
 processuum femoris maxillæ, etc. de lineatio 5. & 6.26
 processuum transuersorum ceruicis uertebrae natura. 68.55. foramen. 69.4. ascendentium et descendentium natura. 69.25. numerus. 70.12
 processuum transuersorum in thoracis & colli uertebrae ductus. 75.24
 processuum usus 8.46
 πονήμιον 168.37
 πορσι δπηκοι 237.22
 proræ os 166.45
 proræ futura 166.29
 πηλοσολής dicta cerebri portio. 632.37. & 637.16. & * 309.40
 ψαλ musculus 297.14
 ψαλ uertebrae 167.38
 πτηνæ 168.48
 πτηνολόγος processus. 32.28. & 167.7
 pubis os. 6.2. & 127.17. & 128.51. & 168.24
 pubis os cur maximo foramine peruium, ipsiusq; sinus & tubera. 132.7.23. crassities ead. 30
 pubis ossis figura. 5. foramen. 123.39
 * pubis ossis foramen occupans membrana. 252.28. administratio 256.19
 * pubis ossium foramina occupans membrana 226.35. & 225.28
 * pubis ossis foramen occupantis membrana administratio 243.25
 pubis ossis historia 131.37. inde
 pubis ossa an usquam puellis nuper natis disiungantur, facilius partus genera 132.4
 pubis ossa mulieribus in partu non recludi 131.50
 pubis ossa quī dirimenda 556.16
 pubis ossium in uiris & mulieribus quæ differentia 131.41
 pudendi muliebris prominentes carunculae. 536.54. easdemq; præcendendi apud Aegyptios mos. 537.2
 pudendi muliebris carunculas non esse in omnibus æquales. 532.1
 pudibundum 168.25
 puellaris uteri fundus minor. 533.36.
 ceruix mollior 535.14
 pueri à ueteribus in Anatome exerceri soliti 83.22
 pueris quomodo eruendi dentes. 47.4
 puerorum ossa cuiusmodi 27.19
 pulmo instar promptuarij cordi circumpositus 596.24
 pulmonis anterioris sedis delineatio. 568. item posterioris ead.
 pulmonis cordi inuoluti delineatio. 561. & 563
 pulmonis examen 600.37. & 602.56
 pulmonis fibrarum seu lobarum de lineatio 562. & 563.12. & 568. inde
 pulmonis inflatio 601.48
 pulmo in quot lobos fibras ue distribuitur 581.46
 pulmonis lobū in homine nullum causæ caudicem suffulcire. 581.56
 pulmonis situs, ac partes. 580.50. forma 581.8. item. 560. & 561.30
 pulmonis superficies qualis. 582.7. item connexus. ead. 11. substantia. 28. uasa. 29. tunica. 46. nervi 50
 pulmonis uasorum ratio. 533.9. item tunica ead. 20
 pulmonis usus & constructionis ratio 582.53
 pulmonem thoracis formam sequi. 89.43
 pulmone carentia animalia etiam de xtro cordis uentriculo destitui. 596.35.
 pulmonum colores diuersi. 582.12
 pulmonum gratia homini datū cololum 62.49
 pulsus & respirationis idem usus. 570.7
 pulsuum autōr cor 594.57
 puppis capitis os 166.42
 puppis futura 166.27
 πύλος 640.42
 * πύλη 266.55
 πύλωρος unde dictus 390.27. & 391.16
 πύρινος & πυρινολόγος processus. 66.34
 pyxis 10.26
 pyxis os 166.45



Q
 Vadratum os cuiusmodi 168.53
 quadrupedum cum hominis cruribus, ac pedibus similitudo. 145. inde
 quaterij dentes 167.17
 quatrio tali tuber cur dicatur. 145.50



R
 Habdoides, siue ραβδολόγος futura inter uerticis ossa. 26.44. & 166.30
 ραχίς. 56.41. & 167.30
 radius quid. 1.40. & 110.50. & 168.8
 radij ad humerum articulatio. 111.51.
 radij cum ulna motus. 13.33. & humero. ead. 53
 radij delineatio 108. & 109.5
 radij obliquitas. 113.1. eiusdem ad ulnam articulatio. ead. 16. secundum ipsius longitudinem leuitas & asperitas 25
 radij partis inferioris historia. 113.40
 radij sinus deducendis locandisq; musculis & ipsorum tendinibus apti 144.47
 radij substantia cuiusmodi. 115.10
 * radium brachiali neccientia ligamenta 221.1
 * radium cum humero neccientia ligamenta 221.18
 radium primum & secundum constituentium musculorum delineatio. primi. 191.26. secundi. 189.1. tertij. 191.26.

INDEX

tij. 191. 23 quarti. 204. 28
 * radium in pronom ac supinū mo-
 uentium musculorum descriptio.
 215. 46. primus. ead. 57. secun-
 dus, tertius, quartus, 216. 12. admi-
 nistratio 124. 34
 ῥαγοειδης tunica 648. 16
 ramex, ῥαποειδης Græcis cur. 495.
 8.
 ramicum sectionis periculum. 495.
 24
 ῥαφα, ῥαφα, futurae 15. 53. & 166.
 25.
 raseta, & ossa rasetae 168. 15. 51
 rasga 168. 33
 rationis ossa 166. 40
 rationis sedes cerebrum 599. 13
 rationis sedes an in corde 594. 26
 rectum brachialis os appellatum cu-
 iusmodi 118. 14
 rectum intestinum. quare, Intesti-
 num rectum.
 recti intestini musculi 501. 54
 * recti intestini musculorum descrip-
 tio. 228. 39. sedem attollentium. ibi-
 dem. 42. orbicularis. 229. 1. ad-
 ministratio. 229. 28. delineatio.
 228 27
 * rectum intestinū attollentibus mu-
 sculis nullus opponitur. 228. 54
 rectum intestinum quod, & cuius-
 modi 501. 15
 recti intestini à colo differentia. 501.
 16 inde
 recti intestini situs ratio 503. 12
 recti intestini tunica ac fibrae 501.
 20. inde. uenae & arteriae. eadem.
 40. nerui 50
 recurrentes nerui. quare, Neruos
 sexti paris cerebri, etc.
 regum ueterum coronae cuiusmodi
 forma 592. 13
 in Religionis censores quosdam.
 594 41
 remigis cuiusdam Anatomiae, pecu-
 liare quid ab alijs corporibus habe-
 re obseruata, historia 510. 11
 RENALDVS COLUMBVS So-
 phistices apud Patauinos profes-
 sor 56. 23
 * renalis quibusdam dicta uena. 293.
 32
 renis canini ad humanum differen-
 tia 516. 9
 renis fascia quid 517. 10
 renum cum uenae cauae portionibus
 delineatio 374
 renum cur alter altero elatior. 514.
 49
 renum forma. 515. 2. magnitudo. ead.
 8. substantia 10
 renum in internis sedibus cōforma-
 tio 515. 30
 renum fabrica negligentius hacte-
 nus ab Anatomes professoribus
 expensa 515. 38
 renum munus 385. 27. &
 516 53

renum numerus, situs & usus. 514.
 29
 de Renum officio ridicula Anatomī
 corum dogmata 555. 2
 renum sinus cuiusmodi 516. 13.
 inde.
 renum sinus delineati 371. 49
 de Renum sinibus falsa quorun-
 dam persuasio 515. 51
 renum situs delineatio. 370. & 371.
 12. & 372. 32 & 373. 5
 renum tunicae ac nerui 517. 8. 21
 renum tunicarū, totiusq; eorundem
 naturae examen 554. 36
 renum uerebrae 167. 38
 renibus oblatae uenae & arteriae. 515.
 15.
 renuendi mos diuersus 63. 30
 respiratio naturalis, & non natura-
 lis 569. 45
 respirationis & pulsus idem usus.
 570 7
 respirationis organum thorax et pul-
 mo 96. 36
 respirationis organorum artificiosa
 constructio 583. 2
 respirationis partes, & cuiq; earum
 seruientes musculi 292. 51
 respirationis usus ac ratio 569.
 27
 de Respirationis usu libri autorem
 falso Galenum haberi 513. 19
 respiratione perpetuò egere homi-
 nem 89. 24
 * rete mirabile, seu plexus reticularis
 Galeni quis 310. 44
 reticularis plexus falso à bobus ad
 homines quoque relatus à Gale-
 no 524. 8
 reticularis plexus Galeni, nusquam
 repertus 642. 19
 reticularem plexum soporali arte-
 ria fieri. 50. 34. falso confictum à
 Galeno 52. 38
 risorij dentes 167. 17. 20
 risus author cur lien uulgo dicatur.
 514 8
 ῥωγας 648. 16
 Rodol 359. 56
 rostrum porcinum 167. 57
 rotator processus 168. 29
 rotatores femoris processus. 7. 57. &
 8. 23 & 134. 56
 rotula genu 168. 31
 rotunda omnia capacissima, & iniu-
 rijs minus exposita 390. 5



S
 Acrum os, ἰερόν, &c.
 167. 39. uide, Os sa-
 crum.
 sacri ossis appellatio,
 unde 85. 33
 sacri ossis constitutio 58. 34. &
 59 15
 sacri ossis dextro lateri commissum
 os, eiusq; figura 127. 3
 sacri ossis lateribus commissa ossa

in pueris tribus ossibus efforma-
 ri 132. 34
 sacri ossis lateribus commissorum os-
 sium usus 129. 4
 sacri ossis quot ossa 162. 39
 sacri ossis transuersi processus quai-
 lium ossibus connectuntur. 129.
 17
 σαγών 497. 9
 sagittale os 166. 57
 sagittalis futura, & uariis ipsius du-
 ctus 25. 12. & 26. 44. & 166.
 30
 sanguificationis in iecore modus ac
 ratio 385. 14. inde
 sanguificationis organū primarium
 iecur 508. 33
 sanguineus cordis uentriculus dex-
 ter cur appellatus 596. 20
 sanguis an mittendus in octo infe-
 riorum costarum inflammatione.
 602 5
 sanguinis in iecore generatio cuius-
 modi 508. 14
 * saphena 293. 30
 sapientiae dentes qui 167. 24
 σλαφοειδης os 1. 42. uide, Cym-
 bam referens. & 168. 49
 σλαφίον 166. 20
 scapulae à clauicula liberandae, admi-
 nistratio 275. 40
 scapulae anguli ac laterum descriptio
 plenior 97. 19
 scapulae anterior, seu costis proxima
 sedes. 98. 42. posterior 99. 8
 scapulae basis 96. 51. eiusdem ap-
 pendices 97. 3. cartilago. eadem.
 7. ceruix eadem. 37
 scapulae appendices 7. 44
 scapulae cartilago sinū eius frequen-
 ter augens 98. 3
 scapulae ceruix 10. 22
 scapulae dorsi figura 5. & 6. 11
 scapulae forma triangularis. 96.
 49
 scapulae humerum colligantium li-
 gamentorum descriptio 271. 17.
 administratio 272. 3
 scapulae inferioris superiorisq; lateris
 differentia 97. 11
 scapulae motuum differentia. 272. 18
 scapulae nomina 167. 53
 scapulae nullū musculū tribuit Gale-
 nus, proprio motu ad pectus ad-
 ducentem 272. 34
 scapulae oculus, & spina, quid. 168. 2
 scapulae processus 8. 23. & 98. 17
 40 inde
 scapulae processuum nomina. 167.
 55 inde
 scapulae superior processus qui sum-
 mus humerus dicitur, quibus ani-
 malibus obrigerit 100. 38
 scapulae sinus humero excipiendo
 paratus 97. 42
 scapulae spina 99. 22. 31. 50
 scapulam antrorsum agens muscu-
 lus, à Galeno non recte pro moto-
 re brachij

- re brachij habitus 263. 49
 scapulam mouentium secundus, à Galeno bipartiri uisus. & falso. 275. 43
 scapulam attollentes musculi tres, quibus homines carent, simiæ abundant. 274. secundus. ead. 10. tertius. ead. 26. quartus 32
 scapulam attollentibus non recte attributus à Galeno musculus. 274. 51.
 scapulam mouentes musculi, an respirationi quoq; seruiant. 292. 47. & 293 13
 scapulam mouentes & brachij musculi, in quibus animalibus uariet ab homine 270. 3
 scapulam non mouere musculus eum quo brachium detrahitur. 275 13
 scapulam mouentium musculorum administratio. 275. 22. primi. ibidem. secundi. 269. 36. tertij & quartij. 275. 29. eorundem delineatio. primi. 185. 41. secundi. 195. 17. tertij. 191. 15. quartij. 193. 15. item descriptio. 272. 18. primus. ibid. 20. secundus. ibid. 43. tertius. 274. 39. quartus 275. 4
 scapularum cum ossibus sacri ossis lateribus commissis affinitas. 129. 4
 scapularum figura. 94. descriptio. 95. inde. situs & nexus. 96. 12. usus. eadem 24
 σκελετόν 12. 5
 sceleti constructionem quid maxime uitiat 159. 1
 sceleti parandi ratio 155. 23. inde σκελῶν quid Galeno 168. 34
 * schiatica uena 293. 32
 scioli quidam Galeno nimis additi repræhenduntur 83. 1. inde sciurorum cæcum intestinum cuiusmodi 500. 34
 σκληρότης 649. 1
 σκληροειδὲς processus cerebri. 639. 8
 scopula, scopulum apertum. 167. 54
 scortorum apud Venetos truculentum facinus 126. 51
 scrotum, siue scortum quid 521. 39
 scutalis cartilago 159. 23
 scutum cartilago 167. 48
 scutum cordis 167. 44
 scutum pectoris 167. 54
 scutiforme os 168. 31
 scutiformis cartilago. 152. 4. 22. & 153. 21 inde
 στυλαιοὶς digitorum quæ 121. 48
 sectio. uide, Anatome.
 sectio corporis difficillima quæ. 510. 5
 sectio uiuorum, eiusq; historia, & quid ea peculiariter doceat. 658. 27
 secundæ, secundinæ, extimum foetus inuolucrum. 541. 56. uide, Foetus inuolucrum.
 secundinarum examen 558. 6
 semen à teste ad uesicæ ceruicem deferentis uasis historia. 524. 17. & 525 3
 semen deferentis uasis structura ratio 526. 22
 semen deferenti uasi nulla cum testium uenis & arterijs communio. 527 5
 semen deferentium uasorum ortus ratio 525. 54
 semen deferentium uasorum insertionem excipiens glandosum corpus 525. 18
 semen deferentium uasorum ad glandosum uesicæ corpus examen. 556 24
 semen uirile hominis primum effectuum principium 520. 33
 semen utero deducendum uasorum delineatio 378. & 379. 8
 seminis genitalis temperamentum ac ratio 384. 13. inde
 seminis procreatrix testium substantia 525. 38
 semini parando non præesse corpus glandosum, Galeni sententia impugnata 526. 47
 semini urinæq; communis meatus. 528. 22. eiusdem glande diuisi exemplum 529. 23
 seminales arteriæ an sanguinis expertes 526. 5
 seminales arteriæ quæ obseruandæ. 554 22
 seminalium uasorum delineatio. 373. 10. & 372 & 374
 seminalium uasorum examen. 555. 10.
 seminalium uasorum circa testem examen 555. 46
 seminalium uasorum in mulieribus ratio. 535. 47. & 537. 5. examen. 557 29
 seminalium uenæ & arteriæ series, ductus, ac ratio. 522. 55. & 523. 15. & 524 12
 seminalium uenarum & arteriarum in testes ductus. 370. & 371. 22. & 372 inde
 seminarij uasis in penem insertio. 525 6
 seminaria dextri & sinistri lateris uasa 355. 19
 senes cur dorsum inflectant. 71. 18
 senum caluariæ futuris destitutæ. 27 9
 sensus ac motus arbitrarij principium cerebrum 599. 13
 sensus communis os 166. 43
 sensus dentes qui 167. 24
 sensus seruato motu perit, & contra. 348 34
 septum, eiusq; foramen non obstare, ne cibuse uentriculo superiora repetat 389. 12
 septi foramina tria, non duo solum. primum. 291. 26. secundum. ead. 37 tertium. ead. 40
 septi transuersi administratio. 294. 13. eiusdem delineatio 191. 42. item descriptio. 290. 45. foramina. 291. 24. functio iuxta ueritatem 291. 49
 septi transuersi functionem uix quicquam antiquorum absolute tradidit. 291. 56. & super hoc ipso notatus Galenus 292. 1
 septi transuersi motus perperam à quibusdam assignatus. 283. 22. & 292 22
 de Septi transuersi munere antiquorum sententia, Platonis, Aristotelis 291. 50
 septi transuersi neruorum examen. 600 24
 serra, sectionibus apta quæ. 237. 3. delineatio 235
 ferrata compago 16. 2
 sesamina ossicula, σισαμοειδῆ 115. & 116. 53. & 119. 27. & 168. 56
 sesamina pedis ossicula 144. 55
 sesamina ossicula quibus sedibus reponantur. 125. 54. inde. in manu. 126. 11. in pede. ead. 24
 sesamina ossicula quot 162. 44
 * sesamoidon manus ossium administratio 224. 46
 sesaminorum ossium usus 1. 13
 sibilus pro gargareone 530. 13
 σιγμοειδὲς processus. 98. 22. & 168. 1
 σιγμοειδὲς linus 111. 21
 σιγμοειδὲς membranæ quæ. 592. 56
 * simia ab homine in pluribus differens quam putauit Galenus. 243. 47. in musculis thoracis. 287. 52. item. 288. 55. item 289. 19. & 30. item 293. 41 & 45. item 294. 4. & 33. item in brachium mouentibus musculis. 263. 14. item 266. 41. item 268. 50
 simias colo & mesenterio differre ab hominibus 496. 25
 * simiæ, in cubitum agentibus musculis ad hominem differentia. 291. 29. item in musculis femur mouentibus. * 240. 30. & 49. item. 241. 20. item in manus interna fabrica 303. 24
 * simiarum in musculis, pedis digitorum motoribus 3. ad hominem differentia. 250. 31. item in pedum motoribus musculis. * 245. 39. & 246. 16. & 248. 24. in digitorum motoribus, & quo pacto. 250. 34. & 251. 33 & 56
 simiarum ad hominem differentia in pulmonis lobo quinto uenam cauam sustinente 280. 3. & 41
 simiæ ad hominem differentia, in scapulam mouentibus musculis. 274. 11. & 26 & 33
 * simiæ ab homine in tendine pedis subnato differentia 244. 5
 simijs, musculorum thoracis numerus ab homine uariis 292. 40
 simiæ caudatæ ab hominibus differentes in neruorum serie. 349. 40 & 55.
 simiæ caudatæ lumborum uertebra. 77. 54. & processus earūdem. 78. 53. & 79 3
 Mm 4 simiæ

- simiæ caudatæ tertio musculo digi-
 tos manus mouentium carentes.
 306. 45
 simiarum sectio Galeno familiarior
 quàm hominum. 42.56. & 81.24
 simiarum Anatomie quàm homi-
 num peritior Galenus.85.7. & 93.
 6.& 500 30
 simiarum non caudatarum coccygis
 ossis descriptio 82.54
 simiarum omentum mediam inter
 homines & canes rationem forti-
 tum 496.41
 simiæ pulmone deceptū Galenum,
 etiam hominis pulmōni quintum
 lobum attribuere 581.56
 simiarum sacri ossis & coccygis deli-
 neatio. 80.33. descriptio 81.37
 simiarū sectione delusus Galenus,
 aliorum Anatomicorū placita ue-
 ra sæpe euertere aggressus. 299.50.
 uide, Galenus simiarum sect. delu-
 sus, &c.
 similiaria corpora 286.1
 sinus, ad quem decimus femur mo-
 uentium musculus uoluitur. 131.22
 sinus, quo crassissimus corporis ner-
 uus ferrur 131.16
 sinus in uertice diuersa serie 54.53
 sinus articulationis nomine non pa-
 rati 11.21
 sinus ossibus quibusdam peculiaris.
 2 45
 sinus primæ uertebrae, tubera secun-
 dæ excipientes 66.4
 sinus, seu acetabula in ossibus quæ.
 10 27
 sinuum capitis ratio 54.3. inde
 sinuum medullam continentium ap-
 pendices non esse opercula 7.40
 sinuum in ossibus & capitum usus.
 10.46 ac differentia. eadem.
 50.
 solis calor in suspensis corporibus
 uis 585.21
 solum pedis 168.54
 * somni arteria 296.45
 σοφρονισμός dentes 167.22
 spatula 167.54
 speciei propagandæ Naturam prou-
 disse 519.45
 σπέρματινός πόρος 525.1
 σφαγν̄ pectoris ossis 92.22
 * σφαγιλλίδες uenæ 270.10
 spherica figura iniurijs ferendis om-
 nium pertinacissima 995.31
 σφλωιδίς os 1.37. & 28.33. &
 167 2
 σφυγὰ. 168.41. neutro & foeminino
 genere 45
 σφυγὰ perperam à Galeni interpre-
 tibus talos uerti 140.21
 spina 167.31
 spina cur appellatum tibiæ os. 140.56
 spina scapulæ. 168.2. eiusdem appen-
 dix 5. & 6.24
 spina sex humiliorum ceruicis uerte-
 brarum 68.22
 spina uertebrae 59.1
 spinarum appellatio 57.28. & 99.50
 spinarum apicibus obnata cartila-
 go 59.4
 spinarum in uertebis ductus 75.11
 spiritus animalis ubi elaboretur.
 622 57
 spiritus animalis per uasa distribu-
 tio quæ fiat 623.7
 spiritus in aquam conuersio in cor-
 dis inuolucro, quibusdam asserta.
 585 4
 spiritus uitalis fons cor 594.56
 spiritui uitali subseruiētia membra,
 eorumq; ratio 569.27. inde
 σπινδύλιον 167.41
 σπινδύλος. 9.30. & σπινδύλοι 167.31
 squamæformis conglutinatio. 21.29.
 & 23.7. & 25 13
 squamose temporum commissuræ.
 27.44. cur ita dictæ ead.54
 squamose conglutinationes cur reli-
 quarum suturarū specie non com-
 pingantur 28.9
 squamosas conglutinationes in exteri-
 ori capitis superficie elatius quàm
 interiori ascendere 29.17
 * squamose suturæ 166.34
 σφαυλὴ cur pro gargareone 580.15
 * σελήνια dicta uena. 267. 2. & 276.52
 σφαυρὴ 166.22
 σφαυρία sutura 166.27
 σφονγὴ 88.43. & 167.43
 σῆθος 88.43. & 167.44. & 168.16. 54
 σῆθος etiam de palma & pedio dici.
 120 6
 σῆθος pedis 148.35. & 168.54
 σολίδες 237.23
 stomachus, σόμαχος. 387.49. & 388.7.
 uide, Venterculus.
 stomacho adnatæ crebro glandulæ.
 389 19
 stomachi anterior & posterior facies
 367 32
 stomachi appellatio 153.45
 stomachi examen 603.5
 stomachi fibræ cur duplices solum.
 388 23
 stomachi obliqui ductus usus. 389.
 16
 stomachi oris clypeus 167.48
 stomachi situs & incessus 388.28
 stomachum non eodem cum arteria
 magna uti foramine septi. 388.36
 stomachum non esse angustiore
 quàm uentriculo continuatur. 389.
 15.
 strumæ uulgo strophulæ 245.30
 styloides, siue stylo scriptorio simi-
 lis processus. 8.31. & 23.30. & 31.
 40. & 112.5. & 166.56. & 163.
 14
 stylorum pro sectione descriptio. 236.
 39 delineatio 235.49
 * subciteni arteria 296.45
 Suidæ in laryngis dictione senten-
 tia explosa 579.19
 summus humerus 167.55
 summi humeri appellatio, et usus. u-
 de, Humerus.
 supercilia 11.7
 sura quid 133.26. & 168.40
 sura tibiæ uenter 138.30
 * suram constituentes musculorum
 uentres. 245.28. & 248.24
 suspendij præfagiū ex umbilici pro-
 gressu collo obducto 383.44
 suspensorum oculos solum ab aui-
 bus lacerari, nō cutem, aliter quàm
 uulgus putat 161.54
 futura 12.22. & 15.53
 futura coronalis. 21.16. lambdoeides,
 &c. ead. 19. & 22. inde
 futura frontis os à maxillæ ossibus di-
 rimens 29.43
 futura octauum capitis os circūscri-
 bens 28.22
 futura omentum anterioris uentrici-
 li fundo committens. 357.19. & 356.
 futura sagittalis 25.12
 futuræ capitis figura 20.4
 futuræ cuneiforme os circūscriben-
 tis interualla, &c. 23.21. inde
 futuræ interuallū cuneiformi et fron-
 tis ossi commune 29.36
 futuræ naturalis figuræ capitis cuius-
 modi 26.33
 futuræ capitis ossibus, & alijs com-
 munes 28.32
 futuræ non naturalium capitis figura-
 rum cuiusmodi 27.29
 futuræ, σφαγὰ. 166.25. earumq; nomi-
 na. ead.
 futurarum appellatio 39.13
 futurarum capitis delineatio. 24.
 & 25.4. & 37.14. inde. & 38.17. in-
 de. earundem ratio 11.47
 futurarum coitus qualis 16.47
 futurarum maxillæ superioris ratio.
 40.1. inde, ad finem usq; Cap.
 futurarum numerus. 28.20. & inter-
 ualla 29.11. inde
 futurarū uoce ueteres etiam harmo-
 nias completi 16.14
 futurarum usus 26.27
 futuras capitis etiam in interna cal-
 uariæ sede conspici 27.55
 futuris destituta quædam capita.
 27 5
 symphysis 12.22. & 16.15
 synarthrosis 12.20.36. & 13.18
 synarthrosis motus qualis 17.3
 synarthroseos uoce quomodo usus
 Galenus 120.27
 synchondrosis 12.43. & 16.47
 syncipitis ossa 166.38.42
 σωννύρωσις 16.34
 synsarcosis 12.39. & 16.41. &
 17 37
 sypho pro sectione parandus. 236.
 42. delineatio 235
 σύριγξ ἱερά 58.18

T

Actus instrumentum.



145.28

650 34
 tactus toto corpore fu-
 sus, cur 19.12
 talus, ἀσπράγγος et ἀσπίς
 & 168.43
 tali

I N D E X.

tali ceruix	10. 17	tendinum pedis traditio, ac digito-	theologis scholasticis frequentior de
tali connexus. 15. 46. ad calcē. 146. 27.		rū, sub Musculis pedis quærat. 167. 35	genitalibus & semine, quàm medi-
cum osse cymbam referente articu-	146. 25	tenon, uerterbra	cis, sermo 531. 22
lus.		τῷ ὠμῷ unde	theologos sibi solis uendicare de ani-
tali cum calce commissurarum sinus	146. 34	tergum	marum immortalitate disputatio-
146.		testis caput quid Galeno	nem 126. 48
tali delineatio. 5. & 6. 5. & 142. & 143. 6		testis dextri uena à caue caudice. 526. 1	Theophili parum Anatomici, locus
tali sinus, quibus à tibiæ osse & fibu-		testis inuolucrum intimum cuiusmo-	reprehensus 506. 50
la ligamēta assumit. 146. 14. & qui-		di 522. 27	Thersitæ caput, φῶξ 19. 28
bus tendines deducit ead. 20		testis musculus exteriori ipsius inuo-	thorax quid. 88. 38. θώραξ. 43. & 167.
tali situs, ipsiusq; cum tibiæ osse & fi-		lucro innatus 522. 16	44. & 586. 5
bula articulationis ratio 145. 40		testis tunicæ exterioris apertio. 555. 39	thorax pro corporis trunco Aristo-
tali tuber cur τῆς ὀστέου, siue quatrio		testem interdum unum, interdū tres	teli 389. 41
dictum. 145. 46. 50. quale in cani-		etiam reperiri 521. 21	thoracis amplitudinem intersepien-
bis 146. 1		testem sinistram petentiū uasorum	tium membranarū examen. 599. 57
talum ante sectionem tactui non oc-		ortus examini 555. 9	thoracis cauitatē intersepiētes mem-
currere 140. 12		testes cerebri, ac eorundem descri-	branæ. 572. 9. inde
talum falso appellari à quibusdā exte-		ptio 638. 19	thoracis creandi artificium admirabi-
riorem malleolum 140. 17		testiculorū malum granatum. 168. 29	le. 88. 45. inde. & 89. 37
tarsus 168. 50. & 238. 27		testes mulierum cuiusmodi. 535. 23.	thoracis ex sinistro latere expressio.
tarsi descriptio 147. 49. inde		eorundem inuolucra 38	559. 12. item anterioris 560
tarsi ossa. 148. 1. eorundem forma &		testium muliebrium musculorū de-	thoracis fabricæ quatuor scopi. 89. 40
quantitas uaria ead. 17		scriptio. quære, Vteri musc.	thoracis ligamentorū traditio. 294. 45
tarsi ossa quot 162. 47		testium muliebrium ratio 537. 51	thoracis motus cuiusmodi 89. 1
tarsi ossium delineatio 5. & 6. 4		testium muliebrium situs delineatio	thoracis motus uoluntarius 286. 50
τάρσος 4. 40		377. 12. & 378	thoracis motū, an musculi brachium
τάρσος appellatio 150. 29		testium constructionis ad iecur col-	aut scapulam mouentes, adiuent
temporum lineamenta musculosa		latio 525. 41	292. 47. & 293. 13
250. 39		testiū delineatio. 372. & 373. 50. & 374	thoracis musculi intercostales. quære,
temporis os. 21. 33. eius processus. 22.		testium in uiris musculorum descri-	Intercostr. musc.
7. 24. & 23. 14. & 36. 43		ptio. 285. 35. eorum usus. ibid. 51.	thoracem mouētes musculi, necessa-
temporis ossis linea 23. 49		administratio 286. 31	riū facti. & eorundem ratio 287. 16
temporum ossis cauitas. 31. 30. pro-		testium & penis à suis inuolucris de-	thoracem mouentium musculorum
cessus iugalis ossis portionem con-		tectio in administranda Anatome	administratio. 293. 18. eorundem
stituens ead. 47		555. 19	delineatio. primi. 185. 30. secūdi.
temporis ossis processus 33. 17		testium & uasorum seminalium exa-	172. 5. tertij. 201. 10. quarti. 204. 14.
temporum ossa. 29. 57. eorumq; cir-		men 555. 46	quinti. 201. 35. sexti. 195. ult. in-
cumscriptio 31. 22. & 166. 48. 54		testium cum suis musculis deline-	tercostalium musculorum deline-
temporum ossa lapidea appellata,		tio 372. & 373. 10	tio 188. 28
quæ 33. 41		testium inuolucra utrisque testibus	thoracis motorum musculorum de-
temporum ossa qualia esse oportue-		cōmunia. 521. 34. priuata utriusq;. ead.	scriptio. 286. 50. primus. 287. 24.
rit 28. 12		45	secundus. ead. 31. tertius in homi-
temporum ossium ansæ 167. 10		testium musculi, non recte ab Arabi-	ne, simiæ quartus. 288. 14. quartus,
temporalis musculi examen 603. 42		bus traditi 286. 4	simiarum sextus. ead. 56. quintus
temporalis musculo, quot neruorum		testium situs, ac numerus. 521. 19. for-	hominis, simiarū septimus. 289. 19.
propagines offerantur 327. 15		ma. ead. 23. substantia 26	sextus hominis, simiis octauus.
temporalium musculorum læsione		testium situs examen 555. 28	ead. 30
quæ mala inducantur 33. 27		testium substantia seminis procrea-	thoracem mouentium musculorum
temporales plagæ cur stuporiferæ		trix 525. 38	enumeratio, & quādo suo fungan-
Hippocrati dictæ 33. 30		testium substantiæ, insertæ uenulæ	tur illi munere 292. 40
temporales futuræ 166. 34		521. 29	thoracem mouentium musculorum
temporalibus musculis quomodo		testium uenæ cuiusmodi, earumq;	numerus uniuersus. 287. 18. & 292.
Natura prospexerit 33. 24		ortus. 522. 55. inde. & cum arteria	40. & quando singuli functionē
tendo latescens plātæ cuti subnatus.		connexus. 523. 43. & 524. 12.	obeant ibidem
quære, Pedis planta.		testium uirilium ratio 520. 5	thoracem mouentium musculorum
tendo ligamento, non neruo respon-		testiū uasa duplicia cuiusmodi 520. 7	sex, non intercostaliū functio. 287.
det 221. 42		testibus nullam generandi seminis	primi. ead. 29. secūdi. ead. 43. ter-
tendinis sub uola manus lateſcentis		uim tribui ab Aristotele 527. 16	tij. 288. 29. quarti. 289. 18. quinti.
descriptio. 302. 27. administratio.		testibus sanguinem ac spiritum defe-	ibid. 29. sexti. ibid. 37
* 222. 32		rentium uasorum numerus & or-	thoracis musculorum septimi, lateri
tendines nuncupati Musculi, qui		tus 522. 54	utriq; cōmunis delineatio 191. 42
267. 43		testudinatum dictum corpus cere-	thoracis musculis septum quoq; ad-
tendines, Nerui appellatione dicti		bri 636. 37	numeraſ, & eius traditio tota. 290.
315. 27		τῆς ὀστέου tali tuber, cur dictum	45. quære item, Septum
tendinū in musculis differētiæ. 228. 44		tharuca 168. 30	thoracis situs ratio 388. 1
tendinum, manus digitos, ac manū		θαλα, papilla 543. 44	thoracis ossium descriptio & figura.
ipsam mouentium traditio, sub cu-		Theod. Gaza, an recte mesenteriū la-	85. 54. inde. & 86. 7. & 88. 45. inde
iufq; musculorum traditione quæ-		cies uerterit 504. 5	& 89. 45
ratur 155. 4		Theodori Gazæ lapsus	thoracis uerterbræ & costæ 56. 51
			Mm 5 thoracis

thoracis uerterarū foramina. 70.45
 thoracis uerterarum figura. 71.25.
 uide, Vertebrae thoracis.
 θώρακος uerterae 167.37
 Thracum renuendi mos retrorsum
 flexo capite 63.30. & 67.10
 * θύμος 261.39. * & 282.18
 θυρεοειδής cartilago 153.22
 θυρεοειδής os 132.8
 tibia, *λευμήν* 138.24. & 168.36
 tibiae os ead.
 tibiae, & tibiae ossis discrimen 138.27
 tibiae appendix 8.1
 * tibiae motus quot. 231.1. super his
 Galeni sententia uaria 230.45
 * tibiae os ad fibulam neclentium li-
 gamentorum descriptio 253.30.
 administratio. 256.34
 tibiae os, spina appellatum 140.56
 tibiae ossis ad femur articulatio. 138.
 34. inde & 139.15
 tibiae ossis appēdix & processus. &c.
 133. 31
 tibiae ossis secundum ipsius longitu-
 dinem, figura 140.54
 tibiae ossis sinus & tubera, quibusta
 lo articulatur 139.41
 tibiae ossium figura. 136. descriptio.
 137.6. & 133.22. inde
 * tibiam mouentium musculorū ad-
 ministratio. 236.16. primi. ead. 34.
 secundū. ead. 37. tertij & quartū.
 ead. 48. quintū. 56. sextū. 236.24.
 reliquorum trium. 237.9. eorun-
 dem delineatio. primi. 180.26. se-
 cundū. 213.17. tertij. 199.48. quar-
 ti. 199.50. & 205.1. sextū. 180.29. se-
 ptimi. 186.35. octauū. ibid. 39. no-
 ni 183.32
 * tibiam mouentium musculorū de-
 scriptio. 230.3. primus. 231.11. se-
 cundus. ead. 29. tertius. ead. 50.
 quartus. 232.13. quintus iuxta Ga-
 lenū. ead. 51. iuxta ueritatē. ibid.
 sextus. 234.22. septimus, octauus,
 nonus 235.6
 * de Tibiā mouētibz musculis, Ga-
 leni sententia uaria 230.8
 tibiam petētes nerui. quāre, Nerui.
 timidis iecur maius datum 507.10
 tintinabulum pro gargareone. 580.13
 tirbus quid 494.39
 τριμῆς dentes 167.17
 tonsillae, earumq; usus 389.22
 tonsillae faucium, quae 579.46
 tonsillarum examen 604.12
 * torcular cerebri 309.45
 trachametra maior 168.30
 τράχηλος 10.11. & 167.34
 τριγλῶχινες, processus 592.5
 τριχίας mamillarū parum recte Ari-
 stoteli asserta 544.16
 τροχαντήρ μέγας 168.29
 τροχαντήρ femoris processus. 134.56
 tunica costas succingens quid. 570.21.
 eiusdē nomen, ac situs. ead. 29. ma-
 gnitudo. 35. figura. 40. superfi-
 cies quales, quisq; earum ad alias
 partes nexus 50

tunica costas succingens, altera uete-
 ribus dicta, quae 295.2. & 571.39
 tunica cost. succingentis foramina.
 571.14. substantia. ead. 22
 tunica costas succingentis secundae
 examen 603.32
 tunica costas succingētis usus, eius-
 demq; cōstructionis ratio 571.43
 tunicarum costas succingentium ad-
 ministratio 294.43
 tunica oculi. uide, Oculi tunicae
 Turcarum anulus, quo sagittantes
 utuntur 154.7
 Turcicae sellae cuiusmodi 593.30
 turcicorum telorū triangulares cuspi-
 des cuiusmodi 592.8
 Turdolorum gentis quosdam septe-
 nis costis creari 89.55
 τυλαειδής cerebri substantia 632.34
 tymparum ossa 166.54
 τυφλόν foramen 53.12
 τυφλόν intestinum cuiusmodi. 500.9

V



Accini uteri cornua. 532
 50
 uaccini uteri delineatio 382. 2
 uariciformis plexus 524. 7
 uaricofi corporis delineatio 374. 23
 & 375.
 ualis semen à teste ad uelicae ceruicē
 deferentis historia 524.17
 uasorum appellatio, neruis attributa 317.53
 uasorū per lienis corpus series. 512.6
 uasorum testi materiam deducentiū
 ortus ratio 525.54
 uasorum testibus sanguinem ac spi-
 ritum deferentium numerus & or-
 tus. 522.54. & an maior dextri late-
 ris quā sinistra implexus 523.50
 ubera. uide, Mamillae.
 uenalis arteria. uide, Arteria uenalis.
 uenalis arteriae descriptio. 590.25.
 eiusdem appellatio. ead.
 * uena quid. 257.29. qualiter à mem-
 brana eius corpus differat. ead. 31
 * uena, corpus instrumentariū. 257.34
 * uenae cōpositio, eiusq; ratio. 258.27
 * uenae tunica ascititia, quae 258.41
 uenae usus 258.55
 * uenae arterialis descriptio. 312.11.
 delineatio. 311.24. & 590.17. appel-
 latio ead. 19
 uenae arterialis examen 601.13
 uenae arterialis membranae cuiusmo-
 di 592.36
 uenae arterialis, eiusdemq; orificij de-
 lineatio, ubi quārenda 589.42
 uenae arterialis orificij, ac membra-
 narum examen 602.30
 uenae arterialis pulmonī insertae deli-
 neatio 568
 uenae arterialis principiū. 564.19. inde
 uenae arterialis usus 583.12
 uenae axillaris distributio delineata
 271. 37
 * uenae axillaris ort⁹ delineatio. 269.37

* uenae axillaris per brachium series.
 285.35. & 280.27. distributio in trun-
 cos praecipuos duos, ceteris igno-
 ta. 280.46. portionisq; qua in imū
 mergitur series. ibidē. portionis
 qua cutem subit series 287.6
 * uenae axillarem constituentis ortus
 282. 23
 * à Vena quae axillam petit sparsi ra-
 mi, priusquam illa brachium sub-
 eat 283.7
 uena caua. uide, Caua uena.
 uena caua primum cordis uas. 590.16
 * uenae cauae per collum caputq; se-
 ries 283.37
 uenae cauae p crura distributio. 291.1.
 femur petentes radices duae. ibid.
 radices minoris series. 290.16. ma-
 ioris radices series 291.15
 * uenae cauae per crura distributae de-
 lineatio. 274.1. per pedes. ibid. 43
 * uenae cauae distributionis descri-
 ptio, ab epate ordianda cur 276.28
 uenae cauae exortus, & ad iecoris gib-
 bum in duos truncos distributio-
 nis falsa haecenus traditio 507.8
 * uenae cauae, quā gibbo epatis adna-
 scitur, delineatio. 269.4. qua in
 dextrū cordis sinum tendit. ead. 17
 * uenae cauae partis eius quae supra ie-
 cur consistit exposita distributio
 278. 1
 * uenae cauae in iecore series. 276.43
 * uenae cauae ad iugulum progressus
 expositus 282.15
 uenae cauae membranae 591.36
 uenae cauae orificium 590.4. eiusq;
 delineatio, ubi quārenda 589.41
 uenae cauae orificij in cor pertinentis
 usus 596.37
 uenae cauae ortus, an à corde 589.51
 * uenae cauae ortus, apud autores con-
 trouersus. 275.7. item apud Gale-
 num uariis. * 281.4. & unde eam
 enasci oportuerit ead. 32
 * uenae cauae ortum ē iecore esse, im-
 becilliter à Galeno confirmatum.
 275.14. & quo pacto, deinceps
 * uena caua, quo pacto portae uenae
 committatur, & in iecur ramos dif-
 fundat descriptio 275
 * uenae cauae supra os sacrum biper-
 titae, delineatio 273.28
 * uenae cauae iuxta sacri ossis summā
 regionem distributio. 289.33. quā
 per foramen ossis pubis femur pe-
 tit 290.13
 * uenae cauae pars septum tranſiens,
 ea quae sub iecore consistit arctior
 non est. 278.1. contra quā Ga-
 lenus prodidit. ibid. & 275.23
 * uenae cauae per septum tranſeun-
 tis descriptio. 278.46. in septum
 ramī. ead. 49. in cordis sinum de-
 xtrum ad apertio. ead. 51
 * uenae cauae ad partes quae infra se-
 ptum sunt, distributio. 288.21. ad
 renem inuolucra. ead. 28. ad renes
 ipsos. ead. 36. ad lumborum uer-
 tebras

- tebras 289.27
- * uenæ causæ nomina 276.52
- uenæ causæ situs delineat⁹. 370. & 371.9
- * uenæ causæ totius per uniuersum corpus distributæ, delineatio 268
- * uenam causam constituentium, ecp iecore ductarū uenarū, congressus qua iecoris parte fiat 277.6
- * uenam causam sustinens pulmonis fibra, Galeni figmentum 280.31
- * uenæ communis cōstitutio. 287.14. series ead.39
- * uenæ communis delineatio. 271.55. & 272.14. diuisio. ead.18.
- * uenæ coniugis expers dicta. 279.28. & 358. & 359.50
- * uenæ coniugis expers, quo pacto à caua educenda fuerit 279.12
- * uenæ sine pari delineatio 269.28. eiusdem uaria distributio exposita * 279.35. & 45
- uenæ coniuge carentis examen. 600.56. & 602.3
- * uena Coronaria dicta 278.56
- * uenæ Coronariæ delineatio 269.23
- * uenæ superiora costarum interualla petentis, descriptio 282.26
- * uena Crassa dicta Hippocrati. 272.33
- * uena decolationis 296.44
- * uena ante paruum digitum & anularem, humerariæ soboles 286.23
- * uenæ Humerariæ per brachium series. 285.35. iuxta cubiti articulum ead. 56
- * uenæ humerariæ ortus, & priusquā brachium subit series 284.7
- * uenæ humerariæ orientis delineatio. 271.7. & totius series. ead.12
- * uena iugularis interior, eiusq; series. 283.45. exterioris ortus. 284.7. eiusq; series ead.22
- * uena iugularis interna, quibusdam falso dicta 284.48
- * uena minor Aristoteli dicta, quæ 259.34 & * 294.51
- uenæ & arteriæ, in musculorum fabrica, usus 220.35
- uenæ & arteriæ in testis substantiam implexus, &c. 524.12
- uena portæ. uide, Portæ uena
- * uenæ portæ descriptio. 264. ramorū in iecoris substantia series. ead.1. extra iecur distributio. 264.12. in bilis uesicam. ibid. ad uentriculū. ead.17. ad intestinū duodenum. ead.37. in duos truncos principales scissio. 264.19. trunci sinistri series. 264.50. dextri. 266.5. distributionis totius ratio ibid.35
- * uenæ portæ nomina 266.53
- * uenæ portæ ortus, ac distributionis delineatio 62
- * uenæ portæ ramī sanguinem melancholicum expurgantes 267.14
- * uena portæ, sanguinem non confici 267.5
- * de uena umbilici locus, ob Galenū aduertendus 294.23
- * uenæ umbilici nudæ delineatio. 293.
- * uenæ & arteriarum umbilici descriptio. 294. ortus. ead.7. ductus. ead.13. usus. ead.28
- * uenā quā uterus & mamillæ cōmunicant 290.41
- uenæ albæ Celso, quæ 518.51
- * uenæ apoplectice, iuueniles, organicae, peniles, subeticae, uertiginosae, quæ 270.15
- uenæ & arteriæ colī & recti intestini 501. 40
- uenæ & arteriæ renibus oblate. 515.15
- uenæ gracilium intestinorum. 499.38
- uenæ omentum implicantes cuiusmodi 496.44
- * uenæ puellarum hymen cōstituentes 290.13
- uenæ, quæ inciduntur 234.14
- uenæ seminales, an à renū uenis oriantur. 523.15. earumq; ductus. ead. inde
- * uenæ somni dictæ 270.17
- * uenæ substantiæ, cerebri non innascuntur, sed membranis ipsius implicantur, & quō pacto 307.13
- uenæ, tempore Aristotelis, Platonis, Hippocratis, quæ 259.20
- uenæ uentriculum petentes. 392.22. inde
- uenarū Anatomes ratio. 552.4. inde
- * in Venarū arteriarumq; serie Naturæ artificium 260.46
- * uenarum quæ per brachiū distribuntur appellationes uariæ. 272.28. axillaris. 272.30. asellaris. ibid.56. auris. 276.9. basilica. 272.57. & 273.8. capitis uena. 272.34. cephalica. ibid.53. cōmunis. ibid.42. corporalis. 273.12. cubiti interior. 272.56. & 273.8. humeraria. 272.34. iecoraria. 272.32. lienaria. ibid.33. Mediana. 272.39. media, mediana. 273.12. nigra. 272.57. & 273.8. oblique dictæ uenæ. 272.41. *ωμιαία*. ibid.34. ocularis. 273.8. saluarella. 273.5. salubris. ibid. spatularis 272.51
- * uenarum sex, caluarii ingredientium descriptio. 306.43. earū quæ in primū duræ mēbranæ sinū unā cum arterijs exhauriuntur. 307.49. tertiæ uenæ series. 310.3. quintæ ac sextæ. ibid.11. omnium delineatio 305.47
- * uenarum cerebri delineatio 305
- * uenarum cutem pedis ac tibiæ implicantium series, quo pacto discēda. 293.16. earundē nomina. ead.30.
- uenarū diductibus subditæ glandulæ. quare, Glandulæ
- * uenarū ē quibus purgationes menstruæ uirginib. promanare creduntur, expositio 290.9
- uenarum ex iecore prōdeuntium series 507.19
- uenarum in intestinis ratio 503.35
- * uenarum in pede consistentium series 293. 24
- * uenarum iugularium appellationes uariæ 270.13
- * uenarum iugularium delineatio. interioris. 270.6. exterioris. ead.9
- uenarum mamillis exporrectarum series 544.31
- * uenarū manus extremæ cutem implicantium series uaria 287.53
- uenarum per abdominis musculos repentium administratio 549.35
- uenarum per abdominis regionem inter cutem & carneam membranam excurrentium administratio 549. 10
- uenarum per iecoris substantiam digestarū, cur tenuior tunica. 508.37
- uenarum per manum tendentiū examen. 656.26. per crura 657.49
- * uenarum quæ inter pollicem & indicem, inter anularem & minimū habētur, ignorata series apud Medicos 288.2
- * uenarum renes petentium delineatio 273.15
- * uenarum seminalium delineatio, dextra, sinistra 273.21
- * uenarum seminalium series, in uiris. 288. sinistra. ead.48. dextra. 289.4. in mulieribus. 289.21
- * uenarum series in cubito quoq; ut in cute manus extremæ persape uarians 288.8
- * uenarū sub pectoris osse deorsum repentium descriptio 282.30
- * uenarum totius animalis numerus quis sit 260.20
- uenarum uentriculī munus 493.2
- uenarum uesicæ distributarum ratio 518.28
- uenis & arterijs ex iecore & magna arteria excurrentibus, quantum subseruiat mesenterium 504.34
- uenas musculis ad extimam tantum superficiem adnasci. 595.47
- uenas nullas intestinīs à caua propagari, contrā quā Galenus tradit 504. 49
- ueneris hortus, herba 539.27
- uenter & uentriculus, cur *γαστήρ* & *κοιλία* Græcis 389.31
- uenter inferior qui 502.39
- uentris fabricæ solertia 89.32
- uentris mappa 494.39
- uentriculus. uide Stomachus.
- uentriculus cerebri Galeno, nūc mediū, nunc postremus, præstātor dictus 636.26
- uentriculī cerebri anterioris nō sunt olfactus organa, ut putabat Galenus, & quædam alia 634.20
- de Ventriculis cerebri confutata recentium sententia 623.19
- uentriculorū cerebri administratio. primorum. 652.33. tertiū. 653.14. quarti. ibid. 51
- uentriculorū cerebri delineatio, ubi quærenda 633.34
- uentriculorū cerebri descriptio. 633. 32. numerus, ibid.42. dexter ac sinister

- sinister. 633. 45. cōmunis amborum
cauitas, qui tertius est uentriculus.
634. 39. quarti uentriculi historia.
635. 3. quid singulis insit. 635. 30.
quis sit usus. 636. 7. tres priores te-
nui membrana non succingi. 635.
40. à tertio uētriculo educi mea-
tus. 364. 47
uentriculorū cerebri septum. 363. 6.
eius descriptio. ibid. usus. ibid. 19
uentriculus cordis dexter, cur sangui-
neus appellatus 596. 20
uentriculus cordis sinister, cur spiri-
tuosus, aëreus ue appellatus 598. 5
uentriculus, cur sub thorace locatus
387. 51
uentriculus rex corporis quibusdam
dictus 494. 7
uentriculi superiori omenti membra
na tecti, descriptio 358. 17
uentriculi anterior pars 357. 12. & 356
uentriculi anterior & posterior faci-
es. 367. interior 368
uentriculi anteriori sedi nullā omen-
ti partem obduci 494. 22
uentriculi capacitatis & tunicarum
examen 554. 8
uentriculi eximendi ratio, in Anato-
me 553. 38
uentriculi forma. 390. 3. inde. & 506. 8
uētriculi fundus, an carnosior 392. 10
uentriculi historia 389. 30
uentriculi munus 385. 5. & 493. 56
uentriculi munijs qui subserviāt par-
tes ei accumbentes, atq; ita illius ad
alias partes contactus 494. 12
uentriculi nerui 493. 12. eorumq; u-
sus ead. 31
uentriculi nutrimentum cuiusmodi
494. 3
uentriculi octo facultates. 493. 56.
& 494. 6
uentriculi orificia 365. 5. & 366. 19.
& 390. 6. 21. eorundem non par am-
plitudo. ead. 41
uentriculi superius orificium 370. 16
ad Ventrliculi inferioris orificiū glan-
dulosa caro cuiusmodi 391. 2. inde
uentriculi protuberās in orificijs sub-
stantia. 391. 18. eius usus. ead. 25
uentriculi os inferius, cur superiori
arctius, & quanta eiusdem ampli-
tudo in quibusdam 390. 41. inde
uentriculi quantitas 391. 38
uentriculi sedis descriptio. 356. 17. &
figura. 360
uentriculi situs 389. 35. eiusdem exa-
men 551. 14
uentriculi substantia, forma, ac tūi-
cæ 388. 14
uentriculi substantia, quibus forme-
tur tunicis 391. 44. inde
uentriculi superficies 391. 28
uentriculi tunicarū series, numerus,
ac natura 367. 42
uentriculi uenarum munus. 493. 2.
inde. & arteriarum ead. 6
uentriculum nullis cellulis abunda-
re 391. 36
uentriculum petentes uenæ ac arte-
riæ 392. 22. inde
uentriculum quinq; iecoris fibris ap-
prehendi, unde ab Anatomicis tra-
ditum 506. 47
uentriculum sedi, non esse contigu-
um 502. 13
uermis imaginem referentium cere-
bri processuū traditio. 639. 1. deli-
neatio ubi spectanda 638. 55
uermiformes cerebri processus, nul-
lum habent motum 216. 15
uermiformes processus, continentes
tendines pro mente Galeni, qui
639. 48
uermiformium cerebri processuum
administratio 653. 54
uermiformium processuū usus à Ga-
leno mirabiliter traditus. 639. 9. à
recentioribus perperam ead. 23
uertebra 9. 26. 29
uertebra superior, inferiori maior
63. 52
uertebam in dorso medio unā utrin-
que suscipi, cur oportuerit 76. 36
uertebam secundā aliquot sibi sub-
ditis esse maiorem 68. 49
uertebrae, ἀνὸν δὲ 167. 31
quot. 162. 39
uertebiarum appendices. 7. 48. inde.
& 70. 57
uertebiarum coarticulatio 59. 28
uertebiarum corpus 57. 3
uertebiarū corporibus exporrecto-
rum examen 603. 27
uertebiarum in compingendo sce-
to applicatio cuiusmodi esse debe-
at 160. 32
uertebiarum in senibus nexus 71. 13
uertebiarum inter se differentia. 58.
46. inde
uertebiarum nexus uariis 15. 11
uertebiarum omnium articulationis
ratio 75. 44. inde
uertebiarum processus 8. 18. trans-
uersi 59. 20
uertebiarum spina 59. 1
uertebiarū ceruicis corpora quomo-
do committantur. 69. 42. inde
uertebiarum ceruicis delineatio. 60.
descriptio 64. 35. inde
uertebiarū ceruicis processuū trans-
uersorum natura. 68. 55. foramen.
69. 4. 25. numerus. 70. 12. laterum
foramina ead. 29
uertebrae ceruicis primæ descriptio.
64. 35. 40. qualis in canibus. ead.
51. secundæ tubera. 66. 8. & dens.
ead. 28. & 68. 13. inde. earundem &
reliquarum processus quales. ead.
29. inde per totum
uertebiarum colli, lumborum, & tho-
racis foramina uariare. 70. 29. inde
uertebiarum colli processus 76. 15
uertebrae costarum, & thoracis 56. 52
uertebiarum lumborum delineatio.
77. descriptio 78. 6. inde
uertebiarum lumborum numerus.
78. 8. corpora, ead. 11. foramina,
13. transuersi processus. 18. spina;
24. processus ascendentes & de-
scend. 34. inde & 79. 3
uertebiarum lumborum processus,
eorumq; ductus. 75. 38. & articu-
lationis ratio 76. 23
uertebrae thoracis quot numero ple-
runque 72. 45. & 75. 56
uertebiarum thoracis delineatio. 71.
25. descriptio. 72. 44. inde. fora-
mina 73. 52
uertebiarum thoracis differentia in
corporibus. 73. 3. ex sinibus, qui
costæ articulantur. ead. 25. ex cor-
porum substantia. ead. 44. à trans-
uersis processibus. 74. 2. à spina.
ead. 40. inde. à processibus ascen-
dentibus & descendantibus 75. 43
uertebiarum thoracis processus, eo-
rumq; ductus 75. 24
uertebiarū thoracis processus quot
76. 51
uertebiarum thoracis quandam su-
pra, infraq; ab alijs suscipi 72. 51
uertebias thoracis tredecim sæpius
occurrere, quàm undecim 89. 47
uertebias dorso neccientia ligamēta,
quare, Dorso uert.
uertebias ginglymo articulari quo-
modo à ueteribus dictum 15. 18
uertebias in pueris pluribus cōstare
ossibus 71. 3
uertebrium 9. 26
uerticis os sinistrum 36. 43
uerticis ossa. 21. 32. & 23. 11. & 29. 56.
eorumq; circumscriptio. 30. 4.
& 166. 33
uerticis ossium situs 28. 15
uerticis sedem urendi, aut tenebran-
di temeritas 54. 55
uerticis sinus 54. 53
uerticulum 9. 30
uerticuli 167. 32
uescet quid 388. 9
uesica urinæ receptaculum, eiusq; si-
tus ac forma. 517. 41. 50. substantia ac
fibræ. 518. 2. uenæ, arteriæ & nerui
ead. 28
uesicæ cauitatis delineatio 380. 14
uesicæ ceruicem ambiens musculus
372. & 374. 1. & 226. 34. & 225. 28.
eiusdem descriptio. * 227. 44. in
uiris. ibid. in mulieribus. ead. 51.
usus. ead. 55. administratio. 229. 28.
delineatio in uiris. 226. 34. & 225. 28.
in mulieribus 227. 41
uesicæ situs delineatio. 370. & 371. 36.
& 372
uesicæ fundus 356. & 357. 11
uesicæ tunica, cur durior 518. 16
uestigium 148. 36
uesicæ ceruicis musculi, ipsiusq; uesi-
cæ fundi, & ceruicis examē. 556. 44
uesicæ ceruicis pars uteri ceruici in-
serta 381. 31
uesicæ ceruicis per glandosum cor-
pus transitus 525. 26
uesicæ ceruicis semini urinæq; com-
munis delineatio 374. & 375. 7
uesicæ

I N D E X.

uesicæ cervicis seu colli nō eadem in uiris & mulieribus ratio	519.24	umbilici uena in iecur porrecta.	356.	uteri acetabulorum examen.	558.28
uesicæ collo adnati corporis glando- si usus	526.38	& 357.	2	uteri acetabulorum ratio cuiusmodi	39.
uesicæ cum seminarijs organis exe- ctæ delineatio.	374	umbilici uena iecur peritonæo con- necti	507.52	uteri canini & uaccini delineatio	382.
uesicæ & uteri forma quatenus eadē 530.35	(& 378	umbilicum non esse corporis mediū 389.	39	uteri ceruix an multis & orbiculari- bus musculis intertexta	535.10
uesicæ & uteri situs delineatio.	377.	in Umbilicum pertinentium uenarū & arteriarum series	543.20	uteri ceruicis delineatio	378
uestigium	168.54	ungues calente aqua auferendi ra- tio	158.13	uteri ceruicis ratio	537.44
uetula os	167.40	ungues ex quibus gignantur.	150.11	uteri ceruicis substantia	535.1
uespertilionis alis similes processus.	21.38. & 23.15. & 25.51. & 167.7	ungues sensus omnis expertes.	150.9	uteri cornua	532.35
uini multi feruētis ad iecoris sangui- ficationem comparatio	508.18	unguium eadem quæ cartilaginū substantia	4.46	uteri cornua in homine, Galeni fig- mentum	286.14
uirginalis dicta uena	293.30	unguiū figura & descriptio.	149.34.	uteri muliebris cornua quid ab alio- rum animantium cornibus diffe- rant	533.6
uirile semen primariū hominis prin- cipium	520.38	43. usus, ac natura. 51. nexus. 150.1	ut	uteri cum illū peritonæo alligātibus membranis delineatio	380.14
uirilis mēbri structura. uide, Penis.		unguium nerui. 150.7. & incremen- ta	ead.13	uteri cum mamillis consortium.	544.
uirorum capita à mulierū capitibus non perpetuò futuris uariare.	26.	unionum à quodam deglutitorum historia	390.49	43. & 546.46	
47.	inde	uocis generatio cuiusmodi	578.7	uteri & uesicæ situs delineatio.	377.
uitreus humor dictus	646.51	uocis materia	62.56. optima quæ 583.	& 378	
uita quibusdā dicta foetū inuoluens membrana	543.4	uocis organum præcipuum aspera arteria	577.2.50	uteri ac uesicæ situs qui obseruādus.	557.22. & forma
VITVS TRITONIVS Athe- sinus	538.13	uocis organum præcipuum, laryn- gis lingua	154.47	ead.43	
uiuorum sectionis ratio, & quid ea præstet	658.27	uocis organum præcipuum quod sit iuxta Galenum	261.33	uteri foetu turgidi delineatio	382.40
ulna quid	110.50. & 168.3.5.10	uocis plectrum gargareon	580.30	uteri forma delineata.	381. & 530.
ulnæ ad brachiale ductus, inferio- risq; ipsius sedis historia.	112.1. inde	uocem nō edere collo carentia.	62.57	35. cur Arabibus quadrata dicta.	ead.
ulnæ ad humerū articulatio, ipsiusq; hic processuū & sinus descriptio.	110.53. inde	uolæ mediæ superstrata carnea sub- stantia descripta	303.44	uteri in fundum & ceruicem diuisio	529.
ulnæ ad humeri orbitā flexus	106.10	uoluulus cuiusmodi intestinū.	499.7	529.	35
ulnæ appendix. 8.3. eiusdem proces- sus	8.30	ὑγῶς meatus, eiusq; ratio	542.29	uteri fundus puellis minor.	533.36.
ulnæ cum radio connexus cuiusmo- di in animalib. aliquot.	113.9. inde	urina serosus humor	514.31	ceruix mollior	535.14
ulnæ delineatio, 108. & descriptio.	109.5. inde	de Vrinæ excolatione medicorum commentum	515.46	uteri fundi os omento cōprimi.	495.9
ulnæ processus anterior & posterior	109.	urinae foetus meatus.	357.10. & 356. & 378.17.	uteri fundi oris ad ceruicis os prola- psus	530.7
ulnæ processus, <i>leopoldæ</i> .	106.17	urinam foetus deducētis meatus ra- tio	542.25	uteri fundi os, quibus in pudendum soleat propendere	533.33
ulnæ processibus nulli appendices	8.	urinæ seminiq; communis meatus.	528.22. eiusdem separati exemplū. 529.	uteri fundi orificium	380.14. cuius- modi
ulnæ secundum ipsius longitudinē forma, & impressiones quædam.	112.20. eiusdem cognoscendæ uti- litas. ead.	urinam ē renibus in uesicā deducen- tium meatuum historia.	518.43. eo- rundem artificiosa insertio	532.11	
ulnæ sinus humeri rotulam excipies	109.	529.	23	uteri fundi sinus.	530.56. cuiusmodi
ulnæ substantia solida, &c.	115.11	urinam uesicæ deferentiū meatuum delineatio.	379.10.36. & 378	531.	30
umbilicus Veneris herba	539.27	de Vrinarij meatus operculo figmen- tum quorundam	516.46	uteri fundi substantia	533.46
umbilicus an corporis mediū.	595.13	urinariorum meatuum ad uesicam examen	556.23	uteri interna superficies cuiusmodi	531.
umbilici figura & descriptio.	355.17. & 356	urinariorum meatuum in muliere examen	557.38	531.	53
umbilici à peritonæo liberati figura	356.	urinariorum meatuū principia decla- rantes figuræ	371.50	uteri muliebris ab aliorū animalium uteris differentia	530.32
umbilici uasorū administratio.	549.	de Vsu partium libri ex aliorum sen- tentia à Galeno conscripti	350.4	uteri muliebris magnitudo.	533.16. & 381
57. eorundem præsectio.	550.31.	uterus muliebris & asinae, acetabu- lorum experts	540.9	uteri musculi	536.36
eorundem progressus, ac nodi cuius- modi.	383.42. ex eodem præsa- gia. ead.	uterus qualis in non prægnantibus.	529.53. in imprægnatis.	uteri muliebris musculorum descri- ptio.	286.7. functio. ead. 17. ad- ministratio
umbilici uasorū unā cum foetus in- uolucris, examen	558.21	529.53. in imprægnatis.	530.23. inde	ead.43	
umbilici uena, arteria. quare, Vena, arteria.		uterus quibus partibus adnascatur, & quas solum tangat	536.32	uteri officium, ipsiusq; conformatio nis ratio	537.5
		uteri acetabula uerè quæ, & quæ pri- mo, secundo & tertio, ita nuncupa- ta	539.19.39. inde	uteri orificium in coitu non semper aperiri.	532.20. neq; penem eo exci- pi
				ead.30	
				uteri os, & uteri ceruicis os, nō idem	532.
				532.	14
				uteri sedem & ceruicem petentiū ue- narum examen	557.35
				uteri situs, partiumq; uicinarum con- tactus	529.41. inde
				uteri situs quatenus foetū sexus ra- tione uariet	530.29
				uteri situs ratio.	537.6. item formæ.
				ead. 11. magnitudinis. 15. sub- stantiæ. 19. superficiē & nexus.	32. orificij fundi
				32. orificij fundi	39
				uteri	

I N D E X.

uteri superficies cuiusmodi 530.50
uteri testes 520.12
uteri tunica 533.57
uteri tunica interioris fibræ cuius-
modi 534.48
uteri uenæ & arteriæ, seminaliumq;
organorum constructio. 535.21.
& 536. 10
uteri uenarum & arteriarum in fœ-
tus inuolucrum implexus 541.35
uteri uenarum & arteriarum ratio
538. 5
uterum humanum nunquam spe-
ctasse Galenum 532.43
utero leuius gerendo, quomodo pro-
spexerit mulieribus Natura 132.1

uuea dicta tunica 647.44
uuea cur progargareone 580.15
VVOLPHANGI HERVVORT
patricij Augustanilaus 35.55

X



ισοδός in pectore loca-
tum os 93.2
ξισοδός cartilago ab in-
fima pectoris ossis sede
educta 167.46

Y



Αλσειδός dictus humor
647. 5
ύδατοςδός 649.22
ύσειδός OS. 1.39. & 11.56.
& 55.34. & 167.26

υ referentis ossis figura 55.5.11
υαλώς 244.32
υποζωκός tunica Græcis dicta, quæ
570. 29
ύψισιδός OS 55.34. & 167.26
ύψισιδός futura 166.28

Z



Ac & Zachd 536.41
zeudech 30.34.
& 166. 32
ziphac, zimpfac. 385.
52

zirbus, zirbus adipinus 494.39
ζυγωμα & ζυγωματα 1.37. & 33.13.
ζυγωματα, ζυγοειδ᾽ ossa, & ζυγώδης.
167. 8

INDICIS FINIS.

SERIES CHARTARVM.

*a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z A B C D E F G H I K L M N O P Q R S
T V X Y Z Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm


Omnes terniones, præter m & Mm quaterniones. Cæterum in m propter insutam extra reliquas
chartas figuram quaternione, obseruabis semifolium ideo iniectum, ut ex imaginibus ipsi impressis ua-
riæ portiunculae, insutæ illic figuræ committi queant. Sic & p, propter
insuendam figuram, trienio efficitur.

B A S I L E A E, E X O F F I C I
N A I O A N N I S O P O R I N I,
Anno salutis reparaæ M D X L I I I.
Mense Iunio.

VIRTUTI



EST VIA.





Shown in *Dream Anatomies Exhibitions*
At 5-10 footcandles (no UV) for 3 months
Page 164-165; 180-181; 190-191

Med. Hist.
WZ
240
FV575dh
1543

